


జంతుశాస్త్రము

అకశేరుకాలు, ప్రోటోకార్బేటా

ఖండిక - 1 - అకశేరుకాలు

ఖండిక - 2 - ప్రోటోకార్బేటా

సంఖ్య	100
తేదీ	10/11/92
సంఖ్య	100
తేదీ	10/11/92



డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
హైదరాబాదు

1992

ప్రపంచములోని భూమి మట్టి, మంచినీరు, సముద్రము మరియు ఆకాశము మొదలగు ప్రాంతాలను తమ వివాస స్థానముగా ఏర్పరుచుకొన్నవి.

జంతువుల గురించి అభ్యసించు శాస్త్రమును జంతుశాస్త్రము అంటారు (గ్రీ. జాన్ = జంతువు. లోగాన్ = చర్చించు లేక అభ్యసించు). జంతుశాస్త్ర విజ్ఞానము, జంతువుల ఉనికి, జీవనచర్య, పెరుగుదల, జీవిత చరిత్ర, సంఘాలు, వైవిధ్యాలు, పరిణామము దాని కారకాలు మరియు వాతావరణమును వివరించును.

జంతుశాస్త్ర విషయ సామగ్రి, వివిధ రకాల వైవిధ్యము కలిగి యున్నట్టి జంతు ప్రపంచము. జంతువులన్నిటిని సమగ్రముగా జీవన వ్యాపారము సాగించే జీవులుగా అర్థం చేసుకొనుటయే ఈ శాస్త్ర ప్రధమ లక్ష్యము.

1.3 జంతుశాస్త్ర చారిత్రక పరిచయము

చరిత్రకు పూర్వము నుండి మానవుడు జంతువులయందు శ్రద్ధ చూపుచున్నాడు. ఆహారము, దుస్తులు, చివరకు ఆత్మ రక్షణకు వీనిని చంపేవాడు. పురాతన కాలపు గ్రీకు, ఈజిప్టు, బాబిలాన్ నాగరికతలందు జంతువుల గురించిన పరిజ్ఞానము కనబడును. జంతుశాస్త్రము నందు గ్రీకులను మొదట పేర్కొనవచ్చును. అనాక్సిమాండర్ (క్రీ.పూ. 611 547) జెనోఫాన్స్ (క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్దము ఎం పెడోకల్స్ (క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దము) మిసోకెటిస్ (క్రీ.పూ. 460 370) అనువారు ఈ శాస్త్రమును గురించి చాలా కృషి సల్పినారు. కాని గొప్ప గ్రీకు శాస్త్రవేత్త అరిస్టాటిల్ (క్రీ.పూ. 384 322) 'జంతుశాస్త్ర పిత' యనబడుతాడు. ఇతను వృక్షములు, జంతువుల ప్రత్యుత్పత్తి, కోడి పెరుగుదల మున్నగువాని గురించి తొమ్మిది సంపుటములు గల "హిస్టోరియా అనిమేలియం" అను గ్రంథ రాజాన్ని వ్రాసినాడు.

తరువాత కాలములో రోమనులు జంతు శాస్త్రజ్ఞుల కూటమితో చేరినారు. వీరు ఈ విచిత్రమైనట్టి విషయానికి సంబంధించిన వివిధ భాగాల గురించి ప్రత్యేకమైన కృషి సల్పినారు. గ్రీకు, రోమనులు కృషి ప్రాముఖ్యత వేటికి ఈ శాస్త్రమునందు వాడే పారిభాషిక పదాలతో కానవచ్చును. ఈ పదాల పుట్టుక గ్రీకు, లాటిను భాషలకు సంబంధించి ఉన్నది.

పునరుజ్జీవనము (Renaissance) తరువాత విజ్ఞాన శాస్త్ర అవతరణతోపాటు పలువురు మేధావులను జంతుశాస్త్రము ఆకర్షించినది. విలియం హార్వే, రాబర్ట్ వదిక్, లీవెన్ హుక్, లీనియన్, వైడన్, స్వేన్, బెర్నార్డ్, డార్విన్, వ్యాంస్, పాఫర్, మెండల్, క్రాగ్ మరియు హైమన్ వంటి గొప్ప వ్యక్తులు తమ పరిశోధనలు, సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు మరి వివిధ రకాల క్రొత్త విషయాల చేత జంతుశాస్త్ర చరిత్రపై మాయని గుర్తులను వేసినారు.

జంతుశాస్త్ర వివిధ దృక్పథాలను వివిధ ఉప విభాగములుగా అధ్యయనము చేయవచ్చును. ఈ శాస్త్ర ముఖ్య శాఖలను క్రింద వివరించడమైనది.

1. స్వరూప శాస్త్రము (Morphology) (గ్రీ. మార్టా = ఉనికి, లోగన్ = అధ్యయనము) బాహ్య నిర్మాణమును చర్చించుట.

2. శరీర నిర్మాణ శాస్త్రము (Anatomy) (గ్రీ. అనా = పై; టామన్ = కోత). శరీర విచ్ఛేదనము ద్వారా అంతర్ నిర్మాణ అధ్యయనము చేయుట.
3. కణ సముదాయ శాస్త్రము (Histology) (గ్రీ. హిస్టాన్ = కణ సముదాయము లేక జాలకము) కణ సముదాయ సూక్ష్మ నిర్మాణమును అధ్యయనము చేయుట.
4. కణ శాస్త్రము (Cytology) (గ్రీ. కైటన్ = బోలు) కణము యొక్క నిర్మాణ విధులను చర్చించునది.
5. శరీర ధర్మ శాస్త్రము (Physiology) (గ్రీ. ఫైసిస్ = ధర్మము) వివిధ భాగముల మరియు వ్యవస్థల అధ్యయనము.
6. వర్గీకరణ శాస్త్రము (Taxonomy) (గ్రీ. టాక్సీన్ = వరుసగా ఉంచుట; నోమ్స్ = సిద్ధాంతము) జంతు వర్గీకరణను వివరించునది.
7. జీవావరణ శాస్త్రము (Ecology) (గ్రీ. ఓయకాన్ = గృహము) జంతువులకు మరియు వాని వాతావరణమునకు మధ్యగల సంబంధమును చర్చించునది.
8. పిండోత్పత్తి శాస్త్రము (Embryology) (గ్రీ. ఎన్ = తోపల; బ్రియో = ఉబ్బుట) గ్రుడ్డులోపలి వ్యక్తిగత పెరుగుదలను చర్చించునది.
9. జంతు భూగోళము (Zoogeography) (గ్రీ. జా = జంతువు; జీ = భూమి; గ్రాఫెఇన్ = వ్రాయుట) జంతువుల విస్తరణను చర్చించు శాస్త్రము.
10. వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రము (Pathology) (గ్రీ. పాథోస్ = బాధ) వ్యాధి స్వరూప లక్షణములు, కారణములను చర్చించునది.
11. పరిణామము (Evolution) (లా. ఇ = బయట పరచుట; వాల్వ్ = చుట్ట) ఇది జంతు జీవన పుట్టుక మరియు విభేదనమును చర్చించును.
12. పురాజీవ శాస్త్రము (Palaeontology) (గ్రీ. పాలియోన్ = పురాతన; ఆంట్ = జీవి) జంతు అవశేషములు మరియు శిలాజముల ద్వారా పురాణ కాలపు జీవనాన్ని అధ్యయనము చేయుట.
13. జన్యుశాస్త్రము (Genetics) (గ్రీ. జెనెసిస్ = పుట్టుక) పితృ లక్షణములు వారి సంతతికి అందచేయుటను తెలుపు శాస్త్రము.
14. పరాన్న జీవశాస్త్రము (Parasitology) (గ్రీ. పారా = ప్రక్కన; సిటోస్ = ఆహారము) పరాన్న జీవుల అధ్యయనము.
15. ఆస్టియాలజీ (Osteology) ఎముకలను గురించి చర్చించు శాస్త్రము.
16. ఎండోక్రైనాలజీ (గ్రీ. ఎండోన్ = తోపల; క్రిన్ = వేరు చేయుట) వివాళ గ్రంథులు మరియు వాని స్రావములైన హార్మోనుల అధ్యయనము.

పైన పేర్కొన్న జంతు శాస్త్ర విభాగములతోపాటు కొన్ని ప్రత్యేక విభాగములు కలవు. వానిని క్రింద పేర్కొనడమైనది.

1. ప్రోటో జీవాలజీ (Protozoology) (గ్రీ. ప్రోటోన్ = మొదట; జోవన్ = జంతువు) ప్రోటోజోవాకు చెందిన ఏకకణ జీవుల అధ్యయనము.
2. హెల్మింథాలజీ (Helminthology) (గ్రీ. హెల్మింథ్స్ = పురుగులు) పరాన్న జీవులైన పురుగుల అధ్యయనము.
3. ఫైటోనిమటాలజీ (Phytonematology) (గ్రీ. ఫైటాన్ = మొక్క; నీమా = దారము) మొక్కలందు నివసించే నిమాటోడ్లను చర్చించునది.

టాక్సానమి యందు వర్గీకరణము మరియు నామకరణము అను రెండు భాగాలు కలవు.

1.8.1 వర్గీకరణము

వివిధ జంతువులకు మధ్యగల బాంధవ్యాలను ఆధారంగా గైకొని క్రమబద్ధముగా వర్గాలు లేక జతులుగా అమర్చుట.

నామకరణము: వర్గీకరణ యందు వివిధ వర్గాల నిర్దిష్టమైన పేర్లను వర్తింపజేయుట.

వర్గీకరణము, నామకరణము రెండింటినీ కలిపి ఒక విశాల విభాగము, సిస్టెమాటిక్స్ (క్రమబద్ధ అమరిక) అని పేర్కొన్నారు. ఇందులో జంతువుల రకాలను, వైవిధ్యాలను, వాని బాంధవ్యాలను తెలుపు వైజ్ఞానిక అధ్యయనమని నిర్వచించవచ్చు. (గ్రీ. సిస్టెమా = వ్యవస్థలకు అన్వయించినట్టి).

1.8.2 వర్గీకరణ హైరార్కీ

జంతువులందరి అన్ని పెద్ద కూటములను చిన్న ఉప కూటములుగా విభజించవచ్చును. ఒక వ్యక్తిగత జంతువు స్థానాన్ని గుర్తించుటకు దీనిని వివిధ శ్రేణులకు చెందిన రకాలుగా, తెగలుగా అమర్చడమైనది.

కరోలియస్ లినియస్ (1707 1778) ప్రపథమ గొప్ప వర్గీకరణ శాస్త్రజ్ఞుడు. ఇతడు వర్గీకరణలో ఐదు విభాగాలను మాత్రమే గుర్తించినాడు. వీనిని వర్గము, క్రమము, జాతి, ప్రజాతి మరియు రకము అంటారు. కాలక్రమేణా ఇది మార్పు చెంది క్రింద వివరించిన భాగాలు వాడుకలోకి వచ్చినవి. అవి, రాజ్యము, వర్గము, తరగతి, క్రమము, వంశము, జాతి, ప్రజాతి. ఇవికాక మధ్యాంతర కూటములను ఇమిడ్చి వివిధ వర్గాల మధ్యగల దగ్గరి సంబంధాలను నిర్ధారణ కావించబడినది. ఈనాడు వర్గీకరణ పట్టిక యందు 21 అంచెలు చేరియున్నవి.

అన్ని జంతువులు తమ సాధారణ నామముతోపాటు శాస్త్రీయ నామము కలిగి ఉన్నాయి. శాస్త్రీయ నామకరణమునకు ప్రపంచమంతట ఉపయోగించే ఒక పద్ధతిని వర్గీకరణ శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్నారు. ప్రతి

టాక్సా	మానవుడు	కుక్క	కప్ప	బొద్దింక
సామ్రాజ్యం	జంతు	జంతు	జంతు	జంతు
ఉపసామ్రాజ్యం	మెటాజోవా	మెటాజోవా	మెటాజోవా	మెటాజోవా
వర్గము	కార్డేటా	కార్డేటా	కార్డేటా	ఆర్థ్రోపాడ
విభాగము	మామేలియా	మామేలియా	ఆంఫీబియా	ఇన్సెక్టా
ఉపవిభాగము	థీరియా	థీరియా		టెరెగోటా
క్రమము	ప్రెమేట్స్	కార్నిపారా	ఆన్యూరా	డిక్టియోప్టెరా
కుటుంబము	హోమినైడి	కానైడి	రానైడి	బ్లాటైడి
ప్రజాతి	హోమో	కానిస్	రానా	పెరిప్లానెటా
జాతి	సాపియన్స్	ఫెమిలియారిస్	ట్రగినా	ఆపెరికానా

జంతువుకు ఒక శాస్త్రీయ నామము కలదు. ఈ నామము ప్రపంచ వ్యాప్తముగా వాడుకలో ఉన్నది.

జాతి, ప్రజాతి అన్న పదాలు పలుమార్లు ఉపయోగములోకి వస్తాయి. కావున ముందుగా వీని నిర్వచనము గావించుట అవసరము.

జాతి: ఇది జీవుల ఒక కూటమి. ఇందులో పరస్పర సన్నిహిత పోలికలు కలిగి ఉన్న పెక్కు ప్రజాతులను చేర్చినారు. జాన్ రే (1627-1705) అను ప్రకృతి శాస్త్రవేత్త జాతి పదాన్ని ప్రవేశపెట్టినాడు.

ప్రజాతి: అన్ని జంతువులు, వృక్షముల వర్గీకరణానికి ప్రజాతి అన్నపదము మూల ప్రమాణము. వర్గీకరణ హైరాక్లియండు అతి ముఖ్యమైన శ్రేణి. చాలాకాలము నుండి వర్గీకరణలో ప్రజాతి నిర్వచనము ఒక ప్రశ్నగా ఉన్నది. నిర్వచనము సమాయాసు గుణ్యముగా మారుతూ వచ్చినది. సాధారణంగా ఒక ప్రజాతికి చెందిన జీవులు తమ మధ్యనే సంతానము వడయును. ఇతరులతో సంతానోత్పత్తి జరుపవు. 'మే' అను శాస్త్రజ్ఞుడు 1942 ప్రజాతి అనగా తమ మధ్య సంతానోత్పత్తి జరుపుకునే వ్యక్తుల జనాభా అని నిర్వచించినాడు.

వర్గీకరణను గురించి అభించిన విషయ సామగ్రి ప్రజాతుల గురించి వివిధ అభిప్రాయాలే ఆధునిక ఆలోచనలకు దారి తీసినవి. కె.జోహన్ 1905లో జీవశాస్త్రంలో ప్రజాతికి స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని ఇచ్చినారు. జంతు ప్రజాతుల ముఖ్య లక్షణాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి.

1. ఒక పరస్పర సంతానము వడయు సంఘము: ప్రజాతి ఒక ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధ సంఘము. అనగా ఒక జంతువు ప్రజాతికి చెందిన వ్యక్తి ప్రత్యుత్పత్తి కొరకు తగిన సతగాడిని గుర్తించగలుగును.
2. ఒక జీవావరణ ప్రమాణము: ప్రజాతి ఒక జీవావరణ లేక వాతావరణ ప్రమాణము. ఇది జీవావరణములో ఒక స్థానాన్ని ఆక్రమించి ఉంటుంది. అందులో ఇతర ప్రజాతులకు స్థానముండదు.
3. ఒక జన్యు సంబంధ ప్రమాణము: ఒక ప్రజాతియందు స్వతంత్ర జన్యు ప్రవాహముగల జన్యు సముదాయము (Gene pool) ఉండును.

పైన పేర్కొన్న కారకాలు "ప్రజాతి భావన"కు దారి తీసినవి. ప్రజాతి ఒండొరుల మధ్య ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునే ప్రకృతి సిద్ధమైన జనాభా. ఇది ప్రత్యుత్పత్తి విషయంలో ఇతర సముదాయాలతో వివక్షత కలిగి ఉన్నది.

1.8.3 ద్వినామ పద్ధతి

వర్గీకరణ శాస్త్ర చరిత్ర క్రిస్తు పూర్వము ఐదు, ఆరు శతాబ్దముల నాటిది. అరిస్టాటిల్ వర్గీకరణ కొరకొక పద్ధతిని కనుగొనుటకు ఒక ప్రయత్నము గావించినాడు. ఆనాటినుండి పెక్కు వర్గీకరణ శాస్త్రజ్ఞులు మరియు జీవశాస్త్రజ్ఞులు ఎన్నియో ప్రయత్నములు పలికినారు.

లినియస్ కు పూర్వము జంతువుల నామకరణము గురించి ఒక విస్తృత పద్ధతి ఆచరణలో లేదు. వివిధ భాషలలో ఒక సామాన్య నామముతో వ్యవహరించబడేవి. లీనీయస్ కు తెలిసి ఉన్న ప్రతి జంతువు మరియు వృక్షమునకొక క్రమమైన స్థానమును ఏర్పరుచుటలో కృతకృత్యుడైనాడు. ఇతని మహోత్సృష్టమైన పనిని 1758వ సంవత్సరములో ప్రకటితమైనట్టి "సిస్టేమా నాచురీ" యొక్క పదవ ముద్రణయందు

కాంచవచ్చును. ఇందులో ప్రతి జంతువునకొక లాటిన్ పదమును లేక లాటిను భాషలోకి మార్చిన పదమును వాడినారు. ఇతడు చేసిన పని జీవశాస్త్ర ప్రపంచమునందొక చరిత్రను సృష్టించినది. ఇప్పుడిది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాడుకలో ఉన్నది.

ఈ విధముగా ప్రతి జాతిని రెండు లాటిన్ పదాలతో గుర్తించే పద్ధతిని ద్విసామనామికరణము అంటారు. ఇందులో మొదటి పదము జాతిని, రెండవ పదము ప్రజాతిని సూచించును.

ఈ విషయాన్ని విశదీకరించుటకు లీనీయన్ స్వయముగా మానవునికి జీవశాస్త్రరీత్యా 'హోమో' అను పేరిడినాడు. అనగా "మ్యాన్ ది రీజనర్" (కారణము తెలుసుకొను మానవుడు). కానీ 'హోమో' జాతియందు ఓరంగోటాంగ్ ప్రజాతి కూడా చేరి ఉంది. దీనికి హోమోట్రాగ్లోడైటిస్ అనగా గుహలందు నివసించే మానవుడు. ఇదే విధముగా గుర్రములు మరియు దానిని పోలియున్న వాటిని "ఈక్యువస్" జాతి యందు చేర్చవలెనది. ఇందులో ఈక్యువస్ కెబాలస్ అంటే అడవి గుర్రము. ఈక్యువస్ అసినస్ అంటే అడవి గాడిద మరియు ఈక్యువస్ జీబ్రా అంటే జీబ్రా.

ఈనాడు తెలిసియున్న ప్రతి జంతు, వృక్ష ప్రజాతికి ప్రకృతి శాస్త్రవేత్తలు ఒక శాస్త్రీయ నామము అంటకట్టుచున్నారు. పేరు ఎప్పుడూ లాటిన్ భాషకు చెంది ద్వందముగా ఉంటూ వచ్చినది. జాతి సముదాయ నామము ఎల్లప్పుడు ఏకవచన నామవాచకమై ఉండాలి. దీని మొదటి లక్షరము ఎల్లప్పుడు కేపిటల్ పదము ఉండవలె. ఉదాహరణకు ఆమీబా (Amoeba), రానా (Rana), ప్రజాతి నామము సామాన్యముగా లేక సంయుక్తంగా ఉండి విశేషణము (Adjective) కావలెను. మరియు జాతి యొక్క లైంగిక రూపములో ఏకీభవించవలెను. ఉదా. రానా ట్రైగ్రినా.

1.9 జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణ ఆకారము


ఇప్పటి జంతువుల వర్గీకరణను వ్రామన్ (1940) ప్రవేశ పెట్టినాడు. జంతు సామ్రాజ్యమున రెండు ఉపసామ్రాజ్యములు గలవు. ఒకటి ప్రోటోజోవా, రెండవది మెటాజోవా. మొదటి దానియందు ఏకకణం లేక కణరహిత జీవులు, రెండవ దానిలో బహుకణ జీవులు చేరియున్నవి. ఏకకణ లేక వికణ ప్రోటోజోవా మరియు బహుకణ మెటాజోవాలు విభిన్న రకాలకు చెందిన వాతావరణ స్థావరాలను ఆక్రమించి ఉంటాయి.

ప్రోటోజోవా ఏకకణ లేక కణరహిత జీవులు చాలా వరకు ప్రోటోజోవాన్లను ఏకకణ మరియు వికణ జీవులని రెండు పేర్లతో పిలుస్తారు. ఏకకణ జీవులు అను పదము వీనికి ప్రథమంగా ఇచ్చిన పేరు. ప్రోటోజోవాన్ జీవుల స్వభావము గురించి రెండు అభిప్రాయములు కలవు.

మొదటి సిద్ధాంతము ప్రకారముగా ప్రోటోజోవా ఏకకణ జీవులు. ఆకార నిర్మాణరీత్య ఇవి మెటాజోవా జీవుల దేహమునందలి ఒక కణాన్ని పోలి ఉంటాయి. ప్రోటోజోవాకు చెందిన పెక్కు జీవుల కూడిక వలన మెటాజోవా ఉద్భవించింది. రెండవ సిద్ధాంతము ప్రకారముగా ఒక ప్రోటోజోవా జీవి ఒక మెటాజోవాన్ జీవి జరుపు అన్ని జీవన వ్యాపారాలను, శరీర ధర్మాలను స్వతహా జరుపుతుంది. ఈ విధముగా ఒక ప్రోటోజోవా మెటాజోవా యొక్క ఒక భాగము కాక పూర్తి మెటాజోవాన్ వ్యవస్థతో సమానముగా పరిగణించవలెను. ఈ

సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి ప్రోటోజోవాను కణరహిత జీవిగా వ్యవహరించవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక లక్షణమును దృష్టియందుంచుకుని ప్రోటోజోవాకు ఒక ఉప సామ్రాజ్య ప్రతిపత్తిని ఇవ్వడమైనది. దీనికి ప్రాటిస్టాయను ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్య స్థానము ఇవ్వవలెనను అభిప్రాయము కలదు.

జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణమును క్లుప్తముగా దిగువ ఇవ్వడమైనది.



1.10 స్వపరిశీలనం

ఒక జాతిని వర్ణించడానికి రెండు లాటిన్ పేర్లు ఉపయోగిస్తే _____ అంటారు. ఒక పేరు _____ ని తెలుపగా మరొక పేరు _____ ని వివరిస్తుంది.

1.11 సారాంశము

జంతు శాస్త్రమనగా జంతువుల గురించిన విజ్ఞానము. జంతుశాస్త్ర చరిత్ర నేటి నుండి 2600 పురాతనమైనది. గ్రీకులు, రోమనులు, ఐరోపా దేశ శాస్త్రజ్ఞులు దీని పురోభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేసినారు. జంతుశాస్త్రము నందు వివిధ శాఖలు కలవు. ఇవి జంతు జీవిత వివిధ అంశాలను అనగా వాని ఉనికి, జీవన చర్య మరియు పెరుగుదలను తెలియపరచును. అద్భుతమైన జంతు ప్రపంచ అవగాహనకు జంతుశాస్త్ర అధ్యయనము ఎంతేని అవసరము. ఇది సామాజికంగాను, వైద్యశాస్త్రరీత్యా ప్రతిఫలమిస్తున్నది. అవసరమైనది. జంతు సామ్రాజ్యము రెండు ముఖ్యభాగములుగా విభజించడమైనది. 1. ఏకకణ జీవులు, 2. బహుకణ జీవులు. ఏకకణ జీవులందు ఒకే ఒక ప్రోటోజోవా విభాగము కలదు. బహుకణ సముదాయము కణముల వ్యవస్థీకరణను బట్టి పెక్కు శాఖలుగా విభజించడమైనది. ఇందులో సకశేరుకాలు సైతము చేరియున్నవి.

1.12 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. ద్వినామ పద్ధతి జంతువు ప్రజాతి జాతి .

1.13 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. 'జంతుశాస్త్రము' అంటే ఏమిటి? దాని చరిత్ర అధ్యయన ఉద్దేశములు గురించి వ్రాయండి.

II. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. జంతుశాస్త్రములోని వివిధ శాఖలను వివరించండి.
2. రినియన్ కృషిని ఉదాహరణలతో వివరింపుము.
3. జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణ గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయండి.

1.14 పదకోశము

ఏసిలోమేట్స్ : (గ్రీ. ఏ = లేనట్టి; కొయిలాస్ = బోలు) సీలోం లేక దేహకుహారం లేనట్టి జంతువులు

ప్రవర్తన : వివిధ పరిస్థితులందు జంతువు తన అవసరాల కొరకు పనిచేయు లేక ప్రతీకారము చేయు పద్ధతి

జీవరసాయన శాస్త్రము : జీవము గురించిన రసాయన శాస్త్రము

జీవశాస్త్రము : (గ్రీ. బయాస్ = జీవము; లాగోస్ = చర్చించు) పజీవుల గురించి తెలుపు శాస్త్రము

కణము : (లా. సెలా = గది) పజీవుల నిర్మాణ ప్రమాణము

12 సంయుక్త నేత్రము : పెక్కు కటకములలో ఏర్పడిన కన్ను

పెరుగుదల	: (ఫ్రెం. డెవలప్ = విప్లు) ఫలదీకరణము చెందిన గ్రుడ్డునుండి ప్రాథ జీవిగా ఏర్పడు దశ వరకు జరిగే మార్పుల క్రమం
డయాగ్నోస్టిక్	: తెలుపు, వేర్పరచు
విచ్ఛేదము	: (లా. డిస్సెక్టర్ = కోసి చూపుట) దేహమును విచ్ఛేదించి వివిధ భాగములు చూపించుట
వైవిధ్యము	: వ్యత్యాసముల స్థాయి, భిన్నత్వము, రకాలు
ఉభయ జీవితము	: నీటిలోను, భూమిపైన రెండు చోటులందు జీవించుట
అంతర్ సహస్రజీవి	: అతిథేయి దేహమునందు జీవించు జీవి
పరిణామము	: (లా. ఇవాల్యూ = విడదీయుట) జంతువులు, వృక్షములందు ఒక తరము నుండి రెండవ తరమునకు క్రమముగా మార్పులు జరిగి కొత్త ప్రజాతులను, రకాలను ఏర్పరచుట.
బాహ్య అస్థిపంజరము	: దేహము యొక్క వెలుపలిభాగమున ఉండు కఠినమైన కప్పడము
జీన్	: క్రోమోజోమ్ను ఏర్పరచే మూలకము. వారసత్వానికి జీవశాస్త్ర ప్రమాణము (జన్యువు)
మొప్పచీలిక	: కార్డేటాలో గ్రసనీ భాగంలో వెలుపలికి తెరచుకునే రంధ్రాలు
డింభకము	: జంతువుల జీవిత చక్రమునందు ఉండు ఎదగని స్వతంత్రముగా జీవనము గడుపు దశ
జీవిత చక్రము	: ఒక జంతువు జీవితంలో ఫలదీకరణము చెందిన గ్రుడ్డు నుండి ప్రాథ జీవిగా ఏర్పడువరకు జరిగే మార్పుల కూడిక
క్షీరగ్రంథి	: క్షీరదాలలో పాలను స్రవించే గ్రంథి
అణుజీవశాస్త్రము	: సూక్ష్మతమమైన రేణువు యొక్క జీవశాస్త్రము
మెటాబోవా	: పెక్కు కణములతో ఏర్పడిన జీవి
నిచె	: ఒక జీవికి జీవావరణము నందు అనుకూలమైన స్థానము
వెన్నుపాము	: కార్డేటుల పిండదశ లేక ప్రాథదశ యందు వెన్ను పొడుగున వాడి 13 దండమునకు అడుగున ఉండే ఆధారమునిచ్చు కడ్డీ

అంగము	: జీవులయందు ఒక ప్రత్యేక పని కొరకు ఏర్పడిన భాగము
పరాన్నజీవి	: ఒక జీవి నుండి ఆహారము సేవిస్తూ జీవించు మౌలిక జీవి
కర్పరము	: జీవి దేహముపైనుండు కఠినమైన కప్పడము
వ్యవస్థ	: ఒక ప్రత్యేక జీవన వ్యాపారాన్ని నెరవేర్చే కణజాలము మరియు అంగముల కూర్పు
కణజాలము	: కణముల సమూహము
ప్రోటోజోవా	: ఒకే ఒక క్రియాశీలక కణముతో ఏర్పడిన జీవి
కశేరు దండము	: వెన్నెముక, సకశేరుకాల పృష్ఠతలము నందు దేహము పొడవున ఉండే చిన్న చిన్న ఎముకలు లేక కశేరుకముల కూర్పు
శిశోత్పాదక	: (లా. వివన్ = జీవించు, పెరేరె = కను) పిల్లలను కనుట

భాగము-2 ప్రోటోజోవా సామాన్య లక్షణాలు మరియు వర్గీకరణ

విషయ క్రమము

- 2.1. ఉద్దేశము
- 2.2. ఉపోద్ఘాతం
- 2.3. సామాన్య లక్షణాలు
- 2.4. వర్గీకరణ
 - 2.4.1. విభాగం-1-మ్యాస్టిగోఫోరా
 - 2.4.2. విభాగం-2-పారోక్సిడివా
 - 2.4.3. విభాగం-3-ఎపిలివేటా
 - 2.4.4. విభాగం-4-ప్రోటోజోవా
 - 2.4.5. విభాగం-3-పీరియేటా
- 2.5. స్వపరిశీలనం
- 2.6. సారాంశం
- 2.7. స్వపరిశీలన బాబులు
- 2.8. నమూనా ప్రశ్నలు

2.1 ఉద్దేశము

ఈ పాఠమునందు ప్రోటోజోవా ఉపసామాజ్యము మరియు వర్గము యొక్క సామాన్య లక్షణములను విభాగాల విభాగాల వరకు వర్గీకరణము, సామాన్య లక్షణములను ఉదాహరణలను వ్యాఖ్యానించడమైనది.

2.2. ఉపోద్ఘాతం

సూక్ష్మదర్శిని కనుగొన్న తరువాతనే ప్రోటోజోవా జీవుల ఉనికిని గుర్తించడం జరిగింది. కటకాలు తయారు చేసే డచ్ శాస్త్రవేత్త ఏన్స్టన్ హన్స్ లీవేహాక్ (1632-1723) ఈ జీవులను కనుగొన్నాడు. ప్రోటోజోవాకు చెందిన జీవుల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంటాయి. వాటి ఉనికికి తేమ ఉండడం అత్యంతావశ్యకం. అత్యధికంగా ఇవి ఏకాంత జీవులు. స్వేచ్ఛగా ఈదేవి అధికంగా సహనివేశాలు సాధారణంగా అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. సహనివేశంతోని ప్రతి జీవిని జీవకం అంటారు. ఇవి పరస్పరం జీవపదార్థంతో సంధించి ఉంటాయి. ఒకే ఒక ప్రాథమిక జీవకం నుండి మొత్తం సహనివేశం వృద్ధిచెందుతుంది.

2.3 సామాన్య లక్షణాలు

1. ఇవి స్వతంత్ర జీవులు మరియు పరాన్న జీవులు. స్వతంత్ర జీవులు మంచివీరు మరియు సముద్రపు నీటిలో లభిస్తాయి.
2. ఇవి సామాన్యముగా సూక్ష్మంగా, వర్ణ రహితంగా సూక్ష్మదర్శిని సహాయముతో గోచరించు జీవులు. కొన్ని మూతము వర్ణము కలిగి సాధారణ కంటి కనుగొనవలసివస్తుంది.
3. నిర్మాణము సరళమైనది. దేహము ఏకకణ లేక ఏకకణ నిర్మితము.
4. ఒంటరిగాను, సహనివేశులుగానూ వుంటాయి. సహనివేశులందు పెక్కు జీవులు స్వతంత్ర్యంగా వుంటాయి.

UJERAOU
LIBRARY

Acc. No: 7-3375
Class No: 591
2.11

5. దేహము ద్విసార్వ సౌష్ఠవముతో లేక గోళాకారముగ లేక సౌష్ఠవ రహితంగా వుంటుంది.
6. ఒకే ఒక్క కణము దేహము యొక్క అన్ని విధులను నిర్వహించును.
7. దేహము రక్షక త్వచముతో లేక ప్లాస్మామెమ్బ్రాన్తో లేక ధృఢమైన అవధానినితో లేదా సెలికా కర్పరముతో కప్పబడి వుంటుంది.
8. దేహము జీవ పదార్థరాశి. దీని యందు ఒకటి లేక పెక్కు కేంద్రకాలు వుంటాయి. జీవ పదార్థాన్ని బాహ్య మరియు అంతర్గత ద్రవ్యముగా గమనించవచ్చును.
9. దేహం ఆకారం చాల వరకు స్థిరంగా వుంటుంది. కొన్నింటిలో వివిధ రకాలుగాను మరికొన్నింటిలో వాతావరణము వయసును బట్టి మారుతూ వుంటుంది.
10. చలనము, ఆహార సేకరణ, వ్రేళ్లవంటి మిథ్యాపాదాలు లేక కొరడావంటి కళాభాలు లేదా వెంట్రుకలవంటి శైలికలు నిర్వహిస్తాయి.
11. ఈ జీవులందు పోషణము వివిధ రకాలుగా కలదు. ఇవి జాంతవ భక్షణము, పాదపీయ భక్షణము, పూతికాహార భక్షణము గావిందును. కొన్ని పరాన్న జీవులు లేదా మిక్స్ట్రాఫీక్ రకానికి చెందినవి.
12. శ్వాసక్రియకు, విసర్జనకు ప్రత్యేక సూక్ష్మాంగాలు ఉండవు. ఈ రెండు విధులు దేహము యొక్క సామాన్య ఉపరితలము నుండి పరస్పర వ్యాపనము ద్వారా జరుగుతాయి.
13. మంచి నీటి జీవులందు ద్రవాభిసరణ క్రమత సంకోచ రిక్తికల ద్వారా జరుగును. ఈ రిక్తిక విసర్జకావయవముగా కూడా పనిచేయును.
14. ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక మరియు అలైంగిక పద్ధతిలో జరుగును. అలైంగిక ఉత్పత్తి ద్విభా విచ్ఛిత్తి, బహుభా విచ్ఛిత్తి మరియు మొగ్గ తొడగడం ద్వారా లైంగిక ఉత్పత్తి సంయోగము ద్వారా జరుగును.
15. పెక్కు జీవుల జీవన చరిత్ర యందు తరముల ఏకాంతరము ఉంటుంది.
16. కోశీభవనము, అనుకూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనుటకు మరియు దీని విస్తరణకు ఉపయోగకరమైనది.


2.4 వర్గీకరణ

ప్రోటోజోవా వర్గీకరణ సామాన్యముగ వాని చలన పద్ధతులపైన, అలైంగిక మరియు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి పద్ధతులపైన ఆధారపడియున్నది.

ప్రోటోజోవా ఉప సామ్రాజ్యము మరియు వర్గమును రెండు ఉప వర్గాలుగా విభజించవచ్చును.

1. ప్లాస్మాడోమా 2. సీలియోఫోరా.

ఉప వర్గము ప్లాస్మాడోమా నాలుగు తరగతులుగా విభజింపబడినది. ఉపవర్గము సీలియో ఫోరా యందు ఒకే ఒక్క తరగతి కలదు.




2.4.1. మాస్టిగోఫోరా

(గ్రీక్. మాస్టిక్ = కొరడా; ఫోరన్ = కానుపు) లేదా ప్లాజెల్లేటా (లాటిన్ : ప్లాంగ్రం = కొరడా)

1. ఇవి మంచినీటిలో, సముద్రపు నీటిలో మరియు తేమగల మట్టిలో లభిస్తాయి.

2. స్వతంత్ర జీవులు ఒంటరిగా లేక సహనివేశులుగా వుంటాయి. కొన్ని పరాన్న జీవులుగా జీవిస్తాయి.

3. దేహము నిర్దిష్ట ఆకారము కలిగి, పలుచని, కఠినమైన రక్షక త్వచము లేక సెల్యులోజ్ లేదా కైటిన్ చేత నిర్మితమైన కవచముతో కప్పబడి వుంటుంది.



పటం 2.1. బ్రూజ్‌వోవాలు. ఎ. యూగ్లినా. బి. వాల్‌వాక్స్. సి. ట్రిపనోసోమా. డి. ట్రికోమానాస్. ఇ. అమీబా. ఎఫ్. ఎంటమీబా. జి. పాలిస్టా మెల్లా (ఎల్బిడియం). 1. కణభ్రమము 2. రక్షక త్వచము 3. కేంద్రకము 4. సంకోచరిక్షిక 5. మిథ్యాపదము 6. పేరామైటమ్ నిర్మాణాలు 7. శారీరక కణము 8. పెల్ల సహనివేశము 9. తరంగాకార స్తరము 10. అధారకణుక(బేస్ ఫ్యాన్) 11. అక్షీయ కిలము 12. అపార రిక్షిక 13. అంతర్గతాణుము చెందిన ఎర్ర రక్త కణాలు 14. కర్పర గదులు. 15. బ్రూక్యులమ్.

6. లైంగికోత్పత్తి సిద్ధబీజాలు మరియు సింగేమి ద్వారా జరుగును. జీవిత చక్రమునందు సాంక్రమిక దశయైనట్టి చలత్పిద్ధ బీజనిర్మాణము జరుగును.
 7. జీవిత చక్రమున తరముల ఏకాంతరత ఉంటుంది.
- ఉదా. మానోసిస్టిస్ (Monocystis), ప్లాస్మోడియం (Plasmodium), బాబేసియా (Babesia), నోసెమా (Nosema), సార్కోసిస్టిస్ (Sarcocystis). (పటాలు 2.2 బి అండ్ సి).

2.4.5. సీలియేటా

1. ఇవి మంచి నీటిలోను, సముద్రపు నీటిలోనూ లభిస్తాయి.
 2. చాలా వరకు స్వతంత్ర జీవులు (స్థానబద్ధ లేక సహనివేళ) కొన్ని పరాన్న జీవులు.
 3. ప్రోటోజోవాన్ లందు సీలియేటులు ఎక్కువ అభివృద్ధిచెందిన జీవులు.
 4. దేహము కఠినమైన రక్షకత్వముతో కప్పి ఉంటుంది.
 5. శైలికలు చలనము నందు మరియు ఆహార సేకరణయందు ఉపయోగపడును.
 6. కేంద్రకాలు రెండు రకాలకు చెంది ద్వీరూపకతను చూపుతాయి. ఒకటి పెద్దగా నుండు బ్రూహ్ కేంద్రకము. ఇది లైంగికేతర జీవన వ్యాపారాలను సాగిస్తుంది. చిన్నది సూక్ష్మ కేంద్రకము లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి నియంత్రిస్తుంది.
 7. నోరు, గ్రసని(కణగ్రసని) ఉంటాయి.
 8. పోషణము జాంతవ భక్షణ పద్ధతిలో జరుగును.
 9. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అడ్డుద్విధావిచ్ఛిత్తి లేదా మొగ్గ తొడుగుట వలన జరుగును.
 10. లైంగికోత్పత్తి, పంయోగము లేదా ఆటోగేమి ద్వారా జరుగుతుంది.
- ఉదా. పారామిషియం (Paramoecium), వర్టిసెల్లా (Vorticella), బాలంటిడ్యం (Balantidium), హాల్టెరియా (Halteria) (పటాలు 2.2 డి-ఎఫ్).

2.5 స్వపరిశీలన

1. ప్రోటోజోవా _____ జీవులు.
2. మంచి నీటి ప్రోటోజోవా జీవులలో సంకోచరీతికి _____ క్రియను _____ క్రియను నిర్వహిస్తుంది.

2.7. సారాంశం

1. ప్రోటోజోవాన్లు ప్రథమ సరళమైన ఏకకణ జంతువుల సముదాయము. ఇందులోవి కొన్ని స్వతంత్ర జీవులు, కొన్ని పరాన్న జీవులు.
2. దేహము యొక్క అన్ని జీవ వ్యాపారాలు ఒకే ఒక్క కణము నిర్వర్తించును.
3. చలనాంగముల ఆధారముగ ప్రోటోజోవా ఐదు విధాలుగా విభజింపబడినది.
4. మ్యాస్టిగోఫారా యందు కళాభములు, సార్కోడినా యందు మిథ్యాపాదములు ఉండును. ఒపాలివేటా మరియు స్టోమోజోవా పరాన్న జీవులు, వీనికి చలనము లేదు. సీలియేటా యందు శైలికలు ఉండును.
5. శరీర ధర్మము సరళమైనది.
6. ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక, అలైంగిక రెండు పద్ధతులలో జరుగును.

భూమిపై అవతరించిన వాటిలో ప్రోటోజోవాన్లు అతి ప్రాచీనమైన జీవులు. ఇవి జంతువులందు సరళ నిమ్మ సముదాయానికి చెంది యున్నవి. 1822లో గోల్డ్ ఫస్ కణ నిర్మాత ఈ మాక్స్ జంతువులకు ప్రోటోజోవా అను పేరు పెట్టినాడు. ప్రోటోజోవా అను పదము గ్రీకు భాష నుండి గ్రహించబడినది. ప్రోటోన్ అనగా మొదటి జంతువు. ప్రోటోజోవాలో సుమారు 50,000 ప్రజాతులు తెలిసి ఉన్నది.

2.7. స్వపరిశీలనజవాబులు.

1. ఏకకణ
2. ద్రవాభిసరణ క్రమత వివర్ణన

2.8. నమూనా ప్రశ్నలు

I ఈ క్రింది ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. ప్రోటోజోవా సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.

II. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. మాస్టిగోఫెర తరగతి సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.
2. సీరియోట తరగతి సామాన్య లక్షణాలు వివరించండి.
3. ప్రోటోజోవా వర్గీకరణ గురించి సంక్షిప్తంగా వ్రాయండి.

భాగము -3 ఎల్బీడియం, మానోసిస్టిన్ మరియు వర్మిసెల్లా.

విషయక్రమము

3.1. ఉద్దేశ్యము

3.2. ఉపాధ్యాయులం

3.3. ఎల్బీడియం (ఫిరిస్టామెల్లా)

3.3.1 వివాసము

3.3.2 అలవాట్లు

3.3.3 బాహ్యరూపము

3.3.4 ప్రయోజనము మరియు జీవన చక్రం.

3.4 మానోసిస్టిన్

3.4.1 ఉనికి

3.4.2 అలవాట్లు

3.4.3 బాహ్యరూపం

3.4.4 ప్రయోజనము మరియు జీవనచక్రం

3.4.5 అతిథేయి పై ప్రభావము

3.4.6 తరముల వికాసతరత

3.5 వర్మిసెల్లా

3.5.1 వివాసము

3.5.2 అలవాట్లు

3.5.3 విర్మాణము

3.5.4 శరీర ధర్మశాస్త్రము

3.5.5 గమనము

3.5.6 పోషణ

3.5.7 శ్వాసక్రియ మరియు విసర్జన

3.5.8 ద్రవాభివరణ క్రమత

3.5.9 ప్రయోజనము

3.6 స్వపరిశీలన

3.7 సారాంశం

3.8 స్వపరిశీలనం జవాబులు

3.9 నమూనా ప్రశ్నలు.

3.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ భాగము లోని విషయాలు చదివిన తరువాత మీరు ఎల్బీడియం, మానోసిస్టిన్, వర్మిసెల్లా జీవుల విర్మాణం, శరీర ధర్మాలు, జీవిత చరిత్రలు వివిధంగా ఉంటాయో వివరించగలుగుతారు. సార్కోడివా, స్పోరోజోవా, సీలియోటా అనే విభాగాలకు అవి ఎట్లా ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తున్నాయో తెలుపగలుగుతారు. ఇంతేగాక

1. ఎల్బీడియం జీవిత చక్రం

2. మానోసిస్టిన్ తరన్న జీవన ప్రభావం దాన్ని అతిథేయి వాసపాముపై వివిధంగా ఉంటుంది.

3. అసక్తిదాయకమైన వర్టిసెల్లాలోని

- ఎ. ద్వితీయచిత్రి
- బి. సిద్ధబీజకోశం
- సి. సంయోగం

మొదలైన విషయాలు విశదీకరించగలుగుతాము.

3.2 ఉపోద్ఘాతం

ఎర్టిడియం సముద్ర ప్రోటోజోవా జీవి. బరువుగా ఉండడం చేత ఈ స్వేచ్ఛా జీవి నీటి అడుగు భాగంలో జీవిస్తుంది. ఫోరామిని ఫెరి (లాటిన్ ఫోరే = రంధ్రాలు, ఫెరా = ధరించడం)తో కర్పరా తేర్చడతాయి. వాటికి చాలా రంధ్రాలుంటాయి.

వానపాములలోని పరాన్న జీవి మనోసిస్టిస్. సాధారణంగా ఇది వాన పాముల ముష్కలలోనో లేదా శుక్రాశయాలోనో ఉంటుంది. కదాచిత్తుగా పరాంత ఖండితాల శరీర కుహరంతో కూడా కనిపిస్తుంది.

వర్టిసెల్లా అసక్తి కలిగించే సీలియేట్. తన వృంతాన్ని మధ్య మధ్య పర్చిలాకారంగా చుట్టుతూ, నిటారుగా చేస్తూ వింతగా ఉంటుంది. పారామిషియం మాదిరిగానే వర్టిసెల్లా కంపాసులా కూడా మంచి నీటిలో విశ్వ వ్యాప్తంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కుంటలు, పరస్పలు, తటాకాలు, నదులు కాలువలు మొదలైనవి వీటి నివాస స్థలాలు.

3.3 ఎర్టిడియం (పాలిస్టోమెల్లా)

వర్గము	: ప్రోటోజోవా
ఉపవర్గము	: ప్లాస్మోడోమా
తరగతి	: సార్కోడినా లేక రైజోపాడా
క్రమము	: ఫోరామిని ఫెరా
జాతి	: ఎర్టిడియం (పాలిస్టోమెల్లా)

ఎర్టిడియం విరివిగా లభించు కర్పరయుత జీవి. ఇది ఫోరామిన్ ఫెరా క్రమానికి చెందినది. (లాటిన్ ఫోరే = రంధ్రములు; ఫెరా = కలిగి ఉన్న) వీని కర్పరాలు చిన్న చిన్న రంధ్రములతో చిద్రితమై ఉండును.

3.3.1 నివాసము

ఎర్టిడియం సముద్రపు జీవి. 550 నుండి 600 మీటర్ల లోతు లన్ని సముద్రాలలో లభిస్తాయి. తక్కువ ఉప్పు గల నీటియందు సహితము నివసిస్తాయి. సాధారణముగా ఇది అడుగు భాగములో ఉంటుంది.

3.3.2 అలవాట్లు

ఇది స్వతంత్ర జీవనముగడుపు సూక్ష్మ జీవి. సముద్రపు అడుగున ఇసుక మరియు బురదలో మెల్లమెల్లగా చలించును.

3.3.3 బాహ్యరూపము

ఎర్టిడియం బాహ్య కంటికి గోచరించు సూక్ష్మజీవి. సూక్ష్మదర్శినిలో ఇది చిన్న ప్రమాణముగల నత్తగుల్ల

కర్పరము వలె గోచరించును. దీని దేహము రవ్వలుగాను, జిగురుగాను ఉన్న జీవ పదార్థముతో ఏర్పడి ఉంటుంది. స్పష్టమైన బాహ్య జీవ పదార్థము లోపించి ఉండును. సంకోచ రిక్తిక ఉండదు. ఎల్లిడియం ద్వీరూపకతను చూపించును. అనగా ఇది మైక్రోస్పెరిక్ మరియు మెగాలోస్పెరిక్ అను రెండు విస్తృత రూపములందు ఉండును. ఈ రెండు అకారం రూపమునందు ఇతర వ్యత్యాసములు కలిగి ఉంటాయి. వీనిని ఈ దిగువ వివరించడమైనది (పటం 3.1. ఎ అండ్ బి).

మైక్రోస్పెరిక్

మెగాలోస్పెరిక్

తక్కువ సంఖ్యలో ఉండును.

ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండును.

పరిమాణంలో చిన్నగా ఉండును.

పరిమాణంలో పెద్దగా ఉండును.

బహు కేంద్రక నిర్మాణము. కేంద్రకాలు చిన్నవిగా ఉండును


ఏకకేంద్రకము కలిగి ఉండును. కేంద్రక పరిమాణము పెద్దగా ఉండును.

ప్రాలాక్యూలమ్ అనబడే మొదటి గది చిన్నగా ఉంటుంది.

ప్రాలాక్యూలమ్ పెద్దగా ఉండును.

ఇది అలైంగిక పద్ధతిలో బహుధా విచ్ఛిత్తి ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపును.

ఇది లైంగిక పద్ధతిలో సమ సంయోగ వీజాలతో జరుపును.



పటం 3.1. ఎల్లిడియంలో ద్వీరూపకత. ఎ. మైక్రోస్పెరిక్ రూపము. బి. మెగాలోస్పెరిక్ రూపము. 1. కేంద్రకము 2. పెద్దప్రాలాక్యూలమ్ 3. బాహ్య కర్పర గదులు 4. రిక్తిక ప్రాసెస్ 5. కేంద్రకములు 6. ప్రాలాక్యూలమ్ 7. చిన్నప్రాలాక్యూలమ్

ఎల్లిడియమ్ యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు రెండు కలవు. ఒకటి కర్పరము లేక టెస్ట్ ఉండుట. రెండవది మిథ్యాపాదాలు ఉండుట.

కర్పరము

ఎల్లిడియం యొక్క కర్పరము కఠినముగా, ద్విపుటాకారముగా, అందాకారముగా లేక గుండ్రముగా ఉంటుంది. ఇది లేత వసుపు రంగులో ఉండి, జీవ పదార్థమును అవరించి ఉండును. ఇది పెక్కు గదులు కలిగి సున్నములో నిర్మింపబడి యుండును.

మిథ్యాపాదాలు

ఎల్లీడియం యొక్క మిథ్యాపాదాలు, పాదపుగా, సున్నితంగా ఉన్న శాఖలతో జాలకముగా ఏర్పడి ఉంటాయి. వీనిని మిక్స్ పాడియా లేక రెటిక్యులో పాడియా అంటారు. మిథ్యాపాదాలు అహార సేకరణకు మరియు చలనమునకు ఉపయోగపడును.

3.3.4 ప్రత్యుత్పత్తి మరియు జీవన చక్రము

దీని యందు లైంగిక మరియు అలైంగిక రెండు పద్ధతులతో ప్రత్యుత్పత్తి జరుగును. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మైక్రోస్పెరిక్ జీవి యొక్క బహుధా విచ్ఛిత్తి వలన సంభవించును. ఇట్లు ఉత్పన్నమైన వాటిని సంయోగ బీజ మాతృక (గామెట్) లేదా వైజాంట్ అంటారు. (పటం 3.2).

అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి

పైన చెప్పినట్లు మైక్రోస్పెరిక్ జీవి యందు వైజాంట్ లేక బహుధా విచ్ఛిత్తి ద్వారా ఈ దృగ్విషయము జరుగును. ఇందు కణపదార్థమంతా వెలుపలికి వచ్చి కర్పరము చుట్టూ ఒక పొరను ఏర్పరచును. కేంద్రకాలు విచ్ఛిత్తి చెంది క్రొమాటిన్ దేహాలుగా ఏర్పడును. ఈ దేహాలు పునర్వ్యవస్థీకరణ చెంది కొత్త కేంద్రకాలుగా ఏర్పడును. ప్రతి కేంద్రకము చుట్టూ కొంత కణ పదార్థము చేరుకొని చిన్న చిన్న అమీబాయిడ్ కణాలుగా ఏర్పడుతాయి. వీనిని అమీబులీ లేక సంపర్క కణాలు (గేమెట్స్) అంటారు. ఇవి మాతృకకణము నుండి వేర్పడి చుట్టూ కర్పరాన్ని ప్రవించుకొని మెగాలో స్పెరిక్ జీవిగా మారును. ఇందులో మొదటి కర్పరము ఆరంభ గది లేక ప్రోలాక్యులస్ అని వ్యవహరింపబడును. పెరుగుదల జరిగి క్రమముగా కణ పదార్థసావము వలన కొత్త గదులు ఏర్పడును. కేంద్రకము ఒక గది నుండి రెండవ గదికి వలసపోయి చివర మధ్యనున్న ఒక కర్పర గదిలో స్థావరము ఏర్పరచుకొనును. ఈ అమీబులీఉంది. ఏక కేంద్రక మెగాలో స్పెరిక్ ప్రాథమిక జీవులుగా ఏర్పడును. ఇట్లు అలైంగిక పద్ధతిలో మైక్రోస్పెరిక్ జీవి మెగాలో స్పెరిక్ జీవులను ఉత్పన్నం చేయును.

లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి

లైంగిక పద్ధతిలో ప్రత్యుత్పత్తి జరుపు మెగాలో స్పెరిక్ జీవి 'గామెట్' అంటారు. గామెట్ కేంద్రకము పను విభజన చెంది పెక్కు కేంద్రకాలను ఏర్పరచును. కణ పదార్థము విభజన చెంది తునకలుగా పిల్ల కేంద్రకాలను ఆవరించి ఒక జత కణాభములు ఏర్పరచును. వీనిని ఇప్పుడు సంయోగ కణాలు లేక జంతు పిల్ల బీజాలు (జా స్పోరులు) లేక ప్లాజులీ అంటారు. ఈ సంయోగ కణాలన్నీ ఒకే ఆకృతి కలిగి వుంటాయి. అందువలన వీనిన పను సంయోగ కణాలు కణాభాలను కోల్పోయి కలిసిపోయి ద్వయ స్థితిక సంయుక్త బీజాలుగా తయారగును. ఇట్టి దృగ్విషయాన్ని జసోగమీ అంటారు. ప్రతి సంయుక్త బీజము తన చుట్టూ కర్పరాన్ని ప్రవించుకొని పిల్ల మైక్రో స్పెరిక్ జీవిగా ఎదుగును. క్రమముగా గదులు పెరుగును. కేంద్రకము విభజన చెంది పెక్కు ఏక స్థితిక కేంద్రకాలుగా ఏర్పడి ప్రాథమిక మైక్రో స్పెరిక్ జీవి తయారగును. మైక్రోఫోరిక్ జీవి లైంగిక పద్ధతి ద్వారా మెగాలో స్పెరిక్ లేక మైక్రోస్పెరిక్ జీవి నుండి ఏర్పడును.

ఇచట జీవిత చక్రమును ఒక జీవి తన జీవిత కాలమున జరుపుకొను వివిధ మార్పులు దశల పరంపరయని నిర్వచించవచ్చును. ఈ మార్పుల పర్యవసానము జీవి ప్రాథమిక తిరిగి వచ్చుటయే.

ఎల్లీడియం జీవిత చక్రమునందు తరముల ఏకాంతరత గోచరించును.


1. వైజాంట్ యొక్క అలైంగిక తరానికి మైక్రోస్పెరిక్ జీవి ప్రాతినిధ్యము వహించును.

2. మైక్రోస్పెరిక్ జీవి గామెట్ లేక లైంగిక తరాన్ని వర్ణించును.

3. మైక్రోస్పెరిక్ జీవి అలైంగిక పద్ధతిలో ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి మైక్రోస్పెరిక్ జీవిగా ఎదుగును.


4. మైక్రోస్పెరిక్ జీవి లైంగిక పద్ధతిలో ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి మైక్రోస్పెరిక్ తరమును ఏర్పరచును. ఇది మైక్రోస్పెరిక్ తరముతో ఏకాంతరముగా వుండును.

ఎల్బీడియం తన జీవిత చక్రమును సుమారు రెండు సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయును.




చటం 3.2. ఎల్బీడియం జీవిత చక్రము 1. ఏక కేంద్రకము 2. కళాభాలు.

ఎల్బీడియం జీవిత చక్రము



ఎల్బీడియం నందు తరముల ఏకాంతరత



3.4 మానోస్టిస్ట్

వర్గము	: ప్రోటోజోవా
ఉపవర్గము	: ప్లాస్మోడోమా
తరగతి	: స్పోరోజోవా
ఉప తరగతి	: డిథో స్పోరిడాన్
క్రమము	: గ్రెగారినిడా
వంశము	: మానోస్టిడి.
జాతి	: మానోస్టిస్ట్.
ప్రజాతి	: ఫోరీటిమ్.

3.4.1 ఉనికి

మానోస్టిస్ట్ వానపాము యొక్క పుంబీజ కోశాలు మరియు శక్రాశయము నందు వివసించే అంతర్ పరాన్న జీవి. దీని ఒకటి లేక అన్ని దశలు అన్ని వానపాములందు విస్తారముగా ప్రబలి వుండును.


3.4.2 అలవాట్లు

పిల్ల దశలో మానో స్టిస్ట్, శక్రకణ మారులా కణ పదార్థమునందు కణాంతస్థ పరాన్న జీవిగా వుంటుంది. ప్రౌఢ దశయందు శుక్రాశయ ద్రవమున కణబాహ్య పరాన్న జీవిగా జీవించును.

3.4.3 బాహ్యరూపము

ప్రౌఢదశలో మానో స్టిస్ట్ను ట్రోఫోజైట్ అంటారు. ఈ దశలో ఆహారాన్ని గ్రహిస్తూ ఇది పెరుగుతుంది. ఇది సూక్ష్మాంగ పురుగు వలె పొడవుగా లేక కదురు ఆకారముగ, ప్యూజీఫామ్ లేక అండాకారముగ ఇరువైపుల పొడుచుకొని వుంటుంది. ఇది పొడవులో 250 నుండి 400 మై. వెడల్పులో 40 నుండి 65 మై. ఉంటుంది. చలాపార్లు ఆహార కొరత వలన కృశించినట్టి సున్నితమైన శుక్రకణాలు ట్రోఫోజైట్ ఉపరితలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. (పటం 3.3. ఎ అండ్ బి)

దేహము దళితముగ గట్టిగా వుండి ఎపిథెల్ అనబడే పెరికల్తో కప్పబడి వుంటుంది. కణ పదార్థము రెండు స్తరాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. వెలుపలి పన్నని దళితమైన వున్న పొరను బాహ్య జీవ ద్రవ్యము లేక పలక్కలము అని రోపలి చిక్కని కణకలు గల సముదాయాన్ని అంతర్జీవ ద్రవ్యము లేక దవ్వ అని వ్యవహరిస్తారు.



పటం 3.3. మానోస్టిస్ట్. ఎ. స్వతంత్ర పిల్ల ట్రోఫోజైట్ బి. ప్రౌఢ ట్రోఫోజైట్. 1. కేంద్రకము 2. ఎండోసోమ్ 3. కణకామయ కణ ద్రవ్యము 4. పారదర్శక కణ ద్రవ్యము 5. రక్షక త్వచము 6. శుక్ర కణ తోకలు 7. మయోసోమ్.

కణపదార్థ లోపలి స్తరము నందు పాడవైన సంకోచించే జీవ పదార్థ పోగులు ఉంటాయి. వీటిని మయోనీస్స్ లేక కండర పోగులు అంటారు. వీనిన పుష్పత జీవులందరి కండర వ్యవస్థకు నాంది సూచకాలనవచ్చును. అంతర్ జీవ పదార్థము పెద్దగా అశయాకార కేంద్రకమును, పారా క్లొకోజన్ కణికల రూపములో ఆహారపు విలువలు, క్రొవ్య కణికలు లేక గోళాలు కలిగి వుంటుంది. పరాన్న జీవనము గడుపుట వలన దీనిలో చలనాంగాలు, రిక్తికలు, నోరు మరియు అన్నవాహిక లోపించి వుంటాయి.

3.4.4. ప్రత్యుత్పత్తి మరియు జీవిత చరిత్ర

మానోసిస్టిస్ జీవిత చక్రము ఒక అతిథేయి యందు పూర్తియగును. కావున ఇది మానో జెనెటిక్ పరాన్న జీవి. దీనికి మాతృమిక అతిథేయి లేదు (పటం 3.4.)

సంయోగ బీజోత్పత్తి (Gametogony) ఇది తైలగిక ప్రత్యుత్పత్తి దశ. ఇందులో ఈ క్రింది దశలు వుంటాయి.

1. సైజెగీ

పరిణతి చెందిన ప్రాథజీవి (ట్రోఫోజైట్) చరుకుగా ఆహారము భుజించిన పిదప ఈ దశలోకి ప్రవేశించును. ఇప్పుడు పరాన్న జీవి అందాకారముగా వుండి బీజ మాతృకలము లేక సంయోగ బీజ మాతృక అనబడును. సంయోగ బీజ మాతృకణాలు జతలు జతలుగా చేర్చుకొని పార్శ్వతలము వెంబడి కలిసికొనును. ఇప్పుడవి గుండ్రముగా లేక గోళాకారము దాల్చును. సంయోగ బీజ మాతృకలములు తమ చుట్టూ ఒక నన్నని త్వచముగల రక్షణ కోశాన్ని స్రవించును. దీనిన "బీజకణ కోశిక" లేక "సంయోగ కోశిక" అంటారు. కోశము రెండు పొరలు కలిగి వుంటుంది. ఇందులో వెలుపలిపొర దళితముగాను గట్టిగాను వుంటుంది. దీనిని అధికోశము లేక బాహ్యకోశము అంటారు. లోపలి నన్నని వృద్ధులైన పొరను అంతర్కోశము అంటారు. కోశమూ లోపలి బీజ కణ మాతృకలు ఒకదానితో వేరొకటి దగ్గరగా నుండును. కానీ కలిసిపోవు ఇట్టి సహవాసమును సైజెగీ అంటారు.

2) సంయోగ బీజకణోత్పత్తి

కోశము లోపల బీజకణ మాతృకలు ముకుళించుకొని తమలోని ద్రవాన్ని కొంత వెలుపలకు పంపివేయును. ఈ ద్రవము కణముల మధ్య స్తలాన్ని ఆవరించును. దీని తర్వాత బహుదా విచ్చిత్తి లేక గామోగోని జరిగి పెక్కు సూక్ష్మ కేంద్రకయుత దేహాలు ఏర్పడును. వీనిని బీజకణాలు అంటారు. ఇట్లు ఏర్పడిన సంయోగ బీజ కణాలు ఆకారము, పరిమాణము చివరకు సంఖ్యలో సమానముగా వుండి సమసంయోగ బీజకణాలు (ఐసోగమెట్స్) అనబడతాయి. ఈ సమ సంయోగ బీజకణాలు బీజకణ మాతృక ఉపరితలాన అమర్చబడి సంయోగ బీజ మాతృకకు (గ్యామెట్) పూతిక పండు (మల్పరీ) రూపాన్ని ఆపాదించును.

3) ఐసోగమీ లేక సింగేమీ లేక సంయోగము

రెండు బీజకణాల మధ్యగల పటలము కరిగిపోవును సమసంయుక్త కణాలు కొంతసేపు ముందు వెనుకకు చరుకుగా చలించును. ఆ పిదప జతలుగా కలిసిపోవును. కలయిక పూర్తి కావటమును ఐసోసింగమీ అనబడుతుంది. దీని పర్యవసానముగా ఒక పెద్ద కేంద్రకయుత ద్వయస్థితక సంయుక్త బీజాలు లేక స్పోరోజోన్ట్లు ఏర్పడుతాయి.

స్పోరోగాని (సిద్ధబీజోత్పత్తి)

పెరుగుదల చెందుచున్న సంయుక్త బీజము లేక స్పోరోబ్లాస్ట్ అండాకారము దాల్చి ఒక కఠినమైన ధృఢముగానున్న ఎదిరించే శక్తిగల కప్పడాన్ని ప్రవించును. దీనిని స్పోరోసిస్ట్ లేక సిద్ధ బీజకోశము అంటారు. సంయుక్త బీజము సిద్ధ బీజకోశములో పాటు సిద్ధ బీజము లేక సంయుక్త బీజకోశము (ఉసిస్ట్) అనబడుతుంది. ఇది ఒక నావ లేక దోనె ఆకారాన్ని దాల్చి న్యూవిసెల్లా డయాటమ్ ను పోలివుంటుంది. దీనికి ఇరువైపుల బిరడ వుండను. ఇది నావ ఆకారములో వుండుటబట్టి మిథ్యా న్యూవిసెల్లా అనబడను (గ్రీ.నూడ్ = మిథ్యా; నేపమ్ = నావ) ప్రతి ఒక్క సంయోగ బీజకోశము నందు మొత్తము 64 మిథ్యాన్యూవిసెల్లాలు వుంటాయి. సంయుక్త బీజము (మిథ్యాన్యూవిసెల్లా) మూడుసార్లు విభజన చెందును లేక బహుధా విచ్ఛిత్తి లేక సిద్ధబీజోత్పత్తి జరుగును. చివరి విభజన క్షయకరణ విభజన. విభజన ఫలితముగా 8 ఏకస్థితిక, ఏకకణ సిన్సితమైన కొడవలి ఆకారముగానీ, మూపురాకారముగానీ కలిగివున్న దేహాలు ఏర్పడతాయి. వీనిని చలత్విద్ధ బీజాలు లేక ఫాల్సిఫామ్ పీల్ల జీవులంటారు. ఇవి మాన్ స్పిస్ట్ యొక్క జీవిత చరిత్ర యందు సాంక్రమిక దశ. మూల సంయోగ బీజ మాతృక పగిలి మిథ్యాన్యూవిసెల్లా దానియందలి 8 చలత్విద్ధ బీజాలు అతిథేయ వానపాము శుక్రాశయ కుహరము నందు విడుదలవుతాయి.

పరాన్న జీవుల బదిలీ

ఇతర వానపాములందు పరాన్న జీవులు ఎప్పుడు ఉండే వుంటాయి. ఐనను పరాన్న జీవుల పెరుగుదల కొనసాగుటకు ఒక వానపాము దేహమునుండి రెండవ వానపాము దేహములోనికి సిద్ధ బీజాల మార్పిడి జరగుట అవశ్యకము.

ఒక వానపాము నుండి రెండవ వానపాము దేహములోనికి సిద్ధ బీజాల మార్పిడి ఎట్లు జరుగుతుందని చెప్పట కష్టము. బహుశః క్రింద వివరించిన పద్ధతులలో జరుగవచ్చును.

1) సంపర్కకాలములో వానపాముల మధ్య సంపర్కము జరుగునపుడు శుక్రకణాల వెంబడి సిద్ధ బీజాలు వెలువడుతాయి. ఎన్నో సార్లు సిద్ధ బీజాలు, గుడ్ల తిత్తియందు, మరియు ప్రత్యేకతై నాళములందు పరిశీలించబడినవి.

2) అతిథేయ మరణించిన తరువాత అతిథేయ మరణించినట్లయితే సిద్ధ బీజాలు మట్టిలోనికి విడుదలగును. ఇట్టి సాంక్రమిక మట్టిని ఇతర వానపాములు ఆహారముగా గైకొన్నట్లయితే సిద్ధ బీజాలు ఆహార నాళంలోకి చేరును. ఇచట కోశము కరిగిపోయి చలత్విద్ధ బీజాలు శుక్రాశయములోకి చేరుకుంటాయి.

3) పక్షుల ద్వారా పక్షులు సహితము ఈ పరాన్న జీవులను చేరవేస్తాయని అని సూచించబడినది. ఇది సంక్రమిక వానపామును పక్షి ఆహారంగా గైకొన్నచో జరుగును. సిద్ధ బీజాలు పక్షి మలము ద్వారా బయటడి, వానపాము మట్టిని ఆహారముగా గైకొన్నచో దాని దేహము చేరుకొనును.

3.4.5 అతిథేయపై ప్రభావము

మాన్ స్పిస్ట్ శుక్రద్రవాన్ని, పెరుగుచున్న శుక్రకణాలను తిని జీవించును. మాన్ స్పిస్ట్ శుక్రకణాలను అధిక సంఖ్యలో నాశనము చేయును. ఐనను శుక్రకణాల ఉత్పన్నము చాల మొత్తములో వుండుట వలన అతిథేయ ఫలదీకరణ శక్తిపై ఏమి ప్రభావముండదు.

3.5. వర్తిసెల్లా

వర్గము	: ప్రోటోజోవా
ఉపవర్గము	: సీలియోఫోరా
తరగతి	: సీలియేట
ఉపతరగతి	: పెరిట్రైక (గంట ఆకారపు దేహము)
క్రమము	: పెరిట్రైకిడా
ఉపక్రమము	: సెస్టెరినా
వంశము	: వర్తిసెలిడి
జాతి	: వర్తిసెల్లా

వర్తిసెల్లా ప్రథమముగా 1677 వ సంవత్సరములో వర్ణించబడింది.

3.5.1 నివాసము


సుంచివీటిలో నివసించే సీలియేట్. ఇది కుంటలలో, సరస్సులలో, నదులు మరియు పెరియేర్లలో లభించును.

3.5.2. అలవాట్లు

ఇది స్వతంత్రముగా జీవించు కాడహితజీవి లేదా ఒంటరిగా అతుక్కొని వుండు జీవి. పెక్కు జీవులు పెద్ద సమూహాలలో నీటి మొక్కలను, జంతువులను, రాళ్లను అంటుకొని లేదా కట్టబడి ఉంటాయి.

3.5.3. నిర్మాణము

ఆకారము మరియు పరిమాణము: వర్తిసెల్లా సామాన్యముగా గంటాకారము గల సూక్ష్మజీవి (పటం 3.5). ఇది చూచుటకు బోర్ల ఉంచిన గంటను పోలి ఉండును. గంట ఆధారమునుండి పాదపుగా ఉండు



పటం 3.5. వర్తిసెల్లా. 1. పరిముఖ గాది 2. కాలర్ 3. సంకోచరీతిక 4. జాన్యదీప ద్రవ్యము 5. అంతరదీపద్రవ్యము 6. అలిందము 7. రక్షక త్వచము 8. తరంగాకార స్తరము 9. సూక్ష్మ కేంద్రకము 10. స్థూల కేంద్రకము 11. కండర తంతువు 12. అపార రీతిక 13. కాడ.

సంకోచకాడ అంటి ఉండును. ఇది వర్ణ రహితము ఐనను, పసుపు పచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను కనిపించవచ్చును. దేహము లేక గంట పరిమాణం పొడవులో 157 మై. మరియు వెడల్పులో 100 మై. ఉంది. కాడ 50 నుండి 150 మై. వరకు పొడవు ఉంటుంది.

దేహము లేక గంట: ఇది జీవి యొక్క భాగము. ఇది తల క్రిందుగా ఉన్న గంటవలె ఉండి దళితముగా గట్టిగా ఉన్న రక్షకత్వముతో కప్పబడి ఉంటుంది. కణపదార్థము వెలుపలి సన్నని బాహ్యజీవద్రవ్యముగా లేక వల్కలము మరియు దళితముగాను, కణికల వంటి అంతర్జీవద్రవ్యము లేక ద్రవ్యగా విభజింపబడి యుండును. బాహ్యజీవ ద్రవ్యమునందు 5 సంకోచము చెందే ప్రాగులు ఉండును. వీటిని మయోసీమ్స్ అంటారు. ఇవి గంట ఆధారముపైపు అనివుతమై కాడలోనికి చొచ్చుకుని అక్షయ పోగులవబడును. మయోసీమ్స్ చర్యవలన దేహము కురుచనై గంట యొక్క వెలుపలి ఫలకము మూసుకొనును. అంతర్జీవ ద్రవ్యమునందు కేంద్రకాలు, సంకోచ రిక్తికలు మరియు ఆహార రిక్తికలు ఉంటాయి.

కేంద్రకాలు: వర్తిపెల్లా కేంద్రకాలు ద్వీరూపకతను సదర్శించును. ఒకటి చిన్నగాను గోళాకారంగాను ఉండు సూక్ష్మ కేంద్రకము. రెండవది పెద్దగా గుర్రపు నాడాకారమునున్న స్థూల కేంద్రకము. ఈ విధముగా రెండు రకాల కేంద్రకాలు ఉండుటను విషమ కేంద్రక పరిస్థితి అంటారు. సూక్ష్మ కేంద్రకము స్థూల కేంద్రకానికి వెనుక భాగము నందుండి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని నియంత్రించును. స్థూల కేంద్రకము లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొనదు. ఇది జీవి యొక్క అలైంగిక విధులందు పాల్గొంటుంది.

రిక్తికలు: ఇవి రెండు రకాలు. ఒకటి సంకోచ రిక్తిక. రెండవది ఆహార రిక్తిక. సంకోచ రిక్తిక ద్రవాభిసరణ క్రమత నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో ఒక ఆశయము ఉంటుంది. దీనిలోకి విసర్జక పదార్థాలు సమకూర్చబడి ఒక ఇరుకైన అపవాహనాళము ద్వారా అభిందములోకి పంపబడును.

కొన్ని ప్రజాతులందు రెండు సంకోచ రిక్తికలుండును. దీనియందు పెక్కు గోళాకార భాగాలు క్రింత వివరించిన విధంగా ఉంటాయి.

పరిముఖము (పెరిస్టోమ్): ఇది గంట యొక్క వెడల్పైన స్వేచ్ఛగానున్న భాగము. ఇది గుండ్రముగాను కొంచెము ఉబ్బెత్తుగా ఉండు మూతచే కప్పబడి ఉంటుంది. దీనిని పరిముఖ ఫలకము లేదా ముఖ ఫలకము లేదా ఎసిస్టోమ్ అంటారు. ఫలకము యొక్క వెలుపలి అంచు పెరిగి కాలర్ లేక పరిముఖ పెదవి అవబడును. కాలర్ మరియు పరిముఖ ఫలకానికి మధ్య ఒక తక్కువ లోతుగల పరిముఖ గాడి లేక ముఖ గాడి చుట్టూ ఆవరించి ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఫలకము దేహములోనికి ముడుచుకొని ఉంటుంది. పై నుండి కాలర్, గంటను పరివేష్టించి ఉండును.

అభిందము: ఇది గంట ఆకారముగల గుంత. ఫలకానికి మరియు పరిముఖ భాగానికి మధ్య ఉంటుంది. దీనిని అస్య కుహరము లేక ఇన్ ఫండిబులమ్ అంటారు. ఇది సైటోప్లాస్మ్ లేక కణముఖము ద్వారా సున్నితమైన ఇరుకుగానున్న సైటోఫారింక్స్ లేక కణగ్రహని లోనికి తెరచుకొని అంతర్జీవ ద్రవ్యములో అంతమవుతుంది.

సైటోప్లాక్స్: ఇది తాత్కాలిక లేక శాశ్వతమైనట్టి రంధ్రము. దీని ద్వారా జీర్ణముకొని ఆహారపదార్థాలు అభిందములోనికి పంపబడును. దీనిని కణపాయువుగా పరిగణించవచ్చును.

శైలికలు: దేహము శైలికమయమైనది. అనగా గంట మరియు కాడపై శైలికలు ఉండవు. శైలికలు పరిముఖ తలము మరియు అభిందానికి పరిమితమై ఉండును. వీటిని నోట్ లేక పరిముఖ శైలికలు అంటారు. ఇవి అపసవ్యముగా ఒకటిన్నర చుట్టు తిరిగి జలావర్తనము రూపములో అమర్చబడి చివరకు అభిందములోనికి అంతమవుతాయి. పరిముఖ శైలికలు ఆధారము వద్ద అంటి ఉండి పరాంతాన స్వేచ్ఛగా ఉండును. శైలికల వలయాలు అభిందాన్ని చేరుకోగానే లోపలి వలయాలు వెలుపలివాటితో వేరై అభిందములోనికి జారిపోతాయి.

పాదపుగా వెలుపలి వలయ శైలికలు కలిసిపోయి తరంగాకార త్వచముగా ఏర్పడును. కణగ్రనని యందు శైలికలు లేవు. వర్తిపెల్లా ఆహార సేకరణ యందు శైలికలు ముఖ్య సూక్ష్మాంగాలుగా పనిచేయును. శైలికలు కొట్టుకొనుట వలన తరంగాకారస్తరకుహరము ఆహారాన్ని ఆలించములోనికి అచటి నుండి కణగ్రనని లోనికి షంపబడుతుంది.

గంట లేక దేహము ఒక పాదవైన మృదువైన కాడ చేత నీటిలో మునిగి ఉన్న వస్తువును అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది. కాడ వెలుపలి భాగము తొడుగు లేక కుడ్యము. మధ్యభాగము అంతర్జీవ ద్రవ్యకల్య కలిగి ఉండును. కాడ యొక్క మయోసీమ్లు జతగా ఒక దళితమైన సర్విలాకారబంధనముగా ఏర్పడును. దీనిని అక్షీయ పోగు లేక అక్షీయ నూక్ష్మ తంతువు లేక స్పాజ్మోసీమ్ అంటారు. ఇది వెలుపలి జీవ ద్రవ్యము వెంబడి క్రిందికి పయనించును. ఇట్లు కాడ రక్షకత్వముతో కప్పబడిన బాహ్యజీవ ద్రవ్యము మరియు మధ్య అక్షీయ పోగు కలిగి ఉంటుంది.

3.5.4 శరీర ధర్మశాస్త్రము

ఇంతకు మునుపు వివరించిన ప్రోటోజోవా జాతులకన్నా వర్తిపెల్లాలో జీవన క్రియా విధానాలు ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి. అన్ని క్రియలను ఒకే ఒక్క కణము నిర్వహించినను, ఆ కణములోని అంతర్జీవ ద్రవ్యములోని వివిధ భాగాలు, కణాంగాలు వివిధ పనులను నిర్వహించుతాయి.

3.5.5 గమనము

వర్తిపెల్లా స్థిరముగా ఆధారాన్ని అంటిపెట్టుకొని జీవించే ప్రాణి. ఇది ఒకచోట నుండి మరియొక చోటికి గమనము సాగించలేదు. కానీ, సంకోచించే కాడ మరియు కండర తంతువుల సహాయంతో వర్తిపెల్లా గంట లేదా దేహము నీటిలో ఈదడంగానీ లేదా ప్రక్కలకు వంగడంలాంటి గమన పద్ధతులను కొనసాగించుతుంది.

3.5.6 పోషణ

వర్తిపెల్లా సర్వ భక్షకజీవి. ఇది జాంతవ భక్షణ పద్ధతి ద్వారా ఆహార పోషణను కొనసాగించుతుంది. ఇది చిన్న ప్రోటోజోవాలను, బాక్టీరియాలను మరియు సేంద్రియ పదార్థముక్కులను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఇంతకు మునుపు చెప్పుకొన్నట్లు శైలికలు కొట్టుకోవడం వల్ల ఆహారపు రేణువులు, కణగ్రననిలోనికి సేకరించబడుతాయి. అక్కడ, ఆహారపు రేణువులు, కొంత నీటితో కలిసి ఆహారపు రిక్తికలుగా తయారవుతాయి. ఇవి ఆ తరువాత అంతర్జీవ ద్రవ్యములోనికి వెళ్లి వేయబడుతాయి. అంతర్జీవ ద్రవ్యములో ఈ ఆహార రిక్తికలు తిరగడం వలన జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది. జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాలు అంతర్జీవ ద్రవ్యములోనికి తీసుకోబడుతాయి. అలా లోనికి తీసుకున్న ఆహారపదార్థాలు, కొంత కణజీవ ద్రవ్యనిర్మాణం కొరకు వినియోగించబడతాయి. మరికొంత ఆహారము గ్లైకోజెన్ గా ఏర్పడి నిల్వయుంచబడుతుంది. జీర్ణముకాని ఆహార పదార్థాలు కణసాయువు ద్వారా వెలుపలికి విసర్జింపబడుతాయి. ఈ ప్రక్రియను మలవిసర్జనము అంటారు.

3.5.7 శ్వాసక్రియ మరియు విసర్జన

వీటికొరకు వర్తిపెల్లాలో అంగాలు లేవు. శ్వాసవాయువుల మార్పిడి, స్రవణని సంబంధిత విసర్జక పదార్థాలు, శరీర ఉపరితలము ద్వారా, వ్యాపన పద్ధతి ద్వారా జరుపబడుతుంది.

3.5.8 ద్రవాభిసరణక్రమత

సంకోచ రిక్తిక ఈ క్రియను నెరవేరుస్తుంది. శరీరంలో చేరిన అదనపు నీరు సంకోచరిక్తికలతో చేరి అచ్చటనుండి, ఆశయము ద్వారా ఆలించములోనికి చేరుతుంది. ఆలించము నుంచి, ఇతర జీర్ణముకాని ఆహారపు పదార్థాల ద్వారా నీరు వెలుపలికి విసర్జింపబడుతుంది. సంకోచ రిక్తిక ఒక స్పందన నిర్మాణంగా పనిచేస్తూప్రతి 6 సెకండ్లకొకసారి సంకోచించుతుంది.


3.5.9 ప్రత్యుత్పత్తి

ప్రత్యుత్పత్తి మూడు పద్ధతులలో జరుగును.

- (1) అలైంగిక పద్ధతిలో నిలువు ద్వితావిచ్ఛిత్తి.
- (2) లైంగిక పద్ధతిలో సంయోగము
- (3) కోశీభజనము

ద్వితావిచ్ఛిత్తి

అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఒక సామాన్యమైన పద్ధతి. ఇందులో కణము రెండు సమాన భాగములుగా విభజన చెందుతుంది. ఇది దేహము నిలువున జరుగును. ఇది జరుగునపుడు ముఖఫలకము వెనుకకు తిరిగి తీసుకొనబడి ఫలకముపైన పరిముఖ కాలర్ మూసుకొనును. దేహము అణచబడి కురుచగ వెడలై అడ్డములో పాడవుగావగును.



పటం 1.6. వర్షసెల్ల నిలువు ద్వితావిచ్ఛిత్తిలోదశలు. 1. స్థూల కేంద్రకము 2. సూక్ష్మ కేంద్రకము. 3. నిలువు చీలిక 4. అసమాన నిలువు విభజనలు 5. తల్లిదీవి 6. పిల్లదీవి 7. ప్రతిముఖ శైలికలు 8. టెలోట్రాక్ 9. శైలికామయ పట్టీ

బృహత్ కేంద్రకము కురచగాను, సరళముగాను మారి దేహ మధ్యమున అడ్డముగా ఉంటుంది. ఇది అసమ విభజన ద్వారా రెండుగా చీలి పోవును. సూక్ష్మకేంద్రకము సమవిభజన పద్ధతిలో రెండుగావగును. దేహ పూర్వమధ్యభాగము కుచించి రెండుగా చీలుట ఆరంభించును. రెండు అసమభాగాలుగా విభజించును. దీనివలన ఒకటి పెద్దది, రెండవది చిన్న పిల్ల జీవులుగా ఏర్పడును. పెద్దగా నున్న జీవి పరిముఖము మరియు కాడ రెండూ కలిసి ఉండి తొందరగా ప్రౌఢ జీవిగా మారుతుంది. రెండవది ప్రతిముఖ శైలికల వలయాన్ని పెంచుకుని స్వూపాకారాన్ని దాల్చును. ఇది పెద్దగా నున్న జీవి నుండి వేరై నీటిలో ఈదుట ఆరంభించును. దీనిని 'టెలోట్రాక్' అంటారు. ఈ జీవి పరాంత శైలికల వలయాన్నొకటి పెంచుకొని ప్రతిముఖాంతాన్ని

ముందుకు వాచి చైతన్యవంతముగా ఈదు చుండును. కొంతకాలము తరువాత టెలోట్రాక్ ప్రతిముఖ తలాన స్కాపులా అనే అంటు బిల్లును పెంచుకొని, దాని సహాయముతో స్థిరపడిపోతుంది. ఇట్లు స్థిరపడిన దశయందు వర్తిపెల్లా లినైఫీడియా అనే కాదరహిత సీలియేట్ను పోలి ఉంటుంది. కావున ఈదశ లైఫీడియా దశ యని పిలువబడుతుంది. స్కాపులా కాదను ప్రవించును. టెలోట్రాక్ ఒక కొత్త ఫలకాన్ని పెంచుకొని ప్రాథరూపాన్ని దాల్చును. నిలుపుగా అనమాన ద్వితీ విచ్చిత్రి ప్రక్రియ పరిసమాప్తానికి 20 30 ని.ల సమయము పట్టును (పటం 3.6).

సంయోగము

ఇది లైంగిక వద్దతితో జరుగు ప్రత్యుత్పత్తి. ఇది రెండు అనమాన జీవుల మధ్య జరుగును. వీనిని కాంజుగేంట్స్ (సంయోగ జీవులు) అని పిలుస్తారు (పటం 3.7). ఒకటి పెద్దగా కాదయుతమైన బృహత్ సంయోగ.జీవి. రెండవది చిన్నగా ఉండి స్వతంత్రముగా ఈదుచుండే సూక్ష్మ సంయోగ జీవి. బృహత్ సంయోగ జీవి అచైతన్యవంతమైన అడసంయోగ జీవి లేక బృహత్ సంయోగ బీజమని, సూక్ష్మ సంయోగ జీవి చైతన్యవంతమైన మగ సంయోగ జీవి లేక సూక్ష్మ సంయోగ బీజమని పరిగణించవచ్చుని సూచించబడినది.

సంయోగ జీవుల నిర్మాణము: సంయోగ జీవులు నిలుపు ద్వితీవిచ్చిత్రి వలన ఏర్పడును. ఇది లైంగిక ద్వితీ విచ్చిత్రితో పోల్చిన ఎక్కువ అనమానమైనట్టిది. బృహత్ సంయోగ జీవి స్థిరమైన కాద కలిగి ఉండుటచే ప్రాథ వర్తిపెల్లాను పోలి ఉంటుంది. సూక్ష్మ సంయోగ జీవి పరాంతాన శైలికల వలయాన్ని పెంచుకొని, పిత్తు దేహమునుండి వేరుపడి ఈదుచు దూరముగా వెదలిపోవును. ఇవి ప్రాథ జీవిగా పెరగలేవు. ఇది టెలోట్రాక్ను పోలి యుండును. కాని పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉండును. ఇది 24 గంటలవరకు జీవించ గలుగుతుంది. ఈ కాలములో ఇది క్రాత్రగా ఏర్పడిన బృహత్ సంసర్కము ఏర్పరచుకొనవలయును. దీనిలో అకర్ణక శక్తి కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది.

సంయోగ జీవుల కలయిక: స్వేచ్ఛగా ఈదు చున్నట్టి సూక్ష్మ సంయోగ జీవి. స్థూల సంయోగ జీవి సంసర్కముకి వచ్చినచో ఇది తన ప్రతిముఖ తలము వెంబడి స్థూల సంయోగ జీవి దేహానికి అడుగు భాగాన కాదకు దగ్గరగా అంటుకొనును. ఆ పిదప ఇది తన శైలికలను, ఇతర సూక్ష్మాంగాలను కోల్పోతుంది. రెండు సంయోగ జీవుల మధ్య రక్షకత్వచ విఘటన జరిగి రెండింటి అంతర్జీవ ద్రవ్యము అవిచ్ఛిన్నమగును

సంయోగ ప్రక్రియ: సంయోగ ప్రక్రియ 12 నుండి 24 గంటలలో పరిసమాప్తి అగును. రెండు సంయోగ జీవుల బృహత్ కేంద్రకాలు విచ్చిత్రి చెంది చివరకు మాయమగును. ఈవిధముగా యిది సంయోగమునందు ముఖ్యపాత్ర వహించదు. ప్రతి సంయోగ జీవిలోని సూక్ష్మ కేంద్రకము ఒక ప్రత్యేక వద్దతితో విభజన చెందును. సూక్ష్మ సంయోగ జీవి యందు సూక్ష్మ కేంద్రకము మూడుసార్లు సమవిభజన చెంది ఎనిమిది కేంద్రకాలును ఏర్పరచును. బృహత్ సంయోగ జీవిలోని మూడు కేంద్రకాలు విచ్చిత్రి చెంది అంతరజీవ ద్రవ్యములోనికి శోషించబడును. ఇప్పుడు రెండు సంయోగ జీవులందు ఒక సూక్ష్మ కేంద్రకము మాత్రము మిగిలి ఉండును. ఈ కేంద్రకము సమవిభజన చెంది రెండు ప్రాక్కేంద్రాలు లేక సంయోగ బీజ కేంద్రాలుగా ఏర్పడును. ఇందులో ఒకటి ప్రవాసపు ప్రాక్కేంద్రకము లేక మగ ప్రాక్కేంద్రకము. రెండవది స్థావర ప్రాక్కేంద్రకము లేక అడ ప్రాక్కేంద్రకము అనబడును.

కేంద్రకాల బదిలీ: సూక్ష్మ సంయోగ జీవిలోని ప్రవాస కేంద్రకము బృహత్ సంయోగ జీవిలోనికి వినిమయము చెంది అందులో స్థాన బద్ధమైనఉన్న ప్రాక్కేంద్రకముతో కలిసి పోయి సంయుక్త కేంద్రకము లేదా కలిసి పోయిన కేంద్రకము లేదా సంయోగ కేంద్రకము కాని బృహత్ సంయోగజీవి ప్రవాస ప్రాక్కేంద్రకము మరియు సూక్ష్మ సంయోగ జీవి స్థానబద్ధ ప్రాక్కేంద్రకము రెండుగా ఏర్పడుతుంది. కలియుకుండ తిరోగమనము చెందును. ఈవిధముగా కేంద్రకాల కలయిక విచ్ఛలమైనది. బృహత్ సంయోగ జీవి సంయుక్త కేంద్రకముతోబాటు సంయుక్త బీజమనబడుతుంది. సూక్ష్మ సంయోగ జీవి కేంద్రకరహితమై కృశించి వీడిపోవును. దానిలోని పదార్థాలు సంయుక్త బీజములోనికి శోషించబడును. దీనితో సంయోగ ప్రక్రియ సమాప్తము చెందును.

చెందును. పూర్వ సంయోగ జీవి యొక్క విభజన ఆరంభమాతుంది. మొదటి విభజనలో రెండు పిల్ల జీవులు ఏర్పడి ఒకదానియందు ఒక సూక్ష్మ కేంద్రకాలు చేరును. రెండు పిల్ల కణాలు అందులోని సూక్ష్మ కేంద్రకాలు రెండుసార్లు విభజన చెందును. స్థూల కేంద్రకాలు విభజన చెందక పిల్ల జీవులందు విస్తరణ చెందును. నాలుగు

భాగము-4 : ప్రోటోజోవా వ్యాధులు

విషయ క్రమము

4.1 ఉద్దేశ్యము

4.2 ఉపోద్ఘాతం

4.3 లీష్మినియా డోనోవాని

4.3.1 బాహ్యరూపము

4.3.2 జీవిత చక్రము

4.3.3 రోగగ్రస్తత

4.3.4 నియంత్రణ పద్ధతులు

4.3.5 ఉపచారము

4.4 ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా

4.4.1 బాహ్య రూపము

4.4.2 జీవిత చక్రము

4.4.3 వ్యాధి గ్రస్తత

4.4.4 రోగనివారణ చర్యలు లేదా ప్రాఫైలాక్సిస్

4.5 మలేరియా పరాస్థజీవి

4.5.1 చరిత్ర

4.5.2 మలేరియా పరాస్థజీవి జీవిత చక్రము

4.5.3 మలేరియా లక్షణములు

4.5.4 నివారణ చర్యలు

4.5.5 ఉపచారము

4.6 స్వపరిశీలన

4.7 సారాంశం

4.8 స్వపరిశీలనం/ జవాబులు

4.9 వమూనా ప్రశ్నలు

4.10 పదకోశం

4.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠం చదివిన తరువాత ప్రోటోజోవా పరాస్థ జీవులు ఏ విధంగా కాలాజార్, అమీబియాసిస్, మలేరియా వ్యాధి కారకాల్లో, వాటి నిర్మాణం జీవిత చక్రాలు ఏవిధంగా ఉంటాయో నీవు తెలుపగలుగుతావు.

4.2 ఉపోద్ఘాతం

4.3 లీప్సానియా డౌనోవాని

ఎంటమిబా హిస్టాలిటికా

ఆహారనాశ అమీబాలలో ఇది ఎక్కువ రోగ జనకమైనది. దీనివలన అమీబిక్ డీసెంట్రి (రక్తవిరేచనాలు) లేక అంత్ర అమీబియాసిస్ కలుగుతుంది. ఇది ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉంది. సమశీతోష్ణ మరియు ఉష్ణమండల వివిధ రకాల జనాభాలందు వివిధ శాతం ప్రజలు ఈ వ్యాధికి గురిఅవుతున్నారు. ఈ పరాన్నజీవి మెక్సికో, భారతదేశము, చైనా మరియు దక్షిణ అమెరికాలోని ప్రజారోగ్య పారిశుద్ధ్య పరిస్థితులు సంతృప్తికరంగా లేని ప్రదేశములందు ఎక్కువ ప్రజలి ఉంటుంది.

దీనిని ప్రథమంగా 1859లో లాంబి కనుగొన్నాడు. దీని పరాన్న జీవన లక్షణాన్ని లావ్ అను రష్యన్ జంతు శాస్త్రజ్ఞుడు 1875లో వర్ణించినాడు. ఈ పరాన్నజీవి మానవుని చిన్న పేగు ప్రాంతాన మొత్తం పెద్దపేగు యొక్క శ్లేష్మ ప్థరములందు నివసిస్తుంది. ఉండుకమునందు సయితము ఉంటుంది. దీర్ఘకాల రోగులందు ఇది కాలేయము, శ్వాసకోశాలు, మెదడు మరియు స్త్రీహమునందు సయితము ప్రవేశించి ద్వితీయ లక్షణాలను కలుగజేస్తుంది.

మలేరియా పరాన్న జీవి

(ప్లాస్మోడియం)


మానవునికి తెలిసిన అన్ని రోగాలలోను మలేరియా అతి ప్రాచీనమైనది. గ్రీకులకు ఇది తెలిసియుండెను. దానిని వారు బురద, నీటి తేమగల ప్రదేశములనుండి వెలువడు చెడుగాలి వలన సంభవిస్తుందని భావించెడివారు. (మలా = చెడు; ఎరియా = గాలి). ఇది మామూలుగా ఉష్ణ ప్రదేశములందు సమశీతోష్ణ ప్రదేశములందును వ్యాప్తించి ఉంటుంది. ఇప్పటికిని ప్రపంచములో అనేక భాగములందు అతి ముఖ్య వ్యాధిగా పరిగణింపబడుతున్నది. ఇది ప్రత్యక్షముగాను, పరోక్షముగాను మానవ బలహీనతకు మరియు చావుకు కారణభూతమై యున్నది. మలేరియా కణాంతస్తంగా ఉండే రక్త పరాన్న జీవి అయిన ప్లాస్మోడియం వలన కలుగుతుంది. ఇది స్పోరోజోవాకు చెందిన ప్రోటోజోవా పరాన్నజీవి. ప్లాస్మోడియం జాతియందు నాలుగు ప్రజాతులు చేరి యున్నవి. (1) వైబాక్స్, (2) ఫాల్సిపేరం, (3) మలేరియై, (4) ఓవెల్. ప్లాస్మోడియం ఓవెల్ మనుషు చాలా తక్కువ ప్రదేశాలలో చూస్తాము. ఇది ఆఫ్రికా యొక్క తూర్పు, పడమర ప్రాంతములందు మరియు ఫిలిప్పైన్స్ దీవులందు ఉండును. ప్లాస్మోడియం వివిధ రకాల మలేరియాను కలుగజేస్తుంది. అన్నిరకాలలో ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపేరం చాలా ఉద్రితమైనది. ఈ ప్రజాతి తెగలు మందులను ఎదిరించు శక్తి కలిగిఉన్నవి.

4.3 లీప్సానియా డౌనోవాని

వర్గము	:	ప్రోటోజోవా
ఉపవర్గము	:	ప్లాస్మోడోమా
తరగతి	:	మాస్టిగో ఫోరా
ఉప తరగతి	:	జూ మాస్టిగో ఫోరా
క్రమము	:	ప్రోటోమొనాడినా
జాతి	:	లీప్సానియా
ప్రజాతి	:	డౌనోవాని

4.3.1 బాహ్యరూపము

వర్ణ రహితమైన అతి సూక్ష్మమైన పరాన్న జీవి. ఇది గుండ్రముగా అందాకారము కలిగియుండి నాలుగు మైక్రానుల వ్యాసము కలిగి యుండును. దేహము రక్షక త్వచముతో ఆవరించి ఉంటుంది. కణ పదార్థం, బాహ్య అంతర్జీవ ద్రవ్య పదార్థము వేర్వేరుచుండి ఉండదు. మధ్యన ఒక గుండ్రని కేంద్రకం ఉంటుంది. దీనియందు బ్లెఫేరో ప్లాస్ట్ పారా జేసల్ దేహము మరియు రైజో ప్లాస్ట్ ఉంటాయి కాని కళాభము మాత్రం ఉండదు (పటం 4.1 ఎ-సి).



పటము 4.1. లీవ్యాసియా ఎ. త్రాఫీడివి. బి. పిల్లడివి. సి. లెడ్జి మోనాడ్ రూపాలు. 1. రైజో ప్లాస్ట్ 2. కణ ద్రవ్యము 3. ఆహార కణిక 4. కేంద్రకము 5. కళాభము 6. కైటో ప్లాస్ట్

4.3.2 జీవిత చక్రము

జీవిత చక్రము రెండు అతిథేయుల యందు పరివహింపబడి చెందును. (1) ప్రాథమిక అతిథేయి (మానవుడు), (2) మాధ్యమిక అతిథేయి (రక్తము పీల్చు ఫ్లేబోటమస్ జాతికి చెందిన సాండ్ ఫ్లై).

ఈగలో: సాండ్ ఫ్లై, మాధ్యమిక అతిథేయి లేక ద్వితీయ అతిథేయి లేక వాహకముగా వ్యవహరిస్తుంది. రక్తము పీల్చు ఈగ, ప్రాథమిక అతిథేయి రక్తమును ఆహారము కొరకు పీల్చునపుడు పరాన్న జీవులు దాని ఆహార నాళములోనికి చేరుకొనును. ఇచట పరాన్న జీవి పెరిగి పెద్దగా నగును. వీనిలో పెద్ద కేంద్రకము, దేహానికి పూర్వంతమునకు దగ్గరగా బ్లెఫేరో ప్లాస్ట్ నుండి పేరుగునట్టి ఒక కురుచుని స్వేచ్ఛాయుత కళాభము ఉండును. ఇట్టి కళాభయుత పరాన్నజీవి 'లెడ్జి మోనాడ్' అనబడును. ఈగ కుట్టినపుడు సంక్రమిక దశ మానవుని రక్తములోనికి విడుదలగును. ప్రాథమిక అతిథేయి లోపల లెడ్జి మోనాడ్ రూపక పరాన్నజీవులు ప్రాథమీయంగా లోపల లెడ్జి మోనాడ్ రూపక పరాన్న జీవులు (వాధ రీష్మానియా దశలోకి మారును.

మానవునిలో: పరాన్నజీవి పలుమార్లు ద్విధావిచ్ఛిత్తి చెంది సంఖ్యను పెంచును.

4.3.3 రోగ గ్రస్తత

కాలాజార్ (కాలా = నలుపు; ఆజార్ = వ్యాధి) మలేరియా వంటి వ్యాధి. దీనివలన క్రమము లేని జ్వరము, కాలేయ స్త్రీహముల విస్తరణ మరియు రక్తక్షీణత ఏర్పడును. చర్మము రంగు నల్లబడి ల్యూకో పీనియా సంభవించును. ఈ వ్యాధికి సరైన చికిత్స జరుగని యెడల మరణము సంభవించును.

4.3.4 నియంత్రణ పద్ధతులు

సాండ్ ఫ్లైను చంపుట చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతి. దీని కొరకు క్రింది పద్ధతులు అవలంబించవచ్చును.

1. క్రిమి సంహారక మందులను చల్లుట ఇందులో డి.డి.టి.ట హెచ్.సి.హెచ్ మరియు డయాల్రిన్ చేరినవి.
2. పారిశుధ్య పరిమాణాలను మెరుగు పరచవలెను. దీనికై
 1. సాండ్ ఫ్లైస్ యొక్క పెరుగుదల స్థానాలను నివారణ గావించవలెను. దీనికై గృహము లందరి పొక్కలను, పర్రలను తీసివేయవలెను.
 2. ఇండ్లవద్ద నుండు గుంపు పొదలను, గడ్డిని తీసివేయవలెను.
 3. పశుశాలలను, కోళ్ల పెంపుడు శాలలను ఇండ్ల నుండి దూరముగా ఉంచవలెను.

4.3.5 ఉపచారము

రీప్లానియా వ్యాధులను క్రింది పద్ధతుల ద్వారా వివారించవచ్చును.


1. సోడియం అంటిమెని గ్లూకోనేట్ యొక్క ఇంజక్షన్లు 10 14 దినముల వరకు తీసుకొవలెను.
2. పెంటా మీడిన్ ఐసోథయోనేట్ యొక్క ఇంట్రా వీనస్ ఇంజక్షన్లు
3. టార్ టార్ ఎమోటిక్ డోస్లు లేక సోడియం అంటి మెని టార్టరేట్.
4. అంటిమెని పమ్మేళనాల రెండు సముదాయాలు మందులుగా వాడుదురు. పెంటా వేలెంట్ సమ్మేళనాలు మార్కెట్ ను నందు వివిధ వ్యాపార పేర్లతో లభిస్తాయి. ఉదా. నియోస్టిబోరాన్, నియోస్టాన్, సోల్వర్టి బోసాన్ మరియు యూరియాస్టిబానిన్ మొ. ఇవి అన్ని చాలా ప్రబలంగా వాడుకలో నున్నవి.

4.4 ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా

వర్గము	:	ప్రోటోజోవా
ఉపవర్గము	:	స్ట్రోమిడోమా
తరగతి	:	సార్కోడినా
క్రమము	:	అమీబినా లేక తాబోసా
జాతి	:	ఎంటమీబా
ప్రజాతి	:	హిస్టాలెటికా

4.4.1 బాహ్యరూపము

ఇది సామాన్యముగా 10 50 మైక్రానుల వ్యాసము కలిగి ఉంటుంది. కణ సదృశములను రెండు భాగములందు



పటం 4.2. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా. ఎ. ట్రోఫోజైట్ రూపము. బి. మైక్రాబా రూపము. 1. బాహ్య ఉప ద్రవ్యము 2. అంతర్గతద్రవ్యము 3. కేంద్రకము 4. అంతర్గతనాణుము చెందిన ఎర్ర రక్త కణాలు 5. అంతర్గతనాణుము చెందిన బాక్టీరియా 6. ప్లాస్మాలెమ్మా 7. మిథానవాదము.

విభేదించవచ్చు. 1. వెలుపలి స్పష్టమైన బాహ్య జీవ ద్రవ్యము, 2. లోపలి కణికాయుత అంతర్జీవ ద్రవ్యము. కేంద్రకము గుండ్రముగా ఉండును. సున్నితమైన క్రొమాటిన్, వలయుము వెలుపలివైపు ఆవరించుకొని యుండును. మధ్యన సున్నితమైన చిన్న కారియోజోమ్ కలదు. అంతర్జీవ ద్రవ్యమునందు ఆహార రిక్తికలు, ఎర్ర రక్తకణాలు మరియు బాక్టీరియా ఉంటాయి. ఒక స్పష్టమైన కావాభ మిథ్యాసాదము ఉంటుంది. దీని నవోయముతో అన్ని దిశలందు తిన్నగా గమనము సాగించును. (పటం 4.2 ఎ అండ్ బి).

4.4.2 జీవితచక్రము

పరాన్న జీవి జీవిత చక్రమునందు నాలుగు స్పష్టమైన దశలు కలవు. వానిని ట్రోఫోజైట్, పరకోశయ, కోశీయ మరియు మెటాసిస్టిక్ అంటారు (పటం 4.3).

ట్రోఫోజైట్ పోషణ మరియు పెరుగుదల దశ, పరకోశీయ మరియు కోశీయ దశలు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపును. మెటాసిస్టిక్ దశ సాంక్రమిక దశ.

జీవిత చరిత్ర ఒకే అతిథేయిలో పరిసమాప్తము చెందును. కావున ఇది మానోజెనెటిక్ పరాన్నజీవి.

కోశీభవనము: ట్రోఫోజైట్, ఆహారము సేకరించుకొని పెరిగి ద్విదావిచ్ఛిత్తి ద్వారా సంఖ్యను పెంచుకొని కణజాలము నుండి పెద్ద పేగు కుహరమును చేరుకొనును. ఇచ్చట కోశీభవన ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఇచ్చట పరాన్నజీవి గుండ్రముగా ఉండి ఆహార రిక్తికలను కోల్పోతుంది. ఇప్పుడిది పరకోశీభ లేక మైన్యూటా రూపమని వ్యవహరించబడును. ఇది ఒక పన్నిని నిరోధక శక్తిగల కణ కుడ్యమును మట్టు ప్రవించుకొంటుంది. ఇందులో ఒక ప్రామాణిక కేంద్రకము మరియు సున్నితమైన అకణికమయ జీవ పదార్థముండును. ఇవిధముగా ఒకే కేంద్రకము కలిగిఉన్న ప్రారంభదశ ఏక కేంద్రక కోశీభవన రూపమంటారు. కేంద్రకము రెండుసార్లు విభజన పొంది నాలుగు పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పరుస్తుంది. ఇప్పుడు కోశము టెట్రా మ్యూక్లియేట్ లేక క్వాడ్రమ్యూక్లియేట్ అనబడును. దీని వ్యాసము 5 10 మైక్రానులు ఉండును. ఈ దశలో క్రొమాటిన్ దేహము సిగార్ ఆకారంగా ఉంటాయి. కొన్ని గంటల వ్యవధిలో కోశీభవన ప్రక్రియ సమాప్తము చెందును.

పరాన్నజీవి యొక్క కోశాలు సాంక్రమిక దశలు. ఇవి ఎండకు ఉష్ణానికి, రసాయనిక పదార్థాలకు అవరోధన శక్తి కలిగి ఉంటాయి. మానవుని మలంద్వారా పరిణతి చెందిన కోశాలు మధ్య మధ్యన బయటికి వెదలిపోతాయి.


ప్రసారము: కోశాలు మానవుని ఆంత్రము వెలుపలి అనుకూల పరిస్థితులందు చాలా కాలము పరకు జీవించగలవు. క్రొత్త అతిథేయికి మలినపడిన ఆహారము, పానీయాల ద్వారా సంక్రమిస్తాయి. ఈగలు, బొద్దింకలు మరియు అపారశుద్ధ్య మనుష్యులు, ఆహార పదార్థాలను ముట్టుకున్న మలినపడుట సంభవించును. ఇట్టి సాంక్రమణను కంటామినేట్ సాంక్రమణ అంటారు.

కోశీభవనము: మలినపడిన ఆహార పదార్థాల ద్వారా కోశాలు మానవుని ఆంత్రము చేరును. ఇచ్చటనుండు జీర్ణరసాల ద్వారా కోశము కరిగి టెట్రా మ్యూక్లియేట్ పరాన్నజీవి బయటపడును. ఇట్లు జరుగుటను ఎక్స్సిస్ట్ మెంట్ లేదా ఎక్స్సిస్టేషన్ అంటారు. ఈదశలోనున్న పరాన్నజీవిని ఎక్స్సిస్టిన్ లేదా మెటాసిస్టిక్ దశ అంటారు.

మెటాసిస్ట్: మెటాసిస్ట్లోని కేంద్రకము మరియు జీవ పదార్థము విభజనలు జరుపుకొని 8 చిన్న ఏక కేంద్రక పిల్ల అమీబులీలను తయారుచేస్తుంది. ఇప్పుడవి పెద్ద పేగు చేరి శ్లేష్మ ప్రరముపై దాడి చేసి పెరిగి పరిణతి చెందిన ట్రోఫోజైట్లుగా ఏర్పడును. ఏకకేంద్ర మేటాసిస్టిక్ రూపాలు కోలాన్ కుహరము నందు ఉండిపోయి పరకోశీయ లేక మైన్యూటా రూపాలుగా ఏర్పడును.

ఎంటమీబా జీవిత చక్రమునందు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మాత్రము కలదు. మాధ్యమిక లేక ద్వితీయ అతిథేయి లేదు. ఈగ మరియు బొద్దింకలు, పరాన్నజీవుల ప్రసారానికి మాత్రము పనికివస్తాయి.

ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క కోశాలు మరియు ట్రోపోజోయట్స్ యొక్క పరిమాణమునందు కనిపించే వైవిధ్యమునుబట్టి పివిని రెండు తెగలుగా అకారణ వర్గీకరణము చేయుటకు దారితీసినది. పెద్ద తెగ యందు కోశపరిమాణము 10 మైక్రానులు అంతకంటే ఎక్కువగాను, చిన్న తెగయందు 10 మైక్రాన్లకు తక్కువగాను ఉంటుంది. మొదటిదాని వలన ఉగ్రతలో పోనికలుగు గాయములు కలుగును. దీనివలన అమీబియాసిస్ చీము, రక్త విరేచనాలు, కాలేయము, శ్వాసకోశము మరియు మెదడు నందు పుండ్లను మరియు చర్మీయ అమీబియాసిస్ అను వ్యాధులు సంభవించును. రెండవ తెగ దీర్ఘకాల జడదాంత్ర రోగము కలిగిఉన్న వారిలో ఉంటుంది. ఇవి ఎర్ర రక్తకణాలను అంతర్లహణము చేయువు.



పటం 4.3. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ప్రత్యుత్పత్తి. జీవిత చక్రము. 1. కేంద్రకము 2. అంతర్లహణము పెరిగిన ఎర్ర రక్త కణములు 3. దావాక్రీవ ద్రవ్యము 4. అంతర్లహణ ద్రవ్యము 5. కోశపు గోత 6. గ్లైకోజెన్ 7. క్రొమాటిన నిర్మాణాలు.

4.4.3 వ్యాధిగ్రస్తత

ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా సర్వసాధారణంగా ఉండే వ్యాధియైన అమీబియాసిస్ డిసెంట్రీ లేక అమీబియాసిస్ కు కారకము. దీని చేత సుమారు 60 శాతం జనాభా బాధ పడుచున్నారు. ఇది కాలేయం శ్వాసకోశం మరియు మెదడు నందు పుండ్లు కలిగించును.

ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా వలన సంభవించు వివిధ వ్యాధులు క్రింద వివరింపబడినవి.

1. అమీబిక్ డిసెంట్రీ: ఈ వ్యాధి వలన మలములో చీము రక్తము వచ్చును.
2. దీర్ఘకాల ఆంత్రి అమీబియాసిస్: దీర్ఘకాల అమీబిక్ డిసెంట్రీ ఆంత్రి అమీబియాసిస్ గా మారుతుంది. దీనివలన రోగికి నీటి విరేచనాలు మరియు మలబద్ధకము సంభవించును. కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అనగా

పాలు, చమురుగల ఆహార పదార్థములతో అజీర్ణవ్యాధి కలుగును. దీనివలన గేస్ ఫ్లాటులెన్స్ (Flatulane) కడుపులో ఆయాసము, నాసియా బలహీనత, సాధారణ దుర్బలత ఏర్పడును. ట్రోపోజైట్ చాలాకాలముగ ఉన్నవారు మామూలు జీవితము గడుపుదురు. వీరు ఈ వ్యాధికి వాహకములుగా పనిచేయుదురు.

3. ఫుండ్లు పెరుగుట: అప్పుడప్పుడు ట్రోపోజోయిట్లు ప్రసరణ వ్యవస్థలోనికి చేరుట తటస్థించును. ఇట్లు ద్వితీయ ఆంతేతర చోటు లభించును. కొత్త ప్రదేశాలలో కాలేయము, శ్వాసకోశము, ముష్టిష్కము మరియు స్త్రీహము చేరియున్నవి.

4. చర్మీయ అమీబియాసిస్: ఇది తరచుగా పరి పాయు స్థానము మరియు పిరుదలపైన సంభవించును.

4.4.4 రోగనివారణ చర్యలు లేదా ప్రాఫైలాక్సిస్

అమీబియాసిస్ మరియు దానికి సంబంధించిన లక్షణాలను అదుపు నందుంచుటకు వ్యక్తిగత మరియు సాంఘిక చర్యలు ఆచరణము యందుంచవలెను.

వ్యక్తిగత నివారణ చర్యలు

1. పరిశుభ్రత అలవాట్లను పెంచుకొనవలెను. మరగబెట్టిన నీటిని త్రాగవలెను. పండ్లు, ఆకుకూరలు కడిగి శుభ్రపరిచి వాడుకొనవలెను. వీలైతే కొన్ని పెంకండ్లు వేడి నీటిలో యుంచి స్టైరలైజ్ చేయవలెను.
2. దేహమును పరిశుభ్రముగా యుంచుకొనవలెను. ఆహారము తినుటకు ముందు కాలక్యత్యములు ముగించిన పిదప, మలిన పదార్థములు ముట్టినపుడు చేతులను సబ్బుతో కడుగవలయును.
3. వేలిగోళ్లను వెంట వెంటనే తీసివేయవలయును.
4. ఆహార పదార్థములను మలినపడకుండా మూసి ఉంచి ఈగలు, బొద్దింకలు మరియు ఎలుకల నుండి కాపాడవలెను.
5. మలమూత్రాలను ఖాళీ స్థలములందు, సాములందు మరియు వీధులలోను విసర్జన చేయరాదు. మరుగు దొడ్లను వాడుకునే అలవాట్లు పెంచుకొనవలెను.

4.5 మలేరియా పరాన్నజీవి (ప్లాస్మోడియం)

వర్ణము	:	ప్రోటోజోవా
ఉపవర్ణము	:	ప్లాస్మోడోమా
తరగతి	:	స్పోరోజోవా
క్రమము	:	హిమెనోస్పోరిడా
వంశము	:	ప్లాస్మోడిడే
జాతి	:	ప్లాస్మోడియం
ప్రజాతి	:	వైవాక్స్

4.5.1 చరిత్ర

పైన చెప్పినట్లు మానవునకు వేల సంవత్సరాల నుంచి మలేరియా తెలిసి యున్నది. 18వ శతాబ్దములో మాత్రమే దీనిని గురించి గొప్ప విషయాలు చాలా వరకు కనిపెట్టుట జరిగింది. మలేరియా పరాన్నజీవి మరియు దాని జీవిత చక్రము గురించి కనుగొన్న ముఖ్యమైన విషయాలు. ఆ విషయాలు కనుగొన్న తేదీలు, సంవత్సరాలు దిగువన ఇవ్వబడినవి.

- 1827 : (Macculloch) 'మలేరియా' అను వామకరణము చేసినాడు.
- 1881 : ప్లాస్మోడియంను ప్రప్రథమంగా Alphonse Laveran అను ఫ్రెంచి ఆర్మీ సర్జన్ అల్జీరియాలో పనిచేయు చుండగా కనుగొనెను.

- 1894 : *Sir Patrick Manson* ఇతడు పాక్కిస్థాన్ (Taiwan) లో పని చేయుచున్న స్కాట్ లేండ్ డాక్టరు. మలేరియా ప్రసారమునందు దోమల పాత్రను సూచించినాడు.
- 1896 : *Sir Ronald Ross* ఇతడు ఇండియన్ మిలటరీ డాక్టరు. సికింద్రాబాదు కంప్టన్ మెంట్ హాస్పిటల్ లో పని చేయుచుండగా ఆడ అనాఫిలస్ దోమ మలేరియాను ప్రసారము చేయునని కనుగొన్నాడు.
- 1898 : *Gyassi* ఇటాలియన్ శాస్త్రజ్ఞుడు. ఇతడు మరియు ఇతని సహచరులు మలేరియా పరాన్న జీవి లైంగిక చక్రాన్ని ఆడ అనాఫిలస్ దోమలో సంపూర్ణంగా జరుగుతుందని రుజువు చేసినారు.
- 1848 : *Col. Shortt and Gvahim* వీరు బ్రిటిష్ దేశపువారు. ప్రాటోజోవాలో శాస్త్రజ్ఞులు. వీరు పూర్వరక్త కణ చక్రాన్ని మానవుని కాలేయమునందు కనుగొన్నారు.

4.5.2 మలేరియా పరాన్నజీవి జీవిత చక్రము

మలేరియా కలుగచేసే పరాన్నజీవి జీవిత చక్రము రెండు అతిథేయులందు పరిసమాప్తి అవుతుంది. ఒకటి ప్రాథమిక అతిథేయి మానవుడు, రెండవది మాధ్యమిక అతిథేయి లేక ద్వితీయ పరాన్నజీవి లేక వాహకము — ఆడ అనాఫిలస్ దోమ.

ఒక మానవుడి నుండి రెండవ మానవునకు ప్రసారము దోమకాటు వలన కలుగును. ఇది ఇంచుమించుగా ఇనాక్యులేషన్ అనవచ్చును. ఇదికాక ఇతర సాధనములు కలవు. (1) సంక్రమణ పుట్టుకతో ఉండవచ్చును. (2) మందుకు అలవాటు పడినవారు మలిన పడిన సూదులను వాడుట వలన (3) ముఖ్యముగా రక్తము ఎక్కించునపుడు మానవుని యందు జరుగు జీవిత చక్రము మూడు దశలుగా విభజింపబడినది. (పటం 4.4)

- (1) పూర్వ రక్తకణ పైజోగొని (కాలేయ కణములందు)
- (2) ఎర్ర రక్తకణ పైజోగొని (ఎర్ర రక్తకణములందు)
- (3) సంయోగ బీజ మాతృక నిర్మాణము (రోగగ్రస్త ఎర్రరక్త కణములందు)

పూర్వరక్తకణ పైజోగొని

పరాన్న జీవులు మానవుని రక్తములో ప్రవేశించిన వెంటనే అవి పరిధీయ రక్త ప్రసరణ నుండి మాయమై కాలేయంలో మృదు కణజాలంపై దాడి పలుపుతాయి. కాలేయ కణములందు పోషణ జరుపుకొని అలైంగిక బహుధావిచ్ఛిత్తి ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపును. సాంక్రమిక కాలేయ కణము పగిలి పరాన్నజీవులు బయటపడును. ఇప్పుడు వీనిని క్రిప్టో మీరోజోయిట్స్ అంటారు. ఈ చక్రము 5-15 దినముల వరకు కొనసాగును.

ఎక్స్ ఎరిథ్రో సైటిక్ పైజోగొని

ఇందులో పూర్వ రక్తకణ చక్రము తిరిగి జరుగును. పరాన్నజీవులు ఇప్పుడు మెటాక్రిప్టో మీరోజోయిట్స్ అనబడును. ఇందులోనుంచి కొన్ని ఎర్ర రక్తకణాలను చేరి ఎర్ర రక్తకణ చక్రాన్ని మొదలు పెడ్తాయి. మరికొన్ని కాలేయ కణాలపై దాడిచేసి చక్రాన్ని తిరిగి కాలేయమునందు మొదలుపెట్టును. కాలేయమునందు పరాన్న జీవులున్నంత కాలము జ్వరము రాదు. మలేరియా విరుద్ధ మందులచే ప్రభావితం కాదు.

పటం 4.4. ప్లా స్టాడియం కీవెల చక్రము. 1. క్రీడ్లా మెరేజ్ యిట్స్ 2. కాలేయ కళాము 3. మెటా క్రీడ్లా మెరేజ్స్ 4. ఎల రక్త కణములన్నీ ప్రవేశించుచున్న మెరైజ్స్ 5. సగైడ్ రింగ్ దశ 6. బహుధా పిచ్చిత్తి 7. హిమోజోయన్ కణుకలు 8. మెరైజ్స్ 9. ఎలరక్త కణము 10. ఆంధము 11. క్షీర్ణాశయపు గోళమ వలచుకొని బాతున్న మెరైజ్స్ 12. కోశము. 13. సంయుక్తకీణకము 14. స్పూరోజోయిట్స్ 15. పెగులుతున్న కోశపు గోళ.

ఎరిథ్రోసైటిక్ చక్రము/పైజోగోవి

కాలేయమునందు మీరోజోయిట్స్ ఎర్ర రక్త కణాలను ప్రవేశిస్తాయి. పోషణము మొదలుపెడతాయి. ఇవి ట్రోఫోజాయిట్ నుండి సిగ్నెట్ రింగ్ దశకు చేరుకుంటాయి. ఆ పిదప అమీబాయిడ్ దశ దాల్చును. ఇవి ఇప్పుడు అలైంగిక బహుధా విచ్ఛిత్తి పద్ధతిలో విభజన చెందును. ఎర్ర రక్త కణాలు పగిలి పరాన్న జీవులు బయటపడతాయి. వీని వెంబడి విష పదార్థములైన హీమోజోయిన్ విడుదలవుతుంది. ఈ పదార్థమే మలేరియా జ్వరానికి కారణము. ఈ చక్రము 48-72 గంటలలో ప్లాస్మోడియం యొక్క ప్రజాతులను అనుసరించి ఉంటుంది. పెక్కు అలైంగిక తరాల తరువాత పరాన్నజీవులు ఆడ, మగ సంయోగ బీజ మాతృకలుగా మారుతాయి. జీవిత చక్రము యొక్క తరువాతి దశలు ఆడ అనాఫిలస్ దేహములలో జరుగుతుంది. సాంక్రమిక మానవుడిని దోమకుట్టి రక్తము పీల్చునపుడు రక్తము వెంబడి సంయోగ బీజ మాతృకలు దోమలో ప్రవేశిస్తాయి.

దోమయందు అలైంగిక చక్రం

దోమ జీర్ణాశయమునందు ఆడ మగ సంయోగ బీజ మాతృకలు ఎదిగి సంయోగ బీజాలుగా, శుక్రకణాలు మరియు అండములు ఏర్పడతాయి. ఫలదీకరణము జరిగి సంయుక్త బీజము ఏర్పడును. సంయుక్త బీజము చలనశక్తిగల ఊకైన్స్ గా మారుతుంది. ఊకైన్స్ ఇప్పుడు జీర్ణాశయ కుడ్యములోనికి చొచ్చుకుపోయి వెలుపలివైపున స్థిరపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది కోశీభవనము చెందుతుంది. స్పోరోగోవి అలైంగిక పద్ధతిలో విభజన జరుగుతుంది. దీనిలో పెక్కు కొడవలి ఆకారపు చలత్విర్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. సంయుక్త బీజ కోశములు పగిలి చలత్విర్ధ బీజాలు దేహకుహరంలోకి పడతాయి. రక్త కుహరం (దేహకుహరం) నుండి ఇవి లాలాజల గ్రంథులను చేరుకుంటాయి. ప్లాస్మోడియం జీవిత చక్రమునందు చలత్విర్ధ బీజాలు సాంక్రమిక దశ. ఈ దోమ మానవుని కుట్టినపుడు ప్లాస్మోడియం రెండవ అతిథేయ మానవుని చేరుకుంటాయి. దోమయందు లైంగిక చక్రము 2-4 వారములందు సమాప్తమగును.

పాదిగేకాలం

దోమద్వారా పరాన్నజీవి మానవుడిని చేరిన సమయము నుండి కొంతకాలానికి మలేరియా వ్యాధి లక్షణాలు ఆరంభమగు వరకు మధ్యకాలాన్ని పాదిగేకాలం అంటారు. ప్రజాతుల బట్టి ఈకాలం మారుతుంది. ఇది 8-40 దినముల వరకు ఉంటుంది.

పట్టిక-1

ప్రజాతి పేరు	వ్యాధి	కాలేయం	రక్తము నందు	పాదిగే కాలం
ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్	బనైన్ బర్న్ యన్ వైవాక్స్ మలేరియా	8 దినములు	48 గంటలు	10-17 దినములు
ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపేరు	మాలిగ్నంట్ బర్న్ యన్, ఫాల్సిపేరు మలేరియా, సబ్-టర్న్ యన్ మలేరియా	5 దినములు	48 గంటలు	8-12 దినములు
ప్లాస్మోడియం మలేరియై	క్వార్టన్ మలేరియా	14-15	72 గంటలు	21-40 దినములు
ప్లాస్మోడియం ఓవేల్	ఓవేల్ మలేరియా	9 దినములు	48 గంటలు	10-17 గంటలు

పీఠిక

ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం బి.ఎస్సీ., విద్యార్థులకు రూపొందించిన రెండవ సంవత్సర పాఠ్యప్రణాళికలోని అకశేరుకాలు మరియు ప్రోటోకాల్స్ కు సంబంధించిన వివిధ అంశాల వివరణ ఈ పుస్తకం. బి.ఎస్సీ., మూడు సంవత్సరాల కోర్సులో, రెండవ సంవత్సరములో చదివే ఈ అంశాలు, పాఠ్య విషయానికి సంబంధించిన ప్రధాన భాగాలుగా ఉంటాయి. అధ్యయన పోలభ్యం కోసం పాఠ్య ప్రణాళికను ఖండికలుగా, ఖండికలు భాగాలుగా విభజింపబడ్డాయి. ప్రతి ఖండిక సాధారణంగా పాఠ్య విషయానికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక రంగాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. విద్యార్థి సులువుగా అర్థం చేసుకొనే విధంగా పాఠాలను విపులులు నిర్దిష్టంగా రూపొందించినారు. ప్రతి పాఠానికి ముందు ఆ పాఠం ఉద్దేశాల వివరణ ఉంటుంది. తరువాత పాఠం సారాంశం ఉంటుంది. విద్యార్థికి పాఠ్యాంశాలు ఎంతవరకు బోధపడినవో పరీక్షించడానికి, అభ్యాసాలు ప్రతిపాఠం చివరలో పొందుపరుచబడ్డాయి. ప్రతి ఖండిక చివర పరిచయంలోని సాంకేతిక పదాల వివరాలు 'పదకోశం' అను శీర్షిక క్రింద ఇవ్వబడింది.

ఈ పుస్తకంలో పున్న పాఠ్యాంశాలు మొత్తం 2 ఖండికలుగా విభజింపబడినది. ఆ ఖండికలు మళ్ళీ 32 భాగాలుగా విభజింపబడ్డాయి. మొదటి 25 భాగాలు (ఖండిక-1) అకశేరుకాల గురించి తెలుపుతాయి. 2వ ఖండికలోని 7 భాగాలు ప్రోటోకాల్స్ గురించి వివరించుతాయి.

మొదటి భాగము జంతుసామ్రాజ్యము గురించిన పరిచయము మరియు వర్గీకరణ, 2వ భాగములో ప్రోటోజోవా సామాన్యలక్షణాలు, వర్గీకరణ గురించి తెలుపబడినది. స్వేచ్ఛాయుత మరియు పరాన్నజీవుల జీవిత చరిత్రలు, ప్రోటోజోవా వ్యాధులు గురించి 3, 4 భాగములలో తెలియచేయబడినది. 5వ భాగములో పోరిఫెరా సామాన్యలక్షణాలు, వర్గీకరణ వివరించబడినది.

6, 7 భాగములు నిడేరియా సామాన్యలక్షణాలు మరియు వర్గీకరణ. ఇక 8వ భాగము నుండి 18వ భాగము వరకు వర్గాల ప్లాటీహెల్మింథీస్, అస్కిహెల్మింథీస్, విమాటోలులు, అనిలీడులు, మలస్కలు మరియు అర్థ్రోపాటులు యొక్క సామాన్యలక్షణాలు మరియు వర్గీకరణ గురించి తెలియచేయబడినది. పెరిపాటన్ యొక్క సామాన్యలక్షణాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు 19వ భాగముతో, 20, 21వ భాగములో ఉపయోగ మరియు పోషకర కీటకముల గురించి తెలుపటము జరిగినది. ఆస్టేరియస్ అభివృద్ధి మరియు ఇన్సెక్టార్మ్ డింభకముల ప్రాముఖ్యతను గురించి 22 నుంచి 24వ భాగములలో చర్చించబడినది.

2వ ఖండికలో 26 నుంచి 32 వరకు గల భాగములలో సీలోమ్ (శరీర కుహరము), పొష్టనము, రిర: ప్రాధాన్యము, సమఖండ విన్యాస భావనల గురించి, కార్డేటా, ప్రోటోకార్డేటా సామాన్యలక్షణాలు, బెలనోగ్లాసన్, హెర్మిమేనియా, ఆంఫియాక్స్ గురించి వాటి సంబంధ బాంధవ్యాలు గురించి వివరించబడినది.

సైకాన్, బబీలియా, నీరిస్, పైలా, పేలిమాన్ మరియు అస్టేరియాన్ గురించి ఆయా సంబంధిత భాగములలో చెప్పబడ్డాయి. జంతుశాస్త్రములోని ముఖ్యంగా అకశేరుకాలు, ప్రోటోకార్డేట్యు, గురించి మౌళిక అంశాలు మరియు అకశేరుకాలలో జీవపరిణామ మార్గముల గురించి, విద్యార్థులు తెలుసుకోవడానికి పాఠాలు తోడ్పడగలవని ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయము ఆశిస్తోంది.

ప్రపంచములోని భూమి మట్టి, మంచినీరు, పముద్రము మరియు ఆకాశము మొదలగు ప్రాంతాలను తమ వివాప స్థానముగా ఏర్పరుచుకొన్నవి.

జంతువుల గురించి అభ్యసించు శాస్త్రమును జంతుశాస్త్రము అంటారు (గ్రీ. జాన్ = జంతువు. లోగాన్ = చర్చించు లేక అభ్యసించు). జంతుశాస్త్ర విజ్ఞానము, జంతువుల ఉనికి, జీవనచర్య, పెరుగుదల, జీవిత చరిత్ర, సంఘాలు, వైవిధ్యాలు, పరిణామము దాని కారకాలు మరియు పాతావరణమును వివరించును.

జంతుశాస్త్ర విషయ సామగ్రి, వివిధ రకాల వైవిధ్యము కలిగి యున్నట్టి జంతు ప్రపంచము. జంతువులన్నిటిని సమగ్రముగా జీవన వ్యాపారము సాగించే జీవులుగా అర్థం చేసుకొనుటయే ఈ శాస్త్ర ప్రథమ లక్ష్యము.

1.3 జంతుశాస్త్ర చారిత్రక పరిచయము

చరిత్రకు పూర్వము నుండి మానవుడు జంతువులయందు శ్రద్ధ చూపుచున్నాడు. ఆహారము, దుస్తులు, చివరకు ఆత్మ రక్షణకు వీనిని చంపేవాడు. పురాతన కాలపు గ్రీకు, ఈజిప్టు, బాబిలాన్ నాగరికతలందు జంతువుల గురించిన పరిజ్ఞానము కనబడును. జంతుశాస్త్రము నందు గ్రీకులను మొదట పేర్కొనవచ్చును. అనాక్సిమాండర్ (క్రీ.పూ. 611 547) జెనోఫాన్ (క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్దము ఎం పెడోకల్స్ (క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దము) మిపోకెటిస్ (క్రీ.పూ. 460 370) అనువారు ఈ శాస్త్రమును గురించి చాలా కృషి పల్చినారు. కాని గొప్ప గ్రీకు శాస్త్రవేత్త అరిస్టాటిల్ (క్రీ.పూ. 384 322) 'జంతుశాస్త్ర సీత' యనబడుతాడు. ఇతను వృక్షములు, జంతువుల ప్రత్యుత్పత్తి, కోడి పెరుగుదల మున్నగువాని గురించి తొమ్మిది సంపుటములు గల "హిస్టోరియా అనిమేలియం" అను గ్రంథ రాజాన్ని వ్రాసినాడు.

తరువాత కాలములో రోమనులు జంతు శాస్త్రజ్ఞుల కూటమిలో చేరినారు. వీరు ఈ విచిత్రమైనట్టి విషయానికి సంబంధించిన వివిధ భాగాల గురించి ప్రత్యేకమైన కృషి పల్చినారు. గ్రీకు, రోమనులు కృషి ప్రాముఖ్యత నేటికీ ఈ శాస్త్రమునందు వాడే పారిభాషిక పదాలలో కానవచ్చును. ఈ పదాల పుట్టుక గ్రీకు, లాటిను భాషలకు సంబంధించి ఉన్నది.

పునరుజ్జీవనము (Renaissance) తరువాత విజ్ఞాన శాస్త్ర అవతరణతోపాటు పలువురు మేధావులను జంతుశాస్త్రము ఆకర్షించినది. విలియం హార్వే, రాబర్ట్ వచిక్, లీవెన్ హుక్, లీనియస్, పైడన్, ప్లెస్, బెర్నార్డ్, డార్విన్, వ్యాలన్, పాశ్చర్, మెండల్, క్రాగ్ మరియు హైమన్ సంటి గొప్ప వ్యక్తులు తమ పరిశోధనలు, సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు మరి వివిధ రకాల క్రొత్త విషయాల చేత జంతుశాస్త్ర చరిత్రపై మాయని గుర్తులను వేసినారు.

జంతుశాస్త్ర వివిధ దృక్పథాలను వివిధ ఉప విభాగములుగా అధ్యయనము చేయవచ్చును. ఈ శాస్త్ర ముఖ్య శాఖలను క్రింద వివరించడమైనది.

1. స్వరూప శాస్త్రము (Morphology) (గ్రీ. మార్ఫా = ఉనికి, లోగన్ = అధ్యయనము) బాహ్య నిర్మాణమును చర్చించుట.

2. శరీర నిర్మాణ శాస్త్రము (Anatomy) (గ్రీ. అనా = పై; టామన్ = కోత). శరీర విచ్ఛేదనము ద్వారా అంతర్ నిర్మాణ అధ్యయనము చేయుట.
3. కణ సముదాయ శాస్త్రము (Histology) (గ్రీ. హిస్టాన్ = కణ సముదాయము లేక జాలకము) కణ సముదాయ సూక్ష్మ నిర్మాణమును అధ్యయనము చేయుట.
4. కణ శాస్త్రము (Cytology) (గ్రీ. కైటన్ = బోలు) కణము యొక్క నిర్మాణ విధులను చర్చించునది.
5. శరీర ధర్మ శాస్త్రము (Physiology) (గ్రీ. ఫైసిస్ = ధర్మము) వివిధ భాగముల మరియు వ్యవస్థల అధ్యయనము.
6. వర్గీకరణ శాస్త్రము (Taxonomy) (గ్రీ. టాక్సిన్ = వరుసగా ఉంచుట; నోమ్స్ = సిద్ధాంతము) జంతు వర్గీకరణను వివరించునది.
7. జీవావరణ శాస్త్రము (Ecology) (గ్రీ. ఓయకాన్ = గృహము) జంతువులకు మరియు వాని వాతావరణమునకు మధ్యగల సంబంధమును చర్చించునది.
8. పిండ్-త్పత్తి శాస్త్రము (Embryology) (గ్రీ. ఎన్ = లోపల; బియో = ఉబ్బుట) గ్రుడ్డులోపలి వ్యక్తిగత పెరుగుదలను చర్చించునది.
9. జంతు భూగోళము (Zoogeography) (గ్రీ. జా = జంతువు; జీ = భూమి; గ్రాఫెయిన్ = వ్రాయుట) జంతువుల విస్తరణను చర్చించు శాస్త్రము.
10. వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రము (Pathology) (గ్రీ. పాథోస్ = బాధ) వ్యాధి స్వరూప లక్షణములు, కారణములను చర్చించునది.
11. పరిణామము (Evolution) (లా. ఇ = బయట పరచుట; వాల్వ్ = చుట్ట) ఇది జంతు జీవన పుట్టుక మరియు విభేదనమును చర్చించును.
12. పురాజీవ శాస్త్రము (Palaeontology) (గ్రీ. పాలియోస్ = పురాతన; ఆంట్ = జీవి) జంతు అవశేషములు మరియు శిలాజముల ద్వారా పురాణ కాలపు జీవనాన్ని అధ్యయనము చేయుట.
13. జన్యశాస్త్రము (Genetics) (గ్రీ. జెనెసిస్ = పుట్టుక) పితృ లక్షణములు వారి సంతతికి అందచేయుటను తెలుపు శాస్త్రము.
14. పరాన్న జీవశాస్త్రము (Parasitology) (గ్రీ. పారా = ప్రక్కన; సిటోస్ = ఆహారము) పరాన్న జీవుల అధ్యయనము.
15. ఆస్టియాలజీ (Osteology) ఎముకలను గురించి చర్చించు శాస్త్రము.
16. ఎండ్రోక్రైనాలజీ (గ్రీ. ఎండ్రాన్ = లోపల; క్రియైన్ = వేరు చేయుట) వినాశ గ్రంథులు మరియు వాని ప్రావములైన హార్మోనుల అధ్యయనము.

పైన పేర్కొన్న జంతు శాస్త్ర విభాగములలోపాటు కొన్ని ప్రత్యేక విభాగములు కలవు. వానిని క్రింద పేర్కొనడమైనది.

1. ప్రోటో జీవాలజీ (Protozoology) (గ్రీ. ప్రోటోస్ = మొదట; జోవన్ = జంతువు) ప్రోటోజోవాకు చెందిన ఏకకణ జీవుల అధ్యయనము.
2. హెల్మింథాలజీ (Helminthology) (గ్రీ. హెల్మింథ్స్ = పురుగులు) పరాన్న జీవులైన పురుగుల అధ్యయనము.
3. ఫైటోనిమటాలజీ (Phytonematology) (గ్రీ. ఫైటాన్ = మొక్క; నీమా = దారము) మొక్కలందు నివసించే విమాటోడ్లను చర్చించునది.

4. ఎంటోమాలజీ (Entomology) (గ్రీ. ఎంటోమాన్ = కీటకములు) కీటకముల అధ్యయనము.
5. ఇక్టియోలాజీ (Ichthyology) (గ్రీ. ఇక్టిస్ = చేప) చేపల గురించి తెలుపు శాస్త్రము.
6. హెర్పెటోలాజీ (Herpetology) (గ్రీ. హెర్పాయిన్ = ప్రాకుట) సరీసృపములు మరియు ఉభయచరముల అధ్యయనము.
7. ఆర్నిథోలాజీ (Ornithology) (గ్రీ. అర్నిస్ = పక్షి) పక్షులను వర్ణించు శాస్త్రము
8. మమ్మాలోజీ (Mammalogy) (గ్రీ. మమ్మా = స్తనము) క్షీరదముల అధ్యయనము
9. అపికల్చర్ (Apiculture) తేనెటీగల పెంపుదల
10. సిరికల్చర్ (Sericulture) పట్టు పురుగులను పెంచుట
11. పిసీ కల్చర్ (Pisciculture) చేపలను పెంచుట
12. పౌల్ట్రీ (Poultry) కోళ్లను పెంచుట

1.4 జంతు శాస్త్రము ఎందుకు అభ్యసించవలెను?

జంతు శాస్త్రము జంతువుల జీవనము గురించి తెలియచేయును. ఇది అభిలాషకరమై ఎప్పుడూ పెరుగుచున్నట్టి క్షేత్రము. ఎంతోమంది పరిశోధకుల కృషి ఫలితముగా ఇందులో త్వరిత పురోభివృద్ధి కానవచ్చును. జంతువుల గురించిన విజ్ఞానము విద్యార్థులకు వారి నిత్య జీవిత అనుభవాల వలన ఎంతో లభిస్తూ ఉంటుంది. జంతు శాస్త్రములోని ప్రవేశిక పాఠములందు జంతు సామ్రాజ్య సంబంధ వ్యాఖ్యానము, జంతువుల రకాలు, జంతు నిర్మాణము, శరీర ధార్మిక ప్రక్రియలు, జంతువుల విచిత్రాత్మక మరియు కఠోరమైన ప్రవర్తనలు తెలుసుకొనుటకు వీలగును. జంతువుల పెరుగుదల, ప్రత్యుత్పత్తి, వారసత్వ సూత్రాలు, నేడు మరియు పురాణ కాలమునందు, భూమిపై జంతు విస్తరణ మరియు జంతు పరిణామము మొదలగు విషయములు తెలియుట వలన, విజ్ఞానము రోజు రోజుకూ పెరుగుచూ విశాలమగుచున్నది.

1.5 అధ్యయన పద్ధతులు

- జంతు శాస్త్రమును పలు విధములుగా అభ్యసించవచ్చును. జంతువులను సజీవముగా వాని ప్రకృతి సీద్ధమైన వాతావరణములో అధ్యయనము చేయవచ్చును. కొన్ని రకాల అధ్యయనము వానిని పట్టి పెంచుచు ప్రదర్శిని లోపల ఉంచి చేయవచ్చును. కొన్ని సందర్భాలలో వాటిని చంపి ద్రవాలలో భద్రపరచిగాని లేక దేహములోపలి భాగము తీసివేసి వాటి స్థానములో ప్రత్తి లేక గడ్డి వంటి పదార్థము నింపి మ్యూజియములో నుంచి అభ్యసించవచ్చును. జంతువులను ఫార్మల్లిన్ హైడ్ మరియు సారా వంటి ద్రవాలలో భద్రపరుస్తారు. (చేపలు, సరీసృపాలు, ఉభయచరాలు మొదలగునవి మరియు అకశేరుకాలు) గాఢ ఫలకాలపై ఉంచి (సూక్ష్మ జంతువులు) లేదా ఎండబెట్టి (కీటకాలు) దూదితో నింపి (పక్షులు, క్షీరదాలు మరియు మొలస్కులు మొదలగునవి) భద్రపరుచవచ్చును. ఇట్లు భద్రపరచిన జంతువుల సహాయముతో జంతువులను గుర్తించుటకు, వర్గీకరించుటకు, అంతర్భాగ నిర్మాణమును తెలుసుకొనుటకు లేదా ఇతర సంబంధ కార్యములకు అక్కరకు వచ్చును. ప్రకృతి పరిశోధనయే పనిగా ఉన్నవారు జంతువుల సేకరించి, భద్రపరిచి తమ పరిశోధన ఫలితాలను ప్రచురించెదరు. ఇది జంతుశాస్త్ర పురోభివృద్ధికి ఎంతో సహాయపడును.

1.6 అధ్యయన ఉద్దేశము

జంతుశాస్త్ర అధ్యయన ఉద్దేశాలు పెక్కు కలవు. అందులో కొన్ని దిగువ పేర్కొనబడినవి.

1. జంతువుల గురించిన విజ్ఞానము. జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక సూత్రాలను అభ్యసించనిదే సర్వతోముఖ విద్య అసంపూర్ణముగా ఉండును.
2. కొందరు జంతు విజ్ఞానం వలన తృప్తి అనుభవించుదురు. కొందరికి ఇది యొక అలవాటు. కొందరు పక్షుల విక్షణయందు, కర్పరాల సమకూర్పులలో, మరికొందరు చేపల పెంపకములో శ్రద్ధ చూపుదురు.
3. దీనిని జీవనోపాధిగా డబ్బు సంపాదనయందు ఉపయోగించవచ్చును.
4. మానవునకు నిత్య జీవితంలో సంబంధగల జంతువుల గురించిన విజ్ఞానము ఈ రోజులలో చాల అవసరము. ఈ విజ్ఞానము మానవుని స్వంత జీవనాన్ని అవగాహన చేసుకొనుటకొక విడదీయరాని భాగము.
5. ఆధునిక సామాజిక సాంస్కృతిక విద్యలో ఇది ఒక ముఖ్యభాగముగా పరిణమించినది.
6. వైద్యరీత్యా ఎంతో ఉపయోగకారి. ఇది వైద్యులకు బయో మెడికల్ మరియు పారా మెడికల్ క్షేత్రములందు పనిచేయు వారలకు లాభదాయక. సామాజిక విలువ కలిగియున్నది. వ్యవసాయ దారులకు, మత్స్యశాఖ వారికి, ప్రజారోగ్య శాఖవారికి, ఆహార పరిశోధనకు, జీవరసాయనిక శాస్త్రజ్ఞులకు ఈ విజ్ఞానము సమముగా లాభకారియై యున్నది.

1.7 జంతు సంఖ్యలు

నేడు 12,50,000 పైగా జంతువుల జాతులు తెలిసియున్నవి. ఇంకా ఎన్నియో గుర్తించవలసి యున్నది. వీటి సంఖ్య నిర్ధారణ పూర్ణమైనది కాదు. సుమారు అని మాత్రము చెప్పవచ్చును. మొత్తము మీద సకశేరుకాలు (వెన్నెముక కలిగి ఉన్న జీవులు) ఐదు శాతము మాత్రమే. మిగతావన్నీ అకశేరుకాలు. అకశేరుకాలలో అర్థోపొదాకు చెందిన జీవులు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ. వీని తరువాతది మొలస్కుల సంఖ్య.

1.8 జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణలోని కొన్ని ముఖ్య అంశాలు

జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణ కొన్ని సూత్రాలపై ఆధారపడి యున్నది. ఇది కొన్ని నిబంధనల ననుసరించి చేయబడింది. 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము కొందరు జంతువులను వాని పోలికలను ఆధారము చేసుకుని వర్గీకరించినారు. లాక్సానమీ అభివృద్ధి చెందిన కొలదీ వివిధ జంతుశాస్త్ర శాఖలు పురోగమించి జంతు వర్గీకరణ వాటి రూప లక్షణాలు, పిండ శాస్త్రము, జీవిత చరిత్రలు, ప్రవర్తన, శారీరక ధర్మాలను అనుకరించి జరుగుతూ వచ్చినది. జన్యుశాస్త్రము, అణుజీవ శాస్త్రము, జీవ రసాయన శాస్త్రము, రక్త పరీక్ష విజ్ఞానము మరియు ఇతర సంబంధ విజ్ఞానము పెరిగిన కొలదీ, ఇవి అన్నీ వర్గీకరణకు ముఖ్య అంశాలుగా పరిణమించినవి.

టాక్సానమి యందు వర్గీకరణము మరియు నామకరణము అను రెండు భాగాలు కలవు.

1.8.1 వర్గీకరణము

వివిధ జంతువులకు మధ్యగల బాంధవ్యాలను ఆధారంగా గైకొని క్రమబద్ధముగా వర్గాలు లేక జతలుగా అమర్చుట.

నామకరణము: వర్గీకరణ యందు వివిధ వర్గాల నిర్దిష్టమైన పేర్లను వర్తింపజేయుట.

వర్గీకరణము, నామకరణము రెండింటినీ కలిపి ఒక విశాల విభాగము, సిస్టెమాటిక్స్ (క్రమబద్ధ అమరిక) అని పేర్కొన్నారు. ఇందులో జంతువుల రకాలను, వైవిధ్యాలను, వాని బాంధవ్యాలను తెలుపు వైజ్ఞానిక అధ్యయనముని నిర్వచించవచ్చు. (గ్రీ. సిస్టెమా = వ్యవస్థలకు అన్వయించినట్టి).

1.8.2 వర్గీకరణ హైరార్శీ


జంతువులందరి అన్ని పెద్ద కూటములను చిన్న ఉప కూటములుగా విభజించవచ్చును. ఒక వ్యక్తిగత జంతువు స్థానాన్ని గుర్తించుటకు దీనిని వివిధ శ్రేణులకు చెందిన రకాలుగా, తెగలుగా అమర్చడమైనది.

కరోలియస్ లినియస్ (1707-1778) ప్రప్రథమ గొప్ప వర్గీకరణ శాస్త్రజ్ఞుడు. ఇతడు వర్గీకరణలో ఐదు విభాగాలను మాత్రమే గుర్తించినాడు. వీనిని వర్గము, క్రమము, జాతి, ప్రజాతి మరియు రకము అంటారు. కాలక్రమేణా ఇది మార్పు చెంది క్రింద వివరించిన భాగాలు వాడుకలోకి వచ్చినవి. అవి, రాజ్యము, వర్గము, తరగతి, క్రమము, వంశము, జాతి, ప్రజాతి. ఇవికాక మధ్యాంతర కూటములను ఇమిడ్చి వివిధ వర్గాల మధ్యగల దగ్గరి సంబంధాలను నిర్ధారణ కావించబడినవి. ఈనాడు వర్గీకరణ పట్టిక యందు 21 అంచెలు చేరియున్నవి.


అన్ని జంతువులు తమ సాధారణ నామముతోపాటు శాస్త్రీయ నామము కలిగి ఉన్నాయి. శాస్త్రీయ నామకరణమునకు ప్రపంచమంతట ఉపయోగించే ఒక పద్ధతిని వర్గీకరణ శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్నారు. ప్రతి

టాక్సా	మానవుడు	కుక్క	కప్ప	బొద్దింక
సామ్రాజ్యం	జంతు	జంతు	జంతు	జంతు
ఉపసామ్రాజ్యం	మెటాజోవా	మెటాజోవా	మెటాజోవా	మెటాజోవా
వర్గము	కార్డేటా	కార్డేటా	కార్డేటా	ఆర్థ్రోపాడ
విభాగము	మామేలియా	మామేలియా	ఆంఫిబియా	ఇన్సెక్టా
ఉపవిభాగము	ఫీరియా	ఫీరియా		టెర్రెగోటా
క్రమము	ప్రెమేట్స్	కార్నిపారా	అన్యూరా	డిప్టియోప్టెరా
కుటుంబము	హోమినైడి	కానైడి	రానైడి	బ్లాటైడి
ప్రజాతి	హోమో	కానిస్	రావా	పెరిప్లావెటా
జాతి	సాపియన్స్	ఫెమిలియారిస్	టిగ్రివా	అపెరికానా

మానోసిస్టిన్ జీవిత చక్రము



మానోసిస్టిన్లో తరముల ఏకాంతరత



3.5. వర్తిసెల్లా

వర్ణము	: ప్రోటోజోవా
ఉపవర్ణము	: సీరియోఫోరా
తరగతి	: సీరియేట
ఉపతరగతి	: పెరిట్రైక (గంట ఆకారపు దేహము)
క్రమము	: పెరిట్రైకిడా
ఉపక్రమము	: సెస్టెలినా
పంశము	: వర్తిసెలిడి
జాతి	: వర్తిసెల్లా

వర్తిసెల్లా ప్రథమముగా 1677 వ సంవత్సరములో వర్ణించబడింది.

3.5.1 నివాసము


సుంచిసీటిలో నివసించే సీరియేట్. ఇది కుంటలలో, సరస్సులలో, నదులు మరియు సెలయేర్లలో లభించును.

3.5.2. అలవాట్లు

ఇది స్వతంత్రముగా జీవించు కాదహితజీవి లేదా ఒంటరిగా అతుక్కొని వుండు జీవి. పెక్కు జీవులు పెద్ద సమూహాలలో వీటి మొక్కలను, జంతువులను, రాళ్లను అంటుకొని లేదా కట్టబడి ఉంటాయి.

3.5.3. నిర్మాణము

ఆకారము మరియు పరిమాణము: వర్తిసెల్లా సామాన్యముగా గంటాకారము గల సూక్ష్మజీవి (పటం 3.5). ఇది చూచుటకు బోర్ల ఉంచిన గంటను పోలి ఉండును. గంట ఆధారమునుండి పాదపుగా ఉండు



పటం 3.5. వర్తిసెల్లా. 1. పరిముఖ గాడి 2. కాలర్ 3. సంకోచరిక్తిక 4. బాహ్యజీవ ద్రవ్యము 5. అంతరజీవద్రవ్యము 6. ఆలిందము 7. రక్తక త్వచము 8. తరంగాకార ప్రరము 9. సూక్ష్మ కేంద్రకము 10. స్థూల కేంద్రకము 11. కండర తంతువు 12. అపార రిక్తిక 13. కాద.

విషయసూచిక

ఖండిక-1	అకశేరుకాలు	1
భాగం-1	: జంతు సామ్రాజ్యము గురించి ఉపోద్ఘాతము	3
భాగం-2	: ప్రోటోజోవా-సామాన్యలక్షణాలు మరియు వర్గీకరణ.	15
భాగం-3	: ఏబీడియం, మానోస్టిస్ మరియు వర్టిపెల్లా.	22
భాగం-4	: ప్రోటోజోవా వ్యాధులు	40
భాగం-5	: పోరిఫెరా-సామాన్యలక్షణాలు-వర్గీకరణము, మరియు పైకాన్ ఒక నమూనా జీవిగా చదువుట.	58
భాగం-6	: నిడేరియా-సామాన్యలక్షణాలు, వర్గీకరణ	76
భాగం-7	: బబీలియా	82
భాగం-8	: ప్లాటీహెల్మింథిన్-సామాన్య లక్షణాలు, వర్గీకరణ.	92
భాగం-9	: ముఖ్యమైన ట్రిమటోడ్ మరియు పెప్టోడ్ పరాన్నజీవులు	99
భాగం-10	: ఆస్కెహెల్మింథిన్ సామాన్య లక్షణములు, వర్గీకరణ.	112
భాగం-11	: ముఖ్యమైన నిమటోడా పరాన్నజీవులు.	119
భాగం-12	: అనెలిడా-సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ.	130
భాగం-13	: నీరిస్.	139
భాగం-14	: మలస్కా-సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ.	155
భాగం-15	: పైరా గ్లోబోసా.	165
భాగం-16	: మలస్కా జీవుల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యం	181
భాగం-17	: ఆర్థోలిపాడా-సామాన్య లక్షణాలు, వర్గీకరణ.	192
భాగం-18	: పేలిమాన్ (మంచినిటి రొయ్య)	207
భాగం-19	: ఒకైవోపార-సాధారణ లక్షణాలు సంబంధ బాంధవ్యాలు.	227
భాగం-20	: ఉపకారులైన కీటకాలు.	236
భాగం-21	: హానికరమైన కీటకాలు.	246
భాగం-22	: ఇకైవోడర్మెట-లక్షణాలు, వర్గీకరణ.	257
భాగం-23	: ఆప్టిరియస్.	265
భాగం-24	: ఇకైవోడర్మ్ డింభక దశ.	278
భాగం-25	: అకశేరుకాలలో జీవ పరిణామ మార్గము.	288
ఖండిక-2	ప్రోటోకార్డేటులు.	297
భాగం-26	: ప్రోటోకార్డేట్లు.	299
భాగం-27	: బెలనోగ్లాసెస్.	307
భాగం-28	: ఉపవర్గము-యూరోకార్డేటా సామాన్యలక్షణాలు, వర్గీకరణ.	318
భాగం-29	: హెర్డ్ మేనియా.	326
భాగం-30	: హెర్డ్ మేనియా అభివృద్ధి, యూరోకార్డేట్ల సంబంధ బాంధవ్యాలు.	344
భాగం-31	: ఉపవర్గము-సెఫలోకార్డేటా-ఆంఫియాక్స్.	354
భాగం-32	: ఆంఫియాక్స్ సంబంధ బాంధవ్యాలు.	372

BRAOU

ఖండిక — I
అకశేరుకాలు

BRAOU

భాగము—1 జంతు సామ్రాజ్యము గురించి ఉపోద్ఘాతము

విషయక్రమము

1. 1 ఉద్దేశ్యము
1. 2 ఉపోద్ఘాతము
1. 3 జంతుశాస్త్ర చారిత్రక పరిచయము
1. 4 జంతు శాస్త్రము ఎందుకు అభ్యసించవలెను?
1. 5 అధ్యయన పద్ధతులు
1. 6 అధ్యయన ఉద్దేశ్యము
1. 7 జంతు సంఖ్యలు
1. 8 జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణలోని కొన్ని ముఖ్య అంశాలు
 - 1.8.1 వర్గీకరణ హైదార్కీ
 - 1.8.2 ద్వినామ పద్ధతి
1. 9 జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణ ఆకారము
- 1.10 స్వపరిశీలనం
- 1.11 సారాంశం
- 1.12 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 1.13 నమూనా ప్రశ్నలు
- 1.14 పదకోశము

1.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠమునందు జంతుశాస్త్ర ఉపోద్ఘాతము, ప్రాముఖ్యత, సంక్షిప్త చరిత్ర మరియు దాని వివిధ శాఖలను చర్చించడమైనది. జంతుశాస్త్ర వర్గీకరణ, సిస్టమేటిక్స్ సూత్రాలను మరియు జంతు సామ్రాజ్య వర్గీకరణ రూపాన్ని చిత్రించడమైనది.

1.2 ఉపోద్ఘాతము

కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలకు పూర్వము జంతు జీవితము భూమిపై మొదలైనది. అప్పటి నుండి అవిచ్ఛిన్నముగా జీవపరిణామము జరుగుచూ క్రమముగా మార్పులు జరుగుచు వచ్చినవి. అదిలో సరళముగాను, అవ్యవస్థముగా, అక్రమబద్ధముగానున్న ఏకకణ జీవులు క్లిష్టమై వ్యవస్థీకరింపబడి, క్రమబద్ధమైన బహుకణ జీవులుగా ఏర్పడినవి. లక్షల సంవత్సరాల పాడుగున జరిగినట్టి సుదీర్ఘ ప్రయాణమునందు అసంఖ్యాక జంతువులు ఉద్భవించి, నశించి పెరిగి పరిణామము చెంది, క్రొత్తగ వృద్ధిచెందిన జంతువులుగా మారినవి. ఇవి ఎప్పుడూ మారుచుండూ వాతావరణమును ఎదిరించుటకు అనుగుణ్యమైనవి. ఇట్టి పలురకాల జంతువులు

ప్రపంచములోని భూమి మట్టి, మంచినీరు, సముద్రము మరియు ఆకాశము మొదలగు ప్రాంతాలను తమ వివాస స్థానముగా ఏర్పరుచుకొన్నవి.

జంతువుల గురించి అభ్యసించు శాస్త్రమును జంతుశాస్త్రము అంటారు (గ్రీ. జూన్ = జంతువు. లోగాన్ = చర్చించు లేక అభ్యసించు). జంతుశాస్త్ర విజ్ఞానము, జంతువుల ఉనికి, జీవనచర్య, పెరుగుదల, జీవిత చరిత్ర, సంఘాలు, వైవిధ్యాలు, పరిణామము దాని కారకాలు మరియు వాతావరణమును వివరించును.

జంతుశాస్త్ర విషయ సామగ్రి, వివిధ రకాల వైవిధ్యము కలిగి యున్నట్టి జంతు ప్రపంచము. జంతువులన్నిటిని పసుగ్రముగా జీవన వ్యాపారము సాగించే జీవులుగా అర్థం చేసుకొనుటయే ఈ శాస్త్ర ప్రథమ లక్ష్యము.

1.3 జంతుశాస్త్ర చారిత్రక పరిచయము

చరిత్రకు పూర్వము మండి మానవుడు జంతువులయందు శ్రద్ధ చూపుచున్నాడు. అహోరము, దుస్తులు, చివరకు ఆత్మ రక్షణకు వీనిని చంపేవాడు. పురాతన కాలపు గ్రీకు, ఈజిప్టు, బాబిలోన్ నాగరికతలందు జంతువుల గురించిన పరిజ్ఞానము కనబడును. జంతుశాస్త్రము నందు గ్రీకులను మొదట పేర్కొనవచ్చును. అనాక్సిమాండర్ (క్రీ.పూ. 611 547) టెనోఫిసెస్ (క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్దము ఎం పెడోకల్స్ (క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దము) మిపోకెటిస్ (క్రీ.పూ. 460 370) అనువారు ఈ శాస్త్రమును గురించి చాలా కృషి సల్పినారు. కాని గొప్ప గ్రీకు శాస్త్రవేత్త అరిస్టాటిల్ (క్రీ.పూ. 384 322) 'జంతుశాస్త్ర పిత' యనబడుతాడు. ఇతను పక్షములు, జంతువుల ప్రత్యుత్పత్తి, కోడి పెరుగుదల మున్నగునవి గురించి తొమ్మిది సంపుటములు గల "హిస్టోరియా అనిమేలియం" అను గ్రంథ రాజాన్ని వ్రాసినాడు.

తరువాత కాలములో రోమనులు జంతు శాస్త్రజ్ఞుల కూటమిలో చేరినారు. వీరు ఈ విచిత్రమైనట్టి విషయానికి సంబంధించిన వివిధ భాగాల గురించి ప్రత్యేకమైన కృషి సల్పినారు. గ్రీకు, రోమనులు కృషి ప్రాముఖ్యత వేటికి ఈ శాస్త్రమునందు వాడే పారిభాషిక పదాలలో కానవచ్చును. ఈ పదాల పుట్టుక గ్రీకు, లాటిను భాషలకు సంబంధించి ఉన్నది.

పునరుజ్జీవనము (Renaissance) తరువాత విజ్ఞాన శాస్త్ర అవతరణతోపాటు పలువురు మేధావులను జంతుశాస్త్రము ఆకర్షించినది. విలియం హార్వే, రాబర్ట్ వచిక్, లీనెన్ హుక్, లీనియస్, మైడన్, ప్లెన్, బెర్నార్డ్, డార్విన్, వ్యాలన్, పాశ్చర్, మెండల్, క్రాగ్ మరియు హైమన్ వంటి గొప్ప వ్యక్తులు తమ పరిశోధనలు, సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు మరి వివిధ రకాల క్రొత్త విషయాల చేత జంతుశాస్త్ర చరిత్రపై మాయవి గుర్తులను వేసినారు.

జంతుశాస్త్ర వివిధ దృక్పథాలను వివిధ ఉప విభాగములుగా అధ్యయనము చేయవచ్చును.

ఈ శాస్త్ర ముఖ్య శాఖలను క్రింద వివరించడమైనది.

1. స్వరూప శాస్త్రము (Morphology) (గ్రీ. మార్ఫా = ఉనికి, లోగన్ = అధ్యయనము) బాహ్య నిర్మాణమును చర్చించుట.

4.5.3 మలేరియా లక్షణములు

మలేరియా జ్వరము రావడానికి ఒకటి రెండు రోజుల పూర్వము ఈ క్రింది లక్షణములు రోగిలో కనబడుతాయి.

- ఎ) అలసిపోవుట మరియు పడే పడే ఆవలించలు రావడం
- బి) పైత్యము, తలనొప్పి మరియు కండరాల నొప్పి
- సి) మలబద్ధకము

4.5.4 నివారణ చర్యలు

మలేరియాను అదుపులో పెట్టుటకు కొన్ని చర్యలను అవలంబించ వలయును. మొదటి చర్యయందు వీని వాహకాలైనట్టి దోమలను లేకుండా చేయవలయును. దేహ పరిశుభ్రత, ఆరోగ్య రక్షణను మెరుగుపరచ వలెను. ఈ చర్యలను ఈ క్రింది విధముగా విభజింపవచ్చును.

దోమల నివారణ

1. ఢింబక నాశక చర్యలు

ఇండ్ల చుట్టూ ప్రాంతము శుభ్రము చేయుట మరియు పెరుగుదల స్థలాలను శుభ్రము చేయుట. దోమల ఢింభకాలను నాశనము గావించి కొత్త తరాలు ఎదగకుండా చేయవలెను. దోమ ఢింభకాలను పారద్రోలుటకు ఈక్రింది చర్యలను గైకొనవలెను.

1. ఇండ్ల చుట్టూ ప్రాంతాలను శుభ్రపరిచి అదుపులో ఉంచుట
2. రసాయనిక అదుపు
3. జీవశాస్త్ర సంబంధ అదుపు

చుట్టు ప్రాంత అదుపు పద్ధతియందు దోమలు పెరుగు స్థలాలను నాశనము గావించుట చేరిఉన్నది. దీనిని మూలాధార అణత అనవచ్చును.

రసాయన చర్య అనగా పెట్రోలియం, కిరోసిన్, క్రూడ్ ఆయిల్ మొదలగునవి నీటిపై వెదజల్లి దోమల ఢింభకాలను మరియు ఇతర పెరుగుదల దశలను నాశనము చేయుట. డి.డి.టి., డి.డి.డి., బి.హెచ్.సి. మొదలగు స్ప్రేలు నీటిని విషపూరితం చేస్తాయి. జీవశాస్త్ర సంబంధ పద్ధతితో కొన్ని ఢింభక నాశన చేపలు చేరియున్నవి. చేపలయందు మిన్నోన్, ట్రాట్, గప్పీన్, గాంబునియా చేరియున్నవి. కొన్ని క్రిమి భక్ష వృక్షములు ఉ.బ్లాడర్ వర్మ్, క్రిముల ఢింభకాలను నాశనము చేయును. పాండిచ్చేరిలో ఉన్న Vector Control Research Centre పరిశోధన కేంద్రమందు నీటినల్లల ఒకప్రజాతిని కనుగొన్నారు. ఇది దోమగుడ్లను, ఢింభకాలను భక్షించి వీనిని నాశనము చేయును.

వైద్య జీవుల నాశన చర్యలు

1. స్థావిక స్ప్రేలు
2. ఆకాశ స్ప్రేలు
3. పాగపెట్టుట
4. జన్యసంబంధ అదుపు


పరిణతి చెందిన శుక్ర కణము, అండాకార లేక గుండ్రని లేక గదాకార కేంద్రకముగల తల మరియు పొడవైన కంపించే తోక కలిగి ఉంటుంది. ఇవి నీటి ప్రవాహము ద్వారా వేరొక సైకన్లోని కళాభయత కుల్యంతోనికి చేరతాయి. (పటం 5.7).

అండాలు: అండ మాతృకణాలు మధ్య భూకణాల నుండి ఆహార కణాల కొరకు తిరుగుచు కొయానోసైట్ల స్తర ఆధారము వద్దకు చేరుతాయి. ఇవట ఆహారము గైకొని పెరుగును. ఆ పిదప క్షయకరణ విభజనలు జరిగి అండములుగా మారిపోవును. (పటం 5.7).

పరిణతి చెందిన అండాలు పెద్దగా గుండ్రంగా ఉండి సుస్పష్టమైన కేంద్రకము కలిగి ఉంటాయి. ఇది కిరణ కుల్య కుద్యమునందు ఉంటుంది.

ఫలదీకరణము

ఫలదీకరణము నందు మగ సంయోగ బీజమగు శుక్రకణము మరియు స్త్రీ సంయోగ బీజమైన అండము కలిసిపోయి సంయుక్త బీజము ఏర్పడును. ఫలదీకరణము దేహములోపల జరుగును. పరిణతి చెందిన శుక్రకణాలు నీటి ప్రవాహముతో దేహము వెలుపలికి వచ్చి రెండూ స్పృశి దేహములోనికి నీటివెంబడి ప్రవేశించి కిరణ కుల్యలను చేరుకొనును. ఇవట శుక్రకణము ధాత్రికణమనబడే తిరుగుచున్న అమీబోసైట్ లేక కొయానోసైట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇవట శుక్ర కణము తోకను కోల్పోయి కప్పబడుతుంది. తిరుగుచున్న అమీబోసైట్ శుక్రకణాన్ని స్త్రీ బీజ మాతృకణాలు వరకు చేర్చును. శుక్ర కణము అండములోనికి చొచ్చుకుపోయి దానితో కలిసిపోవును. దీనితో ఫలదీకరణము పరిసమాప్తి చెందును. ఫలదీకరణముతో సంయుక్త బీజ నిర్మాణము పూరిత అవుతుంది. అపుడది చుట్టప్రక్కల ఉన్న అమీబోసైట్లతో ఏర్పడిన సంతాన గుళికయందు మూయబడి ఉంటుంది (పటం 5.7 సి).




పటం 5.7. సైకన్లో సంయోగ బీజాలు, ఫలదీకరణము. ఎ. కిరణ కుల్యలో ఉన్న అండము. బి. కళాభయత కణములో ఉన్న శుక్ర కణము. సి. ఫలదీకరణముకొరకు శుక్ర కణాన్ని తీసికొని పోతున్న ధాత్రి కణము. 1. కేంద్రకాంశము 2. కేంద్రకము 3. పినాకోసైట్లు 4. అండము 5. కొయానోసైట్లు 6. కణజీవ ద్రవ్యము 7. శుక్ర కణము 8. కొయానోసైట్లు (ధాత్రికణముగా).

5.9 పెరుగుదల

ఒక జీవి యందు ఫలదీకరణము చెందిన అండము నుండి ప్రౌఢ దశ చేరువరకు జరుగు మార్పుల సముదాయాన్ని పెరుగుదల అంటారు. అన్ని మెటాజోవా జంతువులందు పెరుగుదల సంయుక్త బీజ విభజనతో మొదలవును. విభజనలు పలుమార్లు ఇతర కణాలతో లంబకోణంగా జరిగి కణ సంఖ్యను గుణోత్తర చయముగా అనగా 2, 4, 8, 16, 32, 64 పెరుగును. పెరుగుదల యందు మొదటిదశలు కిరణ కుల్యలందు జరుగును (పటం 5.8).

విదళనము: సంయుక్త బీజమునందు పూర్ణ భంజిత పద్ధతిలో విదళనము లేక ఖండి భవనము జరుగును. మొదటి మూడు విభజనలు నిలువుగా జరిగి ఎనిమిది కణాలు లేక బ్లాస్టోమియర్లు ఏర్పడును. తరువాత విభజన అడ్డముగాను, కొంచెము పూర్వవంతుము వైపు జరుగును. దీనితో 16 కణాలు ఏర్పడుతాయి. అందులోని క్రింది భాగపు 8 పెద్ద కణాలు మూక్రోమియర్ ప్రైభాగపు ఎనిమిది కొంచెం చిన్నగా ఉండి మైక్రోమియర్ అనబడుతాయి. మూక్రోమియర్లు చర్మీయ స్తరము, మైక్రోమియర్లు కాయానోస్టెట్టుగా ఏర్పడుతాయి. పిండము ఇప్పుడు బల్లవరుపుగాను, చక్రాకారముగాను గోచరించును. దీనిని బ్లాస్టులా అంటారు.



పటం 5.8. పైకావ్ అభివృద్ధి. ఎ. సంయుక్త బీజము బి. రెండు కణాల స్థితి సి. నాలుగు కణాల స్థితి డి. ఎనిమిది కణాల స్థితి ఇ. పదహారు కణాల స్థితి ఎఫ్. బ్లాస్టులా జి. స్ట్రోమా బ్లాస్టులా హెచ్. స్ట్రోమా బ్లాస్టులా నిలువుకోత (విలోమము జరిగిన తరువాత) ఐ. అంఫిబ్లాస్టులా జె. అంతర్వర్తనము ద్వారా ఏర్పడిన తృతీయ పిండాభివృద్ధి దశ కె. నిశ్చల తృతీయ పిండాభి వృద్ధి దశ నిలువుకోత 1. కేంద్రకము 2. కణద్రవ్యము 3. విదళనము 4. చిన్న మైక్రోమియర్లు 5. పెద్ద మూక్రోమియర్లు 6. కళాభయుత మైక్రోమిర్లు 7. కణికాయుత మూక్రోమియర్లు 8. కళాభాలు 9. సంయుక్త బీజ కుహరిక (బ్లాస్టో సీల్) 10. బీజరంధ్రము.

5.12 సారాంశము

1. పారిశుధ్య వర్గమునందు స్పాంజులు చేరి యున్నవి. ఇవి సముద్రము లందు మంచినీటియందు లభిస్తాయి.
2. ఇవి నిమ్మరకపు బహుకణ, కాడ రహిత జీవులు.
3. దేహము రంధ్రములతో నిండి ఉండును. వీటిద్వారా ప్రవహించే నీరు, దేహము యొక్క వివిధ పనులను నిర్వహించును.
4. అష్టపంజరము కంటకములతో నిర్మితమై ఉంటుంది.
5. వివిధ రకాల కణాలు వీటి వివిధ రకాల శారీరక ధర్మాలను నిర్వహించును.
6. ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక మరియు అలైంగిక పద్ధతులలో జరుగును.
7. స్పాంజు కాడ రహిత, సున్నము నిర్మిత సముద్ర జీవి.
8. ఇది ద్వీపస్థ జీవి. పెక్కు అమీబోసైటులు మధ్య క్షేమ స్థరమునందు ఉంటాయి.
9. కుల్యలందలి నీటి ప్రవాహము వివిధ శరీర ధార్మిక చర్యలను నిర్వహించి కుల్యావ్యవస్థ నిర్మాణము గావించును.
10. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, పునరుత్పత్తి మరియు కోరకీ భవనము ద్వారా జరుగును.
లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, శుక్ర కణాలు, అండాలు ద్వారా జరుగును. ఫలదీకరణము, పెరుగుదల స్థానబద్ధముగా జరుగును. స్వతంత్రంగా ఈయ చుండె డింభక చర్య ఉంటుంది.

5.13 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. చర్మస్తరం, జఠర స్తరం
2. అంతర్యాహికుల్య, (పోసోఫైట్, కిరణ కుల్య, ఎపోఫైట్, బహిర్యాహి కుల్య, స్పంజికా కుహరం, ఆమ్మోనియా.
3. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి
4. అంఫిబ్లాస్టులా

5.14 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. పారిశుధ్య సామాన్య లక్షణాలు వివరించండి.
2. వర్గము పారిశుధ్యను తరగతుల వరకు వర్గీకరించి, వాటి లక్షణాలు, ఉదాహరణలు వ్రాయండి.
3. సైకాన్ అంతర్నిర్మాణమును, అందులోని వివిధ కణాలు, వాటి విధులను గూర్చి వ్రాయండి.
4. సైకాన్ కుల్యా వ్యవస్థను విశదీకరించి, దానివలన గల ప్రయోజనాలను లెక్కింపుము.
5. సైకాన్ లో లైంగికోత్పత్తి, మరియు పెరుగుదలను గురించి వివరించండి.

2. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. స్పంజికం అష్టపంజరము 2. సైకాన్ లో అలైంగికోత్పత్తి.

5.15 పదకోశము

అమీబాయిడ్ కణాలు : అమీబాయిడ్ లక్షణాలు, మిథ్యాసాదాల సహాయంతో పోషణ మరియు చలనం కలిగి ఉండుట.

బాక్టీరియా	: సున్నితమైన సూక్ష్మ దర్శినిచే కనబడే ఏకకణ జీవులు
సహనివేశము	: ఒకచోట కలిసి జీవించు జీవుల సముదాయం
సంధాయక కణజాలము	: జంతువుల దేహమునందు ఖాళీ స్థలముల నింపె వివిధ అంగములను కలిపే కణజాలము
సంకోచ శక్తి	: సంకోచ వ్యాకోచ శక్తి?
క్రస్టేషియన్	: ఆర్థోపాడ్లు, ఒక పెద్ద, వివిధ వైవిధ్యము కల సముదాయము ఉ.షింపులు, రొయ్యలు, పీతలు
వ్యాపనము	: ఒక మాధ్యమము నుండి రెండవ దానిలోనికి ద్రవము వెదజల్లుట మరియు పరచుట
ద్విస్తరి	: రెండు స్పష్టమైన జీవన స్తరాలు ఉండుట. ఒకటి బహిష్కవము, రెండవది అంతస్కవం
ఉపకళ కణాలు	: దేహమునందలి భాగముల స్వేచ్ఛాయుత ఉపరితలాన్ని కప్పి ఉంచే కణాలు. ఇవి అంగము వెలుపల లేక లోపల ఉండవచ్చును.
ఎన్జైమ్	: (గ్రీ.ఎన్. = లోపల; జైమ్ = ఉండుట) రసాయనిక ప్రక్రియను ఉత్తేజితము చేయు రసాయనిక పదార్థం.
జాంతవ మాత్రిక	: కణజాలానికి ఆధార పదార్థము. ఇందులోని కణాలు వాటి మధ్యనుండు నిర్జీవ పదార్థాన్ని స్రవించును.
షట్కణ కంటకాలు	: అరు కోణములుగల కంటకాలు
పూర్ణభంజిత	: ఫలదీకరణము చెందిన అండము యొక్క పూర్వ విదళనము
జాంతవ భక్షక	: పోషణకై సేంద్రియ పదార్థ వృక్షాలపై ఆధారపడుట, జంతువుల పోషణ పద్ధతి
ఉభయ లింగజీవి	: (గ్రీ. హర్మాప్రాడైటిస్ = రెండు లింగముల పమ్మేళన) ఆడ మగ ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు ఒక జీవిలో ఉండుట
కణాంతస్థ	: కణములోపల
క్షయకరణ విభజన	: కణ విభజన ఇందులో క్రోమోసోమ్ల పంఖ్య పగమగును
రూపవిక్రియ	: డింభకము త్వరితగతిని మార్పుచెంది యవ్వనజీవిగా ఏర్పడుట

మెటాజోవా	: బహుకణ జంతువులు. ఇందులో పెక్కు రూప భిన్నతగల కణాలు ప్రత్యేక పని కొరకు కణజాలాలను, అంగాలను, వ్యవస్థలను ఏర్పరచును.
మలస్కా	: మెత్తని శరీరం కలిగి, ఖండిభవనము లేక కార్నియం కర్పరాన్ని కల జీవులు
శ్లేష్మము	: ఒక విధమైన మ్యూసిన్ యొక్క కాంతివంతమైన ద్రవము. ఇది శ్లేష్మ గ్రంథి లేక శ్లేష్మ త్వచము నుండి స్రవించబడును. స్రవణని సంబంధ విసర్జక పదార్థము యూరియా వంటి విసర్జక పదార్థము ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అంగము	: ఒక ప్రత్యేక పనికొరకు ఏర్పరచిన దేహంలో రూప భిన్నత గల భాగము
పారా బేసల్ దేహము	: ఒక ద్వితీయ ఆధార కణిక. ఇది బ్లైఫెరో ప్లాస్ట్తో సమానము.
స్థనకాలు	: సూక్ష్మమైన జంతువు లేక వృక్షము. ఇది సాధారణముగా నది లేక సముద్రపు ఉపరితలాన తేలియాడును లేక కొట్టుకుపోవును.
వలయసౌష్ఠవము	: ఒక మాధ్యమిక నిలువు అక్షానికి చుట్టు ఒకే విధమైన భాగాలు అమర్చబడి ఉండుటను వలయ సౌష్ఠవము అంటారు.
రైజోప్లాస్ట్	: కొన్ని ప్రోటోజోవాలో కశాభ ఆధార కణికను జీవపదార్థ పోగుతో కేంద్రకాన్ని లేక పారాబేసల్ దేహాన్ని కలిపి ఉంచుట.
వృంతరహిత	: (లా. సోడెర్ = కూర్చుండుట) కదలికలేని జంతువులు, కాడలేక వెడలైన ఆధారముతో అతుకబడి ఉన్న జంతువులు
అధస్తరము	: నీటిలో మునిగిఉన్న ఒక పదార్థము లేక పదార్థ సమూహము. వీనినంటే వృంత రహిత జీవులు అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి.
కణజాలము	: ఒక రకపు లేక వివిధ రకాల కణ సముదాయము. ఇది ఒక ప్రత్యేక పనిని నిర్వహించును.
కంపనకల తోక	: ముందు వెనుకకు కంపించే శక్తిగల తోక

5.16 పరిశీలన గ్రంథాలు

SUGGESTED READING

1. Agarwal V.P.	: A text on Invertebrate Zoology
Dalela R.C.	: Jai Prakash Nath & Co. Meerut
2. Blackwelder R.E.	: Taxonomy, John Wiley & Sons, Inc. New York

3. Chandlar : Parasitology
Chatterji : Medical and Veterinary Parasitology
 4. Dalcla. R.C. : Anial Taxonomy and Museuiology,
Jai Prakashnath & Co., Meerut
- Sharma R.S.
5. Dhami P.S.
Dhami : R. Chand & Co. Publishers, New York.
 6. Dhami P.S.
Dhami J.K. : R. Chand & Co. Publishers, New Delhi
 7. Gordon, : Zoology, Collier Macmillian
International Editions
- Malcolms, et.al
8. Jordan E.L. : Invertenbrate Zoology
Varma P.S. : S. Chandr & Co.
 9. Cotpal R.L. : Protozoa, Phylum Series, Rastogi
Publications, Meerut
 10. Kotpal R.L. : Porifera, Rastogi Publications, Meerut
Kotpal R.L. : Invertebrate Zoology
Ketrpal : Rastogi Zoology
Agarwal : Meerut
 11. Majhpuria : A Text Book on Invertebrate Zoology
 12. Parker, T.J : Text Book of Zoology - Invertebrates
Haswell W.A. (Edited by A.J. Marshall & W.D. Williams)
English language Book Society and Macmillan)
 13. Prasad S.N. : A Text Book of Invertebrate Zoology
Kotab Mahal PUblications, Allahabad.
 14. Rastogi, Veer Bala : A Text Book of Invertebrate Zoology,
Jai Prakash Nath & Co., Meerut
 15. Saxena, M.M. : A Text Book of Invertebrate Zoology
Prakasham Kendra, Lucknow.
 16. Simpson G.G. : Principles of Animals taxonomy
Colombia University Presss, New York.
 17. Singer, Charles : A History of Biology
Abelard - Schuman, London, New York.
 18. Siva Sastry, T.V. : B.Sc., Zoology (Invertebrate)
Narasimha Rao K. : Commercial Literature Co., Guntur
 19. Storer, Tracy I. : General Zoology
Usinger, Robert L. : Mc. Grew - Hill Book Company
 20. Vishwanath : A Text Book of Invertebrate Zoology.

భాగము - 6 నిదేరియా - సామాన్య లక్షణాలు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

- 6.1 ఉద్దేశ్యము
- 6.2 ఉపోద్ఘాతము
- 6.3 సామాన్య లక్షణాలు
 - 6.3.1 తరగతి: హైడ్రోజోవా
 - 6.3.2 తరగతి: హైడ్రోజోవా
 - 6.3.3 తరగతి: ఆంథోజోవా
- 6.4 స్వపరిశీలనం
- 6.5 సారాంశం
- 6.6 స్వపరిశీలనంజవాబులు
- 6.7 నమూనా ప్రశ్నలు

6.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠంనందు వర్గము యొక్క సామాన్య లక్షణాలు మరియు అందులో కానవచ్చు వైవిధ్యాలు, ద్విస్తరిత ప్లితివి చర్చించడమైనది. వర్గీకరణ మరియు ఉదాహరణలను వివరించడబడింది.

ఇది అధ్యయనం చేసిన తరువాత ద్విస్తరిత పరిస్థితిని, జీర్ణ కీయకు అంతరంగా ఏర్పడ్డ కుహరాన్ని అది నోటిద్వారానే బయటకు తెరుచుకొంటుందనే విషయాలను భోధించగలుతావు.

6.2 ఉపోద్ఘాతము

పూర్వమున నిదేరియా మరియు టీనోఫోరను జతపరచి సీలెంటరేటా వర్గమునందు చేర్చియుండిరి. వీటి యందు అంతరగుళిక లేక సీలెంటరాన్ అను కుహరముండుటచే ఈ వర్గమునకు సీలెండరేటాయని పేరు పెట్టిరి. టీనోఫోరాలో దంశ కణాలు లేకుండుట వలన నిదేరియా నుండి వేరు చేసి రెండింటిని వేరు వేరు వర్గాలుగా చేయడమైనది.

నిదేరియా జీవులన్నీ వికరణ సాష్టవంతో విర్యాణరీత్యా రెండురూపాలలో గోచరిస్తాయి. చలన రహితమైనది పాలిప్, స్వేచ్ఛగా ఈదేది మెడుసా.

6.3 సామాన్య లక్షణాలు

1. స్పంజిల వలె నిదేరియా బహుకణ జీవులు
2. ఈ వర్గపు సభ్యులు ప్రపంచమంత వ్యాప్తము కలిగి ఉన్నవి.
3. ఇందులో కొన్ని తప్ప అన్నియు సముద్రజీవులే.
4. దేహము రెండు కణ స్తరాలతో - ఒకటి బహిష్టచము, రెండవది అంతస్త్వచము ఉండుట వలన వీనిని ద్విస్తర జీవులంటారు.
5. ఇవి రెండు రూపాలలో ఉంటాయి. 1. పాలిప్, అలైంగిక జీవకము, 2. మెడుసా, లైంగిక జీవకము.

6. ప్రాథ దశయందు వలయ సౌష్ఠవాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.
7. ఒకే ఒక్క నోటి రంధ్రము ఉంటుంది. ఈ రంధ్రమే సాయువు యొక్క పనిని నిర్వహిస్తుంది.
8. జీర్ణక్రియ, కణాంతర మరియు కణాంతస్థ అను రెండు రకాలుగా జరుగును.
9. నాడీ వ్యవస్థ నాడీకణముల జాలకముతో వ్యాప్తి చెంది అదిమ రకానికి చెందినది.
10. జ్ఞానాంగాలు సరళమైనవి లేదా క్లిష్టమై ఉంటాయి. కొన్ని కంటి మచ్చ లేదా సంయంజ కోశము కలిగి ఉంటాయి.
11. ప్రత్యుత్పత్తి రెండు విధాలుగా జరుగును.
 1. అలైంగిక పద్ధతి కోరకీభవనము వలన జరుగును.
 2. లైంగిక పద్ధతిలో శుక్రకణాలు, అండముల వలన జరుగును.


నిదేరియా వర్గము మూడు తరగతులు కలిగి ఉంటుంది.

1. హైడ్రోజోవా, 2. హైస్టోజోవా, 3. ఆంథోజోవా లేక ఆక్టినోజోవా.


6.3.1 తరగతి హైడ్రోజోవా

1. చాలా వరకు ఇవి సహనివేశాలుగాను సముద్రాలలో (ఒబీలియా) ఉంటాయి. కొన్ని ఒంటరిగా మంచి నీటిలో (హైడ్రా) ఉంటాయి. కొన్ని వృంత రహితంగా లేక స్వతంత్ర జీవనం గడుపునవి గలవు.
2. దేహము వలయ సౌష్ఠవము కలిగి ఉంటాయి.
3. దేహ కుడ్యము ద్విస్తరితము. ఇందులో 1. బహిష్టచము. 2. అంతస్త్వచము. ఈ రెండు ఒక కణరహిత జిగురు పదార్థ మధ్య శ్లేష్మస్తరముతో వేరు జేయబడి ఉంటాయి.
4. బహిష్టచము నందు ఉపకళా కండర కణాలు. మధ్యాంతర కణాలు, జ్ఞాన కణాలు, గ్రంథి కణాలు మరియు నాడీ కణాలు ఉంటాయి.
5. మధ్యాంతర కణాంతో కొన్ని ప్రత్యేకమైనట్టి కణాలు దాడి చేయుటకు, ఆత్మ రక్షణ కొరకు ఎదుగుతాయి. వీనిని కుట్టు కణాలు లేక దంశ కణాలు అంటారు.
6. అంతస్త్వచము నందు కళాభయుత లేక అమీబాయిడ్ కణాలు, గ్రంథి కణాలు మరియు ఉప కళా కండర కణాలు ఉంటాయి.
7. ఆహార కుహరము వెలుపలికి నోరు అనే ఒకే ఒక్క రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొంటుంది.
8. జతర ప్రసరణ వ్యవస్థ సరళమై ఉన్నది. దీని నిలుపు విభజకాలు అంత్రయోజకాలు విభజించవు. అద్య ఆహార నాళము లేదు.
9. సహనివేశమునందు రెండు రకాల జీవకాలున్నాయి.
1. పాలిప్స్ లేక జతర జీవకాలు. 2. జ్ఞాస్టో స్టైల్స్ లేక బీజ జీవకాలు.
10. నిజమైన పటిస్తరము (Velum) ఉంటుంది.
11. లైంగిక కణాలు సాధారణంగా బహిష్టచము నుంచి ఎదగబడి, వెలుపలికి విసర్జింపబడుతాయి.
12. అలైంగిక పద్ధతిలో కోరకీభవనము జరిగి సహనివేశ పెరుగుదల జరుగును. ఇందులోని కొన్ని మెడ్యూసా మొగ్గలు, బీజకోశాలను పెంచుకొనును. బీజకోశాలలో బీజ కణాలు పెరిగి, ఫలదీకరణము జరిగి సంయుక్త బీజాలేర్పడును. వీని నుండి కొత్త సహ నివేశాలు బయలుదేరును.
13. పెక్కు సందర్భాలలో, వెలుపల నుండు కొమ్ము పదార్థ పెరిస్కార్ ఊతనిచ్చే, అస్తిపంజరాన్ని నిర్మాణం కావిస్తుంది. కొన్నింటి లోపలి 'సీనోస్కోర్' కార్నియం కార్నోనేట్ అస్తి పంజరాన్ని స్రవించును. దీని నుండి ఒక కఠినమైన శిలవంటి నిర్మాణము లేక ప్రవాళము ఏర్పడును.
14. కొన్ని సహనివేశాలు ఒక చోట స్థానబద్ధమై ఉండక, సముద్రపు ఉపరితలాన ఈదుచు లేక తేలియాడుచు ఉంటాయి. ఇట్టి పెలాజిక్ లేక తేలియాడే జీవులు బహు రూపత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. వీనియందు వివిధ రూపాల జీవకాలు వుండి వివిధ పనులు వెరవేరుస్తాయి.
15. వీని ఓంభకము శైలికలతో నిండియున్న స్థానులా.

ఉదా. ఒబీలియా (Obelia) (పటం. 6.1). హైసేలియా (Physalia) (పటం 6.2 ఎ) మిల్లిపార (పటం 6.2 బి) 77



పటం 6.1. ఒడీలియా సహ నివేశము. 1. స్పర్శకములు. 2. గ్రైవేయకము. 3. ఫ్లాగ్రోఫీకా. 4. పెల్వీ. 5. పెరిసార్క్. 6. మొగ్గ. 7. సీనోసార్క్. 8. ఫ్లాగ్రోకాలస్. 9. ఫ్లాగ్రోరైజా. 10. ప్లాస్టోస్టైట్. 11. ఉత్పాదకావృతము. 12. మెడుసా మొగ్గలు. 13. మధ్య క్షేపకము. 14. హిలిస్.



పటం 6.2. ఎ. టెనెలియా. బి. మిల్డిటరీ. సి. అరేలియా. 1. నుమాటోఫోర్. 2. జతర చీవకము. 3. ఉత్పాదకచీవకము. 4. అంగుళి చీవకము. 5. దంశకణాలతోనున్న స్పర్శకాలు. 6. తెరవాప లేదా శిఖ. 7. జతర రంధ్రాలు. 8. ఉపరిచక్రాకార తలము. 9. ఇంటర్ రేడియల్ కుళ్ళు. 10. వలయకుళ్ళు. 11. ఉపాంత స్పర్శకాలు. 12. ముఖ భుజాలు. 13. గొడ్. 14. ఉపాంత లాపెట్. 15. చీజకోశములు.

6.3.2 తరగతి స్క్వెఫోజోవా

1. ఇవి మెడుసా రూపములో ఉండు నిడేరియాలు.

2. ఇవి కేవలం సమద్ర వాసులు. ఇందులో ఎక్కువ శాతం వీటిపై తేలియాడునవి చేరియున్నవి.


3. రమారమి అన్ని యవ్వన దశతో రూదును ఉంటాయి. కొన్ని ప్రవాళ అవరోధాల పైన లేక బురద పున్న తీరములందు తల క్రిందులుగ ఎక్స్ అంబెల్లా తలముపై పడి వుండి విశమిస్తాయి.
4. పెక్కు సైస్టోజోవాలు అర్థ పారదర్శకంగాను మరియు గాఢ ఫలకం వలెగానీ ఉంటాయి. వీనియందు ప్రకాశవంతమైన రంగులు గల బీజకోశాలు, స్పర్శకాలు, వలయ కుల్యలు ఉంటాయి.
5. పెక్కువాటిలో చిత్రము, ముఖ నిర్మాణాలు గాఢమైన రంగులతో ఉంటాయి.
6. పాలిప్ దశ వుండదు. ఉంటే క్షీణించి ఉండును. సాధారణంగా ఒక చిన్నని, ఒంటరిగా ఉండు అలైంగిక నిర్మాణము ఉండి సైస్టోమా అనబడును.
7. సైస్టోమా అంత్యకోరకీభవనము లేదా అడ్డు ద్వితీ విచ్చిత్తి చేత మెడుసాలను ఉత్పత్తి చేయను. ఈ ప్రక్రియను స్ట్రోబిలైజేషన్ అంటారు.
8. మెడుసా దశ బలియమైనది. ఇవి పెద్దగా, గంట మరియు చిత్రము ఆకారంలో స్వతంత్రముగా, ఈదేవిగా ఉంటాయి. లేదా ప్రతి ముఖ వృంతము చేత అంటుకొని ఉంటాయి.
9. మధ్య శ్లేష్మస్తరము కణములతో వుంటుంది.
10. జతర ప్రసరణ వ్యవస్థ అధ్యాహార నాళము లేకుండా ఉండును. ఇది విభాజకముల ద్వారా నాలుగు ఇంటరేడియల్ కోష్ఠకాలుగ విభజింపబడి వుండవచ్చు. ఉండక పోవచ్చు.
11. వీనియందు నిజమైన పటిస్తరము ఉండదు. కాని జ్ఞానాంగాలు గదాకార బోలు నిర్మాణాలుగా వుండి స్పర్శకోశాలు (Tentaculosysts) అనబడతాయి.
12. కొన్నిటియందు మాత్రమే జీవిత చరిత్ర మరియు పెరుగుదల ప్రక్రియ తెలియ వచ్చింది. పెక్కువాటి గురించి తెలియదు.

ఉదా. అరేలియా (Aurelia) (పటం 6.2 పి), రైజోస్టోమా (Rhizostoma)

6.3.3 తరగతి ఆంథోజోవా

1. ఇవి పాలిప్ ఆకారముగ వుండి జీవిస్తాయి.
2. ఇవి ఒంటరిగా లేక సహనివేశాలుగా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం సముద్ర వాసులు. ఆధార తలమును అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి.
3. మెడుసా దశ వీనియందు కానరాదు.
4. వీని జతర ప్రసరణ కుహరము, హైడ్రోజోవా మరియు సైస్టోజోవా అధ్యాహార నాళము, ఆంత్రయోజకాలు, నిలుపు కిరణ ప్రసారక విభాజకాలతో పోల్చిన భిన్నముగా ఉండును. ఇందులో ఆంత్రయోజకాలు, సర్పిలాకార ఆంత్రయోజక పోగులు లేక జతర పోగులు ఉంటాయి.
5. మధ్య శ్లేష్మస్తరము తంతుయుత సందాయక కణజాలముతో బాగుగా ఎదిగి వుంటుంది.
6. కండర వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెంది వున్నది. ఇది బహిష్టవ మరియు అంతస్త్వ ఉపకళా కండర కీలతములతో ఏర్పడి వుంటుంది.
7. ఈ తరగతి జీవులు, బహిష్టముచే ప్రవించబడుచున్న పదార్థము లేదా కొమ్ము పదార్థముతో నిర్మితమై ఆస్తి పంజరము కలిగి వుంటాయి. కొన్నిటిలో మాత్రము ఇట్టి కఠిన భాగము లేదా అస్థిపంజరము వుండదు.
8. సైస్టోజోవాతో వున్నట్లు వీనియందు కోరకీభవనము, స్ట్రోబిలైజేషన్ అనబడే అడ్డు విచ్చిత్తి ఉంటుంది.
9. వీనియందు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విస్తారముగ జరుగును. దీనివలన వివిధ రకాల సహ నివేశాలు ఏర్పడతాయి.
10. ఆంత్రయోజకాలలో బీజకోశాలు అభివృద్ధి చెందును. లైంగిక కణాలు అంతస్త్వము నందు ఉంటాయి. పరిణతి చెందిన లైంగిక ఉత్పాదితములు, అంతర్ గుహికలోని విడుదల చేయబడుతాయి.
11. ఫలదీకరణము చెందిన అండములు పెరిగి ప్లానులా తయారు అవుతాయి. ప్లానులా కొంతకాలము స్వతంత్ర జీవనము గడిపి స్థిరపడి పోవును. ఆ పిదప రూప విక్రియ జరిగి పాథజీవిగా ఏర్పడును.

ఉదా: పెన్నాట్యులా (Pennatula) (పముద్రపు పెన్). కోరేలియం (Corallium) (ఎర్రజీవాళము),
అల్పియోనియం (Alconium) (డెడ్‌మ్యాప్స్ ఫింగర్) (పటం. 6.3. ఎ)



పటం 6.3. ఎ. పెన్నాట్యులా. బి. కోరేలియం. సి. అల్పియోనియం. 1. ఆక్సియంపాలిప్, 2. పార్శ్వకాలు. 3. అంకుశనాళిక కీలకాలతోనున్న ఈ. 4. పిడంకుల్. 5. అంక్టోకోడియా. 6. ముకుళిత పాలిప్లు. 7. పిన్నేట్ పుష్పకాలు. 8. సంయోజక కలుజాలము. 9. వెడల్పైన తమ్మెలు. 10. డిజిటేట్ కాలులు. 11. సంకోచము చెందివున్న పాలిప్లు. 12. కాడ.

6.4 స్వపరిశీలన

1. ప్రైఫోజవాలు _____ రూపాలు
2. మెడుసాలు _____ జీవకాలు.
ఇవి శుక్రకణాలను, అండాలును ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
3. ప్రవాళాలలో ప్రవాళాలలో ప్రబలంగా కనిపించే రూపం _____ లది

6.5 సారాంశం

1. నిడేరియా జీవులు ద్విస్తరిత, వలయ సౌష్ఠవము కలిగి ఉన్న బహుకణ జీవులు.
2. ఇవి పాలిప్ మరియు మెడుసా రెండు రూపాలలో ఉంటాయి.
3. శరీరము నందు ఒక కుహరము గలదు. దీనిని అంతర గుహిక (Coelenteron) లేక జరర అంతర కుహరము (Gastro vascular cavity) అంటారు.
4. దంశ కణాలు అనే ప్రత్యేకంగా ఏర్పడిన అంగాలు ఆత్మ రక్షణకు, దాడి చేయుటకు ఉపయోగ పడతాయి.
5. నిడేరియా వర్గమునందు హైడ్రోజోవా (Hydrozoa) ప్రైఫోజోవా (Scyphozoa) మరియు ఆంథోజోవా (Anthozoa) యను మూడు తరగతులు గలవు. తరగతుల సామాన్య లక్షణాలు ఉదాహరణలు చర్చించబడినవి.

6.6 స్వపరిశీలన జవాబులు

1. మెడ్యుసాయిడ్
 2. లైంగిక
 3. పాలిప్
-

6.7 నమూనా ప్రశ్నలు

1. ఆ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. వర్గము సిడేరియాలోని వివిధ విభాగాలను తెలిపి, హైడ్రోజోవా లక్షణాలను వివరించండి.
 2. వర్గము సిడేరియా సామాన్య లక్షణాలను వివరించి, హైడ్రోజోవా విభాగపు లక్షణాలను తెలపండి.
2. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. అంథోజీవా విభాగపు సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.

BRAOU

భాగము — 7 ఒబీలియా

విషయక్రమము

- 7.1 ఉద్దేశ్యము
- 7.2 ఉపోద్ఘాతము
- 7.3 సామాన్య నిర్మాణము
 - 7.3.1 పాలిష్ లేదా హైడ్రాల్
 - 7.3.2 గోవాంజియమ్ లేదా బ్లాస్టోస్టెల్
 - 7.3.3 మెడుసా
- 7.4 జీవిత చక్రం
- 7.5 మెటాజెనిసిస్
- 7.6 పాలిష్ మరియు మెడుసాలు సామ్యాంతరాలు
- 7.7 వ్యవశీలనం
- 7.8 సారాంశం
- 7.9 వ్యవశీలనం జవాబులు
- 7.10 నమూనా ప్రశ్నలు
- 7.11 పదకోశం

7.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠమునందు ఒబీలియా, నిడేరియా వర్గానికి ఒక ఉదాహరణగా గైకొని చర్చించుదుము. దీని నిర్మాణము జీవిత చరిత్రను వివరముగ చర్చించనైది. ఇది చదివిన తరువాత నీవు పాలిష్ మెడుసా తారతమ్యాలనే గాక తరాల ఏకాంతరతను కూడా విశదపరచగలవు.

7.2 ఉపోద్ఘాతం

ఒబీలియా సముద్ర నిడేరియా జీవి. దీనిలో స్వేచ్ఛగా ఈదే మెడుసాతరం, నిశ్చలంగా ఉండే హైడ్రాయిడ్ (పాలిష్) తరం కనిపిస్తుంది. ఏకాంతరంగా ఈ రెండు తరాలు జరగడం ఒక దృగ్విషయం. దీనిని మెటాజెనిసిస్ అంటారు. క్రమబద్ధంగా ఆలైంగిక లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి తరాలు చక్రీయంగా భరిస్తాయి.

7.3 సామాన్య నిర్మాణము


ఒబీలియా చిన్నగా ఉంటు శాఖలుగల, సహనివేళ సముద్ర హైడ్రాయిడ్. ప్రపంచమంతట వ్యాప్తము చెంది ఉన్నది. ఒబీలియా సహనివేళము సున్నితముగ కనిపించు, తెలుపు లేక లేత గోధుమ వర్ణములో వుండు మాస్ లేక ఫర్ అకారపు పెరుగుదల. ఇది ఒకటి నుండి పెక్కు అంగుళముల ఎత్తు వుంటుంది. దీని ఆధారము లేక అడ్డముగా వుండు సహనివేళ భాగము వ్రేల్ల వలె లేక ప్రాకే కాండము వలె వుంటుంది. ఈ భాగాము ఆధారాన్ని అంటి వుండుటకు సహాయపడును. ఈ విధముగా ప్రాకుమండు కాడ హైడ్రోరైజా (Hydrorhiza) అనబడును. దీని నుండి పెక్కు సున్నితమైన చక్కగా నిలబడి వుండే హైడ్రోకాల్ (Hydrocauli)

అయిదుదేరును. ఇవి ఏకాంతరమగు శాఖలుగా ఏర్పడును. పార్శ్వశాఖ మళ్ళీ శాఖలుగా ఏర్పడును. ప్రతి ఒక హైడ్రోకాలన్ సహనివేశము ఒక ముఖ్య శాఖ లేక అక్షయనబడును. ప్రక్కశాఖల నుండి మరల ఉపశాఖలు ఏర్పడవచ్చును. చిన్నశాఖల చివరన పాలిప్ సురియు బ్లాస్టోస్టయిర్ ఏర్పడుతాయి. కాడ మరియు జీవకాలు జీవ కణాలతో ఏర్పడిన బోలుగొట్టుము. దీనిని సీనోసార్క్ (Coenosarc) అంటారు. సీనోసార్క్ వెలుపలి భాగము ఇహిస్ట్రవముతోనూ లోపలి భాగము అంతస్త్వచముతోను, ఈ రెండింటి మధ్య శ్లేష్మస్తరము ఉంటుంది. ఒబీలియా సహనివేశము రెండు రకాల జీవకాలను ప్రదర్శించే ద్వీరూప జీవి.

బ్లాస్టోస్టయిల్స్ పెక్కు చిన్న చిన్న సాసర్ ఆకారపు పార్శ్వశాఖలను ఉత్పత్తి చేయును. వీటిని మెటాసా మొగ్గలు అంటారు. ఇవి చివరకు ఎదిగి స్వతంత్రముగా ఈదుచు రైంగిక జీవకాలుగా లేక మెడుసాయిగ పెరుగును. ఇవి పెరుగుట వలన సహనివేశములు తిరూప జీవిగ అవుతుంది. ఒబీలియా సహనివేశము బహు రూపకరమే మంచి ఉదాహరణము. బహురూపకర అనగా నిర్మాణాత్మకంగా, క్రియాత్మకంగా వివిధ రకాల జీవకాలుగల సహనివేశము.

7.3.1 పాలిప్ లేదా హైడ్రాంట్

ఇది చూడటానికి సుమారు ఒక చిన్న హైడ్రోవలె వుంటుంది. సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా చూస్తే ఇది పసుపురంగుతో ఒక స్థూపాకారపు లేదా శంకు ఆకారముతో నుండి బోలు తిత్తివలె కనబడుతుంది. దీని ఆధార భాగము ఒక బోలు కాడతో హైడ్రాకాలన్ కు కలుసబడి వుంటుంది. ఒక ఉబ్బెత్తు మాదిరిగానున్న పాలిప్ పూర్వభాగాన్ని గ్రేవేయకము (Manubrium) అంటారు. గ్రేవేయకం చివరనగల రంధ్రాన్ని నోరు అంటారు. దీని ఆధారము వద్ద పెక్కు స్పర్శకాలు అమర్చబడి వుంటాయి. పాలిప్ యొక్క గ్రేవేయకం మరియు దేహము నందు విశాలమైన జలర అసారక కుహరము లేదా అంతర్ గుహిక (Coelenteron) ఉంటుంది. పాలిప్ యొక్క దేహ కుడ్యము రెండు స్తరాలతో ఉంటుంది. ఒకటి బహిష్టవము. రెండవది అంతస్త్వచము. రెండింటి మధ్య కణరహిత మధ్య శ్లేష్మస్తరము ఉంటుంది. పాలిప్ మ కప్పి ఉండె పెరిసార్క్ విస్తరించి, ఒక శంఖు ఆకార కప్ వలె వుంటుంది. దీనిని హైడ్రోఫీకా అంటారు. ఇది వర్ణరహితంగా పారదర్శకంగా వుండి, ప్రేరేపించిన పాలిప్ తొందరగా సంకోచించి హైడ్రోఫీకాలోనికి పూర్తిగా లేక సగము వరకు ముడుచుకుంటుంది. అప్పుడు స్పర్శకాలు కురుచనై గ్రేవేయకం పైకి వంగును. హైడ్రోఫీకా అడుగు భాగాన ఒక వలయాకాల అంగుళ్యము వంటి అడ్డముగా నుండి షెల్డ్ (Shelf) పెరుగుతుంది. దీనిపై పాలిప్ ఆధారముతో అమర్చబడును. షెల్డ్




పటం 7.1. ఒబీలియా పాలిప్ (నీలుపుకోత). 1. నోరు. 2. హైడ్రోమా. 3. స్పర్శకము. 4. సీలింటిరన్ 5. అంతస్త్వచము. 7. పెల్వీ. 8. హైడ్రోఫీకా. 9. పెరిసార్క్ ఉపఖండికాలు. 10. సీనోసార్క్. 11. పెరిసార్క్. 12. మధ్య శ్లేష్మస్తరము.

మధ్యనున్న రంధ్రము ద్వారా పాలిష్ యొక్క ఆధార ఫలకము కాండము యొక్క సీనోసార్క్తో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. పాలిష్ లేక శాఖ యొక్క ఆధారము వద్ద నుండు పెరిసార్క్ వర్తులాకార కుంచనాలు, ఒక వలయాకార రూపాన్ని ఆపాదించి తరంగాకార కదలికకు దోహదం చేస్తాయి. (పటం. 7.1).

ఇవి ముఖ్యముగా మాంసాహారులు. హైడ్రావలె వీటిలోని క్షేపియా, నిమాటోడ్లను, పురుగులను భక్షిస్తాయి. దంశకాణాలు ధరించి వున్న స్పర్శకాలు ఆహారాన్ని పట్టి నోటి వరకు తీసుకువస్తాయి. జలర ప్రసరణ కుహరాన్ని అంతర్వేష్టించబడిన అంతస్త్వచ కణాలు జీర్ణ రసాలు ప్రవిస్తాయి. వీటి వలన ఆహారము తునకలుగ విరిగిపోతుంది. ఆహారము కొంతవరకు జలర కుహరమునందు జీర్ణమవుతుంది. అమీబాయిడ్ కణాలు విరిగిన ఆహారపు ముక్కలను ఆవరించి కణ పదార్థములలోనికి తీసుకొనును. కణము లోపల మిగతా జీర్ణ క్రియ సమాప్తమగును. ఇట్లు జీర్ణ క్రియ హైడ్రాలో వలె, కణము వెలుపల మరియు కణము లోపల జరుగుతుంది. పాలిష్ యొక్క కండర సంకోచము మరియు అంతస్త్వచ కశాభము యొక్క కణములు కొట్టుకొనుట వలన జీర్ణింపబడిన ఆహారము ప్రసరించబడును. దీనివలన వివిధ స్తరపు కణాలు ఆహారాన్ని శోషించుకొనును. జీర్ణము కాని అనవసర పదార్థాలు తిరిగి నోటి ద్వారా వెలుపలికి పారవేయబడును. పాయువు లేని కారణాన నోరు ఆహార సేకరణ, మరియు విసర్జన రెండు పనులను వెరవేర్చును.

7.3.2 గోనాంజియం లేదా బ్లాస్టోస్టైల్

గోనాంజియం ఒక సరళమైన జీవకము. నోరు, స్పర్శకాలు లేవు. ఇది పొడవుగా, ఇరుకుగా, బోలుగానున్న గొట్టుములాంటి నిర్మాణము. సరాంతము బల్లపరుపుగా వుండు ఫలకము చేత మూయబడి వుండును. దీనిని గోనోథీకా యనబడు వదులుగా వున్న గాజు వంటి వేన్ ఆకారపు గుళిక పరివేష్టించి వుంటుంది. ఇది అలైంగికంగా పెక్కు మెడుసా మొగ్గలను (లైంగిక జీవకాలు) ఉత్పన్నము చేయును. మెడుసా పూర్తిగా ఎదిగి గోనోథీకాలు పగలటము వలన బయటకు వచ్చి, ఈదును పిత్త సహనివేశము నుండి దూరంగా వెడలిపోతాయి. గోనోథీకా, బ్లాస్టోస్టైల్ మరియు మెడుసాలు అన్నిటినీ కలిపి గోనాంజియం అంటారు (పటం 7.2).




పటం 7.2. ఒబీలియా గోనాంజియమ్. 1. ఉత్పాదకాపుదము. 2. బ్లాస్టోస్టైల్. 3. పెరుగుతున్న మెడుసా మొగ్గలు. 4. సీనోసార్క్. 5. పెరిసార్క్. 6. కాడ.

పాలిష్, బ్లాస్టోస్టైల్ మెడుసా మొగ్గలు మరియు సీనోసార్క్ అన్నిటినీ కణ నిర్మాణము హైడ్రాలో పోలివుంటుంది. బహిష్త్వచము పలుచగా వుండును. ఇందులో పెద్దగా శంఖువలె ప్లంభాకార కండర ఉపకళాకణాలు వుంటాయి. వీని ఇరుకైన లోపలి భాగము నుండి అరేఖత కండరపోగులు బయలుదేరి నిలువుగా

బహిష్కృతానికి మధ్యశ్లేష్మస్తరానికి మధ్యన అమర్చబడి వుంటాయి. వీని సహాయముతో దేహము మరియు స్పర్శకాలు త్వరితగతినీ కురుచనగుటకు వీలుపడును. ఉప కళాకణాల లోపలవైపున మధ్యాంతర కణాలు వుండవు. బహిష్కృతమునుండు దంశకకణాలు (Nematocysts) ఉంటాయి. ఇవి దాడి చేయు అయుధములుగ ఉపయోగపడతాయి. దంశకకణాలు దంశకణ మాతృకల (Nematoblasts) నుండి సీనోఫార్క్ లేక పాలిడ్ యొక్క ఆధార తలము నుండి వుడుతాయి. ఒబీలియా దంశకకణాలు జేస్సెక్రెట్ రకానికి చెంది యుండును. వీనియందు అండాకార గుళిక, పాడువైన దారము, చివరన రంధ్రము, ఆధారం వద్దకంటకాలు కలిగి వుండును.

అంతస్పచము ముఖ్యముగా పెద్దగా వున్న ప్లంభాకార కండర పోషక కణాలు కలిగి వుండును. ఈ కణాలలోపలి స్వేచ్ఛాయుత కొనలు మిథ్యాపాదాలు కలిగి ఉండి అహార పదార్థాలను పట్టుకొని జీర్ణింపచేస్తాయి. అప్పుడప్పుడు మిథ్యాపాదాలున్న చోట పాడువైన కళాభాలు పెరిగి అహార పదార్థముల ప్రసారమునకు సహాయపడతాయి. కండర పోషక కణములందు గ్రంథి కణాలు ఉండి జీర్ణ రసాలను ఆంత్రములోనికి పంపుతాయి.



పటం 7.3. ఒబీలియా మెడుసా ముఖ దృశ్యము. 1. కిరణకుల్య 2. బీజకోశము. 3. గ్రైవేయకము. 4. లిథోసైటులు. 5. స్పర్శకాలు. 6. నోరు. 7. వలయకుల్య.

7.3.3 మెడుసా

ఇది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తికై రూపాంతరము చెందిన జీవకము. ఇది ఒంటరిగా స్వతంత్రముగా ఈదే జీవకము. పూర్తిగా పెరిగినట్టి ఒబీలియా మెడుసా చత్రము లేదా లోతుగల సానరపై గల గంటవలె ఉంటుంది. చత్రము యొక్క కుంభాకారపు వెలుపలి తలాన్ని పరిచత్రము మరియు పుటాకారపు లోపలి తలాన్ని ఉపచత్రముని అంటారు. మెడుసా మొగ్గ బ్లాస్టోస్టైల్ కు పరిచత్రమున అంటి వుంటుంది. ఉప చత్రము యొక్క మధ్య భాగము నుండి గ్రైవేయకం అనే చతుర్భుజాకార నిర్మాణం వ్రేలాడి వుంటుంది. గ్రైవేయకానికి పరాంతాన, చతుర్భుజాకార నోరు నాలుగు నోటి తమ్మెలతో అవరించబడి వుంటుంది. నోరు ఇతర కుహరము లేక జీర్ణాశయములోనికి తెరుచుకొంటుంది. జీర్ణాశయం యొక్క అడుగు భాగం, ఇరుగుగాను,


మన్నితంగానున్న నాలుగు కీరణ కుల్య లోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి సమదూరములో వుంటాయి. చత్రానికి అంచువద్ద 4 కీరణకుల్యలు అంచుకు సమాంతరముగ ఉండు వలయ కుల్యలోనికి తెరుచుకొనును. చత్రము యొక్క అంచులోపలి వైపుకు ముడుచుకొని మడత లేక షెల్ట్ గా ఏర్పడును. దీనిని పటిస్తరము (Velum) అంటారు. పటిస్తరము కలిగి ఉన్న మెడుసాలను క్రాస్టెడోట్ అని వ్యవహరిస్తారు. చత్రము అంచు వెంబడి పెక్కు చిన్న చిన్న స్పర్శకాలు ఉంటాయి. ప్రాథమికముందు వీని సంఖ్య ఎక్కువగుతుంది. ఎనిమిది స్పర్శకాల ఆధారము వద్ద కాల్క్యేరియస్ దేహమొకటి ఒక సూక్ష్మకార గోళాకార తిత్తియందుంటుంది. ఇది లిథోసైట్ (Lithocyte) అనే ఉపాంత జ్ఞానాంగము. ఈ జ్ఞానాంగము ఈదుటకు సంబంధించిన చలనాలను సమన్వయపరుచును. (పటము 7.3)

7.4 జీవితచరిత్ర

పురుష సంయోగ బీజాలు లేక శక్రకణాలు పరిపక్వ స్థితిని చేరుకొన్న ద్వారా నీటిలోనికి వదలబడుతాయి. ఇవి నీటి ప్రవాహము వెంబడి ఆడ సంయోగ బీజాల దగ్గరికి కొని పోబడుతాయి. ఇవట ఇవి అండములను ఫలదీకరణము గావించి సంయుక్త బీజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. సంయోగ బీజము విదళనము చెంది బ్లాస్టులా, ఆ తరువాత గాస్ట్రులాగా మారుతుంది. చివరకు ఇది ప్లానులా ఢింభకముగ ఎదుగును. ప్లానులా ఢింభకము శైలికలు కలిగివుండి ఈదుచు తిరిగే దశ. దీని దేహము పొడవుగా, అండాకారముగ వుండి వెలుపలి భాగము శైలికలతో, బహిష్టకణాలతో లోపలి భాగము అంతస్పచ కణాలతో ఏర్పడి వుంటుంది. ప్లానులా కొంతకాలము ఈదుచు ఏదైనా కలప లేక సముద్రపు మొక్కను అంటిపెట్టుకొని స్థిరపడిపోతుంది. ఇది ఒక సామాన్య పాలిప్ లేక హైడ్రులాలాగ మారుతుంది. సమీపాగ్రాన అంటుకొని వుండుటకు ఫలకము, దూరాగ్రాన గ్నవేయకము మరియు స్పర్శకాల వలయము వుంటాయి. హైడ్రులా వెంటనే పార్వాంగ మొగ్గలు వేయడం ఆరంభించును. ఇట్లు మొగ్గల సంఖ్య పెరుగగనే హైడ్రులా ఒక క్లిష్టమైన ఒబీలియా పహనివేశముగా మారుతుంది. (పటం 7.4)

7.5 మెటా జెనిసిస్

ఒబీలియా జీవిత చరిత్రయందు క్రమబద్ధముగ, సహనివేశ హైడ్రాయిడ్ జీవి మరియు ఒంటరిగా వుండు మెడుసా ఏకాంతరముగ వుంటాయి. హైడ్రాయిడ్ సహనివేశము సిద్ధపడి వుంటుంది. ఇందులో బీజకోశాలు వుండవు. ఇది అలైంగిక కోరకీభవనము ద్వారా మెడుసాలను పెంచుతుంది. మెడుసాలు బీజకోశాలను వృద్ధి చేసి లైంగికంగా శుక్రకణాలు అండాం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతాయి. అండాలు మరియు శుక్రకణాలు ఫలదీకరణము జరిపి కొత్త ఒబీలియాను ఏర్పరచును. ఇట్లు అలైంగిక హైడ్రాయిడ్ తరము లైంగిక మెడుసా తరముతో ఏకాంతరముగ వుంటుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని మెటా జెనిసిస్ అంటారు. దీని ఆధర్మము ఒబీలియా జీవిత చరిత్రమునందు రెండు వృష్టమైన దశలు కలవు. ఒకటి అలైంగిక రెండు లైంగిక. ఇవి ఒకదాని తరువాత ఒకటి క్రమబద్ధంగా ఏకాంతర పడతాయి.




పటం 7.4. ఒకటిలియా జీవిత చరిత్ర. ఎ. ఆలైంగిక దశ, ఒకటిలియా సహస్రవేళం. బి. లైంగిక దశ, స్వేచ్ఛగా తుడుతున్న మెడుసా. సి. శుక్రకణము. డి. అండము. ఇ. సంయుక్త చీజం. ఎఫ్. రెండు కణాల ఫిటి. జి. నాలుగు కణాల ఫిటి. హెచ్. జ్ఞాన్మలా. ఐ. స్వేచ్ఛగా తుడుతున్న జ్ఞాన్మలా ధింభకము. జి. జ్ఞాన్మలా అధస్తలాన్ని అంటి పెట్టుకొనడం. కె. జటివలనే ఎర్పడిన పాలిప్. ఎల్. మొగ్గ తొడుగుతున్న జ్ఞాన్మలా. 1. పాలిప్. 2. మొగ్గ 3. వెలుపలికి వస్తున్న మెడుసా. 4. గోనాంజియమ్. 5. జ్ఞాన్మ పైల్. 6. చీజకణాలు.

7.6 పాలిప్ మరియు మెడుసాల సామ్యాంతరాలు

పాలిప్	మెడుసా
1. ఆధార వృంతము చేత స్థానబద్ధమై వుంటుంది. వృంత రహితమై స్వతంత్రముగ ఈదుచు కదాపి స్వతంత్ర జీవనము గడుపును.	జీవింును.

2. దేహము స్థూపాకారముగ పాడవుగా దేహము సాసర్ ఆకారముగ లేక ఛత్ర రూపంతో వుంటుంది.
3. ఆధార పీఠము అడుగు భాగాన అంటి వుండి, ఆధారతలము పైకి వుండి, గ్రైవేయకము కింది వైపుకు గ్రైవేయకము మీదికి పొడుచుకొని వుంటుంది. వేలాడి వుండును.
4. స్పర్శకాలు సామాన్యముగ 24 వుంటాయి. పిల్లదశలో 16, ప్రాథదశలో ఎక్కువ స్పర్శకాలు వుంటాయి.
5. దేహ నిర్మాణము, కండరాల మరియు నాడీ దేహ నిర్మాణము క్లిష్టంగాను, కండరాలు నాడీ వ్యవస్థ ఎక్కువ అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది.
6. పటిస్తరము వుండదు. పటిస్తరము ఛత్రము అంచును చుట్టి వుంటుంది.
7. మధ్యశ్లేష్మస్తరము మామూలుగా పెరిగి వుండును. మధ్య శ్లేష్మస్తరము చాలా బాగా అభివృద్ధి చెంది వుండును.
8. జ్ఞానాంగాలు లేవు. లిథోసిస్ట్లవలదే ఉపాంత జ్ఞానాంగాలు ఎనిమిది, రేడియల్ స్పర్శకాల అడుగున ఉంటాయి.
9. అంతర్ గుహిక, కిరణ, వలయ కుల్య లేకుండా అంతర్ గుహిక జీర్ణాశయము, 4 కిరణ కుల్యలు ఒక వలయ కుల్యతో వుంటుంది.
10. నోరు వలయాకారంగా వుండును. నోరు చతుర్భుజాకారంగా వుండును.
11. పోషక జీవకము, బీజకోశాలు లేకుండును. ప్రత్యుత్పత్తి జీవకము కిరణ కుల్యలపై నాకు బీజకోశాలు వుంటాయి.
12. ప్రత్యుత్పత్తి అలైంగికంగా కోరికీ భవనము ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక బీజకణాలచే జరుగును. ద్వారా జరుగును.

ఒబీలియా జీవితచక్రం



7.7. స్వపరిశీలన

1. ఒబీలియా త్రిరూప సహనివేశంలో _____ రూపాలుంటాయి.
2. బహురూపక సహనివేశంలోని జీవకాలు సూక్ష్మనిర్మాణరీత్యా _____, క్రియరీత్యా _____ ఉంటాయి.
3. మెటాజెనిస్ పెన్ వల్ల జాతిలో పునరుత్తేజంతోబాటు దాని _____ కు దోహదమవుతుంది.

7.8 సారాంశం

1. ఒబీలియా సముద్రమునందు నివసించు సహనివేశ హైడ్రాయిడ్.
2. ఇది త్రిరూప సహనివేశము. ఇందులో 3 రకాల జీవకాలు అనగా పాలిప్, బ్లాస్టోస్టైల్ మరియు మెడుసా చేరియున్నవి.
3. మూడు జీవకాలు నిర్మాణాత్మకంగా, క్రియాత్మకంగా ఒకదానితో మరొకటి భిన్నంగా వుంటాయి.
4. ఒబీలియా సహనివేశము అలైంగిక పద్ధతితో కొరకీ భవనం ద్వారా పెరుగును. ఇందులోని కొన్ని మొగ్గలు (కోరకాలు) మెడుసాలన బడతాయి. ఇవి బీజకోశాలుగా ఎదుగుతాయి. బీజకోశాలు లైంగిక కణాలను నీటిలోనికి వదులుతాయి. శుక్రకణాలు, అండాలు కలిసిపోయి ఫలదీకరణము చెందిన గుట్టు ఏర్పడుతుంది. దీని నుండి క్రొత్త ఒబీలియా సహనివేశము పెరుగుతుంది.
5. ఒబీలియా జీవిత చక్రము మెటాజెనిసిస్ కు ఒక ఉదాహరణము. ఇందులో అలైంగిక తరము, లైంగిక తరము ఏకాంతరముగా ఉంటుంది.

7.9 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. పాలిప్, బ్లాస్టోస్టైల్, మెడుసా
2. ఏకరూపంగా, విభేదంగా
3. విస్తరణ

7.10 నమూనా ప్రశ్నలు

1. ఈ క్రిందివానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. ఒబీలియా సహనివేశ నిర్మాణమును గురించి వ్రాయుము.
 2. ఒబీలియా జీవిత చక్రమును వివరించి, మెటాజెనిసిస్ అనగానేమి తెలుపుము.
 3. ఒబీలియాలోని పాలిప్ మెడుసాలను సరిపోయిము.
2. ఈ క్రిందివానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. పాలిప్ నిర్మాణమును వివరించండి.
 2. మెడుసా నిర్మాణమును వివరించండి.
 3. బ్లాస్టోస్టైల్ నిర్మాణమును వివరించండి.
 4. పాలిప్, మెడుసా మరియు బ్లాస్టోస్టైల్ యొక్క బహిష్కరణము, అంతస్కరణములందు ఉండే వివిధ రకాల కణాలను వివరింపుము.
 5. పాలిప్ నందు జరుగు పోషణ క్రియను వివరింపుము.

ఆది ఆంధ్రము	: తృతీయ పిండాభివృద్ధిదశలో అంతస్త్వచముతో అంతర్వేష్టింపబడియుండు మధ్య కుహరము. ఇది ప్రాథమిక జీర్ణనాళకుహరాన్ని సూచిస్తుంది.
పంయుక్త బీజరంధ్రము	: ఆది ఆంధ్రమును వెలుపలి భాగముతో కలుపు రంధ్రము. ఇది కొన్ని జీవులందు నోటి రంధ్రముగాను, కొన్నింటిలో పాయువుగా మారును.
బ్లాస్టులా	: పెరుగుదల యందు ప్రారంభదశ. ఈదశ, పిండము బోలుగా లేక ఘనమైన గోళముగా ఉంటుంది.
నిడేరియా	: దంశకణములు కలిగి ఉన్న జంతువులు.
నిడోబ్లాస్ట్	: సీలెంటేరేటాలో నిమాటోసిస్ట్ కల్గిఉండు దంశకణము.
నిడోసిల్	: నిమాటోసిస్ట్ వెలుటకు ఉపయోగపడు ట్రీగర్ వంటి దంశకబాహువు.
సీలెంటేరేట్	: అకేశరక జంతువు. దీనికి నోరు ఆహారనాళము, దంశకణాలు, స్పర్శకాలు ఉంటాయి. పాయువులేదు.
అంతర్ కుహక	: సీలెంటేరేటుల దేహమందలి ఏకైక కుహరము. ఇది ఆహారనాళము మరియు దేహకుహరముగ వ్యవహరిస్తుంది.
ద్విస్తరిత	: బహుస్త్వచము, అంతస్త్వచము అను రెండు జననస్తరాలు కలిగి ఉన్నవి.
జలరప్రసరణ	: జీర్ణము మరియు ప్రసరణ, రెండు విధులను నిర్వర్తించును.
గ్రేస్టులా	: జంతువుల పెరుగుదలయందు రెండవస్తరాల దశ.
హైడ్రాంట్	: హైడ్రాంట్ పాలిప్ యొక్క పుష్పము వంటి పరాంత భాగము. ఇది నోరు స్పర్శకాలు, కలిగి ఆహార సేకరణయందు తోడ్పడును.
హైడ్రోఫీకా	: ఒబీలియావంటి హైడ్రోజోపన్ పాలిప్ ను రక్షణ కొరకు కప్పి ఉంచే 'వేస్' ఆకారపు కప్ప.
కిరణ సౌష్ఠవము	: చక్రమునందు మధ్య అక్షమునుండి కమ్ములు అమరిఉండు పద్ధతి.
బహుస్త్వచము	: గ్రేస్టులా యందుండు వెలుపలి స్తరము. దీనినుండి బాహ్యచర్మము, జ్ఞానాంగాలు మరియు నాడీ వ్యవస్థ ఎదుగుతాయి.
90 అంతస్త్వచము	: పిండ పెరుగుదల ప్రారంభదశ యొక్క తొలి కణస్తరము. దీని నుండి ఆహారనాళము ఎదుగును.


మధ్య క్షేపణము : పీలెంటేరేటా యందు బాహ్య, అంతస్యచాలకు మధ్యనుండు జిగురు పదార్థము.

మెటాజోవా : బహుకణజీవులు

ప్లానులా : పీలెంటేరేటాలో శైలికలతో కప్పి ఉండి స్వతంత్రముగా ఈదుచు జీవించే ధీంభక దళ.

బహురూపకత : విర్మాణాత్మకంగ, క్రియాత్మకంగ వివిధ రకాల జీవకాలు కలిగి ఉండుట.


పటిస్తరము : కణజాలముతో ఏర్పడిన పన్నని పొరవంటి పట్టి.



పటం 8.1. టెమ్నోసెఫాలా ప్రతినిధులు. ఎ. ఉష్ణచేరియా. బి. టెమ్నోసెఫాలా. 1. మోర్ఫాంత భాగము. 2. కన్ను. 3. పరాంత భాగం. 4. స్పర్శకాలు. 5. చూచకము. 6. పేగు. 7. గ్రహణి.

8.4.2. తరగతి డైజీనియా

1. ఇవి అన్నీ అంతర్ వరాన్జ జీవులే.
2. దేహము బల్లవరువుగా ఆకువలె వుంటుంది.



పటం 8.2. డైజీనియా, అప్లెడోగోస్ట్రీయా ప్రతినిధులు. ఎ. ఫాష్యలా హెపాటికా. బి. సెన్ట్రోసోమా. సి. హెగెస్టోమస్. డి. అప్లెడోగోస్ట్రీ. 1. నోరు. 2. అస్య చూచకము. 3. ఉత్పాదక రంధ్రము. 4. అసెటబులమ్. 5. విసర్జక రంధ్రము. 6. పురుష జీవి. 7. గ్రేనకో ఫారిక్ కుల్క. 8. స్త్రీ జీవి. 9. స్త్రీ జీవకోశం. 10. పీతక గ్రంథులు. 11. పేగు. 12. గ్రహణి. 13. ఉదర చూచకము. 14. ముక్కుము. 15. ముఖ సురంగము. 16. విలాలు.

3. వీనియందు సాధారణంగా రెండు చూషకములు వుంటాయి. కంటకాలు వుండవు.
4. ప్రాథ జీవుల బహిశ్చర్యము నందు శైలికలు, రాబైట్లు వుండవు.
5. ఆహార నాళము ఎప్పుడు, ముఖ చూషకము గ్రసని మరియు రెండుగ చీలియున్న ఆంత్రము కలిగి యుండును.
6. విసర్జక వ్యవస్థ ఒక నిలువు కాలువతో, పరాంతాన ఒక విసర్జక రంధ్రము కలిగి వుంటుంది.
7. కొన్ని తప అన్నీ ఉభయలింగ జీవులు. జనన రంధ్రము ఐక్యమై వుంటుంది. యోని వుండదు. గర్భకోశము పెక్కు గుడ్లతో వుంటుంది.
8. జీవిత చరిత్ర క్లిష్టమై రెండు లేక ఎక్కువ అతిథేయులను కలిగి వుండును.

ఉదా. ఫాష్కోలా (Fasciola), సిస్టోసోమా (Schistosoma), పారగోనిమస్ (Paragonimus) (పటం 8.2 ఎ-సి)


8.4.3 తరగతి ఆస్పిడో గ్రాస్టియా

1. ఇవి అంతర్ పరాన్న జీవులు.
2. నోరు గరాటు ఆకారముతో, నోటి చూషకము కలిగి వుంటుంది.
3. సంలగ్న అంగము లేక స్పష్టమైన పెక్కు చూషకాలుగ విభజింపబడి వుంటుంది.
4. బహిశ్చర్యము శైలికలు లేక రాబైట్లు లేక వుంటుంది.
5. ఆహార నాళము ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇందులో నోరు, గ్రసని, మరియు సామాన్య ఆంత్రము ఉంటాయి.
6. ప్రాథ జీవియందు సాధారణంగా ఒక విసర్జక రంధ్రము పరాంతమున వుండును.
7. జీవిత చక్రము వివిధంగా వుంటుంది. ఢింభకాలు అకశేరుక అతిథేయి యందు కోశిభవనము చెంది ఉంటాయి. ప్రాథ జీవులు సకశేరుకములందుంటాయి.

ఉదా. ఆస్పిడో గాస్టర్ (Aspidogaster) (పటం 8.2. డి) కాటిలోగాస్టర్ (Cotylogaster)

8.4.4 తరగతి: మానోజీనియా

1. ఇవి చేప మొవ్వులు లేదా చర్మముపై బాహ్య పరాన్న జీవులుగా నివసిస్తాయి. కొన్ని రేపా కుహరములోను, కొన్ని అరుదుగా చేపల ఆహార నాళంలోను, కొన్ని ఉభయ చరాల, సరీసృపాల గ్రసని, మరియు మాత్ర కోశములందు నివసిస్తాయి.




పటం 8.3. మానోజీనియా ప్రతినిధులు. ఎ. గైరోడాక్టెల్స్. బి. హెలియోమెమ్. 1. నోరు. 2. గ్రసని. 3. పెగు. 4. ఫలదీకరణము చెందిన అండము. 5. మువ్వము. 6. లంగరు. 7. ఉపాంత కొక్కాలు. 8. జెర్మెరియమ్. 9. యోని. 10. పేతక గ్రంధులు. 11. చూషకము. 12. కొక్కాలు.

2. నోరు సాధారణంగా, లేదా నోటి చూషకంతో ఆవరింపబడి లేదా ఒకజత బహిష్కాని చూషకములుగల అన్యకుహారంతో వుంటుంది.
 3. దేహానికి ఉభయ చివరలందు ఒక సంస జనక యంత్రాంగము ఉంటుంది. పూర్వ సంస జనక యంత్రాంగము (పోహప్టర్ (Prothaptor) పరాంత సంసజన యంత్రాంగము ఓపిస్థాప్టర్ (Opisthaptor) అనబడతాయి. పరాంత చూషకము కంటకాలు లేదా నఖముల రూపములో ఒక లంగరుతో ఉంటుంది.
 4. వీని బహిష్కర్మము నందు శైలికలు, రాబ్డైటులు లేవు.
 5. ఆడ, మగ జనన రంధ్రాలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి. ఒకటి లేక రెండు యోనులు ఉంటాయి. గర్భకోశము సరళంగా కొన్ని అండములు మూత్రము కలిగి వుండును.
 6. జీవిత చక్రము సరళమైనది. ఒక ఢింభక దశ ఉంటుంది. మధ్య అతిథేయ ఉండదు.
- ఉదా. గైరోడాక్టైల్స్ (Gyrodactylus), పాలిస్టోమమ్ (Polystomum) (పటం 8.3. ఎ బి).

8.4 తరగతి సెస్టోడా

1. ఇవి సామాన్యముగ బద్దె పురుగులనబడతాయి. వీని దేహము బల్ల పరువుగా రిబ్బన్ వలె వుంటుంది.
2. ఇవి చేపల నుండి క్షీరదాల వరకు అన్ని సకశేరుకాలలో అంతర్ పరాన్న జీవులుగ వుంటాయి.
3. కొన్ని విడిచి అన్ని బద్దె పురుగులందు స్కోలెక్స్ (Scolex) మెడ (Neck) మరియు స్ట్రోబిలా (Strobila) లేక దేహము కలిగి ఉంటాయి. దేహము వివిధ ఇండితములుగ విభజింపబడి వుండును. వీనిన గ్రీవ ఇండితాలని అంటారు.
4. సంలగ్న అంగము దేహానికి పూర్వభాగాన ఉంటుంది. దీనిని స్కోలెక్స్ అంటారు.
5. బహిష్కర్మము నందు శైలికలు రాబ్డైటులు ఉండవు. కాని ఇందులో సూక్ష్మ అంకురికలు ఉంటాయి.



పటం 8.4. ఎ. దీనియా. బి. ఎక్సెనోకాకస్. 1. స్కోలెక్స్. 2. మెడ. 3. స్ట్రోబిలా. 4. అపరిపక్వ గ్రీవాభండతము. 5. పరిపక్వ గ్రీవాభండతము. 6. కొల్లెములు. 7. చూషకము. 8. జనన రంధ్రము. 9. శాఖలుగా మన్న గర్భాశయము. 10. పరిపక్వ భండతము.

6. నోరు, అహార నాళము, ప్రసరణ వ్యవస్థ మరియు నిర్దిష్ట విసర్జక వ్యవస్థ ఉండవు.
7. నాడీ వ్యవస్థ ఒక జత నాడీ సంధులతోను, రెండు పార్శ్వ విలుపు నాడీ దండములు కలిగి ఉంటుంది.
8. జ్ఞానాంగములు లేవు.
9. సెస్టోడులు సాధారణంగా ఉభయలింగ జీవులు. ఒక గ్రీవా ఇండిరమునందు ప్రత్యుత్పత్తి అంగముల పూర్తి సమూహము వుంటుంది.
10. గ్రీవ ఇండిరమునందు అడ, మగ రెండు ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఉంటాయి.
11. ఆత్మఫలదీకరణము జరుగుతుంది.
12. గ్రుడ్డు నుండి ఆంకోస్పెయర్ అను (Onchosphere) అను కొక్కెములుగల దశ బయలుదేరుతుంది.
13. జీవిత చక్రము వివిధ జీవులందు కొద్ది తేడాతో ఉంటుంది. ఒకటి లేక ఎక్కువ మాధ్యమిక అతిథేయులు ఇందులో పాల్గొంటాయి.

ఉదా. టేనియా (Taenia), ఎక్సైన్కోకస్ (Echinococcus) (పటం 8.4. ఎ.బి.) డైఫిల్లోబోత్రియం (Diphyllobothrium)

8.5 స్వపరిశీలన

1. పృష్టోద్భరంగా బల్లపరుపుగాను, శరీరకుహర రహితంగాను, ద్విపార్శ్వసౌష్ఠవంతోను ఉండే జీవులను _____ వర్గంలో చేర్చినారు.
2. పలుచగా, బల్లపరుగా ఆకు ఆకారంతో ప్లాకోలు, పలుచగా పొడవుగా, ఇండితాలతో _____ ఆకారంతో బద్దె పాములు ఉంటాయి.

8.6. సారాంశం

1. ప్లాటేహెల్మింథీస్ బల్లపరుపు దేహముగల పురుగులు.
2. ఇందులో ప్లానేరియన్లు, బల్లపరుపు పురుగులు, కొంత బద్దెపురుగులు చేరియున్నవి.
3. ఇవి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవ, కుహర రహిత, బహుకణ జీవులు.
4. అభివృద్ధి చెందిన అంగ వ్యవస్థ కలిగి ఉంటాయి.

8.7 సారాంశం

1. ప్లాటేహెల్మింథీస్ బల్లపరుపు దేహముగల పురుగులు.
2. ఇందులో ప్లానేరియన్లు, బల్లపరుపు పురుగులు, కొంత బద్దెపురుగులు చేరియున్నవి.
1. ఇవి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవ, కుహరరహిత, బహుకణ జీవులు.
4. అభివృద్ధి చెందిన అంగ వ్యవస్థ కలిగి ఉంటాయి.

8.7 స్వపరిశీలనంజవాబులు

1. ప్లాటే హెల్మింథీస్
2. ఆకు రిబ్బన్, టేప్

8.8 నమూనా ప్రశ్నలు

1. ఈ క్రిందివానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. ప్లాటేపెర్మింథీస్ సామాన్య లక్షణాలు వివరించండి.
 2. సెస్టోడా సామాన్య లక్షణాలను వివరించి, కొన్ని ఉదాహరణలిమ్ము.
2. ఈ క్రిందివానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
 1. తరగతి టర్బెల్లేరియా ముఖ్యమైన లక్షణాలను వివరించండి.
 2. తరగతి డైజీనియా ముఖ్యమైన లక్షణాలను వివరించండి.

భాగము—9 ముఖ్యమైన ట్రిమిటోడ్ మరియు సెస్టోడ్ పరాన్న జీవులు

విషయక్రమము

- 9.1. ఉద్దేశ్యము
- 9.2. ఉపోద్ఘాతము (ట్రిమిటోడ్ పరాన్నజీవులు)
- 9.3. ఫాస్టోలా హెపాటికా
 - 9.3.1. జీవిత చరిత్ర
 - 9.3.2. రోగ లక్షణాలు
 - 9.3.3. నియంత్రణ
- 9.4. సిస్టోసోమా హిమటోలియం
 - 9.4.1. జీవిత చరిత్ర
 - 9.4.2. రోగ లక్షణము
 - 9.4.3. నియంత్రణ
- 9.5 ఉపోద్ఘాతము — సెస్టోడ్ పరాన్న జీవులు
- 9.6. టీనియా సోరియం
 - 9.6.1. వ్యాధి లక్షణాలు.
 - 9.6.2. నియంత్రణ
- 9.7. ఎక్టెవోకోకస్ గ్రాన్యూలోసస్
 - 9.7.1. జీవిత చక్రము
 - 9.7.2. రోగ లక్షణములు
 - 9.7.3. నియంత్రణ
- 9.8 స్వపరిశీలనం
- 9.9. సారాంశం
- 9.10. స్వపరిశీలనం—జవాబులు
- 9.11. నమూనా ప్రశ్నలు
- 9.12. పదకోశం

9.1 ఉద్దేశ్యము

ఇందులో వివిధ సకళేరుకాలందుండు ముఖ్య పరాన్న జీవులను మరియు దాని వలన కలుగు వ్యాధులను వివరించవలెనది. దీనితోపాటు వాని పరాన్న జీవన అనుకూలవాలను చర్చించవలెనది.

9.2 ఉపోద్ఘాతము—ట్రిమిటోడ్ పరాన్నజీవులు

1. డైజీనియా యందు అనభాసిని కంటకయుతమైనది. దీని అడుగున, అడ్డు, విలుపు మరియు డయగోవల్ కండరాల స్త్రాలు ఉంటాయి.
2. అంతరాంగాలు, పదులుగానున్న మృదు కణజాలమునందు అమర్చబడి వుంటాయి.
3. జీర్ణ వ్యవస్థ యందు కండరయుత గ్రహవి, రెండు అంధనాళములు కల ఆంత్రము వుంటాయి. కొన్ని ఫాస్టియాల హెపాటికా వంటి పెద్ద ప్లూక్ లందు అంధనాళాలు శాఖోపశాఖలుగ విభజింపబడి ఉంటాయి.

సెస్టిముల అంధనాళాలు పరాంతమున కలిసిపోయి ఒక కాండముగ ఏర్పడుతాయి. కొన్నిటిలో మాత్రము అంధనాళాలు వెలుపలికి తెరుచుకుంటాయి.

4. నాడీ వ్యవస్థ ఎదిగి వుండదు. ఇందులో ఒక చిన్న నాడీ పంధి, కొన్ని నిలుపు నాడులు వుంటాయి.
5. విసర్జక వ్యవస్థ, జ్వాలా కణములందు అంతమయ్యే శాఖలుగల గొట్టాలతో ఏర్పడును. ముఖ్య ప్రోగుచేయు గొట్టాలు, పరాంతాన గల ఒక కోశములోకి తెరుచుకొంటాయి. డైజెనిటిక్ ఫ్లాకోల విసర్జక వ్యవస్థ వర్గీకరణమునందు గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నది.
6. ఒక సెస్టి స్టోమియాటిడీ వంశమునందు తప్ప అన్ని ప్లాకులందు ఆడ మగ ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు ఒకే జీవీయందు ఉంటాయి.
7. మగ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ యందు రెండు ముష్కాలు, రెండు శుక్రనాలికలు, ఒక శుక్రవాహిక, ఒక శుక్రాశయము, ఒక స్థలన నాళము వుంటాయి. శుక్ర వాహిక అంత్య భాగము కండరయుత ఉపాంగముగ రూపాంతరము చెంది ఉంటుంది. శుక్రాశయము స్థలన నాళములోనికి తెరుచుకొని చివరకు జననాశయములోనికి చేరుకుంటుంది. సిరెస్ లేక ఉపాంగము సంపర్కాంగముగ పనిచేస్తుంది.
8. ఆడ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థయందు ఒక స్త్రీ బీజకోశము, ఒక స్త్రీ బీజవాహిక, రెండు విటెలేరియా, వాని నాళాలు, ఒక విలుప్తయోవి (లారల్ నాళము), ఒక శుక్రాధానము, గర్భాశయము, ఊటైవ్ మరియు మెహిస్ గ్రంథి ఉంటాయి. గర్భాశయము, ఊటైవ్ నుండి బయలుదేరి జననాశయమునందు అంతమవుతుంది. పునరుత్పత్తి నాళము ఉదర తలాన ఉదూళలమునకు దగ్గరగ తెరుచుకుంటుంది.
9. డైజీనియా జీవిత చక్రము రెండు వేరు వేరు అతిథేయిలందు జరుగుతుంది.

1. ముఖ్య అతిథేయి సామాన్యముగ మానవుడు. (ప్రాథమిక జీవి ముఖ్య అతిథేయిలో నివసించును.
2. మాధ్యమిక అతిథేయి మలస్కా వర్గమునకు చెందిన మంచివీటి నత్తగుల్ల. ఇందులో ధీంభకాల పెరుగుదల జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి రెండవ మాధ్యమిక అతిథేయి (చేప లేక పీత) కోశీభవనమునకు అవసరమవుతుంది. ముఖ్య అతిథేయి నుండి గుడ్లు బయటపడి నీటిని ప్రవేశిస్తాయి. గుడ్లు పొదిగి, వ్యతంత్రముగ ఈదుచు బ్రతికే శైలికామయ ధీంభకములు ఎదుగుతాయి. ఈ ధీంభకాన్ని మిరాసిడియం అంటారు. మిరాసిడియం సరైన మాధ్యమిక అతిథేయిని కలిసిన (నత్తగుల్ల లేక మలస్కా) పెరుగుదల కొనసాగుతుంది.

9.3 ఫాష్యోలా హెపాటికా

సాధారణ నామము: గొర్రె కాలేయ పురుగు లేదా సాధారణ కాలేయ పురుగు.

ఫాష్యోలా హెపాటికా గొర్రె కాలేయము నందలి ప్రైత్య నాళములందు నివసించే పరాన్నజీవి జీవి (మేకలు, పశువులందు సయితము)

9.3.1 జీవిత చరిత్ర

ఫాష్యోలా తన జీవిత చక్రమును రెండు విభిన్న అతిథేయిలందు కొనసాగిస్తుంది.

ముఖ్య అతిథేయి: గొర్రె, మేక, పశువులు మరియు మానవుడు.

మాధ్యమిక అతిథేయి: లిమ్నియా ప్రజాతికి చెందిన నత్తగుల్ల.

ముఖ్య అతిథి మలము ద్వారా గుడ్లు దేహము వెలుపలికి వస్తాయి. నీటి యందు ఈ గుడ్లు పరిణతి చెందుతాయి. గుడ్లు అండాకారంగా గోధుమ వర్ణంతో 140 మైక్రాన్ల పరిమాణం కలిగి వుంటాయి. రెండు మూడు వారముల కాలములో గుడ్లు లోపల శైలికామయ మిరాసిడియం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అండ కర్పరపు ఒకవైపున గల మూత తెరుచుకొనడంతో మిరాసిడియం ధీంభకము వెలుపలికి వస్తుంది. మిరాసిడియం

4.5.3 మలేరియా లక్షణములు

మలేరియా జ్వరము రావడానికి ఒకటి రెండు రోజుల పూర్వము ఈ క్రింది లక్షణములు రోగిలో కనబడుతాయి.

- ఎ) అలసిపోవుట మరియు పదే పదే అవలంతలు రావడం
- బి) పైత్యము, తలనొప్పి మరియు కండరాల నొప్పి
- సి) మలబద్ధకము

4.5.4 నివారణ చర్యలు

మలేరియాను అదుపులో పెట్టుటకు కొన్ని చర్యలను అవలంబించ వలయును. మొదటి చర్యయందు వీని నాహకాలైనట్టి దోమలను లేకుండా చేయవలయును. దేహ పరిశుభ్రత, ఆరోగ్య రక్షణను మెరుగుపరచ వలెను. ఈ చర్యలను ఈ క్రింది విధముగా విభజింపవచ్చును.

దోమల నివారణ

1. ఢింబక నాశక చర్యలు

ఇండ్ల చుట్టూ ప్రాంతము శుభ్రము చేయుట మరియు పెరుగుదల స్థలాలను శుభ్రము చేయుట. దోమల ఢింభకాలను నాశనము గావించి కొత్త తరాలు ఎదగకుండా చేయవలెను. దోమ ఢింభకాలను పారద్రోలుటకు ఈక్రింది చర్యలను గైకొనవలెను.

1. ఇండ్ల చుట్టూ ప్రాంతాలను శుభ్రపరిచి అదుపులో ఉంచుట
2. రసాయనిక అదుపు
3. జీవశాస్త్ర సంబంధ అదుపు

చుట్టూ ప్రాంత అదుపు పద్ధతియందు దోమలు పెరుగు స్థలాలను నాశనము గావించుట చేరిఉన్నది. దీనిని మూలాధార అణత అనవచ్చును.

రసాయన చర్య అనగా పెట్రోలియం, కిరోసిన్, క్రూడ్ ఆయిల్ మొదలగునవి నీటిపై వెదజల్లి దోమల ఢింభకాలను మరియు ఇతర పెరుగుదల దశలను నాశనము చేయుట. డి.డి.టి., డి.డి.డి., బి.హెచ్.సి. మొదలగు స్ప్రేలు నీటిని విషపూరితం చేస్తాయి. జీవశాస్త్ర సంబంధ పద్ధతిలో కొన్ని ఢింభక నాశన చేపలు చేరియున్నవి. చేపలయందు మిన్నోన్, ట్రాట్, గప్పీన్, గాంబునియా చేరియున్నవి. కొన్ని క్రిమి భక్ష వృక్షములు ఉ.బ్లాదర్ వర్మ్, క్రిముల ఢింభకాలను నాశనము చేయును. పాండిచ్చేరిలో ఉన్న Vector Control Research Centre పరిశోధన కేంద్రమందు నీటినల్లుల ఒకప్రజాతిని కనుగొన్నారు. ఇది దోమగుడ్లను, ఢింభకాలను భక్షించి వీనిని నాశనము చేయును.

వైద్య జీవుల నాశన చర్యలు

1. స్థానిక స్ప్రేలు
2. ఆకాశ స్ప్రేలు
3. పొగపెట్టుట
4. జన్యుసంబంధ అదుపు

దోమల నివారణకు డి.డి.టి. గెమెక్సిన్, ఫైరిథ్, మలథియాన్, క్లోర్డేన్ మొదలగు ప్రేలు చాలా ఉపయుక్తమైనవి. నేస్తా ఉత్పన్నమైన క్రిసాల్, తారాకరు ఫార్ మొదలగునవి మరియు వెల్లుల్లి ఉత్పన్నాలు లాభదాయకమైనవి. జన్యుసంబంధ చర్యలందు హాంబర్గ్ మగ దోమలు మరియు ఆడ దోమలకు మధ్య సంపర్కము జరిపిన వానివలన ఉత్పన్నమగు గుడ్లు పొడగవు.

దోమకాటు నుండి రక్షణ

అయినంతవరకు మనము దోమకాటు నుండి తప్పించుకొనవలెను. దీని కొరకు దోమతెరలను, దోమలను తిరగకొట్టు మందులను వాడవలెను.

మలేరియా జ్వర పీడితులను లెక్కించుటకు రక్తమును సేకరింతురు. రక్తమునందు పరాన్నజీవి ఉనికిని కనుగొనుటకు ప్రత్యేకంగా పరీక్షలు సలుపవలెను. దీని కొరకై ఇల్లిల్లు తిరిగి రక్తము సేకరించవలెను.

4.5.5 ఉపచారము

వ్యాధి నిరోధక చర్యలు అన్నీ నిష్ప్రయోజకములై మానవుడు మలేరియా పరాన్నజీవుల దాడికి గురియైనచో వెంటనే Prophylactic మందులను వాడవలెను. క్వినైన్ తో తయారుచేసి వివిధ పేర్లతో అమ్ముటజే Resochin, Choloroquin, Barigo మొదలగు ఎక్కువ వాడుకలోనున్న మందులను నోటిద్వార లేక ఇంజక్షను ద్వార రోగికి ఇవ్వవలెను. జ్వరము వచ్చిన వెంటనే విరేచనమునకు ముందు దాని పిదప వేడిపాలు లేక టీ తాగించవలెను. తీవ్రమయిన జ్వరము వచ్చినపుడు అనగా వేడి దశయందు Aspirin లేక Analgesics ఇవ్వవలెను. సులభముగా జీర్ణమయ్యే ఆహారమును మాత్రమే వాడవలెను. దీర్ఘకాల మలేరియా వలన రక్తహీనత సంభవించును. ఇట్టి పరిస్థితులందు ఇనుముతో కూడిన టానిక్ మందులు సేవించవలెను.

4.6 స్వపరిశీలన

1. లీష్మానియా జీవితచక్రం రెండు అతిథేయులతో పూర్తి అవుతుంది. (ప్రాథమిక అతిథేయి _____ మరొక అకస్మేరుక అతిథేయి _____)
2. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా సాధారణంగా కలిగి _____ అనే వ్యాధిని కలిగించే పరాన్నజీవి.

4.7 సారాంశం

1. కాలాజార్ ఉష్ణమండల వ్యాధి. ఇది లీష్మానియా దొనోవాని వలన సంభవించును.
2. ఇది మానవుని యందు అంతర్ పరాన్నజీవి.
3. సాండ్ ఫ్లై, ఈ పరాన్నజీవికి వాహకము.
4. దీని జీవిత చక్రము మానవుడు మరియు ఈగయందు పరిసమాప్తము చెందును.
5. కాలాజార్ మలేరియా వంటి వ్యాధులను కలుగజేయును.
6. సాండ్ ఫ్లై నుండి దూరముండ వలయును. తగిన చికిత్స పొందవలయును.
7. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా మానవుని ఆంత్రము నందు అంతర్ పరాన్నజీవిగా జీవిస్తూ అమీబియాసిస్ అను వ్యాధిని కలుగజేయును.

8. జీవిత చక్రము మానవునియందే పరిసమాప్తము చెందును.
9. అమీబియాసిస్ వలన రక్తము, చీము, విరేచనములు, నీటి విరేచనములు, కాలేయము నందు పుండ్లు మరియు ఇతరములు కలుగును.
10. వ్యక్తిగత మరియు సామూహిక ఆరోగ్య విషయములందు తగిన చర్యలు అవలంబించ వలయును.
11. తగిన ఔషధములు సేవించవలయును.
12. మలేరియా, తెలిసిన అన్ని వ్యాధులతోను పురాతనమైనది. ఇది ప్లాస్మోడియం జాతికి చెందిన నాలుగు ప్రజాతుల వలన సంభవించును.
13. ఆడ అనాఫిలిస్ దోమవాహకము.
14. అలైంగిక చక్రము మానవుని ఏర రక్తకణాల మరియు కాలేయమునందు, లైంగిక చక్రము జీర్ణాశయమునందు జరుగును.
15. మలేరియా వ్యాధివలన చలి, అతిజ్వరము, చెమట పట్టుట జరుగును. దీనివలన రక్తము క్షీణించును.
16. దీని నిర్మూలన దోమలను, వాని దీంభకాలను నాశనముగావించుట వలన మాత్రమే సాధ్యమగును. ఇదికాక ఇంకా ఎన్నియో రక్షణ చర్యలు ఉన్నవి.
17. క్వివైన్ పదార్థములు ఎంతయో లాభదాయకము.
18. ఆంధ్రప్రదేశ్ నందు వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య ఇప్పటికి వేలతో ఉన్నది. దీని నిర్మూలనకై పెక్కు ప్రణాళికలు ప్రవేశపెట్టబడినవి.

4.8 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. మానవుడు ఫ్లిచోటమస్
2. అమిబిక్ డిసెంట్రి

4.9 నమూనా ప్రశ్నలు

I ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. ఎంటమీబా హిస్టాలెటికా జీవిత చక్రాన్ని వివరించి, వ్యాధి గ్రస్తత గురించి వ్రాయండి.
2. అమీబియాసిస్ వ్యాధి ఏవిధంగా వస్తుంది? దాని లక్షణాలు, నివారణ పద్ధతులు గురించి తెలపండి.
3. ప్లాస్మోడియం జీవిత చక్రాన్ని గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయండి.
4. మానవునిలో ప్లాస్మోడియం జీవిత చక్రాన్ని వివరించండి.
5. మలేరియా పరాన్నజీవి లైంగిక చక్రాన్ని వివరించండి.
6. మలేరియా వ్యాధి, దాని లక్షణాలు, నివారణ చర్యలు, ఉపచారము వ్రాయండి.

II. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. కాలాజార్ గురించి వ్రాయండి.
2. కాలేయంలో ప్లాస్మోడియం చక్రాన్ని వివరించండి.
3. ఎంటమీబా హిస్టాలెటికా నిర్మాణము
4. ప్లాస్మోడియం ఎరిథ్రోసైటిక్ చక్రము
5. మలేరియా నివారణ పథకాలు

4.10 పదకోశము

అచోరర్	: జంతువు నోటికి దూరము నుండి తలము (అచో = నుంచి, ఓరిస్ = నోడు)
పుండు	: దేహకర్మజాలము ఎర్రనై ఉబ్బులు, అచ్చులు బాష్టీరియా చర్యవలన కణములు నశించి, దీనిలో నిండిన కుహరన్ని ఏర్పరచుట.
వికణ	: క్రియాత్మక ఏకకణజీవి
తరముల ఏకాంతరత	: ఒక జీవి జీవిత చరిత్రయందు లైంగిక అలైంగిక రెండు తరాలు ఒకదాని తరువాత రెండవది ఉండుట
రక్తహీనత	: ఎర్రరక్త కణములందు హీమోగ్లోబిన్ లోపించుట. దీనివలన దేహము తెలుపుగా నగును.
అనాల్ జెసిక్	: నొప్పిని చంపు లేక అణచే మందు
అనిమల్ క్యూల్	: సూక్ష్మంగా ఉండి సూక్ష్మ దర్శిని సహాయమున కనబడు జంతువులు
అంటిబయాటిక్	: ఫంజి మరియు బాష్టీరియాంచే ఉత్పన్నము చేయబడు రసాయనిక పదార్థాలు. వీటిని పరాన్న జీవుల సంక్రమణాన్ని అణుచుటకు వాడుదురు.
అపెండిక్స్	: మానవుని పెద్దప్రేగు నుండి పేరిగే బాహ్యవృద్ధి
ద్విధా విచ్చిత్తి	: అలైంగిక ఉత్పత్తి. ఇందులో కణము రెండు సమాన భాగములుగా విభజన చెందును.
ఎముకల మూలుగ	: ఒకవిధమైన పసుపు పచ్చని కణజాలము. ఇది పెద్ద ఎముకల మధ్య కుహరము లోపల ఉండును. ఎర్ర రక్తకణాలు, కొన్ని తెల్ల రక్త కణాలు ఇందులో పెరుగును.
బ్లైఫెర్ ప్లాస్ట్	: కొన్ని ప్రోటోజోవాలుందు కళాభ ఆధారము వద్ద ఉండు సూక్ష్మ నిర్మాణము. దీనిని పారాజెనెర్ దేహమని కూడా అంటారు. దీని పని అనిశ్చితమైనది.
బ్రాకిష్	: కొంచెము ఉప్పుగా ఉండునది.
కాల్కేరియన్	: (కాల్కూరన్ = మన్నము) కాల్షియం కాంప్లెక్స్ తో చేయబడిన
తైలికలు	: (లా. సీలియం = కంటిరెప్ప) అతిసూక్ష్మమైన పోగులు. ఇవి అయిబద్ధముగా కదిలి చలనమును ఏర్పరచును.
గుడ్లతిత్తి	: వానపాముల గుడ్ల రక్షణకై ఏర్పడిన కప్పడము మరియు కీటకాల ప్యాపాదశను కప్పి యుంచునది.
పహనివేళ	: కొన్ని జీవులు ఒకచోట కలసి ఉండట
మలబద్ధకము	: మల విసర్జన క్రమబద్ధముగా లేక, విసర్జనకై శ్రమ కలుగుట

సంపర్కము	: (లా. కాపులా = కట్టివేళ)
క్రస్టేషియన్	: ఆర్థోడెక్స్ యొక్క ఒక తరగతి. ఇది నీటిలో నివసిస్తాయి. ఉదా. పొయ్య, ప్రింప్, పీత మొ.
చర్మము	: చర్మపంబంధ
డిఫికేషన్	: (లా. డిఫికేషన్ = మలము వెడలగొట్టుట) మలవిసర్జన
డెసికేషన్	: పదము తీసివేయు ప్రక్రియ
డయాటెస్	: ఏకకణ ఆర్థి
వ్యాపనము	: ఒక మార్గమును నుండి రెండవ మార్గమును లోనికి ద్రవాలను లేక వాయువులను వినరుట లేక పరచుట
ద్విరూపకత	: రెండు స్పష్టమైన రూపాలు కలిగిఉండుట
ద్వయస్థితిక	: (గ్రీ. డిప్లాస్ = ద్వయము) క్రోమోజోముల పూర్తి సంఖ్య ఉండుట
అంతర్ పరాన్నజీవి	: అతిథేయ దేహముతో జీవించు పరాన్నజీవి
ఎండో ఫీలియల్	: (గ్రీ. ఎండోన్ = లోపల, దీరె = సూచకము) హృదయము, రక్తనాళము మరయు శోష నాళముల అంతర్భాగాన్ని అంతర్వేష్టించు శల్కల ఉపకళ.
అంత్రిక కళాభము	: (గ్రీ. ఎంటెరాన్ = ఆహార నాళము) ఆహార నాళ సంబంధ కణము నుండి బయలుదేరే పొడవైన కణ పదార్థ పోగు. ఇది శైలిక కన్నా చిన్నగా ఉండి జీవి ముందుకు త్రోయుటకు లేదా చిన్నని రేణువును ఆకర్షించుటకు.
సంయోగ బీజము	: మగ లేక ఆడ ప్రత్యుత్పత్తి కణము
సంయోగ బీజ మాతృక	: సంయోగ బీజము యొక్క మాతృకణము
ఉనికి	: ఒక వృక్షము లేక జంతువుండు చోటు లేక వాతావరణము
రక్తకుహరము	: ఆర్థోపోడులందు రక్తముతో నిండియున్న దేహ కుహరము
హిమోగ్లోబిన్	: సకరేరుకాల రక్తమునందుండు ఇనుముతో సంబంధముకల వర్ణకము. ఇది శ్వాసక్రియ యందు సహాయపడును.
ఏకస్థితిక	: కణమునందు క్రోమోసోముల సంఖ్య సగము ఉండుట
పాదఫీయ భక్షణ	: వృక్షముల వలె ఆహారము గ్రహించుట
జాంతవ భక్షక	: (గ్రీ. హోలో = పూర్తిగా, జావన్ = జంతువు) జంతువుల వలె ఆహారము గ్రహించుట
కారియోజోస్	: విశ్రమించు కేంద్రకములోని క్రొమాటిన్ పదార్థ సమూహము
కణాంతస్త	: కణములోపల
లెప్టోమోనాడ్	: కళాభయుత పరాన్నజీవియైన లీప్టోనియా పెరుగుదల దశ. ఇది లెప్టోమోనాడ్ ప్రజాతిని పోలి యుండుంది.

ల్యూక్సేటు

: (గ్రీ. ల్యూక్స్ = తెల్లని, కైటోస్ = బొటం) వర్ణరహిత తెల్లని రక్తకణము. ఇది ఎముకమూలుగ, శోషరస వ్యవస్థ మరియు జాలక ఎండో థీలియల్ వ్యవస్థయందు పెరుగును.

ల్యూకోపేనియా

: సామాన్య సంఖ్యకన్నా తెల్ల రక్తకణముల సంఖ్య తగ్గుట

మైక్రాన్

: ఒక సెంటీమీటరులో వెయ్యవ వంతు

పనువిభజన

: కణవిభజన యొక్క సాధారణ పద్ధతి అప్రత్యక్ష విభజన పద్ధతి

మిక్స్ట్రోఫిక్

: జంతువు మరియు వృక్షముల వలె రెండు విధాలుగా పోషణ జరుగుట

మానోజెనెటిక్

: ఒకే అతిథేయి యందు జీవన చక్రము పూర్తి చేసుకొనుట

మయోసీవ్స్

: జీవి యొక్క భాగములందరి కణజాలాలు క్షీణించి నశించుట

నెక్రోసిస్

: ఆహారము గ్రహించి, జీర్ణము, శోషణము మరియు స్వాంగీకరణము జరుగుట

పోషణము

సర్వభక్షక

: మాంసము, శాఖములు మరియు ఇతర అన్ని రకముల పదార్థములు భజించుట

సూక్ష్మ అంగము

: కణమునందలి సూక్ష్మభాగము. ఇవి ఒక ప్రత్యేక పని నిర్వహించును. ఉదా. కశాభము, శైలిక

ద్రవాభిసరణ క్రమత

: జీవి దేహమునందు నీటిని ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంచుటకు కావలసిన యంత్రాంగము. ద్రవాభిసరణచే నీరు దేహములోనికి వెలుపలికి విరాటంకంగా ప్రవేశించుటను నిరోధించుట.

వ్యాధి జనక

: వ్యాధిని జనింపజేయు సూక్ష్మజీవి

రక్షకత్వచము

: కొన్ని ప్రోటోజోవాల వెలుపలి భాగాల రక్షణకై ఏర్పడిన కఠినమైన జీవపదార్థత్వచము

ప్లాస్మాలెమ్మా

: కణము వెలుపలి హద్దును ఏర్పరచే కణపదార్థ స్తరము

ప్రాథమిక అతిథేయి

: పరాస్థజీవి తన ప్రాథ జీవితము ఎక్కువ కాలము ఏదానిలో గడుపునో దానిని ప్రాథమిక అతిథేయి అంటారు.

ప్రోప్లాప్సిన

: రోగము రాకుండ తీసుకునే చర్యలు

ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్

: మాంసకృత్తులను జీర్ణము చేయు ఎంజైమ్

మిథ్యాపాదము

: (గ్రీ. నూడ్ = మిథ్యా; పాన్ = పాదము). జీవపదార్థముతో ఏర్పడిన చలనాంగము. దీనికి ముడుచుకొని సాగుశక్తి యుండుటను ప్రోటోజోవాలో కశాభము యొక్క అధార కణికను, కేంద్రకముతో లేక పారా బేసల్ దేహముతో కలుపు జీవ పదార్థ తంతువు.

పూతికాహార

: కుళ్ళించున్న సేంద్రియ పదార్థాలను భుజించుట

ప్రోజోగాని

: ప్రోటోజోవా యందు జరుగు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. ఇవి బహుధా విచ్ఛిత్తి వలన జరుగును.

ద్వితీయ అతిథేయ

: పరాన్నజీవి కొలదికాలము (ఫింభక దశ) మాత్రము ఉండునట్టి అతిథేయి. ఆ తరువాత ముఖ్య అతిథేయిని చేరుకొనును.

వృంత రహిత

: వృంతము లేకయుండి, వెడలైన అధారముతో అంటియుండుట.

సిరికాన్

: సిరికాతో నిర్మితమైన

శుక్రకణ మారులా

: గోళాకార కణ సముదాయము దీని నుండి శుక్రకణాలు పెరిగి వేరుగును.

సింగెమీ

: అడ మగ సంయోగ కణముల లైంగిక కలయిక

BRAOU

భాగము - 5 పారిఫెరా - సామాన్య లక్షణాలు - వర్గీకరణము మరియు సైకాన్ ఒక నమూనాజీవిగా చదువుట

విషయక్రమము

5. 1 ఉద్దేశ్యము
5. 2 ఉపోద్ఘాతం
5. 3 సామాన్య లక్షణాలు
5. 4 వర్గీకరణ
 - 5.4.1 తరగతి 1 కాల్కేరియా
 - 5.4.2 తరగతి 2 హెక్టాక్టినెల్లాడా
 - 5.4.3 తరగతి 3 డెమోస్పాంజియా
5. 5 సైకాన్
 - 5.5.1 ఉనికి
 - 5.5.2 బాహ్యరూపము
 - 5.5.3 నూక్కు నిర్మాణము
5. 6 అస్తిపంజరము
5. 7 కుల్యావ్యవస్థ
5. 8 ప్రత్యుత్పత్తి
 - 5.8.1 అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి
 - 5.8.2 లైంగికోత్పత్తి
5. 9 పెరుగుదల
- 5.10 రూపక్రియ
- 5.11 స్వపరిశీలనం
- 5.12 సారాంశము
- 5.13 స్వపరిశీలనంజవాబులు
- 5.14 నమూనా ప్రశ్నలు
- 5.15 పదకోశము
- 5.16 పరిశీలన గ్రంథాలు

5.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠమునందు పారిఫెరా వర్గీకరణము, సామాన్య లక్షణములు చర్చించబడినవి. ప్రతి తరగతి సామాన్య లక్షణాలు, ఉదాహరణలు వివరించడమైనది. వర్గము యొక్క ప్రతినిధిగా సైకాన్ వివరించబడినది. సైకాన్ బాహ్య లక్షణములను, అంతర్నిర్మాణమును, వివిధ రకాల కణాలను, అస్తిపంజరము, కుల్యావ్యవస్థ మరియు శరీర ధర్మాలను విశదీకరించడమైనది.

పారిఫెరా జీవులను అధ్యయనం చేసిన తరువాత ఇవి కణజాల స్థాయికి చేరినట్టివని, నోరు, జీర్ణాశయము తదితర అవయవాలు లేవని, జల కుల్యావ్యవస్థ వీటి ప్రత్యేకత అని విశదపరచగలుగుతావు.

5.2 ఉపోద్ఘాతం

స్పంజికలతో కూడిన పారిశుధ్య వర్గంలోని జీవులు బహుకణాలతో (ప్రాథమిక లక్షణాలతో ఉంటాయి. ఒక్క ప్రజాతితప్ప తక్కినవన్నీ సముద్రవాసులు, అధస్తలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. పైకాన్, కాలేరియస్ కంటకాలతో ఉండే స్పంజిక. ఈ వర్గ లక్షణాలను ఇది స్థుటంగా ప్రదర్శిస్తుంది.

5.3 సామాన్య లక్షణాలు

పారిశుధ్య (లాటిన్: పోరస్ = రంధ్రము; ఫెరా = కలిగియుండు)

పారిశుధ్య వర్గము బహుకణ జంతువుల ఆరంభమును సూచించును. ఈ సముదాయములో మొక్కవంటి జీవులు చేరి యున్నవి. వీని కఠిన వ్యవస్థ ప్రోటోజోవాకన్నా ఉన్నతశ్రేణికి చెందింది. ఇతర బహుకణ జీవులతో పోల్చిన, ఇవి సరళమై నిమ్మ తరగతికి చెందియున్నవి. 1869లో హెక్కెల్ స్పంజాల సముదాయాన్ని ప్రోటోజోవాతో వేరు చేసినాడు. వీనికి స్పష్టమైన కణజాలము, అంగములు లేవు. పారిశుధ్యలో 500 పైగా ప్రజాతులు వర్ణించబడినవి. దేహము వేస్ (పూలకుండ్ల వంటి ఆకారము) వంటి స్థూపాకారంగా పెక్కు రంధ్రములతో కుళ్ళు మరియు సంచరించే అమీబోసైటులున్న వ్యవస్థ కలిగి ఉంటుంది.

1. ఇవి వీటిలో నివసించును. చాలా వరకు సముద్రపు నీటిలోని ఆధారాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి.
2. దేహము ఆకారము వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. పాతవలె స్థూపాకారంగా, గోళాకారంగా, సౌష్ఠవరహితంగా శాఖలు కలిగి ఉంటుంది.
3. రంగు వివిధ రకాలు. గోధుమ, బూడిద, పసుపుపచ్చ, ఎర్రగా, నారింజ, ఊదా, గులాబి, వల్లగా లేక తెల్లని రంగులలో ఉంటుంది.
4. ఒంటరిగ లేక సహనివేళులుగా జీవిస్తాయి.
5. ఇవి బహుకణ, ద్విస్తర జీవులు. 1. వెలుపలి చర్మ స్తరము, 2. లోపలి కశాభయుత స్తరము. ఇందులో ప్రత్యేకమైన కొయ్యానోసెట్లు ఉంటాయి. ఈ రెండు స్తరాల మధ్య జిగురు పదార్థ మధ్య శ్లేష్మ స్తరము లేదా మిసెన్కెమా పలురకాల అమీబాయిడ్ కణాలతో పొందు పరచబడి ఉంటాయి.
6. దేహమునందు పెక్కు రంధ్రాలు, కుళ్ళు లేక గదులు ఉండును. వీటి ద్వారా నీటిప్రసరణ జరుగును.
7. పెక్కు చిన్న రంధ్రాలు దేహ పార్శ్వ బాగమంతట ఉంటాయి. వీటిని అస్టియా అంటారు. పూర్వాంతర అమ్యులం అను పెద్ద రంధ్రం ఉంటుంది. ఈ రెండు రకాల రంధ్రాలు, కుళ్ళు సమూహము చేత కలుపబడి ఉంటాయి.
8. దేహ మధ్యభాగాన స్పంజి కుహరము లేక పారా గాస్ట్రోక్ కుహరము ఉంటుంది.
9. మన్నము, పిలికా మరియు స్పాంజిక్ పోగులచేత తయారైన కంటకాలు అస్తిపంజరాన్ని నిర్మిస్తాయి.
10. స్థానబద్ధ జీవులు కావున చలనాంగాలు లేవు.
11. నోరు, ఆహారవాళము లేవు. జాంతవ భక్షణ పోషణము, కణాంతస్థ జీర్ణక్రియ జరుగును.
12. శ్వాస మరియు విసర్జకాంగాలు ఉండవు. పరస్పర వ్యాపన ద్వారా ఈ ప్రక్రియ జరుగును.
13. నాడీ వ్యవస్థ లేదు. ప్రేరణలకు ప్రతికారము చాలా స్వల్పంగా గోచరించును.
14. ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక మరియు లైంగిక పద్ధతులలో జరుగును. మొదటిది పునరుత్పత్తి, కోరకీభవనము మరియు గెమ్యూల్స్ అనే ప్రత్యేక కణముల సమూహము చేత జరుగును. రెండవది అండములు మరియు శుక్రకణాల ద్వారా జరుపబడును. జీవిత చక్రమునందు స్వతంత్రముగ జీవించే డింభక దశ ఉంటుంది.


15. ఇతర జంతువులు వీనిపై దాడి చేయవు. భక్షించవు. క్లస్టేషియన్లు, పురుగులు, మలస్కులు వీని పూర్వంత కుహరములందు తాత్కాలిక ఆశ్రయమేర్పరచుకుంటాయి.
16. స్పంజులకు గొప్ప ఆర్థిక విలువ గలదు. బాత్ స్పాంజ్ అస్థిపంజరమును మానవుడు పురాణ గ్రీకుల కాలమునాటి నుండి స్నానము చేయుటకు, బట్టలు ఉతుకుటకు వాడుకలో ఉంచినారు. కొన్ని స్పంజులు అలంకరణకు, కానుక వస్తువులుగా వాడబడును.

5.4 వర్గీకరణ

పారిఫెరా వర్గమునందు మూడు తరగతులు కలవు. అవి 1. కాల్కేరియా, 2. హెక్టాక్టేనెల్లిడా, 3. డెమోస్పొంజియా.

5.4.1 తరగతి - 1 కాల్కేరియా

1. తక్కువ లోతుగల పీటిలో ఉండు స్పంజులు
2. కార్షియం కంటకాలతో అస్థిపంజరము ఏర్పడును.



పటం 5.1. కొన్ని పారిఫెరా వర్గ ప్రతినిధులు. ఎ. సైకాన్. బి. గ్రాంవియా. సి. ల్యూకో సెలిసియా. డి. హైలోసియా. ఇ. యూ సైక్టెరా. ఎఫ్. ఫెరోసియా. జి. స్పొంజిల్లా. హెచ్. క్లియోనా. ఐ. కాలినా. 1. అస్కులమ్ 2. అస్కులం అంచు. 3. కుర్మా ముఖాలు 4. వర్చులాకార స్తంభము 5. అధారము 6. అధస్తరము 7. జతర శంకువు 8. దేహము 9. సజీవ పాలిప్ప 10. చేళ్ల కంటకాలు 11. అస్కులర్ వడపోత ఫలకము 12. లెథస్ 13. పెరైటర్ పీలికలు 14. ఉపాంత ద్రోష్టల్స్ 15. పుష్ప ద్రోష్టల్స్ 16. ప్లెక్ 17. ప్రవాళాల కప్పులు.

3. ఇవి 15 పెం.మీ. పొడవుండి లేత గోధుమ రంగుతో ఉంటాయి.
4. దేహము వేన్ ఆకారముతో కిరణ పొష్టవాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
5. కంటకాలు పొడుచుకుని ఉండటం వలన దేహము గరుకుగా ఉండును.
6. కొయావోపైటులు (కళాభకణాలు) తులనాత్మకంగా పెద్దగా ఉండును.
7. కుల్యావ్యవస్థ వివిధ రకాలుగా ఉండును.
8. కోరకీభవనం ద్వారా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగును. లైంగికోత్పత్తి, అండములు మరియు శుక్రకణాల ద్వారా జరుగును.
9. జీవిత చక్రములో స్వతంత్రముగా జీవించే డింభకము గలదు. ఇందులో బాల్ స్పాంజ్ లవంటి ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతగల స్పంజాలు కలవు. ఉదా. సైకాన్, గ్రాంషియా, ల్యూకోషెలినియా (పటాలు 5.1 ఎ - సి).

5.4.2 తరగతి - 2 హెక్టాక్టినెల్లిడా

1. ఇవి 300 అడుగుల నుండి 3 మైళ్ల లోతుగల సముద్రపు నీటిలో లభించును.
2. సాధారణముగా వీనిని గ్లాస్ స్పాంజాలని వ్యవహరిస్తారు. వీని అస్థిపంజరము సీలికామయం కంటకాలతో నిర్మితమై వేరువేరుగా లేక జాలకమువలె కలసి ఉంటాయి.
3. దేహము పలుచని రంగుతో 10 పెం.మీ. నుండి ఒక మీటరు వరకు ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది.
4. కిరణ పొష్టవముగల దేహము, స్థూపాకారంగా, వేన్ లేక గరాటు ఆకారంగా ఉంటుంది.
5. అంతశ్చర్మ స్తరము పలుచగా ఉండును. మధ్య స్తరము దళితముగాను, బహిర స్తరము పలుచగా నుండి క్రమరహిత రంధ్రముల ద్వారా స్పాంజీ కుహరములోకి తెరచుకొని ఉండును.
6. దేహకుడ్యమునందు బాహ్యచర్మ కణాలు విలుప్తమై ఉంటాయి. మిసెన్ క్రెమ్ మాత్రిక, అమీబోపైటుల మిథ్యాపాదాల శాఖల పోగులు కలిసిపోయి ఏర్పరచిన జాలకముతో తయారగును.
7. కొయావోపైటులు చిన్నగాను, సంకోచ శక్తి విలుప్తమై ఉండును.
8. కుల్యావ్యవస్థ సరళమైనది.
9. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కోరకీభవనం ద్వారా జరుగును.
10. డింభకము స్టీరియోగ్యాస్ట్రులా అనబడుతుంది.

ఈ తరగతి యందు కొన్ని ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతగల స్పాంజాలు కలవు. ఉదా. యూఫ్లేక్టెల్లా మరియు హైలోనిమా. ఎండబెట్టిన యూఫ్లేక్టెల్లా అస్థిపంజరము జపాన్ దేశమునందు విలువైన పెండ్లి కానుకగా వాడుకొంటారు. హైలోనిమా మందరమైన అలంకార స్పంజ. ఉదా. హైలోనిమా, యూఫ్లేక్టెల్లా, ఫెరోనిమా (పటం 5.1 డి.-ఎఫ్).

5.4.3 తరగతి - 3 డెమోస్పాంజియా

1. ఇతర స్పాంజాలకన్నా ఇవి ఎక్కువ సంఖ్యలో విశాలమైన విస్తరణ కలిగి ఉంటాయి.
2. వీని దేహము స్పంజాలన్నింటిలోనూ ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వ్యవస్థ కలిగి ఉంది.
3. ఇవి చాలావరకు సముద్రవాసులు, కొన్ని మంచినీటిలో లభిస్తాయి.
4. దేహ ఆకారము, రంగు వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది.
5. అస్థిపంజరము, సీలికామయ కంటకాలతోను, స్పాంజిన్ పోగులతోను ఏర్పడును.
6. మధ్యశీర్ష స్తరమునందు పెక్కు హైపోపైటులుంటాయి. ఈ కణాలు అధిక సంకోచ శక్తి కలిగి ఉండును.
7. కుల్యావ్యవస్థ క్లిష్టమైనది.
8. కొయావోపైటులు చిన్నగా ఉండును.
9. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి గెమ్యూర్స్ అనబడే అంతరంగిక మొగ్గల ద్వారా జరుగును.
10. డింభకమును స్టీరియోగ్యాస్ట్రులా అంటారు.

ఉ. స్పాంజెల్లా, క్లీయోనా, కాలినా (పటాలు 5.1 జి.-ఐ.).

5.5 సైకాన్

వర్గము	:	పారిఫెరా
తరగతి	:	కాల్మేరియా
క్రమము	:	వాటరోసిలా
వంశము	:	సైకోటిడి
జాతి	:	సైకాన్ (సైకాఫా)

5.5.1 ఉనికి

సైకాన్ ప్రపంచములోని పెక్కు భాగములందు ముఖ్యముగా లభించు సముద్ర స్పాంజి. ఇది నీటిలో మునిగిన రాళ్లను, ఇతర ఘన పదార్థముల ఉపరితలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండే ఒంటరిజీవి.

5.5.2 బాహ్యరూపము

సైకాన్ కాల్మేరియన్ స్పంజ(పటం 5.2). దీని అష్టిపంజరము కాల్షియం, కార్బోనేట్ కంటకాలతో ఏర్పడును. దేహము కిరణ సౌష్ఠ్యముతో వేవ్ ఆకారగొట్టాలు కలిగియుండును. రంగు లేత గోధుమ లేక బూడిద వర్ణముతోను, పరిమాణము 20 25 మి.మీ., ఎత్తు 56 మి.మీ. వ్యాసముతో ఉండును.




పటం 5.2. సైకాన్. 1. అస్కలం 2. కాళీయ వర్తుల స్తంభాలు 3. కుల్యా ముఖాలు 4. ఆధారము

ప్రతి నిలువుగొట్టము పరాంతాన పెద్ద రంధ్రము ఉండును. దీనిని అస్కలం లేక బహిర్వాహ రంధ్రము లేక నిశ్వాస రంధ్రము అంటారు. దీనిని ఆవరించుకొని పెద్దగా కడ్డివలె నుండు మోనాక్సన్ కాల్షియం కంటకాలు ఉంటాయి. దేహము ఉపరితలము పెక్కు బహుకోణ ఉబ్బెత్తులు కలిగి ఉండును. ఇవి పాలిగన్ కు సమాంతరముగా ఉండే రేఖాయుత నొక్కులతో వేరుచేయబడి ఉంటాయి. ఈ నొక్కులందు పెక్కు ఆస్టియా అనే రంధ్రాలు ఉంటాయి. వీనిని అంతర్వాహ రంధ్రాలు లేక ఉచ్ఛ్వాసక రంధ్రాలు అంటారు. నీటిలో ఉన్నప్పుడు నీరు ఈ రంధ్రాల ద్వారా స్పంజలోనికి ప్రవేశించి అస్కలం ద్వారా బయటికి వచ్చును. ప్రతి నిలువుగొట్టము లోపలి భాగము బోలుగా నుండి స్పంజికా కుహరము లేక పారాగ్యాస్త్రిక్ కుహరము లేక గ్యాస్త్రిక్ కుహరము అనబడును.

5.5.3 సూక్ష్మ నిర్మాణము

దేహ కుద్యమునందు రెండు స్తరాలు కలవు. ఒకటి వెలుపలి స్తరము. బాహ్య చర్మము లేక చర్మ స్తరము రెండవది. అంతర్ స్తరము లేదా జతర స్తరము. ఈ రెండింటి మధ్యభాగము ఒక పలుచని జాంతన 62 మూత్రికతో నిండి అమీబాయిడ్ కణాలు కలిగి ఉంటుంది. దేహ కుద్యము నందంతట కొన్ని కుయలుంటాయి.


ఇందులోనికి ఆస్టియా ద్వారా నీరు ప్రవేశించి, పారుచు దేహం మధ్యగల పెద్ద పార్శ్వ జతర కుహరము చేరును. ఇందులో రెండు రకాల కుల్యాలు. ఒకటి అంతర్వాహ కుల్య, రెండవది కిరణ కుల్య. (పటం 5.3 ఎ అండ్ బి)



పటం 5.3. సైకాన్. ఎ. సైకాన్ నిలువుకోత. బి. కణజాలము, కుల్యా వ్యవస్థను చూపుతున్న నిలువుకోతలో ఒక భాగము (బాణపు గుర్తులు నీటి ప్రవాహపు దిశను సూచించుతాయి). 1. ఆస్మ్యులర్ అంచు 2. ఆస్మ్యులర్ 3. జతర కుల్యా ముఖాలు 4. చర్మీయ కుల్యా ముఖాలు 5. అంతర్వాహక కుల్య 7. స్పంజకుహరము 8. కాడ 9. ట్రోసోసైట్ 10. స్క్లెరోఫ్లాష్ 11. అమీబోసైట్ 12. అపోసైట్ 13. పొడము 14. జతర పినాకోసైట్ 15. టెట్రాఆక్సన్ కంటకము 16. మోనాక్సన్ కంటకము 17. త్రికిరణ కంటకము 18. అండము 19. మధ్య శ్రేవ్యస్తరము 20. చర్మీయ వల్కలము 21. చర్మీయ పినాకోసైట్ 22. ఆక్సియోప్లే 23. చర్మీయ కుల్యా ముఖము 24. రంధ్రత్వచము.

బాహ్య చర్మము స్పంజి యొక్క బాహ్య ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచుతుంది. ఇది పినాకో సైట్లవలన బద్ద బల్లపరుపు ఉపకరణ కణాలతో నిర్మితమైనది.

పినాకోసైట్: ఇది బహుకోణ బల్లపరుపుగా నుండు పెద్ద కణము. పినాకో సైటులు సంకోచించును. స్పంజాల ఉపరితలాన్ని తక్కువ చేయును. ఇది ఉన్నత జంతువుల ఉపకరణ కణాలను పోలి ఉండును.




పటం 5.4. సైకాన్ కోయాన్సైట్. 1. కళాభము. 2. కిలెత కలయిక వల్ల ఏర్పడిన కాలర్ 3. కాలర్ 4. పెంట్రో జ్యోఫరోఫ్లాష్ 5. రైజోఫ్లాష్ 6. పారాబో సల్ దేహము 7. కేంద్రకము 8. కణ త్వచము 9. కణదీప ద్రవ్యము.

జతర స్తరము: దేహములోపలి స్తరాన్ని జతర స్తరము అంటారు. ఇది జతర కుహరము, కిరణ కుల్యలను అంతర్వేష్టించును. దీనియందు రెండు రకాల కణాలున్నవి. ఒక రకము బాహ్య చర్మములోని పినాకో సైట్లవలె, రెండవది కాలర్ కణాలు లేక కొయాన్సైట్లు లేక కళాభ కణాలవలె ఉండును.

కొయాన్ నైటులు: ఇవి కొయాన్ కళాభ ప్రోటోజోవాను పోలి ఉంటాయి. ఈ కణాలు అండాకార లేక గోళాకారంగా ఒక కేంద్రకము కొన్ని రిక్తికలు కలిగి ఉంటాయి. అగ్రభాగమున ఒక కాలర్ వలె నుండు పారదర్శక జీవ పదార్థ ఉబ్బెత్తు కలదు. ఒక పొడవైన కొరదావంటి కళాభము సెంట్రో బ్లెఫెరోప్లాస్ట్ నుండి ఎరుగును. ఇది కణమునందు కాలర్ యొక్క ఆధార భాగమున ఉంటుంది. కేంద్రానికి ప్రైభాగమున ఒక పారాజేసల్ దేహము కలదు. ఒక పొగువంటి రైజోప్లాస్ట్, సెంట్రో బ్లెఫెరో ప్లాస్ట్ ను పారా జేసల్ దేహాన్ని కలుపును. కళాభముల కంపనము వలన స్పంజ నందు నీటి పారుదల సాగును. (పటం 5.4).

మధ్యభూణ కణజాలము: ఈ స్తరము బాహ్య చర్మము మరియు జఠర స్తరమునకు మధ్య ఉంటుంది. దీనిని మధ్య క్షేష్ణ స్తరము లేక అస్థిపంజర జనక స్థరము అంటారు. ఇందులో అస్థిపంజరమునకు ఊతనిచ్చు కంటకాలనబడు మూలకాలు ఉంటాయి.

1. కొలెన్ నైటులు లేక సంధాయిక కణజాల కణాలు: వీనియందు కిరణ ప్రసారక కీలితాలు లేక మిథ్యాపాదాలు ఉంటాయి. చూచుటకు నక్షత్రాకారంగా ఉంటాయి. (పటం 5.5).
2. క్రోమోనైటులు లేక వర్ణకణాలు: ఇవి మొండిగా నుండు మిథ్యా పాదాలతో వర్ణ కణికలు కలిగి ఉంటాయి. స్పంజాలకు ఇవి వర్ణముగా ఆపాదించును.
3. థీసోనైటులు లేక నిలువలు ఉంచు కణాలు: ఇవి మొండిగానున్న మిథ్యాపాదాలు కల అమీబోనైటులు. ఇందులో పెద్ద మొత్తములో అహార పదార్థములు నిలువ ఉంటాయి.
4. స్క్లెరో బ్లాస్టులు లేక కంటకోల్పాదక కణాలు: ఇవి అస్థిపంజర నిర్మాణమునందు పాల్గొను కంటకోల్పాదక కణాలు. ఇవి సైకాన్ లో కాలేజీరియన్ కంటకాలను స్రవించే కాల్యోబ్లాస్టులు.




పటం 5.5. స్పంజకల మధ్య క్షేష్ణ స్తరములో కనబడు సాధారణ కణజాలము. ఎ. కొలెన్సైట్. బి. క్రోమోసైట్. సి. థీసోసైట్. డి. స్క్లెరోబ్లాస్ట్. ఇ. ఫ్యాగోసైట్. ఎఫ్. ప్రోసైట్. జి. అర్కియోసైట్. హెచ్. మయోసైట్. ఐ. ఫోరసైట్.

5. ఫ్యాగోసైటులు: ఇవి ఆహారాన్ని సేకరించు లేక పట్టుకొను కణాలు. వీనియందు ఆహార పదార్థాలను, విసర్జక పదార్థాలను మరియు నష్టపడిన కణజాలాన్ని అవరించుటకు మిథ్యాపాదాలు ఉంటాయి.
6. ట్రోఫోసైటులు లేక పోషక కణాలు: ఇవి జీర్ణించిన ఆహార పదార్థాలను ఒక ప్రాంతము నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి చేరవేస్తాయి.
7. ఆర్కియో సైట్లు: ఇవి పంయోగ బీజాలు లేక లైంగిక కణాలు. వీనియందు మొండి మిథ్యాపాదాలు, పెద్ద కేంద్రకము, కణికామయ కణ పదార్థము ఉంటుంది. ఇవి పునరుత్పత్తి ప్రక్రియయందు కీలక పాత్ర వహిస్తాయి.
8. లోఫోసైట్లు: ఈ కణాలు ఒక నైపున పోగుల గుచ్ఛములు కలిగి ఉంటాయి.
9. మయోసైట్లు: ఇవి ఆమ్మకం, ఆస్టియా మరియు కుల్యలను సంధాయ వరకు ఆపోసైట్ రంధ్రాలను అవరించి ఉండును. ఇవి సకళేరుకాల కండరాలను పోలియుండి పాడవుగ నుండి సంకోచ కణాలు. ఆమ్మకం రంధ్రాన్ని తెరచుటను, మూయుటను క్రమబద్ధము చేయును.
10. గ్రంథి కణాలు: ఇవి శ్లేష్మాన్ని స్రవించును. ఆధారము వద్దనుండి, స్పంజను ఆధారతలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండుటకు సహాయపడును.
11. డెస్మోసైట్లు: ఇవి పాడవుగాను, పన్నముగాను ఉండి కుల్యల ఆధారము వద్ద ఉంటాయి.

5.6 అస్థిపంజరము

అస్థిపంజరము వివిధ రకాల కంటకాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. ఇది స్పంజికి గట్టితనాన్ని ఇచ్చి దేహము యొక్క ఆకారాన్ని కాపాడును. స్పంజి దేహాన్ని వంచుటకు, నిలబెట్టి ఉంచుటకు ఇదియే కారణము. సైకాన్ కంటకాలు కార్నియం కార్పొనేట్ తో నిర్మితమైనవి కావున కాలేరీయన్ కంటకాలనబడును. స్క్లెరోబ్లాస్ట్లనబడే మధ్యభూణ అమీబాయిడ్ కణాలతో స్రవించబడును. కంటకాలు నాలుగు రకాలుగా ఉండును. (పటం 5.6).



పటం 5.6. సైకాన్ కంటకాలు ఎ. మోనాక్స్ కంటకాలు. బి. త్రికిరణ కంటకాలు.

1. మోనాక్స్ కంటకాలు: ఇవి పాడవుగ, కడ్డి ఆకారంగా తిన్నగా ఏక కిరణ కంటకాలు ఆమ్మకం చుట్టూ వలయాకారంగా పెద్ద మొత్తములో ఉంటాయి. వీనిని ఏక కిరణ కంటకాలు అని కూడా అంటారు. ఇవి

పీయర్ ఆకారంగా లేక ముద్గరాకారంగా ఉండే ఆక్సియోల్ కంటకాలు అంటారు. ఇట్టి కంటకాల దేహము ఉపరితలము నుండి వెలుపలికి పొడుచుకొని ఉంటాయి. కిరణ కుల్య వెలుపల సహితము ఉంటాయి.

2. ట్రయ్యాక్స్ కంటకాలు: వీటిని త్రికిరణ కంటకాలని వ్యవహరిస్తారు. ఇవి అధిక సంఖ్యలో ఉండి కిరణ కుల్యల పొడుగున ఉంటాయి. ఇందులో ఒక కిరణము కుల్యల పరాంతమునైపు పొడుచుకొని ఉంటుంది.

3. ట్రైట్రయ్యాక్స్ కంటకాలు: వీటిని చతు: కిరణ కంటకాలని కూడ వ్యవహరిస్తారు. ఇవి త్రికిరణ కంటకాలతోబాటు జతర వల్కులము నందు జతర కుహరమును ఆవరించి ఉంటాయి.

4. టి. ఆకారపు కంటకాలు: ఇవి అరుదుగా కనబడుతాయి.

5.7 కుల్యా వ్యవస్థ

కుల్యావ్యవస్థ అన్ని స్పంజాల యొక్క ప్రత్యేక లక్షణము. దీనికి శరీర ధర్మ ప్రాముఖ్యత చాల కలదు. దీనికి ఆక్వి ఫెరస్ (Acquiferous) వ్యవస్థ అని కూడ పేరు కలదు. స్పంజాలు ఉనికిలో వ్యంత రహిత జీవులు కావున ఇవి ప్రతి పనిని ఆస్టియా ద్వారా ప్రవేశించి, ఆస్కులం ద్వారా బయటికి వచ్చే నీటి ప్రవాహముపై ఆధారపడి ఉంటాయి. నీటి ప్రవాహము వివిధ కుల్యల ద్వారా పోవునపుడు వివిధ రకాల క్రియలను చేస్తాయి. స్పంజాల జీవన వ్యాపారాల సమర్థత చాలావరకు నీటి ప్రవాహముపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని బట్టి మనకు కుల్యా వ్యవస్థ యందు అంతర్వాహి కుల్య, కిరణ కుల్య, బహిర్వాహి కుల్య అను కుల్యలు, ఆస్టియా, ఆస్కులం వంటి కుల్యాంతర రంధ్రాలు, ప్రోసోఫైట్ మరియు అపోఫైట్ అనబడే కుల్యాంతర రంధ్రాలు మరియు మధ్యనగల పార్శ్వ జతరాధ కుహరిక ఉంటాయి.

అంతర్వాహి కుల్య: ఇది బల్ల పరుపుగా ఉండు బాహ్య చర్మ పినాకో సైట్స్ తో అంతర్వేష్టింపబడి ఉంటుంది. ఆ కుల్య బాహ్య భాగము కొంచము విస్తాపరకమై లోపలి భాగము జతరాధ కుహరికవైపు ఇరుకుగా మొండిగా ఉంటుంది. విస్తారిత బాహ్య భాగము రెండు లేక మూడు సూక్ష్మమైన ఆస్టియాలన్న సన్నని పొరతో కప్పబడి ఉంటుంది.

కిరణ కుల్య: ఇది రెండు అంతర్వాహి కుల్యల మధ్య అడ్డముగా ఉంటుంది. దీనిని కళాభయుత కుల్య అని కూడ అంటారు. ఇది లోపల తలాన కొయానోసైట్లతో అంతర్వేష్టింపబడి జతరాధ కుహరికతో కలసి ఉండును. బాహ్య భాగము అండనాళముగా ఉంటుంది. కిరణ కుల్య మరియు అంతర్వాహి కుల్య ఒక చిన్న ఇరుకైన ప్రోసోఫైట్ అనే కాలువతో కలసి ఉంటాయి. ప్రతి ప్రోసోఫైట్ రంధ్రము, పోరోసైట్ అనే నాళాకార కణమునందు ఉంటుంది.

బహిర్వాహి కుల్య: ఇది కురచగా వెడల్పుగా ఉండు దారి. బల్లపరుపు ఆకార బాహ్యచర్మ పినాకో సైట్లు దీనిని అంతర్వేష్టించును. కిరణ కుల్య జతరాధ కుహరికలోనికి అపోఫైట్ అనే మధ్య ఉండు గుండ్రని సంకోచించే రంధ్రము ద్వారా బహిర్వాహి కుల్యచేత తెరుచుకుంటుంది.

నీటి ప్రవాహ సర్వత్రా సముద్రపు నీరు సూక్ష్మమైన ఆస్టియా అనబడే చర్మ రంధ్రముల ద్వారా సైకాన్ దేహములోని అంతర్వాహి కుల్యలోనికి ప్రవేశించును. ఇచటి నుండి నీరు ప్రోసోఫైట్ అనే ఇరుకైన దారి ద్వారా కిరణ కుల్య చేరును. ఇప్పుడు నీటి ప్రవాహము బహిర్వాహి కుల్యము చేరును. అపోఫైట్ అనే సంకోచ రంధ్రము బహిర్వాహి కుల్య ద్వారానికి రక్షణ కల్పిస్తుంది. బహిర్వాహి కుల్య నుండి నీరు స్పంజికా కుహరము చేరి చివరకు ఆస్కులం ద్వారా దేహము వెలుపలికి పోవును. ఆస్కులం సంకోచ వ్యాకోచ చర్య ద్వారా నీటి ప్రవాహ గతిని నియంత్రిస్తుంది. చివరకు పూర్తిగా ఆపివేస్తుంది కూడ.

66 నీటి ప్రవాహము: చర్మీయ ఆస్టియా → అంతర్వాహి కుల్య → ప్రోసోఫైట్ → కిరణ కుల్య → బహిర్వాహి కుల్య → స్పంజికా కుహరము → ఆస్కులం → వెలుపలికి.

కుల్యా వ్యవస్థ ప్రయోజనాలు

స్పృంజికలందు కుల్యా వ్యవస్థ గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. రంధ్రయుత స్పృంజికల దేహము నుండి ఎడతెగని నిరవధిక నీటి పారుదల పెక్కు చైతన్యవంత శారీరక ప్రక్రియలను పలుపుతుంది.

కుల్యావ్యవస్థ ప్రయోజనాలు, విధులు క్రింది విధముగా ఉన్నవి.

1. నీటి ప్రవాహము ఆహారము మరియు ఆమ్లజనిని తీసుక వస్తుంది.
2. శుక్ర కణాలను, అండములను లోనికి వెలుపలికి చలించుటకు సహాయపడును.
3. నత్రజని సంబంధ విసర్జక పదార్థాలను కర్చనద్వీ ఆమ్లజనీకమును తొలగించును.
4. అంపి బ్లాస్టులా డింభకమును దేహము వెలుపలికి తీసుకవచ్చును. చివరకు ఇది ఈదుచు వెడలిపోవును.

ఒక 10 సెం.మీ. పొడవు మరియు 1 సెం.మీ. వెడల్పు కలిగి ఉన్న స్పృంజికోపల 2,250,000 కిరణ కుల్యాలు లేక కశాభయుత గదులు ఉండి 22.5 లీటర్ల వీరు రోజు ఒక్కటికి దేహము నుండి వెలుపలికి పంపునని అంచనా వేయబడినది.

5.8 ప్రత్యుత్పత్తి

సైకన్ లైంగిక, అలైంగిక అను పద్ధతుల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపును.

5.8.1 అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి

ఇది పునరుత్పత్తి కోరకీభవనం అను పద్ధతుల ద్వారా జరుగును.

పునరుత్పత్తి: పునరుత్పత్తి అనగా దేహము యొక్క ఏదేని భాగము నష్టపడి లేక గాయపడి కోల్పోయిన దానిని తిరిగి ఉత్పన్నము చేసికొనుట. ఒక స్పృంజికను ముక్కలుగా కోసి కణములను వేర్పరచిన కణములు తిన్నగా దగ్గరకు వచ్చి కలిసిపోయి పిల్ల స్పృంజిక నిర్మాణము గావించును.

కోరకీభవనము: అలైంగికోత్పత్తి యందు బాహ్య కోరకీభవనము జరుగుట సాధారణ పద్ధతి. ఆర్కియోసైట్ల సమూహములు వలసపోయి ఒక ఉబ్బెత్తు ఏర్పడును. దీనినే కోరకము అంటారు. ఇది స్పృంజిక ఆధార తలము వద్ద ఏర్పడి అగ్రభాగాన ఆస్కరం పెంచుకొని ఉంటుంది. పితృ స్పృంజిక నుండి వేరయి కొత్త స్పృంజికగా తయారగును. లేదా పితృ స్పృంజికని అంటిపెట్టుకొనిపోయి పరిమాణము పెంచుకొనును. ఇదికాక అంతర్ కోరకీభవనము సయితము జరుగును. ఇందులో అమీబోసైట్లు కొన్ని సమూహములుగా చేరి 'గెమ్యూలు' అనే బీజ నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి. వీనితోపాటు ఆర్కియోసైట్లు కూడా కలుస్తాయి. ఇది కవచాన్ని స్రవించుకొని బంతి ఆకారం దాల్చును. గెమ్యూలు వదలబడి కొంతకాలము నీటిలో ఉండిపోవును. అనుకూల పరిస్థితులలో ఇవి పిల్ల స్పృంజికలుగా ఎదుగుతాయి.

5.8.2 లైంగికోత్పత్తి

లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కణాలైన శుక్ర కణాలు మరియు అండముల ద్వారా జరుగును. సైకన్ ఉభయ లింగక జీవి. కాని ఇది ప్రోటోగైన్స్ అనగా స్త్రీ సంయోగ బీజాలు, పురుష సంయోగ బీజాలకంటే ముందుగా పరిణతి చెందుతాయి. ప్రత్యేక లైంగికాంగాలు, ముష్కాలు స్త్రీ బీజకోశాలు ఉండవు.

లింగ కణాల నిర్మాణము: లింగ కణాలు, అమీబోసైటులు, మరియు త్రియోసైటుల నుండి ఎదుగుతాయి.

శుక్ర కణాలు: శుక్ర మాతృకణాలు, అమీబోసైట్ల నుండి ఎదిగి రెండు మూడుసార్లు విభజన చెంది శుక్ర మాతృ కణ జన్యాలను చివరకు శుక్ర కణాలను పుత్పన్నము చేయును.


పరిణతి చెందిన శుక్ర కణము, అండాకార లేక గుండ్రని లేక గదాకార కేంద్రకముగల తల మరియు పొడవైన కంపించే తోక కలిగి ఉంటుంది. ఇవి నీటి ప్రవాహము ద్వారా వేరొక సైకన్లోని కళాభయత కుల్యంతోనికి చేరతాయి. (పటం 5.7).

అండాలు: అండ మాతృకణాలు మధ్య భూకణాల నుండి ఆహార కణాల కొరకు తిరుగుచు కొయానోసైట్ల వైపు ఆధారము వద్దకు చేరుతాయి. ఇచట ఆహారము గైకొని పెరుగును. ఆ పిదప క్షయకరణ విభజనలు జరిగి అండములుగా మారిపోవును. (పటం 5.7).

పరిణతి చెందిన అండాలు పెద్దగా గుండ్రంగా ఉండి సుస్పష్టమైన కేంద్రకము కలిగి ఉంటాయి. ఇది కిరణ కుల్య కుడ్యమునందు ఉంటుంది.

ఫలదీకరణము

ఫలదీకరణము నందు మగ సంయోగ బీజమగు శుక్రకణము మరియు స్త్రీ సంయోగ బీజమైన అండము కలసిపోయి సంయుక్త బీజము ఏర్పడును. ఫలదీకరణము దేహములోపల జరుగును. పరిణతి చెందిన శుక్రకణాలు నీటి ప్రవాహములో దేహము వెలుపలికి వచ్చి రెండూ స్పంజి దేహములోనికి నీటివెంబడి ప్రవేశించి కిరణ కుల్యలను చేరుకొనును. ఇచట శుక్రకణము ధాత్రికణమనబడే తిరుగుచున్న అమీబోసైట్ లేక కొయానోసైట్ లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇచట శుక్ర కణము తోకను కోల్పోయి కప్పబడుతుంది. తిరుగుచున్న అమీబోసైట్ శుక్రకణాన్ని స్త్రీ బీజ మాతృకణాలు వరకు చేర్చును. శుక్ర కణము అండములోనికి చొచ్చుకుపోయి దానిలో కలిసిపోవును. దీనితో ఫలదీకరణము పరిసమాప్తి చెందును. ఫలదీకరణములో సంయుక్త బీజ నిర్మాణము పూరిత అవుతుంది. అప్పుడది మట్టప్రక్కల ఉన్న అమీబోసైట్లతో ఏర్పడిన సంతాన గుళికయందు మూయబడి ఉంటుంది (పటం 5.7 సి).




పటం 5.7. సైకన్లో సంయోగ బీజాలు, ఫలదీకరణము. ఎ. కిరణ కుల్యలో ఉన్న అండము. బి. కళాభయత కణములో ఉన్న శుక్ర కణము. సి. ఫలదీకరణముకొరకు శుక్ర కణాన్ని తీసికొని పోతున్న ధాత్రి కణము. 1. కేంద్రకాంశము 2. కేంద్రకము 3. పెనాకోసైటు 4. అండము 5. కొయానోసైటు 6. కణజీవ ద్రవ్యము 7. శుక్ర కణము 8. కొయానోసైటు (ధాత్రికణముగా).

5.9 పెరుగుదల

ఒక జీవి యందు ఫలదీకరణము చెందిన అండము నుండి ప్రౌఢ దశ చేరువరకు జరుగు మార్పుల సముదాయాన్ని పెరుగుదల అంటారు. అన్ని మెటాజోవా జంతువులందు పెరుగుదల సంయుక్త బీజ విభజనతో మొదలవును. విభజనలు సలుమార్లు ఇతర కణాలతో లంబకోణంగా జరిగి కణ పంఖ్యను గుణోత్తర చయముగా అనగా 2, 4, 8, 16, 32, 64 పెరుగును. పెరుగుదల యందు మొదటిదశలు కిరణ కుల్యలందు జరుగును (పటం 5.8).


విదళనము: సంయుక్త బీజమునందు పూర్ణ భంజిత పద్ధతిలో విదళనము లేక ఖండి భవనము జరుగును. మొదటి మూడు విభజనలు నిలువుగా జరిగి ఎనిమిది కణాలు లేక బ్లాస్టోమియర్లు ఏర్పడును. తరువాత విభజన అడ్డముగాను, కొంచెము పూర్వాంతము వైపు జరుగును. దీనితో 16 కణాలు ఏర్పడుతాయి. అందులోని క్రింది భాగపు 8 పెద్ద కణాలు మాక్రోమియర్ పైభాగపు ఎనిమిది కొంచెం చిన్నగా ఉండి మైక్రోమియర్ అనబడుతాయి. మాక్రోమియర్లు చర్మీయ స్తరము, మైక్రోమియర్లు కొయానోస్టెల్లుగా ఏర్పడుతాయి. పిండము ఇప్పుడు బల్లపరుపుగాను, చక్రాకారముగాను గోచరించును. దీనిని బ్లాస్టులా అంటారు.



పటం 5.8. పైకాన్ అభివృద్ధి. ఎ. సంయుక్త బీజము బి. రెండు కణాల స్థితి సి. నాలుగు కణాల స్థితి డి. ఎనిమిది కణాల స్థితి ఇ. పదహారు కణాల స్థితి ఎఫ్. బ్లాస్టులా జి. స్ట్రోమా బ్లాస్టులా హెచ్. స్ట్రోమా బ్లాస్టులా నిలువుకోత (విలోమము జరిగిన తరువాత) ఐ. అంఫిబ్లాస్టులా జె. అంతర్వర్తనము ద్వారా ఏర్పడిన తృతీయ పిండాభివృద్ధి దశ కె. నిశ్చల తృతీయ పిండాభి వృద్ధి దశ నిలువుకోత 1. కేంద్రకము 2. కణాద్రవ్యము 3. విదళనము 4. చిన్న మైక్రో మియర్లు 5. పెద్ద మాక్రోమియర్లు 6. కళాభయుత మైక్రోమిర్లు 7. కణికాయుత మాక్రోమియర్లు 8. కళాభాలు 9. సంయుక్త బీజ కుసారిక (బ్లాస్టో సీల్) 10. బీజరంధ్రము.

స్టోమో బ్లాస్టులా: చిన్నగా ఉండు మైక్రోమియర్ల సంఖ్య వేగముగా పెరిగి పొడవై జతర కుహరమువైపు కళాభావను ఏర్పరచుకుంటాయి. మాక్రోమియర్లు విభజన చెందవు. జీవి పదార్థ కణికలుగా ఏర్పడును. మాక్రోమియర్ సమూహ మధ్యన ఒక రంధ్రమేర్పడి నోరుగా పనిచేస్తుంది. పిండమును అంటియున్న కొయానోస్టెల్లును అంతర్గ్రహణము చేస్తాయి. ఈ పిండదళము స్టోమో బ్లాస్టులా అంటారు. పిండమిప్పుడు అవశ్యముగా బ్లాస్టులా కాని దీనియందు కళాభములు లోపలివైపుకు పొడుచుకొని ఉంటాయి. నోరు మూసుకొని ఉంటుంది.

సైకాన్ జీవిత చరిత్ర



ఆంధ్రప్రదేశ్: ఇప్పుడు పిండము ఇతర మెటాబోలిక్ యందు ఎన్నటా కనబడిన అసాధారణమైన విలోమ ప్రక్రియకు లోబడింది. ఈ ప్రక్రియ నోరు తిరిగి తెరచుకొనటంతో ఆరంభమగును. నోటి రంధ్రం వెదల్చి కళాభ కణాలను వెలుపలికి పొడుచుకొని ఉండునటుల బహిర్గతము కావిస్తుంది. మూక్రోమియర్లు మెల్లగా సంఖ్యను పెంచుకొని అన్నివైపుల విస్తరిస్తాయి. డింభకము నోరు మూయబడి పిండము పొడవుగా ఎదుగును. ఇప్పుడీ కళాభయుత పిండము స్వతంత్రముగా రెండు విధాలుగా చలనం లేని ప్రాథ జీవితో భిన్నంగా ఉంటుంది (పటం 5.8). ఈ దశ ఏర్పడువరకు పుంజిక యొక్క కోయానోసైట్లు అడుగున ఉండే మధ్య భూణ కణజాలమునందు పిండము ఉంటుంది. ఇప్పుడు సంతాన గుళిక పగులుట చేత డింభకము విడుదలై కిరణ కుల్య చేరుతుంది. ఇచ్చటి నుండి నీటి ప్రవాహముతో దేహము వెలుపలికి వస్తుంది. ఇది చురుకుగా నీటిలో ఈదుచు సైకన్ జీవిత చక్రమునందలి స్వతంత్రముగా ఈదుచు ఉండే శైలికామయ డింభకదశను సూచిస్తుంది.

గాస్ట్రోలేషన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డింభకమిప్పుడు తన కళాభయుత అంతాన్ని ముందుకు చాచి ఈదును. కొంతకాలానికి ఇది పూర్వంతం ద్వార స్థిరపడి పెరుగుదల కొనసాగించును. కళాభయుత కణాలు అంతర్గతత్వము చెంది స్థూల కణికామయ కణాలతో కప్పివేయబడుతుంది. ఇప్పుడు డింభకము ద్విస్తర జీవి. దీనియందు వెలుపలివైపు కళాభ రహిత లోపలివైపు కళాభయుత కణాలు ఉంటాయి. దీనిని గాస్ట్రోలా లేక ద్విస్తర డింభకమని అంటారు. ఈ ప్రక్రియను గాస్ట్రోలేషన్ అంటారు.

5.10 రూపవిక్రియ

రూపవిక్రియ అనగా నిర్మాణ మార్పు లేదా డింభకము ప్రాథ జీవిగా పరివర్తన చెందుట. ఇది ముఖ్యముగా బాహ్య అంతర్నిర్మాణము రీత్యా డింభకము, ప్రాథ జీవితో భిన్నంగా ఉన్నవాటిలో జరుగుతుంది. డింభకము పొడవై స్థూపాకారంగా ఎదుగును. దాని స్వేచ్ఛాయుత పరాంతాన ఆస్కూలం పెరుగును. సూక్ష్మమైన రంధ్రాలు స్థూపం పార్శ్వ భాగములందు ఏర్పరుస్తాయి. లోపల కళాభ కణాలు, కోయానోసైట్లను మరియు వివిధ అమీబోసైట్లను పెంచుతాయి. ఈ దశలో డింభకము సామాన్య ల్యూకో సాలేనియా వంటి పుంజిక గోచరించును. ఇది ఒలింథన్ డింభక దశ.

అసమాన అభివృద్ధి మరియు పెరుగుదల కారణంగా దేహ కుడ్యం ముడుతల పెంచుకొని కిరణ మరియు అంతర్వాహి కుల్యలు ఏర్పడుతాయి. కోయానోసైట్లు కిరణ కుల్యలోనికి పంపబడుతాయి. పినోక్సైట్లు అంతర్వాహి కుల్యను అంతర్వేష్టింప బడుతుంది. కంటకాలు వివిధ అమీబోసైట్లు మధ్య శ్లేష్మస్తరాన్ని నింపివేయును. దీనితో ప్రాథదశ ఏర్పడుతుంది.

5.11 స్వపరిశీలన

1. సైకన్ శరీరంలోని రెండు స్తరాల పేరు _____
2. కుల్యారంధ్రాల నుండి ప్రారంభమయ్యే నీటి ప్రవాహ కుల్యవ్యవస్థలోనికి వెళ్లేదారి _____
3. పునరుత్పత్తి కోరకీభవనం ఈ రెండూ సాధారణంగా జరిగే _____ విధానాలు.
4. _____ డింభకం లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి సైకన్లో జరిగేటప్పుడు ఏర్పడుతుంది

5.12 సారాంశము

1. పారిశుధ్య వర్గమునందు స్పాంజులు చేరి యున్నవి. ఇవి సముద్రము లందు మంచినీటియందు లభిస్తాయి.
2. ఇవి నిమ్మరకపు బహుకణ, కాడ రహిత జీవులు.
3. దేహము రంధ్రములతో నీటి చామును, నీటిద్వారా ప్రవహించే నీరు, దేహము యొక్క వివిధ పనులను నిర్వహించును.
4. అస్థి పంజరము కంటకములతో నిర్మితమై ఉంటుంది.
5. వివిధ రకాల కణాలు పేటి వివిధ రకాల శారీరక పర్యాలను నిర్వహించును.
6. ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక మరియు అలైంగిక పద్ధతులలో జరుగును.
7. స్పాంజు కాక రహిత, సున్నము నిర్మిత సముద్ర జీవి.
8. ఇది ద్విస్తర జీవి. పెక్కు అమీబోస్టాలు మధ్య క్షేపణ స్తరమునందు ఉంటాయి.
9. కుల్యలందలి నీటి ప్రవాహము వివిధ శరీర ధార్మిక చర్యలను నిర్వహించి కుల్యావ్యవస్థ నిర్మాణము గావించును.
10. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, పునరుత్పత్తి మరియు కోరకే భవనము ద్వారా జరుగును.
లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, శుక్ర కణాలు, అండాలు ద్వారా జరుగును. ఫలదీకరణము, పెరుగుదల స్థానబద్ధముగా జరుగును. స్వతంత్రంగా ఈ చుండె డింభక చక్ర ఉంటుంది.

5.13 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. చర్మస్తరం, జఠర స్తరం
2. అంతర్వాహికుల్య, (పోసోపైల్, కిరణ కుల్య, ఎపోపైల్, బహిర్వాహి కుల్య, స్పంజికా కుహరం, ఆస్కులమ్).
3. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి
4. ఆంఫిబ్లాస్టులా

5.14 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. పారిశుధ్య సామాన్య లక్షణాలు వివరించండి.
2. వర్గము పారిశుధ్యం తరగతుల వరకు వర్గీకరించి, వాటి లక్షణాలు, ఉదాహరణలు వ్రాయండి.
3. సైకాన్ అంతర్నిర్మాణమును, అందులోని వివిధ కణాలు, వాటి విధులను గూర్చి వ్రాయండి.
4. సైకాన్ కుల్యా వ్యవస్థను విశదీకరించి, దానివలన గల ప్రయోజనాలను లెక్కింపుము.
5. సైకాన్ లో లైంగికోత్పత్తి, మరియు పెరుగుదలను గురించి వివరించండి.


2. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబు వ్రాయండి.

1. స్పంజికల అస్థిపంజరము 2. సైకాన్ లో అలైంగికోత్పత్తి.

5.15 పదకోశము


అమీబాయిడ్ కణాలు : అమీబాయిడ్ లక్షణాలు, మిథ్యాపాదాల సహాయంతో పోషణ మరియు చలనం కలిగి ఉండుట.

శంఖు ఆకారం గలిగి దేహమంతా శైలికంతో కప్పబడి పూర్వంతమున త్రికోణాకారముతో తలతమ్మె మరియు రెండు కంటి చుక్కలు వుంటాయి. ఒక జత జ్వాలా కణములు, మిగతా ఖాళీ స్థలమంతా జనన కణ సముదాయముతో నిండి వుంటుంది. శైలికామయ మిరాసిడియం ఢింభకము వీటిలో ఈదుచు లేక పదనుగల గడ్డి మొక్కల పైకి ప్రాకుచు వుంటుంది. వీటి యందు ఇది లిమ్మియా ప్రజాతికి చెందిన నత్తను చేరవలెను. చేరకుండా వుంటే చనిపోతుంది. నత్త దేహమును చేరినట్లయితే వెంటనే శైలికామయ బాహ్య చర్మమును వదిలివేసి దాని ప్రావార కుహరము చేరుకొనును. ప్రావార కుహరమునందు త్వరత్వరగా అభివృద్ధి చెంది




పటం 9.1. ఫాహ్యలా హెవాటకా జీవిత చక్రం. ఎ. శ్రావ ఫాహ్యలా. బి. మైరాసిడియం. సి. స్పిరోసెఫ్టె. డి. రీడియా. ఇ. సెర్కెరియా. ఎఫ్. మెటాసెర్కెరియా. 1. ముఖచూచకము. 2. ఉదర చూచకము. 3. మూతతో వున్న గుడ్డు. 4. తలలందిక. 5. శైలికలు. 6. బీజకణాలు. 7. జ్వాలా కణములు. 8. జననరంధ్రం. 9. తోక.

5. గుడ్లు పెట్టునప్పుడు మూత్రకోశము నందు నెప్పి కలుగచేయును. మూత్ర పిండ బాధ హినుటూరియా అనే వ్యాధి సంభవించును. ఇందులో మూత్రము వెంటడి రక్తము పడును.
6. గుడ్లు ఊపిరి తిత్తుల ధమనికలందు సేకరింపబడి, హృదయ పుష్పసస్టిఫోమియాసిస్ను కలుగజేయును.



పటం 9.3. సిస్టా సోమా జీవితచక్రం. 1. పరివర్తన చెందిన త్రాచిడివి. 2. గుడ్లు. 3. క్లికలతో వున్న పెండమును కల్గియున్న అండము. 4. మైరాసిడియం. 5. స్పొరోసెస్ట్ (మొదటి తరము). 6. స్పొరాసెస్ట్ (రెండవ తరము). 7. నత్తలో పెరుగుదల దశలు. 8. సెర్కేరియా. 9. త్రాచిడివులుగా పెరుగుతున్న సిస్టా సోమాలు.

సిస్టాసోమా హిమటోబియం జీవిత చక్రం



9.4.3 నియంత్రణ

1. సిస్టా సోమియాసిస్ అంటిమని పశువులనాటు అనగా టార్టార్ ఎమెటిక్, ఫ్యూడిన్ మొదలగునవి పొందుట వలన తగ్గును.
2. మార్మిక్ అతిథేయిలైన నత్తలను నాశనము గావించినచో ఈ వ్యాధి నియంత్రణ జరుగును. దీనికొరకు పచ్చిక బయళ్లను, నత్తలను లేకుండా చేయుటవలన లేదా నత్తలను తిను జాతులను విడచిన ఈ పని వెరవేరును.
3. కాపర్ పల్వేట్ లేదా కాపర్ కార్బొనేట్ నీటిపై చల్లిన సిస్టా సోమియాసిస్ అదుపులో నుండును.
4. త్రాగే నీటిని కుళావరచి సెర్కేరియా నిర్మూలనము గావించిన మానవునకు ఇది సంక్రిమించదు.

9.5. ఉపోద్ఘాతము—సెస్టోడ్ పరాన్న జీవులు

1. సెస్టోడ్లు పొడవుగా, ఖండితములతో బద్దెవలె ఉండుట వలన బద్దెపురుగుని పిలుస్తారు. వీని దేహము బల్ల పరపుగా పుష్కోదరంగా సామాన్యంగా మూడు భాగములుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. అవి:
 1. తల. 2. మెడ. 3. పెక్కు ఖండితాలతో ఏర్పడిన స్తోమెలా
2. ప్రాథ జీవులు మానవుని ఆంత్రములోను మరియు పకళేరుకాలలోను ఉంటాయి.
3. తల చూషకాలతోను, కొక్కెములతోను ఉంటుంది. వీని సహాయమున అతిథేయి దేహమును అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి.
4. అంతరాంగాలు స్పంజివలె నున్న, మృదు కణజాలముతో ఇమిడి ఉంటాయి.
5. నాడీ వ్యవస్థ కొన్ని నాడీ పంథులు, నిలుపు నాడీ దండాలతో ఉంటుంది.
6. వివర్ణక వ్యవస్థ ప్రతి ఖండిత పరాంతమున అద్దు నాళాలతో కలపబడన పార్శ్వ నిలుపు గొట్టాలతో ఉంటుంది. ఇవి వివరి ఖండితమున వెలుపలికి తెరుచుకుంటాయి. ఉదర నాళము నుండి పెక్కు కేళనాళికలు బయలు దేరి జ్వాలా కణములతో అంతమవుతాయి.


7. మగ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ యందు, విస్తరింపబడిన పెక్కు పురుషబీజ కోశాలు, శుక్రవాహిక, శుక్రకణాల సమకూర్పుటకు శుక్రాశయము ఉంటాయి. శుక్రవాహిక చివరి భాగము కండరయుతమైన సిరస్ అనబడును. పెక్కు బద్దె పురుగులందు సిరస్ మరియు యోని ఒక సంయుక్త జనన ఏటీయం లోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఏటీయం, మధ్య పార్శ్వతలము లకే ఉదల తలముపై ఒక రంధ్రము ద్వారా తెరుచుకొనును.
8. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ యందు ఒకటి లేక ఒక జత స్త్రీ బీజకోశములు ఉంటాయి. ఇందులో తమ్మెలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఊట్రెప్సు అవరించి మెట్టేస్ గ్రంధులు ఉంటాయి. ఇందులో గుడ్లు భాగాలు సమకూర్చడం జరుగును. శుక్ర కణాలు ప్రవేశించుటకు యోని శుక్రకణాలు ప్రోగు చేయుటకు శుక్రాశయము ఒక గర్భాశయము ఉంటాయి. గర్భాశయము వెలుపలికి తెరిచి ఉండచ్చు లేక పోవచ్చు.
9. గర్భాశయ రంధ్రము కలిగి (సూడ్ పైక్లోపైరిడియా) ఉన్న బద్దె పురుగులందు గుడ్లు పెరగుదల మరియు బయటకు పంపుట పెక్కు ఖండితములందు ఒకేసారి జరుగుతుంది. గర్భాశయ రంధ్రము లేని పైక్లో పైరిడియాలో గర్భాశయము గుడ్లతో విండి వుంటుంది. ఇట్లు గుడ్లతో విండి ఉన్న గర్భాశయముగల పరిపక్వ ఖండితాలు ఒక దాని తరువాత స్త్రాబైలా నుండి వేరై భూమిలోకి మలము ద్వారా చేరుకుంటాయి. ఇచ్చట గుడ్లు విడుదల చేయబడతాయి.
10. ఒకే ఖండితమునందు ఆత్మ ఫలదీకరణము లేదా రెండు ఖండితాల మధ్య లేదా రెండు వేరు పురుగుల మధ్య పర ఫలదీకరణము జరగవచ్చు. కాని సాధారణంగా రెండు ఖండితాల మధ్య ఫలదీకరణము ఎక్కువ జరుగుతుంది. జీవిత ప్లాకులందు వలె అంతర్జన్యమైనది కాదు.
11. బద్దె పురుగుల పెరుగుదల గుడ్లతో మొదలగును. గుడ్లయందలి పిండము గుండ్రముగా మూడు జతల కొక్కెములతో ఉంటుంది. వీనికి ఆంకోస్పియర్ (Onchosphere) అని పేరు. ఇవి వరైన ముఖ్య ఆతిథేయిచే తినబడితే స్కోలెక్స్ లు బ్రతుకుతాయి. ఆంత్రములోని శ్లేష్మ స్తరాన్ని అంటి పెట్టుకొని వుంటాయి. పెరిగి ప్రాథ జీవిగా ఎదగుతాయి.

9.6 టీనియా సోలియం

సాధారణనామము: పంది మాంసపు బద్దె పురుగు/ మానవుని బద్దె పురుగు.


టీనియా సోలియం ప్రాథ జీవులు మానవుని చిన్న ప్రేగులో నివసిస్తాయి. గుడ్లలోపల చిన్న చిన్న గోళాకార పిండాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. వీనిని ఆంకోస్పియర్ అని పిలుస్తారు. అండ కర్పరము లోపలి ఒకటి లేక రెండు పొరలు, పెరుగుచున్న పిండము నుండి ఏర్పడును. లోపలి త్వచాన్ని పిండ గుళిక లేదా ఎంబ్రియోఫోర్ (Embryophore) అంటారు. మలము ద్వార గుడ్లు ఆంకోస్పియర్ దశలో దేహము వెలుపలికి పంపబడుతాయి. మానవుని మలము గుడ్లతో సహా మాధ్యమిక ఆతిథేయియైనట్టి పంది దేహము చేరినచో, దాని ఆహార వాళములో గుడ్లు పగిలి ఆంకోస్పియర్ లను విడుదల చేస్తాయి. ఆంకోస్పియర్ కొక్కెముల సహాయమున ఆంత్ర కుడ్యమును చీల్చుకొని పోయి రక్తము లేదా శోష రషనాళాలను చేరుకుంటాయి. రక్తము నుండి రేఖిత కండరాలను ముఖ్యంగా నాలుక, మెడ వ్యాదయము మరియు పూర్వ చరమాంగములను చేరుకుంటాయి. కండరాలలోపల, హెక్సాకాంత్ తన కొక్కెములను కోల్పోయి పరిమాణం పెంచుకొని దేహము లోపల ద్రవముతో విండిన పెద్ద కుహరాన్ని కలిగి వుంటుంది. పిండము చుట్టూ అవభాసిని కోశము ఏర్పడును. దీనిని తిత్తి పురుగు లేదా సిస్టిసర్కస్ (Cysticercous) అంటారు. ఇవి 10 మి.మీ × 6 మి.మీ. పరిమాణం కలిగి తెల్లగా అండాకారంతో ఉంటాయి. తిత్తి పురుగులోని ద్రవం ఆతిథేయి రక్త జీవ ద్రవం నుంచి ఏర్పడును. తిత్తి పురుగునందు కొక్కెములు వున్న భాగమునకు విరుద్ధ భాగము దలితమై అంతర్గర్భము చెంది ఒకేచోట ఉబ్బెత్తుగా ఏర్పడుతుంది. ఉబ్బెత్తు లోపలి రాష్ట్రెల్లమ్ కొక్కెములు మరియు చూషకములు ఏర్పడును. ఇట్టి విలోమ స్కోలెక్స్ ను, ప్రోస్కోలెక్స్ (Prosclex) అంటారు. ప్రోస్కోలెక్స్ తో వున్న సిస్టిసర్కస్, సాంక్రమిక

జీవి. ఇది మానవుని చేరటకు వేచి వుంటుంది. ఆంకోస్టియర్, సిస్టిసర్కస్‌గా ఎదుగుటకు నాలుగు మాసముల వ్యవధి అవసరముంటుంది. పంది మాంసము ఇప్పుడు గోధుమ రంగు మచ్చలతో వుండి మచ్చల పంది మాంసము (Measly pork) అనబడును. ఈ మచ్చలుగల పంది మాంసమును బాగుగ వండక లేదా పచ్చికా వున్న దానిని తినినచో మానవునికి ఈ వ్యాధి సంక్రమించును. మానవుని ఆంత్రములందు సిస్టిసెర్కెస్ తన తిత్తిని విడనాడును. ప్రోస్కోలెక్స్‌ను బహిర్గతత్వము చెంది రాష్ట్రెల్లన్, కొక్కెములు మరియు చూషకములు, ప్రోథ బద్దె పురుగునందు వున్నట్లు కనపడును. ఇది రెండు మూడు మాసములందు పెరిగి ప్రోథ జీవిగా ఏర్పడును (పటం 9.4).



పటం 9.4. టేసియా సోలియం జీవిత చక్రం. 1. ప్రోథ టేసియా. 2. పరివర్త్య ఖండితము. 3. మానవ మలములో వున్న గుడ్డు. 4. హెక్సాకాంథ్. 5. సిస్టి సర్కస్‌లుతో వున్న పంది మాంసము. 6. అంతర్గతనం చెందిన స్కొలెక్స్. 7. బహిర్గతనం చెందిన స్కొలెక్స్. 8. పిల్లబద్దెపురుగు. 9. కొక్కెలు. 10. అముక్రోటికోజ్. 11. స్కొలెక్స్.

టీసియాసాలియం జీవిత చక్రం



9.6.1 వ్యాధి లక్షణములు

1. ఈ పరాన్న జీవులు ఉదర అవసరకాలతను కలుగ చేయును. దీని వలన ఆకలెక్కువగుట, కడుపు వొప్పి, ఆజీర్ణము, బరువు తగ్గుట, నీళ్ల విరేచనములు. నాడీ వ్యవస్థ అస్వస్థత మొదలగునవి సంభవిస్తాయి.
2. అప్పుడప్పుడు ప్రమాద వశమున గుడ్డు లేక గ్రీవ ఇండితాలు మానవుని జీర్ణాశయము చేరి ఆంకోస్టియర్లను విడుదల చేయవచ్చును. ఆత్మసంక్రమణము లేదా మామూలు సాంక్రమణము వలన సిస్టిసెర్కస్ ఢింభకాలు కణ సముదాయమునందు వివిధ కణముల మార్పిడి కలుగజేయును. ఉదాహరణకు బహు రూప కేంద్రక ల్యూకోసైటులు ఇన్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగును.
3. ప్రాథ జీవి సాంక్రమణముకన్న సిస్టిసెర్కస్ సాంక్రమణము అపాయకరమైనది. నాడీ వ్యవస్థయందు సిస్టిసెర్కస్ పెక్కు ప్రమాదకరమైన మూర్తులను కలుగజేస్తుంది. ఉదాహరణకు మెదడు నెక్రాసిస్ మరియు ఎపిలెప్సీ అనే వ్యాధులను కలుగ జేయును. ఇది చాలావరకు ప్రమాదకరమైనది.

9.6.2 నియంత్రణ

1. మానవ ఆవాసాంకు పండులను రావీయకుండా, మల పదార్థాలను మురుగు కాల్వల ద్వారా పంపించి ఆంకోస్టియర్లను చాలా వరకు నాశనం చేయవచ్చు.
2. పంది మాంసాన్ని బాగా పండి లేక అతిగా శీతలీకరించి సిస్టిసెర్కస్లను చంపవచ్చు.
3. యోమెసాన్, హైడ్రెలిరిసార్పినాల్ 1 గ్రా అకేజియా 2 గ్రాను మందుగా ఇచ్చినట్లయితే ప్రాథజీవులు నశిస్తాయి. దీనివల్ల ప్రోబిలా బయటకు వస్తుంది కావిస్కాలెక్స్లను మాత్రం శస్త్ర చికిత్స ద్వారానే తీసివేయవలె.

9.7 ఎక్సెనోకాకస్ గ్రాన్యూలోసస్

సాధారణనామము: కుక్క బద్దెపురుగు, హైడాటిడ్ బద్దెపురుగు.

ప్రాథజీవులు కుక్క చిన్న ప్రేగువందు మరియు ఇతర కుక్కల జాతికి చెందిన జంతువులందు నివసిస్తాయి.


9.7.1 జీవిత చక్రము

జీవిత చక్రము రెండు అతిథేయిలందు జరుగుతుంది. 1. ముఖ్య అతిథేయి: కుక్క, తోడేలు, నక్క మరియు జకాల్ 2. మాధ్యమిక అతిథేయి: గొర్రె, వంది, పశువులు, మేక మరియు మానవుడు.

గుడ్డు ముఖ్య అతిథేయి మలము ద్వారా (కుక్క) విసర్జింపబడుతాయి. ఇవి గొర్రె మరియు ఇతర పెంపుడు జంతువులు మేయునపుడు గడ్డి వెంబడి వాని దేహములోనికి చేరుకుంటాయి. మానవుడు ముఖ్యంగా పిల్లలు సాంక్రమిక కుక్కలతో ఆడుకొనునపుడు ఈ గుడ్డు వారిని చేరుకుంటాయి. ఆంధ్రములమునందు జీర్ణరసాల చేత గుడ్డు పై నుండి కర్పరపు పొర కరిగి పోయి అరు కొక్కెములు గల (హెక్సాకాంత్) ఢింభకము వెలువడుతుంది. దేహములోనికి చేరిన సుమారు ఎనిమిది గంటల తరువాత పిండము ఆంధ్ర కుడ్యమును చొచ్చుకొని నిర్వాహక సీరను చేరుకొంటుంది. ఇచట నుండి కాలేయానికి మరియు కాలేయ కేళ నాళికల ద్వారా పుపున ప్రసరణ ద్వారా ఇతర అంగములను చేరుకుంటాయి. సాధారణంగా పెంపుడు జంతువుల అన్ని అంగాలను ముఖ్యంగా కాలేయము మరియు శ్వాస కోశములను ఆశ్రయిస్తాయి. ఎచట స్థిరపడినను ఇది హైడాటిడ్ కోశము ఏర్పరుస్తుంది. కోశము లోపలి భాగమున పంథాన గుళికలు పెక్కు స్కొలెక్స్ లతో పెరుగుతాయి. ఒక గుడ్డు నుండి ఏర్పడిన హైడాటిడ్ కోశమునందు వేలకొలది స్కొలెక్స్ లు వుంటాయి. ఇట్టి స్కొలెక్స్ లు ఒక ముండ్లతో నిండియున్న కాయలవలె గోచరిస్తాయి. ఈ కారణమున ఈ పరాన్న జీవి పేరు ఎక్సెన్ కాకస్ అనబడింది. పరాన్న జీవి పరిపూర్ణముగా ఎదిగినట్లు, కోశములో స్కొలెక్స్ పెరుగుదలతో గమనించవచ్చును. హైడాటిడ్ లు కుక్క దేహము చేరిన ఆంధ్రమునందు ఆరేడు వారములలో ప్రాథ జీవులుగా ఎరుగుతాయి. ఇట్లు జీవిత చక్రము తిరిగి జరుగుతుంది. ఒక కుక్క జాతి అతిథేయి యందు ప్రాథ జీవి జీవితం 6 నెలల కాలము వరకు మాత్రమే కొనసాగుతుంది. కాని ఢింభకదళ కొన్ని సంవత్సరముల వరకు వుంటుంది (పటం 9.5)

9.7.2 రోగ లక్షణములు

1. కోశాల పెరుగుదల కాలములో ఎక్కువ నష్టము కలుగ చేస్తాయి. పరాన్న జీవుల చుట్టు ఉండు కణజాలమునందు వాపుకు సంబంధించిన ప్రక్రియలు అతిథేయి దేహమునందు తంతుయుత కణజాలాన్ని పెంచుటకు దోహదము చేయును.



పటం 9.5. ఎక్సెన్ కాకస్ గ్రామ్యలోపన జీవిత చక్రం. 1. ప్రాథ ఎక్సెన్ కాకస్. 2. గుడ్డు. 3. హైడాటిడ్ సెన్స్ ఢింభక దళ.

2. ఆస్తి కణజాలము దుర్బలమగును. కాలేయము విస్తరించును.
3. మెదడు మరియు కండల లోపలి కోశాలు పెరుగుట ప్రమాదకరము.
4. హైడాటిడ్లోని ద్రవము నందు విష పదార్థాలు (Toxins) బయలుదేరి వివిధ రకాల చెడు ప్రభావములను కలుగజేస్తాయి. ఉదా. వాంతులు, నీళ్ల విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, ఇసిన్ ఫీలియా, అవుడపుడు మరణము కూడా సంభవించవచ్చు.

9.7.3 నియంత్రణ

1. కుక్కలతో ఆడుట పనికిరాదు.
2. భోజనమునకు పూర్వము చేతులు శుభ్రము చేయవలెను.
3. గొర్రెల, పశువుల మరియు కుక్కలయొక్క పచ్చిమాంసమును కుక్కల తిరిగి తినకుండా చూడవలెను.

9.8 స్వపరిశీలన

1. అంతర, బాహ్య పరాన్న జీవులు, చూషకాలను, లఘుత్రోటిని, కొక్కెలను పెంచుకోవడమే గాక సంక్లిష్ట జీవిత చక్రాలు ఎన్నో లార్వా దశలతో ఉంటాయి. వీటిలో కొన్ని అంగాలు నష్టపోతాయి. ఈ లక్షణాలని ఉమ్మడిగా వాటి _____ అని పిలుస్తారు.
2. అత్యధిక ప్లాటి హెల్మింథిస్ జీవులు సకళిరుకాలలోని అంతర పరాన్న జీవులు కావి విచిత్రంగా వాటి మాధ్యమిక ఆతిథేయులు మూత్రం _____

9.9 సారాంశం

1. ఇవి పుష్కోదరముగ అణగి, ద్విపార్శ్వ సాష్టవము కలిగి, కుహర రహిత పురుగుల వలె నుండు జంతువులు.
2. వీనియందు పాయువు, ప్రసరణ, ఆస్తి సంజరము మరియు శ్వాస వ్యవస్థలు లేవు.
3. వివిధ అంగాల మధ్య స్థలము, మృదు కణజాలముతో నిండి వుంటుంది.
4. విసర్జక వ్యవస్థ ఆదివృక్కాలతో ఏర్పడి ఉండును.
5. ఇవి సామాన్యముగ ఉభయలింగ జీవులు. వీని ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు క్లిష్టమైనవి. ఈ విభాగమునందు డైజీవియా, సెస్టోడా తరగతులకు సంబంధించిన పురుగులను వివరించనైనది.

9.10 స్వపరిశీలన — జవాబులు

1. పరాన్న జీవన, అనుకూలవాలు
2. అకళిరుకాలు.

9.11 నమూన ప్రశ్నలు

1. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి
1. ఫిష్కోలా హెపాటికా జీవిత చక్రాన్ని వివరించండి.

2. సిస్టో సోమా హిమటోబియం జీవిత చక్రాన్ని వివరించి, దాని రోగ లక్షణము గురించి తెలుపండి.

3. టీవియా సోలియం జీవిత చక్రాన్ని విరించి, దాని రోగ లక్షణములను తెలుపండి.

పటం 9.5. ఎక్సెన్ కోకస్ గ్రామ్యులోసస్ జీవిత చక్రం. 1. ప్రొథ ఎక్సెన్ కాకస్. 2. గుడ్లు. 3. హైడాటిడ్ సిస్ట్ డింభక దశ.

9.12 పదకోశం

ఎసిలోమేట	: దేహకుహర రహితజీవి (సీలోం)
కోశీభవనం	: కోశముతో కప్పి ఉండుట
ఉభయలైంగిక	: ఒకే జీవి యందు స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అంగములు కలిగి ఉండుట
పరాన్నజీవి	: ఒక జీవి రెండవ జీవిపై ఆధారపడి జీవించునది
ప్లానేరియన్	: బద్దెపురుగులందు స్వతంత్ర జీవనము గడుపుజీవి.
ప్లాటేనాల్మింథీస్	: బద్దెపురుగుల వర్గము
పెర్కేరియా	: ఫ్లాగెల్ జీవిత చక్రమునందు రీడియాల నుండి పెరుగు డింభకము. ఇది ముఖ్య అతిథికి సంక్రిమించి కోశీభవనము చెందును.
విదళనం	: ఫలదీకరణము చెందిన గ్రుడ్డులోని ప్రారంభవిభజనలు.
నాడీసంధి	: మెదడుకన్న పరళమైన నాడీకణ సముదాయం.
హైడాటిడ్ కోశము	: ఎక్సెన్ కాకస్, బద్దెపురుగు ఏర్పరుచు ఒకపెద్ద కోశము.
ఆతిథేయ	: పరాన్న జీవికి స్థావరము, ఆహారము మరియు ఇతర అవసరాలను అందజేయుజీవి.
అంతర్వర్తనము	: బ్లాస్టులా నుండి గ్రేస్టులా ఏర్పడునపుడు పిండకుహరములోనికి కణముల వర్తము వొచ్చుకొని పోవుట.
మిరాసిడియం	: ఫ్లాగుల జీవిత చక్రమునందు గ్రుడ్డునుండి పెరిగే మొదటి డింభకదశ.
అంకోస్టియర్	: బద్దెపురుగు యొక్క డింభకదశ.
ఓపర్ కులం	: మూలవంటి విర్మాణం.
స్త్రీ బీజకోశము	: జీవులందు అండములను ఉత్పన్నము చేయు అంగము.
మృదుకణజాలము	: మెత్తని సంధాయిక కణజాలము. ఇది పురుగుల వివిధాంగముల మధ్యనుండి భౌతికములను పూరించును.
రీడియా	: ఫ్లాగుల జీవిత చక్రమునందు సిద్ధ బీజకోశమును ఉత్పత్తి చేయు డింభక దశ.
సిద్ధ బీజకోశము	: ఫ్లాగుల జీవిత చక్రములోని ఒక డింభకదశ.
సిస్టోసోమియాసిస్	: రక్తపు ఫ్లాక్ కలుగ చేయు వ్యాధి.

భాగము — 10 ఆస్క్ హెల్మింథిన్ సామాన్య లక్షణములు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

10.1 ఉద్దేశ్యము

10.2 ఉపోద్ఘాతము

10.3 సామాన్య లక్షణాలు.

10.4 వర్గీకరణ

10.4.1. తరగతి — విమటోడా

10.4.2. తరగతి — నెమాటోమార్తా

10.4.3. తరగతి — రోటిఫెరా

10.4.4. తరగతి — గాస్ట్రోట్రైకా

10.4.5. తరగతి — కైనోరింకా

10.5 స్వపరిశీలనం

10.6 సారాంశం

10.7 స్వపరిశీలనం — జవాబులు

10.8 సమూహ ప్రశ్నలు

10.1 ఉద్దేశ్యము

ఇది ఆస్క్ హెల్మింథిన్ సామాన్య లక్షణములను, వివిధ తరగతులందు ఉండే వైవిధ్యాలను వివరిస్తుంది. ఇందులో మిథ్యా దేహ కుహర లక్షణమును వివరించబడినది.

ఈ వర్గాన్ని అధ్యయనం చేసి తరువాత నీవు ఈ జీవుల శరీరంలో ద్రవపూరితమైన ఇటువంటి కుహరం ప్రప్రథమంగా ఏర్పడిందనీ, మధ్యతవధాగాలు ఈ కుహరం బయటి వైపుంటాయి. ఈ కుహరం పిండ సంయుక్త బీజకుహరానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.

10.2 ఉపోద్ఘాతము

మిథ్యాశరీర కుహరముండే జీవుల సమూహాలన్నీ ఆస్క్ హెల్మింథిన్ వర్గంలో చేరినాయి. దీని విభాగాలలో ఎంతో వైవిధ్యం ఉంది. అందుచేత ప్రతి విభాగాన్ని వేరే ఒక వర్గంగా పరిగణించవలసివస్తుంది. కానీ విటిస్సిటిసి బంధించేవి ఈ జీవుల నిర్మితలో ఉండే మౌలిక సామ్యం, మిథ్యాశరీర కుహరం.

10.3 సామాన్య లక్షణాలు

1. ఇవి స్త్రాసాకార, ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యము కల, త్రిస్తరిత, మిథ్యా కుహర, బహుకణ జీవులు.
2. ఇవి మంచి నీరు, సముద్రపు నీరు రెండింటిలో నివసిస్తాయి. కొన్ని భూమి మీద నివసించుతాయి. ఇవి

స్వతంత్ర జీవులు లేదా పరాన్న జీవులు.

3. కొన్ని చాలా చిన్నగా, సూక్ష్మదర్శినితో కనబడునవి. మరికొన్ని పెద్దగా ఒక మీటరు కన్న ఎక్కువ పొడవు కలిగి వుంటాయి. దేహము పురుగు వలె ఖండితములుగా ఉండి విభజింపబడి వుండదు లేదా పైపైన విభజింపబడి ఉంటుంది.
4. పూర్వంతమున పుష్టమైన తల లేదు.
5. దేహము దలితమైన, వంగే శక్తిగల అనభాసినితో కప్పబడి ఉంటుంది. సాధారణంగా అనభాసిని కంటకాలు, గండు రోమాలు కలిగి ఉంటాయి.
6. బాహ్య చర్మము కణములతో లేక పిషీయల్ గా ఉండును.
7. కండర పుంజము సాధారణంగా నిలుపు పోగులతో ఉంటుంది.
8. జీర్ణ వాహిక నోటి నుండి పాయువు వరకు గల ఒక తిన్నని గొట్టము. ఇందులో గ్రహవి తప్ప ఇతర భాగములందు కండర పుంజము లేదు. గ్రహవి బాగుగా ఎదిగి కండరములతో ఉంటును.
9. శ్వాస మరియు ప్రసరణ వ్యవస్థలు లేవు.
10. విసర్జక వ్యవస్థ కుచ్చులు, ఆది వృక్కాలతో ఉంటుంది.
11. జ్ఞానంగములుగా, శైలికా మయగర్తలు, సూక్ష్మాంకురాలు, గండు రోమాలు, కంటి ముక్కలు పనిచేస్తాయి.
12. ఇవి ఏకలింగ జీవులు. లింగాలు వేరుగా ఉండును. మగ జీవులు, ఆడ జీవుల కన్నా, చిన్నవిగా ఉంటాయి. బీజకోశాలు ఒంటిగా లేక ద్వయంగా ఉంటాయి. గుడ్లు చిన్నవిగాను, కైటిన్ తో ఏర్పడిన కర్పరముతో ఉంటాయి.
13. పెరుగుదల ప్రత్యక్షంగాను, అప్రత్యక్షంగాను ఉండి, జీవిత చరిత్ర క్లిష్టమైఉంటుంది.

10.4 వర్గీకరణ

ఆప్ట్ హెల్మింథిస్ వర్గము ఐదు తరగతులుగా విభజింపబడింది. అవి:

1. నిమటోడా (Nematoda) 2. నిమటో మార్ఫా (Mematomorpha) 3. రోటిఫెరా (Rotifera) 4. గాస్ట్రోట్రైకా (Gastrotoicha) 5. కైన్రోరింకా (Kinorhyncha)

10.4.1 తరగతి నిమటోడా

1. ఇవి తేమగల వేలలో, మంచినీటిలో, సముద్రనీటిలో, వృక్షములలో మరియు జంతువులలో వివసిస్తాయి.
2. ఏవి దేహము స్థూపికారంగా, పురుగు వలె పొడవుగా ఉంటాయి.
3. ఏవివి సామాన్యముగా "గుండ్రు పురుగులవి" పిలుస్తారు. తల, శైలికలు మరియు ఖండితనము ఇందులో లోపించి ఉండును.
4. దేహకుడ్యము కఠినమైన విరోధక శక్తిగల అనభాసినితో కప్పబడి ఉంటుంది.
5. బాహ్య చర్మము పింపిషీయల్ గా వాలుగు లేక ఎక్కువ నిలుపు దండాలు మరియు నిలుపు కండరాలతో ఉంటుంది.

11.4.2 రోగ లక్షణాలు

1. ఈ పరాన్న జీవి వలన అంతైలో స్టోమియాసిస్ (Ancylostomiasis) అను వ్యాధి సంభవించును. దీని ముఖ్య లక్షణము రక్త పోషణ.
2. మానవుడు పాదరక్షలు లేక మలిన వడిన నేలపై నడిచిన ఈ వ్యాధి సంభవించును. ఈ వ్యాధి వలన ఆర్థిక నష్టము మరియు ఆరోగ్యము చెడుట సంభవించును.
3. ఫైలోరిఫామ్ డింభకము చర్మమును తాకిన తక్షణమే అందులోనికి చొచ్చుకొని పోతుంది.
4. చొచ్చుకొని పోయే డింభకాలు ప్రతికార క్షోభ్యతను కలిగించును. చర్మము ఉబ్బును. గుల గుల మొదలగును.
5. ప్రాథ జీవులు జీర్ణాశయము, ఆంత్రము నందు నొప్పి కలిగించును. నీటి విరేచనాలు గుండె దడదడ చివరకు మరణము సంభవించును.

11.4.3 నియంత్రణ


1. చీవో ఫోడియం, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, హైక్సాల్ రిసార్సినాల్ (Hexylesorcinol) వంటి పెక్కు మందులు వాడుట వలన రోగము నయమగును. క్రిములు దేహము నుండి తీసివేయ బడతాయి.
2. చాలా బలీయమైన, తక్కువ విషపూరితమైనట్టి టెట్రాక్లోరో ఇథీలీన్ (Tetrachloroethylene) సాధారణంగా సిఫారసు చేయబడిన మందు.
3. ప్రజలలో వ్యక్తిగత శుభ్రత, పరిసరములను శుభ్రము గావించుట గురించి బోధించవలెను. ముఖ్యముగా పిల్లలకు భోజనమునకు పూర్వము చేతులు కడుగుకొనుట అలవాటు చేయవలెను.
4. ప్రతి ఇంటిలో మరుగు దొడ్డిని కట్టించవలెను. మానవుల మలమును భూమి లోపల నిర్మించిన గొట్టముల ద్వారా పారవేయ వలయును.

11.5 వుకరేరియా బాంక్రాస్టి

Synonym: ఫైలేరియా బాంక్రాస్టి

సామాన్య నామము: బాంక్రాస్టి ఫైలేరియా

ఆడ పురుగు అండ శిశోత్పాదకాలు. ఇవి బాగా ఎదిగిన పిండము గల గుడ్లను పెట్టాయి. ఈ పిండమును మైక్రోఫైలేరియా అంటారు. మైక్రోఫైలేరియా చురుకుగా రక్తములో తిరుగుతుంటాయి. విరంజితము చేయని మైక్రో ఫైలేరియా పారదర్శకంగా, వర్ణ రహితంగా వుండు దేహాలు. వీని తల మొండిగా, తోక



పటం 11.3. వుకరేరియా బాంక్రాస్టి డింభక దళ (మైక్రోఫైలేరియా)

1. మైక్రోఫైలేరియా, 2. తొడుగు, 3. ఎర్రరక్త కణాలు, 4. నాడి వలయము, 5. విసర్జన కండ్లం, 6. జీ కణాలు (2-4), 7. పాము రంధ్రము

పాడుగ్గా, కూచిగా ఉంటుంది. పిండము 290 మైక్రాన్ల పొడవు, 6 7 మైక్రాన్ల వెడల్పు ఉంటుంది. వీనిని ఆవరించి ఒక కానాథ (hyaline) తొడుగు లోపలి కేంద్రకాలు మరికొన్ని 'G' కణాలు లేక జీవన కణాలు ఉంటాయి. (పటం 11.3)

మానవుని శరీరము లోపల డింభకాలు పెరుగుదలను కొనసాగించవు. పరైన మాధ్యమిక అతిథేయి (క్యూలెక్స్ దోమ) కొరకు వేచి ఉంటాయి. క్యూలెక్స్ దోమ దేహమును చేరనట్లే తే మైక్రోస్టైలేరియాలు చనిపోతాయి. మైక్రోస్టైలేరియాలు మానవుని దేహమునందు 70 రోజుల వరకు జీవింది ఉంటాయి. మైక్రోస్టైలేరియాలు రాత్రులందు పరిధీయ రక్త నాళములందు ఆవర్తిత పద్ధతిలో గోచరిస్తాయి. దీనిని "నిశాకాల గమనము" అంటారు.

11.5.1 జీవిత చక్రము

జీవిత చక్రము రెండు అతిథేయిలందు జరుగును. ఒకటి మానవుడు, రెండవది దోమ. మానవుడు ముఖ్యఅతిథేయి, ప్రాథమిక మానవుని శోషరస వ్యవస్థయందు నివసించును. సజీవ పిండాలు (మైక్రోస్టైలేరియా) విడుదలై రక్తప్రవాహము చేరుకుంటాయి. పరిధీయ రక్తనాళాలలో ఎట్టి మార్పు లేకుండ కొంతకాలము ఉంటాయి. ఆడక్యూలెక్స్ దోమ రక్తము పీల్చుకొనుట వలన దాని దేహములోనికి చేరుకొంటాయి.

మాధ్యమిక అతిథేయి క్యూలెక్స్ జాతికి చెందిన దోమ, దోమ లోపల మైక్రోస్టైలేరియాలు పెరుగుదలను సాగిస్తాయి. తొడుగుతో నున్న మైక్రోస్టైలేరియాలు దోమ జీర్ణాశయమునకు పూర్వ భాగము చుట్టూ ప్రాగుచేయ బడుతాయి. ఆ పిదప, తమ తొడుగును వదిలి, ఒకటి రెండు గంటల లోపల జీర్ణాశాళ కుడ్యమును చొచ్చుకొని వక్షస్థల కండరాలను చేరుకుంటాయి. ఇవల డింభకాలు విశ్రమించి పెరగడం ప్రారంభించుతాయి. తరువాత రెండు దినములలో సున్నితమైన జీవి పొట్టిగా దళితంగా ఉండే జీవిగా మారిపోతుంది. సాసీజ్ ఆకారముగల నిర్మాణము చిన్నవిగా పొడుచుకొని ఉన్న తోకతో 124 నుండి 250 మైక్రానుల పొడుగు, 10 నుండి 17 మైక్రానుల వెడల్పు కలిగి వుంటుంది. ఇది మొదటి దశ డింభకము. దీనిలో అపార నాళము అవశేషింగముగ ఉంటుంది. 3 నుండి 7 దినములలో డింభకము త్వరగా పెరిగి, ఒకటి లేక రెండు సార్లు నిర్మోచనము చెంది, రెండవ దశ డింభకము అవిపిస్తుంది. ఇది 225 నుండి 330 మైక్రాన్ల పొడవు, 15 నుండి 30 మైక్రాన్ల వెడల్పు ఉంటుంది. పది లేక పదకొండవ దినము లోపల రూప విక్రయ పూర్తి అవుతుంది. లేక ఒక చిన్న బొడివగా మిగిలిపోతుంది. జీర్ణ వ్యవస్థ, దేహ కుహరము, జననాంగాలు ఇప్పుడు బాగా ఎదిగి ఉంటాయి. ఇది మూడవ దశ డింభకము. దీని పొడవు 1500 నుండి 2000 మైక్రాన్లు, వెడల్పు 18 నుండి 23 మైక్రానుల ఉంటుంది. ఇది మానవునకు సంక్రమించు దశ. 14 దినముల లేక పద్నాలుగు దినముల లోపల తొండపు తొడుగులోనికి చేరుకుంటాయి. తొండపు తొడుగు లోపల ఒక్క మైక్రోస్టైలేరియా నుండి ఒక్క సాంక్రమిక డింభకము పెరుగుతుంది.

పరాన్న జీవులు కలికి యున్న దోమ, కాటువేసినచో మూడవ దశ డింభకము చర్మములోనికి చొచ్చుకపోయి, శోషరస నాళాలను చేరుకొంటుంది. చివరకు ఏదో ఒక చోట (నాంక్షణ, ముష్కగోణి లేక ఉదర శోష నాళికలు) సిద్ధపడి ప్రాథ జీవులుగ పెరుగుతాయి. కాలక్రమేణ, రమారమి 5 నుండి 18 మాసముల సమయములో లైంగిక పరిణతి చెందుతాయి. మగజీవి, ఆడజీవిని ఫలధీకరణము చేస్తుంది. పరిపక్వ స్త్రీ జీవి డింభకాలను కంటుంది. మైక్రోస్టైలేరియాల ఒక క్రొత్త తరము వెలువడి వక్షస్థల లేదా కుడి శోషరస నాళము ద్వారా సిరా మండలము మరియు పుపుస కేస నాళికలను చేరి చివరకు పరిధీయ ప్రసరణను చేరుకొంటాయి. ఇట్లు చక్రమును పమాప్రము చేస్తాయి.

11.5.2 రోగ లక్షణాలు

1. పైరేరియా క్రిములు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నచో శోషరస నాళాలను ఆడ్డుకొంటాయి.
2. ప్రభావిత భాగములలో శోషరసము కూడుకొని అయా భాగములందు వాపును కలుగజేస్తాయి.
3. ఈ వ్యాధిని ఎలిఫెంట్యాసిస్ లేదా పైరేరి యాసిస్ (బోధకాలు) అని అంటారు.
4. దీనికి సాధారణంగా చేతులు, కాళ్ళు, ముష్కగోణి, క్షీర గ్రంథులు గురియవుతాయి.

11.5.3 నియంత్రణ

1. రోమల మండి రక్షణ కల్పించిన వుకరేరియా బాంక్రాప్టి సంక్రమణమును ఆపివేయును.
2. రోమలను నాశనము చేసి దీని సంక్రమణమును నియంత్రించ వచ్చును.
3. హెట్రజాన్ మందు ద్వారా వాహకుల చికిత్స కావించవచ్చును.

11.6 డ్రాకుంకులన్ మెడినెన్సిస్ (Linnaeus, 1758) Gallandont 1773)

సాధారణ నామము: గిని పురుగు, పర్చెంట్ పురుగు, డ్రాగన్ పురుగు, మెడినా పురుగు.


ప్రాథమిక జీవులు సామాన్యంగా అధశ్చర్మ కణజాలము నందు ముఖ్యంగా కాళ్ళు, చేతులు మరియు పిపు భాగమున ఉంటాయి. మగ జీవులు కొంత వరకు మానవుని యందు (ఒకసారి ఇండియా నుంచి మినహా) కనబడలేదు. పరిశోధక జీవులందు మగ జీవులను కనుగొన్నారు. (పటం 11.4)

11.6.1 జీవిత చక్రము

దీని జీవిత చక్రము రెండు ఆతిథేయిలు: మానవుడు, సైక్లాప్స్ లో సమాప్తము చెందును.

1. ముఖ్యఆతిథేయి: ప్రాథమిక మానవుని అధశ్చర్మకణ జాలమునుందు ఉంటుంది.
2. మాధ్యమిక ఆతిథేయి: సైక్లాప్స్ నందు పిండము కొన్ని పెరుగుదల దశలను గడుపుకొని, పాంక్రమిక దశను చేరుకొంటుంది.

సైక్లాప్స్ నందు పిండము పెరుగుతుంది. ఒక సైక్లాప్స్ 15 నుండి 20 వరకు డ్రాకుంకులన్ పిండములను అంతర్గతము చేసికొంటుంది.



పటం. 11. 4. డ్రాకుంకులన్, మెడినెన్సిస్ A ప్రౌఠ పురుగు. B మగజీని పూర్వాయత భాగము. C, మగజీని పుద్బ భాగము. 1 శిరస్థ వెదవి. 2. కండ రయత గ్రసని. 3. గ్రంథియత గ్రసని. 4. నాడి వలయము. 5 గ్రీవ ప్రాంతపు సూక్ష్మంకురాలు. 6. మేహన కంటకాలు, 7 పాయపు 8. పాయ వర సూక్ష్మంకురాలు.

సంక్రమణ చెందిన పైక్లాప్స్ 42 దినములలోను, పరాన్న జీవులు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నచో 15 రోజులలో చనిపోతుంది.

పైక్లాప్స్ యొక్క సాధారణ జీవిత కాలము మూడు మాసములు.

పైక్లాప్స్ నందు పిండము ఆహార నాళ కుడ్యములోకి 16 గంటల లోపల చొచ్చుకొపోయి దేహకుహరము చేరుకొంటుంది. ఇచట పిండము రూప విక్రయ చెంది పరిమాణములో పెద్దదవుతుంది. పెరుగుదల పూర్తి యగుటకు రెండు వారములు పట్టును.

మానవుని లోనికి ప్రవేశించుట మరియు ప్రాథమీకపులుగ పెరుగుట

వడబోయని త్రాగేనీటి ద్వారా, సాంక్రమిక పురుగులు గల పైక్లాప్స్లను మానవుడు మ్రింగుతాడు. జీర్ణాశయమునందు జీర్ణరసములచే పైక్లాప్స్ జీర్ణింపబడి డింభకాలు విడుదల అవుతాయి. ఇప్పుడివి, జీర్ణనాళ కుడ్యమును చేరించుకొని సంధాయ కణజాలము చేరి పెరిగి పెద్దదై లైంగిక పరిణితిని చేరుకుంటాయి. మానవుని లోపల డింభకాలు ప్రాథ ఆడ, మగ జీవులుగా ఏర్పడుతాయి. మగ జీవులు, ఆడజీవులను ఫలధీకరణము చేసిన వెంటనే మరణిస్తాయి. ఆడ, మగ జీవుల కలియక ఆంత్రము నందు గాక లోతుగా నున్న సంధాయక కణజాలము నందు జరుగును. పరిపక్వ ఆడ జీవులు, ఆరు వెలల కాలములో క్రొత్త స్థానము చేరుకొని, నీటిలోనికి పిండములను వదులుట ఆరంభిస్తాయి. సాధారణంగా పరిపక్వ ఆడజీవులు, నీటి స్పర్శను చెందే కాళ్ళు, చేతులు మొదలైన భాగములను ఎంచుకొని వలస పోయి స్థిరపడతాయి. బట్టలు ఉతికే వారి కాళ్ళ చేతులు బావులు మరియు కుంటల నుండి కుండలతో నీళ్ళ ముంచి తెచ్చుకునే వారి కాళ్ళ చర్మము చేరగనే విషపదార్థము (టాక్సిన్)ను విడుదలచేస్తాయి. దీని వలన చర్మముపై పొక్కు ఏర్పడి, తరువాత పగలటంతో వుండు ఏర్పడుతుంది. నీరు తగిలిన వెంటనే పురుగునకు ప్రేరణ కలిగి వుండు నుంచి ఒక విధమైన తెల్లని పొలవంటి ద్రవము కారును. గర్భాశయము నుండి విడుదల చేయబడిన పిండము ద్రవము ద్వారా నీటిని చేరుకుంటాయి. తిరిగి జీవిత చక్రాన్ని ప్రారంభిస్తాయి.

11.6.2 రోగ లక్షణాలు

1. ద్రాకంకులన్ వలన గిని పురుగు వ్యాధి సంభవిస్తుంది. దీని వలన ఉబ్బసం, అర్ధికేరియా, దురద, వాంతి, నీటి విరేచనము, డిస్ట్రీయా, ఇననోఫిరియా మొదలగునవి సంభవించును.
2. పరాన్న జీవి పృష్టించే టాక్సిక్ పదార్థముల ప్రభావముతో వ్యాధి లక్షణాలు సంభవిస్తాయి.

11.6.3 నియంత్రణ

పైక్లాప్స్ వివారణ వలన త్రాగేనీటిని వేడిచేసి, మరియు వడబోపి త్రాగినచో ఈ వ్యాధిని నియంత్రించ వచ్చును.

11.7 హెల్మింథీన్ పరాన్న జీవుల అనుకూలనాలు

హెల్మింథీన్ పరాన్నజీవులు, అవి నివసించే ప్రత్యేకమైన వాతావరణమును అనుసరించి బాహ్య రూప లక్షణాలలో, శారీరక ధర్మంగా రూపాంతరము చెందినాయి. రూపాంతరాలు పరాన్న జీవి స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

బాహ్యరూప అనుకూలనాలు

1. చలన, జీర్ణ వ్యవస్థ, జ్ఞానాంగాలలో తిరోగామిత్యము లేదా క్షీణించబడి వుండటం జరుగుతుంది.

విభాగము — 12 అనెలిడా — సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

- 12.1 ఉద్దేశ్యము
- 12.2 ఉపోద్ఘాతము
- 12.3 సామాన్య లక్షణాలు
- 12.4 వర్గీకరణ
 - 12.4.1 విభాగము — హీలిక్టీటా
 - 12.4.2 విభాగము — అర్కి అనెలిడా
 - 12.4.3 విభాగము — లిగోక్టీటా
 - 12.4.4 విభాగము — హిరుడినియా
- 12.5 స్వపరిశీలన
- 12.6 సారాంశము
- 12.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 12.8 నమూనా ప్రశ్నలు

12.1 ఉద్దేశ్యము

అనెలిడా వర్గపు సాధారణ లక్షణాలు వాటి విభాగ లక్షణాలను వివరించడమైనది. ఈ వివరణవలన వర్గములోని వివిధ భాగాలలోని జీవుల సామాన్య లక్షణాలు ఒకదానితో ఒకటి సన్నిహితంగా వుంటుందని తెలియుచున్నది. దేహాశాండావస్థ, ప్రైజోసీలోన్, సంవృత రక్త వ్యవస్థకు చెందిన భావనలు వాటి ప్రాముఖ్యం జంతు పరిణామంలో ఏ విధంగా ఉందో నీవు బోధించగలుగుతావు.

12.2 ఉపోద్ఘాతం

మృదు శరీర నిర్మాణము గల జంతువులన్నింటిని 'క్రిములు' (Vermes) అను సముదాయములో చేర్చడము పూర్వము పరిపాటిగా వుండేది. అందువలన పరాన్నజీవులు కొన్ని ఆరాక్ నిడ్లు, క్రస్టేషియన్లు, యా క్రిములు అనుసముదాయములో వుండేవి. కానీ లామార్కు (1890)లో, ఈ జీవుల శరీరములోని వుంగరాల వంటి ఖండిత నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని జీవులను వేరుచేసి వర్గానికి అనెలిడా అను నామకరణము చేసినాడు. ఈ వర్గములో సుమారు 8,500 జాతులు వున్నాయి. సాండ్వర్మ్లు, వాస పాములు, జలగలు మొదలైన జీవులు యిందులో చేర్చబడినాయి.

12.3 సామాన్య లక్షణాలు

2. వీటి శరీరమంతయు పుంగరాల వంటి దేహఖండితాలచే విభజింపబడి వుంటుంది. ఈ దేహ ఖండాలు బాహ్యంగా గాడులచేతను లోపల విభాజకాల చేతను విభజింపబడి వుంటాయి. ఈ విధమైన శరీర విభజనను సమఖండ విన్యాసము (True metamerism) అని అంటారు.
3. పూర్వార్వంతములో నోటికి ముందు ముఖ పూర్వ భాగము వుంటుంది. పాయువు పాయు ఖండితములో వుంటుంది. దీనిచే 'పైజీడియమ్' అని అంటారు. ఈ రెండింటి మధ్యనున్న భాగములో ఖండితాలు ఒకే విర్మాణముతో వుంటాయి.
4. శరీర కుద్యమును ఆవరించి పారదర్శక, కణరహిత, పలుచని పొర వుంటుంది. దీనిని అవభాసిని అంటారు. ఇది బాహ్యత్వచ నిర్మితము.
5. బాహ్యచర్మము ఏకకణ స్తరముతో వుంటుంది. ఇందులో వివిధ రకాల కణాలు, క్లెటిన్ చే నిర్మింపబడిన శూకాలు వుంటాయి.
6. శరీర కుద్యము, అవరనాశాన్ని వర్తుల, ఆయత కండరస్తరాలు కలిగి వుంటుంది.
7. శరీర కుహరము నిజమైనది (True coelom). ఈ కుహరము యిరువైపుల మధ్యత్వచ నిర్మితమైన ఉపకళచే ఆవరింపబడి వుంటుంది. ఇది సీలోమిక్ ద్రవముతో నిండి వుంటుంది. సీలోమిక్ ద్రవము విభాజకాలతో సహా బిగుతుగా (Incompressible) వుండి జల రూప అస్థిపంజరముగా (Hydraulic B skeleton) వ్యవహరిస్తుంది. కానీ, జలగవంటి జీవులలో సీలోమ క్షీణదశలో వుంటుంది.
8. క్లెటిన్ విర్మాణమైన శూకాలు గమనానికి పుషయోగంగా వుంటాయి. పాలీకీటా జీవులలో ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెందిన పార్శ్వ పొదాలలో శూకాలు కట్టులుగా వుంటాయి. జలగలలో శూకాలు పుండవు. (ఒక ఆకాంథోడ్స్ లలో తప్ప), చూషకాలు వీటిలో గమనాంగాలుగా వుంటాయి.
9. జీర్ణ వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది. ఆహారనాళము తిన్ననైన గొట్టము. ఇది వివిధ భాగాలుగా విభక్తమై వుంటుంది. గ్రసని గ్రంథులు, కొన్ని జీవులలో ఆంత్రగ్రంథులు (Intestinal glands) వుంటాయి. జలగలలో ఆహార నాళము రెండు భాగాలతో వుంటుంది. ఇందులో ఒకటి ఆహారము నిలువచేయు ప్రాంతము. రెండవది జీర్ణక్రియ జరుపు భాగము.
10. హిమోగ్లోబిన్ జీవ ద్రవ్యము (Plasma) లో కలిగి వున్నందున, రక్తము ఎరుపు వర్ణముతో వుంటుంది. రక్తము ఎల్లప్పుడు రక్తనాళాలలో మాత్రమే ప్రసరిస్తూ వుంటుంది. అందువలన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సంవృత రకానికి (Closed type) చెందినది.
11. ప్రత్యేక శ్వాస అవయవాలు లేవు. చర్మము శ్వాస అవయవముగా పనిచేస్తుంది. ఇది జిగురుగాను, తేమగాను వుంటుంది. దీనికి రక్తనాళాలు విరివిగా పరస్పరం చేయమడి వుంటుంది.
12. విసర్జక వ్యవస్థలో మెలికలు తిరిగిన వృక్కాలు ఖండితానికి జత చొప్పున వుంటాయి. కొన్నింటిలో యివి అతి సూక్ష్మంగా వుండి, ఒక్కొక్క ఖండితములో ఎక్కువ సంఖ్యలో వుంటాయి.
13. నాడీ వ్యవస్థలో ఒక జత సుస్తిష్క నాడీ సంధులు లేదా మెదడు (Brain) గ్రసని పృష్ఠతలం మీద వుంటుంది. ఒక పరిగ్రసని సంయోజకాలు (Circumpharyngeal connectives) ఉదరతలములో కింది గ్రసని నాడీ సంధి (Subpharyngeal ganglion) తో కలసి నాడీ వలయాన్ని (Nerve ring) యేర్పరుస్తాయి. శరీరము పొడవున వ్యాపించిన ఉదర నాడీ వలయాన్ని (Ventral nerve cord), ప్రతి ఖండితములో నాడీ సంధి (Ganglion) నాడులు వుంటాయి. ఈ నాడీ దండము ఘనంగా (Solid) జతల (Paired) తో వుంటుంది.
14. స్పర్శ గ్రాహకాలు (Tactile receptors), అన్యగ్రాహకాలు (Buccal receptors), వేతాలు (Eyes) మొదలైనవి జ్ఞానేంద్రియాలు.
15. అనెలిడ్లు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉభయలింగ జీవులు (Monoecious), పాలీకీటా విభాగపు జీవులు ఏకలింగ జీవులు (Dioecious).

16. అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా లేదా అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధిలో ట్రోకోఫోర్ (Trochophore) లేదా ట్రోకోస్టియర్ అను డింభక జీవి వుంటుంది. కొన్నింటిలో అలైంగిక పద్ధతిలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది.
17. అండుములో సర్పిలాకార విదళనము (Spiral cleavage) జరుగుతుంది. ఈ అండులను నిర్ధారిత అండులని (Indeterminate eggs) అంటారు.
18. కొన్ని జీవులు పునరుత్పత్తిని (Regeneration) ప్రదర్శిస్తాయి. అనెలిడా జీవులు కొన్ని సముద్ర జాలాలలోను, కొన్ని మంచినీటిలోను మరికొన్ని భూమిమీద జీవిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా స్వేచ్ఛజీవులు. కొన్ని గొట్టాలలో నివసిస్తాయి. తక్కువ సంఖ్యలో బాహ్యపరాన్న జీవులు వుంటాయి.

12.4 వర్గీకరణ

ఈ వర్గము నాలుగు విభాగాలుగా విభజింపబడినది. ఇవి 1) పాలీకీటా 2) అర్కి అనెలిడా 3) లైగోకీటా 4) హిరుడినియా


12.4.1 విభాగము పాలీకీటా

(Gr. పాలి = ఎక్కువ; కీట = శూకాలు)

పాలీకీట్లు సాధారణంగా సాగర జీవులు. ఇవి అనెలిడా వర్గములోని పెద్ద విభాగము. ఇందులో సుమారు 5000 జాతులున్నాయి.

సామాన్య లక్షణాలు

1. పాలీకీట్లు స్పష్టమైన పదునండ విన్యాసాన్ని కలిగి వున్న స్థూపాకార జీవులు.
2. తలలో ముఖ పూర్వ భాగము. పరితుండము వుంటాయి. నేత్రాలు, పుర్రకాలు, పుర్రాంగాలు వుండవు.



పటం 12.1 పాలీకీటా ప్రతినిధులు A కీటాప్టెరన్. B అరెనికోలా. C వీరిస్. 1.ముఖ పూర్వ భాగ పుర్రకము 2. ముఖపూర్వక భాగము 3. పరితుండము 4. కళ్లు 5. పార్శ్వపాదాలు 6. ప్రెజీడియమ్ 7. పాయుకేపరాలు 8. నోరు 9. ముఖపూర్వ భాగ కండరవలయము 10. పరితుండ పుర్రకము 11. నోట్‌పోడియా 12. పెద్దరెక్క 13. ఆహార కప్ప 14. ఫేస్ 15. బయటికి పొడుచుకొని వచ్చిన గ్రనవి 16. మొప్పలు 17.

3. ప్రతి ఖండితములో ఒక జత పార్పొడాలు (Parapodia) వుండటము. ఈ విభాగపు ప్రత్యేక లక్షణము. ఇవి సార్వంగా వుంటాయి.
 4. పరాంతములోని చివరి ఖండితాన్ని పైజీడియమ్ (Pygidium) అంటారు.
 5. శరీర కుడ్యము కండరయుత నిర్మాణము (Dermomuscular body wall). శరీరకుడ్యము చుట్టూ దృఢమైన, పలుచని, కణరహిత అవభాసిని వుంటుంది.
 6. సీలోమ్ విశాలమైన కుహరము ఇది అద్భుత విభాజకాలచే కక్ష్యలుగా విభజింపబడి వుంటుంది. సీలోమిక్ ద్రవము శరీరానికి దృఢత్వాన్ని (Turgidity) యిస్తుంది. ఇది హైడ్రాలిక్ అస్థిపంజరముగ (Hydraulic skeleton) వుపయోగపడుతుంది.
 7. అహార నాళములో గ్రనని, ఆస్య కుహరము నుండి ఒక తుండము వలె పొడుచుకొని వస్తుంది.
 8. శ్వాసక్రియ చర్మము వలన జరుగుతుంది. దీనిని చర్మీయ శ్వాసక్రియ (Cutaneous respiration) అంటారు.
 9. సంవృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ (Closed blood vascular system) వుంటుంది.
 10. విసర్జక అవయవాలు ఖండిత క్రమములో అమరిన వృక్కాలు. ఇవి ఖండితానికి జత చొప్పున వుంటాయి.
 11. నాడీ వ్యవస్థ అనెలిడ నమూనా పద్ధతి (Typical annelidan) లో వుంటుంది.
 12. ఇవి ఏకలింగ జీవులు. ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో బీజ వాహకాలు వుండవు. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా జరుగుతుంది.
 13. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Indirect development)) జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛగా ఈదే, ట్రోకోఫోర్ డింభకము యేర్పడుతుంది.
 14. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి పార్శ్వ మొగ్గలు తొడుగుట వలన జరుగుతుంది.
- ఉదా: నియాంథీస్ (వీరిస్ (పటం 121C)),
కీటాప్టెరన్ (పటము 121A)), అరెనికోలా (పటం 121B)

12.4.2 విభాగము: ఆర్కి అనెలిడా

ఆర్కి అనెలిడులు ఒక విభిన్న సముదాయము (Aberrant group). ఇటీవల కాలములో వీటిని విన్ను వర్గ జీవులుగా (Minor Phyla) పరిగణించడము జరిగింది. వీటిలోని క్షీణించిన లక్షణాలను ఆదిమ లక్షణము కాదని, బొరియంలో వివసించటానికి అనువుగా యేర్పడిన ద్వితీయ లక్షణమని భావిస్తున్నారు.


ఈ విభాగపు ముఖ్యమైన లక్షణాలు:

1. ఇవి అస్పృష్ట బాహ్య ఖండిభవనములో వున్న చిన్న సాగర జీవులు.
2. వీటిలో ముఖపూర్వ భాగము (Prostomium) చిన్నదిగాను, పరితుండం పెద్దదిగా వుంటుంది.
3. పార్పొడాలు, శూకాలు, చూషకాలు వుండవు.
4. ఒక జత స్పర్శాంగాలు (Prostomial tentacles) ముఖపూర్వ భాగములో వుంటాయి.
5. పాలిగార్డియన్ జీవిలో పాయువు చుట్టూ గ్రంథి మెత్తలు (Adhesive pads) వుంటాయి. స్లోమోడ్రీలన్ ఉదర తలంలో శైలికానుయ నిలువగాడి (Longitudinal ciliated groove) వుంటుంది.
6. శరీర కుహరము అద్భుత విభాజకాలచే అనేక కక్ష్యలుగా విభజింపబడి వుంటుంది.
7. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో పృష్ట రక్తనాళము, ఉదర రక్తనాళము శరీరము పొడవునా విస్తరించి వుంటాయి.
8. ప్రతి ఖండితములోను ఒక జత వృక్కాలు వుంటాయి. ఇవి సాలెనో సైటులను (Solenocytes) కలిగి వున్న వృక్కాలు, క్నెఫ్రోస్టోమ్ వృక్క ముఖాల ద్వారా (Nephrostomes) సీలోమ్ లోనికి తెరచుకోవేసి అయి వుంటాయి.

9. పాలిగార్డియన్ ఏకలింగజీవి. ప్రోటోడిలన్ ఉభయలింగ జీవి. ప్రత్యేకమైన బీజ వాహికలు వుండవు.
10. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది. పాలిగార్డియన్ డింభకాన్ని లోవెస్సు డింభకము (Loven's Larva) అంటారు.

ఉదా: పాలిగార్డియన్ (పటం 13.2.A)

ప్రోటో డిలన్ (పటం 13.2. B.)



పటం 13.2 అర్కి అనెలిడా ప్రతినిధులు. A. పాలిగార్డియన్ B. ప్రోటోడిలన్ 1. స్పర్శకము 2. పరితుండము 3. పాయుఖండితము 4. ముఖపూర్వభాగ స్పర్శకాలు 5. ఆహార వాళము 6. అంత్రము.

12.4.3 విభాగము: ఒలి గోకీటా

ఒలి గోకీటా (ఒలిగోన్ = కొన్ని మాత్రమే, కీటాన్ = శూకాలు) విభాగములో సుమారు 3000 జాతులు వుంటాయి. వానపాములు ఈ విభాగములో వుంటాయి. వీటిలో ఖచ్చితమైన దేహభండ విన్యాసము (Typical metamerism) వుంటుంది. శరీరంలో బాహ్యంగా ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలేవి వుండవు. పరిమాణములో వైవిధ్యాన్ని కలిగి వుంటాయి. మంచి వీటిలో నివసించు కొన్ని వానపాములు 0.5 మి.మీ నిడివితో వుండగా అస్ట్రేలియా దేశములోని కొన్ని వానపాములు 3 నుండి 4 మీటర్ల పొడవు వుంటాయి.

ఈ విభాగపు ముఖ్యమైన లక్షణాలివి:


1. ఈ విభాగములోని జీవులు భూచరజీవులు. కొన్ని నుంచి వీటిలో నివసించునవి. ఇవి తేమ నేలలలో బొరియలు చేసుకొని అందులో నివసిస్తాయి.
2. తల, నేత్రాలు, స్పర్శకాలు, పార్శ్వపాదాలు వీటిలో వుండవు.
3. క్లెటిల్తో నిర్మింపబడిన శూకాలు ఖండిత క్రమంతో వుంటాయి. శూకాలు 'S' ఆకారములో నుండి మధ్యభాగములో నాడ్యులన్ అను వుబ్బెత్తు నిర్మాణమును కలిగి వుంటాయి. శూకాల పంఖ్య, అమరిక జీవులలో వేర్వేరుగా వుంటుంది.
4. పరిణతి (Mature) చెందిన వానపాము శరీరభాగములో కొన్ని ఖండితాలు దళసరియైన కుడ్యముతో వుంటాయి. ఈ భాగములో ఖండితవనము స్పష్టంగా వుండదు. దీనిని క్లెటెల్లమ్ (Clitellum) అంటారు. క్లెటెల్లమ్లోని బాహ్య చర్మ కణాలు మ్యూకస్ను స్రవిస్తాయి. ఈ మ్యూకస్ స్రావము

- సంపర్క సమయములోను, తరువాత గుడ్లత్పత్తి యేర్పడటానికి పువయోగపడుతుంది.
5. శరీర కుడ్యము కండర పహిత చర్మము (Dermomuscular) తో వుంటుంది. బాహ్యచర్మము వలన యేర్పడిన, వలుచని అవభాసిని పార వుంటుంది. వర్తుల, ఆయత కండరాల స్తరాలు బాగుగా అభివృద్ధి చెంది వుంటాయి.
 6. విజమైన శరీర కుహరము యేర్పడి వుంటుంది. ఈ కుహరము, రెండు మధ్యత్పవ (Mesoderm) స్తరాల మధ్య యేర్పడి వుంటుంది. శరీరకుడ్యాన్ని చుట్టి వున్న పారను కుడ్యస్తరము (Parietal layer) అని, ఆహార నాళాన్ని చుట్టివున్న పారను అంతరాంగ స్తరము (Visceral layer) అని అంటారు. బాహ్య ఖండిభవనమునకు అనుగుణంగా శరీర కుహరము కూడా అడ్డు విభాజకాలచే అనేక గదుల వంటి భాగాలుగా విభజింపబడి వుంటుంది. పృష్ఠరంధ్రాల ద్వారా సీలోమిక్ కుహరము వెలుపలకు తెరచుకొని వుంటుంది. సీలోమిక్ ద్రవము ఈ రంధ్రాలద్వారా బయటకు ప్రవహించి శరీరకుడ్యాన్ని ఎల్లప్పుడు తేమగా వుంచుతుంది.
 7. వర్తుల, ఆయత కండరాల వికాంతరంగా సంకోచ పడలికలు జరపడము వలన ఈ జీవులలో గమనము జరుగుతుంది.
 8. జీర్ణ వ్యవస్థ బాగుగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది. దీనిలో ఆహార నాళము, గ్రసని గ్రంధులు వుంటాయి. ఆహార నాళము వివిధ భాగాలుగా విభజింపై వుంటుంది. గ్రసని ఆహార కుహరము నుండి పొడచుకొని వస్తుంది. పేగులోపలి గోడ పృష్ఠతలం (Dorsal wall of the Intestine) లో ముడతలబడి ఆంత్రావలి (Typhlosole) అను నిర్మాణంగా యేర్పడుతుంది. ఇది పేగుయొక్క శోషణ తలమును (Absorptive surface) అధికము చేస్తుంది.
 9. శ్వాసక్రియ చర్మము ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది జిగురుగాను, తేమగాను వుంటుంది. చర్మానికి అనేక రక్తనాళాలు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి.
 10. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సంపూర్ణ రకానికి చెందినది. పృష్ఠక్షదర రక్తనాళాలు, పార్శ్వహృదయాలు వుంటాయి.
 11. విసర్జక అవయవాలు వృక్కాలు. ఇవి మెలికలు తిరిగిన మూక్ష్తనాళికలు. జలచర ఒలై గోకీటులు అమ్మోనియాను విసర్జిస్తాయి. పీతకణాలు (Chloragogen cells) పేగుచుట్టూ ఒక స్తరాన్ని యేర్పరుస్తాయి. ఇవి ఆంత్రవేష్టన స్తరము (Visceral coelomic epithelium) నుండి వుత్పత్తి అయిన సమపు వర్ణముగల కణాలు. ఇవి జీవి మాధ్యమిక జీవక్రియలో ప్రధాన పాత్రను నిర్వహించి నకశేరుకాలలోని కాలేయముతో పోల్చదగినవిగా వుంటాయి.
 12. వాడీ నమూనా ఆనెరిడ్లలోపల వుంటుంది. మెదడు, వాడీ వలయమును, ఉదర వాడీ దండము ఉంటాయి.
 13. జ్ఞాన అవయవాలు బాగుగా అభివృద్ధి చెంది వుండవు. ఇవి బాహ్య చర్మకణాల నుండి యేర్పడిన కొన్ని గ్రాహకాలు.
 14. ఒలైగోకీట్లు ఉభయలింగ జీవులు. బీజకోశాలు బీజ వాహికలతో స్పష్టంగా వుంటాయి. ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు, శుక్రాశయము, అండకోశాలలో పరిణతి చెందుతాయి.
 15. పరస్పర శుక్రకణాల మార్పిడి కోసము ఒలైగోకీటా జీవులలో సంపర్కము జరుగుతుంది. సంపర్కము జరుగుతున్నప్పుడు వానపాములు వాటి శరీర పూర్వభాగాలను వ్యతిరేఖిదిశలో వుంచునట్లుగా జతపడతాయి.
 16. సంపర్కము తరువాత క్లైటెల్లమ్ గుడ్ల తిత్తిని యేర్పరుస్తుంది. దీనిలోనికి గుడ్లను, శుక్రకణాలను విడుదల చేస్తాయి.
 17. ఫలదీకరణ గుడ్ల తిత్తిలో జరుగుతుంది.
 18. అభివృద్ధి పూర్తి అయిన తరువాత గుడ్డు నుండి పిల్లజీవి గుడ్ల తిత్తిలోనికి విడుదల అవుతుంది. తరువాత యిది వెలుపలకు వస్తుంది.
 19. జలచర ఒలైగోకీట్లలో ఆలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి పాధారణంగా జరుగుతుంది.

20. ఓలైగోకీట్లలో పునరుత్పత్తి జరుగుతుంది.

ఉదా: మెగాస్కోలెక్సు, ఫెరటిమా, డ్రవిడా,

ట్యూబిఫెక్సు(Tubifex)—మంచి నీటిలో నివసించు ఓలైగోకీటు లోతైన సరస్సు అడుగు ప్రాంతములో వుంటుంది.



పటం 12.3. ఓలైగోకీటా—హిరుడినియా (వర్ణవిధులు. A. ట్యూబిఫెక్సు B. హిరుడినేరియా C. పాంటోబెల్లా. 1. నాడీ మండలము 2. రక్తనాళము 3. ఆంత్రము 4. పఖండ గ్రహకములు 5. పరాంత చూషకము 6. మొటిమలు 7. ముఖ పూర్వభాగము.

12.4.4. విభాగము హిరుడినియా

హిరుడినియా విభాగములో సుమారు 500 జాతులు వుంటాయి. ఇవి కొన్ని మంచి నీటిలోను, కొన్ని సముద్ర జలాలలోను, మరికొన్ని భూమిమీద నివసిస్తాయి. ఇందులో సకరేరుకాల రక్తాన్ని పీల్చి నివసించే బాహ్యపరాన్న జీవు (Sanguivorous ectoparasites) లైన జలగలు వున్నాయి. ఇవి ఓలైగోకీట్ జీవులతో ఎక్కువ పోలికలు కలిగి వుంటాయి.

ఈ విభాగపు సామాన్య లక్షణాలు:

1. జలగ శరీరములో ప్రయోధర తలాలు అణచబడి వుంటాయి.
2. రెండు చివరలలో ఖండితాలు రూపాంతరము చెంది చూషకాలుగా యేర్పడతాయి. చాలా జలగలలో పూర్వ చూషకము గిన్నె ఆకారములో వుంటుంది. పరచూషకము గుండ్రని చిళ్ళవలె వుంటుంది.
3. ఖండితాల సంఖ్య తక్కువగా వుంటుంది. ఇవి జాతులను గుర్తించడానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. సాధారణంగా 32-34 ఖండితాలు వుంటాయి.
4. ప్రతి ఖండితము కొన్ని వలయగాడుల చేత, మరికొన్ని రింగుల వంటి ఉపఖండితాలుగా విభజింపబడి వుంటుంది. వివిధ ఖండితాలలో ఉపఖండితాల సంఖ్య భిన్నంగా వుంటుంది.
5. జలగ శరీరంలో స్థూలంగా ఈ క్రింది భాగాలను గుర్తించవచ్చు శిరస్థ భాగము (Cephalic), పూర్వ క్లెటెల్లార్ భాగము (Preclitellar), క్లెటెల్లార్ భాగము (Clitellar), మధ్య భాగము (Middle), పుచ్చీయభాగము (Caudal), పరాంత చూషక భాగము (Posterior sucker).
6. క్లెటెల్లమ్ 9,10,11 ఖండితాలలో వుంటుంది. ఇది పంతోవోత్పత్తి కాలములో మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతుంది.

7. శిరస్థ భాగములో ఐదు జతల వేత్రాలు వుంటాయి.
8. పార్శ్వపాదాలు, శూకాలు వుండవు. అకాంథోజ్డెల్లా క్రమములోని జలగకు శూకాలు వుంటాయి.
9. సీలోమ్ కుడ్యములో అంతశ్చర్మము (Dermis) ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది. వర్తుల, ఆయత కండరాలేకుండా అవనము (Oblique) కండరాలు కూడా అభివృద్ధి చెంది వుంటాయి.
10. సీలోమ్ క్షీణించి నందున జలగలు యితర అనెలిడ జీవులకన్నా కొంత భిన్నత్వాన్ని కలిగి వుంటాయి. దీనికి కారణము ఎక్కువగా సంయోజక కణజాలము అభివృద్ధి చెంది వుండటమే. అందువలన సీలోము చిన్న కుల్యలుగా యేర్పడి వుంటుంది. హిరుడో ప్రజాతిలోను మరికొన్ని యితర జలగలలో బొట్రాయాయిడల్ కణజాలము విస్తారముగ పెరగడము వలన సీలోమ్ క్షీణిస్తుంది.
11. ఎక్కువజలగలలో జీర్ణవ్యవస్థ రక్తాన్ని పీల్చుకొని బాహ్యపరాన్న జీవనానికి అనుగుణంగా మార్పుచెంది వుంటుంది. ఆహార నాళము రెండు భాగాలలో వుంటుంది. ఆహారము విలువ వుంచుకొన భాగము, జీర్ణక్రియ జరుగుభాగము.
12. జలగ లాలాజలములో రక్త స్క్రంధనము నిరోధించు 'హిరుడిన్' అను ప్రతి రక్తస్క్రంధన పదార్థము (Anticoagulant) వుంటుంది.
13. ప్రత్యేక శ్వాస అవయవాలు లేవు. ఇతర అనెలిడా జీవులవలె చర్మము శ్వాసక్రియకు ఉపయోగంగా వుంటుంది.
14. విసర్జక అవయవాలు నృక్కాలు. ఇవి 10 నుండి 17 జతల ఖండితానికి జత చొప్పున వివిధ జలగలలో వుంటాయి.
15. అమ్మోనియా ప్రధానమైన విసర్జక పదార్థము.
16. ఇతర అనెలిడా జీవులలో వలె నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు, నాడీ వలయము, ఉదర నాడీ సంధులు ఉంటాయి.
17. జ్ఞాన అవయవాలు, వేత్రాలు, పిండ గ్రాహకాలు, వలయ గ్రాహకాలు ఉంటాయి.
18. ఒరైగోక్టీల్లవలె జలగలు కూడ ఉభయ లింగజీవులు. బీజకోశాలు, బీజవాహికలు స్థిరమైన ప్రాంతాలలో వుంటాయి.
19. శుక్రకణ మార్పిడి ఒరైగోక్టీల్ జీవులలోవలె రెండు జలగల మధ్య పరస్పరము జరుగుతుంది.
20. ఫలదీకరణ ప్రే బీజకోశ గోణులలో (Ovisacs) జరుగుతుంది. సంయుక్త బీజాలు (Zygote) గుడ్ల తిత్తిలోనికి విడుదల అవుతాయి. గుడ్లతిత్తిని క్లెటెల్లమ్ యేర్పరుస్తుంది.
21. అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా (Direct) జరుగుతుంది. డింభక దశలేదు.

ఉదా హిరుడినేరియా గ్రాన్యులోసా (Hirudinaria granulosa) (పటం 13.3.B)
 పాంటోబ్డెల్లా (Pontobdella) (స్కేట్ పక్కర్) (పటం 12.3.C) బ్రాంకెల్లియన్ (Branchellian)
 (పముద్ర జలగ)

12.5 వ్యపరిశీలన

1. విశాలమైన శరీర కుహరముండడం అన్ని అనెలిడా జీవుల ప్రముఖ లక్షణం కాని ఇది జలగలలో _____ కణజాలం ఉండడం వల్ల చాలా తగ్గిపోయింది.
2. _____ వ్యవస్థ తప్ప అన్ని అవయవ వ్యవస్థలు అనెలిడ్ లలో బాగా పెరిగినాయి.
3. _____ లార్య అనెలిడా మొలస్కా జీవులకు ప్రత్యేకం.

12.6 సారాంశం

1. ఇవి ద్విపార్శ్వ పౌష్ట్యముతో, ఖండిత నిర్మాణం గల క్రిములనంటి జంతువులు.
2. శరీరకుడ్యము, కైటిన్ తో చేయబడిన శూకాలు గల కండరసహిత చర్మము.
3. సీలోమిక్ ద్రవములో నిండివున్న విజమైన సీలోమ్ వుంటుంది.
4. సంవృత (Closed) రకానికి చెందిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
5. పృక్కాలు విపర్యక్త అవయవాలు.
6. వాడీ వ్యవస్థ నమూనా అకశేరుకాల రకానికి చెందినది.
7. హెచ్చు సంఖ్యలో జీవులు ఉభయ లైంగికాలు.
8. ట్రోకోఫోర్ లేదా ట్రోకోస్టియర్ డింభకజీవి.
9. ఈ వర్గము నాలుగు విభాగాలలో వుంటుంది.
10. పాలీకీటా విభాగములో అన్నియు సాగరజీవులే.

12.7 స్వసరిశీలనం — జవాబులు

1. బొట్రాయిడల్
2. శ్యాస
3. ట్రోకోఫోర్

12.8 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి
1. అనెలిడా వర్గపు వర్గీకరణ విభాగాలవరకు తెల్పి, సాధారణ లక్షణాలను వివరింపుము.
 2. విభాగము పాలీగోకీటా ముఖ్యమైన లక్షణాలను తెల్పి, అది విభాగము హిరుడినియా నుంచి ఏ విధంగా భిన్నంగా వుందో వివరించండి.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.
1. పాలీకీటా విభాగ సాధారణ లక్షణాలు వివరించి, కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
 2. ఆర్కి అనెలిడులను గురించి వివరించండి.
 3. ఈ క్రింది వాటి వర్గీకరణను తెల్పుము.
అరెనికోలా, ఫెరిటీనూ, అకాంథోజెల్లా, పాలిగోర్డియస్.

విషయక్రమము

13. 1 ఉద్దేశ్యము
13. 2 ఉపోద్ఘాతం
13. 3 బాహ్య లక్షణాలు
 - 13.3.1 తల
 - 13.3.2 తలలోని జ్ఞానేంద్రియ విర్మాణాలు
 - 13.3.3 ప్రైజీడియన్
 - 13.3.4 పార్శ్వపాదాలు
 - 13.3.5 కూకాలు
13. 4 శరీర కుద్యము
13. 5 సీలోన్
13. 6 గమనము
13. 7 జీర్ణవ్యవస్థ
13. 8 శ్వాసక్రియ
13. 9 రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ
- 13.10 విసర్జక వ్యవస్థ
- 13.11 నాడీ వ్యవస్థ
 - 13.11.1 జ్ఞానేంద్రియాలు
- 13.12 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 13.13 పిండాభివృద్ధి
- 13.14 ఎపిటోక్ మరియు హెటరోసీరిస్
- 13.15 స్వపరిశీలన
- 13.16 పారాంశం
- 13.17 స్వపరిశీలనం జనాబులు
- 13.18 నమూనా ప్రశ్నలు
- 13.19 పదకోశం

13.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠ్యాంశములో వీరిన్ గురించి విపులంగా వివరింపటం వలన ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవము, ఖండిత విన్యాసముతోనున్న సీలోమేట్ జీవి యొక్క నిర్మాణ విషయాలను పరిచయం చేయడం జరిగింది. వీటిని నీవు స్పష్టంగా విశదపరచగలవు.

పార్శ్వ పాదము (Parapodium) (పటము 13.1.2) ద్విశాఖ (Biramous) నిర్మాణంతో ఉంటుంది. ఇది రెండు భాగాలతో ఉంటుంది. పైభాగాన్ని పుష్ట బ్లేడ్ (Dorsal blade) లేదా నోట్ పోడియం (Notopodium) క్రింది భాగాన్ని ఉదర బ్లేడ్ (Ventral blade) లేదా న్యూరో పోడియం (Neuropodium) అని అంటారు. ఇవి ఒక్కొక్కటి మరి రెండు తమ్మెలుగా విభజింపబడుతాయి. కురుచగాను, స్థూపాకారంగాను ఉండే పుర్రక కీలితాన్ని నోట్ పోడియం కలిగి ఉంటుంది. దీనిని పుష్ట కేసరము (Dorsal cirrus) అంటారు. ఇదే విధంగా న్యూరో పోడియం ఉదర కేసర (Ventral cirrus)ను కీలితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నోట్ పోడియం న్యూరో పోడియం కన్నా పెద్దదిగా ఉంటుంది.

నోట్ పోడియం, న్యూరో పోడియంల రెండింటి నుండి కట్టులుగా శూకాలు (Bundle of setae) ఉంటాయి. ఈ శూకాలు శూకోత్పాదక గోళిలో (Setigerous sac) ఉంటాయి. శూకాలు కండరాల వల్ల అన్ని దిశలకు కదలుతాయి. ప్రతి శూకము శూకోత్పాదక గోళిలోని ఫార్మేటివ్ కణము (Formative cell) నుండి ఉత్పత్తి అవుతాయి.

ఒక్కొక్క శూకాల కట్టులో ఒక శూకము పాదపుగా దృఢంగా, తిన్నగా ఉంటుంది. దీనిని ఎసిక్యులమ్ (Aciculum) అంటారు. ఇది పార్శ్వ పాదము నుండి వెలుపలికి రాదు. ఇది పార్శ్వ పాదానికి అంతరస్థి పంజరంగా పనిచేసి దృఢత్వాన్ని కలిగిస్తుంది.

పార్శ్వపాదాలు కండరయుతంగా ఉంటాయి. ఇవి ప్రధానంగా గమనాంగాలు. జీవులు పాకటానికి, ఈదడానికి ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువ రక్తనాళాలతో ఉంటాయి. అందువల్ల ఇవి శ్వాసక్రియలో కూడా తోడ్పడుతాయి. శరీర మధ్యభాగంలో పార్శ్వ పాదాలు పెద్దవిగా ఉంటాయి.

13.3.5 శూకాలు

ఒక్కొక్క శూకము రెండు కణుపులతో కీలును కలిగి ఉంటుంది. (Two jointed) ఇది సమీప ప్రాంతములో దండము (Shaft) వలెను దూరప్రాంతములో బల్లపరుపుగాను (Blade) ఉంటుంది. శూకాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి.

1. సాధారణ శూకము


ఇది దళవరగాను, పాదపుగానున్న దండమును కలిగి ఉంటుంది. బ్లేడు పొట్టిగాను, దళపరిగాను ఉంటుంది. చివరి ప్రాంతము వంపు తిరిగి నొక్కును కలిగి ఉంటుంది. (పటం 14.2 ఎ)

2. పాదవైస బ్లేడును గల శూకము

ఇది చిన్న దండముతో ఉంటుంది. దీని బ్లేడ్ పాదపుగాను, సున్నితముగాను, విటారుగా ఉండి సూదివలె మొనదేలి ఉంటుంది. ఒక అంచు రంపపు పళ్ళవలె దంతాలను కలిగి ఉంటుంది. (పటం 14.2 బి).

13.4 శరీర కుడ్యము

శరీర కుడ్యము నాలుగు స్తరాలతో ఉంటుంది. (1) అవభాసిని, (2) చర్మము (3) కండరస్తరాలు (4) శరీర కుపార ఉపకళ యొక్క కుడ్యస్తరము (Peritoneum).



పటం 13.2 వీరిస్ శూకాలు. ఎ.సాధారణ శూకము బి. పొడవైన బ్లేడ్గల శూకము 1. రంపపు పళ్ళవంటి అంచు 2. బ్లేడ్ 3. కీలు 4. కాండము.

1. అవభాసిని


ఇది బాహ్యచర్మము చేత ప్రవించబడిన వెలుపలి స్తరము. ఇది పల్లవి, దృఢమైన కణరహిత కైటిన్ పొర. దీనికి అనేక బాహ్య చర్మ గ్రంథి నాలికల సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి. అవభాసిని బహువర్ణ ప్రకాశ లక్షణముతో ఉంటుంది.

2. బాహ్యచర్మము

బాహ్యచర్మము ఒకే వరుస స్తంభాకార ఉపకళ కణాలతో విర్మితమవుతుంది. ఈ కణాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి. ఇవి గ్రంథి కాలు, జ్ఞాన కణాలు, పహాయక కణాలు. గ్రంథి కణాలు సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటాయి. బాహ్యచర్మము ఉదరతలం నైపు దళపరిగా, గ్రంథియుతంగా ఉంటుంది. పొర్వ పాదాల పమీపంతో గ్రంథికణాలు పెద్దదిగాను, అనంభ్యాకంగా ఉంటాయి. గ్రంథికణాలు మ్యూకస్ను స్రవిస్తాయి. ఇది బొరియలను ఆవరించి ఉంటుంది. రక్తనాళాలు హెచ్చుగా ఉంటాయి. చర్మము రక్షణ, జ్ఞాన, శ్వాసక్రియ వంటి అనేక పనులను చేస్తుంది.

3. కండర స్తరాలు

వీరిస్లో కండరాలు బాగా అభివృద్ధి చెందినవి. ఇవి మూడు స్తరాలతో ఉంటుంది. (1) వర్తుల కండరాలు (2) ఆయుత కండరాలు (3) ఏటవాలు లేక అవనమ కండరాలు. ఇవి అన్నీ అరేఖిత కండరాలు.



పటం. 13.3. వీరిస్ అడ్డుకోత. 1. వృష్టరక్తనాళము, 2. వర్తుల కండరాలు, 3. ఆయుత కండరాలు, 4. నోటోసోడియమ్, 5. మ్యూరో సోడియమ్, 6. ఉదర రక్తనాళము, 7. ఉదర నాడీ దండము, 8. పీలోమ్, 9. ఆహారనాళము, 10. అవనమ కండరాలు, 11. బాహ్య చర్మము, 12. అవభాసిని, 13. కుద్వ్య అంతర్యేష్ఠనము.

వర్తుల కండరాలు బాహ్య చర్మము క్రింద ఉంటాయి. వీటి సంకోచము వలన జీవి శరీరము పలుచగా అవుతుంది. ఆయత కండరాలు నాలుగు వేర్వేరు కట్టులుగా ఉంటాయి. వీటిలో రెండు పృష్ఠ పార్శ్వాలలోను, రెండు ఉదర పార్శ్వాలలోను ఉంటాయి. ఇవి సంకోచించినప్పుడు శరీరము పొట్టిగాను, దళసరిగాను అవుతుంది.

ఏటవాలు కండరాలు రెండుజతలు ఉంటాయి. ఇవి ఉదర మధ్యభాగము నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. ఇవి పృష్ఠ, పార్శ్వంగా శరీర కుడ్యమునకు వ్యాప్తి చెందుతాయి. పార్శ్వ పాదాలు ఆధార ప్రాంతంలో వర్తుల కండరాలతో కలసిపోతాయి. ఈ కండరాలు పార్శ్వపాదాన్ని ముకుళింపజేస్తాయి.

4. శరీర కుహర ఉపకళ యొక్క కుడ్యస్తరము

ఇది శరీర కుడ్యము యొక్క లోపల స్తరము. ఇది శరీర కుడ్యాన్ని సీలోము నుండి వేరుచేస్తుంది. దీనిని దైహిక లేదా శరీర కుహర ఉపకళ యొక్క కుడ్యస్తరము అని (Somatic or Parietal layer of the coelomic epithelium) అంటారు.

13.5 సీలోమ్


సీరిస్ శరీర కుహరము నిజమైన సీలోమ్ ఇది ఫ్లైజోసీలిక్ రకానికి చెందినది. ఇది మధ్యత్వచము చీలిక వలన ఏర్పడినది. ఇది విశాలమైన పర్యాంతరాంగ కుహరము (Perivisceral cavity)ను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది శరీర కుడ్యానికి, జీర్ణనాళానికి మధ్య ఉంటుంది. ఇది అడ్డు విభాజకాల (Transverse partitions of septa) వలన అనేక కక్షలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. పృష్ఠ ఉదర ఆంత్ర యోజనుల (Dorsal and Ventral mesenteries) వలన శరీర కుహరము కుడి, ఎడమ భాగాలుగా విభక్తమై ఉంటుంది. విభాజకాలు సూక్ష్మ రంధ్రాలను కలిగి ఉన్నందువలన శరీర కుహర కక్షలు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధము కలిగి ఉంటాయి. సంతానోత్పత్తి కాలంలో ఈ ద్రవములో వివిధ దశలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు ఉంటాయి. ఇది వెలుపలికి వృక్క రంధ్రాలతోను, సీలోమ్ వాహికలతోను సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సీలోమిక్ ద్రవము జీవి శరీరానికి బిగుతును (Turgidity) ఇస్తుంది. అందువలన జీవికి జలాస్థిపంజరముగా (Hydraulic skeleton) ఉండి గమనానికి తోడ్పడుతుంది.

13.6 గమనము

సీరిస్లో గమనము పార్శ్వపాదాలు, ఆయత కండరాల ద్వారా జరుగుతుంది. పార్శ్వ పాదాల కదలికల వలన నిదానమైన ప్రాకుడు గమనము జరుగుతుంది. మరియొక రకమైన కదిలికలో పార్శ్వపాదాలు, ఆయత కండరాలు చురుకుగా పనిచేస్తాయి. కుడి, ఎడమ వైపున ఉన్న ఆయత కండరాలు ఏకాంతరంగ సంకోచ పడలికలు జరుపుతాయి. దీనివలన శరీరము పొడవునా తరంగాకార కదలికలు జరుగుతాయి. వీటికి అనువుగా పార్శ్వపాదాల కదలికలు జరుగుతాయి. దీని ఫలితంగా జీవి వేగంగా ప్రాకడంగాని, ఈడడంగాని జరుగుతుంది.

13.7 జీర్ణ వ్యవస్థ

నీరిస్ లో జీర్ణనాళము (Alimentary canal) విలుపుగా ఉన్న గొట్టము. ఇది పూర్వంతము నుండి పరాంతము వరకు విస్తరిస్తుంది. ఇది పృష్ఠయోజని, అడ్డు విభాజకాలచే శరీరకుహరంలో నిర్ణీత స్థానంలో ఉంచబడుతుంది. జీర్ణనాళము పూర్వంతములో నోటితో ప్రారంభమై పరాంతములో పాయువుతో అంతమవుతుంది. ఈ నాళము మూడు భాగాలతో ఉంటుంది. (1) పూర్వాహార నాళము (Foregut) or అధ్యముఖము (Stomodaeum) . ఈ భాగములో ఆస్య కుహరము, గ్రసని ఉంటాయి. (2) మధ్యాహార నాళము (Midgut or mesenteron) . ఇందులో అహార నాళిక (Oesophagus) జీర్ణాశయము పేగు (Stomach - intestine) ఉంటాయి. (3) అంత్యాహార నాళము (Hind gut) లేదా పాయుసంధము (Proctodaeum) . ఈ భాగము పురీషనాళముతో ఉంటుంది. పూర్వాహార, అంత్యాహారనాళాల లోతట్టున బహిష్కృత అవభాసిని అంతర్వేష్టనంతో ఉంటాయి. మధ్యాహార నాళము లోతట్టున అంతస్త్వ కణాల స్తరము వుంటుంది. (పటం: 13.4)




పటం 13.4 నీరిస్ - జీర్ణవ్యవస్థ 1. ముఖ పూర్వభాగము 2. పరితుండము 3. నోరు 4. ఆస్యకుహరము 5. గ్రసని 6. దవడలు 7. అన్నవాహిక 8. అన్నవాహిక గ్రంథులు 9. జీర్ణాశయము-ఆంత్రనాళము 10. వృక్కములు.

నోరు అడ్డు చీలికవలె నున్న రంధ్రము. ఇది ఉదరతలంలో ముఖ పూర్వభాగానికి వెనుకగా బయటకు తెరుచుకుంటుంది. ఇది పరితుండములో నున్న వెడలైన కక్ష్య. ఆస్యకుహరము కండరయుతమై, బయటకు పాడుచుకొని వచ్చు గ్రసనిలోనికి వెడుతుంది. ఇది నాల్గవ ఖండితము వరకు విస్తరిస్తుంది. ఈ రెండు కక్షలు బహిష్కృత ఉపకళ అంతర్వేష్టనంతో ఉంటాయి. ఈ ఉపకళ తలలోని బాహ్య చర్మముతో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ లోపలివైపు దళసరి అవభాసిని అంతర్వేష్టనము కూడా ఉంటుంది. అవభాసిని అక్కడక్కడా దళసరియై ఫలకాలు లేదా దంతాలను ఏర్పరుస్తుంది. గ్రసని పూర్వంత భాగము దళసరి కండర కుడ్యంతో నిర్మింపబడిన కారణంగా లోపలి కుహరం ఇరుకుగా ఉంటుంది (పటం 14.5 ఎ, బి). ఒక జత ధృఢమైన క్లెటిక్ దవడలు గ్రసని పూర్వ కుడ్యాలలో ఉంటుంది. దవడ లోపలి అంచు రంపపు పళ్ళు మాదిరిగా

ఉంటుంది. గ్రసని కుడ్యము, శరీర కుడ్యము అభివర్తన, ముకులిత కండరాలచే లతకబడి వుంటాయి. ఆహార సేకరణ సమయంలో గ్రసని, ఆస్యకుహరం నుండి బయటకు పొడుచుకొని వస్తుంది. ఈ విధంగా గ్రసని ఒక తుండమువలె ఉంటుంది.

గ్రసని ఇరుకైనా ఆహార వాహిక లోనికి దారి తీస్తుంది. ఇది ఐదు ఖండితాలను ఆక్రమిస్తుంది. ఒక జత పెద్దవైన ఆహార వాహికాంధ నాళాలు (Oesophageal caecae) ఆహారవాహిక లోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఇవి ప్రోటీన్లను, జీర్ణింపజేయు ఎంజైములను ప్రవిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయ -- పేగు భాగం లోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఈ రంధ్రము సంవరిణీ కండరాలచే నిర్మితమవుతుంది.



పటం 13.5 వీరిస్ (A) గ్రసని బయటకు పొడుచుకొని వచ్చిన స్థితి. (B). గ్రసని(i) ముకులించుకున్నస్థితి. (ii) బయటికి పొడుచుకొని వచ్చిన స్థితి. 1. దవడ. 2. బయటకు పొడుచుకొని వచ్చిన గ్రసని. 3. దంతకాలు 4. బయటి కండరాలు 7. అభివర్తన కండరాలు 8. నోరు 9. ఆస్యకుహరం 10. దవడలతోమన్న గ్రసని 12. అన్నవాహిక.

జీర్ణాశయము - పేగు వెడలైన నాళము. ఇది జీవి మిగతా భాగంలో వ్యాపిస్తుంది. ఇందు జీర్ణక్రియ, శోషణ జరుగును. దీని చివరి భాగమును పురీషనాళము అంటారు. పురీష నాళము ఒక పొట్టినాళము. పైజీడియంలో ఉన్న పాయువు ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది.

ఆహార సేకరణ

వీరిస్ మాంసాహారజీవి. చిన్నవియైన క్రస్టేషియన్లు, డింభకజీవులు, క్రిములు మొదలైనవి వీటి ఆహారం. ఆహార సేకరణకు దవడలను, దంతాలను ఉపయోగిస్తాయి. అభివర్తన కండరాల సంకోచము వలన, సీలోమిక్ ద్రవములో పీడన శక్తివలన, గ్రసని, తుండము మాదిరి బయటకు పొడుచుకుని వస్తుంది. ముకులిత కండరాల సంకోచించటం వలన గ్రసని యథా స్థానాన్ని చేరుతుంది. గ్రసని ముకులించుకున్నప్పుడు ఆహార పదార్థం దవడల మధ్యన ఉండిపోతుంది. ఈ విధమైన ఆహార సేకరణ పద్ధతిని రాష్ట్రోరియల్ పద్ధతి అంటారు.

నీరిన్ మరొక పద్ధతిలో కూడా ఆహారాన్ని పేకరిస్తుంది. ఇది 'U' ఆకారముతో ఉన్న బొరియలలో నివసిస్తుంది. వోటికి ముందు భాగంలో ఇది శంఖు రూపంలో క్లేష్టపదార్థాన్ని స్రవిస్తుంది. ఈ కేష్టంలో సూక్ష్మ జీవులు చిక్కు కుంటాయి. పార్శ్వ పాదాల కదలిక వలన నీటి ప్రవాహము సృష్టించబడుతుంది. ఈ నీటి ప్రవాహము ఆహార పదార్థములు చిక్కుకొనియున్న కేష్ట శంఖువును (Cone of mucus) వోటి వద్దకు వంపుతుంది. ఈ పద్ధతిని ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ (Filter feeding) అంటారు.

జీర్ణక్రియ


అస్యకుహర గ్రహని ప్రాంతములో ఆహారము బాగుగా మధించ (Masticate) బడుతుంది. ఆహారవాహికాంధవాళ గ్రంథులు, జీర్ణాశయ పేగులోని గ్రంథి కణాలు స్రవించు జీర్ణరసాల వలన జీర్ణవాళములోని ఆహార పదార్థాలు జీర్ణింపబడతాయి. జీర్ణక్రియ కణబాహ్య (Extracellular) రకానికి చెందినది. జీర్ణింపబడిన ఆహారము జీర్ణాశయ పేగులో శోషణ చేయబడుతుంది. జీర్ణము కాని కేష్ట పదార్థాలు పురీషవాళములోనికి ప్రవేశించి అక్కడ నుండి పాయువు ద్వారా బయటకు విసర్జింపబడును.

13.8 శ్వాసక్రియ

కొన్ని ఇతర పాఠీకీట్లలో ఉన్నట్లు నీరిన్ లో మొప్పలు కాని, శ్వాసక్రియ జరుపు ఇతర తంతురూప నిర్మాణాలు (Branchial filaments) గాని ఉండవు. అందువలన చర్మము, పార్శ్వ పాదాలు శ్వాసక్రియను జరుపుతాయి. దీనికి అనువుగా, శరీరకుద్యము, పార్శ్వపాదాలలో రక్తకేశ నాళికలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. శ్వాస వాయువుల పరస్పర మార్పిడి నీటి ఉపరితలము మీద జరుగును.

13.9 రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ

నీరిన్ లో బాగుగా అభివృద్ధి చెందిన రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ద్రవరూపములో ఉన్న కణజాలమైన రక్తము యిందులో ఉంటుంది. రక్తము సంవృత రక్తనాళాలలో (Closed blood Vessels) మాత్రమే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ సంవృత రకానికి (Closed type) చెందినదని అంటారు.



పటం 13.6 నీరిన్ అడ్డు కోతలో రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ దృశ్యం. 1. పృష్ఠరక్తనాళము 2. పుష్టాంతర రక్తనాళము 3. జీర్ణనాళము 4. పార్శ్వ పాదమునకు రక్తనాళములు 5. ఉదర్రాంత నాళము 6. ఉదర రక్తనాళము 7. ఉదర నాడీ దండము 8. పరివాహి నాళము (పెరిమ్యారల్).

సిరిస్ రక్తంలో జీవద్రవ్యం (Plasma), రక్తకణాలు (Corpuscles) వుంటాయి. రక్తము ఎరుపు వర్ణంతో ఉంటుంది. జీవ ద్రవ్యములో క్లోరోక్రూయోరిన్ (Chlorocruorin) లేదా ఎరిత్రోక్రూయోరిన్ (Erythro cruorin) అనే వర్ణ పదార్థం వున్నందున రక్తానికి ఎరుపు వర్ణం వస్తుంది.

రక్తనాళాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇవి (1) పంపిణీ రక్తనాళము (Distributing blood vessel), (2) సంగ్రహణ రక్తనాళాలు (Collecting blood vessel). ఇవి రెండు కేళనాలికలతో కలుపబడి ఉంటాయి. సిరిస్లో ముఖ్యమైన నాళాలు - పుష్ట రక్తనాళము, ఉదర రక్తనాళము (పటం 13.6)


పుష్ట రక్తనాళము (Dorsal blood vessel) ఆహార నాళముపైన ఆంత్రయోజవి (Mesentery) తో ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో పూర్వార్ధం నుంచి పరాంతము వరకు వ్యాపిస్తుంది. ఇది హెచ్చుగా సంకోచ పడలికల శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఈ రక్తనాళములో రక్తము పరాంతము నుంచి పూర్వార్ధము వరకు ప్రవహిస్తుంది. (వెనుక నుండి ముందుకు). ఆహార వాహిక ప్రాంతములో ఇది ఒక కేళనాలికా గుచ్చాన్ని (Capillary net work) ఏర్పరుస్తుంది. చదవ ఖండిత ప్రాంతములో ఇది ఉదర రక్తనాళంతో కలుస్తుంది. ఇది సంగ్రహణ రక్తనాళము. ఇది జీర్ణాశయ - ప్రేగునుండి రక్తాన్ని పుష్టాంత రక్తనాళము (Dorsointestinal vessel) ద్వారా సంగ్రహిస్తుంది. ఇది శరీర కుడ్యము, పార్శ్వపాదాలు, వృక్కాల నుండి రక్తాన్ని సంగ్రహిస్తుంది. ఆహార వాహిక ప్రాంతంలో పుష్టరక్తనాళము పంపిణీ నాళముగా పనిచేస్తుంది. ఉదర రక్తనాళము ముఖ్యంగా పంపిణీ రక్తనాళము. ఇది ఆహార నాళము క్రింద శరీరము పొడవునా వ్యాపిస్తుంది. దీనికి సంకోచించు శక్తి ఉండదు. (Non-contractile). ఇందులో రక్తము పూర్వార్ధం నుండి పరాంతానికి ప్రవహిస్తుంది. (ముందునుండి వెనుకకు). ఇది రక్తాన్ని జీర్ణాశయ - ప్రేగునకు, శరీర కుడ్యానికి, పార్శ్వ పాదాలకు, వృక్కాలకు, పార్శ్వనాళాల ద్వారా పంపిణీ చేస్తుంది. పూర్వార్ధములో ఇది సంగ్రహణ నాళంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ రక్తము ఆహార వాహిక నుండి ప్రవేశిస్తుంది. పరాంతములో పాయు ఖండితములో ఉదర రక్తనాళము పరిపురీష రక్తనాళము (Circumrectal ring) ద్వారా పుష్టరక్తనాళమును చేరుతుంది.

ప్రతి ఖండితములో పుష్ట ఉదర రక్తనాళాలు శిక్య రూపములో ఉన్న అడ్డులేక పార్శ్వ నాళాలతో కలిసి ఉంటాయి. వీటిని పార్శ్వ సంధాయక రక్తనాళాలు (Lateral commissural) అంటారు. ఒక్కొక్క సంధాయక రక్తనాళము అభివాహి (Afferent) కాఖగా విభజన చెందుతుంది. ఈ కాఖలు రక్తాన్ని శరీర కుడ్యానికి, వృక్కానికి, పార్శ్వ పాదానికి పరస్పర చేస్తాయి. ఇక్కడ ఇవి కేళనాలికలుగా విడిపోతాయి. ఇవి అన్నీ ఐక్యమై పుష్ట రక్తనాళములో ప్రవేశిస్తాయి. పలుచనైన అథోనాడీ రక్తనాళము (Subneural blood vessel) ఉదర నాడీ దండము క్రిందుగా ఉంటుంది. ఇందులో రక్తము పూర్వార్ధము నుండి పరాంతము వైపుకు ప్రవహిస్తుంది. ఇది రక్తాన్ని క్రింది వైపున ఉన్న శరీరక కుడ్యము నుండి గ్రహిస్తుంది. ఇది వివరకు ఉదర రక్తనాళాన్ని చేరుతుంది.

13.10 విసర్జక వ్యవస్థ

సిరిస్లో విసర్జక క్రియను వృక్కాలు నిర్వహిస్తాయి. ఇవి మెలికలు తిరిగిన నాలికలు. ఇవి ఖండితానికి ఒక జత చొప్పున ఉంటాయి. పరితుండము, ప్రజీడియమ్లలో వృక్కాలు ఉండవు. ప్రతి వృక్కములో ఈ భాగాలు ఉంటాయి. 1. వృక్క ముఖము 2. మెడ 3. వృక్క దేహము లేక వృక్క శరీరము (Body). వృక్క రంధ్రము, మెడ, వృక్క శరీరము సిస్సియల్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ మాన్లో ఉంటుంది.

ఒక్కొక్క వృక్కము శైలికామయ గరాటు ద్వారా సిస్లోమ్లోకి తెరుచుకుంటుంది. ఈ గరాటును వృక్కముఖము (Nephrostome) అంటారు. వృక్కము వృక్కరంధ్రము (Nephridiopore) ద్వారా



పటం 13.7 పిరిస్. (A) వృక్కము 1. వృక్కముఖము 2. విభాజకము 3. జీవపదార్థ మూత్రిక 4. వృక్కరంధ్రము 5. చుట్టలగానున్న వృక్కనాళము (B). నాడీ వ్యవస్థ 1. పుష్కాంగాలకు నాడులు 2. అధిగ్రహని నాడీ సంధి 3. పరిగ్రహని నాడీ సంధి 4. అధోగ్రహనినాడీ సంధి 5. ఉదర నాడీ దండము 6. సఖండనాడీ సంధులు 7. నాడీ తంతువులు.

వెలుపలకు తెరుచుకుంటుంది. ఈ రంధ్రము పార్శ్వపాదములో ఉదర కేసరమునుకు సమీపంగా ఉంటుంది.

వృక్క శరీరము క్రమరహితంగా వున్న అండాకార గ్రంథివంటి నిర్మాణము. ఇది శరీరపు విలుపు అక్షియరేఖకు ఏటవాలుగా లేక అడ్డుగా (Transverse) ఉంటుంది. (పటము 14.7. ఎ) వృక్క ముఖము పూర్వ ఖండితములో ఉంటుంది. ఇటువంటి వివృత వృక్కాన్ని అంత్యవృక్కము (Metanephridia) అంటారు.

వృక్కాలు మలిన పదార్థాలను సీలోమిక్ ద్రవమునుండి, రక్తము నుండి వ్యాపన పద్ధతిలో సేకరిస్తాయి. మలిన పదార్థాలతో కూడిన సీలోమాస్టెట్స్ శైలికామయ గరాటులోనికి ప్రవేశిస్తాయి. శైలికల కదలికల వలన ఈ పదార్థాలు వృక్క రంధ్రము ద్వారా బయటకు విసర్జింపబడుతాయి. నీరిన్ విసర్జించు ముఖ్యమైన పదార్థము అమ్మోనియా.

13.11 నాడీ వ్యవస్థ

నీరిన్లో నాడీ వ్యవస్థ బాగుగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. ఇది సఖండ విన్యాసాన్ని (Metameric arrangement) ప్రదర్శిస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థలో కేంద్రీయ పరిధియ, అంతరాంగ నాడీ వ్యవస్థలు ఉంటాయి.

కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ


ఈ నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు లేదా మస్టిష్కయ నాడీ సంధి (Cerebral ganglion) లేదా అధిగ్రసవి సంధులు (Supra pharyngeal ganglion) ఉంటుంది. మెదడు పృష్ఠంగా ముఖపూర్వభాగములో నున్న పెద్దదైన ద్వితీయ నిర్మాణము. మెదడు నుండి ఒక జత పరిగ్రసవి సంయోజకాలు బయలుదేరుతాయి (పటం 13.7.బి). ఒక్కొక్కటి గ్రసవిని చుట్టి మూడవ ఖండితంలో ఉదర నాడీదండాన్ని కలుసుకుంటాయి. ఇవి ఒక నాడీ వలయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ ఒక అథో గ్రసవి నాడీ సంధి (Sub - Pharyngeal ganglion) ఏర్పడు తుంది. ఈ నాడీ సంధి నుండి ఉదర నాడీ దండము సన్నిహితంగా ఉన్న రెండు నాడీ తంతుల కలయిక వలన ఏర్పడుతుంది. వీటి చుట్టూ ఒక తొడుగు (Sheath) ఉంటుంది. నాల్గవ ఖండితము నుండి ప్రారంభమై ఉదరనాడీ దండములో ఖండితానికి ఒక జత చొప్పున నాడీ సంధులు ఉంటాయి.

పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు ఉదర నాడీ దండాలు నుండి విస్తరించిన నాడులు ఉంటాయి. ఇవి శరీరములో వివిధ భాగాలకు నాడులను పంపుతాయి. నేత్రాలకు, స్పర్శకాలకు, స్పర్శాంగాలకు శాఖలు వ్యాపిస్తాయి. పరితుండ స్పర్శకాలకు శాఖలు, పరిగ్రసవి సంయోజకాల మీద నున్న నాడీ సంధి నుండి బయలు దేరుతాయి. నాడీ దండము మీద నున్న నాడీ సంధుల నుండి మూడు జతల నాడులు పార్శ్వ పాదాలకు శరీర కుద్యానికి, ఖండితములోని ఇతర అవయవాలకు సరఫరా చేయబడతాయి.

అంతరాంగ నాడీ వ్యవస్థ: ఈ వ్యవస్థలో పలువైన నాడులతో నున్న నాడీ ప్లక్కుము, కొన్ని సంధులు ఉంటాయి. ఇవి గ్రసవి, పృష్ఠ, ఉదర కుద్యాలకు నాడులను సరఫరా చేస్తాయి. ఇవి తుండము (Proboscis) కదలికలను నియంత్రిస్తాయి.

13.11.1 జ్ఞానేంద్రియాలు

పిరిస్ లో జ్ఞానేంద్రియాలు ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. ముఖ పూర్వ స్పర్శకాలు, స్పర్శాంగాలు, పరితుండ స్పర్శకాలు, స్పర్శ జ్ఞానాంగాలు. ముఖ పూర్వ భాగంలో ఉన్న ఒక జత న్యూకే అవయవాలు, శైలికామయ గర్తలు. వీనిని రసాయనిక గ్రాహకాలుగా భావిస్తారు.



పటం 13.8 పిరిస్ కన్ను నిలుపుకోత 1. కటకము 2. అవభాసిని 3. బాహ్య చర్మము 4. వర్ణదము 5. నేత్ర పటలము 6. కేంద్రకము 7. దృక్ నాడి.

ఈ జీవిలో నాలుగు సరళ నేత్రాలు ముఖ పూర్వ భాగం మీద ఉంటాయి. ప్రతి నేత్రము ఒక కప్పు వంటి నిర్మాణము (పటం 13.8). ఇది వర్ణక నేత్ర పటల కణాల (Pigmented retinal) చే ఏర్పడినది. ఈ కణాలు దండాల మాదిరిగా (Rodlike) వుంటాయి. ఈ కప్పు యొక్క రంధ్రము కంటిపాప (Pupil). బాహ్యంగా ఉన్న అవభాసిని శుక్లపటలముగా (Cornea) ఏర్పడుతుంది. కప్పు కుహరములో ఒక పారదర్శక

9.4 సిస్టో సోమాహిమటోబియం

సామాన్యనామము: అంతరాంగ రక్తస్థూక్

ఇది మానవుని రక్తములో ఉండు పరాన్న జీవి. ఇందులో లింగ భేదము కలదు. ఆడ మగజీవులు రెండూ చాలా దగ్గరగా కలిసి జతలుగా ఉంటాయి. మగజీవి ఆడజీవిలో పోల్చిన చిన్నగాను, దళితంగాను ఉంటుంది. మగవాసి ఉదరతలము లోతుగా గాడి వలె ఏర్పడి ఉండి గైనికోఫోరిక్ గాడి (Gynacophore canal) లేక కుల్య అనబడుతుంది. ఇందు ఆడజీవి అమరి ఉంటుంది.

9.4.1 జీవిత చరిత్ర

ఇది తన జీవిత చక్రమును రెండు అతిథేయులందు పరిసమాప్తి చేసుకొనును.

ముఖ్య అతిథేయ: మానవుడు


మాధ్యమిక అతిథేయ: బురీచన్ బ్రంకేటన్ అను మంచినీటి నత్త.

పిండముతో నిండియున్న గ్రుడ్లు ముఖ్య అతిథేయ మూత్రము ద్వారా బయటికి వచ్చి నీటిలో కలిసిపోవును. గ్రుడ్లు పగిలి శైలికామయ మిరాసిడియం డింభకాలు బయటికి వచ్చి మాధ్యమిక అతిథేయిని వెదకుట ఆరంభించును. సరైన మాధ్యమిక అతిథేయి (నత్త)ని చేరిన వెంటనే మెత్తని సముదాయములోనికి చొచ్చుకొని పోవును. చివరకు కాలేయం చేరుకొనును. ఇచట డింభకము శైలికలను, ఇతర అంగములను కోల్పోయి 4-6 వారములందు పెరుగుదల మార్పులను పూర్తి చేసుకొనును. ఇప్పుడిది, పొడవుగా నుండి స్పోరోసిస్టుగా మారును. స్పోరోసిస్టు క్రమముగా సంఖ్యను పెంచుకొని రెండవతరము స్పోరోసిస్టుల నేర్పరచును. సంక్రమణము జరిగిన కొన్ని వారములకు కణ విభజన ఆగిపోయి, పిల్ల స్పోరోసిస్టులు అంత్యదశకు చెందిన సర్కేరియా అను డింభకములను ఉత్పన్నము చేయును. దీని లోక రెండుగా చీలి యుండును. ఈ డింభకాలే మానవునికి సంక్రమింప చేయును. సర్కేరియాలు, స్పోరో సిస్టుల నుండి వేరై నత్త దేహము వదలి నీటిలోనికి చేరుకొనును. సర్కేరియాలు ఉన్నట్టి నీటిలో మానువుడు ఈదినను లేదా తిరిగినను సంక్రమణ జరుగును. సర్కేరియాలు మానవుని చర్మమందు దూరుకొని తోకను బయటికి వదిలివేసి రక్తనాళముల ద్వారా కాలేయము చేరుకొనును. ఈ డింభకాలు అతిథేయి శోషరస నాళాల ద్వారా, నిర్వాహక వ్యవస్థను, సిరలను, ఆంత్రమోజకాలను, కేశనాళికలను చేరుకొనును. రక్తముపై పోషణము జరుపుకొని ప్రాథ జీవులుగా విడుగును. లైంగికముగా పరిణతి చెందిన జీవులు సంపర్కము జరుపును. ఆ పిదప ఆడజీవి గుడ్లు పెట్టుట ఆరంభించును. ఈ గుడ్లు అతిథేయి మూత్రము వెంబడి బయట పడతాయి (పటం 9.3)

9.4.2 రోగ లక్షణము

1. ఈ వ్యాధిని సిస్టోసోమియాసిస్ అంటారు.
2. సర్కేరియాలు దేహములోనికి చొచ్చుకపోవునపుడు, చర్మముపైన గులగుల దురద (Itching) కలుగును.
3. నీటి పక్షులందుండు రక్తస్థూకుల సర్కేరియాలు సయితము మానవుని చర్మములోనికి చొచ్చుకొని పోయి డెర్మటైటిస్ (Dermatitis) వ్యాధిని లేక చర్మము వాచుట సంభవింప చేయును. దీనికి స్విమ్మర్స్ ఇన్ అనియు పేరుగలదు.
4. ఇవి చర్మము నుండి నిర్వాహక వ్యవస్థలోనికి వలస పోవునపుడు తలనొప్పి, ఇసివోఫీలియా నీటి విరేచనాలు, రక్తము చీముతో కూడిన విరేచనాలు సంభవించును.

5. గుడ్లు పెట్టునపుడు మూత్రకోశము నందు నెప్పి కలుగజేయును. మూత్ర పిండ బాధ హిమటూరియా అనే వ్యాధి సంభవించును. ఇందులో మూత్రము వెంటడి రక్తము పడును.
6. గుడ్లు ఊపిరి తిత్తుల ధమనికలందు సేకరింపబడి, హృదయ పుపునసిస్టోసోమియాసిస్ను కలుగజేయును.



పటం 9.3. సెల్టా సోమా జీవితచక్రం. 1. పరిపక్వత చెందిన శ్రావజీవి. 2. గుడ్డు. 3. కైరికలతో పున్న పిండమును కల్గియున్న అండము. 4. మైరాసిడియం. 5. స్పొరోసెస్ట్ (మొదటి తరము). 6. స్పొరాసెస్ట్ (రెండవ తరము). 7. నత్తలో పెరుగుదల దశలు. 8. సెల్కెరియా. 9. శ్రావజీవులుగా పెరుగుతున్న సెల్టా సోమాలు.

స్వతంత్ర జీవులు లేదా పరాస్ప జీవులు.

3. కొన్ని చాలా చిన్నగా, సూక్ష్మదర్శినితో కనబడునవి. మరికొన్ని పెద్దగా ఒక మీటరు కన్న ఎక్కువ పొడవు కలిగి వుంటాయి. దేహము పురుగు వలె ఖండితములుగా ఉండి విభజించబడి వుండదు లేదా పైపైన విభజింపబడి ఉంటుంది.
4. పూర్వంతమున స్పష్టమైన తల లేదు.
5. దేహము దళితమైన, వంగే శక్తిగల అనభాసినితో కప్పబడి ఉంటుంది. సాధారణంగా అనభాసిని కంటకాలు, గండు రోమాలు కలిగి ఉంటాయి.
6. బాహ్య చర్మము కణములతో లేక సిషీయల్ గా ఉండును.
7. కండర పుంజము సాధారణంగా నిలుపు సోగులతో ఉంటుంది.
8. జీర్ణ నాహిక నోటి నుండి పాయువు వరకు గల ఒక తిన్నని గొట్టము. ఇందులో గ్రసని తప్ప ఇతర భాగములందు కండర పుంజము లేదు. గ్రసని బాగుగా ఎదిగి కండరములతో ఉంటును.
9. శ్వాస మరియు ప్రసరణ వ్యవస్థలు లేవు.
10. విసర్జక వ్యవస్థ కుళ్ళు, అది వృక్కాలతో ఉంటుంది.
11. జ్ఞానంగములుగా, శైలికా మయగర్తలు, సూక్ష్మాంకురాలు, గండు రోమాలు, కంటి చుక్కలు పనిచేస్తాయి.
12. ఇవి ఏకలింగ జీవులు. లింగాలు వేరుగా ఉండును. మగ జీవులు, అడ జీవుల కన్నా, చిన్నవిగా ఉంటాయి. బీజకోశాలు ఒంటిగా లేక ద్వయంగా ఉంటాయి. గుడ్లు చిన్నవిగాను, కైటిన్ తో ఏర్పడిన కర్పరముతో ఉంటాయి.
13. పెరుగుదల ప్రత్యక్షంగాను, అప్రత్యక్షంగాను ఉండి, జీవిత చరిత్ర క్లిష్టమైఉంటుంది.


10.4 వర్గీకరణ

ఆన్స్కె హెల్మింథిస్ వర్గము ఐదు తరగతులుగా విభజింపబడింది. అవి:

1. నిమటోడా (Nematoda) 2. నిమటో మార్ఫా (Mematomorpha) 3. రోటీఫెరా (Rotifera) 4. గాస్ట్రోట్రైకా (Gastrotoicha) 5. కైన్రోరింకా (Kinorhyncha)

10.4.1 తరగతి నిమటోడా

1. ఇవి తేమగల వేలలో, మంచినీటిలో, సముద్రనీటిలో, వృక్షములలో మరియు జంతువులలో వివసిస్తాయి.
2. పిని దేహము స్థూపాకారంగా, పురుగు వలె పొడవుగా ఉంటాయి.
3. పివివి సామాన్యముగా "గుండ్రపురుగులవి" పిలుస్తారు. తల, శైలికలు మరియు ఖండిభవనము ఇందులో రోపించి ఉండును.
4. దేహకుడ్యము కఠినమైన విరోధక శక్తిగల అనభాసినితో కప్పబడి ఉంటుంది.
5. బాహ్య చర్మము సింపీషియల్ గా నాలుగు లేక ఎక్కువ నిలుపు దండాలు మరియు నిలుపు కండరాలతో ఉంటుంది.



పటం 10.1 అస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్ A. పురుషజీవి B. స్త్రీ జీవి C. పూర్వంత భాగము (పుష్ట దృశ్యము). 1. నోరు 2. పార్శ్వపు చార 3. అవస్కర రంధ్రము 4. మేహాన కంటకాలు 5. స్త్రీ ఉత్పాదక రంధ్రము 6. సూక్ష్మాంకురాలు 7. పుష్ట పెదవి 8. పుష్టచార 9. పాయువు.



పటం 10.2 పుకరేరియో బాంక్రాస్టీ - స్త్రీ జీవి పూర్వంత భాగము

1. నోరు 2. వాడీ వలయము 3. గ్రహవి 4. యోని రంధ్రము 5. ఓ వెజిక్టర్. 6. యోని 7. శుక్ర.

6. జీర్ణవాళము నోరు, పాయువుతో పూర్ణముగాను, తిన్నగాను ఉంటుంది. నోటిని ఆవరించి 3 & 6 వరకు పెదవులు కలవు. గ్రహవి కండరయుతమై త్రికరణ గుహ్వరముతో ఉన్నది.

7. శ్వాస మరియు ప్రసరణ వ్యవస్థలు లేవు.

8. వాడీ వ్యవస్థ పరిగ్రహవి వలయముతోను, దీనిని అంటి వాడీ వంధులు, ఆరు పూర్వ, ఆరు పరవాదులు ఉంటాయి.

9. విపర్ణ వ్యవస్థ పరచంగా ఒకటి లేక రెండు కుయ్యలతో లేదా ఏదీ లేక ఉంటుంది.


10. చాలా వరకు లింగభేదము ఉంటుంది. ఐనను ఉభయ లింగత్వము అవిశేష కనిక జీవులు ఇందులో కలవు.

11. పురుష జీవులు, స్త్రీ జీవుల కన్న చిన్నవి.


12. బీజకోశాలు దారము వలె ఒంటిగాను లేదా జతగాను ఉంటాయి. మగ జీవులలో కంటకాలు ఉంటాయి. మగ ఉత్పత్తి నాళము పురీష నాళము లోనికి తెరుచుకొని అవస్కరమును నిర్వహిస్తుంది. ఆడ ఉత్పత్తి నాళము విడిగా నెలువలికి తెరుచు కొంటుంది.

13. అంతర్ ఫలదీకరణము జరుగును. పెరుగుదల అప్రత్యక్షంగా జరుగును. మాతృమిశ్ర అతిథి ఉండవచ్చు, ఉండక పోవచ్చు. ధీంభకాలు నాలుగు పర్యాయములు నిర్మోచించ బడుతాయి.

ఉదా: అస్కారిస్ (Ascaris) (పటం 10.1), వుకరేరియా (Wuchereria) (పటం 10.2), డ్రాకంక్యులస్ (Dracunculus) లోవా లోవా (Loa Loa) (పటం 10.3), అంక్టెలోస్టోమా డ్యుయెడెనేల్ (Ancylostoma) (పటం 10.4)



పటం 10.3 లోవా లోవా



పటం 10.4 అంక్టెలోస్టోమా డ్యుయెడెనేల్ A. ప్రాథమ పురుష జీవి B. ప్రాథమ స్త్రీ జీవి C. పూర్వంత భాగము D. పురుష జీవి పరాంత భాగం.

1. నోరు 2. ఆనయ కుహరము 3. నాడీ నలయము 4. ముష్కము 5. శుక్రకాశయము 6. ఫలవ నాళము 7. పంపర్క కంటకాలు 8. అవస్కరము 9. పంపర్కబర్హ 10. గ్రహవి 11. స్త్రీ బీజ కోశము 12. గర్భాశయము 13. యోని 14. పాయువు 15. దంతములు 16. రేఖలు 17. పృష్ఠరేఖలు.

10.4.2 తరగతి విమర్శ మార్గా

- ఈ తరగతి పై పైన చూడటానికి విమర్శాదాను పోలి ఉంటుంది.
- ఇది అన్ని మంచి నీటిలో ఉంటాయి. ఒక వెక్టోరియా మాత్రము పముద్రపు జీవి.


3. అవస్కరము అడ, మగ రెండింటిలో ఉండుట వలన ఇవి, ఇతర తరగతులతో వ్యతిరేకముగా విపర్ణక వ్యవస్థ లేనందున నిమటోడుల నుంచి భిన్నంగా ఉంటాయి.
4. ఇవి తంతు రూప మిథ్యా కుహర జీవులు, దేహము పొడవుగా మన్నితముగా స్థూపాకారముగ ఖండిక రహితముగ ఉంటుంది.
5. జీర్ణనాళము క్షీణించి వుంటుంది.
6. ప్రసరణ, శ్వాస, విపర్ణక అంగాలు వుండవు.
7. నాడీ వ్యవస్థ, పరిగ్రహని నాడీవలయము మరియు ఒక మధ్యోదర నాడీ దండము కలిగి వుంటుంది.
8. లింగ భేదము ఉంటుంది. ఒక జత బీజ కోశాలు, ఒక జత బీజ వాహికలు ఉంటాయి.
9. జానెనెల్ జీవులు (బాల్యదశ) ఆర్థో పోడ జీవులలో పరాన్న జీవులుగా ఉంటాయి.

ఉదా: గోర్డియస్ (Gordius), నెక్టోనెమా (Nectonema)

10.4.3 తరగతి రోటీ ఫెరా

1. ఇవి నుంచి వీటి కుంటలు, పరస్పరంలో లభిస్తాయి. కొన్ని సముద్రపు జీవులు.
2. దేహము ఖండిత రహితమై, ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యము కలిగి ఉంటుంది.
3. ఇవి “వీల్ అనిమల్ క్యుల్” (Wheel animalcule) అను పేరుతో వ్యవహరింపబడతాయి. వీవి పూర్వంతమున ఒక తైలికా యంత్రాంగము ఉంటుంది. దీనిని కరోనా (Corona) లేదా ట్రోచ్ ఫలకము (Trochal disc) అంటారు. ఈ ఫలకము పోషణానికి, చలనానికి ఉపయోగపడుతుంది.
4. అపార నాళము సాధారణంగ పంపూర్ణముగ ఉండి, గ్రహని కండరములతో విభేద పడి ఉంటుంది. గ్రహని చలించే దనడలుతో ఉంటుంది.
5. నాడీ వ్యవస్థ పరళమైంది. కంటి చుక్క ఉంటుంది.
6. విపర్ణక వ్యవస్థ జ్వాలా కణములతో ఉంటుంది.
7. లింగభేదము కలదు. మగ జీవి చిన్నదిగా లేక తిరోగమించి లేదా అసలే ఉండదు.
8. ప్రత్యుత్పత్తి లైంగికంగా మరియు అనిషేక పద్ధతివ జరుగును. డింభిక దశ ఉండదు.

ఉదా: బ్రాక్యోనస్ (Brachionus) (పటం — 10.5), రోటీఫర్ (Rotifer)



పటం 10.5 బ్రాక్యోనస్ రూపాన్ని. A. స్త్రీ జీవి. B. పురుష జీవి.


1. మెదడు 2. వృక్కా నాళము 3. గ్రహని 4. జెర్మెరియం 5. తోక 6. పేగు 7. జీర్ణకయము 8. రోరికా. 9. కండరయంత పట్టీలు 10. ముష్కము. 11. జ్వాలా కణములు.

10.4.4 తరగతి గాస్ట్రోట్రైకా

1. ఇవి స్వతంత్ర జీవనము గడిపే సూక్ష్మజీవులు.
2. మంచినీటిలో లేదా సముద్రములో ఉంటాయి.
3. దేహము పురుగువలె వుండి ఖండిత రహితంగా ఉంటుంది. ఉదల తలము బల్ల పరుపుగా వుండి శైలికలతో ఉంటుంది.
4. అవభాసిని పలుచగా వుండి సాధారణంగా కంటకాలతో, పాలుసులతో లేదా మొటిమలతో వుంటుంది.
5. కార్నా ఉండదు. పరాంతము రెండుగా చీలి వుండి, చీలియున్న గొట్టాలతో గ్రంథులతో ఉండును.
6. జీర్ణనాళము పూర్ణముగ వుండి, నోరు కంటకాలతో చుట్టబడి ఉంటుంది.
7. నాడీ వ్యవస్థ, మస్తిష్క నాడీ పంధి, రెండు ముఖ్య పార్శ్వ నిలుపు నాడులు కలిగి ఉంటుంది.
8. ఒక ఆడ జీవులు లేదా ఉభయ లింగవ్యము ఉంటుంది.
9. ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక లేదా అనిషేక జననంతో జరుగును.
10. ప్రత్యక్ష పెరుగుదల జరుగును.

ఉదా: కీటోనోటస్ (Chaetonotus) (పటం 10.6.ఎ)

లెపిడోడర్మెల్లా (Lepidodermella)



పటం 10.6. A. కీటోనోటస్. B. లెపిడోడర్మెల్లా. 1. నోరు 2. గ్రనవి.
3. శైలికలు. 4. పేగు. 5. పాయువు. 6. ముఖ శింకువు. 7. జీర్ణాశయము.-
పేగు. 8. పార్శ్వగ్రంథి కంటకము.

10.4.5 తరగతి కైటోరింకా

1. ఇవి సూక్ష్మమైన స్థూపాకార జీవులు తక్కువ తోతుగల సముద్రపు నీటి అడుగున బురదలో నివసిస్తాయి.
2. దేహము స్థూపాకారంగా, పైపైన 13 అతుకులుగా (Joints) ఖండిభవనము ప్రదర్శించును.
3. అవభాసిని కంటకాలతో ఉండును. శైలికలు లేవు.
4. కంటకాల వలయముతో కప్పబడి వున్న ఒక ముకుళిత తల ఉంటుంది.
5. జీర్ణనాళము, పూర్ణముగా ఉండి, విస్తరిత జీర్ణాశయము ఆంత్రముతో మరియు ముకుళిత వలయముతో పాయువు పరాంతన ఉంటుంది.

6. వాడీ వ్యవస్థ, ఒక వృష్ట మస్త్రస్క పంధి, మరియు పంధియుత మధ్య ఉదర వాడీ దండముతో ఉంటుంది.
7. వివర్ణక వ్యవస్థ ఒక జత కురుచవి ఆదివృక్క వాళములతో ఉండును. ఇది ఒక బహు కేంద్రక, జ్వాలా కణములతో ఆరంభమగును.
8. లింగభేదము కలదు. బీజ కోశాలు గొట్టము వంటి తిత్తులు. మగ జీవియందు పంపర్క కంటకాలు ఉండును.
9. అప్తక్ష ఆభివృద్ధి జరుగును. పెక్కు డింభక దళలు మరియు రూప నిక్రియ కలిగి ఉంటుంది. ఉదా. ఎక్టోడెరెస్ (Echinoderes), (పటం 10.6 బి), సెంట్రోడెరెస్ (Centroderecs) మొదలగునవి.

10.5 స్వపరిశీలనం

1. ఉండడం చేత ఆన్స్క హెల్మింథిన్ వర్గంలోని 5 విభాగాలను ఒకచోట చేర్చినారు.

10.6 సారాంశం

1. ఆన్స్క హెల్మింథిన్ జీవులు ద్విసార్వ సౌష్ఠవము, మిథ్యా కుహరము కలిగి ఉంటాయి.
2. ఇవి స్వతంత్ర జీవులుగను, పరాన్న జీవులుగను ఉంటాయి.
3. ఇవి చిన్నగా, పురుగులవలె, ఖండిభవనము లేని జంతువులు.
4. పూర్వాయతమున ప్రవృత్తమైన తల ఉండదు.
5. పెరుగుదల ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా జరుగుతుంది.

10.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. మిథ్యా శరీరకుహరం

10.8 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో సమాధానములు వ్రాయండి.
 1. వర్గము ఆన్స్క హెల్మింథిన్ లోని వివిధ విభాగములను తెల్పి, కొన్ని ఉదాహరణములిమ్ము. రోటిఫెర యొక్క సామాన్య లక్షణాలను కూడా తెల్పుము.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి
 1. విభాగము నిమిటో మార్కా, ఆన్స్క హెల్మింథిన్ విభాగముల నుంచి ఏ విధంగా భిన్నంగా వున్నది?
 2. నిమిటోదా సాధారణ లక్షణాలను తెలపండి.

భాగము - 11 ముఖ్యమైన నిమిటోడా పరాన్నజీవులు

విషయక్రమము

- 11. 1 ఉద్దేశ్యము
- 11. 2 ఉపోద్ఘాతము
- 11. 3 అస్కారిస్ బుంబికాయిడిస్
 - 11.3.1 జీవిత చక్రము
 - 11.3.2 రోగ లక్షణాలు
 - 11.3.3 నియంత్రణ
- 11. 4 అంక్టోస్టోమా డుమోడినేల్
 - 11.4.1 జీవితచక్రము
 - 11.4.2 రోగ లక్షణాలు
 - 11.4.3 నియంత్రణ
- 11. 5 పుకరేరియా బాంక్రాఫ్టీ
 - 11.5.1 జీవిత చక్రము
 - 11.5.2 రోగ లక్షణాలు
 - 11.5.3 నియంత్రణ
- 11. 6 డ్రాకుంకులస్ మెడిసెన్సిస్
 - 11.6.1 జీవిత చక్రము
 - 11.6.2 రోగ లక్షణాలు
 - 11.6.3 నియంత్రణ
- 11. 7 హెల్మింథ్స్ జీవులు అనుకూలనాలు
- 11. 8 స్వపరిశీలన
- 11. 9 సారాంశము
- 11.10 స్వపరిశీలన జవాబులు
- 11.11 నమూనా ప్రశ్నలు

11.1 ఉద్దేశ్యము

ఇందులో నిమిటోడ్ల సామాన్య స్వరూపము, పశువులకు మానవులకు చెందిన ముఖ్యమైన పరాన్న జీవుల జీవిత చక్రాలు వాని వల్ల కలుగు రోగాలు మరియు నియంత్రణ పద్ధతులు విశదీకరించబడినది. ఇందులో అతిథేయ, పరాన్న జీవులకు గల సంబంధాలను వివరించబడింది. ఇది చదివిన తరువాత నిమిటోడ్ల పరాన్న జీవుల వల్ల దేశానికి ఎంత ఆర్థిక నష్టం సంభవిస్తుందో, వాటిని ఏ విధంగా నియంత్రించాలో విబ్ధరంగా నీవు చెప్పగలుగుతావు.

11.2 ఉపోద్ఘాతము

1. నిమిటోడ్లు ద్విసార్వ పౌష్టవాన్ని చూపుతాయి. ఇవి త్రిస్తరిత, మిథ్యా శరీర కుహరము గల మెటాజోవన్లు.
2. సాధారణ నిమిటోడ్ యొక్క దేహం పొడవుగా, స్థూపాకారంగా వుండి, రెండువైపులా మొనదేలి వుంటుంది.

3. ఇవి దట్టమైన, పారగమ్యుతరేని, పారదర్శక అవభాసితో లేదా పాక్షిక పార దర్శక అవభాసితో కప్పబడి వుంటుంది. కొన్నిసార్లు అవభాసని గండు రోమములు, కంటకములు, గట్టులు మొదలగునవి కలిగి ఉంటుంది.
4. కొన్ని నిమోటోడ్ల తల మరియు లోక భాగములలో సూక్ష్మాంశురాలు ఉంటాయి.
5. స్ట్రాంగిలేటోలో మగజీవుల పరాంతమున బర్సా (Bursa) అనబడు గంటాకార విస్తారకము ఉంటుంది.
6. అధిక సంఖ్యయందు నోరు మూడు పెదవులతో అవలించి ఉంటుంది. కొన్నింటిలో పెదవులు అస్వరూపర గుళికగా రూపాంతరము చెంది ఉంటాయి.
7. జీర్ణనాళము, నోరు, అస్వరూపరము, అహార వాహిక, గ్రసని మరియు అంత్రముతో ఉంటుంది.
8. నాడీ వ్యవస్థలో నాడీ వలయము ఉంటుంది. దీని నుండి నియపు నాడులు పూర్వ జర భాగములకు వెళ్లుతాయి. ప్రత్యేక జ్ఞానంగాలైన, అంఫిడ్స్ ఉంటాయి.
9. విసర్జక వ్యవస్థ వైవిధ్యాలు కలిగి ఉంటుంది. అహార వాహికగ్రసని, మరియు అంత్రముతో ఉంటుంది.
10. కొన్నింటిని మినహాయించి, అన్ని పరాన్న జీవన నిమోటోడ్లందు లైంగిక విభేదనము ఉంటుంది. ఇవి బాహ్యంగా కానవచ్చును.
11. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థయందు గొట్టపు ఆకారముతోనున్న బీజకోశము, ఒక శుక్రవాహిక, ఒక శుక్రాశయము అవస్కరములోనికి తెరచుకుంటుంది.
12. సామాన్యముగా మగ జీవులలో ఒక జత కంటకాలు అవస్కరములోనికి తెరచుకుంటాయి. ఇవి సంపర్క సమయంలో శుక్రకణాలను యోనిలోనికి పోపుటకు సహాయపడతాయి.
13. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో రెండు స్త్రీ బీజ కోశాలు, రెండు గర్భాశయాలు ఉంటాయి. గర్భాశయాలు కలిసిపోయి యోనిగా ఏర్పడుతుంది. యోని చాలా వరకు ఉదర మధ్య భాగాన ఆడ జనన రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి తెరచుకొంటుంది.

ముఖ్యమైన కొన్ని పరాన్న జీవుల జీవిత చరిత్రలను మరియు వాని రోగ లక్షణాలను ఈ క్రింద వివరించబడినది.

11.3 ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్


సామాన్య నామము: సాధారణ గుండ్రని పురుగు

మానవుని అంత్రమునందు నివసించు నిమోటోడ్ పరాన్న జీవుల అన్నింటిలో ఇది పెద్దది

11.3.1 జీవిత చక్రము

ఇది తన జీవిత చక్రాన్ని ఒక ఆతిథేయిలోనే పరిసమాప్తము చేసుకుంటుంది. మాధ్యమిక ఆతిథేయి అవసరము లేదు. ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్ కు మానవుడొక్కడే ముఖ్య ఆతిథేయి. ఫలదీకరణము జరిగిన పిదప ఆడ ఆస్కారిస్ విడుదల చేయు గుడ్లు మానవుని మలము ద్వారా వెలుపలికి వస్తాయి. ఇవి చూచుటకు అందాకారముగాను, గుండ్రముగాను ఉంటాయి. ఇవి 60 75 మైక్రానుల పొడవు, 40 50 మైక్రానుల వెడల్పు ఉంటాయి. గుడ్లు గోధుమ వర్ణంతో ఒక ఖండిత అండమును కలిగి ఉంటాయి. వెలుపలికి వచ్చిన వెంటనే ఇవి సంక్రమించేవి కావు. 10 40 దినముల కాలమున మట్టిలో 'రాబ్లిటి ఫారమ్' డింభకము, గుడ్డు కర్పరము లోపల అఖండిత అండము నుంచి తయారవుతుంది. దీని పెరుగుదల, వాతావరణము, ఉష్ణోగ్రత మరియు తేమ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిణతి చెంది మెలికలు తిరిగిన పిండము మానవునకు సాంక్రమికము. గుడ్డు పొదుగక ముందు డింభకము ఒకసారి నిర్మోచనకు చెందుతుంది.

ఆహారము, పానీయము లేదా శుభ్రముగా లేని కూరగాయల వెంబడి పిండము కల గ్రుడ్డు మానవుని, ఆంధ్ర మూలమును చేరుకుంటాయి. ఆంధ్ర మూలము నందు జీర్ణ రసముల వలన కర్పరము దుర్బలమై లోపల ఉన్నట్టి డింభకము చైతన్య సంతము గావిస్తాయి. ఆ పిదప, కర్పరము పగులటచే రాబ్బడి ఫారమ్ డింభకములు చిన్నప్రేగు పైభాగంలో విడుదలవుతాయి. ఈ డింభకాలు చిన్న ప్రేగులో ప్రత్యక్షంగా పెరిగి పరిణతిని



పటం 11.1 ఆస్కారిస్ జీవిత చరిత్ర ఎ. ప్రాథమిక పురుష జీవి బి. ప్రాథమిక స్త్రీ జీవి సి. అండము డి. అండము అడ్డుకోత ఇ. పిండముతోనున్న గుడ్డు ఎఫ్. డింభకము. 1. నోరు 2. ఆస్కరుహారము 3. నాడీ వలయము 4. గ్రనవి 5. ప్రేగు 6. బాహ్యపార 7. సంయుక్త బీజం 8. కైటిన్ కర్పరము 9. పురిషనాళము 10. పాయువు 11. తోక 12. బాల్యదశ (జువనైల్)

చెందవు. కొత్తగా పొడగ బడిన డింభకాలు చిన్న ప్రేపు క్లేష్ట్రస్తరాన్ని చీల్చుకొని పోయి, రక్తము ద్వారా కాలేయమును చేరుకుంటాయి. కాలేయములో ఇవి 3-4 వినములు ఉంటాయి. చివరకు కాలేయము వదిలి హృదయము యొక్క కుడిభాగము నుండి పుపుస ప్రసరణము చేరుకుంటాయి. శ్వాసకోశములలో పెరిగి 0.2 మి.మీ. నుండి 2 మి.మీ. పొడవును చేరుకుంటాయి. ఇచట డింభకము రెండుసార్లు నిర్మోచనము చెందుతుంది. (మొదటిది 5 లేక 6వ రోజు రెండవది 10వ దినము తరువాత) శ్వాస కోశములలో ఇవి వాయు కోశాలను చేరుకుంటాయి. ఈ వలసకు 10-15 దినముల వ్యవధి అవసరముంటుంది. ఊపిరి తిత్తుల వాయుకోశము నుండి, డింభకాలు ప్రాకుచు శ్వాస నాళికల ద్వారా శ్వాసనాళము చివరకు స్వరపేటిక మరియు గ్రనవిని చేరుకుంటాయి. శ్వాసమార్గము యొక్క ఉపకళా శైలికలు ఏర్పరచు ప్రవాహము సహాయముతో డింభకాలు గ్రనవి చేరి, అచట నుంచి రెండవసారి మ్రింగబడి, అన్నవాహిక ద్వారా జీర్ణాశయము చేరుకుంటాయి. తదుపరి చిన్నప్రేగు పూర్వభాగమున స్థిరపడతాయి. చిన్నప్రేగు వీనికి నివాస స్థానము. సాంక్రమణ తరువాత సుమారు 25 నుండి 29 దినముల మధ్యకాలమున, మరో నిర్మోచనము జరుగును. 6-10 వారముల వ్యవధిలో లైంగిక పరిణతి సమకూరును. పరిపక్వ ఆడ పురుగులు గుడ్లను మలము ద్వారా వదలుట ఆరంభిస్తాయి. పరాన్నజీవులు ప్రథమంగా సంక్రమించిన రెండు నెలల తరువాత గుడ్లు మలమునందు కనబడుట ఆరంభమౌతాయి. ఈ విధముగ జీవితచక్రము తిరిగి తిరిగి కొనసాగుతుంది (పటం 11.1).

11.3.2 రోగ లక్షణాలు

1. అస్కారిస్ రోగ లక్షణాలు సంక్రమణ తీవ్రతమీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
2. దేహములో పరాన్న జీవుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఆతిథేయికి ఎక్కువగా హాని జరుగదు.
3. ఎక్కువ సంఖ్యలో పరాన్నజీవులు సంక్రమించినచో పరిస్థితి విషమించును. దీనివలన బలహీనత, రక్తక్రీణత సంభవించును.
4. పరాన్నజీవులు ఉత్పన్నము చేసే టాక్సిన్లు సంక్షోభ్యతను చూపును. జీర్ణము మాంధ్యమగును. కోలిక్ నొప్పి సంభవించును.
5. పురుగులు శ్లేష్మప్రరాన్ని గాయపరచిన ఎంటరైటిస్ (Enteritis) సంభవించును. పెరిటోనైటిస్ కూడా కలుగును.
6. దింభకాలు ఊపిరి తిత్తుల నుండి వలన పోపునపుడు సంక్షోభ్యత, దగ్గు, రక్తసావము, వాపు మొదలగునవి వచ్చి నిమోనియా వచ్చుటకు కారణభూతమౌతాయి.
7. అప్పుడప్పుడు సాధారణ ప్రసరణ ద్వారా దింభకము మూత్రపిండాలు, మెదడు, వెన్నుపాము మరియు కండరాలు మొదలగు భాగములను చేరి అందులో ప్రణాళను కలుగజేస్తాయి.
8. సుమారు వంద పురుగులు ఉన్నచో చిన్న పేగును పూర్తిగా నాశనము గావించుతాయి.
9. ఇవి అపెండిసైటిస్ మరియు హెపాటైటిస్ కలుగజేస్తాయి.

11.3.3 నియంత్రణ

1. అస్కారిస్ సంక్రమణమును అరికట్టుటకు మానవ మలమును, బహిర్గతము కావీయక భూమిలోపలి గొట్టముల ద్వారా పారవేసే వ్యవస్థను ఏర్పరుచుట ఎంతో లాభదాయకము.
2. కూరగాయలను, పండ్లను తినుటకు పూర్వము శుభ్రముగా కడుగట వలన అస్కారిస్ సంక్రమణమును ఆపవచ్చును.
3. చిన్న పిల్లలు భోజనము చేయుటకు ముందు చేతులు కడుగుకొనేటట్లు అలవాటు చేయవలెను.
4. చీనోపోడియం (Chenopodium), టేట్రా క్లోరో ఇథిలీన్ (Tetrachloroethylene) యొక్క నూనెలను కలిపి రోగులకు ఇచ్చి ప్రాథమ పురుగులను దేహము నుండి పారద్రోలవచ్చును.
5. హెట్రాజాన్ (Hetrajon) సిరప్ చిన్న పిల్లలకు చాల అనుకూలమైన ఔషధము.
6. పిపర్ జిన్ హైడ్రేట్ (Piperjine hydrate), ఆల్కొపార్ (Alcopar) మరియు బానోసిడా (Banocida) మొదలగునవి అంటి హెల్మింథిక్ మందులుగా వాడుటకు సిఫారసు చేయబడినవి.

11.4 అంకైలోస్టోమా దుయొడెనేట్

సామాన్య నామము: పురాతన ప్రపంచపు కొక్కెపు పురుగు
అంకైలోస్టోమా ప్రాథజీవి. మానవుని చిన్నపేగులో నివసించును. గుడ్లు పెట్టినపుడు అఖండిత దశలో ఉంటాయి. ఆంత్రము ద్వారా పోపునపుడు ఖండిభవనము మొదలై నాలుగు కణముల దశను చేరుకుంటాయి. గుడ్లు మలము ద్వారా బయటపడినపుడు మానవులకు సంక్రమించే స్థితిలో ఉండవు.

11.4.1 జీవిత చక్రము

దీనికి మాధ్యమిక ఆతిథేయి అవసరము లేదు. ఇతర హెల్మింథ్ పురుగులవలె మానవుని దేహమునందు పెంఖ్యను పెంచుకోవు. అంకైలోస్టోమా దుయొడెనేట్ నకు మానవుడొకడే ముఖ్య ఆతిథేయి. ఖండి భవనము జరిగిన అందములలో ఉన్న గుడ్లు మలము ద్వారా ముఖ్యమైన ఆతిథేయి మానవుని దేహము వెలుపలికి చేరుకుంటాయి. 48 గంటల లోపుగ ప్రతి గుడ్డు పొదిగి 'రాబ్బిటి ఫారమ్' దింభకము మట్టిలోనికి వదులుతుంది. ఇప్పుడు దింభకము 250 మైక్రానుల పొడవు ఉంటుంది.

11.4.2 రోగ లక్షణాలు

1. ఈ పరాన్న జీవి వలన అంకైలో స్టోమియాసిస్ (Ancylostomiasis) అను వ్యాధి సంభవించును. దీని ముఖ్య లక్షణము రక్త పోషణ.
2. మానవుడు పొడరక్షలు లేక మలిన పడిన నేలపై వడిచిన ఈ వ్యాధి సంభవించును. ఈ వ్యాధి వలన ఆర్థిక నష్టము మరియు ఆరోగ్యము చెడుట సంభవించును.
3. ఫైలోరిఫావ్ డింభకము చర్మమును తాకిన తక్షణమే అందులోనికి చొచ్చుకొని పోతుంది.
4. చొచ్చుకొని పోయే డింభకాలు ప్రతీకార క్షోభ్యతను కలిగించును. చర్మము ఉబ్బును. గుల గుల మొదలగును.
5. ప్రాథ జీవులు జీర్ణాశయము, ఆంత్రము నందు నొప్పి కలిగించును. వీటి విరేచనాలు గుండె దడదడ చివరకు మరణము సంభవించును.

11.4.3 నియంత్రణ


1. చీనో ఫోడియం, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, హైక్సాల్ రిసార్సివోల్ (Hexylesorcinol) వంటి పెక్కు మందులు వాడుట వలన రోగము నయమగును. క్రిములు దేహము నుండి తీసివేయ బడతాయి.
2. చాలా బలీయమైన, తక్కువ విషపూరితమైనట్టి టెట్రాక్లోరో ఇథీలీన్ (Tetrachloroethylene) సాధారణంగా సిఫారసు చేయబడిన మందు.
3. ప్రజలలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పరిసరములను శుభ్రము గావించుట గురించి బోధించవలెను. ముఖ్యముగా పిల్లలకు భోజనమునకు పూర్వము చేతులు కడుగుకొనుట అలవాటు చేయవలెను.
4. ప్రతి ఇంటిలో మరుగు దొడ్డిని కట్టించవలెను. మానవుల మలమును భూమి లోపల నిర్మించిన గొట్టముల ద్వారా పారవేయ వలయును.

11.5 పుకరేరియా బాంక్రాస్టీ

Synonym: పైలేరియా బాంక్రాస్టీ

సామాన్య నామము: బాంక్రాస్టీ పైలేరియా

ఆడ పురుగు అండ శిశోత్పాదకాలు. ఇవి బాగా ఎదిగిన పిండము గల గుడ్లను పెట్టాయి. ఈ పిండమును మైక్రోపైలేరియా అంటారు. మైక్రోపైలేరియా చురుకుగా రక్తములో తిరుగుతుంటాయి. విరంజితము చేయని మైక్రో పైలేరియా పొరదర్యకంగా, వర్ణ రహితంగా వుండు దేహాలు. వీని తల మొండిగా, తోక



చిత్రం 11.3. పుకరేరియా బాంక్రాస్టీ డింభక దళ (మైక్రోపైలేరియా)

1. మైక్రోపైలేరియా, 2. తొడుగు, 3. ఎర్రరక్త కణాలు, 4. చాడి పరియము, 5. విసర్జన రంధ్రం, 6. జీ కణాలు (2-4), 7. పాయు రంధ్రము

జాంతన కటకము ఉంటుంది. నేత్ర పటల కణాలు చిన్న నాడీ తంతువులను కలిగి ఉంటాయి. ఈ నాడీ తంతువులు కలిసి దృక్ నాడి (Optic nerve) యేర్పడుతుంది. నేత్రాలు కాంతి గ్రాహకాలుగా పనిచేస్తాయి.


13.12 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

వీరిన్ ఏకలింగ జీవి. బీజకోశాలు సంతానోత్పత్తి కాలములో తాత్కాలికంగా ఏర్పడుతాయి. పురుష జీవులలో 19 నుండి 25వ ఖండితాలలో యేదో ఒక ఖండితములో ఒక జత ముష్కాలు (Testis) ఉంటాయి. కొన్ని జీవులలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఖండితాలలో విస్తరిస్తాయి.

స్త్రీ జీవులలో బీజకోశాలు ఎక్కువ ఖండితాలలో ఉంటాయి. బీజవాహికలు రెండు జీవులలోను ఉండవు. బీజకణాలు సీరోమ్లోకి విడుదల అవుతాయి. అక్కడే అవి పెరిగి పరిణతి (Nature) అవుతాయి. పరిణతి చెందిన సంయోగ బీజాలు కుద్యము చిట్టడము ద్వారా బయటకు విడుదల అవుతాయి. కొన్ని వీరిష్టలో సంయోగ బీజాలు వెలుపలకు విడుదల అయిన వెంటనే స్త్రీ జీవి మరణిస్తుంది. ఫలదీరకణము బాహ్యంగా జరుగుతుంది.

13.13 పిండాభివృద్ధి

అండము టేలోలిస్టైటల్ రకానికి చెందినది. సర్పిలాకార, నిర్ధారిత విదళనము (Spiral cleavage, determinate) జరుగుతుంది. అనేక విదళనల తరువాత పిండాభివృద్ధి ద్వితీయ దశ (బాష్టులా), మరికొంత మార్పువల్ల గాష్టులా ఏర్పడుతాయి. గాష్టులా ట్రోకోఫోర్ లేదా ట్రోకోస్టియర్ డింభకముగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. (పటము 13.9)



పటం 13.9 ట్రోకోఫోర్ డింభకము 1. అగ్ర గుచ్చతైకలు 2. అగ్రజ్ఞాన ఫలకము 3. కంటిచుక్క 4. ప్రోటోట్రాక్ 5. బ్లాస్టోసోల్ 6. పాయు పథము 7. పాయువు 8. మధ్యత్వచ పట్టీ, డింభక దశ వృక్కము 9. సంతులనకోశం 10. నోరు 12. ఆద్య ముఖము.

ప్రోటోఫోర్, పియర్ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది పలుచని బహిష్టన ఉపకళతో ఉంటుంది. రెండు చివర ప్రాంతాలతో దళసరిగా ఉంటాయి. పై భాగాన్ని అగ్రభాగముని, దళసరి అయిన భాగాన్ని అగ్రఫలకముని (Apical Plate) అంటారు. ఈ భాగములో శైలికల గుచ్చము ఉంటుంది. ఆహారవాళము అభివృద్ధి చెందుతుంది. వారు ఆహార వాహిక లోనికి దారితీస్తుంది. ఇది బహిష్టన అంతర్వేష్టనలో ఉంటుంది. జీర్ణాశయము అంతస్త్వచ నిర్మితము. అంత్యాహార వాళము బహిష్టన అంతర్వేష్టనములో ఉంటుంది. ఇది పాయువు ద్వారా వెలుపలకు తెరుచుకుంటుంది. శరీరం చుట్టూ ఒక శైలికామయ మేఖల యేర్పడుతుంది. దీనిని ప్రోటోట్రోక్ అని అంటారు. దీంభక జీవి స్వేచ్ఛగా ఈదడానికి ఇది రోహదపడుతుంది. అగ్రఫలకము దిగువన ఒక కంటిచుక్క ఉంటుంది.

ప్రోటోఫోర్ ప్లవక జీవి. ఇది వీటిలో నిరాధారంగా తేలుతూ ప్రోటోట్రోక్ లోని శైలికల కదలిక వలన కొద్ది మాత్రము ఈదగలుగుతుంది. ప్రోటోఫోర్ రూప విక్రియ (Metamorphosis) చెందుతుంది. అగ్రఫలక భాగము ముఖపూర్వ భాగముగా మార్పు చెందుతుంది. మెదడు, స్పర్శకాలు, నేత్రాలు ఈ భాగములో అభివృద్ధి చెందుతాయి. దీని వెనుకనున్న భాగము పరితుండముగా రూపొందుతుంది. దీంభక జీవి పాయు ప్రాంతము నుండి అభివృద్ధి చెంది, పెరిగి, పాదపుగా ఏర్పడి ఖండిత విన్యాసాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రాథజీవి రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

13.14 ఎపిటోక్ (Epitoke) మరియు హెటిరో నీరిస్

కొన్ని నీరిడ్ క్రిములు రెండు రూపాలలో లేదా దశలలో కనిపిస్తాయి. లైంగిక పరిణతి చెందిన జీవులలో పర అర్థ భాగంలో నిర్మాణము భిన్నంగా వుంటుంది. దీనిని ఎపిటోక్ అంటారు. పూర్వాంతములోని ఖండితాలలో ఎటు వంటి మార్పు ఉండదు. ఈ ప్రాంతాన్ని ఎటోక్ (Atoke) అని అంటారు. ఈ విధంగా రెండు వేర్వేరు నిర్మాణాలతో ఉన్న నీరిస్ క్రిములను హెటిరో నీరిస్ అని అంటారు.

13.15 స్వపరిశీలనం

1. ————— ఉండడం. పాలికేట్ విభాగం జీవుల విశిష్ట లక్షణం.
2. చక్కగా, బాగా పెరిగిన ఆహారవాళంతో ఉన్నా నీరిస్ ఆహార సేకరణ ————— పద్ధతిలో జరుగుతుంది.
3. ఎపిటోక్ మార్పులు నీరిస్ ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలకు చిహ్నం. ఎటోక్, ఎపిటోక్ తో ఉండే ఈదశను ————— అంటారు.

13.17 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. పార్వ పాదాలు
2. ఫ్లెడ్ ఫీటింగ్
3. హెటిరో నీరిస్.

13.18. నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి

1. నీరిస్ బాహ్య లక్షణాలను వివరింపుము
2. నీరిస్ లో జీర్ణవ్యవస్థ, ఆహార సేకరణ, జీర్ణ క్రియ గురించి క్లుప్తముగా వ్రాయుము.
3. నీరిస్ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను వివరింపుము
4. నీరిస్ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను వివరించి, పిండాభివృద్ధిని తెలుపండి

II. ఈ క్రిందివానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి

1. నీరిస్ విసర్జక వ్యవస్థను వివరింపుము
2. నీరిస్ నాడీ వ్యవస్థను వివరింపుము
3. ట్రోకోఫోర్ డింభక నిర్మాణాన్ని, భాగాలు గుర్తించిన పటము ద్వారా వివరింపుము
4. నీరిస్ శరీర కుడ్య నిర్మాణమును తెలపండి.

13.19 పదకోశం

ఉభయలింగ జీవి : స్త్రీ, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు రెండూ ఉన్న జీవి.

క్లెటెల్లమ్ : జలగ, వానపాము వంటి అనెలిడ్లలో కొన్ని ఖండితాలు దశసరి అవుతాయి. సంపర్కము, శుక్రకణ మార్పిడి తర్వాత ఈ ప్రాంతములో గుడ్లత్పత్తి ఏర్పడుతుంది.

ఖండి భవనము : దేహము రింగులవంటి సమభాగములుగా విభక్తమై ఉంటుంది. వీటిని దేహ ఖండితాలు అంటారు. వీటిలో అనేక అవయవాలు నిలుపు క్రమవరుసలో అమరి వుంటాయి.

గుడ్లత్పత్తి : క్లెటెల్లమ్ చుట్టూ గంధుల ప్రావకాల వల్ల శ్లేష్మపు గొట్టము యేర్పడుతుంది. తరువాత ఇది గట్టిపడి ఒక పంచి వంటి నిర్మాణాన్ని యేర్పరుస్తుంది. ఇందు లోనికి శుక్రకణాలు, అండాలు వదలబడతాయి. ఇది గుడ్లత్పత్తిగా వ్యవహరింప బడుతుంది. వీనిలో సంయుక్త బీజము అభివృద్ధి చెందుతుంది.

ద్విశాఖాయుత : రెండు శాఖలలో ఉన్న ఉపాంగము

(Biramous)

ఉపాంగము

పార్శ్వ పాదము : కొన్ని పారీక్టిల్లలో పార్శ్వాలలో నున్న ద్విశాఖాయుత నిర్మాణము ఇది గమనానికి, శ్వాసక్రియకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

సీతకణము : ఇవి అంతరాంగ శరీరకుహర ఉపకళ నుండి ఉత్పత్తి అయిన పసుపు వర్ణకణాలు. ఇవి రక్తము నుండి మలిన పదార్థములను సేకరిస్తుంది. ఇలాంటి కణాలను ఈరియోసైట్లు 153

14.3 సామాన్య లక్షణాలు

1. మలస్కన్ల శరీరము ఖండిత రహితంగా, ద్విసార్వ పౌష్ట్యముతో ఉంటుంది. గాఢ్రో పాడవంటి మలస్కన్లలో ద్విసార్వ పౌష్ట్యము ద్వితీయంగా పోగొట్టుకొని సౌష్ట్యవరహితంగా (Asymmetrical) ఉంటాయి.
2. మలస్కన్ల శరీరము పురువుగా ఉండి కర్పరముతో ఉంటుంది.
3. వీటి శరీరము వదులుగా నున్న ప్రావారములో ఇమిడి ఉంటుంది. ప్రావారము, శరీరము మధ్యనున్న ఖాళీ స్థలమును ప్రావార కుహరమని అంటారు.
4. కర్పరాన్ని ప్రావారము స్రవిస్తుంది. కర్పరము బాహ్యంగా కానీ, లోపలివైపుకానీ ఉంటుంది. అరుదుగా కర్పరము లోపిస్తుంది.
5. శరీరము, తల, పాదము అంతరాంగ ద్రవ్యముగా విభజన చెంది ఉంటుంది. తల స్పష్టంగా ఉండి నోరు, పుర్రుకాలు, నేత్రాలు ఉంటాయి.
6. కొన్ని జంతువులలో ఉదర శరీర కుడ్యము (Ventral body wall) కండరయుతంగా, బలవరువుగా, గొడ్డలి ఆకారములో నున్న పాదముగా రూపాంతరము చెంది యుంటుంది. ఇది ప్రాకడానికి, బొరియలు చేయడానికి ఈదడానికి అనువుగా వివిధ జీవులలో మార్పు చెంది ఉంటాయి.
7. అంతరాంగ ద్రవ్యములో జీర్ణ, విసర్జన, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉంటాయి.
8. శరీర కుహరము, రక్త కుహరము, సీరోము క్షీణించి హృదయావరణ కుహరానికి, పుక్కి అవయవము, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలకు మూత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది.
9. జీర్ణ వ్యవస్థలో లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి. ఎక్కువ జీవులలో ఆస్య కుహరములో నికషణ అవయవము (Rasping organ) ఉంటుంది.
10. శ్వాసక్రియ మొప్పలు లేదా కంకా భాగము లేక పుపున కవశము ద్వారా జరుగుతుంది. తరచుగా ప్రావారంబిక, బాహ్య చర్మము శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి.
11. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో పృష్ఠంగా ఒకటి లేక రెండు కర్ణికలు ఒక జతరికతో నున్న గుండె హృదయావరణ కుహరంలో ఉంటుంది.
12. విసర్జన క్రియ మూత్ర పిండాల ద్వారా జరుగుతుంది. వీటిని పుక్కాలని కూడ అంటారు. ఇవి హృదయావరణ కుహరములోనికి తెరచుకుంటాయి. అక్కడ నుండి వెలుపలకు పుక్కి రంధ్రాల ద్వారా తెరచుకుంటాయి.
13. నాడీ వ్యవస్థలో జతలుగా ఉన్న మస్తిష్కం, పుపున, పాద, అంతరాంగ నాడీసంధులు వాటిని కలుపుతూ సంయోజకాలు, సంధాయకాలు ఉంటాయి.
14. జ్ఞానేంద్రియాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. నేత్రాలు, పుర్రుకాలు, ఓన్ (ఫేడియమ్)లు కొన్ని జ్ఞాన విర్మాణాలు.
15. ఎక్కువ జీవులలో లింగ భేదము ఉంటుంది (Dioecious) కొన్ని ఉభయ లింగ జీవులు (Monoecious) ఫలదీకరణ లోపలివైపు గానీ, బాహ్యంగా కానీ జరుగుతుంది.
16. మలస్కా జీవులు సాధారణంగా అండోత్పాదకాలు. కొన్ని శిశూత్పాదకాలు (వివిపేర, పైలా వంటివైనవి). అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా కానీ, అప్రత్యక్షంగా కానీ జరుగుతుంది. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగునప్పుడు రూప విక్రమం ఉంటుంది. ట్రోకోఫోర్, వెలిజర్, గ్లోకిడియమ్ వంటి వివిధ డింభకాలు ఉంటాయి.

మలస్కా వర్గము ఈ క్రింది ఆరు విభాగాలుగా విభజింపబడినది. మార్టన్, యంగ్ (1964)ను అధారంగా తీసుకొని మార్టల్, విల్లియమ్స్ (1979) పవరించిన వర్గీకరణను ఇక్కడ అనుసరించడమైనది.

14.4 వర్గీకరణ

14.4.1 విభాగము: మోనోప్లాకోఫర

(G మోనాన్ = ఒకటి; ప్లాక్స్ = ఫలకము; ఫెరిన్ = కలిగిఉన్న)

1. ద్విపార్శ్వ పౌష్ట్యముతో నున్న ఖండిత నిర్మాణము కలిగిఉన్న సాగర మలస్కా జీవులు.
2. విభాగము పేరుకు తగినట్లు ఇవి కుంభాకారముతోనున్న ఏక కర్పర నిర్మాణ జీవులు.
3. పాదము వెడల్పుగాను, బల్ల పరుపుగాను ఉండి ఎనిమిది జతల అవరర్చని (Retractor) కండరాలతో ఉంటుంది.
4. ప్రావారము శరీర కుడ్య వలయాకార ముడుతవలె శరీరాన్ని చుట్టి ఉంటుంది.
5. ఆస్య కుహరములో బద్దవలెనున్న రాడ్యులా, రాడ్యులా సంవి (Radular sac)లో ఉంటుంది. షేగు ఎక్కువగా మెలికలు తిరిగి ఉంటుంది.
6. ఐదు జతల మొప్పలు ఉంటాయి. ఇవి ప్రావార కుహరములో ఉంటాయి.
7. వరుసగా నున్న ఆరుజతల వృక్కాలు ప్రావార గాడితో ఉంటాయి.
8. గుండెలో రెండు జతల కర్లికలు, రెండు జతరికలు ఉంటాయి.
9. లింగభేదము ఉంటుంది. రెండు జతల బీజకోశాలు శరీర మధ్యభాగములో ఉంటాయి.

ఉదా: నియోపైరినా గలాతియా (పటం 14.1 ఎ)

14.4.2 విభాగము: ఆంఫిన్యూరా

(Gr : ఆంఫి = రెండు; న్యూరాన్ = నాడి)

1. ఇవి బల్లపరుపు లేదా పృష్టోదరంగా అణగిఉన్న మలస్కా జీవులు.
2. తల బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉండును.
3. పాదము వెడల్పుగాను, చదునుగా ఉంటుంది లేదా అవృష్టంగా ఉంటుంది.
4. ప్రావారము విస్తారముగ ఉండి పృష్ట కర్పరము నిలువ వరుసలోనున్న ఎనిమిది ఫలకాలతో ఉంటుంది. కొన్నింటిలో కర్పరము లోపిస్తుంది.
5. ఆస్య కుహరములో రాడ్యులా ఉంటుంది.
6. లింగభేదము ఉంటుంది. పిందాభివృద్ధి అప్రత్యక్ష పద్ధతిలో జరుగుతుంది. దీంభక జీవి ట్రోకోఫోర్ రకానికి చెందినది.

ఉదా.: కైటాన్ (కోట్ ఆఫ్ మెయిల్ షెల్ (Coat of mail shell) (పటం 14.1 బి) వరుసగానున్న ఎనిమిది కర్పర ఫలకాలు ఉంటాయి.

కీటోడర్మా: (పటం 14.1 సి) క్రిమి రూపములోనున్న శరీరముతో ఉంటాయి. తల, ప్రావారము, పాదము, వృక్కము లోపిస్తుంది. శరీరము అవభాసినితో ఉండి అనేక పంఖ్యలో కార్మేరియన్ కంటకాలు ఉంటాయి.

14.4.3 స్కాఫోపాడ

1. స్కాఫోపాడ విభాగములో (స్కాఫోన్ = కోరలు) విభాగములో బొరియలలో నివసించే 200 సాగర మలస్కాలు ఉంటాయి. వీటిని సాధారణంగా కోర లేదా దంత (Turk or tooth) కర్పరాలు అంటారు.

16. ఇవి ఏక లింగ జీవులు. కొన్ని ఉభయ లింగ జీవులు.
17. అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. దీంభక దశలో ట్రోకోఫోర్, వెలిజర్ ఉంటాయి. వెలిజర్ దీంభకము రూపాంతరము చెందిన ట్రోకోఫోర్ దీంభకము.
18. మంచిపీటితో నివసించు కొన్ని గొద్దరిపాద జీవులు గ్రీష్మకాల ముస్తావస్తలో ఉండి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి రక్షించు కుంటుంది. ఇవి వేలలో బొరియలు చేసుకుని ముస్తావస్త కాలాన్ని గడుపుతాయి.

ఉదా: పైలా (ఆపిల్ వత్త పటం 14.1)

పటెల్లా (పటం 14.1 ఇ), అప్లేసియా (సముద్ర కుందేలు) (పటం 14.1 ఎఫ్)

పిసియా (పటం 14.1 బి.)

14.4.5 విభాగము బైవాల్యియా

1. బైవాల్యియా విభాగాన్ని పెరిస్ పాద, లామెల్లి ప్రాంకియేటా అని కూడ అంటారు.
2. మలస్కా వర్గ జీవులలో ఇది జీవుల సంఖ్యలో రెండవది. ఇందులో క్లాములు, ఆల్మిప్పలు, ఆయిస్టర్లు మొదలైన జీవులను చేర్చినారు. ఇవి ఎక్కువ అర్థిక ప్రాముఖ్యతను (Economic importance) కలిగి ఉన్న జీవులు.
3. శరీరము ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి పార్శ్వాల అణచబడి రెండు పార్శ్వ కవాలాంతో ఉంటుంది.
4. ఇవి పృష్ఠ భాగంలో మడత బంధువలె (Hinge like) అమరి ఉండి ఉదర భాగములో స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది.
5. ప్రావారము విస్తారముగ ఉంటే కవాలాలను అనుసరించి పార్శ్వంగా రెండు అందికలతో ఉంటుంది.
6. తల లోపించి ఉంటుంది. గ్రనవి, దవడలు, రాద్యులా, పుర్రకాలు ఉండవు.
7. పాదము, ఉదరంగా కండరయుతంగా ఉండి గొడ్డలి ఆకారము లేదా నాగటికరు (Plough share) వలె ఉంటుంది. ఇది బొరియలు చేయటానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. స్థాన బద్ధ జీవులలో పాదము లోపించి ఉంటుంది. అనేక జీవులు ఇసుకలో కాని, బురద మట్టిలోకాని, బొరియలు చేసుకొని నివసించేవి. కొన్ని రాళ్ళలో, చెక్కలలో బొరియలు చేసుకొని నివసిస్తాయి. కొన్ని బైసస్ పోగులు (Byssusthreads) ద్వారా, మరికొన్ని పిమెంటు ద్వారా రాళ్ళకు అతికి ఉంటాయి. కొన్ని ఈదగలవు.
8. పృష్ఠంగానున్న హృదయావరణకు మాత్రమే సీలోమ్ పరిమితమై ఉంటుంది.
9. జీర్ణనాళము కొంత మెలికలు తిరిగిన నాళముతో ఉండి ద్వంద్వ జీర్ణ గ్రంథులను కలిగి ఉంటుంది.
10. మొవ్వులు లేదా కంకా భాగాలు పత్రమువలె (Leaf like) ఉన్నందున ఈ విభాగాన్ని లామెల్లి ప్రాంకియేటా అని కూడా అంటారు.
11. గుండె హృదయావరణలో ఉంటుంది. దీనిలో రెండు కర్ణికలు ఒక జతరీతి ఉంటాయి.
12. విసర్జక అవయవాలు ఒక జత వృక్కాలు లేదా మూత్ర పిండాలు. పీటిని బొజానస్ అవయవాలు (Organs of Bojanus) అని కూడ అంటారు. కొన్ని బైవాల్యియాలలో కీబర్ అవయవము (Keber's organ) లేదా హృదయావరణ గ్రంథి (Pericardial gland) కూడా విసర్జక క్రియలో పాల్గొంటుంది.
13. నాడీ వ్యవస్థ నాలుగు జతల నాడీ సంధులలో ఉంటుంది. అవి మస్టిష్క, పుపుస, పాద, అంతరాంగ నాడీ సంధులు. సాధారణంగా మస్టిష్క పుపుస నాడీ సంధులు ఒక్కొక్కవైపు కలసిపోయి మస్టిష్క, పుపుస నాడీ సంధులను ఏర్పరుస్తారు.
14. జ్ఞానేంద్రియాలు సంతులన కోశము, ఓన్ ఫేడియవ్సులు, నేత్రాలు ఉండవు.

15. ఇవి పాదారణంగా ఏకలింగ జీవులు. అరుదుగా ఉభయ లింగ జీవులు (ఫెరోమియా).
 16. అభివృద్ధి రూప విక్రియతో ఉంటుంది. డింభక జీవులు ట్రోకోఫోర్ దశలోగాని, గ్లోకిడియం దశలోకాని ఉంటాయి. గ్లోకిడియన్ ప్రాథమిక దశ చేరుకొనక ముందు కొంతకాలం బాహ్య పరాన్న జీవనాన్ని (Ectoparasitic life) గడుపుతుంది.

ఉదా: లామెల్లి డెన్స్ లేదా యూవియో - (మంచినీటి ఆల్మిప్ప) (పటం 14.2 ఎ)

మైటిలన్ (సముద్రపు ఆల్మిప్ప - పటం 14.2 బి)


అస్ట్రీయా (తినగలిగే ఆయిస్టర్ - పటం 14.2 సి)

పింక్టాడ (ముత్యపు ఆల్మిప్ప - పటం 14.2 డి)

పెక్టెన్ (స్కాలప్) (పటం 14.2 ఇ)

టెరిడో (షిల్ వర్మ్) (పటం 14.2 ఎఫ్)

సోలెన్ (రేజర్ క్లామ్ లేదా రేజర్ కర్పరము - పటం 14.2 జి)



పటం 14.2 కొన్ని మలస్కా జీవులు. ఎ. లామెల్లిడెన్స్, బి. మైటిలన్, సి. అస్ట్రీయా, డి. పింక్టాడ, ఇ. పెక్టెన్, ఎఫ్. టెరిడో, జి. సోలెన్. 1. కర్పరము 2. గవ్వము 3. పాదము 4. మడతబందు స్నాయువు 5. విశ్వాసక అంకుశ నాళిక 6. ఉచ్ఛ్వాసక అంకుశ నాళిక 7. పెరుగుదల రేఖలు 8. కర్పరపు అంచు 9. బైవల్ పోగులు 10. కదిలే మడి కవాలము 11. శాశ్వతముగా రాళ్ళకు అతకబడిన ఎడమ కవాలము 12. కర్పర కవాలము 13. చెవి ఆకారపు కీలము 14. మడత బందు 15. రెక్క 16. పుష్ట ప్రావరపు మడత 17. దేహము.

14.6 సారాంశం

1. వర్గ సాధారణ లక్షణాల వివరణ
2. ఈ వర్గము ఆరు విభాగాలుగా విభజింపబడినది.
3. నియోప్రైరినా అను సజీవ శిలాజాలము (Living fossil) మోనోప్లాకోఫర విభాగము లోని ఉదాహరణ.
4. స్కాఫోపాడ జీవులు దంతపు కర్పర జీవులు.
5. గాస్ట్రోపాడ విభాగము ఏక కవాట జీవులు. వీటిలో కర్పరము మెలిక తిరిగి ఉంటుంది. ద్వితీయంగా ఇవి పాప్టవరహితంగా ఉంటాయి.
6. బైవాల్యూయా జీవులు పార్వాలు అణిగిఉన్న ద్వికవాట జీవులు.
7. మలస్కావర్గ జీవులన్నింటిలోకి అభివృద్ధి చెందిన జీవులు సిఫాలోపాడ విభాగానికి చెందినవి. వీటిలో పాడవైన పుర్రుకాలు, వాటిమీద చూషకాలు ఉంటాయి.
8. అతి పెద్ద పరిమాణములో మున్న అకశేరుకాలు ఈ వర్గములో ఉన్నాయి.

14.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. గాస్ట్రోపాడ
2. బైవాల్యూయా
3. సిఫాలోపాడ

14.8 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.

1. వర్గము మలస్కా సాధారణ లక్షణాలను వివరించండి.
2. గాస్ట్రోపాడ విభాగము సామాన్య లక్షణాలను తెల్పి, ఉదాహరణలిమ్ము.
3. బైవాల్యూయా విభాగ లక్షణాలను తెల్పి, అది ఏవిధంగా గాస్ట్రోపాడ విభాగానికి భిన్నంగా ఉందో వివరించండి.

II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.

1. మలస్కా వర్గము ఎన్ని విభాగాలుగా విభజింపబడినది? అవి ఏవి? కొన్ని ఉదాహరణలను ఇవ్వండి.
2. మోనోప్లాకోఫర విభాగము గురించి తెలపండి.
3. స్కాఫోపాడ విభాగపు సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.

విషయక్రమము

- 15. 1 ఉద్దేశ్యము
- 15. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 15. 3 బాహ్య లక్షణాలు
- 15. 4 మొత్తని శరీర భాగాల విర్మాణము
- 15. 5 జీర్ణ వ్యవస్థ
 - 15.5.1 ఆహారనాళము
 - 15.5.2 జీర్ణగంధులు
- 15. 6 శ్వాసవ్యవస్థ
 - 15.6.1 జలశ్వాసక్రియ
 - 15.6.2 వాయు శ్వాసక్రియ
- 15. 7 రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ
- 15. 8 విసర్జక వ్యవస్థ
- 15. 9 నాడీ వ్యవస్థ
 - 15.9.1 జ్ఞానేంద్రియాలు
- 15.10 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
 - 15.10.1 పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
 - 15.10.2 స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
 - 15.10.3 సంపర్కము, అండ నిక్షేపణం
- 15.11 స్వపరిశీలనం
- 15.12 నమూనా ప్రశ్నలు
- 15.13 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 15.14 నమూనా ప్రశ్నలు

15.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ సారంలో ఆపిల్ నత్తను గురించి క్లుప్తంగా వివరించడం వలన విద్యార్థులు మలస్కా జీవులను గురించి ప్రత్యేకంగా గాస్ట్రోపోడ జీవుల నిర్మాణ విశిష్టతలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విషయాలను క్లుప్తంగా అధ్యయనం చేసిన తరువాత మలస్కా జీవులు వర్గీకరణ శాస్త్రరీత్యా తక్కిన పెద్ద సమూహాలకు చేర్చిన జంతువులకంటే చాలా బాగా తెలిసినట్టివని, మనుగడ పొందే ఇతర జీవులకు ఏమాత్రం తీసిపోని జీవులని నికు బోధపరచే సామర్థ్యం చేకూరుతుంది. ఇంతేకాక గాస్ట్రోపోడ్లు వృద్ధిచెందిన అవయవ వ్యవస్థలతో ఉభయ జీవనం జరుపుకోగలిగే యోగ్యత కలవిని కూడా చెబుతావు.

15.2 ఉపోద్ఘాతం

పైలా మంచిసీటిలో నివసించే గాస్ట్రోపోడ మలస్కా జీవి. ఇది మంచి సీటి కొంసులో, చెరువులలో, సరస్సులలో, వరి పొలాలలో నివసిస్తుంది. సాధారణంగా భారతదేశములో కనిపించు నత్త పైలా గ్లోబోసా జాతికి చెందినది.

వర్గీకరణ

వర్గము	— మలస్కా
విభాగము	— గాస్ట్రోపోడ
ఉపవిభాగము	— ప్రోసోట్రోచియేటా (ప్రెస్టోస్ట్యూరా)
క్రమము	— పెక్టినిట్రోచియేటా (మోనోటోకార్టియా)
ప్రజాతి	— పైలా
జాతి	— గ్లోబోసా

సాధారణంగా పైలా గ్లోబోసాను ఆపిల్ నత్త అని అంటారు. ఇది ఎక్కువగా పల్లిష్వేరియా, పిస్టియా మొదలయిన మొక్కలు విరివిగా పెరిగిన జలాశయములలో వుంటాయి. ఇది ఈ మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకొంటుంది. ఇది ఉభయ చర జీవనానికి అనుకూలపడి వుంటుంది. ఉదర భాగంలో నున్న కండరయుత పాదముతో యిది చాలా నెమ్మదిగా చలించుతుంది.


15.3 బాహ్య లక్షణాలు

పైలా శరీరము గుండ్రముగా నున్న కర్పరములో ఇమిడి ఉంటుంది. ఈ కర్పరము మెలికలు తిరిగిన ఒంటిగవ్వ (univalve). ఈ మెలికలు ఒక మధ్య అక్షము నుండి యేర్పడినవి. దీనిని కాలుమెల్లా (columella) అని అంటారు. సర్పిలానికి చివర ఉన్న భాగాన్ని అగ్రము (apex) అంటారు. ఇది అతి చిన్నది. ఇదియే ప్రథమంగా యేర్పడిన కర్పర భాగము. కర్పరము $5\frac{1}{2}$ నుండి $6\frac{1}{2}$ చుట్టలు (whorls) కలిగి ఉంటుంది. ఇవి క్రమంగా పెద్దవిగా ఉంటాయి. చుట్టకు, చుట్టకు మధ్యన ఉన్న రేఖలను సూదన రేఖలు (sutures) అంటారు. చివర ఉన్న వరుసకు శరీర వరుస (body whorl) అని అంటారు. (పటం 16.1). ఇది మిగతా వాటికన్న పెద్దది. ఇది శరీరములోని ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి ఒక పెద్ద రంధ్రము ఉంటుంది. దీనిని కర్పర రంధ్రము లేదా ముఖద్వారము (shell mouth or aperture) అంటారు. ఈ రంధ్రము ద్వారా జీవి యొక్క తల, పాదము బయటకు చొచ్చుకుని వస్తుంది. దీని బాహ్య అంచును (outer margin) బాహ్య పెదవి (outer lip), లోపలి అంచును లోపలి పెదవి లేదా కాలుమెల్లార్ పెదవి (inner lip or columellar lip) అంటారు. కాలుమెల్లా బోలుగా ఉంటుంది. దీనికి ఒక బాహ్య రంధ్రము ఉంటుంది. ఈ రంధ్రాన్ని నాభి (umbilicus) అంటారు. నాభిని కలిగి ఉన్న కర్పరాలను నాభి కర్పరము (umbilicate shell). లేదా పర్ఫోరేట్ (perforate shell) కర్పరముని అంటారు. కర్పర ఉపరితల మంతయు చిన్న చిన్న నిలుపు కటకాలతో ఉంటుంది.

పైలా కర్పరాన్ని అగ్రముపైకి ఉండేటట్లు, ముఖద్వారము చూపరివైపు (observer) ఉండేటట్లు ఉంచినప్పుడు ముఖద్వారము కుడివైపున ఉండి కర్పరము మెలికలు గడియారపు ముల్లు తిరుగు వ్యతిరేక దిశలో

(anticlockwise) ఉంటాయి. ఇటువంటి కర్పరాన్ని సవ్య (dextral) కర్పరమని అంటారు. ఇది గాన్త్రోపొడ జీవుల కర్పరాల సాధారణ లక్షణము. ఈ విధంగా కాకుండా ఇదే పద్ధతిలో కర్పరాన్ని ఉంచినప్పుడు కర్పర ద్వారము చూపరికి ఎడమవైపున ఉండి మెలికలు గడియారపు ముల్లు తిరుగు దిశలో (clockwise) ఉంటుంది. ఇటువంటి కర్పరాలను అవసవ్య (sinistral) కర్పరాలని అంటారు. ఇవి అరుదుగా ఉండటమేకాక అసాధారణ (abnormal) మైనవి. ఇటీవల కనుగొన్న విషయాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని చర్చిస్తే ఇది ఒక ఆనువంశిక కారకమని ఒక తరమునుండి మరియొక తరానికి మానవులలో కంటి వర్ణము లేక రోమాల రంగు ఏ విధంగా సంక్రమిస్తుందో అదే విధంగా ఇది కూడా వ్యవహరిస్తుందని భావించారు. సత్తలో కుడి లేక సవ్య కర్పరాల ఎడమ లేక అవసవ్య కర్పరాల మీద బహిర్గతంగా ఉంటాయి.

సత్త శరీరమును కర్పరములోనికి ముడుచుకున్నప్పుడు కర్పర ముఖద్వారము గవ్య మూత (operculum) అను కార్కేరియన్ ఫలకములతో మూసుకుంటుంది. ఇది పొదము యొక్క వృష్ట భాగానికి అతికి ఉంటుంది. గవ్య మూత లోపలితలంలో సృష్టమైన అందాకార ఉబ్బెత్తు నిర్మాణము ఉంటుంది. దీనిని బాస్ (Boss) అంటారు (పటం 15.1). ఇది గవ్య మూతకు సంబంధించిన కండరాలు అంటుకొని ఉండే స్థానాన్ని సూచిస్తుంది.



పటం 15.1 పైలా గ్లోబోసా ఎ.కర్పరము, బి.గవ్యమూత (వెలుపలి, లోపలి దృశ్యము). 1. అగ్రము 2. సూదనము 3. శరీరవరుస 4. అర్చవరేఖ 5. పెరుగుదల రేఖలు 6. నాభి 7. కాలుమెల్లార్ పెదవి 8. కర్పర రంధ్రము 9. వెలుపలి పెదవి 10. కేంద్రకము 11. లోపలి గాడి. 12. లోపలి పెదవి 13. లోపలి కర్పర రంధ్రము

కర్పర సూక్ష్మ నిర్మాణము


పైలా కర్పరము కార్నియమ్ కార్పొనేటు, కాంచియోలిన్ అను పదార్థముతో చేయబడినది. దీనిలో మూడు స్తరాలు ఉంటాయి. బయటి స్తరము బయటి పెంకు (Periostracum) అంటారు. ఈ స్తరము కాంచియోలిన్ అను కొమ్ము పదార్థముతో చేయబడి ఉంటుంది. మధ్యస్తరమును పెంకుభాగము (ostracum) అంటారు. ఇది కార్నియమ్ కార్పొనేటుతో ఉంటుంది. లోపలి స్తరమును దిగువ పెంకు (hypostracum) అంటారు. దీనిలో కార్నియమ్ కార్పొనేటు ఉంటుంది. దీనిని ముత్యపు పొర (nacreous layer) అని కూడా అంటారు. కాంచియోలిన్ అను పదార్థము, కార్నియమ్ కార్పొనేటు నీటిలో కరగకుండా పట్టి ఉంచటానికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది.

15.4 మెత్తని శరీర భాగాల నిర్మాణము

నత్త శరీరము మూడు భాగాలుగా విభజించి వుంటుంది. ఇది తల, పాదము, అంతరాంగ సముదాయము (Visceral mass). జీవి పూర్తిగా వ్యాకోచించినప్పుడు తల, పాదము కర్పరము నుండి వెలుపలికి వుంటుంది. కానీ అంతరాంగ సముదాయము ఎల్లప్పుడు కర్పరములో యిమిడి వుంటుంది. (పటం 15.2)

తల: తలలో రెండు జతల స్పర్శకాలు వుంటాయి. మొదటి జత స్పర్శకాలను అధర స్పర్శాంగాలు (labial palps) లేదా శిరస్థ స్పర్శకాలు (cephalic tentacles) అంటారు. ఇవి చిన్నవి. ముందుభాగంలో వుంటాయి. వీటి వెనుక మన్నవి రెండవ జత, పాదపుగా వుంటాయి. ఈ స్పర్శకాలు బోలుగా వుండి ఎక్కువ సంకోచశక్తి కలిగి వుంటాయి. ఒక జత నేత్రాలు వుంటాయి. ఇవి నేత్ర వృంతాల మీద (ommatophores) వుంటాయి.

పాదము: పెద్దదైన, కండరముత శరీర ఉదరభాగము పాదముగా మేర్పడుతుంది. ఇది త్రిభుజాకారములో వుంటుంది. ఇది ప్రాకడానికి వుపయోగంగా వుంటుంది. దీని పృష్ఠ పరభాగములో గవ్వమూత వుంటుంది. పాదము కర్పరము లోనికి ముడుచుకోవచ్చుప్పుడు గవ్వ మూత కర్పరముఖద్వారాన్ని మూసి వుంచుతుంది. పాదములో పాదశ్లేష్మ గ్రంథులు (pedal mucousglands) వుంటాయి. గమనము జరుగునప్పుడు వీటి ప్రావకాల శ్లేష్మవారం (slime trail) ను మేర్పరుస్తాయి.




పటం 15.2 పైలాగ్లోహోపా కర్పరాన్ని తొలగించిన తరువాత కచ్చదే మృదువైన శరీరావయవాలు, 1. అంతరాంగ ద్రవ్యము 2. ప్రావారపు మడత 3. వేదవృంతము పైనున్న కచ్చు 4. ఎడమ అవయవంబిక 5. పాదము 6. మొదటి జత స్పర్శకాలు 7. రెండవజత స్పర్శకాలు (univalve).

అంతరాంగ సముదాయము: ఇది శరీరములోని ముఖ్యభాగాలను కలిగి వుంటుంది. ఇది కర్పరములోని అన్ని చుట్టలను ఆక్రమించి వుంటుంది. ఇది కూడా కర్పరమువలె మెలికలు కలిగి వుంటుంది. అంతరాంగ సముదాయం టార్షన్ (torsion) అను క్రియను ప్రదర్శిస్తుంది.

ప్రావారము: ప్రావారము శరీర భాగాన్ని కప్పి వుంచుతుంది. ప్రావారపు అంచు చాలా దళసరిగా వుంటుంది. కర్పరాన్ని ప్రవించు కర్పర గ్రంథులను కలిగి వుంటుంది. ప్రావారపు కుడి, ఎడమవైపు రెండు అవటులంబికలు వుంటాయి. ఎడమ అవటు లంబిక, కుడిలంబికకన్నా పెద్దదిగా వుండి శ్వాస అంకుశ వాలికను యేర్పరుస్తుంది.. ఇది వాయు శ్వాసక్రియలో తోడ్పడుతుంది.

ప్రావారము: ప్రావారము ఒక పెద్ద కుహరాన్ని కలిగి వుంటుంది. దీనిని ప్రావారకుహరము (Mantle cavity) లేదా పేలియల్ కుహరము (Pallial cavity) అని అంటారు. ఈ కుహరములో శరీర వివిధ భాగాలు వుంటాయి. వీటన్నింటిని సంయుక్తంగా పేలియల్ కాంప్లెక్స్ (Pallial complex) (పటం. 15.3) అంటారు. ప్రావార కుహరము కింది తలములో (Floor of the mantle cavity) ఒక పుబ్బెత్తు గట్టువంటి నిర్మాణము వుంటుంది. దీనిని ఎపిటేనియా లేదా ఎపిటేనియల్ రిడ్జి అంటారు. ఇది ప్రావారకుహరాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది. అవి కుడివైపుపున్న జల శ్వాస కక్ష (Branchial chamber), ఎడమ వైపున వున్న పుష్పన కక్ష, కంకాభాంగము (Ctenidium) లేదా మొప్ప (Gill), పురీష నాళము (Rectum) బీజవాహిక (Gonoduct), హైపోబ్రాంకియల్ గ్రంథి జలశ్వాస కక్షలో వుంటాయి.




పటం 15.3 పైలాగ్లోబాసా పాలియల్ కాంప్లెక్స్ (అడతేది). 1. ఎపిటేనియా 2. పురీషనాళము 3. బీజవాహిక 4. పాలియల్ ఫోల్డ్ 5. కంకాభాంగము 6. మొప్ప 7. రెండవజత స్పర్శకము 8. మొదటి జత స్పర్శకము 9. ఓన్ ఫీడియమ్ 10. ప్రావారము 11. పుష్పన గోడ.

సీలోము: శరీరకుహరము క్షీణించి హృదయావరణ కుహరమునకు, మూత్ర పిండానికి బీజకోశాలకు మూత్రమే పరిమితమై వుంటుంది. అంతరాంగవయవాలను ఆవరించి రక్తముతో నిండివున్న స్థలాలుకానీ, కోటరాలు కానీ వుంటాయి. రక్తముతో నిండిన ఈ కుహరాన్ని హేమోసిల్ (Haemocoel) అంటారు.

15.5 జీర్ణ వ్యవస్థ

పైలా గ్లోబోసా జీర్ణ వ్యవస్థలో గొట్టమువలె నున్న అహార నాళము, జీర్ణ గ్రంథులు వుంటాయి.



పటం 15.4 పైలా గ్లోబోసా జీర్ణవ్యవస్థ. 1. నోరు. 2. ఆన్యకణజాల ద్రవ్యము. 3. ఆహారవాహికా కోష్ఠము. 4. లాలాజల గ్రంథులు. 5. అంథనాళము. 6. జీర్ణకణము. 7. జీర్ణగంధి. 8. పేగు. 9. పురీషనాళము. 10. పాముపు.


15.5.1 ఆహారనాళము

పూర్వాహారనాళము (Foregut), మధ్యాహారనాళము (Midgut), అంత్యాహారనాళము (Hindugut) వుంటాయి.

పూర్వాహార నాళము: దీనిలో నోరు, ఆన్యకూహరము, అవరవాహిక వుంటాయి.

నోరు యిరుకైన నిలుపు చీలికవలె వుంటుంది. నోరు ఆన్యకూహరము లోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఆన్యకూహరము దళసరి కుడ్యంతోను గుంపులుగా వున్న కండరాలతో వున్న పెద్ద కుహరము. దీనిలో ఆన్యకణ జాల ద్రవ్యము (Buccal mass) వుంటుంది (పటం 15.5 A). దీని పైకప్పు నుండి (Roof) దవడలు (Jaws) వేలాడుతూ వుంటాయి. దవడలు కండరాలతో వుంటాయి. దవడ వెనుక నున్న కుహర భాగము పెద్దదిగా వుంటుంది. ఆన్యకూహరానికి అడుగుభాగాన ఓడాంట్ ఫోర్ (Odontophore) అనే ఉబ్బెత్తు నిర్మాణముంటుంది. రాడ్యులా అను రిబ్బను వలె నున్న నిర్మాణము ఈ ఓడాంట్ ఫోర్ మీద వుంటుంది (పటం 15.5B). రాడ్యులా మీద అడ్డు వరుసలతో అనేక కొమ్ము దంతాలు వుంటాయి. రాడ్యులా పరభాగాన సంచి (Radular sac) వుంటుంది. దంతాలు రాడ్యులా నుంచి పుత్తుత్తి అవుతాయి. రాడ్యులాలోని దంతాలు అరిగిపోయినప్పుడు వెనువైపు ఆవిరళంగా పెరుగుతున్న రాడ్యులా ముందుకు నెట్టబడుతుంది.

ఆన్యకూహరము యిరుకైన పాదపుగా నున్న ఆహార వాహికలోనికి దారితీస్తుంది. ఆన్యకణజాల ద్రవ్యానికి (Buccal mass) రెండు వైపులా ఒక జత లాలా జల గ్రంథులు వుంటాయి. ఈ గ్రంథులు వాహికల ద్వారా ఆన్యకూహరములోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఆహార వాహికకు యిరువైపుల సంచుల వంటి నిర్మాణాలు రెండు వుంటాయి. వీటిని ఆహార వాహికా కోష్ఠాలు (Oesophageal pouches) అని అంటారు. ఇవి ఆహారాన్ని స్వల్ప కాలము వుంచు కోడానికి వుపయోగపడతాయి.



పటం 15.5 పైలా గ్లోబోసా A. అవ్యకణజాం (ద్రవ్యపు విలంబు కోత. B. రాడ్యులా విర్మాణము. 1. ఆస్య కుహరము 2. ఆహార వాహిక 3. రాడ్యులా 4. ఓ డాండ్ ఫిల్ 5. వోరు 6. దవడ 7. పిల్ రాడ్యులా అంగము 8. దళము 9. రాడ్యులా రిబ్బన్ 10. దంతముల వరుస.

మధ్యాహార నాళము (Midgut) : జీర్ణాశయము, పేగు వుంటాయి. ఆంతరాంగ సముదాయము ఎడమవైపు జీర్ణాశయము వుంటుంది. ఇది రెండు భాగాలను కలిగి వుంటుంది. ఒకటి ఆహార వాహికను అనుసరించి గోణికా కార పూర్వ జీర్ణాశయము (cardiac stomach). రెండవది పేగులోనికి తెరుచుకొను నాళము వంటి జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయము (Pyloric stomach). జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయము ఒక అంధ నాళముతో కలిసి వుంటుంది.

అంత్యాహారనాళము

ఆంతరాంగ సముదాయము మెలికలు తిరిగిన పేగు వుంటుంది. ఇది పురీష నాళముతో కలుస్తుంది. పురీష నాళము దళసరి కుడ్యాలతో మున్న గొట్టము వంటి నిర్మాణము. ఇది ప్రావార కుహరములోకి ప్రవేశించి పాయువు ద్వారా పూర్వభాగములో నోటికి కుడి వైపున వెలువలకు తెరుచుకుంటుంది.

15.5.2 జీర్ణగ్రంథులు

జీర్ణగ్రంథి అంతరాంగ సముదాయము వుంటుంది. ఇది గోధుమ వర్ణముతోగాని, బురద రంగుతో గాని వుంటుంది. ఇది రెండు లంబికలతో వుంటుంది. ఇందులో ఒకటి చిన్నది. ఇది జీర్ణాశయమును అంటిపెట్టుకొని వుంటుంది. రెండవలంబిక మెలికలు తిరిగిన కర్పరాగ్రము వరకు విస్తరించివుంటుంది. ప్రతి ఒక లంబికనుండి ఒక పెద్ద నాళము బయలుదేరి రెండూ కలిసి ఒక చక్కనాళాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ చక్క నాళము జీర్ణాశయము లోనికి తెరుచుకుంటుంది.

జీర్ణ క్రియా యంత్రాంగము: పైలా ఆహారము నీటిలోని మొక్కలు. వీటిని యిది దవడలచే ముక్కలు చేస్తుంది. ముక్కలు చేయటానికి దవడలు మందుకు వెనుకకు కదలికలు చేస్తాయి. ఆస్య కుహరములో లాలా జలము ఆహారాన్ని మిశ్రణము చేస్తుంది. పిండి పదార్థము జీర్ణింపబడి చక్కెరలుగా మారుతుంది. జీర్ణాశయములో జీర్ణ గ్రంథి స్రావకము ఆహారము మీద చర్య తీసుకుంటుంది. ఈ స్రావకము ఆహారములోని ఇతర పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తుంది. జీర్ణాశయ కుడ్యములోని రిసార్పిటివ్ కణాలు (Resorptive cells) అను ప్రత్యేకమైన కణాలు ఆహారములోని సెల్యులోజును జీర్ణిస్తాయి. ఈ విధంగా పైలాలో కణాంతర జీర్ణ క్రియ (intracellular digestion) కూడా జరుగుతుంది. జీర్ణింప బడిన ఆహారము ఎక్కువ భాగము జీర్ణగ్రంథిలో శోషణ చేయబడుతుంది. కొంతభాగము మాత్రమే పేగులో శోషణ జరుగుతుంది.

15.6 శ్వాస వ్యవస్థ

పైలా ఉభయచర జీవనము గడుపుతుంది. కాబట్టి దీనిలో జలశ్వాస క్రియ, వాయు శ్వాస క్రియ జరుపుటకు రెండు రకాల శ్వాస అవయవాలు వుంటాయి.

15.6.1 జలశ్వాస క్రియ

జంతువు నీటిలో ఉన్నప్పుడు కంకా భాగము ద్వారా జల శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. కంకా భాగము ప్రావార కుహరములో వుంటుంది. దీనికి పలుచని, త్రిభుజాకారములో నున్న పటలికలు (Filaments) ఒకే వరుసలో వుంటాయి. నీటిని లెమెల్లా (Lamella) అంటారు. ఈ విధంగా ఒక వరుసలో అమరి వున్న పటలికలతో వున్న కంకా భాగాన్ని మోన్ పెక్టినేట్ లేదా పెక్టినీ బ్రాంక్ అని అంటారు.

జల శ్వాసక్రియలో రెండు అవటు లంబికలు కాలవలుగా యేర్పడి నీటిని జల శ్వాస కక్ష్యలోనికి, అక్కడ నుంచి బయటకు పంపడానికి తోడ్పడతాయి. ఎడమ అవటు లంబికల ద్వారా నీటి ప్రవాహములోనికి ప్రవేశించగా కుడి అవటు లంబిక ద్వారా వెలుపలకు ప్రవహిస్తుంది. ఓన్ ఫ్రీడియన్ నీటి పరిశుభ్రతను పరీక్షిస్తుంది.

15.6.2 వాయుశ్వాస క్రియ

వాయు శ్వాసక్రియ జరుపునప్పుడు జీవి నీటి ఉపరితలము వైపునకు కదలుతుంది. ఎడమ అవటులంబిక సుమారు 20 మి. మీ నిడివిలో నున్న ఒక అంకుశ నాలికగా యేర్పడుతుంది. దీనిని శ్వాసాంకుశ నాలిక (Respiratory siphon) అని అంటారు. ఈ గొట్టము ద్వారా గాలి ప్రావార కుహరములోని పుష్పక కక్ష్యలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఎసి టీనియల్ రిడ్జి ప్రావారలంబిక వైపు నొక్కివుంటుంది. కాబట్టి గాలి పుష్పక కోశములోనికి (Pulmonary sac) ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ వాయువుల పరస్పర మార్పిడి జరుగుతుంది. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ తో నున్న గాలి బయటకు పంపబడుతుంది.

నేల మీద సంచరించు నప్పుడు పైలా శ్వాసక్రియను నేరుగా పుష్పక కోశముతో జరుపుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో శ్వాస గొట్టము యేర్పడదు. గాలి ఎడమ అవటు లంబిక ద్వారా లోనికి ప్రవేశిస్తుంది.

(గ్రీన్లు కాల సుప్తావస్థ జరుపునప్పుడు జీనిలో శ్వాసక్రియ చాలా తక్కువ స్థాయిలో జరుగుతుంది).

15.7 రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ

పైలాలో రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ కొంత క్లిష్టంగా వుంటుంది. దీనికి కారణము కంకా భాగము, పుష్పక కక్ష్యలుంటుంటే. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థలో గుండె, ధమనులు, సిరలు, కోటరాలు వుంటాయి (వటం 15.6).

హృదయావరణ పలుచని కోశము వంటి నిర్మాణము. ఇది అంతరాంగ సముదాయము ఎడమవైపు వుంటుంది. ఇది సీతోమ్ నుండి యేర్పడినది. మూత్రపిండాలతో యిది సంబంధము కలిగి వుంటుంది. గుండె రెండు గదులతో వుంటుంది. అవి ఒక కర్లిక, ఒక జతరిక. మహాధమని (Aortic trunk), జతరిక నుంచి యేర్పడి పూర్వభాగాన శిరసధమని (Cephalic aorta) గా, పరభాగాన అంతరాంగధమని (Visceral aorta) గా

విభజింపబడతాయి. శిరస్థధమనికి దిగువ భాగాన వున్న నిర్మాణము మహాధమని కంశిక (Aortic ampulla). దీనికి సంకోచించుకొనే శక్తి వుండి రక్తాన్ని ముందుకు వెట్టడానికి తోడ్పడుతుంది. గుండె, శిరస్థధమని, కంశిక పూర్వయావరణంలో యిమిడి వుంటాయి. ప్రావారానికి, ఆహార వాహికకు లాలజల గ్రంథులకు, మూత్ర పిండానికి, పాదానికి, జ్ఞానేంద్రియాలకు శిరస్థధమని రక్తాన్ని సరఫరాచేస్తుంది. అంతరాంగ ధమని రక్తాన్ని జీర్ణాశయానికి, పేగుకు బీజవాహికకు, పురీషవాహినికి సరఫరా చేస్తుంది.

వివిధ శరీర భాగాల నుండి రక్తము లిక్విణులను (Lacunae) చిన్న చిన్న స్థలాలలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇవి అన్ని చిక్కుమయి పెద్దకోటరాలుగా (Sinuses) యేర్పడుతాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో లిక్విణులు బాగా కనిపిస్తాయి. మూత్రపిండాలో యివి ధమనులను, పిరలను, కేశనాలికలను పోలివుంటాయి.

పైలా శరీరములో నాలుగు ముఖ్యకోటరాలు వుంటాయి. అవి:

- 1) పూర్వ-పరాంతరాంగ కోటరము (Anterior perivisceral sinus): ఇది ఆహార నాళము యొక్క పూర్వభాగాన్ని చుట్టి వుంటుంది.
- 2) పర్యాంత్ర కోటరము (Perintestinal sinus): ఇది అంతరాంగ ద్రవ్యములో మెలికలు తిరిగిన పేగు చుట్టూ వుంటుంది.
- 3) జలశ్వాస-వృక్క కోటరము (Branchio-renal sinus): పూర్వ వృక్క కక్షకు వెలుపల వుంటుంది.
- 4) పుష్పస కోటరము (Pulmonary sinus): ఇది పుష్పస కోశము యొక్క కుడ్యముతో సంబంధించి వుంటుంది.



రక్తప్రసరణమార్గము

శిరస్థ, అంతరాంగ ధమనుల శాఖల ద్వారా రక్తము శరీర వివిధ భాగాలకు పంపబడుతుంది. అవయవాలనుంచిను రక్తము మరలాపర్యాంతరాంగ కోటరము చేరుతుంది. పర్యాంతరాంగ కోటరమునుండి రక్తము జలశ్వాస వృక్కకోటరము లోనికి వెడుతుంది. శ్వాసక్రియ జరుపు విధానాన్నిబట్టి యిక్కడ నుండి రక్తము కంకాభాంగము-కర్ణికలోనికిగానీ లేదా పుష్పస కోశము-కర్ణికలోనికిగానీ చేరుతుంది. జలశ్వాసక్రియ జరుగునప్పుడు కంకాభాంగములోనికి వెడుతుంది. అదేవిధంగా పుష్పస శ్వాసక్రియ జరుగునప్పుడు రక్తము పుష్పస కోశములోనికి ప్రవేశిస్తుంది (పటం 15.7).

పర్యాంత్ర కోటరము నుండి రక్తము పూర్వ, పర వృక్కకక్షలలోనికి వెళుతుంది. మలిన పదార్థాలను విడదీసిన తర్వాత పరవృక్క కక్షనుండి రక్తము కర్ణికలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. పూర్వ వృక్క కక్షలోనికి ప్రవేశించిన రక్తము కంకా భాంగములోనికి ప్రవహించి అక్కడనుంచి కర్ణికను చేరుతుంది. ఈ విధంగా పైలాలో కర్ణికలోనికి శుద్ధ, మలిన రక్తాలు రెండూ చేరుతాయి.

15.8 విసర్జక వ్యవస్థ

వృక్క అవయవము లేదా మూత్రపిండము పైలాలో విసర్జక అవయవము. ఇది రెండు కక్షలను కలిగి వుంటుంది. i) చిన్నవి పూర్వ కక్ష (Anterior chamber). ii) పెద్ద పర కక్ష (Posterior chamber). ఇవి రెండూ ఒక రంధ్రము ద్వారా పరస్పర సంబంధము కలిగివుంటాయి. ఈ రంధ్రము కవాటముతో వుంటుంది. పూర్వ కక్ష పూర్వయావరణము ముందుగా వుంటుంది. ఎపిటేనియల్ రిడ్జికి సమీపంగా యిది ప్రావార కుపారములోనికి తెరుచుకుంటుంది. పూర్వ కక్షలోతరములో వ్రతదశముల వలెనున్న పటలికలు వుంటాయి.



పటం 15.6. పైలా గ్లాండ్స్. A. గుండె. 1. పుష్పస సిర 2. మహాధమనీ కలశిక 3. శిరస్థధమనీ 4. అపవాహి కంకాభాంగ సిర 5. అపవాహి వృక్కసిర 6. కర్లిక 7. జఠరిక 8. అంతరాంగ మహాధమనీ B. వృక్క అంగము 1. పరవృక్క కక్ష్య 2. పూర్వ వృక్క కక్ష్య.

పరవృక్కకక్ష్య పురీషనాళమునకు ఎడమవైపు వుంటుంది. దీని కుహరము వృక్క అంగము హృదయావరణ రంధ్రము ద్వారా హృదయావరణముతో సంబంధము కలిగి వుంటుంది. (పటం. 15.6B.).

పూర్వ, పర వృక్క కక్ష్యలు రెండింటిలో రక్తనాళాలు హెమ్యుసంఖ్యలో వుంటాయి. వ్రతజని సంబంధమైన మలిన పదార్థాలు వేరుచేయబడి ప్రావార కుహరములోనికి విడుదల అవుతాయి. విపర్ణక పదార్థములో ముఖ్యంగా అమ్మోనియా వుంటుంది. అమ్మోనియా సమ్మేళనాలు (Ammonium compounds) యూరియా, యూరిక్ ఆమ్లము కూడా వుంటాయి.

15.9 నాడీవ్యవస్థ


పైలా నాడీ వ్యవస్థలో జతలతో (Paired) మున్న ముస్తీష్కనాడీ సంధులు (Cerebral ganglia), పాదనాడీ సంధులు (Pleural ganglia), పుష్పసనాడీ సంధులు (Pleural ganglia), అంతరాంగనాడీ సంధులు (Visceral ganglia) వుంటాయి. ఇవిగాక జతలులేని (Unpaired) అధ్యాంత్ర నాడీసంధి (Supraintestinal ganglion), నిమ్నాంత్రనాడీ సంధి (Infraintestinal) వుంటాయి. సంధాయకాలు (commissures) సంయోజకాలు (Connectives) వీటితో సంబంధించి వుంటాయి (పటం. 15.8).

సమజాతి నాడీ సంధులను కలిపేవాటిని సంధాయకాలు అని, వేర్వేరురకాలనాడీ సంధులను కలిపేవాటిని సంయోజకాలని అంటారు.

అన్యకణజాలద్రవ్యానికి పూర్వంగా పృష్ఠపార్శ్వాలలో ఒక జత ముస్తీష్కనాడీ సంధులు వుంటాయి. ఈ రెండు నాడీ సంధులు ఒక దశసరి సంధాయకముచే కలిపి వుంటాయి. దీనిని ముస్తీష్క సంధాయకము (Cerebral Commissure) అని అంటారు. ముస్తీష్కనాడీ సంధి నుంచి నాడులు తలకు, అన్యకణజాల ద్రవ్యానికి, నేత్రాలకు, స్పర్శకాలకు, పంతులన కణాలకు సరఫరా అవుతాయి.

అన్యకణజాల ద్రవ్యానికి యిరువైపుల ఉదరంగా ఒక జత నాడీ సంధులు వుంటాయి. వీటిని

తెరుచుకుంటుంది. ప్రావారపు అంచునుండి మేహనము (Penis) అను సంపర్క అవయవము ఏర్పడుతుంది. ఇది మేహనపు తొడుగు (Penis sheath)లో ఇమిడి ఉంటుంది. మేహనపు తొడుగుకు ఆధారభాగంలో (Base of the Penis sheath) ఒక గ్రంథి నిర్మాణము ఉంటుంది. దీనిని హైపో బ్రాంకియల్ గ్రంథి అంటారు. దీనికి వాహికలేదు. అందువలన ప్రావక పదార్థాలును నేరుగా మేహనము, మేహనపు తొడుగు మీదికి పంపుతుంది.




పటం 15.10 పైలా గ్లోబోసా పురుష జననేంద్రియ వ్యవస్థ. A. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు. B. సంపర్క అవయవాలు. C. పురుష బీజ కణాలు. 1. ముష్కము 2. ఇరుకైన వాళికాకార శుక్రవాహిక 3. శుక్రాశయము 4. శుక్రవాహిక గ్రంథియుత భాగము 5. మేహనపు తొడుగు 6. మేహనము 7. యూరీ పైరీన్ శుక్రకణము 8. ఒలై గోపైరీన్ శుక్రకణము 9. నాలుగు శైలికలు.

పైలాలో శుక్రకణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. i) యూరీపైరీన్ శుక్రకణాలు ii) ఒలైగోపైరీన్ శుక్రకణాలు. యూరీపైరీన్ శుక్రకణాలు మాత్రమే గుడ్డును ఫలదీకరణ చేయుశక్తి కలిగివుంటాయి.

15.10.2 స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

స్త్రీ బీజ కోశము ముష్కమువలె జీర్ణ గ్రంథికి సమీపములో ఉంటుంది. (పటం 15.11) పిల్లజీవులలో నారింజపండు రంగులో ఉండి పరిణతి (Mature) చెందిన జంతువులలో నలుపు వర్ణంలో ఉంటుంది.

స్త్రీ బీజ కోశమునుండి



పటం 15.11. పైలా గ్లోబోసా. స్త్రీ జననేంద్రియ వ్యవస్థ A. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు B. గుడ్ల సమూహము 1. స్త్రీ బీజకోశము 2. స్త్రీ బీజవాహిక 3. శుక్రధానం 4. గర్భాశయం 5. యోని 6. స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రము.

స్త్రీ బీజవాహిక బయలుదేరి జీర్ణగంధీతో పాటు క్రింది వరకు విస్తరించి శుక్రదానం (Seminal receptacle)లోకి తెరుచుకుంటుంది. శుక్రదానం గర్భాశయంలో (Uterus) కి తెరుచుకుంటుంది. గర్భాశయం పసుపు (Yellow) వర్ణముతో ఉంటుంది. ఇది యోనితో కలుస్తుంది. యోని ప్రావార కుహరంలో పాయువుకు సమీపంగా తెరుచుకుంటుంది. స్త్రీ జీవిలో హైపోట్రాంకియల్ గంధీ బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు.

15.10.3 సంపర్కము(Copulation), అండ నిక్షేపణం (Oviposition)

నత్తలు వర్షాకాలములో ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతాయి. సంపర్కము మంచి వీటి సరస్సులలో కావి, బయట తేమ నేల ప్రాంతాలలో కావి జరుగుతుంది. సంపర్కము సుమారు మూడు గంటలు జరుగుతుంది. శుక్రకణాలు శుక్రదానంలోనికి సంపదతుతాయి. ఫలదీకరణ స్త్రీ జీవి శరీరములో జరుగుతుంది. సంపర్కము ముగిసిన స్వల్ప కాలములోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో గుడ్లను తేమ నేలలో, పరస్పలు, కొలనుల సమీపములో పెడతాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు 200 300 ఉంటాయి.

పిండాభివృద్ధి ముగిసిన తర్వాత పిల్ల జీవులు అండ పారల నుంచి బయటకు వస్తాయి. మంచివీటి జీవులలోను, వేలమీద నివసించు మలస్కా జీవులలోను. స్వేచ్ఛగా ఈదు ఢింభక జీవి ఉండదు. ఇతర గాస్ట్రో పాడ జీవుల పిండాభివృద్ధిలో రెండు ఢింభక దశలు వుంటాయి. మొదటి దశ ఢింభకము ట్రోకోఫోర్, ట్రోకోఫోర్ అభివృద్ధి చెంది వెలిజర్ గా రూపాంతరము చెందుతుంది. వెలిజర్ గాస్ట్రో పాడ జీవుల ప్రత్యేక ఢింభకము. ఇది మార్పు చెందిన ట్రోకోఫోర్ (Modified trochophore).

15.11 స్వపరిశీలనం

1. మలస్క విభాగాల జీవులన్నిటి కంటే గాస్ట్రోపాడ జీవులు అత్యంత విజయవంతంగా బ్రతుకుతున్న జీవులు. దీనికి కారణం వీటిలో అత్యధికం _____ గా జీవిస్తున్నాయి.
2. నత్త తలవెనక ఉండే శరీరం 180 డిగ్రీలు అవసర్యంగా మెలితిరిగే ప్రక్రియను _____ అనిపిలుస్తారు. దీనివల్ల శరీర ద్విపార్శ్వ పౌష్ట్యం మారి పౌష్ట్య రహితమవుతుంది.
3. అన్యకణ జాల ద్రవ్యంలో ఉండే ఆహారాన్ని నమలడానికి పనికివచ్చే అవయవాన్ని _____ అంటారు.
4. ఇతర గాస్ట్రోపాడ్ జీవుల మాదిరిగా అభివృద్ధి దశలో స్వేచ్ఛగా ఈదే _____ ఢింభకం నత్తలో ఏర్పడదు. దీనికి అతిరిక్తంగా గుడ్లు పొదిగి చిన్న నత్తలు వెలువడుతాయి.

15.12 సారాంశం

1. వైలా గ్లోబోసా సామాన్య ఆపిల్ నత్త
2. గాస్ట్రోపాడ కర్పర విర్మాణాన్ని, జీవి బాహ్య లక్షణాలను వివరణలో తెలుసుకోవచ్చు.
3. ప్రాకార కుహరములో వున్న అవయవాలు కంకాభాంగము, పురీషనాళము, జననేంద్రియ నాళము, ఎపిటినియల్ రిడ్జ్ మొదలైనవి.
4. జీర్ణ గ్రంథులలో కూడిన జీర్ణ అవయవాలు వివరించటము జరిగినది.
5. వైలాలో జలశ్వాసక్రియ, పుష్పన శ్వాసక్రియ రెండు జరుగుతాయి. అందువలన ఇది ఉభయచర జీవము గడుపుతుంది.

6. రెండు రకాల శ్వాసక్రియలు పుష్పందున రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కూడ బాగా అభివృద్ధి చెందివుంటుంది.
7. విసర్జన క్రియ వృక్క అవయవాల ద్వారా జరుగుతుంది.
8. నాడీ వ్యవస్థలో అనేకమైన ద్వంద్వ నాడీ సంధులు (Paired ganglia) వుంటాయి. వీటిని కలుపుతూ సంయోజకాలు, సంధాయకాలు వుంటాయి.
9. జ్ఞానేంద్రియాలు నేత్రాలు, సంతులన కోశము, ఓన్ ఫీడియము వీటి పరిశుభ్రతను పరీక్షించటానికి పుష్పయోగపడుతుంది.
10. ఏక లింగ జీవులు, ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది.
11. అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. వెలిజర్ అను డింభక జీవులు వుంటాయి.

15.13 స్వపరిశీలనం/జవాబులు

1. ఉభయ జీవులు
2. టార్నెల్
3. రాడ్యూలా
4. వెలిజర్

15.14 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రిందివానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు వాయండి.
 1. పైలా జీర్ణ వ్యవస్థను వివరించి, జీర్ణ క్రియా విధానమును తెలుపండి.
 2. ఆపిల్ వత్త రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను వివరించండి.
 3. పైలా గ్లోబోసా ఉభయచర జీవి. వీటిలోను, భూమి మీద జీవించుటకు దీని శ్వాస వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉన్నదో చర్చించుము?
 4. పైలా నాడీ వ్యవస్థను వివరింపుము.
 5. పైలా ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను వివరించి, దాని అభివృద్ధి గురించి తెలపండి.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. పైలా గ్లోబోసా కర్పరమును వివరింపుము.
 2. పైలా విసర్జక వ్యవస్థ గురించి తెల్పుము.

భాగము - 14 మలస్కా - సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

14. 1 ఉద్దేశ్యము
14. 2 ఉపోద్ఘాతం
14. 3 సామాన్య లక్షణాలు
14. 4 వర్గీకరణ
 - 14.4.1 విభాగము - మోనోప్లాకోఫోర
 - 14.4.2 విభాగము - ఆంఫిన్యూరా
 - 14.4.3 విభాగము - స్కాఫోపాడ
 - 14.4.4 విభాగము - గాస్ట్రోపాడ
 - 14.4.5 విభాగము - టైవార్మియా
- 14.4.6 విభాగము - సిఫాలోపాడ
14. 5 స్వపరిశీలనం
14. 6 సారాంశం
14. 7 స్వపరిశీలనం జవాబులు
14. 8 నమూనా ప్రశ్నలు

14.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠములో మలస్కా వర్గములోని వివిధ సముదాయాల సాధారణ లక్షణాలను వివరిస్తుంది. ఇది చదివిన తరువాత నీవు ఈ కర్పరధారులైన నమూనా మౌలికంగా ఒకే నమూనాపై నిర్మితమయినాయని బోధపరచగలుగుతావు.

14.2 ఉపోద్ఘాతం

మలస్కా అను పేరును ప్రపథముగా అరిస్టాటిల్ (క్రీ.పూ 350) ప్రవేశపెట్టినారు. తరువాత 1883లో లంకాస్టర్ ఈ పేరును స్థిరపరచినారు. ఈ మృదు శరీర నిర్మాణ జీవులు (Mollis = మెత్తని) సంఖ్యలో అకశేరుక జీవులలో ఆర్థోపాడ వర్గము తర్వాత ద్వితీయ స్థానమును పొందినది. సుమారు ఒక లక్ష జీవించివున్న జాతులను వివరించటము జరిగింది. ఇవిగాక యిందుమించు 35,000 జాతుల విలుప్త జీవుల (Extint animals) ను కనుగొనడం జరిగింది. మలస్కా జీవులు ఎక్కువగా సాగర జీవులు, కొన్ని మంచి నీటిలోను, మరికొన్ని భూమి మీద నివసించే జీవులు వున్నాయి. నల్లలు, అల్పిష్టలు, అయిష్టర్లు, ముత్యపు చిప్పలు, కొనుటి సందులు, స్క్విడ్లు, నాటిలస్లు మొదలైన జంతువులన్ని ఈ వర్గములోని జీవులే.

14.3 సామాన్య లక్షణాలు

1. మలస్కన్ల శరీరము ఖండిత రహితంగా, ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవముతో ఉంటుంది. గాస్త్రో పాదవంటి మలస్కన్లలో ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవము ద్వితీయంగా పోగొట్టుకొని సౌష్ఠవరహితంగా (Asymmetrical) ఉంటాయి.
2. మలస్కన్ల శరీరము మృదువుగా ఉండి కర్పరముతో ఉంటుంది.
3. వీటి శరీరము వదులుగా నున్న ప్రావారములో ఇమిడి ఉంటుంది. ప్రావారము, శరీరము మధ్యనున్న ఖాళీ స్థలమును ప్రావార కుహరమని అంటారు.
4. కర్పరాన్ని ప్రావారము ప్రవిస్తుంది. కర్పరము బాహ్యంగా కానీ, లోపలివైపుకానీ ఉంటుంది. అరుదుగా కర్పరము లోపిస్తుంది.
5. శరీరము, తల, పాదము అంతరాంగ ద్రవ్యముగా విభజన చెంది ఉంటుంది. తల స్పష్టంగా ఉండి నోరు, స్పర్శకాలు, నేత్రాలు ఉంటాయి.
6. కొన్ని జంతువులలో ఉదర శరీర కుడ్యము (Ventral body wall) కండరయుతంగా, బల్లపరువుగా, గొడ్డలి ఆకారములో నున్న పాదముగా రూపాంతరము చెంది యుంటుంది. ఇది ప్రాకడానికి, బొరియులు చేయడానికి ఈదడానికి అనువుగా వివిధ జీవులలో మార్పు చెంది ఉంటాయి.
7. అంతరాంగ ద్రవ్యములో జీర్ణ, విసర్జన, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉంటాయి.
8. శరీర కుహరము, రక్త కుహరము, సీలోము క్షీణించి హృదయావరణ కుహరానికి, పృక్క అవయవము, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలకు మూత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది.
9. జీర్ణ వ్యవస్థలో లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి. ఎక్కువ జీవులలో ఆస్య కుహరములో నికషణ అవయవము (Rasping organ) ఉంటుంది.
10. శ్వాసక్రియ మొప్పలు లేదా కంకా భాగము లేక పుప్పన కనళము ద్వారా జరుగుతుంది. తరచుగా ప్రావారంబిక, బాహ్య చర్మము శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి.
11. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో పృష్ఠంగా ఒకటి లేక రెండు కణికలు ఒక జతరికతో నున్న గుండె హృదయావరణ కుహరంలో ఉంటుంది.
12. విసర్జన క్రియ మూత్ర పిండాల ద్వారా జరుగుతుంది. వీటిని వృక్కాలని కూడ అంటారు. ఇవి హృదయావరణ కుహరములోనికి తెరచుకుంటాయి. అక్కడ నుండి వెలుపలకు పృక్క రంధ్రాల ద్వారా తెరచుకుంటాయి.
13. వాడీ వ్యవస్థలో జతలుగా ఉన్న మస్తిష్క, పుష్ప, పాద, అంతరాంగ వాడీసంధులు వాటిని కలుపుతూ సంయోజకాలు, సంధాయకాలు ఉంటాయి.
14. జ్ఞానేంద్రియాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. నేత్రాలు, స్పర్శకాలు, ఓవ్ ఫ్రేడియన్లు కొన్ని జ్ఞాన నిర్మాణాలు.
15. ఎక్కువ జీవులలో లింగ భేదము ఉంటుంది (Dioecious) కొన్ని ఉభయ లింగ జీవులు (Monoecious) ఫలదీకరణ లోపలివైపు గాని, బాహ్యంగా కాని జరుగుతుంది.
16. మలస్కా జీవులు సాధారణంగా అండోత్పాదకాలు. కొన్ని శిశూత్పాదకాలు (వివిపేర, పైలా వంటి వత్తలు). అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా కాని, అప్రత్యక్షంగా కాని జరుగుతుంది. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగునప్పుడు రూప విక్రీయ ఉంటుంది. ట్రోకోఫర్, వెలిజర్, గ్లోకీడియన్ వంటి వివిధ దింభకాలు ఉంటాయి.

మలస్కా వర్గము ఈ క్రింది ఆరు విభాగాలుగా విభజింపబడినది. మార్బన్, యంగ్ (1964)ను ఆధారంగా తీసుకొని మార్బల్, విల్లియమ్స్ (1979) సవరించిన వర్గీకరణను ఇక్కడ అనుసరించడమైనది.

9. పిండాభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛా జీవనము గడుపు ట్రోకోఫోర్ వెలిజర్ గా వృద్ధి పొందుతుంది. ఇది ప్రాథమికంగా రూప విక్రమ చెందుతుంది.

ఉదా: డెంటేలియమ్ (ఏనుగుదంత కర్పరము) (పటం 14 డి)

14.4.4 గాస్ట్రోపాడ

1. ఈ విభాగములో నత్తలు, స్లగ్స్, లింపెట్లు మొదలైనవి ఉన్నవి.
2. మలస్కాలన్నింటిలోకి గాస్ట్రోపాడ పెద్ద సముదాయము. సుమారు 40,000 జీవించియున్న జాతులను వివరించారు. ఇవి కాకుండా 15,000 వరకు విలుస్త జీవులను కనుగొన్నారు.
3. వీటి విస్తరణ చాల వైవిధ్యముతో ఉంటుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇవి సాగర జీవులు, కొన్ని మంచినీటి వనరులలో నివసించేవి. మరికొన్ని భూరర జీవులు. కాని నత్తవంటి గాస్ట్రోపాడ ఉభయచరాలు (Amphibious)
4. సమూహ గాస్ట్రోపాడ కర్పరము మెలికలు తిరిగిన ఏకకవాల కర్పరము (Spirally coiled, single shelled).
5. శరీరము టార్షన్ (Torsion) అను క్రియ వలన ఇండిత రహితంగాను, పాష్టవరహితంగాను (Asymmetrical) ఉంటుంది.
6. అంతరంగ ద్రవ్యము కూడా మెలికలు తిరిగి ఉంటుంది.
7. పాదము ఉదరంగా, వెడల్పుగా, కండర యుతంగా ఉండి ప్రాకుటకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది. (Creeping sole). పాదమునకు పృష్టంగా ఉపరికల (Operculum) ఉంటుంది. ఇది కర్పర ముఖ ద్వారమునకు (Mouth of the Shell) మూతగా పనిచేస్తుంది. తల, పాదమును కర్పరములోనికి లాగుకొను శక్తిని ఈ జీవి కలిగి ఉంటుంది.
8. కర్పర ఆకారాన్ని బట్టి ప్రావర కుహరము మార్పు చెంది ఉంటుంది. ప్రావర కుహరములో అనేక అవయవాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిని సమూహంగా ప్రావర అవయవాలు (Pallial Complex) అంటారు.
9. ఆన్యకుహరములో ఓడంట్‌ఫోర్ వుండి దీనికి సంబంధించిన రాద్యులా దానిమీద అడ్డు వరుసలలో దంతాలు ఉంటాయి.
10. జీర్ణ వ్యవస్థ, పాదపుగా మెలికలు తిరిగి పేగుతో ఉంటుంది. పురీష వాళము పేగుకు సమాంతరంగా (Parallel) ఉంటుంది. పూర్వభాగములో నోటికి కుడివైపున పాయువు బయటకు తెరుచుకుంటుంది.
11. శ్వాసక్రియ మొప్పలు లేదా కంకా భాగముల ద్వారా జరుగుతుంది. ఉభయచర గాస్ట్రోపాడ జీవులలో మొప్పలతోబాటు పుపుస గోలులుంటాయి.
12. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ వివృత (Open type) విధానంలో ఉంటుంది. గుండె హృదయావరణముతో కప్పబడి ఉంటుంది. రక్తములో హేమోసయనిన్ (Haemocyanin) అను శ్వాస వర్ణకము ఉంటుంది.
13. విసర్జన క్రియ వృక్క కక్షల (Renal chambers) ద్వారా జరుగును.
14. వాడీ వ్యవస్థలో స్పష్టమైన మస్తీష్క, పుపుస వాడీ సంధులు ఉంటాయి. సంయోజకాలు, సంధాయకాలు వివిధ వాడీ సంధులను కలుపుతూ ఉంటాయి.
15. జ్ఞానేంద్రియాలు బాగుగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. నేత్రాలు ఒక జత వృంతాలతో ఉంటాయి. సంతులన కోశాలు సమతా స్థితిలో (Equilibrium) ఉండు అవయవాలు. ఓన్ ఫ్రేడియమ్ నీటి పరిశుభ్రతను పరీక్షించు రసాయన గ్రాహకావయవము.

16. ఇవి ఏక లింగ జీవులు. కొన్ని ఉభయ లింగ జీవులు.
17. అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. డింభక దశలలో ట్రోకోఫోర్, వెలిజర్ ఉంటాయి. వెలిజర్ డింభకము రూపాంతరము చెందిన ట్రోకోఫోర్ డింభకము.
18. మంచినీటిలో నివసించు కొన్ని గాస్త్రోపాడ జీవులు గ్రీష్మకాల మస్తావస్థలో ఉండి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి రక్షించు కుంటుంది. ఇవి నేలలో బొరియలు చేసుకుని మస్తావస్థ కాలాన్ని గడుపుతాయి.

ఉదా: పైలా (ఆపిల్ నత్త పటం 14.1)

పటెల్లా (పటం 14.1 ఇ), అప్లేసియా (సముద్ర కుందేలు) (పటం 14.1 ఎఫ్)

సిపియా (పటం 14.1 జి.)

14.4.5 విభాగము బైవాల్వియా

1. బైవాల్వియా విభాగాన్ని పెరిపి పాడ, లామెల్లి బ్రాంకియేటా అవి కూడ అంటారు.
2. మలస్కా వర్గ జీవులలో ఇది జీవుల సంఖ్యలో రెండవది. ఇందులో క్లాములు, అల్చిప్సలు, ఆయిస్టర్లు మొదలైన జీవులను చేర్చినారు. ఇవి ఎక్కువ అర్థిక ప్రాముఖ్యతను (Economic importance) కలిగి ఉన్న జీవులు.
3. శరీరము ద్విపార్శ్వ పౌష్టవాన్ని కలిగి పార్శ్వాల అణచబడి రెండు పార్శ్వ కవాటాలతో ఉంటుంది.
4. ఇవి పృష్ఠ భాగంలో మడత బందువలె (Hinge like) అమరి ఉండి ఉదర భాగములో స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది.
5. ప్రావారము విస్తారముగ ఉంటే కవాటాలను అనుసరించి పార్శ్వంగా రెండు లంబికలతో ఉంటుంది.
6. తల లోపించి ఉంటుంది. గ్రనవి, దవడలు, రాద్యులా, స్పర్శకాలు ఉండవు.
7. పాదము, ఉదరంగా కండరయుతంగా ఉండి గొడ్డలి అకారము లేదా నాగటికర్ర (Plough share) వలె ఉంటుంది. ఇది బొరియలు చేయటానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. స్థాన బద్ధ జీవులలో పాదము లోపించి ఉంటుంది. అనేక జీవులు ఇసుకలో కాని, బురద మట్టిలోకాని, బొరియలు చేసుకొని నివసించేవి. కొన్ని రాళ్ళలో, చెక్కలలో బొరియలు చేసుకొని నివసిస్తాయి. కొన్ని బైసస్ ట్రెడ్స్ (Byssusthreads) ద్వారా, మరికొన్ని సిమెంటు ద్వారా రాళ్ళకు అతికి ఉంటాయి. కొన్ని ఈదగలవు.
8. పృష్ఠంగానున్న హృదయావరణకు మూత్రమే సీరోమ్ పరిమితమై ఉంటుంది.
9. జీర్ణనాళము కొంత మెలికలు తిరిగిన నాళముతో ఉండి ద్వంద్వ జీర్ణ గ్రంథులను కలిగి ఉంటుంది.
10. మొవ్వులు లేదా కంకా భాగాలు పత్రస్థువలె (Leaf like) ఉన్నందున ఈ విభాగాన్ని లామెల్లి బ్రాంకియేటా అవి కూడా అంటారు.
11. గుండె హృదయావరణలో ఉంటుంది. దీనిలో రెండు కర్ణికలు ఒక జతరీతి ఉంటాయి.
12. విసర్జక అవయవాలు ఒక జత వృక్కాలు లేదా మూత్ర పిండాలు. పీటిని బొజానస్ అవయవాలు (Organs of Bojanus) అవి కూడ అంటారు. కొన్ని బైవాల్వియాలలో కీబర్ అవయవము (Keber's organ) లేదా హృదయావరణ గ్రంథి (Pericardial gland) కూడా విసర్జక క్రియతో పాల్గొంటుంది.
13. నాడీ వ్యవస్థ నాలుగు జతల నాడీ సంధులతో ఉంటుంది. అవి మస్టిష్క, పుపుస, పాద, అంతరాంగ నాడీ సంధులు. సాధారణంగా మస్టిష్క పుపుస నాడీ సంధులు ఒక్కొక్కవైపు కలసిపోయి మస్టిష్క, పుపుస నాడీ సంధులను ఏర్పరుస్తారు.
14. జ్ఞానేంద్రియాలు సంతులన కోశము, ఓన్ ఫ్రేడియమ్లు, నేత్రాలు ఉండవు.

10. వృక్క అవయవాలు నాలుగు ఉంటాయి. ఇవి హృదయావరణ కుహరములో ఉంటాయి. ఇవి ఈ కుహరములో కలసి ఉండవు.
11. నాడీ వ్యవస్థ బాగుగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నాడీ సంధులు ఆహార వాహిక చుట్టూ ఉంటాయి.
12. నేత్రాలు బాగా అభివృద్ధి చెందిఉండి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. బాహ్యంగా ఇవి సకళేరుకాల కంటిని పోలి ఉంటాయి. సంతులన కోశాలు సమతాస్థితి అవయవాలు ఒక జత ఓన్ ఫ్రేడియమ్లు ఉంటాయి. ఆఘాత జలాలలో (Deep Sea) ఉన్న సిఫాలోపాడ జీవులు స్వయం ప్రకాశ లక్షణంలో (Bioluminescence) ఉంటాయి.
13. ఇవి ఏక లింగ జీవులు. కొన్ని సిఫాలో పాడ జీవులలో లైంగిక ద్విరూపకత (Sexual dimorphism) ఉంటుంది. పురుష జీవులలో ఒక భుజమును హైక్టోకాటిలైజాడు భుజము అంటారు. ఇది శుక్ర కణాలను స్త్రీ జీవిలోనికి పంపడానికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది.
14. అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. రూప విక్రమ ఉండదు. కొన్ని సిఫాలో పాడ జీవులలో మషీరసగ్రంథి (Ink gland) ఉంటుంది. ఇవి శత్రువులనుండి రక్షించు కొనడానికి నీలి పాగ తెరను (Smoke screen) ఏర్పరుస్తాయి.

(భుజాలు స్పర్శకాలు రూపాంతరము చెందిన పూర్వపాద భాగము (Anterior region) అను ప్రథమ భావనను (Previous concept) మార్చి, విల్లియమ్లు తప్పు అని సూచన చేసినారు. భుజాలు, స్పర్శకాలు (Arms and Tentacles) విజమైన శిరస్త నిర్మాణాలని వారి అభిప్రాయము. అందువలన ఈ విభాగానికి సిఫాలోపాడ అనునది తప్పు పేరు (Misnomer) అని కూడ వారు భావిస్తున్నారు.)

ఉదా: సిపియా కటిల్ ఫిష్ (కోమటి వంతులు) (పటం 14.3 ఎ) లాలిగో-స్క్విడ్ (పటం 14.3 బి.)

ఆర్కియూఫీన్ ఇది పెద్ద స్క్విడ్. పొడవు 16 మీ. ఉంటుంది. శరీర భాగము 6 మీ. కాగా స్పర్శకాలు 16 మీ. పొడవు ఉంటుంది.

ఆక్టోపస్ (పటం 14.3 సి.) డెవిల్ ఫిష్, శరీరం గుండ్రంగా ఉండి పెద్ద మొండెము వంటి నిర్మాణంతో ఉంటుంది. దీనికి ఎనిమిది భుజాలు ఉంటాయి. వీటి ఆధార భాగము అంగుళ్యజాలముతో (Webbed) ఉంటుంది.

నాటిలస్ (పటం 14.3 డి) సాధారణంగా దీనిని ముత్యపు నాటిలస్ అంటారు. కర్పరము మెలితిరిగి ఉండి అనేక కక్ష్యలతో ఉంటుంది. అన్నిటికన్న బాహ్యంగా, పెద్దదిగా ఉన్న కక్ష్యలో జీవి ఇమిడి ఉంటుంది. భుజాలు చూషకాలు ఉండవు.

14.5 స్వపరిశీలన

1. అంతరాంగ సముదాయం మెలిక తిరిగినందువల్ల టార్సస్ అనే ప్రక్రియ జరుగునట్టి విశిష్ట లక్షణం విభాగంలోని జీవులది.
2. _____ జీవుల తల పరిమాణం వాలాక్షీణించింది.
3. కటల్ చేపలలో అంతర కర్పరం పెరుగుతుంది. ఇవి _____ విభాగానికి చెందిన జీవులు.

14.6 సారాంశం

1. వర్గ సాధారణ లక్షణాల వివరణ
2. ఈ వర్గము ఆరు విభాగాలుగా విభజింపబడినది.
3. నియోప్రైరినా అను నజీవ శిలాజలము (Living fossil) మోనోప్లాకోఫర విభాగము లోని ఉదాహరణ.
4. స్కాఫోపాడ జీవులు దంతపు కర్చర జీవులు.
5. గాస్ట్రోపాడ విభాగము ఏక కవాట జీవులు. వీటిలో కర్చరము మెలిక తిరిగి ఉంటుంది. ద్వితీయంగా ఇవి సాష్టవరహితంగా ఉంటాయి.
6. బైవాల్యూయా జీవులు సార్వాలు అణిగిఉన్న ద్వికవాట జీవులు.
7. మలస్కావర్గ జీవులన్నింటిలోకి అభివృద్ధి చెందిన జీవులు సిఫాలోపాడ విభాగానికి చెందినవి. వీటిలో పాడవైన పురుగుకాలు, వాటిమీద చూషకాలు ఉంటాయి.
8. అతి పెద్ద పరిమాణములో నున్న అకశేరుకాలు ఈ వర్గములో ఉన్నాయి.

14.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. గాస్ట్రోపాడ
2. బైవాల్యూయా
3. సిఫాలోపాడ

14.8 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.


1. వర్గము మలస్కా సాధారణ లక్షణాలను వివరించండి.
2. గాస్ట్రోపాడ విభాగము సామాన్య లక్షణాలను తెల్పి, ఉదాహరణలిమ్ము.
3. బైవాల్యూయా విభాగ లక్షణాలను తెల్పి, అతి ఏవిధంగా గాస్ట్రోపాడ విభాగానికి భిన్నంగా ఉందో వివరించండి.

II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయండి.

1. మలస్కా వర్గము ఎన్ని విభాగాలుగా విభజింపబడినది? అవి ఏవి? కొన్ని ఉదాహరణలను ఇవ్వండి.
2. మోనోప్లాకోఫర విభాగము గురించి తెలపండి.
3. స్కాఫోపాడ విభాగపు సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.

15.9.1 జ్ఞానేంద్రియాలు

పైలాలలో జ్ఞానేంద్రియాలు ఒక జత నేత్రాలు, ఒక జత సంతులన కోశాలు, రెండు జతల స్పర్శకాలు, ఓన్ ఫేడియమ్లు.



పటం 15.9 పైలా గ్లోబోసా A. సంతులన కోశము. B. ఓన్ ఫేడియమ్.

1. గుళిక 2. నాడి 3. సంతులన కణములు 4. పార్శ్వ సూక్ష్మ తంతువులు 5. కేంద్ర అక్షము 6. ప్రావారపు మదత.

నేత్రాలు కాంతి తీవ్రతను గుర్తించటానికి మూత్రమే ఉపయోగంగా ఉంటాయి. సంతులన కోశము పాదనాడి సంధులకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి బహిష్టచము నుంచి ఏర్పడిన సంచివంటి నిర్మాణము (పటం 15.9 A). ద్రవసదార్థముతో నిండి వుండి స్టాటోలిథ్ లను కాలేక్రియన్ రవ్వలను కలిగి ఉంటుంది. సంతులన కోశాలు సమతాస్థితి అవయవాలు (Organs of equilibrium). స్పర్శకాలు స్పర్శాంగాలుగా పనిచేస్తాయి. ఓన్ ఫేడియమ్ జీవికి ఎడమ వైపు ప్రావారలంబిక అంచున ఉంటుంది. ఇది ప్రావార కుహరములోనికి నీరు ప్రవేశించు మార్గములో ఉంటుంది. ఇది అందాకారముగ వుండి మధ్య అక్షము, ఇరువైపుల వరుసలలో పత్రకాల (Leaflets) వంటి నిర్మాణాలుంటాయి (పటం 15.9 B). పత్రకాలలో ఉపకళ కణాలు ఉంటాయి. వీటిలో కొన్ని జ్ఞాన కణాలు. కొన్ని శైలికామయ కణాలు, మరికొన్ని గ్రంథి కణాలు. ప్రావార కుహరములోనికి శ్వాస క్రియ జరుగుటకు ప్రవేశించు నీటి శుభ్రతను పరిశీలించుటకు ఓన్ ఫేడియం ఉపయోగంగా ఉంటుంది. నీరు మలినముతో కూడి శ్వాసక్రియకు ఉపయోగంగా లేని ఎడం జీవి ఆ నీటిని తప్పకొని మరొక ప్రాంతానికి వెళుతుంది.


15.10 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

పైలా ఏకలింగ జీవి. స్త్రీ జీవి, పురుష జీవికన్నా పెద్దదిగ ఉంటుంది.

15.10.1 పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

పురుష జీవిలో ముష్కము తేలికపాటి పసుపు వర్ణముతో (Cream-coloured) ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ గ్రంథిని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది. ముష్కము నుండి అనేక సూక్ష్మ నాళికలు (Vasa efferentia) బయలుదేరుతాయి. ఇవన్నీ ఐక్యమయి శుక్రాహికను (Vas deferens) ఏర్పరుస్తాయి. శుక్రవాహిక మూడు భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. i) ప్రారంభములో పల్పిని కుడ్యముతో సున్న నాళికా భాగము ii) మధ్యలో ఉబ్బి, వంకర తిరిగిన శుక్రా శయమను (Seminal Vesicle) భాగము, iii) పురీషనాళమునకు ఎడమ ప్రక్కన ఉన్న చివరి గ్రంథియుత భాగము. ఇది ప్రావారకుహరంలో పాయువుకు పమిపంగా బయటకు

తెరుచుకుంటుంది. ప్రావారపు అంచునుండి మేహనము (Penis) అను సంపర్క అవయవము విర్బడుతుంది. ఇది మేహనపు తొడుగు (Penis sheath)లో ఇమిడి ఉంటుంది. మేహనపు తొడుగుకు ఆధారభాగంలో (Base of the Penis sheath) ఒక గ్రంథి నిర్మాణము ఉంటుంది. దీనిని హైపో బ్రాంకియల్ గ్రంథి అంటారు. దీనికి వాహికలేదు. అందువలన ప్రావక పదార్థాలును నేరుగా మేహనము, మేహనపు తొడుగు మీదికి వస్తుంది.




పటం 15.10 పైలా గ్లోబోసా పురుష జననేంద్రియ వ్యవస్థ. A. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు. B. సంపర్క అవయవాలు. C. పురుష బీజ కణాలు. 1. ముష్కము 2. ఇరుకైన నాళికాకార శుక్రవాహిక 3. శుక్రాశయము 4. శుక్రవాహిక గ్రంథియుత భాగము 5. మేహనపు తొడుగు 6. మేహనము 7. యూరీ పైరీస్ శుక్రకణము 8. ఒలై గోపైరీస్ శుక్రకణము 9. నాలుగు తైలికలు.

పైలాలో శుక్రకణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. i) యూరీ పైరీస్ శుక్రకణాలు ii) ఒలై గోపైరీస్ శుక్రకణాలు. యూరీ పైరీస్ శుక్రకణాలు మాత్రమే గుడ్డును ఫలదీకరణ చేయుశక్తి కలిగివుంటాయి.

15.10.2 స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

స్త్రీ బీజ కోశము ముష్కమువలె జీర్ణ గ్రంథికి సమీపములో ఉంటుంది. (పటం 15.11) పిల్లజీవులలో నారింజపండు రంగులో ఉండి పరిణతి (Mature) చెందిన జంతువులలో నలుపు వర్ణంతో ఉంటుంది.

స్త్రీ బీజ కోశమునుండి



పటం 15.11 పైలా గ్లోబోసా. స్త్రీ జననేంద్రియ వ్యవస్థ A. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు B. గుడ్డ పమూహము 1. స్త్రీ బీజకోశము 2. స్త్రీ బీజవాహిక 3. శుక్రధానం 4. గర్భాశయం 5. యోని 6. స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రము.

భాగము — 16 మలస్కా జీవుల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యం

విషయక్రమము

16. 1 ఉద్దేశ్యము
16. 2 ఉపోద్ఘాతము
16. 3 ఆహారంగా మలస్కా జీవులు
 - 16.3.1 గాఢోపాద
 - 16.3.2 ద్వీపాట జీవులు
 - 16.3.3 సెఫెలోపాద
 - 16.3.4 సాగర జీవులకు ఆహారంగా మలస్కా జీవులు
16. 4 ఔషధాలకు ఉపయోగము
16. 5 అలంకారవస్తువులు, ఆభరణాలు
16. 6 సున్నము తయారీ
16. 7 ఇతర ఉపయోగాలు
16. 8 పోషకాంశ మలస్కా జీవులు
16. 9 ముత్యపు ఆల్బిన్లు
- 16.10 ముత్యపు సాగుపద్ధతి
- 16.11 స్వపరిశీలనం
- 16.12 సారాంశం
- 16.13 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 16.14 నమూనా ప్రశ్నలు
- 16.15 పదకోశం

16.1 ఉద్దేశ్యము

మలస్కా జీవులు మానవుని ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుచేయుటానికి అనేక ఉపయోగకర వస్తువులను అందజేస్తాయని తెలుసుకోవడానికి ఈ పాఠము దోహదము చేస్తుంది.

16.2 ఉపోద్ఘాతము

భారత దేశములో మలస్కా జీవులు అనేక వేల సంఖ్యలో వున్నాయి. ఇవి సాగర జలాలలో, బ్రాకిష్ నీటిలో, నుంచి నీటిలో మరియు భూమి మీద విస్తరించినవి. నీటిలో కొన్ని ఆర్థిక ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి వుంటాయి. నీటివి ఆహారంగాను, ముత్యముల కొరకు కర్పరాలతో వివిధ వస్తువులు తయారు చేయటానికి ఉపయోగిస్తారు.

16.3 ఆహారంగా మలస్కా జీవులు

తినటానికి ఉపయోగించు గాస్త్రో పాదజీవులలో లింపెట్టు భారత దేశపు తూర్పు తీర ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పేకరిస్తారు. వీటిలో సాధారణంగా లభించు జాతి పెల్లేనా రేడియేటా. చెవి కర్పరము (Haliotis) (పటం 16.1.A) మాంసమును ఆహారంగా చాలా మంది తీసుకుంటారు. ఇది వేలాంచల ప్రాంతంలో (Lowtide level) రాళ్లకు అంటి పెట్టుకొని జీవనము గడుపుతాయి. వీటి నిడివి అరుదుగా 38 మి.మీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది.

16.3.1 గాస్త్రోపాద

బొంగరపు కర్పరము (Top shells of Trochidae) జాతికి చెందిన గాస్త్రో పాదలో ట్రోకస్ నీలోటికస్, ట్రో పెల్లేటస్ మాంసమును దక్షిణ భారత దేశంలో ఎక్కువగా తింటారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో బర్బను కర్పరము, టర్బో బ్రున్నియన్, ట.మార్మో రేటస్ (పటం 16.1 B)లను ఎంచుకొంటారు. బొంబాయి తీర ప్రాంతాలలో బటను కర్పరాలను (Button shells) అంబోనియమ్ వెస్టియేనియమ్ను ఎక్కువ మొత్తములో ఆహార పదార్థంగా వాడతారు.

పైలా గ్లోబోసా (ఆపిల్ నత్త) — పటం 15.1) మృదుశరీర భాగాలను ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ జిల్లాలలో ఆహారంగా తీసుకుంటారు. ఈ నత్త సాధారణంగా చెరువులలో, సరస్సులలో, మంచినీటి గుంటలలో, వరిసొలాలలో వివసిస్తుంది.

ఫిలప్సైన్ దీవులలో హార్వీకర్పరాలు (సెరీఫీసిడే) పూర్తి ఆహారంగా (Wholesome food) సంతోషముతో సేవిస్తారు. ఈ కుటుంబానికి చెందిన జీవులలో టెలిస్కోపికమ్ టెలిస్కోపికమ్ అను ఒక జాతికి చెందిన జీవుల మాంసాన్ని మాత్రమే భారతదేశములో ఆహారంగా తీసుకుంటారు. ఇవి గంగా, కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలలో కొంకను తీర ప్రాంతాలలో బురదనీటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.

స్ట్రాబన్ కనేరియమ్ (రెక్కల కర్పరము), లాంబిస్ (Pterocera) లాంబిస్లను (తేలు కర్పరము — Scorpion shell పటం 16.1 C) సాధారణంగా ఆహారం కోసము రెండు తీరాలలో సోగు చేస్తారు.

టర్చినెల్లా పైరమ్ (పటం 16.1.D) (సవిత్ర శంఖు — Sacred chank), మాంసాన్ని తీర ప్రాంతాలలోని వారు ఎండబెట్టి వేయించి కూరలలో వాడుతారు. ప్రఖ్యాతిగాంచిన పుచ్చకాయ కర్పరము (Melo indica) మెత్తని భాగాలను ఆహారంగా తీసుకుంటారు. ప్రాథమిక గుండ్రంగా వుండి 20 సెం.మీ పొడవు ఉంటుంది. భారత దేశ తీర ప్రాంతమంతటా ఉంటుంది. కాని ప్రత్యేకంగా పాక్ సముద్ర (Palk Bay) ప్రాంతంలో 9 నుండి 11 మీ. లోతులో లభిస్తుంది.

బెస్ట వారిచే విస్తారంగా ఆహార పదార్థంగా వాడబడు ఆలివ్ కర్పరము ఒలైవ్లా ప్రజాతి (16.1E)కి చెందినది. ఇది తూర్పు తీర ప్రాంతంలో సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. కాని పశ్చిమ తీరములో చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. వీటిని ప్రధానంగా ఫిలవరి నుండి ఏప్రిల్ మాసాలలో సోగుచేస్తారు. వీటిని పట్టిన తరువాత మంచినీటిలో ఉడకబెట్టి మృదు శరీర భాగాలను బయటికి తీసి కూరగా లేదా వేయించితింటారు.

16.3.2 ద్వికవాల జీవులు (Bivalves)

సాధారణంగా ఆహారంగా వాడబడు ద్వికవాల జీవులు అయిస్టర్లు (Oysters), సముద్ర ఆల్సిప్పలు (Sea mussels), క్లాములు (Clams), తినదగు అయిస్టర్లు (Edible Oyster), క్రాస్సోస్ట్రీయా ప్రజాతికి (Genus Crassostrea) చెందినవి. దీనిని బొంబాయి, కలకత్తా, మదరాసు వంటి నగరాలలో ఎక్కువగా వాడుతారు.

ఉప్పునీటి పరస్పరాలలో (Backwater Lakes) నివసించు అయిస్టర్, క్రాస్ట్రీయూ మదరాసెన్సిస్ (Cassostrea madrasensis) తూర్పు తీర ప్రాంతంలోని ఉప్పుకయ్య (Estuary) లలోన, విస్తారంగా వ్యాప్తిచెంది వుంటాయి. సహజ సంపదలో ఇది మలభంగా లభించ పౌష్టిక ఆహారము.

భారత దేశ జలాలలో రెండు జాతుల సముద్ర అల్పివలు పెద్ద పరిమాణములో పెరుగుతాయి. ఇవి మైటిలస్ జాతులకు (Mytilus sps.) చెందిన గోధుమ వర్ణపు అల్పిప్ప అకువపు అల్పిప్ప. దీని మాంసాన్ని ఉడకబెట్టి వరి అన్నముతో గాని, టపియోక వేళ్లతో వండిన కూరతో బాటుకు తింటారు. గ్లైకోజను, ప్రోటీన్లు వస్త్రపోకుండా వీటిని ఎండలో ఆరబెట్టుతారు. ఎండిన వస్తువుచాలా రుచికరంగా ఉండటే గాక ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటుంది కూడ.

క్లాములలో (Clams) అహారంగా వాడే జాతులలో ముఖ్యమైనవి మెరిట్రిక్స్ జాతి, గాప్రేరియస్ జాతి, పాఫియా జాతి, వెలారిటా జాతి.

మెరిట్రిక్స్ జాతి (Meretrix sps) (పటం 16.1. F,G)కి చెందిన క్లాములు రెండు తీరాలలోని ఉప్పునీటి కయ్యలలో, బాక్ వాటర్స్ (Back waters) లో విస్తారంగా లభిస్తాయి. ఇవి అయిస్టర్లవలె ముఖ్యమైన ఆహార మలస్కెల్లు (Food Molluscs). క్లాములను సాధారణంగా జీవమున్న వాటినే (Live animals) అమ్ముకొనికి బహిరునకు పట్టుకొని వస్తారు.

పర్యుకల వలెనున్న ఆర్క కర్పరము, (Arca granosa) (పటం 16.11) మన దేశ తీరప్రాంతములో ఇసుక మేటలలో ఉన్న బాక్ వాటర్స్, ఉప్పు నీటి కయ్యలలో విరివిగా లభిస్తాయి. దీని మాంసము ఎర్రగా బిరుసుగా (Tough) ఉన్నా పుష్టికరమైనదిగా భావిస్తారు.


క్లామిన్ పెనటోరియా (నిజమైన స్కాలోప్) అఘాత జలాలలో (Deep waters)లో వుంటుంది. ఇది ఎక్కువ పోషక విలువలు కలిగినదని నమ్ముతారు మంచి నీటి అల్పిప్ప, లామెల్లిడస్ మార్జినాటిస్ (పటం 14.2 A)ను ఎక్కువగా అహారంగా వాడుతారు. చేపలుపట్టే జాతివారు డోనాక్సు కునియేటస్ (Donax cuneatus), డో. స్కార్టమ్ (D.scortum)ల మాంసము అమూల్యమైనదని అనుకుంటారు.

రాక్షస క్లామ్, రేజర్ కర్పరము, సోలెను (Solen) (పటం 14.3 B) కొన్ని సమయాల్లో అహారంగా తీసుకుంటారు.

16.3.3 సిఫాలోపాడ

భారత దేశజలాలలో లభించే సిఫాలోపాడ జీవులలో అహారంగా ఉపయోగపడు జాతులు ఎక్కువలేవు. కొన్ని కటిల్ చేపలు (కోమటి సంఘము) సిపియా (పటం 14.3 A.) జాతిని, లాలిగో (పటం 14.3.B) ప్రజాతికి చెందినకొన్ని స్క్విడ్లు, కొన్ని ఆక్టోపస్ (పటం 14.3.C) ప్రజాతికి చెందిన జీవులను అహారంగా వాడుతారు.

మలస్కెల్లును అన్నింటిని అరగించడానికి ముందుగా రుచికి తగిన విధంగా వండుతారు. గాస్ట్రోపోడ్ల, అయిస్టర్ల, క్లాముల, అల్పిప్పల, మాంసాన్ని బాగా ఉడకబెట్టి మసాలా ద్రవ్యాలతో వేయించడమో లేక కూరచేయుటమో జరుగుతుంది. స్క్విడ్లు, శంఖుల మాంసాన్ని ఎండలో ఆరవేస్తారు. వాడునప్పుడు వీటిని నీటిలో నానవేసి తాజా మాంసమును వండిన విధంగా వండుతారు.



పటం 16.1 ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గల మలస్కాజీవులు A. హేలియోటిస్. B. టర్ఫోమార్ మెరేటస్. C. లాంబిస్ sp D. టర్ఫోమార్ మెరేటస్. E. టర్ఫోమార్ మెరేటస్. F. మెరిట్రెక్స్ మెరిట్రెక్స్ G. మెరిట్రెక్స్ కాస్టా. H. డోనాక్స్ sp. I. అర్కాగ్రానోసా.

16.3.4 సాగర జీవులకు ఆహారంగా మలస్కాజీవులు

అనేక రకాలైన సముద్రజీవులకు మలస్కాజీవులు ఆహారంగా ఉపయోగపడుతాయి. ద్వీకవాటాల దీంభక జీవులు, కొన్ని గాస్ట్రోపాడ పిల్ల జీవులు, చిన్న పరిమాణములోనున్న మరికొన్ని జీవులు విస్తారంగా ప్లవక జీవులుగా జీవనము గడుపుతాయి. ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత కలిగివున్న అనేక చేపలు ఆహారము కోసము వీటిని ఆధారపడి ఉంటాయి. సముద్ర అడుగు భాగములో నివసించు స్కేటులు, టేకు చేపలు (Skates and Bays) ఎక్కువగా ద్వీకవాట జీవులను, గాస్ట్రోపాడ జీవులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. తిమింగలాలు, పార్సాయిన్లు, స్క్విడ్లు ఇతర పిఫాలో పాడజీవుల గుంపులను వేటాడి ఆహారంగా తీసుకుంటాయి.

కటిల్ చేప, స్క్విడ్లు, ఆక్టోపస్లను ముక్కలుగా కత్తిరించి చేపలు పట్టడానికి (Bait) వాడుతారు.

16.4 ఔషధాలకు ఉపయోగము

పవిత్ర శంఖు టర్ఫోమార్ మెరేటస్ను దేశీయ వైద్య పద్ధతిలో వాడుతారు. కర్పర భస్మాన్ని అజీర్ణ వ్యాధికి, మూలశంఖరోగము (Piles) కొన్ని చర్మ వ్యాధులకు వాడుతారు. వీటి మృదుభాగాలను స్త్రీ మా వ్యాధులకు వాడుతారు. గవ్వలు (పటం 14.1.G) కూడా ఇందుమించు సైన చెప్పిన వ్యాధులకు వాడుతారు. ఆపిల్ వత్త

ప్లాకునా ప్లనెంటా (Windowpane Oyster) లోని ముత్యపు గింజను కొన్ని వేతవ్యాధులు వయము చేయడానికి వాడుతారు. సముద్ర అల్పపులను ఎక్కువగా విటమినుల తయారు చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. కటిల్ చేపలోని కటిల్ ఎముక (Cuttle bone) ను అజీర్ణ వ్యాధులలోను, శమన కరమైన (Astringent and sedative) ముందుగా వాడుతారు.

16.5 అలంకార వస్తువులు, ఆభరణాలు

మలస్కన్న కర్పరాలను చిత్రమైన వస్తువులను (Fancy goods), కళా ఖండాలను (Art pieces) తయారుచేయుటకు విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. హేలియోటిస్ (చెవిదొప్ప కర్పరము) కర్పరము లోతలములోని ముత్యపు పొర ఆకర్షణీయమైన రంగుల హరివిల్లు, దీనిని అనే కళాత్మక వస్తువులను తయారుచేయుటలో, లక్ష్మీబొమ్మల నగిషీ పనులకు, ఎక్కువ ఖరీదుచేసే కట్టరీ చేతి పిడులకు మెరుగులు దిద్దే వస్తువుగా ఉపయోగిస్తారు. బ్రోడన్ సిల్వర్ కస్, టర్బో మార్మోరేటస్ కర్పరాలను ముత్యపు బొత్తాములు, చెవిదుద్దులు, తల వెంట్రుకలను అలంకరించు చెంప పిన్నుల (Brooches), మరికొన్ని ఇతర అలంకరణ వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. టర్బో మార్మోరేటస్ యొక్క పెద్దవి ముత్యపు కర్పరాన్ని భారత, జపాన్ దేశపు నగల వర్తకులు ఎక్కువగా వాడుతారు. వీటిని తెరలు, పెట్టెలు, పెద్ద తట్టలు (Trays), జైపూరు కళా వస్తువులు తయారుచేయుటలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని టర్బో జాతుల గవ్వ మూత (Operculum) దృఢంగా, దళపరిగా ఉండి ఒకవైపు పుబ్బెత్తుగా (Planconvex) ఉంటుంది. ఇది పెద్దవిగా సుమారు బరువుతో ఉండి కాగితపు బరువులుగా (Paper weights) వాడటానికి పనికివస్తాయి.

అనేక గాస్ట్రోపాడ జీవుల కర్పరాలను చెవి రింగులను, కంఠ ఆభరణాలను, ఉంగరాలను, అలంకారముతో నున్న బెల్టులు, వడ్డాణాలు, బట్టల అలంకరణ మొదలైన వాటికి ఉపయోగిస్తారు. పాలిష్ చేసిన కర్పరాలను యూరప్ లోని దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు.

ట్రైటాన్ జాతికి చెందిన కర్పరాలను బాకాలుగా (Trumpets) కొన్నింటిని వాయిద్యాలుగా కూడా వాడుతారు.

కాస్సియా కార్నూటా (Cassia cornuta - హెల్మెట్ కర్పరము): ఇది భారత దేశములోని గాస్ట్రో పాడ జీవులన్నింటిలోకి పెద్దది, బాగా బరువు ఉన్నది. ఇది సుమారు 2 కిలో గ్రాముల బరువు, 15 సెం.మీ నిడివి ఉంటుంది. ఇది మన్నార్ అఘాతము (Mannar Gulf) లక్ష దీవుల ప్రాంతంలో ఉంటాయి. కర్పర పదార్థము విభిన్న వర్ణకాలతో ఉండి అనేక స్తరాలను కలిగివుంటుంది. అందువలన ఇది కేమియో నగిషీకి (Cameo carving) పనికివస్తుంది.

శంకు కర్పరాలు గాజాలు చేయటానికి, దండలు, పూసలు, ఉంగరాలు అనే ఇతర అలంకార వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. వీటి గవ్వ మూతను ముద్దగా నూరి అగర బత్తులుగా ఉపయోగిస్తారు.

సింబియన్, డాలియన్, టోపిర, మ్యూరెక్సు వంటి గాస్ట్రోపాడ జీవుల కర్పరాలు విద్యుత్ దీపాల పైకప్పులుగా ఉపయోగిస్తారు.

కొన్ని మలస్కను జీవులు రంగుల చారలతో అందమైన ఆకారాన్ని కలిగివుండటము వలన చిత్ర వస్తువులను ప్రోగు చేయువారికి ఈ కర్పరాలంటే తెగని ప్రీతి. కోవన్ వంటి కొన్ని కర్పరాలు చాలా ఎక్కువ ఖరీదు చేస్తాయి. మీలో జాతి కర్పరాలు చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. చిన్న గవ్వలు, బ్రోకన్ నెరిటా, మిత్రా మొదలైన గాస్ట్రోపాడ కర్పరాలు భారత దేశములో గృహ క్రీడలలో (Indoor games) లో వాడుతారు.

ద్వికవాట జీవులలో విండోపేన్ ఆయిస్టర్ ప్లానెంటా కర్పరము. కిటికీలను, వహార పైకప్పులను శుభ్రపరచటానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని కర్పరము మెత్తగాను, పరిణితి చెందని (Immature) జీవులలో అభ్రకము (Mica) వలే ఉంటుంది. చౌక రకమైన ముత్యాలను కూడ ఈ ఆయిస్టర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

మంచిసీటి లామెల్లిడన్స్ మార్జినాలిస్ సుమారు వాణ్యతగల ముత్యాలను విరివిగా ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిని దక్షిణ భారతదేశములో అమ్ముతారు. మైటిల్స్ (పటం 15.2.B) ఆకుపచ్చనముద్ర ఆల్పిప్ కూడా ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది కాని అవి అంత ప్రకాశవంతముగ ఉండవు.

సిపిలో పొడ జీవుల కర్పరాలలో ముత్యపు నాటిల్స్ కర్పరము అలంకరణ వస్తువులలో, పాగ త్రాగువారు ఉపయోగించు యాష్ట్రే (Ashtray)లు, దీపపు కప్పులు (Lamp shades) తయారు చేయుటలో వాడుతారు. సిపియా కటిల్ ఎముక (Cuttle bone) ను గొజ వస్తువులు, మంచి కర్రసామాగ్రిని పాలిష్ చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. సిపియాలోని మషీరవగోణి (Ink sac) నుండి సిపియా అను పదార్థాన్ని చేయుటలో ఉపయోగిస్తారు. దీనిని ఫోటోగ్రఫీలోను, వర్ణచిత్రాల పనిలో ఉపయోగిస్తారు. స్క్విడ్స్ (Ink sac) నుండి శాశ్వత నలుపురంగును కలిపివున్న పిరాసు తయారుచేస్తారు. ఇది వీటి రంగుల చిత్రలేఖనము (Water colour painting)లో వాడుతారు.

16.6 సున్నము తయారీ

మలస్కన్ల కర్పరాల నుండి గుల్లసున్నమును తయారుచేయుట భారతదేశ తీరప్రాంతంలో ఒక ముఖ్యమైన చిన్నతరహా పరిశ్రమ. ద్వికవాట, గాస్ట్రోపాడ జీవుల కర్పరాలను తీర ప్రాంతములోని బెత్తవారు ప్రోగుచేసి సున్నము తయారుచేయు పారిశ్రామికీకులకు అమ్ముతారు. ఈ కర్పరాలను బట్టిలో కార్చి తయారుచేసిన సున్నము మేలిరకానికి చెందినందున దీనిని ఇల్లు కట్టడములోను, వెల్లవేయించటానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దీనిని ఎరువుగా కూడా వాడుతారు. కేరళలో వాణ్యమైన సిమెంటు ఉత్పత్తిలో ఈ సున్నాన్ని వాడుతారు.

16.7 మలస్కన్ల ఇతర ఉపయోగాలు

స్లాకునా, పైరులా, డాలియమ్ మొదలైన పాటి కర్పరాలు (Tooth paste) తయారుచేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. బ్రోకన్, టర్చ్ కర్పరాల రద్దు ముక్కలను, సిపియా, కటిల్ బోనును పళ్ల పొడుము (Tooth powder)ను తయారుచేయుటలో ఉపయోగిస్తారు.

16.8 హానికారక మలస్కను జీవులు (Harmful Molluscs)

కొన్ని హానికారక మలస్కన్లను గురించి ఇక్కడ వివరించని యెడల ఈ వర్గపు అధిక ప్రాముఖ్యత వివరణ పూర్తికాదు. ఫోలాస్, టెరిడోనంటి ద్వికవాట జీవులు కముద్ర జలాలలో నుండు కర్ర సామాగ్రిని రంధ్రాలు చేసి నాశనము చేస్తాయి. కముద్ర చేపల పరిశ్రమ కర్రతో చేసిన పడవులు, తెప్పల (కట్ట మరాల్లు) మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ జీవులవలన చేపల పరిశ్రమకు యేటా సుమారు కోటి రూపాయలవరకు నష్టము

కలుగుతుందని అంచనా వేశారు.

టెరిడ్ (Shipworm) (పటం 14.2.F) సుమారు ఒక మీటరు పొడవు, 6.3 మి.మీ వ్యాసముతో ఉంటుంది. ఇది బాగ చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడే కర్రలో రంధ్రముచేసి ఆ బొరియలో నివాస మేర్పరచుకుంటుంది. ఎంతగట్టి రకమైన కర్ర అయిన, ఎంత నాణ్యత కలిగి ఉన్నదైనా వీటి ధాటికి ఆగలేవు. వీటినుండి పడవలను, ఓడలను రక్షించు కోవాలంటే సిటితో ఉన్న భాగాలను లోహపు తాడుగలు లేదా క్రిమి సంహార మందులు, రంగులు (Paints) తరచుగా వాడుతూ ఉండాలి. టెరిడ్, సోలెన్ సంటి బోరర్ల (Borers) నుంచి కాపాడుకోవటానికి రసాయనిక రక్షకాల (Chemical preservatives), నూనెల మీద పెద్ద మొత్తాలు ఖర్చు పెడుతున్నారు.

అకాటీన ప్యూలికా (Achatina fulica) పెద్దదైన భూచర నత్త. కాయగూర తోటలను ధ్వంసము చేయును. వంగ, టామాటో, కాలిఫ్లవర్, కాబీజి సంటి కాయగూరల మొక్కలను, వజ్రెన్యలన్ అమస్లగ్ (Slug) నాశనము చేయును. తిమ్మియా, ప్లమ్మియా, ప్లవార్మిన్ బులైన్ అను మంచివీటి నత్తలు కొన్ని భయంకర హెల్మింథ్ వ్యాధులు ప్రత్యేకంగా డైజెనిటిక్ ట్రెమటోడ్లు (Digenetic Trematodes) కలుగుజేయువాటికి మార్గమిక అతిథేయిగా ఉంటాయి.

16.9 ముత్యపు ఆల్చిప్పలు (Pearl Oysters)

ముత్యపు ఆల్చిప్పలు సముద్ర జీవులు. ఇవి పింక్టాడా అనుప్రజాతికి చెందినవి. ఐదు పుష్పమైన జాతులు పి. ప్యూకేటా (పి. నల్దారిస్) (పటం 15.3.D), పి. మార్గరేటిఫర పి. కెన్సెరిట్టి, పి. అనోమియామిడెన్ పి. ఎక్స్ట్రాసర్ పూరియా అనునవి భారతదేశపు జలాల్లో సాధారణంగా లభిస్తాయి. వీటిలో పి. ప్యూకేటా (నల్దారిస్) ముఖ్యమైనది. ఇది సర్వసాధారణంగా లభించునది. ఇది కచ్ అఘాతము (Gulf of Kutch), మన్నార్ అఘాతము (Gulf of Mannar), పాక్ బే (Palk Bay) లో విస్తారంగా వ్యాప్తి చెందినది.

ముత్యపు అయిస్టర్ల రెండు కవచాలను కలుపుతూ నేరుగావున్న పొడవైన మడత బండు కీలు (Hinge) ఉంటుంది. ఈ రెండు కవచాలతో కిందివైపు ఉన్నది, పైదావికన్నా కొంత లోతుగా ఉంటుంది. కర్పరము మడతబండును అనువరించి పూర్వపర ప్రాంతాలలో రెండు చెవి ప్రాంతాలుగ (Ear regions) మగత కర్పర భాగాలనుండి విభేదన చెంది ఉంటుంది. గుబురుగా ఏర్పడిన దారపు పోగులవంటి బైస్సస్ పాదము (Byssus threads) ఆధారప్రాంతము నుండి (Basal region of the foot) బయలుదేరి జీవిని అధస్తరానికి అంటి పెట్టుకొనడానికి తోడ్పడుతుంది. కవచాలలో తలము అతి ప్రకాశవంతముగా ఉంటుంది.

బాహ్య పదార్థాల (Foreign particles) ప్రేరేపణ (Irritation) నుండి రక్షించుకొనుటకు ప్రవించు కార్నియమ్ సంబంధించిన పదార్థమే ముత్యము. ఇది ప్రతిజనక ప్రతిదేహికాల చర్యకు (Antigen-antibody reaction) సంబంధించినది. ఈ బాహ్య పదార్థాలు చిన్న చిన్న ఇసుక రేణువులే కావచ్చు లేదా సూక్ష్మ పరాన్న జీవులైన కావచ్చు. ఇవి జీవి యొక్క ప్రావారలంబికకు, కర్పరానికి మధ్యలో ఉండిపోతాయి. భారతదేశములోని ముత్యపు అయిస్టర్లలో సాధారణంగా కనిపించు పరాన్న జీవి టెంటాకులేరియా యూనియోనిఫాక్టర్ (Tentacularea unionifactor) అను బద్దెపురుగు యొక్క డింభక కోశదళలు. ప్రప్రథమంగా ఒక చిన్న కణజాలం ముడత పర పదార్థాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. తరువాత క్రమంగా స్తరము తర్వాత స్తరము ముత్యపు పదార్థాన్ని ప్రవించి ముత్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

ముత్యపు ఆల్చిప్పలు సాధారణంగా సముద్రము నుండి సుమారు 19 కి.మీ దూరములో 18-22 మీ. లోతులో రాళ్లమీద కాని, ప్రవాళ దిబ్బల (Dead corals) మీద విస్తారంగా ముత్యపు బ్యాంకులను లేదా పార్స్ (Pars) ను

యేర్పరుస్తాయి. తూర్పు తీరములోనున్న ముత్యపు పంపద (Pearl Oyster Beds) పశ్చిమ తీరములోని వాటికన్నా చాలా విస్తారముగాను, లాభసాటిగాను ఉంటాయి. తూర్పు తీరములో ఎక్కువ ఉత్పత్తి అగు ప్రాంతము తూత్తుకొడి (Tuticorn) సమీపములోని తీరము. ఈ ప్రాంతములోని ముత్యాలు నాణ్యమైనవి. వీటిని లింగ ముత్యాలు (Lingha pearls) అని అంటారు.

ముత్యపు ఆల్విప్పలు 4 లేక 5 సంవత్సరాలలో 8.9 నుంచి 10.2 సెం.మీ వెడల్పు ఎదుగుతాయి. ఈ పరిస్థితిలో వాటినుంచి ముత్యాలను ప్రోగుచేయటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. చిన్న ఆయిస్టర్ల నుండి లభించే ముత్యములు విలువ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని బయటకు తీయటానికి ప్రత్యేకమైన విశేషదాజ్ఞలు ఉన్నందున అవి పూర్తిగా యెదుగు వరకు వీటిలోనే వుంటాయి. దక్షిణ భారత దేశములో ముత్యపు ఆల్విప్పలు సేకరించటానికి శిక్షణ పొందిన ఈతగాళ్ళు(Divers) వీళ్ళ లోతులోనికి మునుగుతారు. కానీ పశ్చిమ తీరములో (కచ్, గుజరాతు) ఆయిస్టర్లు అటులో (Lowtide) వేలాంచం ప్రాంతములో (Intertidal zone) బయటికి కనిపిస్తుంటాయి. కాబట్టి మలభంగా చేతిలోనికి తీసుకోవచ్చు (Hand-picking).

ముత్యపు ఆల్విప్పల ఆవాసాలు (Pearl Oyster beds): ఆయా ప్రాంతాలలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అజమానుషి నియంత్రణలో ఉంటాయి. వీటిని సేకరించునప్పుడు తాత్కాలిక శిబిరాలు నిర్వహించి అనేకమంది ఈతగాళ్ళను(Divers), పడవ యజమానులు, వారి సిబ్బందిని, ముత్యపు వ్యాపారుల సహాయాన్ని తీసుకుంటారు. పడవలోని సిబ్బంది సహాయముతో బరువైన మునకరాళ్ళను (Sinking stones) ధరించిన ఈతగాళ్ళు (divers) ను వీళ్ళ లోతులోనికి దింపుతారు. వీరు ఆయిస్టర్లను వారి వెంట తీసుకొని వెళ్లిన యాక్వాలంగ్ (Aqualung)ను యితర ఆధునిక పరికరాలను ఉపయోగించి ముత్యపు సేకరణ విషయములో మలుపులు తెలుసుకున్నారు.

16.10 ముత్యపు సాగు పద్ధతి

ముత్యమును సాగు(Pearl culture) చేయుటలో ఆల్విప్పల కర్పరములో పూసవంటి (Shell bead-like)పర పదార్థాన్ని ప్రవేశపెట్టి ముత్యపు పదార్థాన్ని ఆల్విప్పచే ప్రసరింపజేస్తారు. ఈ పరపదార్థాన్ని ప్రవేశపెట్టునప్పుడు జీవి మృదు శరీర నిర్మాణాలకు ఎటువంటి హాని జరుగకుండా మన్నితమైన శస్త్రచికిత్స వంటి క్రియ (Delicate operation) జరుపుతారు. తరువాత ముత్యము యేర్పడునంత కాలము అనగా సుమారు ఒకటి నుండి మూడు సంవత్సరాలవరకు వీటిని జాగ్రత్తగా పోషిస్తారు. ఈ విధంగా లభించు కృత్రిమ ముత్యముల సాగు (Artificial Pearl culture) యిప్పుడిప్పుడు ప్రజాదృష్టిని ఆకర్షించుచున్నది. దీనికి కారణము సహజ ముత్యపు ఆయిస్టర్ల ఆవాసాలకు కలుగు భౌతిక మరియు జీవిక (Physiological and Biological) యిబ్బందులే. అయినను సహజ సంపద నష్టపోకుండా తీసుకొనవలసిన చర్యలను జాగ్రత్తగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో తీసుకోవచున్న సిబ్బంది లభివందనీయులే.

16.11 స్వపరిశీలనం

1. వీవు చదివిన ఆహారయోగ్యమైన మలస్క జీవుల లిస్ట్ తయారు చేసి వాటి పోషక విలువలను గుర్తింపుము.

2. అల్పపులపై ఆధారితమైన ముత్యం సాగువాణిజ్య పరంగా ప్రముఖమైనట్టిది. ముత్యం సాగుజరిగే అల్పపులకు తీరని నష్టం కలిగించే గాఢ్రోపాద ప్రజాతులను ఉల్లేఖింపుము.

16.12 సారాంశం

1. మలస్కా జీవుల కర్పరాలు, మృదు శరీర నిర్మాణాలు మానవునికి అనేక విధాల ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
2. తీరప్రాంతంలోని వారికి మలస్కా జీవుల ప్రధాన ఆహార పదార్థంగా ఉంటుంది.
3. అనేక రకాల అలంకరణ వస్తువులు, అందమైన కళావస్తువులు, ప్రకాశవంతమైన ఈ కర్పరాల నుండి తయారు చేయవచ్చు.
4. మున్నము తయారు చేయుటలో కర్పరాలను వాడుతారు.
5. ఆర్థిక పరంగా నష్టము కలుగజేయు కొన్ని మలస్కా జీవులను వివరించడం జరిగింది.
6. ముత్యములను అయిష్టర్లు ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
7. ముత్యము తయారు అగు పద్ధతి ప్రతిజనక - ప్రతి దేహపు చర్య.
8. ముత్యమును సహజ, కృత్రిమ పద్ధతులలో సాగుచేయవచ్చు.

16.13 స్వపరిశీలనం జవాబులు

2. మురెక్స్, యులోసార్పింక్స్.

16.14 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. మలస్కా జీవుల ఉపయోగములను ముప్పది పంక్తులకు మించకుండా వ్రాయండి.
- II. ముత్యపు అయిష్టర్లు, ముత్యపు సాగుపద్ధతి గురించి పది పంక్తులకు మించకుండా వ్రాయండి.

16.15 పదకోశం

అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Indirect development)	:	పిండాభివృద్ధిలో డింభకదశలను కలిగి ఉంటుంది. (ఉదా: ట్రోకోఫోర్, వెలిజర్, గ్లోకిడియం)
అండ విశూర్ణాదకము (Ovoviviparous)	:	అండాంను తల్లిజీవి శరీరములోనే వుంచుకొని అభివృద్ధి పూర్తి అయిన తరువాత పిల్లజీవులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
ఉష్ణనీటి సరస్సులు (Backwaters)	:	సముద్రములో కలిసివున్న సరస్సు లేక కొలను వంటిది. దీని నీటి మట్టము సముద్రపు ఆటు-పోటులతో మారుచూ ఉంటుంది.

ఎమ్బు ఆరీ (Estuary)	: నది సముద్రముతో కలియు ప్రాంతము. సాధారణంగా దీనిని నది నోరు (river mouth) అంటారు.
ఒడంట్ ఫోర్ (odontophore)	: అస్య కుహరములోని అడుగు భాగములో వున్న ఉబ్బెత్తు విర్మాణము
ఒమ్మాట్ ఫోర్ (Ommatophore)	: నత్తలకు యిరువైపుల నున్న పాటి వృంతాలు. వీటి చివరలో నేత్రాలు ఉంటాయి.
కోటరాలు (Sinuses)	: రక్త నాళాలు లోపించడము వలన రక్తము ఖాళీ స్థలాలలో స్రవహిస్తుంది.
కంకాభాంగము (Ctenidium)	: మలస్కా జీవులలోని శ్వాస అవయవము. దీనికి మధ్య అక్షము రెండువైపుల కావీ లేదా ఒకవైపు మాత్రమే ఉంటాయి.
గ్రీష్మకాలసుప్తావస్థ (Aestivation)	: అతి ఉష్ణ ప్రాంతాలలోని నత్తలు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కొనటానికి జరుపు సుప్తావస్థ.
డయోసెస్ (Dioecious)	: (డై:రెండు, ఈకస్:ఇళ్ళు) లైంగిక అవయవాలు (స్త్రీ పురుష) వేర్వేరు జీవులలో ఉంటాయి.
పేలియల్ కాంప్లెక్సు (Pallial complex)	: పైలా ప్రావారకుహరములో నున్న అవయవాలు.
ప్లవకజీవులు (Plankton)	: స్వంతంగా ఈదే శక్తిలేని స్వేచ్ఛగా వీటి ఉపరితలము మీద తేలుతూ జీవనము గడుపు చిన్నని జీవులు. వీటి కదలికలు వీటి కదలికల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్లవక జంతువులు (Zooplankton)	: స్వేచ్ఛగా వీటిమీద తేలు చిన్న జంతువులు
ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Direct development)	: డింభకదళలు లేకుండా జరుగు పిండాభివృద్ధి. గుడ్డు నుండి వెలువడిన పిల్లజీవులు తల్లిజీవిని (ప్రాథమిని) పోలి ఉంటాయి.
బిస్సుస్ (Byssus)	: కొన్ని ద్వికవాట జీవులలో పాదము దారము పోగువలె రూపాంతరము చెంది ఉంటుంది. దీని సహాయముతో జీవులు అదస్తరాన్ని అంటే పెట్టుకొని ఉంటాయి.
బ్రాకిష్ జలాలు (Brackish water)	: ఉప్పు సాంద్రత తరుచు మారుతున్న నీరు. ఇది సాధారణంగా ఎమ్బు ఆరీ ప్రాంతములో ఉంటుంది.
మెలిక (Torsion)	: గాస్త్రో పాద జీవులలో ఆంతరాంగ సముదాయము సర్పిలాకారంగా తిరిగి ఉండటము. దీనివలన సౌష్ఠవ రహితంగా (Asymmetry) ఉంటాయి.
మోనోపెక్టినేట్ (Monopectinate)	: కంకాభాంగములోని పటలికలు అక్షానికి ఒక ప్రక్కగా ఉంటాయి.
రాడ్యులా (Radula)	: మలస్కన్ల ఆస్యకుహరములో రీబ్బనువలెనున్న కొమ్ము పదార్థముతో చేయబడిన నికషణ అవయవము.
రూప విక్రమ (Metamorphosis)	: అభివృద్ధి దశలలో డింభకజీవి క్రమంగా మార్పులు చెందుతూ ప్రాథమిని దశను చేరుకోవడము.

- వజీవశిలాజము
(Living fossil) : పురాతన జీవుల లక్షణాలలో యిప్పుడు జీవించుచున్న జీవి.
- సంధాయకాలు
(Commissures) : సమజాతి నాడీ సంధులను కలిపే నాడులు.
- సంయోగ జకాలు
(Connecives) : విభిన్నజాతి నాడీ సంధులను కలిపే నాడులు.
- స్వయంప్రకాశ లక్షణము
(Bioluminescence). : జీవులు కాంతిని ప్రసరించు లక్షణము.
- హీమోసయన్
(Haemocyanin) : రాగి ధాతువును కలిగియున్న శ్వాస వర్ణకము. ఇది మలస్కా, క్రాస్టేషియన్ల రక్తములో ఉంటుంది.

భాగము-17 ఆర్థ్రోపోడా-సామాన్యలక్షణాలు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

- 17. 1 ఉద్దేశ్యము
- 17. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 17. 3 సామాన్య లక్షణాలు
- 17. 4 వర్గీకరణ
 - 17.4.1 ఒవైకోపాఠ
 - 17.4.2 టార్జిగేడా
 - 17.4.3 పెంటాస్టమిడా
 - 17.4.4 ట్రైటో జైటో మార్టా
 - 17.4.5.1 మీరో స్టామేటా
 - 17.4.5.2 అరక్నిడా
 - 17.4.6 పిక్నోగోనిడియా
 - 17.4.7 మాండిబులేటా
 - 17.4.7.1 క్రస్టేపియా
 - 17.4.7.2 పారోపాడ
 - 17.4.7.3 డిప్లోపాడ
 - 17.4.7.4 కైటోపాడ
 - 17.4.7.5 సింప్టెలా
 - 17.4.7.6 ఇన్ సెక్టా
- 17.5 స్వపరిశీలనం
- 17.6 సారాంశం
- 17.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 17.8 నమూనా ప్రశ్నలు


17.1 ఉద్దేశ్యము

ఆర్థ్రోపాడ (Arthros: కీలు: Podos: పాదము) అత్యధిక సంఖ్యలో జీవులున్న వర్గము. కీలున్న పాదము గల జీవులు ఈ వర్గములో చేర్చబడినందున వాన్ సీబోల్డ్ (Voj Siebold) దీనికి ఆర్థ్రోపాడ అను పేరును పెట్టినాడు. ఈ వర్గములో మనూరు తొమ్మిది లక్షల జాతులు ఉంటాయని ఇవి జంతు రాజ్యములోని ఇతర జీవులన్నింటి కలిపిన మూడింతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయము. విస్తృతదేహముగా ఇవి, అన్నింటికన్నా విజయవంతమైన జీవసముదాయము. ఇవి అన్నిరకాల వినాసాలతోను అవగా గాలి, నీరు, నేల అనుకూలవాలు ఏర్పరుచుకుని విస్తరించినాయి. ఈ వర్గములో స్వేచ్ఛాజీవులు, సహభోజకాలు, పరాన్న జీవులు ఉన్నాయి.

1. ఆర్థ్రోపాడ ద్విపార్శ్వ పాష్టవంతో ఉన్న త్రిస్తరిత సీతోమేట్ జీవులు.

2. ఈ జంతువుల శరీరము ఖండిభవనంతో ఉంటుంది. కొన్ని ఖండితాల కలయికవలన వీటిలో తల, ఉదరము, అను శరీర భాగాలు ఏర్పడుతాయి.

3. ప్రతి ఖండితానికి కీళ్లతో ఏర్పడిన ఒక జత ఉపాంగాలు ఉంటాయి. ఉపాంగాలలోని ఖండితాలను పోడోమెరైస్ (Podomeres) అంటారు. పాద ఖండాలు ఒక దానితో ఒకటి ఆర్థ్రోడియల్ పారచే కలుపబడిన ఉంటుంది. ఈ విధమైన అమరికవలన కంపుల మధ్య కీలు ఏర్పడుతుంది. దీనివలన పాదఖండాలు కదలగలిగే శక్తితో ఉంటాయి.



పటం: 17.1 ఆర్థ్రోపాడ జీవి సాధారణ వ్యవస్థ. 1. వృష్ట హృదయము 2. వృష్టఫలకము 3. రక్తకుహరము 4. ప్లూరాన్ 5. ఉపాంగము 6. ఉదర ద్వంద్వ వాడీమండలము 7. ఉదర ఫలకము.

4. శరీరం చుట్టూ బాహ్య కవచము, లేదా గట్టిపడిన అవభాసిని ఉంటుంది. ఇది ఈ వర్గ లక్షణాలలో ఒక ముఖ్యమైన లంకణము. ప్రతి ఖండితంలోను ఈ కవచం నాలుగు ఫలకాలతో ఉంటుంది. అవి: వృష్టకవచము, (Tergum) పార్శ్వ ఫలకాలు (Pleurae) ఉదర ఫలకము (Sternum) (పటము 17.1). ఈ అవభాసిని మ్యూకోపాలిపాక రైట్, ఫ్లెటివ్, ప్రోటీన్లతో ఏర్పడినది.

5. జీవుల పెరుగుదల దశలో అప్పుడప్పుడూ (Periodically) పాత కవచము తొలగిపోయి దాని స్థానంలో కొత్తకవచం ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రియను నిర్మోచనము లేదా కుటుచ విసర్జన (Ecdysis or Moulting) అంటారు.

6. ఆర్థ్రోపాడ్లన్నీ ఒక విశాలమైన రక్తకుహరాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్రాథమిక జీవిలో విజమైన సీతోమ్ క్షీణించి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, కొన్ని గ్రంథులతో సంబంధించి ఉంటుంది.

7. వేగంగా సంకోచనదలక శక్తిగలిగిన రేఖిత కండరాలు ఉంటాయి.

8. జీర్ణవ్యవస్థలో పూర్వాహారనాళము, మధ్యాహరణాళము, అంత్యాహరణాళము ఉంటాయి. పూర్వాహార, అంత్యాహార నాళాలు బహిష్కృత అంతర్ వేష్టనంతో ఉంటాయి. వీటిని వరుసగా పూర్వపద (Stomodaeum), అధ్యముఖము (Proctodaeum) అంటారు.

9. శ్వాసక్రియ వివిధ పద్ధతులలో జరుగుతుంది. జలచర జీవులలో మొప్పలు శ్వాస అవయవాలుగా ఉంటాయి. భూచర జీవులలో వాయువుల మార్పిడి, వాయునాళాల (Tracheae) వలన జరుగుతుంది. కొన్ని ఆర్థ్రోపాడ జీవులలో పుస్తకాకార మొప్పలు (Gill books) మరియు కొన్నింటిలో పుస్తకాకార డిఫిరిలిత్తులు (Book lungs) మరియు కొన్నింటిలో పుస్తకాకార డిఫిరిలిత్తులు (Book lungs) శ్వాసక్రియకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

10. విసర్జక అవయవాలు మాక్సిజియన్ నాళికలు లేదా స్పర్శ శృంగ (Antennary) లేదా హరిత గ్రంథులు (Green glands) కొన్ని ఆర్థ్రోపాడ జీవులలో జంభికా గ్రంథులు (Maxillary glands) విసర్జకవయవాలగా పనిచేస్తాయి.

11. నాడీవ్యవస్థ అవెలిదా రకానికి చెందినది. ఇందులో ఒక జత నాడీ సంధులు తలలో ఉంటాయి. నాడీ వలయము, ఉదరనాడీ దండము ఉంటాయి.
12. జ్ఞాన అవయవాలు బాగాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. పుర్రు శృంగాలు, వేత్రాలు, సమతులన అంగాలు (Balancing organs) చాలా ఆర్డ్రోపాడ్లలో ఉంటాయి.
13. ఇవి ఏకలింగ జీవులు (Dioecious) సాధారణంగా లైంగిక ద్వైరూపకత (Sexual dimorphism) కనిపిస్తుంది. ఫలదీకరణం స్త్రీ జీవిలో జరుగుతుంది. అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా (Direct) కానీ, అప్రత్యక్షంగా (Indirect) గా కాని ఉంటుంది. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగు జీవులలో రూప విక్రమం ఉంటుంది. రూప విక్రమం జరుగువాటిలో దీనికే జీవులు ఉంటాయి. కొన్నింటిలో అవిషేక జననము వలన కూడా అభివృద్ధి జరుగుతుంది.
14. ఆర్డ్రోపాడ్ జీవులు అత్యంత ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత (Economically important) కలజీవులు.

17.4 వర్గీకరణ

ఆర్డ్రోపాడ్ జీవుల సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో విభిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నందున వీటి వర్గీకరణ విషయంలో నిర్ణీతమైన పద్ధతిలేదు. ఈ గ్రంథములో మార్షల్ మరియు విలియమ్స్ 1979లో వివరించిన వర్గీకరణను అనుసరించడమైనది.

ఆర్డ్రోపాడ్ వర్గాన్ని ఈ క్రింది 7 ఉపవర్గాలుగా విభజించినారు.

- ఉపవర్గము - 1 ఒనైకోఫార
- ఉపవర్గము - 2 టార్టీగేడా
- ఉపవర్గము - 3 పెంటాస్టమిడా
- ఉపవర్గము - 4 ట్రైరోబ్రెటా మార్గా
- ఉపవర్గము - 5 కీలీ సీరేటా
- ఉపవర్గము - 6 పిక్నో గొనీడియా
- ఉపవర్గము - 7 మాండిబులేటా

ఒనైకోఫోర, టార్టీగేడా మరియు పెంటా స్టమిడా ఉపవర్గాలు ఇతర ఆర్డ్రోపాడ్ సముదాయాలలో అనిశ్చయమైన లేదా అనుమానాస్పదమైన బాంధవ్యాలను కలిగి ఉంటాయి. కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు వీటిని ఉపవర్గాలుగా వివరింపగా మరికొంత మంది వీటికి ప్రత్యేక వర్గస్థాయిని కల్పించి విన్నవర్గ (Minor phyla) సముదాయ జీవులలో చేర్చినారు, కానీ ఇక్కడ వీటిని ఉపవర్గాలుగా చిత్రించడం జరిగింది.

17.4.1 ఉపవర్గము ఒనైకోఫార

ఒనైకోఫారలో భూచర ఆర్డ్రోపాడ్ జీవులను చేర్చినారు. ఈ సముదాయము మూల ఆర్డ్రోపాడ్ జీవుల నుండి త్వరితంగానే వేరుపడినది. కాని ఇవి ఇంకను కొన్ని ఆర్డ్రోపాడ్ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నందున వీటి పూర్వ చరిత్రను తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పూర్వం పెరిపేటస్లోని జాతులన్నింటినీ ఒక ప్రజాతి పెరిపేటస్లో చేర్చినారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో వీటిని పన్నెండు ప్రజాతులుగా వేరుచేసి రెండు కుటుంబాలలో చేర్చినారు. దీని సాధారణ నామం పెరిపేటస్.

ఒనైకోఫార విశిష్ట లక్షణాలు

1. ఈ ఆర్డ్రోపాడ్ జీవులకు అవెలిదా జీవుల శరీర నిర్మాణం ఉంటుంది.
2. ఇచ్చితమైన బాహ్య కవచంలేదు.

3. శరీరము, తల, ఖండితరహిత (Unsegmented) క్రిమిరూప దేహభాగంగా విభజనచెంది ఉంటుంది.
 4. కణుపులతో (Jointed) నున్న ఉపాంగాలు లేవు. కానీ పొట్టికీలులేని గోళ్లతో మొద్దుగా ఉన్న ఉపాంగాలు జతలలో ఉంటాయి.
 5. శరీర కుడ్యము కండరయుత అంతశ్చర్మముతో (Dermomuscular body wall) ఉంటుంది. చర్మము నునుపుగా, వెల్ వెల్ గా ఉంటుంది.
 6. శరీర కుహరము రక్తకుహరము
 7. శ్వాసక్రియ వాయునాళాల ద్వారా జరుగుతుంది.
 8. గుండె ఒక గొట్టము వంటి నిర్మాణము. ఇందులో కుల్యాముఖాలు ఉంటాయి.
 9. వృక్కాలు విసర్జక అవయవాలుగా ఉంటాయి.
 10. నాడివ్యవస్థ విచ్ఛేద ఆకారంలో ఉంటుంది
 11. లింగభేదం ఉంటుంది (Dioecious).
 12. ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Direct development), డింభక దశలు లేవు.
 13. భౌగోళిక విస్తరణ (Geographical distribution) విషయంలో పెరిపేటస్ జంతుశాస్త్రంలో కుతూహలాన్ని రేకెత్తించిన జంతువు. ఈ సముదాయము విచ్ఛిన్న విస్తరణ (Discontinuous distribution) కు మంచి ఉదాహరణ.
 14. పెరిపేటస్ అనెలిడాకు, ఆర్థ్రోపాడాకు మధ్య ఉన్న మధ్యస్థ జంతువు లేక సమన్వయ జీవి (Connecting link) గా పరిగణిస్తారు. దీనికి కారణము ఈ జీవులు అనెలిడా, ఆర్థ్రోపాడా లక్షణాలను కలిగి ఉండుటమే. కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు ఒకైకోఫోర ఉపవర్గాన్ని వర్గస్థాయికి పెంచాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది ఇతర శాస్త్రజ్ఞులు ఇటీవలి కాలంలో బలపరుస్తున్నారు.
- ఉదా: పెరిపేటస్ (పటము 19.1) పెరిపెటాప్పిస్.

17.4.2 ఉపవర్గము - టార్డిగ్రేడా

1. టార్డిగ్రేడా జీవులను వీటి ఎలుగులని లేదా బేరి ఎనిమిల్ క్యూల్ అని అంటారు.
2. ఇవి మృదువైన చర్మంతో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు. పాధారణంగా ఇవి ఒక మిల్లిమీటర్ విడివికన్నా ఎక్కువ ఉండవు.
3. దేహ ఖండితరహితము, శరీర విభజన స్పష్టంగా ఉండదు.
4. నీల్సానికి అనునైన తుండము వంటి నిర్మాణం నోటికి అనురి ఉంటుంది.
5. నాలుగు జతల కీలు లేని మొద్దుగా ఉన్న కాళ్లు, వీటి చివర గోళ్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కాలు రెండు లేక నాలుగు గోళ్లతో ఉంటాయి.
6. నోటిని ఆవరించి మూక్తాంకురాలు ఉంటాయి. ఆవ్యకుహరంలో ఒకజత కొమ్ము (Horny), పళ్లు లేదా కాల్సిఫైడ్ దంతాలు (Teeth) ఉంటాయి.
7. జీర్ణవ్యవస్థలో నోరు, కండయుత గ్రనవి, ఇరుకైన ఆహార వాహిక, విశాలమైన జీర్ణాశయము, చిన్నవి పేగు ఉంటాయి. సాయువు సరాంతములో కొంత ముందులో ఉంటుంది. ఒక జత లాలాజల గ్రంథులు ఆవ్యకుహరంలో తెరుచుకుంటాయి.
8. శ్వాస వ్యవస్థ, రక్తసరణ వ్యవస్థ ఉండవు.
9. మాట్రిజియన్ నాళికలు విసర్జక అవయవాలు.
10. మెదడుకు ఉదర వాడీ దండము, నాలుగు వాడీ సంధులు, వాడీ వ్యవస్థలో ఉంటాయి.
11. జ్ఞాన అవయవాలు రెండు కంటి చుక్కలు.

12. ఏకలింగ జంతువులు (Dioecious) బీజకోశాలు, స్త్రీ పురుష జీవులలో గోళాకారంగా ఉండి పేగు చివరి భాగంలో తెరుచుకుంటాయి. వీటిలో మగ జంతువుల కన్నా ఆడ జంతువులే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. కొన్ని బార్మిగేడ్లలో మగ జంతువులు ఉండవు. ఇలాంటి జీవులలో అనిషేక జననము వల్ల అభివృద్ధి జరుగుతుంది.

13. ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది.

ఉదా: ఎకైనిస్కన్, మేక్రొబయూటన్ (పటం. 17.2 ఎ) హిప్పిటైయస్.

17.4.3 ఉపవర్గము - పెంటాస్టొమిడా


1. పెంటా స్టొమిడ్లు సుమారు 70 జాతులు ఉన్న ఒక నమూనాము. వీటిని సాధారణంగా "జిహ్వక్రిములు" (Tongueworms) అంటారు.
2. ఇవి అన్నియు సరాన్న జీవులు. వీటి ప్రాథమిక శలలు పాములు, మొసళ్లు మొదలైన వాటి ఊపిరి తిత్తులలో, వాసికా నాళాలలో సరాన్న జీవనము గడుపుతాయి.
3. శరీరము రెండు నుండి 13 సెంటీ మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. పూర్వ ప్రాంతంలో కురచగా ఉన్న ఐదు బొడిపెల (Protuberacles) వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. పెంటాస్టొమిడా అను పేరు ఈ నిర్మాణాల వలననే వచ్చినది. వీటి సహాయంతో సరాన్న జీవి ఆతిథేయికి అతుక్కొనగలదు.
4. ఐదులో నాలుగు బొడిపెలు కాలు మూదిరిగా ఉండి గోళ్లతో ఉంటాయి.
5. జీర్ణనాళము తిన్నగా ఉండి సరళంగా ఉంటుంది. పూర్వ ప్రాంతంలో పీయకావటానికి అనువుగా గ్రసని రూపాంతరం చెంది ఉంటుంది.
6. శ్వాస వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, విసర్జక వ్యవస్థ ఉండవు.
7. నాడీ వ్యవస్థ, ఆనెలిడా మరియు ఇతర అర్థోపొడ జీవులతో మూదిరి ఉంటుంది. ఖండిత విన్యాసాన్ని సూచించు నాడీ సంధులు ఉదరనాడీ దండం మీద ఉంటాయి.
8. లింగభేదము ఉంటుంది (Dioecious) ఫంధీకరణము స్త్రీజీవిలోనే జరుగుతుంది. పిండములో ఉన్న గ్రుడ్డు (Embryonated egg) అతిథేయి జీర్ణనాళంలో విడుదల చేయబడి మలము ద్వారా వెలుపలికి విసర్జింపబడుతుంది.
9. జీవిత చరిత్రలో మాధ్యమిక ఆతిథేయి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా చేప, లేదా చెవుల పిల్లి లేదా ఉడుత.
10. డింభక జీవి అభివృద్ధి, మాధ్యమిక ఆతిథేయిలో లనేకనిర్మితనాల ద్వారా జరుగుతుంది.

ఉదా: సిఫాలో బీనా (పటం 17.2 బి), వాడ్ సిఫాన్, లింగ్వ్యులా

ఉపవర్గము - ట్రైలోబైట్ మార్థా

అర్థోపొడ్ అన్నింటిలోను ట్రైలోబైటా మార్థా ఉపవర్గము అతిపురాతనమైనది. ఇవి పూర్తిగా వియప్త (Extinct) మైన సాగర జీవులు. ఇవి పురాజీవ మహాయుగము (Palaeozoic era) లో అసంఖ్యాకంగా విస్తరించి ఉండేది. ట్రైలోబైట్లు పుష్టతల బాహ్యకవచముతో కప్పి ఉన్నందున ఇవి రికాజాయిగా చక్కగా నిలిచినది.

1. ట్రైలోబైట్లు శరీరము అణగి ఉండి కోలగా ఉండేది. అవి సుమారు 3 సెంటీమీటర్ల పొడవుగా ఉండేవి.
2. తల, ఉరము, పైగిడియమ్ అను మూడు భాగాలుగా శరీరము విభజన చెంది ఉండేది.
3. తలమీద పుష్ట కవచము లేదా శిరస్థ కవచము (Dorsal carapace of cephalic shield) ఉండేది.
4. ఉరములో 2 నుండి 29 వరకు కదలగలిగే ఖండితాలు ఉండేవి. పాయు ఖండితాల మినహా ఖండితాలన్నింటిలో ఖండితానికి ఒక జత చొప్పున ఉపాంగాలు ఉండేవి.



పటం 17.2 ఎ. మేక్రాబయూటస్ . బి. సిఫాలో బీనా, సి.ప్రై ఆర్త్రస్.

1. అన్యకుహరము. 2. లాలాజల గ్రంథులు. 3. గ్రసవి. 4. ఉపాంగములు. 5. జీర్ణాశయము. 6. స్త్రీ బీజకోశం. 7. మాల్పిజియన్ నాలికలు. 8. అనుబంధ గ్రంథి. 9. నోరు. 10. కాళ్ళు. 11. స్పర్శ శృంగము. 12. శిరోభాగము. 13. నేత్రము. 14. టెలిపాడ్. 15. అధిపాదాంగము. 16. మొవ్వు. 17. ఉరము. 18. అక్షీయ లంబిక. 19. పుష్పప లేదా పార్శ్వ లంబిక. 20. పైజీడియమ్.

5. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరిగేది. వాటి జీవిత చరిత్రలో ట్రైలోబైట్లు మూడు ధింభక దశల ద్వారా పూర్తి చేసుకోనేవి. అవి (ఎ) ప్రొటాస్పిడ్ (బి) మిరాస్పిడ్ మరియు (సి) హోలాస్పిడ్.

ఉదా: ప్రై ఆర్త్రస్ (పటము 17.2), మెగాలాస్పిస్, ఫాకాస్

17.4.5 ఉపవర్గము - కీలిసెరేటా

ఈ సముదాయములో చేర్చిన జంతువుల శరీరము, శిరోపక్షము (Cephalothorax) లేదా ప్రొసోమా మరియు ఉదరము (Abdomen) లేదా ఒసిస్టోసోమాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. వీటిలో స్పర్శ శృంగాలు ఉండవు. మొదటి ముఖపూర్వ ఉపాంగాలను కీలిసెరే (Chelicerae) అంటారు. మొదటి ముఖ పర ఉపాంగాలను పెడిపాలై (Pedipalpi) అంటారు.

జీవ పరిణామములో కీలిసెరేటా జీవులు ట్రైలోబైటా జీవులకు సమీప ప్రాంతము నుండియే ఉద్భవించినవి. ఈ ఉపవర్గము రెండు భాగాలుగా విభజింపబడినది. అవి:

1. మీరోస్టామేటా 2. అరాక్ నిడా.

కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు ఏక్ నోగానిడియాను కూడా కీలిసెరేటాలో చేర్చినారు. దీనికి కారణము వీటిలో మొదటి ఉపాంగాలు కీలిసెరేటా మాదిరి ఉండటమే.

17.4.5.1 విభాగము - మీరోస్టామేటా

1. ఇవి పముద్ర జలాలలో ఉండు కీలిసెరేటాలు.


2. ప్రొసోమాలో కీలిసెరే ఐదు జతల ఉపాంగాలు ఉంటాయి.

3. ఒసిస్టో సోమా, మీసో సోమా, మెటాసోమాగా విభజన చెంది ఉంటుంది. మీసోసోమాలో ఐదు లేదా ఆరు

- జతల పటలికాకార ఉపాంగాలు ఉంటాయి. మొదటి జత జనన ఉపరికులను నిర్వహిస్తుంది. ఇతర ఉపాంగాలు మొవ్వులుగా రూపాంతరం చెంది ఉంటాయి. మొవ్వులలోని అమరిక పుస్తకములోని కాగితముల వలే ఉన్నందున ఈ శ్వాస నిర్మాణాలకు పుస్తకాకార మొవ్వులని పేరు వచ్చింది.
4. మెటాసోమాలో ఉపాంగాలు ఉండవు, కానీ ముళ్ళవంటి పొడవైన వారి ఖండము (Telson) ఉంటుంది.

ఉదా: లిములన్ (రాచపీత) (పటము: 17.3 ఎ)

లిములన్ పురాతన జిఫోసుర (Xiphosura) ఉప విభాగానికి చెందిన జీవి. దీనితో ఉన్న ఇతర జంతువులన్నీ విలుప్తమయినవి, అయితే లిములన్ ట్రయాసిక్ కాలము నుండి మూర్చు చెందకుండా అదే విధముగా ఉన్నది. అందుచే దీనిని సజీవ శిలాజము (Living fossil) అంటారు.



పటం 17.3 ఉపవర్గము కీలిసిరేటా ప్రతినిధులు. ఎ. లిములన్. బి పలమ్మియన్ సి. కీలిఫర్ డి. అరేవియా.

1. పుష్ట కవచము 2. నేత్రము 3. ఉదరము 4. వాలఖండము 5. కీలిసిరా 6. పెడిసాల్స్ 7. పార్శ్వ నేత్రము 8. మధ్యనేత్రము 9. మిసోసోమల్ టెర్గైట్ 10. దేహగ్రము 11. కొండి 12. గమన పాదాలు 13. శిరోపక్షము.

విభాగము - అరక్చిడా

1. కీలిసిరేటా విభాగములలో అన్నింటికన్నా పెద్దది, ముఖ్యమైనది అరాక్చిడులు. సాధారణంగా కనిపించు తేలు, సాలెపురుగు, మైట్లు, టిక్కులు, ఈ విభాగములో చేర్చబడినవి.

2. ఆరాక్షీదులలో కూడా శరీరము రెండు భాగాలతో ఉంటుంది, పూర్వ భాగము ప్రోసోమా లేదా శిరోవక్షము, పరభాగములోని ఒపిస్తోసోమా (ఉదరము).
3. ప్రోసోమా ఆరు జతల ఉపాంగాలతో ఉంటుంది. ఇందులో మొదటి జత కీలిసీరెలు, రెండవ జత ధృదంగా ఉన్న పెడిపాల్సెలు, మిగతా నాలుగు జతలు కాళ్ళు.
4. ఒపిస్తోసోమాలో ఒక జత సిన్స్టరెట్స్ (సాలె పురుగు), ఒక జత పెట్టీసు (తేలు) ఉంటాయి.
5. ఆహార నాళములో అనేక సంఖ్యలో జీర్ణనాళ అంధ బాహువులు ఉంటాయి.
6. శ్వాసక్రియ పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు లేదా వాయునాళాల లేదా చర్మము ద్వారా జరుగుతుంది.
7. విసర్జక అవయవాలు మాస్టిజియన్ నాళికలు.
8. ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది రూప విక్రియ ఉండదు.

ఉదా: బూతన్ (House scorpion), ఫిల్డ్ స్కోపియన్ (Field scorpion) (పటము 17.3 బి) కీలిఫర్ (పటము 17.8 సి) ఫలేజియన్ (హార్వెస్టుమాన్), లైకోసా (పుల్డ్ సాలెపురుగు), అజీ ఆరేనియా (సాలెపురుగు). (పటము 17.3 డి) (సార్కోప్టీన్ (ఇన్ ఫైట్), ఇక్స్ డెన్ (చిక్స్).

17.4.6 ఉపవర్గము - పిక్నోగోనిడియా


1. ఇవి సముద్ర సాలెపురుగు వంటి ఆర్థ్రోపాడ జీవులు. వీటిని సాధారణంగా సముద్ర సాలెపురుగులు అంటారు.
2. ఈ జీవి శరీరములో శిరోవక్షము (Cephalothorax) ఉంటుంది. దీని పూర్వ భాగములో తుండము, మూడు శిరస్థ ఖండితాలు, ఒక ఉరము ఖండితము ఉంటాయి. దీనిని అనుసరించి స్వేచ్ఛగా ఉన్న మూడు ఖండితాలు ఉంటాయి. ఉదరము క్షీణించి ఉంటుంది.
3. ఒక జత కీలిసెరాలు, జత పెడిపాల్సెలు జత ఓవిజెరన్ కాళ్ళు 4 నుండి 6 జతల కాళ్ళు ఉంటాయి.
4. శరీర కుహరము రక్త కుహరము.
5. పేగు విస్తరించి ఉంటుంది. పొడవైన పార్శ్వ అంధనాళాలు ఒక్కొక్క పుష్పాంగములో న్యాసిస్తుంది. కాలులో ఇవి వాటి నిడివి అంతయు విస్తరించి ఉంటుంది.
6. శ్వాస, విసర్జక అవయవాలు ఉండవు. శ్వాసక్రియ చర్మము వల్ల జరుగుతుంది.
7. నాడీ వ్యవస్థలో మెడడు, ఆధో ఆహార వాహికా నాడీవంధి, ఉదర నాడీ దండము, మూడు ఇతర నాడీ సంధులు ఉంటాయి.
8. పిక్నోగోడ్లు లింగ భేదంతో ఉంటాయి. (Dioecious). స్త్రీ జీవులను, మగజీవుల నుండి మతభంగా గుర్తించవచ్చు. వీటిలో ఓవిజెరన్ కాళ్ళు క్షీణదశలో ఉండటమో లేదా పూర్తిగా లోపించడమో జరుగుతుంది. బీజకోశాలు శాఖలతో ఉంటాయి.

ముష్కాలు ఉరమునుండి కాళ్ళ వరకు విస్తరిస్తాయి. స్త్రీ బీజకోశాలు పూర్తిగా కాళ్ళలో ఇమిడి ఉంటాయి. జనన రంధ్రాలు కాళ్ళ మూల భాగములలో (Bases of the legs) ఉంటాయి.

పిల్లజీవులు గుడ్లనుండి వెలువలికి వచ్చువరకు మగజంతువులు బాధ్యత వహిస్తాయి.

9. ఎక్కువ జీవులలో రూపవిక్రియ ఉంటుంది. దీంభక జీవి మూడు జతల ఉపాంగాలతో ఉండి బాహ్యంగా (Superficial) నాస్టియన్ దీంభకాన్ని పోలి ఉంటుంది. దీంభక జీవిని ప్రోటో వింఫాన్ అని పిలుస్తారు. పిక్నోగోవిడ్లు సాధారణంగా సముద్ర అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. ఇవి ఆర్కిటిక్ నుండి అంటార్క్టికా వరకు అన్ని సముద్రాలలో వ్యాపించి ఉంటాయి.

ఉదా: వింఫాన్ (పటము 17.4), ఆస్కోరంథస్, సల్లిసు.



పటం 17.4 నింఫాన్ 1. ఓవిజెరన్ కాళ్లు 2. స్టర్నాంగము 3. తుండము 4. కీలిసిరా 5. శిరోభాగము 6. వేత్రము 7. కాలు 8. పాయువు 9. మొండెము 10. గుడ్డ సమూహము

17.4.7 ఉపవర్గము : మాండిబులేటా

ఈ ఉపవర్గములో స్పర్శ శృంగము, హనువులు గల ఆర్థ్రోపాడ జీవులన్నింటిని కలిపి ఉంచినారు. శరీరము సాధారణంగా మూడు భాగములుగా విభజింపబడినది. అవి: 1. పూర్వ భాగములోని శిరస్సు, 2. మధ్య భాగములోని ఉరము, 3. పరాంతములోని ఉదరము ఉంటాయి. అయితే మిరియాపాడ జీవులలో శరీరము తల, దాని వెనుక ఒకేమాదిరిగా ఉన్న ఖండితాలు అనేక సంఖ్యలో ఉంటాయి. స్పర్శ శృంగాలు, హనువులు, జంభికలు శిరస్థ ఖండితాలలో ఉంటాయి. శ్వాసక్రియ మొప్పలు లేదా వాయునాళాలు లేదా చర్మము ద్వారా జరుగుతుంది. వివర్జన క్రియ స్పర్శశృంగ గ్రంథులు లేదా హరిత గ్రంథుల ద్వారా జరుగుతుంది.


ఈ ఉపవర్గము క్రింది భాగాలుగా విభజింపబడినది.

1) క్రస్టేసియా, 2) పారోపాడ 3) డిప్లోపాడ 4) కైలోపాడ 5) సంఫైలా 6) ఇన్ సెక్టా.

17.4.7.1 విభాగము : క్రస్టేసియా

1. పూర్వ భాగములోని ఆరు ఖండితాలు కలిసి తల ఏర్పడుతుంది.
2. మిగిలిన ఖండితాలు ఉరము, ఉదరములను ఏర్పరుస్తాయి.
3. కొన్ని క్రస్టేసియన్ల తల, ఉరము ఖండితాలన్నీ ఐక్యమయి శిరోపక్షాన్ని (Cephalothorax) ను ఏర్పరుస్తాయి.
4. ఒక జత శృంగికలు, ఒక జత స్పర్శ శృంగాలు, ఒక జత హనువులు, రెండు జతల జంభికలు (ప్రథమ, ద్వితీయ జంభికలు) తల భాగములోని ఉపాంగాలు.
5. ఉరము, ఉదరములో ఉపాంగాలు వివిధ రకాలుగా రూపాంతరము చెంది నడచుటకు, ఈదటానికి, ఆహార సేకరణకు, శ్వాసక్రియకు అనుబంధ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలుగా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి.
6. ఉపాంగాలు ద్విశాఖాయుతంగా (Biramous) ఉంటాయి. ఇటువంటి నిర్మాణములో ప్రథమ పాదాంగము (Protopodite) దాని చివర బహిః పాదాంగము (Exopodite) అంతః పాదాంగము (Endopodite) ఉంటాయి.
7. శరీరము బాహ్యకవచముతో కప్పబడి ఉంటుంది.
8. శరీర కుహరము ఎన్నో గదులుగా ఏర్పడుతుంది. ఇందులో చాలా గదులలో రక్తము విండి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక రక్తకుహరము ఏర్పడుతుంది.

9. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సంపూర్ణ రకానికి చెందినది. రక్తనాళాలు పూర్వభాగములో ఉండి రక్త నైసర్మల వరకు వెడతాయి.
10. విసర్జక అవయవాలు ఒకటి లేదా రెండు జతల ఖండిత విన్యాసంతో ఉన్న అవయవాలు ఉంటాయి. ఇవి పుర్వ శృంగాలతో ఉంటాయి. వీటివి పుర్వశృంగ (Antennary) లేక హరిత గ్రంధులు (Green glands) అని అంటారు. జంభికలున్న ఖండితములతో ఇవి ఉంటే వీటిని కర్పర గ్రంధులు (Shell glands) అని అంటారు. ఒక జీవిలో ఈ రెండు గ్రంధులలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది.
11. నాడీ వ్యవస్థ ఆర్థ్రోపాడ జీవులలో సమూహా నిర్మాణంతో ఉంటుంది. ఇది మెదడు, ఆహార వాహిక సంయోజకాలు, ఉదర నాడిదండము, నాడీ సంధులతో ఉంటుంది.
12. జ్ఞానేంద్రియాలు బాగుగా అభివృద్ధిచెంది ఉంటాయి. నేత్రాలు, సంతులన కోశాలు, వివిధ జ్ఞాన గ్రాహకాలు సాధారణంగా ఉంటాయి.
13. లింగభేదం ఉంటుంది (Dioecious) పుష్టమైన లైంగిక ద్వైరూపకత (Sexual dimorphism) ఉంటుంది.



పటం 17.5 విభాగము క్రాస్టేసియా ప్రతినిధులు. ఎ. యువగూరన్. బి కాస్పర్. సి. ఫెక్లాప్. డి. రీపాన్. ఇ. సాక్యులైనా. 1. పుర్వ శృంగము 2. కీలేట్ కాలు 3. పుర్వశృంగిక 4. శిరోభాగము 5. సర్పిలా కారంగా చుట్టబడివున్న మెత్తటి ఉదరము 6. కీలా 7. సంయుక్త నేత్రం 8. పుష్టకవచము 9. ఉరోపాదములు 10. ఉదరము 11. ఉర: ఉపాంగములు 12. పెర్గెమ్ 13. కెరెనా 14. ప్రావారము 15. శీర్షము 16. వృంతము 17. అవశేష పుర్వ శృంగిక 18. మధ్యనేత్రము 19. స్త్రీ బీజవాహిక 20. మధ్యాహార విశము 21. సాయువు 22. పుచ్చియ కీలములు 23. వాలఖండము 24. గుడ్లతిత్తి 25. స్త్రీ బీజకోశము 26. పీత సంయుక్త నేత్రం 27. పరాన్న జీవియొక్క వేరులాంటి కీలము 28. సాక్యులైనా 29. సాక్యులైనా జననేంద్రియ రంధ్రము.

14. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. కొన్ని జీవులలో అనిషేక జననము జరుగుతుంది. ఎక్కువ జీవుల అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరిగి రూపవిక్రమ ఉంటుంది. అనేకమైన డింభక జీవి దశలు కూడా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ క్రస్టేసియన్లలో ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది.

15. ఆటోటమి (Autotomy) , పునరుత్పత్తి (Regeneration) సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది.

క్రస్టేసియా విభాగంలోని 26,000 జాతుల జంతువులలో మనకు బాగుగా తెలిసిన రొయ్య, పీత, లామ్స్టర్లు మొదలైనవి ఇందులో చేర్చినారు. ఇవేకాకుండా ఇంకా చిన్నవైన జంతువులు సరస్సులలో, వదులలో, పముద్రాలలో కూడా తరచు కనిపిస్తుంటాయి.

ఉదా: పేలిమాన్ (మంచినీటి రొయ్య) (పటము 18.1) పినియన్ (పముద్రపు రొయ్య)

పాన్సులైరస్ (ముళ్ల లాబ్స్టర్) యువగూరస్ (ఋషిపీత), (పటం 17.5) బిర్గ్లాట్ (దొంగ లేదా కొబ్బరికాయ పీత), పోర్ట్లాండ్ (ఎడిబిల్ క్రాబ్), పారాటెల్మాసా (మంచినీటి పీత) కాన్సర్ (పీత) (పటము 17.5 బి) సైక్లాప్స్ (పటం 17.5) పి బెలావన్ (ఆకార్న్ బార్నకల్) లీపాన్ (గూవ్ బార్నకల్) (పటం 17.5 డి) సాక్యులైస్ (సరాన్న జీవి) (పటం 17.5 ఇ)

17.4.7.2 విభాగము పారోపాడ

1. పారోపాడ్లు దైవేత (Two jointed) రకానికి చెంది మూడు జతల పురుళ్ళుగాలతో ఉన్న మిరియోపాడ్లు.
2. కన్నులు ఉండవు. కాని సూడోకులై అనుచిత్రమైన అవయవాలు పురుళ్ళ కృంగాలు వెనుక ఉంటాయి. ఇవి కంపనాలను గ్రహించేటంత సున్నితంగా ఉంటాయి.
3. ఒక జత హనువులు, ఒక జత జంభికలు ఉంటాయి.
4. మొండెము 11 లేదా 12 ఖండితాలతో ఉండగా కాళ్ళు 9 నుండి 10 జతలు మాత్రమే ఉంటాయి.
5. వాయు నాళాలు ఉండవు. అందువల్ల శ్వాసవ్యవస్థ క్షీణదశలో ఉంటుంది.
6. గుండె ఉండదు. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ అంతబాగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు.
7. ఇవి చెట్ల బెరడు భాగాన లేదా క్రుళ్ళి చిదికి పోతున్న చెక్కముక్కల క్రింద వేలలో గుంపులు గుంపులుగా నివసిస్తాయి.

ఉదా: పారోపన్ (పటం 17.6) డెకాపారోపన్, బ్రాకిపారోపన్, యూరీపారోపన్.

17.4.7.3 విభాగము డిప్లోపాడ

1. డిప్లోపాడ జీవులను సాధారణంగా రోకలి బండలవి అంటారు. ఇవి విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్నాయి.
2. ప్రతి శరీర ఖండితము రెండు జతల కాళ్ళను కలిగి ఉండి రెండు ఖండితాలు ఐక్యమయినట్లు నూచన కలుగుతుంది.
3. వోటి భాగాలు మార్పు చెంది వేతోకైలేరియమ్ (Gnathochilarium) అను విర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
4. బాహ్యకవచం చాలా గట్టిగా ఉంటుంది.
5. జీర్ణనాశం తిన్నగా ఉండి పాడైన మధ్యంత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

6. వాయునాళాలు శ్వాస అవయవాలు.


7. గుండె గొట్టమువలె ఉంటుంది. ప్రతి ద్వంద్వ ఖండితము రెండు జతల కుల్యాముఖాల (Ostia) తో ఉంటాయి.

8. మాల్పిజియన్ నాళికలు అవయవాలు.

9. మూడవ శరీర ఖండితములో ఉదర మధ్యరేఖ మీద జననేంద్రియ రంధ్రము (Genital opening) ఉంటుంది.

ఉదా: జాలన్ (రోకలి బండ) (పటము 17.6) పైరోబోలస్, పైఫనోఫోర (చూషక రోకలిబండ)

ప్రైనేత: కైటోపాడ, సింఫైలా విభాగాలకు ఎక్కువ లక్షణాలతో పోలికలు ఉండవు. అభివృద్ధిలో కొన్ని జంతవులలో అనామూర్తిజమే అగుపిస్తుంది. పిల్ల జీవులు గుడ్డు నుండి వెలువడినప్పుడు ఉపాంగాలలో ఉన్న ఏడు ఖండితాలతో ఉంటాయి.



పటం 17.6 ఎ.పైరోబోలస్. బి. జాలన్. సి.స్కోటోపెండ్రా. డి.స్కూటికెరె. 1. పైగిడియం. 2. కొల్లం. 3. స్వర్ణశృంగము. 4. గమనపాదాలు. 5. దుర్గంధ గ్రంథియొక్క వెలుపలి రంధ్రము. 6. తల. 7. కీలములు. 8. విషనఖము.

17.4.7.4 విభాగము కైలోపాడ

1. కైలోపాడ జీవులను సాధారణంగా పెంటిపీడ్లు అంటారు.
2. ఇవి ప్రపంచంలో ఉష్ణశీతల మండలాలలో విస్తరించి ఉంటాయి.
3. శరీరము పృష్టోదరంగా అణిగి ఉండి పొడవుగా ఉంటుంది
4. శరీరము తల, మొందెము అను భాగాలుగా విభక్తమై ఉంటుంది.
5. తల ఒక జత స్పర్శశృంగాలు, ఒక జత హనువులు, రెండు జతల జింభికలతో ఉంటుంది.
6. ప్రతి ఖండితానికి ఒక్కొక్క జత కాళ్ళుంటాయి. పూర్వంతములోనున్న కాళ్ళ చిన్నవిగా ఉండి పరాంతము కైపు తెల్లిన కొద్దీ ఇవి క్రమముగా పొడవుగా ఉంటాయి. ఈ అమరికవల్ల ఈ జీవి కదలికలలో కాలికి కాలికి నడుము అడ్డుపడుట తక్కువగా ఉంటుంది.
7. శ్వాసక్రియ వాయునాళాల ద్వారా జరుగుతుంది.
8. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంస్కృత రకానికి చెందినది.
9. విసర్జక అవయవాలు ఒక జత మూర్తిజియన్ నాళికలు.
10. స్పర్శశృంగాలు ఆధార ప్రాంతంలో (Base) నున్న శ్రవణేంద్రియాలను తోమాన్వరి అవయవాలని (Organs of Tomosvary) అని అంటారు.
11. లింగభేదం ఉంటుంది. జననేంద్రియ రంధ్రం ఉదర మధ్యంగా పరభాగంలో చివరి ఖండితానికి ముందు ఖండితంలో ఉంటుంది.

ఉదా: స్కోలో పెండ్రా (జెర్రి) (పటం 17.6) స్కూటిజెరా (పటం 17.6) లిథోబియస్

17.4.7.5 విభాగము సింఫైలా

1. సింఫైలా విభాగములోని జీవులు పెంటిపీడ్లతో బాహ్యంగా మాత్రమే కొంత పోలికలు కలిగి ఉంటుంది.
2. శరీరము తల, మొందెమును ప్రాంతాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది.
3. తల ఒక జత స్పర్శశృంగాలు, ఒక జత హనువులు, రెండు జతల జింభికలను కలిగి ఉంటుంది.
4. మొందెము కాళ్ళతో ఉన్న 12 ఖండితాలను కలిగి ఉంటుంది. చివరి ఖండితమైన 13వ ఖండితములో ఒక జత స్పిన్నరెట్లు లేదా పాయు ఉపాంగములు, ఒక జత జ్ఞానకీలితాలు ఉంటాయి. మొందెము ఒక చిన్న, అండాకార వాల దండము (Telson) తో అంతమువుతుంది.
5. నాల్గవ జత కాళ్ళ మధ్యన ఉదరంగా జననేంద్రియ రంధ్రం ఉంటుంది.

ఉదా: స్కూటిజెరెల్లా (పటం: 17.6)

17.4.7.6 విభాగము ఇన్ సెక్టా

ఇన్ సెక్టా (కీలుకాలు) లేదా హెక్సాపాడ (షట్పాదములు) జంతు రాజ్యంలో అతి విస్తరించిన భాగము. ఇందులో ఎనిమిది లక్షల జాతులు ఉన్నవి. ఇది మిగతా అన్ని జంతువులు ఒక్కటిగా చేర్చిన వాటికన్నా ఇది చాలా పెద్ద సముదాయము కీలుకాలు భూగోళంలో ప్రతియొక్క ఆవాసాన్ని నివాస స్థలంగా ఆక్రమించుకుంటాయి. కొవి కీలుకములు మంచినీటి వనరులలో కూడా విజయవంతంగా జీవనము సాగించుచున్నవి. ఇవి సాగర జలాలలో సాధారణంగా ఉండవు. ఈ విధమైన జీవనానికి కారణాలలో ఒకటి ఇది ఎగిరే శక్తికలిగి ఉండటము, రెండవది శరీర నిర్మాణము నీటిని ఆదా చేయడానికి ప్రత్యేక అనుకూలతలు కలిగి ఉండటమే. ఈ విభాగము విభిన్న అలవాట్లను, ఆవాసాలను కలిగి ఉన్నందున నీటిని సాధారణ లక్షణాలని వివరించటము కొంతవరకు కష్టసాధ్యమనే చెప్పవలె. అయినను ఈ క్రింది కనపరచిన వివరణ ఈ విభాగ నిర్మాణాన్ని కొంత వరకు విశదపరుస్తుంది.

1. కీటకాల శరీరము తల, ఉరము, ఉదరము అను భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది.
2. తల ఆరు ఖండితాల కలయిక వలన ఏర్పడి ఉంటుంది. ఉరము మూడు ఖండితాలతోను, ఉదరము పదకొండు ఖండితాలతోను ఉంటుంది.
3. ఒక జత స్పర్శకణాలు, ఒక జత హనువులు, రెండు జతల జింభికలు తలలో ఉంటాయి. రెండవ జత జింభికలు మధ్యస్థాంతంలో కలిసిపోయి అధరము లేదా క్రింది పెదవి అను (Labium or lower lip) వికృతిస్థానం ఏర్పడుతుంది.
4. తలలో ఒక జత సంయుక్త నేత్రాలు ఉంటాయి.
5. ఉరములోని ప్రతి ఒక ఖండితము ఒక జత కాళ్లను కలిగి ఉంటుంది.
6. ఎగిరేకత్తి గల కీటకాలలో రెండు జతల రెక్కలు, రెండు, మూడు ఉరము ఖండితాలలో ఉంటుంది.
7. సాధారణంగా ఉదరములో పదకొండు ఖండితాలు ఉంటాయి. కొన్ని కీటకాలలో పరాంతములో వాల ఖండము (Telson) కూడా ఉంటుంది.
8. కొన్ని కీటకాలలో జనన ఖండితాల (Genital segments) లో అండనిక్షేపన (Ovipositer) పరాంతములో పాయు ఉపాంగాలు (Anal cerci) ఉంటాయి.
9. వాయునాళాలు (Tracheae) శ్వాస అవయవాలు. ఇవి శరీరకుహరంలో విస్తృతమైనజాలీయంగా ఏర్పడి వాయువుల పరస్పర మార్పిడికి ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది.
10. సాధారణంగా ఎక్కువ కీటకాలలో అభివృద్ధిలో రూపవిక్రీయ (Metamorphosis) ఉంటుంది. కొన్నింటిలో ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది.

ఉదా: లెపిస్మా (పిల్వర్షిస్), పెరిప్లేనేట అమెరికానా (బొద్దింక), మస్కాడొమెస్టికా (ఈగ) ఏపిస్ మెల్లిఫెరా (తేనెటీగ), అనాఫిస్ (దోమ), పెనిడికులస్ (పేమ), బాంబిక్స్ మోరి (పట్టుపురుగు) (పటం 201)

17.5 స్వపరిశీలనం

1. పెరిపాటన్కు అనెలిడా, ఆర్థోపాడ జీవులతో అసక్తికరమైన పోలికలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటి విస్తరణ కూడా పరిమితం పరిణామనాద రీత్యా ఈ లక్షణాలను వరసగా అందురు.
2. మిల్లిపీడ్లు, సెంటిపీడ్లు కాళ్ల జతల సంఖ్యలో విభేదాన్ని చూపుతాయి. ప్రతి ఖండితానికి కాళ్లు, తల మొదటి జీవుల్లో ఉంటే తరవాతి వాటిలో
3. ఇన్సెక్టా విభాగం జంతువులు అత్యధికం. ఈ సాఫల్యతకు కారణం వాటిలో పరిణామం చెందిన లక్షణమే.

17.6 సారాంశం

1. ఆర్థోపాడ వర్గములో చేర్చబడిన జీవులు కీళ్లతో కూడిన పాదాలు కలిగియుంటాయి.
2. శరీరము గట్టిగా ఉన్న కవచము లేదా బాహ్యస్థి పంజరముతో ఉంటాయి. ఇది నిర్మోచనమును క్రియవలన అస్పృహస్థుడు వదిలివేయబడి క్రొత్తకవచాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. జీవి పెరుగుదల ఈ చర్యద్వారా జరుగుతుంది.
3. శరీరకుహరము రక్తకుహరము.
4. సంవృత రక్తనాళాలు (Closed blood vessels) ఉండవు. అందువల్ల రక్తప్రసరణ వ్యవస్థను విస్తృత రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు.
5. మొవ్వులు, శ్వాసనాళాలు, పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు ముఖ్యమైన శ్వాస అవయవాలు.

6. స్పర్శ శృంగ గ్రంథులు లేదా మార్మిజీయన్ నాళికలు విసర్జన క్రియలో ఉంటాయి.
7. లభివృద్ధిలో రూపవిక్రయ ఉంటుంది.
8. ఈ వర్గము ఏడు ఉప విభాగాలుగా విభజించబడినది.
9. పెరిపేటస్ అను ఒనైకోసార జీవి రెండు విభిన్న వర్గ లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది. అందువలన ఇది సజీవ సేతువుగా (Connective link) జంతుశాస్త్రంలో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది.
10. ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతగల రొయ్య, లాబ్స్టర్, పీత మొదలైన జీవులు ఇందులో చేరినవి.
11. ఈ వర్గంలో కీటకాలయిన తేనెటీగ, పట్టుపురుగు, లాక్ ఇన్ సెక్ట్ లే, కాక హానిని కలుగచేయు కీటకాలు కూడా చేర్చబడినవి.
12. సజీవ శిలాజము (Living fossil) అని వ్యవహరింపబడు రాచపీత (King crab) తేలు, సాలెపురుగు మొదలైనవి ఈ అలిపెర్డ వర్గములో చేర్చబడిన మరికొన్ని జీవులు.

17.7 స్వపరిశీలనం — జవాబులు

1. విచ్చిన్న విస్తరణ
2. రెండు, ఒకటి
3. ఉద్దయన

17.8 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. ఆర్థోపాడ వర్గము యొక్క సామాన్య లక్షణములను వివరించండి.
 2. క్రాస్టేసియా విభాగము యొక్క సామాన్య లక్షణాలను వివరించండి.
 3. ఇన్ సెక్టా (కీటకములు) విభాగపు సామాన్య లక్షణాలను తెలపండి.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. రొయ్య, బొద్దింక, తేలు, తేనెటీగలను ఏ విధంగా వర్గీకరించురు
 2. ఆర్థోపాడ వర్గీకరణమును ఉపవర్గముల వరకు తెల్చి, కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
 3. ఒనైకోసార ముఖ్యమైన లక్షణాలను వివరించండి.

భాగము-18 పేరిమాన్(మంచివీటి రొయ్య)

విషయ క్రమము

18. 1 ఉద్దేశ్యము
18. 2 ఉపోద్ఘాతం
18. 3 బాహ్యలక్షణాలు
 - 18.3.1 శిరోవక్షము
 - 18.3.2 ఉదరము
18. 4 బాహ్య కవచము
18. 5 ఉపాంగాలు
 - 18.5.1 శిరస్థ-ఉపాంగాలు
 - 18.5.2 ఉదరము-ఉపాంగాలు
 - 18.5.3 ఉదర-ఉపాంగాలు
18. 6 జీర్ణవ్యవస్థ
18. 7 శ్వాస వ్యవస్థ
18. 8 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
18. 9 విసర్జక వ్యవస్థ
- 18.10 నాడీవ్యవస్థ
 - 18.10.1 జ్ఞానేంద్రియాలు
- 18.11 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 18.12 స్వపరిశీలనం
- 18.13 సారాంశం
- 18.14 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 18.15 సమూహ ప్రశ్నలు

18.1 ఉద్దేశ్యము

నీటిలో నివసించు ఆర్థోపాడ జీవుల విర్మాణ విశేషాలను తెలుసుకోవటానికి మంచివీటి రొయ్య లక్షణాలను విపులంగా ఈ పాఠంలో వివరించడమైనది.

ఇది చదివిన తరువాత రొయ్య (కస్టేషియన్ సమూహానికి చెందినదయినా) దానికి ఉండే కైటిన్ బాహ్య ఆస్థిసంజరం వల్ల కళ్లతో ఉండే కాళ్లవల్ల, ప్రత్యేక జలశ్వాస క్రియవల్ల, వివృత భక్తకుహరం వల్ల ఆర్థోపాడ విశిష్టలక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది.

18.2 ఉపోద్ఘాతం

పేరిమాన్ మంచివీటి రొయ్య. భారతదేశ వాగులలో, నరమృగంలో, నదులలో నివసిస్తుంది. పేరిమాన్


మాల్యామనసోని (Palaemon malcolimsonii), పే. కార్మినన్, పే. రామరెడ్డి, పే. రూడిన్ మొదలైన జాతులు సాధారణంగా భారతదేశంలో లభించు రొయ్యలు, సామాన్యంగా పే. మాల్యామనోని క్రష్టేసియన్ల విర్యాణం తెలియబరుచు ఉదాహరణ.

వర్గీకరణ

వర్గము - ఆర్థ్రోపాడ
ఉపవర్గము - మాండిబులేటా
విభాగము - క్రష్టేసియా
ఉప విభాగము - మాలకోస్ట్రాకా
క్రమము - డెకాపాదా
ఉపక్రమము - మాక్రూరా
ప్రజాతి - పేలిమాన్ (Palaemon)
జాతులు - మాల్యామనోని (malcolimsonii)

18.3 బాహ్యలక్షణాలు

పేలిమాన్ శరీరము పొడవుగా, కుదురు ఆకారంతో ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. (పటము: 18.1) ఇది ఈదడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. బాగుగా ఎదిగిన రొయ్య 2.5 సెంటీ మీటర్ల నుండి 50 సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రాథ జీవులు తేలిక నీలిరంగుతో కాని లేదా ఎరుపు లేదా ఆరంజి రంగుతో ఉంటాయి.



పటం: 18.1 పేలిమాన్ మాల్యామనోని బాహ్య లక్షణాలు. 1. శిరోవక్షము 2. తోటి 3. సంయుక్త శ్లేథం 4. శృంగిక 5. పృష్ఠకవచము 6. రెండవ కీలాభ పాదము 7. వాన్ కీలేట్ కాళ్లు 8. ప్లయోపాడ్లు 9. పుష్పాగ్ర పాదాలు 10. వాలెండము 11. ఉదరము 12. ఆర్థ్రోడియల్ పాద.

రొయ్య శరీరము ముఖ్యంగా రెండు భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. 1. పూర్వ భాగంలోని శిరోవక్షము (Cephalothorax) 2. పరభాగములోని ఉదరము (Abdomen)

18.3.1 శిరోవక్షము (Cephalothorax)

ఇది తల, ఉరముల కలయిక వలన ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇది దృఢంగా, ఖండిత రహితంగా స్థూపాకారం (Cylindrical) గా ఉంటుంది. ఇది 13 ఖండితాలతో చేయబడి ఉంటుంది. ఇందులో 5 శిరస్త ఖండితాలు, 8 ఉరము ఖండితాలు ఉంటాయి. శిరోవక్షాన్ని చుట్టి పృష్టకవచమును (Carapace) కైటిన్ తో కూడి (Chitinous shield) ఉంటుంది. తల భాగంలోని ఈ కవచాన్ని పృష్టఫలకము (Dorsal plate) అంటారు. పూర్వభాగములో ఇది విస్తరించి రంపపు అంచుగల బాకు వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీనికి త్రోటి (Rostrum) అని పేరు. శిరోవక్షము రెండు పార్శ్వాలలో ఫలకాలవలె వేలాడుతూ ఉంటుంది. వీటిని మొప్పకప్పులు లేదా బ్రాంకియోస్టైగైట్లు (Branchiostegites) అంటారు. ఇది మొప్పలకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. ఒక జత సంయుక్త వేత్రాలు త్రోటికి ప్రక్కగానున్న గుంతలలోని కదిలే వేత్ర వృంతాల (Movable eyestalks) మీద అమరి ఉంటాయి.

18.3.2 ఉదరము

ఉదరము ఆరు కదల గలుగు ఖండితాల చివర వాల ఖండము (Telson) నుకలిగి ఉంటుంది. సాధారణ ఉదరము క్రిందకు వంగి ఉంటుంది. ప్రతి ఉదర ఖండితము ఒక ప్లియోపాడ్స్ (Pleopods) లేదా వ్యమ్మరెల్లతో ఉంటుంది.

18.4 బాహ్య కవచము

శరీరము, ఉపాంగాలు బాహ్యకవచంచే కప్పబడి ఉంటాయి. ఇది కైటిన్ అవభాసినితో ఏర్పడి ఉంటుంది. కాల్షియం లవణాల వలన ఇది గట్టిపడి ఉంటుంది. కీలు ఉన్న ప్రాంతంలో అవభాసిని పలుచగాను, మృదువుగా ఉండి కదలికలు చేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఖండితాల మధ్య పలుచని ఆర్థ్రోడియల్ త్వచము (Arthrodial membrane) ఉంటుంది. దీనివలన శరీర భాగము కూడా కదలికలు కలిగి ఉంటుంది.

ఒక ఉదర ఖండితాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని బాహ్యకవచ నిర్మాణాన్ని గమనించగా పృష్ట, పార్శ్వాలలో కుంభాకారముతోనున్న ఒక ఫలకము (sclerite) ఉంటుంది. దీనిని పృష్టఫలకము (Tergum) అని అంటారు. ఉధరతలంలో ఉన్న పన్నని ఫలకాన్ని ఉదర ఫలకము (Stergum) అని అంటారు. పృష్టఫలకము యొక్క పార్శ్వభాగాలలో క్రిందకు వేలాడుతూ ఉన్నవలచని ఫలకాన్ని ప్లూరాన్ అని అంటారు. ప్రతి ఖండితములోను ఉపాంగాలు ఉదర ఫలకాన్ని అంటి ఉంటాయి. ఉపాంగానికి ప్లూరాన్ కి మధ్య ఉన్న కైటిన్ ఫలకాన్ని ఎపిమెరాన్ (Epimeron) అంటారు.

18.5 ఉపాంగాలు

రొయ్యలో ఉపాంగాలు ప్రతి ఖండితము యొక్క ఉదర పార్శ్వాల నుండి ఏర్పడుతాయి. ఉపాంగాలు అన్నీ కలిపి 19 జతలు ఉంటాయి. ఇవి ఐదు జతల శిరస్త ఉపాంగాలు, 8 జతల ఉరము ఉపాంగాలు, ఆరు జతల ఉపాంగాలు.

మాదిరి లేక సమూహ ఉపాంగము యొక్క నిర్మాణము: ఉపాంగముతో ఇండితాలను కణుపులను లేదా పాదఖండాలు (Podomeres) అంటారు. ఉపాంగపు మూలభాగాన్ని (Basal part) ప్రథమ పాదాంగము (Protopodite) అంటారు. ఇది రెండు కణుపులతో ఉంటుంది. పమీష కణుపులను కాక్సా అని, దూరపు కణుపులను జేసిస్ అని అంటారు. జేసిస్ చివర నుండి రెండు శాఖలు (Rami) విస్తరిస్తాయి. ఇవి మధ్యరేఖకు లోపలివైపు ఉంటాయి. లోపలివైపు ఉన్న శాఖను అంతఃపాదాంగముని (Endopodite) బయటవైపు ఉన్న శాఖను బహిఃపాదాంగముని (Exopodite) అంటారు. ఇవి ఒక్కొక్కటి అనేక కణుపులతో ఉంటాయి. పాదఖండాలు ఆర్థ్రోడియల్ త్వచముచే కలుపబడి ఉంటాయి. ఈ ఉపాంగము " అకారముతో ఉంటుంది. దీనిని ద్విశాఖ ఉపాంగము (Biramous appendage) అని అంటారు.

18.5.1 శిరస్త ఉపాంగాలు

ఇవి 5 జతలు ఉంటాయి. (1) శృంగికలు (Antennules), (2) స్పర్శశృంగాలు (Antennae) (3) హనువులు (Mandibles) (4) ప్రథమ జంభికలు (First maxillae) (5) ద్వితీయ జంభికలు (Second maxillae). వీటిలో శృంగికలు, స్పర్శశృంగాలు ముఖపూర్వ (Preoral) ఉపాంగాలు, హనువులు, ప్రథమ, ద్వితీయ జంభికలు, ముఖపర (Postoral) ఉపాంగాలు (పటం: 18.2)

1. శృంగికలు:

ఇవి నేత్రవృంతాల మూలభాగంతో ఉంటాయి. ప్రథమపాదాంగము మూడు కణుపులతో ఉంటుంది. మొదటి కణుపు ప్రీకోక్సా దీనిని అనుసరించి కోక్సా, జేసిస్లు ఉంటాయి. జేసిస్ రెండు కశాభ నిర్మాణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది లోపలి బయటి స్పర్శ శూకాలు (Inner and outer feelers) బయటి శూకము మరి. రెండు శాఖలుగా విభజిస్తే ఉంటుంది. ప్రీకోక్సా లోపల సంతతులన కోశము (Statocyst) అనుసమతుల (Balancing) జ్ఞానేంద్రియం ఉంటుంది. శృంగికలు ఏకశాకీయ ఉపాంగాలుగా భావిస్తారు. కశాభ నిర్మాణాలు అంతః పాదాంగాలుగా పరిగణించబడవు. శృంగికలు స్పర్శ, సమతుల క్రియలకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

2. స్పర్శ శృంగాలు:


ఇవి శృంగికల కింద వెనుకగా ఉంటాయి. ప్రథమ పాదాంగము రెండు కణుపులతో ఉంటుంది. అంతః పాదాంగము అనేక కణుపులతో ఉన్న పాడవైన కశాభమువలె ఉంటుంది. బహిఃపాదాంగము వెడల్పుయిన శకలము (Squama) అను ఫలకముగా రూపాంతరం చెంది ఉంటుంది. కోక్సాలో విసర్జన రంధ్రము (Renal aperture) ఉంటుంది. స్పర్శ శృంగాలు స్పర్శ, విసర్జ క్రియలకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

3. హనువులు:

ఇవి నోటికి ఇరువైపులా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క హనువు కార్షియం లవణాలతో గట్టిగా తయారైన మూలభాగముతో ఉంటుంది. దీనిలోపలి అంచు దాంతాలతో ఉంటుంది. ఈ భాగము ప్రథమ పాదాంగము. రెండు చిన్న కణుపులతోనున్న హనువు స్పర్శాంగము (Mandibular palp) అంతః పాదాంగముగా ఉంటుంది. బహిః పాదాంగము ఉండదు.

4. ప్రథమ జంభిక:

ప్రథమ పాదాంగము రెండు పలుచని ఆకువంటి లంభికల (Leaf like lobes) వలె ఉంటుంది. ఇవి లోపలివైపు దృఢదలవలె చొచ్చుకొని ఉంటాయి. అందుచేత వీటిని నేతోజేసిస్ అంటారు. వీటి అంచులు సున్నితమైనశూకాలచే కప్పబడి ఉంటాయి. అంతః పాదాంగము సున్నితంగా రెండు కణుపులతో ఉంటుంది. బహిఃపాదాంగము ఉండదు. ఇవి ఆహారాన్ని నోటితోకి సంపటానికి ఉపయోగంగా ఉంటాయి.



పటం: 18.2 పేలిమాన్: శిరస్త ఉపాంగాలు. ఎ. శృంగికలు, బి. పుర్య శృంగము సి. హనుపు, డి. ప్రథమ జంభిక ఇ. ద్వితీయ జంభిక, 1. బేసిన్, 2. కోక్స, 3. ప్రికోక్స, 4. సంచులన కోశం, 5. శకలము, 6. వృక్క రంధ్రము, 7. స్పర్శాంగము, 8. చర్మరణక కీలితము, 9. అంతః పాదాంగము, 10. బహిః పాదాంగము

5. రెండవ జంభిక:

ఇవి పలుచగా అకులవలె ఉంటాయి. ఇది నాలుగు లంభికలుగా ఉండి నేతో బేసిన్ గా ఏర్పడుతాయి. అంతః పాదాంగము చిన్నదిగా, ఖండిత రహితంగా ఉంటుంది. బహిః పాదాంగము పెద్దదిగా విసవక్ర వంటి నిర్మణంగా ఉంటుంది. దీనికి స్కాఫోనేతైట్ (Scaphognathite) అని పేరు. వీటి చివరి అంచులకు శూకాలు ఉంటాయి. జంభికలు ఆహార పేకరణ, శ్వాసక్రియలకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

18.5.2 ఉరము—ఉపాంగాలు

పూర్వంతంలోని మూడు జతల ఉరము - పుపాంగలను మాక్సిల్లరీ పాడ్స్ లేదా పాదదవడలు అని (Food jaws) అంటారు. (Gr: maxilla: jaw; pedos: Feet). తరువాతి ఐదుజతలు నడవటానికి పనికివస్తాయి. వీటిని గమన పాదాలు లేదా (Walking legs) పెరియోపాడ్స్ అంటారు. (పటం: 18.3)


1. మొదటి మాక్సిల్లరీ పెడ్:

ప్రథమ పాదాంగము పలుచగా ఉండి అసంపూర్ణంగా మూడు లంభికలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. వీటికిరెండు వరుసలలో శూకాలు ఉంటాయి. అంతః, బహిః పాదాంగాలు రెండూ కూడా పలుచగా లంభిక

విర్మణంతో ఉంటాయి. ఇవి ఆహార సేకరణలోను, స్పర్శాంగముగాను ఉపయోగపడుతుంది.

2. రెండవ మాక్సిల్లెపెడ్:

ప్రథమ పాదాంగము రెండు కణుపులతో ఉంటుంది. అంతః పాదాంగము వంపు తిరిగి ఐదు కణుపులతో ఉంటుంది. అవి: 1. ఇశ్చియమ్ 2. మీరన్ 3. కార్పస్ 4. ప్రోపోడన్ 5. డాక్టైలన్లు. బహిః పాదాంగము సున్నితంగా పాడవుగా ఉంటుంది. కణుపులు ముళ్లతో ఉంటాయి. బాహ్యంగా దీనికి ఎపిపోడైట్, ఒక మొప్ప ఉంటాయి. ఈ ఉపాంగము ఆహార సేకరణకు, శ్వాసక్రియకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది.



పటం: 18.3 పేలిమాన్ - ఉరము ఉపాంగాలు, ఎ.మొదటి మాక్సిల్లెపెడ్, బి. రెండవ మాక్సిల్లెపెడ్, సి. మూడవ మాక్సిల్లెపెడ్. 1. బేసిన్ 2. కోక్సా 3. బహిః పాదాంగము 4. అంతః పాదాంగము 5. ఎపి పాడైట్ 6. మీరన్ 7. మొప్ప 8. అంగుళిక 9. ప్రాక్ పాదము 10. కార్పస్, 11. ఇశ్చియ్ - మీరన్

3. మూడవ మాక్సిల్లెపెడ్:

ఇది కాలువలె (Leg-like) ప్రథమ పాదాంగము రెండు కణుపులతో ఉంటుంది. కోక్సా పొట్టిగా ఉండి ఎపిపోడైట్ అతికి ఉంటుంది. అంతః పాదాంగము మూడు ఖండితాలతో ఉంటుంది. ఈ మూడు ఖండితాలు ఇశ్చియమ్, మీరన్లు కలియుట వల్ల మొదటి కణుపు, కార్పస్ రెండవ కణుపు, ప్రోపోడన్, డాక్టైలన్ కలియుట వల్ల మూడవ కణుపు ఏర్పడుతుంది. కణుపులు లేని పాడవైన బహిః పాదాంగము ఉంటుంది. వీటికి చూకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆహార సేకరణకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

పేలిమాన్ - గమన పాదాలు, బహిః పాదాంగాలు, ఎపిపోడైట్లు లేనందున మాక్సిల్లెపెడ్లతో వేరుగా ఉంటుంది. నమూనా పాదము యొక్క ప్రథమ పాదాంగములో కోక్సా, బేసిన్లు ఉంటాయి. అంతః పాదాంగము ఐదు ఖండితాలతో ఉంటుంది. ఇవి ఇశ్చియమ్, మీరన్, కార్పస్, ప్రోపోడన్, డాక్టైలన్ ఇవి అన్ని నిలుపు వరుసలో ఉంటాయి.

4. మొదటి రెండవ గమన పాదాలు:

ప్రోపోడన్ నిర్మాణము మినహా ఇది పైన వివరించిన నమూనా కాలును పోలి ఉంటుంది. ప్రోపోడన్ పాడవుగా

ఉండి డాక్టైలన్తో కీలే అను పట్టుకారు వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. డాక్టైలన్ కదిలే శక్తికలిగి ఉంటుంది. కీలేట్ కాలు అహారాన్ని పట్టుకోవడానికి, రక్షణను ఉపయోగంగా ఉంటాయి. మగ రొద్దలలో రెండింటిలో కీలేట్ కాలు చాలా పెద్దదిగాను, భృదంగాను ఉంటుంది.

5. మూడవ నాల్గవ, ఐదవ పాదాలు:

వీటిని కీలేలేని కాళ్లు (Non-chelate legs) అని అంటారు. ఇవి నిర్మాణంలో నమూనా వాలును పోలి ఉంటాయి. స్త్రీ జీవిలో మొదటి కీలేలేని కాలు యొక్క కోక్సా మీద స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రం ఉంటుంది. మూడవ జత నాన్ కీలేట్ కాలు శరీరంతో కలిపే ఆర్ట్రోడియల్ త్వచము మీద మగ జీవిలో పురుష జననేంద్రియ రంధ్రము ఉంటుంది.

18.5.3 ఉదర ఉపాంగాలు


ఆరు జతల ఉదర ఉపాంగాలు లేదా స్లియోపాడ్లు లేదా స్విమ్మిరెల్లు ఉంటాయి. ఇవి ద్విశాఖయుతం (Biramous) గా ఉంటాయి. ఇవి ఈదేటప్పుడు వాజాలులాగా ఉపయోగపడతాయి. (పటం: 18.4)

నమూనా ఉదర ఉపాంగము: మూడవ ఉదర ఉపాంగ నిర్మాణమును (నమూనా ఉదర ఉపాంగంగా తీసుకోవచ్చును. పాదాంగములో రింగువంటి కోక్సా, స్టాపికారంతోనున్న బేసిస్ ఉంటాయి. బేసిస్ నుండి రెండు శాఖలు ఏర్పడతాయి. లోపలివైపునున్న శాఖ అంత: పాదాంగము, బయటివైపునున్న శాఖ బహి: పాదాంగము. అంత: పాదాంగపు లోపలి అంచుకు దగ్గరగా వంపు తిరిగిన కడ్డి వంటి నిర్మాణమును ఏర్పరుస్తుంది. ఎది ఎపెండిక్స్ ఇంటర్నా. దీని చివర భాగంలో ఉబ్బెత్తు నిర్మాణం ఉంటుంది. అంత: బహి: పాదాంగాల అంచులలో సన్నని గండు రోమాలు ఉంటాయి.

మొదటి జత స్లియోపాడ్స్: వీటిలో అంత: పాదాంగాలు క్షీణించి ఉంటాయి. ఎపెండిక్స్ ఇంటర్నా లోపించి ఉంటుంది.

రెండవ జత పియోపాడ్లు: మగ పేలిమాన్లో అదనంగా ఇంకొక కీలితము, ఎపెండిక్స్ ఇంటర్నా అంత: పాదాంగాల మధ్య ఉంటుంది. దీనిని ఎపెండిక్స్ మాస్కులైనా అంటారు.

స్త్రీ జీవిలో ఎదురెదురుగా ఎపెండిక్స్ ఇంటర్నాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి వరుసగా సేతువు (Bridge) వంటి నిర్మాణమును ఏర్పరుస్తాయి. ఇవి గుడ్లను ఉంచడానికి ఉపయోగపడతాయి.



పటం: 18.4 పేలిమాన్ - ఉదర ఉపాంగాలు. ఎ. మొదటి స్లియోపాడ్, బి. రెండవ స్లియోపాడ్ (పురుష జీవి), సి. మూడవ స్లియోపాడ్, డి. పుచ్చాగ్రపాదము. 1. బహి: పాదాంగము 2. అంత: పాదాంగము 3. బేసిస్ 4. కోక్సా 5. ఎపెండిక్స్ మాస్కులైనా 6. ఎపెండిక్స్ ఇంటర్నా.

ఆరవ జత ఉదర ఉపాంగాలు లేదా యూరోపాడ్‌లు: ఇవి వాలఫండానికి (Telson) ఇరవైపులా ఉన్న వెడల్పుయిన పలుచని ఉపాంగాలు ప్రథమ పాదాంగము వెడల్పుయిన సింపాండ్ (Sympod)గా రూపాంతరం చెందినది. అంతః పాదాంగము పలుచగాను, అండాకారంగా ఉండి, శూకాలలో ఉంటుంది. బహిః పాదాంగము పెద్దదిగా ఉంటుంది వాల ఇండములో ఇది వాలపక్షం (Tailfin)గా ఏర్పడింది.


18.6 జీవర్ణవ్యవస్థ

మందినీటి రొయ్య జీర్ణవ్యవస్థలో ఆహార నాళము, జీర్ణగ్రంథి ఉంటాయి. ఆహార నాళంలో ముఖ్యంగా 3 భాగాలు ఉంటాయి. (పటం: 19.5)

పూర్వాహార నాళము (Foregut) లేదా అద్యముఖము
మధ్యాహార నాళము లేదా మధ్యాంత్రము (మిసింటెరాన్)
అంత్యాహార నాళము లేదా పాయు పథము (Hindgut)

పూర్వాహార నాళము: ఇది బహిష్టచ అవభాసిని అంతర్వేష్టనాలలో ఉంటుంది. పాయు పథము కూడా బహిష్టచ అవభాసిని అంతర్వేష్టనాలలో ఉంటుంది.


పూర్వాహార నాళము మూడు ముఖ్య భాగాలలో ఉంటుంది. 1. అస్యకుహరము 2. ఆహారవాహిక 3. జీర్ణాశము. నోరు తలకు ఉదరంగా ఉదరంగా ఉంటుంది. దీనికి ముందుగా పైపెదవి పార్శ్వంగా రెండు హనుపులు వెనకగా అధరము (Labium) ఉంటాయి. నోరు పొట్టిగా ఉన్న అస్యకుహరం లోనికి దారితీస్తుంది. దీని లోపలి గోడలు ముడుతలు పడి దళసరి కైటిన్ పొరలో ఉంటాయి. అస్యకుహరము తరువాత ఆహారవాహిక ఉంటుంది. ఇది నిలువుగా వైపున జీర్ణాశయంలో కలుస్తుంది. ఆహార వాహిక జీర్ణాశయంలో కవాటాల వలెనున్న క్షేమ ఏర్పరుస్తుంది. జీర్ణాశయం శిరోవక్షంలోని ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఇది రెండు భాగాలలో ఉంటుంది. పూర్వ జీర్ణాశయము (Cardiac stomach) జతర నిర్గమ జీర్ణాశయము (Pyloric stomach)



(పటం: 18.5) పేలిమాన్ - జీర్ణవ్యవస్థ. 1. నోరు 2. జతరనిర్గమ జీర్ణాశయము 3. కాలేయ అంధనాళములు 4. పూర్వ జీర్ణాశయము 5. మధ్యాహారనాళం 6. పురీషనాళము 7. పాయువు 8. వాలఫండము.

ఆహారవాహిక రంధ్రము యొక్క పూర్వకుడ్యము పలుచని వర్తులాకార అవభాసిని ఫలకముచే కప్పబడి ఉంటుంది. దీనిపై కప్పుభాగంలో భల్లకారపు ఫలకము (Lanceolate plate) ఉంటుంది. పూర్వజీర్ణాశయపు లోపలి కుడ్యము ఆయుత ఘడతలలో ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇది దళసరిగాను, కార్నియమ్ అవగాలతో కూడిన ఫలకాలను, దండాలను ఏర్పరుస్తుంది. పూర్వ జీర్ణాశయపు అడుగుతలం మీద

ముక్కోణాలను చండాలను ఏర్పరుస్తుంది. పూర్వజీర్ణాశయపు అడుగుతలం మీద ముక్కోణాకారపు హాస్టేట్ ఫలకము (Hastate plate) ఉంటుంది. ఇది మధ్యలో పొడవుగా విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ త్రికోణాకారపు ఫలకము ఇరువైపులా కంకాకార ఫలకాలు (Combed) ఉంటుంది. ఈ ఫలకాల అంచుల నుంచి శూకాలు ఏర్పడుటవల్ల ఇవి దువ్వెనను పోలి ఉంటాయి. ఈ కంకాకార ఫలకాల ఇరువైపులా ఆయుత కటకాలను (Longitudinal ridges) గైడింగ్ రిడ్జెస్ (Guiding ridges) అంటారు. (పటం: 18.6)



పటం: 18.6 పేలిమాన్ - పూర్వజీర్ణాశయపు లోపలి అడుగు భాగము (ప్రస్తుత దృశ్యము! 1. వర్తుల అనభాసిని ఫలకము 2. భల్లాకార ఫలకము 3. ఆహార వాహిక రంధ్రము 4. నిలుపుమడత 5. హాస్టేట్ ఫలకము 6. పూర్వకవాటము 7. కంకాకార ఫలకము. 8. కార్డియో - పైలోరిక్ రంధ్రము.

హాస్టేట్ ఫలకము యొక్క పరభాగపు అంచుమీద సున్నితమైన శూకాలు దట్టంగా ఉంటాయి. ఇది కార్డియో పైలోరిక్ రంధ్రపు (Cardiopyloric aperture) పూర్వ కవాటంగా ఏర్పడుతుంది.

పూర్వ జీర్ణాశయము జతరనిర్గమ జీర్ణాశయంలోని 'X' ఆకారపు రంధ్రం ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఇది నాలుగు కవాటాలతో కప్పి ఉంటుంది. ఈ కవాటాలు కార్డియో - పైలోరిక్ రంధ్రాన్ని ఒక జల్లెడవలె ఏర్పరుస్తాయి. ఈ జల్లెడ అతి సూక్ష్మంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే జతరనిర్గమ జీర్ణాశయంలో సంపుటుంది.

జతర నిర్గమ జీర్ణాశయం పొట్టి ఇరుకైన కుహరము. ఇది పూర్వ జీర్ణాశయము పరాంతములో క్రింద ఉంటుంది. పార్శ్వకుడ్యాలు దశసరిగా, కండరయుతంగా ఉంటాయి. ఇవి జతర-నిర్గమ జీర్ణాశయంలో దశసరి ఆయుత ముడుతలుగా ఉంటాయి. ఈ ముడుతలు జతర నిర్గమ జీర్ణాశయ కుహరాన్ని పృష్టి - ఉదరకోశాలు (Dorsal & ventral chambers)గా ఏర్పరుస్తాయి. ఈ రెండు కోశాలు ఒక ఇరుకైన మార్గం ద్వారా సంబంధించి ఉంటాయి. ఉదరకోశం (Ventral chamber) అడుగుతలము లోపలి వైపుకు ఒక ముడతవలె ఏర్పడుతుంది. ఈ ముడుత రెండు పార్శ్వ కక్ష్యలును ఏర్పరుస్తుంది. దీనిమీద V ఆకారములో ఉబ్బ వడబోత ఫలకము (Filter plate) లేదా జతర నిర్గమ వడబోత సాధనము (Pyloric filter) ఏర్పడుతుంది. వడబోత సాధనం మీద గండు రోమాలు ఉంటాయి. అందువల్ల ఇది ఒక సమర్థవంతమైన జల్లెడ లేదా వడబోత సాధనంగా ఉంటుంది. దీనిలో ద్రవరూపంలో ఉన్న ఆహారపదార్థాలు మాత్రమే ప్రవేశిస్తాయి. జతరనిర్గమ వడబోత సాధనానికి వెనుక ఒక జత సన్నని రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఇవి కాలేయ నాళాల (Hepatopancreatic ducts) రంధ్రాలు. జతరనిర్గమ జీర్ణాశయంలోనికి జీర్ణరసాలు ఈ రంధ్రాల ద్వారా ప్రవేశిస్తాయి.

మధ్యాహార నాళము: ఇది సన్నని పొడవైన నాళము. ఇది ఆరవ ఉదర ఇండితము వరకు విస్తరిస్తుంది. దీని

కుహరిక అంతస్పచ కణాలచే ఏర్పడిన ఉపవళతో ఉంటుంది. ఇది అనేక ముడుతలతో ఉంటుంది. ఇది అంత్యాహార నాళంలోనికి తెరుచుకుంటుంది.

అంత్యాహార నాళము: ఇది పొట్టి భాగము. దీనిగోడ లోపలి తలము అవభాసినితో ఏర్పడినది. ఇది కొంత ఉబ్బిన నాళంతో ఉంటుంది. దీనికి పురీషనాళం అంటారు. ఇది వాలఖండ (Telson) ఆధార భాగంలో (Base) పాయువు ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది.

కాలేయ క్లోమము (Hepatopancreas): దీనికి కాలేయము లేదా జీర్ణగంధి అని మూడూ పిలుస్తారు. ఈ గంధి కొంత భాగం జీర్ణాశయం వెనుకగాను కొంత జీర్ణాశయాన్ని చుట్టి ఉంటుంది. ఇది నారింజ పండు రంగుతో ఉంటుంది. ఇది లంబికలతో ఉంటుంది. ప్రతి లంబిక ఎక్కువ సంఖ్యలో సూక్ష్మనాళికలతో ఉంటుంది. ఈ నాళికలు పెద్ద నాళాలతో కలిసి చివరకు కాలేయ క్లోమము వాహికంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు కాలేయ వృక్కక వాహికలు వేర్వేరుగా జతర నిర్గమ జీర్ణాశయ ఉదర కోశంలోకి తెరుచుకుంటాయి.

పేలిమాన్ వీటిలో గల నాచు, అర్చి ఇతర మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. మాక్సిల్ల్యులేలు, జంభికలు, జంభికా పాదాలు ఆహారాన్ని నోటి వద్దకు తీసుకొని వెళతాయి. హనువులు ఆహారాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొడుతుంది.

జీర్ణక్రియ: చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టబడిన ఆహారం పూర్వ జీర్ణాశయంలోనికి ప్రవేశించి అక్కడ నుండి జతర నిర్గమ జీర్ణాశయమును చేరుతుంది. పూర్వ జీర్ణాశయములో ఆహారము కాలేయ వృక్కక స్రావకాలచే మిశ్రణము చేయబడి మెత్తగా అవుతుంది. తరువాత కార్డియో పైలోరిక్ కవాటాల ద్వారా వడగట్టడం జరుగుతుంది. పార్శ్వంగా జీర్ణించబడిన మెత్తని ఆహారం జతర నిర్గమ జీర్ణాశయం యొక్క ఉదర కోశములోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. శేష పదార్థాలు (Residual food) మధ్యాంత్ర నాళము చేరుతుంది. ఇక్కడ మరికొంత శోషణ జరుగుతుంది. జీర్ణముకాని పదార్థాలు అంత్యాహార నాళము లోనికి ప్రవేశించి చివరకు పాయువు ద్వారా వివర్జిపబడుతాయి.

18.7 శ్వాస వ్యవస్థ

మంచినీటి రొయ్యలో శ్వాస అవయవాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. (పటం: 18.7) అవి:

1. బ్రాంకి యోస్టిగైటులు లేదా మొప్ప కప్పలు
2. మూడు జతల ఎపి పొడైట్లు
3. ఎనిమిది జతల మొప్పలు లేదా జంశ్వాస నిర్మాణాలు

బ్రాంకియోస్టి గైటులు: ప్రతి మొప్పకోశము (Gill chamber) బ్రాంకియోస్టి గైటుల ఉరము కుడ్యాల మధ్య ఉంటుంది. బ్రాంకియోస్టి గైటు యొక్క అంతర్వేష్టనంలో (Inner lining fo branchiostegite) అనే రక్తకుల్యలు ఉంటాయి. ఇవి నిరంతరము నీటిచే తడుపబడుతూ ఉంటాయి. ఈ అంతర్వేష్టనంలో నీటిలో కరిగియున్న ఆక్సిజన్ను గ్రహించి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ను విడుదల చేస్తుంది.

ఎపిపొడైట్లు: పలుచని ఆకువలె నున్న ఎపిపొడైట్లు మూడు జతలు ఉంటాయి. ఇవి మాక్సిల్లిపెడ్ల కోక్సాలకు అతికి ఉంటాయి. వీటిలో అనేక రక్తకుల్యలు ఉంటాయి. నీటిలో ఉన్న ఆక్సిజన్, రక్తంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మార్పిడి చెందుతుంది.

మొప్పలు ఇవి ఎనిమిది జతలు ఉంటాయి. ఇవి జలశ్వాస కుహరంలో మొప్ప కప్పలచే కప్పబడి ఉంటాయి. వాటి ఉనికి, అవి అతికిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మొప్పలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి.

1. పోడోబ్రాంక్:


ఇది రొమ్ము ఉపాంగాల కోళ్ళాలకు అతికి ఉంటుంది. ఉదా రెండవ జంభికా పాదము (Second maxillipede)

2. ఆర్ట్రోబ్రాంక్:

ఉపాంగము, శరీరంలో కలిపేవోటున మొప్పలు అతికి ఉంటుంది. ఉదా: మూడవ జంభికా పాదాలు.

3. ఫ్లూరోబ్రాంక్:

జలశ్వాస కుహరము తోసలివైపు గోడకు మొప్పలు అతికి ఉన్నప్పుడు వాటికి ఫ్లూరోబ్రాంక్ అని పేరు. ఉదా: ఐదు జతల కాళ్ళకు అతికి ఉన్న మొప్పలు



(పటం: 18.7) పేలిమాన్. ఎ. మొప్పలతో ఉన్న జలశ్వాస కుహరం. బి. ఫిలో బ్రాంక్, 1. స్కాఫోసేటెల్ 2. పోడోబ్రాంక్ 3. ఆర్ట్రో బ్రాంక్ 4. గమన పాదాలు 5. ఫ్లూరో బ్రాంక్లు 6. మొప్ప కక్ష్య 7. మొప్ప ఫలకాలు 8. రెండు వరుసలలో ఉన్న మొప్ప ఫలకాలు.

మొప్ప నిర్మాణము:

ప్రతి మొప్ప అర్థచంద్రాకృతిలో ఉంటుంది. పూర్వ ప్రాంతములోని మొప్పలు చిన్నవిగా ఉండి పరాంతము వెదుతున్న కొద్దీ అతి పెద్దవిగా ఉంటాయి. (పటం: 18.7)

ప్రతి మొప్ప రెండు వరుసలలో పలుచని మొద్ద ఫలకాలతో ఉంటుంది. మొప్ప ఫలకాలు పుస్తకంలో పేజీలవలె అమరి ఉంటాయి. ఇవి ఒక నిలుపు ఆక్షానికి అతికి ఉంటాయి. ఈ విధమైన మొప్పలను ఫిల్లోబ్రాండ్ అనీ (Phyllobranch) అంటారు. పేలిమాన్ లో ఎనిమిది జతల మొప్పలు ఫిల్లో బ్రాంక్లు. మొప్ప ఫలకాలు నిలుపు అక్షంకు లంబకోణంలో వుంటుంది. ఇవి రెండు కొనలలో చిన్నవిగా వుండి మధ్యలో క్రమంగా పెద్దవిగా వుంటాయి. రెండు వరుసల మొప్ప ఫలకాల మధ్యలో ఆయుత గాడి ఉంటుంది.

శ్వాస క్రియా విధానం:

స్క్విఫోనేటైట్ చలనంవల్ల జలశ్వాస కుహరంలోనికి నీరు నిరంతరం ఒక ప్రవాహం వలె ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. నీరు మొట్టమొదట, ఎపిఫ్రియోల్ల మధ్యగా వెళుతుంది. మొట్టమొదట నున్న రక్తనాళాలు వాయువుల పరస్పర మార్పిడి చేస్తాయి. రక్తంలో హిమోగ్లూబిన్ అను శ్వాస వర్ణకము ఉంటుంది.

18.8 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ


హిమోగ్లూబిన్ అను రాగిధాతువు కలిగియున్న శ్వాసవర్ణకము వలన పేలిమాన్ లో రక్తము నిలివర్ణంలో ఉంటుంది. దీనిరక్తము నీటివలె పచ్చగా ఉంటుంది. ఇందులో ఆమీబో సైటులు ఉంటాయి.

హృదయంలో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ విప్పిత (Open) రకానికి చెందినది. ఇందులో హృదయావరణము (Pericardium), గుండె, ధమనులు (Arteries), రిక్టిగూలు (Sinuses of lacunae), రక్త కుల్యలు (Blood channel) ఉంటాయి.

హృదయావరణము: ఇది గుండెను ఆవరించి ఉరము పృష్ఠకుల్యము క్రిందనున్న విశాలమైన కుహరము. సమాంతరముగా, పలుచగానున్న విభజక పటలము హృదయావరణ యొక్క అడుగు భాగము (Floor)గా ఉంటుంది. ఇది శరీర కుడ్యానికి అతికి ఉంటుంది. ఈ కుహరము రక్తకుల్యల నుండి వచ్చిన రక్తముతో అసంపూర్ణంగా నిండి ఉంటుంది. హృదయావరణము నుండి రక్తము గుండెను చేరుతుంది.

గుండె: ఇది ముక్కోణాకారపు కండరయుత నిర్మాణము. ఇది హృదయావరణంలో ఉంటుంది. హృదయావరణంలో ఇది కార్డియో ఫైలోరిక్ మరియు పార్శ్వ పోగులను కండర పోగులచే తన స్థానంలో నిలకడగా ఉంటుంది. ఇది జతల కుల్యముఖాలు (Ostia) గుండెలోనికి తెరచుకుంటాయి. రక్తము హృదయావరణము నుండి ఈ కుల్యముఖముల ద్వారా గుండెను చేరుతుంది. కుల్యముఖాలతో ఉన్న కవాటాలు రక్తాన్ని ఒకే దిశలో ప్రవహింప చేస్తాయి.

ధమనులు: గుండె పూర్వ, పరాంతాల నుండి ధమనులు వెలువడతాయి. పూర్వంతములో మూడు ధమనులు ఉంటాయి. ఇవి ఒక మధ్య నేత్ర ధమని (Medium opthalmic artery) ఒక జత స్పర్శశృంగ ధమనులు (Antennary aftery) కుడి, ఎడమ స్పర్శశృంగ ధమనులు, నేత్రధమని ఐక్యమయి ముందులో సర్క్యులన్ సాఫ్టికన్ ను ఏర్పరుస్తాయి. నేత్రధమని శృంగికలకు, స్పర్శ శృంగాలకు, నేత్రాలకు శాఖలను సరఫరా చేస్తుంది. నేత్రధమని నుండి మరికొన్ని శాఖలు, కాలేయ వృక్షకానికి (కాలేయ ధమని), జీర్ణాశయానికి (గ్యాస్ట్రిక్ ధమని), హనువుల కండరాలకు (హనువు ధమని) రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. గుండె పరాంతం నుండి ఒక ధమని ఏర్పడి రెండు శాఖలుగా చీలుతుంది. అవి అధ్యాంత్ర ధమని (Supra-intestinal artery), ఉదర ఫలక ధమని (Sternal artery), అధ్యాంత్ర ధమని ఆంత్రానికి, ఉదరములోని పృష్ఠకండరాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. ఉదర ఫలక ధమని రెండు శాఖలుగా చీలి పూర్వశాఖ ఉరము ధమని (Thoracic artery) పరశాఖ ఉదర ధమనిగా (Abdominal artery) ఏర్పడతాయి. ఉరము ధమని ఉరము యొక్క ఉదర ఫలక భాగానికి, హనువులకు, జంభికలకు, జంభికా పాదాలకు మరియు మొదటి మూడుజతల నడచు కాళ్లకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. ఉదర ధమని ఉదరము యొక్క ఉదర భాగానికి, మిగిలిన రెండు జతల కాళ్లకు ఉదర ఉపాంగాలకు, వాటి వెనుకనున్న భాగాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది.



(పటం: 18.8) పేలిమాన్ -- ముఖ్య ధమనులు. 1. గుండె 2. కాలేయ - క్లోమధమని 3. స్పర్మశృంగ ధమని 4. జఠర ధమని 5. వృక్క ధమని 9. మధ్యనేత్ర ధమని 10. త్రోటి ధమని 11. నేత్ర ధమని 12. అధోహను ధమని 13. ఉరము నాడిసంధి 14. ఉదర ఫలక ధమని 15. హృదయావరణ ధమని 16. అధ్యాంత్ర ధమని.

రక్త ప్రసరణము: గుండె నుండి రక్తాన్ని తీసుకునిపోవు ధమనులు రక్తస్థలాల (Haemocoelic spaces) లోనికి ప్రవేశించి అక్కడ అవయవాలను రక్తంతో తడుపుతాయి. అక్కడ నుండి రక్తము కోటరాలలో ప్రవేశించి మరల అరుజతల బ్రాంకియల్ అభినాళాల (Afferent branchial) ద్వారా మొప్పలను చేరుతుంది. మొప్పలలో రక్తము శుభ్రం చేయబడి బ్రాంకియల్ అవనాళాల (Efferent branchial) ద్వారా హృదయావరణ కోటరాన్ని (Pericardial sinus)ను చేరుతుంది. ఇక్కడ నుండి రక్తము కుల్యాముఖాల (Ostia) ద్వారా గుండెను చేరుతుంది. మరల గుండె సంకోచించినప్పుడు రక్తము ధమనులు లోనికి ప్రవహిస్తుంది.

18.9 విసర్జన వ్యవస్థ

పేలిమాన్ లో విసర్జన అవయవాలు ఒక జత స్పర్మశృంగ గ్రంథులు (Antennary glands) లేదా హరిత గ్రంథులు (Green glands). ఇవి స్పర్మశృంగపు కోక్సాలో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క గ్రంథి బతాకి గింజింజ పరిమాణంలో ఉంటుంది. ఇందులో మూడు భాగాలు ఉంటాయి. 1. అంత్యకోశము. 2. గ్రంథి ప్లక్కుము. 3. సంచి (పటం: 19.9 ఎ)

1. అంత్యకోశము (End sac): ఇది చిన్నగా చిక్కుడు గింజి అకారంలో గ్రంథి పూర్వభాగంలో గ్రంథి ప్లక్కు లోపలివైపు ఉంటుంది. అంత్యకోశము లోపలి కుడ్యము కిరణ పద్ధతిలో ఏర్పడిన అనేక విభాగాలతో ఉంటుంది. ఇవి కోశములోని కుహరములోనికి నొచ్చుకొని ఉంటాయి. గ్రంథి ప్లక్కుముతో ఒక రంధ్రం ద్వారా సంబంధించి ఉంటాయి. అంత్యకోశం యొక్క కుడ్యం రెండు స్తరాలలో ఉంటుంది. అవి బాహ్యంగా ఉన్న దళసరి సంయోజక కణజాల స్తరము. లోపలివైపున ఉన్న పలుచని ఉపకణ కణస్తరము.

గ్రంథి ప్లక్కుము: ఇది అంత్యకోశము కన్నా పెద్ద భాగము. ఇందులో మెలికలు తిరిగి శాకీయంగా ఉన్న నాళికల సమూహంలో ఉంటుంది. ఇవి అంత్యకోశం లోనికి ఒక విక్యరంధ్రము (Common opening) ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. వ్యతిరేఖ దిశలో అనేక రంధ్రాల ద్వారా ఇది సంచితలోనికి తెరుచుకుంటుంది. ప్రతి ఒక నాళిక ఒకే కణపారతో ఉన్న విసర్జక ఉపకళ కణాలతో ఉంటుంది.

సంచి (Bladder): ఇది అంత్యకోశమునకు లోపలి వైపునున్న పలుచని సంచి వంటి నిర్మాణము. దీనిలోపలి మధ్యం నుండి ఒక పొట్టి మూత్రనాళం ఏర్పడుతుంది. ఇది పుర్రు శృంగపు కోక్సకు లోపలి వైపు విసర్జక రంధ్రము (Excretory Pore) ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది.

పార్శ్వ నాళాలు (Lateral ducts): ప్రతి ఒక పుర్రు శృంగ గ్రంథి నుండి ఒక ఇరుకైన వాహిక ఏర్పడుతుంది. ఇది పరభాగం వైపు ప్రయాణించి పార్శ్వనాళంగా ఏర్పడుతుంది. రెండు వైపుల ఉన్న పార్శ్వనాళాలు ఒక లఘునాళముచే Transverse duct) కలుపబడి ఉంటాయి. పార్శ్వనాళాలు పొడవైన మూత్రగోళి (Reval Sac) లోనికి తెరుచుకుంటాయి.

మూత్రగోళి (Renal sac): ఇది పృష్ఠవహిని, పూర్వ జీర్ణాశయానికి మధ్యన ఉన్న పలుచని గోడలతో ఉన్న పొడవైన సంచి. దీని కుడ్యము ఒకపొరతో మున్న పలుచని ఉపకణాలతో ఉంటుంది.

హరిత గ్రంథుల విసర్జన క్రియ: గ్రంథి ప్లక్షమునకు, పుర్రుశృంగ ధమని ద్వారా రక్తము పరభాగం చేరుబడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా రెండు విధులను నిర్వర్తిస్తాయి. 1. నత్రజని సంబంధమైన మలిన పదార్థాలను విసర్జించుట. 2. ద్రవాభిసరణ క్రమత.

అంత్యకోశము అమ్మోనియా విసర్జించు క్రియ జరుపుతుంది. యూరిక్ ఆమ్లము దీనికి సంబంధించిన ఇతర నత్రజని సంబంధమైన మలిన పదార్థాలను ఇతర భాగాలు విసర్జిస్తాయి. విసర్జక ద్రవాలు ప్రభవంగా సంచిలోనికి చేరుతాయి. తరువాత అక్కడ నుండి అవి విసర్జక రంధ్రం ద్వారా విసర్జింపబడతాయి.

చర్మము (Integument) కూడా మలిన పదార్థాలను సేకరిస్తుంది. కుబుస విసర్జన (Ecdysis or Moul) కాలంలో ఇవి బాహ్య కవచంతోపాటు విసర్జింపబడుతాయి.


18.10 నాడీవ్యవస్థ

నాడీ వ్యవస్థలో కేంద్రీయ నాడీవ్యవస్థ (Central nervous system), పరిధీయనాడీ వ్యవస్థ (Peripheral nervous system)లు ఉంటాయి. (పటం: 19.9 బి)

కేంద్రీయ నాడీవ్యవస్థ ఇది అనేక నాడీ సంధుల సంయోజకాలతో ఉంటుంది. మెదడు లేదా అనుమస్తిష్క నాడీసంధి లేదా అధ్యాహార వాహికా నాడీ సంధి రెండు లంబికలతో ఉంటుంది. ఇది త్రోటి ఆధార ప్రాంతంలో ఆహార వాహిక పూర్వభాగమున ఉంటూ మెదడు నుండి నేత్రాలకు, శృంగికలకు, పుర్రుశృంగాలకు, ప్రైసెడవికి నాడులు బయలుదేరుతాయి. మెదడు పరభాగం నుండి రెండు పర్యాహార వాహిక సంయోజకాలు (Cirumoesophageal connection) ఉద్భవిస్తాయి. ఇవి ఉదరం క్రింద ఆహార వాహికా నాడీసంధి (Suboesophageal ganglion)తో కలుస్తాయి. రొయ్యలలో ఉరోనాడీసంధి (Thoracic ganglion) బాగా అభివృద్ధి చెందినందున కింది ఆహారవాహికా నాడీసంధి అంత స్పష్టంగా కనిపించదు.

రెండు పర్యాహార వాహిక సంయోజకాల పరభాగంలో ఒక సున్నితమైన అడ్డు సంయోజకంతో కలుపబడి ఉంటుంది.

ఉరోనాడీ సంధి సముదాయము పొడవుగా ఉన్న నాడీ సముదాయము. ఇది శిరోవక్షము, ఉదర మధ్యరేఖలో ఉంటుంది. ఇది పదకొండు జతల నాడీసంధుల కలయిక వల ఏర్పడినది. ఇది మానవులకు, ప్రభు, ద్వితీయ జంతుకాలకు, అన్ని జంతుకా పాదాలకు, అన్ని వడచు కాళ్లకు నాడులను పంపుతుంది. ఉరో నాడీ సంధిలో



(పటం: 18.9) పేలిమాన్ ఎ. విసర్జక అవయవము. 1. మూత్రకోశము 2. వృక్క రంధ్రము 3. అంత్య కోశము 4. లాబిరింథ్ 5. పార్శ్వశృంగిక నాడి 6. అడ్డునాళము 7. మూత్రగోణి. బి. నాడివ్యవస్థ 1. పార్శ్వశృంగిక నాడి 2. పార్శ్వశృంగికనాడి 3. మొదడు 4. పర్యాపార వాహికా సంయోజకము 5. ఉరో నాడిసంధి 6. గమన పాదాలకు నాడులు 7. మొదటి ఉదరము నాడి సంధి 8. ప్లియోపాడ్స్, కండరాలకు నాడులు 9. ఆరవ ఉదర నాడి సంధి.

ఉదర ఫలక ధమని వెళ్లడానికి మార్గము (Opening) ఏర్పడుతుంది. ఉరోనాడి సంధి నుండి ఉదర నాడిదండము (Ventral nerve cord) బయలుదేరుతుంది. ఇది ద్వంద నాడి. ఇది ఆరు ఉదర నాడి సంధులతో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఉదర ఖండితము ఒక్కొక్క నాడిసంధి, మూడవతల నాడులు ఉంటాయి. ఇవి ప్లియోపాడ్స్కు, కండరాలకు నాడులను పంపుతాయి. ఆవ్యర నాడిసంధి మిగతా వాటికన్నా చాలా పెద్దది. దీనినుండి నాడులు యూరోపాడ్స్కు, వాల ఖండానికి, ఇతర పాద భాగాలకు వెళతాయి.


18.10.1 జ్ఞానేంద్రియాలు:

రొయ్యల జ్ఞానేంద్రియాలు ఒక జత నేత్రాలు, ఒక జత సంతులన కోశాలు, స్పర్శ స్పూణ అవయవాలు.

i) సంయుక్త నేత్రాలు: ఒక జత సంయుక్త నేత్రాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక నేత్రము, తోటి, శృంగికల మధ్య ఆర్కిటల్ గుంతతో పాట్టి రెండు కణుపులతో ఉన్న వృంతము మీద ఉంటుంది. ఇది సంయుక్త నిర్మాణము. దీనిలో అనేకమైన నేత్రాంశము లేదా ఓసెల్లె అనబడు సరళ ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఇటువంటి నిర్మాణాలు అర్థ్రపాద జీవులలో సాధారణంగా ఉంటాయి. (పటం: 18.10)

సంయుక్త నేత్రం యొక్క సూక్ష్మ నిర్మాణము (పటం: 18.10): వేత్రానికి బాహ్యంగా ఉన్న పార శుక్లపటలము (Cornia) ఇది పారదర్శకంగా ఉన్న అవభాసిని నిర్మితము. శుక్లపటలము అనేక చతురస్ర లేక దీర్ఘ చతురస్ర నేత్రాంశ ముఖముల (Facets)లో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక నేత్రాంశ ముఖము కింద ఒక నేత్రాంశము (Ommatidium) ఉంటుంది. నేత్రాంశములో ఈ క్రింది భాగాలు ఉంటాయి.

1. ప్రతి ఒక నేత్రాంశ ముఖము మధ్య ప్రాంతములో దళసరియై ద్వికుంభ కటకాన్ని (Biconvex lens) ఏర్పరుస్తుంది.
2. కటకాన్ని పలుచగా ఉన్న రెండు కార్నియోజన్ కణాలు స్రవిస్తాయి. ఈ జత కార్నియోజన్ కణాలు బహిష్టచం నుంచి ఏర్పడుతాయి. కుటుస విసర్జన తరువాత కొత్త శుక్లపటల స్తరము ఏర్పడుతుంది.
3. కార్నియోజన్ కణాల క్రింద నాలుగు పొడవైన శంఖుకణాలు (Cone cells) లేదా విట్రిల్లార్ కణాలు (Vitrellar cells) ఉంటాయి. ఇవి వెలుపలివైపు వెడల్పుగా ఉంటాయి. లోపలివైపు పొడవుగా ఉండి మొనదేలి ఉంటాయి.



(పటం: 18.10) పేరిమాన్ - ఎ.సంయుక్త నేత్రము. బి.సంయుక్త నేత్ర మిలుపుకోత, సి.నేత్రాంశము (నిలుపు కోత). 1. కన్ను 2. రెండు కణుపులలో ఉన్న వృంతము 3. పసుముఖాలు 4. స్పటిక శంకువు 5. పరావర్తక దండము 6. నాడీ తంతువులు 7. నేత్రవాడీ సంధులు 8. కండరాలు 9. శుక్లపటలము 10.

కార్నియోజన్ కణాలు 11. శంఖు కణాలు 12. తారక వర్ణదము 13. నేత్రపటల కణాలు 14. నేత్రపటల వర్ణదము 15. ఆధారత్వము.


4. శంఖుకణాలు స్పటిక శంఖువు (Crystalline cone)ను ఉత్పత్తి చేసి దానిచుట్టూ ఆవరించి ఉంటాయి.
5. శుక్లపటలం నుండి శంఖుకణాల వరకు ఉన్న నేత్రాంశ భాగాన్ని దై ఆప్టికల్ భాగము (Dioptical region) అంటారు.

6. కాంతిని దాని దిగువ ఉండే ప్రాంతం పైకి కేంద్రీకరింప చేయడానికి దై అప్టికల్ ప్రాంతము సంబంధించి ఉంటుంది. ఈ దిగువ ఉండే భాగాన్ని గ్రాహక లేదా రెటినల్ ప్రాంతం (Receptor or retinal region) అంటారు.
7. స్థితిక శంఖు క్రింద పొడవుగా, కదురు ఆకృతిలో ఉన్న పరావర్తక దండము (Rhabdome) అనే భాగం ఉంటుంది.
8. పరావర్తక దండానికి చుట్టూ పొడవైన ఏడు నేత్రపటల కణాలు (Retinular cells) ఉంటాయి. వీటిని రెటిన్యులే (Retinulae) అని కూడా అంటారు. ఇవి పరావర్తక దండాన్ని ఏర్పరచటమే కాకుండా దానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలను కూడా అందజేస్తాయి.
9. రాబ్డోమ్, రెటిన్యులర్ కణాలు కలిసి నేత్రాంశము యొక్క గ్రాహక భాగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
10. గ్రాహక భాగం లోపలి చివరలు ఒక ఆధారత్వచంపైన నిలిచి ఉంటాయి. ఈ త్వచం క్రింద ఉండే నేత్రనాడులతోను, నాడీ సంధులతోను సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఈ నాడీ సంధులు దృక్ నాడీ (Optic nerve) తో మెదడును కలుపుతాయి.
11. ప్రతి నేత్రాంశము దాని ప్రక్కన ఉన్న నేత్రాంశముతో ఒక వర్ణక ఆచ్ఛాదముచే (Pigmented sheath) వేరుచేయబడి ఉంటుంది. సమీప ప్రాంతం (Proximal) లోని ఆచ్ఛాదాన్ని రెటినల్ కర్ణకముని (Retinal Pigment) అంటారు. దూర ప్రాంతంలోని వర్ణకాన్ని (Distal pigment) పరితేరక వర్ణకముని (Iris pigment) అంటారు. రెటినల్ వర్ణకము రాబ్డోమ్ను చుట్టి ఉంటాయి. పరితేరక వర్ణకము స్థితిక శంఖువును చుట్టివుంటుంది.

నేత్రము పనిచేయు విధము: ఈ నేత్రాలు పనిచేయు విధానము చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది. అన్ని నేత్రాంశాల ద్వారా కాంతి ప్రసరిస్తుంది. ఒక్కొక్క నేత్రాంశము ఒకే ప్రతిబింబము యొక్క చిన్న చిన్న భాగాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అందువల్ల ఈ నేత్రంలో ఏర్పడే ప్రతిబింబము అన్ని నేత్రాంశాల సాముదాయక ప్రతిబింబము (Combined effect of all ommatidia). దీనిని మొజాయిక్ దృశ్యము (Mosaic vision) అంటారు.

పేలిమాన్ నంటి రాత్రించరాల (Nocturnal)లో ఏర్పడిన ప్రతిబింబము సూపర్ పొజిషన్ (Super position) ప్రతిబింబము అంటారు. ఇది తక్కువ కాంతిలో కూడా చూడగలుగుతుంది. దివాంచర (Diurnal) క్రస్టేసియన్లలో సంయుక్త నేత్రాలు ఎపొజిషన్ లేక మొజాయిక్ ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

ii) సంతులన కోశాలు: ఇవి ఒక జత చిన్నవి, కూడా ఆకారములో ఉన్న నిర్మాణాలు. ఇవి అవభాసినితో



(పటం: 18.11) పెలిమాన్ ఎ.సంతులన కోశం (అ) ఇన్ సైటు; (ఆ) సంతులన కోశం అడ్డుకోత 1. క్లెర్ 2. కోక్స 3. ప్రీకోక్స 4. సంతులన కోశం 5. సంతులన కోశనాడి 6. పుర్యకృతిక నాడి 7. అవభాసిని 8. ఆటోలిథ్ 8. గ్రాహక కూకాలు. బి. జ్ఞాన నిర్మాణాలు. (అ) పుర్య కూకము; (ఆ) పూణ కూకము 1. చార్ప్ 2. షెడ్ 3. అవభాసిని 4. క్లెర్

తయారయిన గుండ్రని సంచివలె ఉంటాయి. ప్రతి సంచులన కోశం (Statocyst) శృంగిక ప్రీకోక్సాలో ఉంటుంది. ఇది సన్నని రోహాలవంటి జ్ఞానశకాల సంచివంటి కుహరాన్ని అంతర్వేష్టించి ఉంటాయి. వీటిమధ్య ఇసుక రేణువులు ఉంటాయి. వీటిని స్టేటోలిత్లు (Statoliths) అంటారు. సంచులన కోశంనకు స్పర్శశృంగ నాడీశాఖ అయిన సంచులన కోశ నాడి నాడులను సరఫరా చేస్తుంది. సంచుల కోశం సమతాపీతిని, తుల్యత సాధించే జ్ఞానేంద్రియము (పటం: 19.11 ఎ).

iii) స్పర్శ జ్ఞానేంద్రియాలు: ఇవి స్పర్శశృంగాల యొక్క కశాభాంమీద, ఇతర ఉపాంగాల మీద అనేక సంఖ్యలో ఉంటాయి. వీటిని జ్ఞాన శూకాలు అంటారు. ప్రతిస్పర్శ శూకంలో ఒకమూల కణుపు లేదా షాఫ్ట్ (Shaft) అను భాగము, రెండవ కణుపును బ్లేడ్ (Blade) అంటారు. ప్రతి శూకానికి ఒకనాడి శాఖ ఉంటుంది.

ప్రమాణశూకాలు: ఇవి శృంగిక యొక్క బ్లేడ్ రెండు కశాభాల మధ్య ఉన్న సన్నని కశాభం మీద ఉంటాయి. ఇవి కూడా షాఫ్ట్ను, బ్లేడ్ను కలిగి ఉంటాయి. శృంగిక నాడినుంచి చిన్న శాఖలు, ప్రమాణశూకాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ శూకాలు ప్రమాణ స్పర్శను కలిగి ఉంటాయి.

18.11 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ:

పేలిమాన్ ఏకలింగ జీవి ఇవి లైంగిక ద్వీరూపతను ప్రదర్శిస్తాయి. మగ జీవులలో రెండవ జత కీలెట్ కాళ్ళు పాడవుగా, దృఢంగా ఉంటాయి. నాటిమీద కంటకాలు, శూకాలు దట్టంగా కప్పి ఉంటాయి. మగజీవులలో జననేంద్రియ రంధ్రము ఐదవ పెరియోపాడ్కు చెందిన అర్థ్రోడియల్ పొరమీద తెరచుకుంటుంది. స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రం 3వ జత పెరియోపాడ్ కోక్సామీద ఉంటుంది.


పురుష జననేంద్రియాలు: ఇందులో ఒక జత ముష్కాలు, ఒక జత శుక్ర వాహికలు, ఒక జత శుక్రాశయాలు (Seminal vesicles), పురుష జననేంద్రియ రంధ్రాలు ఉంటాయి (పటం: 18.12 ఎ)

ఒక జత ముష్కాలు గుండె, కాలేయ వ్యక్తకాల మధ్య మెత్తగా పాడవుగా ఉన్న నిర్మాణాలు, పూర్వప్రాంతంలో ఇవి రెండూ కలిసిపోయి ఐక్యలంబికను ఏర్పరుస్తాయి. పరప్రాంతంలో ఇవి రెండూ వేరుగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ముష్కము యొక్క పరప్రాంతం నుండి పాడవుగా, మెలికలు తిరిగిన నాళిక ఏర్పడుతుంది. దీనిని శుక్రవాహిక అంటారు. ఇది క్రిందుగా ప్రయాణించి పరభాగంలో ఐదవ పెరియోపాడ్కు చెందిన శుక్రాశయమును సంచివంటి నిర్మాణమును ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ శుక్రకణాలు శుక్రగుళికల రూపంలో నిలువ ఉంటాయి.

స్త్రీ జననేంద్రియాలు: ఒక జత స్త్రీ బీజకోశాలు, ఒక జత స్త్రీ బీజవాహికలు, స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రము ఉంటాయి. స్త్రీ బీజకోశాలు తెల్లగా దట్టంగా ఉండి కొడవలి ఆకారము (Sickle shaped)లో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఈ బీజకోశాల కొనలు రెండూ దగ్గరగా చేరి ఉంటాయి. సాధారణంగా వీటి పరిమాణము (Size) ఆకారము (Shape) జీవిసంతానోత్పత్తి దశను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. పలుచని గోడలతో ఉన్న పొట్టిగా, వెడల్పయిన ఒక జత స్త్రీ బీజవాహికలు ఉంటాయి. ఇవి మూడవ జత వడిచేకాళ్ళ (పెరియోపాడ్స్). కోక్సాలో బయటకు తెరుచుకుంటాయి. (పటం: 18.12 బి)

పేలిమాన్లో సంతానోత్పత్తి కాలం మే నుండి జూలై వరకు ఉంటుంది. ఫలదీకరణము బాహ్యంగా జరగనును. స్త్రీజీవి అసంఖ్యాకంగా గుడ్లను పెడుతుంది. ఫలదీకరణం చెందిన తరువాత అందాలన్నీ ప్లయోపాడ్ శూకాలకు

అతుక్కుంటాయి. పేరిమాన్ లో పిండాభివృద్ధి నేరుగా (Direct)గా జరుగుతుంది. దీంభక దశ ఉండదు. కాని పీనియన్ (సముద్రపు రొయ్య)లో అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా (Indirect)గా జరుగుతుంది. ప్రాథ జీవిగా రూపక్రియ జరిగే ముందు వాస్టియన్, ప్రోటోజోవియా, మైసిస్ అను దీంభక దశలను అనుభవిస్తుంది.



(పటం: 18.12) పేరిమాన్. ఎ. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ. బి. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ. 1. ముష్కము 2. చుట్టలుగా నున్న శుక్రవాహిక 3. శుక్రవాహిక 4. శుక్రకాశయము 5. బదవగమన పాదము యొక్క కోక్కా 6. పురుష జననేంద్రియ రంధ్రము 7. స్త్రీ బీజకోశం 8. స్త్రీ బీజవాహిక 9. స్త్రీ జననేంద్రియ రంధ్రము 10. మూడవగమన పాదము యొక్క కోక్కా.

18.12 స్వపరిశీలన

1. రొయ్యలో ఉండే వివిధ ఉపాంగాలను గుర్తింపుము. అన్ని ఉపాంగాల మౌలిక నిర్మాణం ఒకే ప్రాతిపదికపై ఉంది. అంటే ఇవన్నీ కణుపులు పాదభండితాలతో నిర్మితమైనాయి. వరసగా మూలభాగం నుండి వీటి పేర్లు: _____, _____, _____.
2. కాలేయ క్లోమం _____, _____ అనే ఎన్ డైవ్ లతో కూడిన జీర్ణసావాలను స్రవిస్తుంది.
3. రొయ్యలో బాగా అభివృద్ధి చెందినట్టి పుంధించే గుండె, ధమనులు ఏర్పడినప్పటికీ, రక్తం అంతా _____ లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. తిరిగి వాటి నుండి గుండెకు పోతుంది.

18.13 సారాంశం

1. పేరిమాన్ మంచి నీటి రొయ్య ఇది క్రస్టేసియా విభాగ జీవులకు ఉదాహరణ.
2. శిలస్సు, వక్షము బిక్కుముయి శిరోవక్షముగా ఏర్పడుతుంది.
3. ప్రతి ఒక భండితంలో ద్విశాఖీయ ఉపాంగాలు ఉంటాయి.
4. జీర్ణకాయము అవధాసినితో ఏర్పడిన దళసరి ఫలకాలను, కవాలాలను కలిగి ఉంటుంది.

5. కాలేయ వ్యక్తకము జీర్ణ గంధి.
6. మొప్పలు శ్వాస అవయవాలు.
7. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ విస్తృత రకానికి (Open) చెందినది. రక్తము పర్యాంతరాలకు కుహరాన్ని నింపుతుంది.
8. స్పర్శశృంగ లేదా హరిత గ్రంధులు విసర్జక అవయవాలు.
9. ఒక జత సంయుక్త నేత్రాలు కదిలేశక్తిగల నేత్రవృంతాల మీద ఉంటాయి.
10. ఏకలింగ జీవులు, లైంగిక ద్విరూపకత ఉంటుంది.
11. పిండాభివృద్ధి నేరుగా జరుగుతుంది.

18.14 స్వపరిశీలనం - జవాబులు

1. పథమ పాదాంగం, అంతం పాదాంగం, బహిః పాదాంగం
2. ప్రాటిమేస్లు, లైఫేస్లు
3. కోటరాల

18.15 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. రొయ్యలోని వివిధ ఉపాంగముల గురించి వ్రాయుము.
 2. పేలిమూన్ జీర్ణవ్యవస్థను వివరించి. జీర్ణక్రియా విధానమును తెలపండి.
 3. రొయ్య శ్వాస విధానాన్ని వివరించండి.
 4. రొయ్య రక్తప్రసరణ వ్యవస్థను వివరింపుము.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. రొయ్యలోని మొప్ప నిర్మాణమును వివరింపుము.
 2. హరిత గ్రంధి నిర్మాణమును తెలిపి, అది చేయు పనిని తెలుపుము.

భాగము-19 ఒనైకోఫర సాధారణ లక్షణాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు

విషయకమము

19. 1 ఉద్దేశ్యం
19. 2 ఉపోద్ఘాతం
19. 3 బాహ్య నిర్మాణము
19. 4 శరీర అంతర్ నిర్మాణము
19. 5 భౌగోళిక విస్తరణ
19. 6 పెరిపేటన్ సంబంధ బాంధవ్యాలు
 - 19.6.1 అనెలిడా లక్షణాలు
 - 19.6.2 ఆర్థోపాడ లక్షణాలు
 - 19.6.3 పెరిపేటన్ ప్రత్యేక లక్షణాలు
 - 19.6.4 ముంస్కా జీవుల లక్షణాలు
19. 7 వర్గస్థాయి
19. 8 స్వపరిశీలన
19. 9 సారాంశం
- 19.10 స్వపరిశీలన జవాబులు
- 19.11 సమూహ ప్రశ్నలు

19.1 లక్ష్యం, ఉద్దేశ్యం

ఈ పాఠ్యాంశములో రెండు వర్గాల లక్షణాలను కలిగి ఉన్న జీవిని వివరించడము వలన వాటిలో సంబంధ బాంధవ్యాలు జంతుశాస్త్ర ప్రాముఖ్యత వివిధంగా ఉంటాయో తెలియజేస్తుంది.

ఇది చదవడం పూర్తి అయిన తరువాత ఈ సమూహంలోని మిశ్రమ వర్గలక్షణాలను పేరు ఆసక్తికరముగా తెలుపడమే గాక జంతు సామ్రాజ్యంలో ఈ జీవుల స్థాన విస్తరణం జంతుశాస్త్రవేత్తలకు ఎట్టి క్లిష్టమనుష్య అయిందో అర్థం చేయగలుగుతావు.

19.2 ఉపోద్ఘాతం


ఒనైకోఫార విభాగంలో భూచర ఆర్థోపాడ జీవులు వుంటాయి. ఒనైకోఫార జీవులను అనెలిడా ఆర్థోపాడ జీవుల మధ్యవున్న జీవులుగా వివరించారు. ఈ ఆర్థోపాడ జీవులకు అనెలిడా జీవులు సాధారణ శరీర నిర్మాణము ఉంటుంది. ఆర్థోపాడ జీవుల లక్షణమైన బాహ్య కవచము (Exoskeleton) ఈ జీవులలో ఉండదు. దీనికి బదులు పీటికి మెత్తని ముఖ్ ముఖ్ వంటి అవభాసని ఉంటుంది. కణుపులలో (Joints) కూడిన ఉపాంగాలు ఉండవు. కాని అనేక పొట్టి గోళ్లలో ఉన్న ఖండితరహిత ఉపాంగాలు జతలలో ఉంటాయి. శరీర కుడ్యములో వర్తుల, ఆయత కండరాల స్తరాలు ఉంటాయి. శరీర కుహర వాహికల (Coelomoducts)కు

తైలికలు ఉంటాయి. పిందాభివృద్ధి వేరుగా (Direct) జరుగుతుంది.

పూర్వము ఒనైకోఫరాలో ఒక ప్రజాతి పెరిపేటన్ మాత్రమే ఉన్న సముదాయమని భావించేవారు. అయితే ఇప్పుడు 70 బాతులను పన్నెండు ప్రజాతులలోను రెండు కుటుంబాలలో చేర్చినారు.

19.3 బాహ్య నిర్మాణము:

ఒనైకోఫర జీవులు స్త్రాపాకారంగా, గొంగళి పురుగుల వలె ఉంటాయి. గిల్లింగ్ (1825) మొట్ట మొదట వీటిని కమగొన్నప్పుడు స్లగ్ (Slug) వలె నున్న వీటి రూపాన్ని గమనించి మలస్కా జీవులని పారబడినాడు. పెరిపేటన్ జీవి శరీరము ఇండితముగా విభజింపబడి ఉంటుంది. దీనికి తల ఇంచు మించు పృష్టంగానే ఏర్పడి ఉంటుంది. దీని నిండి సుమారు 1.4 సెం.మీ నుండి 14 సెం.మీ వరకు ఉంటుంది. శరీర సుంతట సున్నితమైన అడ్డు ముడతలు ఉంటాయి. చర్మము అసంఖ్యాకమైన సూక్ష్మాంకురాలతో ఉంటుంది. ప్రతి సూక్ష్మాంకురములో కైటిన్ కంటకము ఉంటుంది. ఒక జత స్పర్శ శృంగాలు, ఒక జత నేత్రాలు, ఒక జత దవడలు, ఒక జత పొట్టిగా ఉన్న ముఖ సూక్ష్మాంకురాలు (Oral papillae) తల మీద ఉంటాయి. స్పర్శ శృంగాలు సూక్ష్మ కంటకాలున్న అనేక వలయాకార నిర్మాణాలచే ఏర్పడినది. నోరు ఉదరంగా ఉంటుంది. నోటికి ఇరువైపుల పొట్టిగా ఉన్న



పటం: 19.1 పెరిపేటన్ ఏ.బాహ్య లక్షణాలు. బి.పూర్వంత భాగపు ఉదర దృశ్యము. 1. స్పర్శశృంగము 2. నోరు 3. పాదములు 4. పాయువు 5. ముఖ సూక్ష్మాంకురాలు 6. నాలుక 7. అధోహనువులు 8. అవ్యప్రాంతపు లంబికలు 9. మొదటి జత పాదాలు.

సూక్ష్మాంకురాలు ఉంటాయి. జిగులు గ్రంథి యొక్క రంధ్రాలు సూక్ష్మాంకురాలు చివరలలో ఉంటాయి. ఒకజత హనువులు లేదా దడవలు నోటికి పార్శ్వాలలో ఉంటాయి. సూక్ష్మాంకురాలు, దవడలు రూపాంతరము చెందిన ఉపాంగాలు కాళ్ల సంఖ్య జాతులను బట్టి లింగభేదాన్ని అనుసరించి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇవి సాధారణంగా 14 నుంచి 43 జతల వరకు ఉంటాయి. మూడు లేక ఆరు వలయాకారములోనున్న మెత్తలు కాలుచివర భాగములో ఉదరంగా ఉంటాయి. నడచుచున్నప్పుడు కాలుకు ఈ మెత్తలు పూతను ఇస్తాయి (పటం: 19.1)

19.4 శరీర అంతర్ నిర్మాణము

228 శరీర కుద్యము పలుచని, పారగమ్య లక్షణగల అవభాసినితో ఉంటుంది. దీని కిందుగ ఏకకణ స్తరముతో నున్న

బాహ్య చర్మము (Epidermis) ఉంటుంది. చర్మీయత్యచము (Dermis) మూడు స్తరాల కండరాలు దీని తర్వాత ఉంటాయి. కండర స్తరాలు వర్తుల, ఆయత, అవనమ రకానికి చెందినవి. దీని కారణంగా శరీర కుద్యము అనెలిడాలో వలె కండరయుత చర్మము (Dermomuscular)తో ఉంటుంది. (ఘం: 19.2)

కండర విభజికాల వలన శరీర కుహరము ఒక మాధ్యమిక రెండు పార్శ్వ అరలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. సీలోము బీజకోశ కుహరాలకు, వృక్కాలకు సంబంధించి కోశాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది. శరీర కుహరమొక రక్త కుహరము (Haemocoel).

పెరిపేటన్ కాళ్లతోను, శరీర భాగాల సంకోచ వ్యాకోచాల వలన గమనము జరుపుతుంది. సంకోచ తరంగాలు పూర్వభాగము నుండి పర భాగానికి విస్తరిస్తాయి. ఈ జీవిలో గమనము మందకొడిగా ఉంటుంది.


ఒనైకోఫర జీవులలో ఒక జత గ్రంధులు ముఖ సూక్ష్మాంకురము మీద తెరుచుకుంటాయి. ఇవి జిగల గ్రంధులు (Slime glands). ఇవి రూపాంతరము చెందిన కోక్సల్ గ్రంధులు (Coxal glands). ఈ జీవులు శత్రువుల నుండి రక్షించుకొను నప్పుడుకాని, ఆహార సేకరణ సమయములోగాని ఈ గ్రంధుల నుండి చిక్కిన ద్రవము సుమారు 50 పెం.మీ దూరము రెండు ప్రవాహాల వలె చిమ్ముతుంది. గాలి తగలగానే ఈ ద్రవము త్వరగా గట్టిపడుతుంది.

జీర్ణ వ్యవస్థలో నోరు, అస్యకుహరము, గ్రసని, ఆహార వాహిక, మధ్య ఆహార నాళము లేదా మధ్యాంత్రము (Midgut or Mesenteron) పురీష నాళము, పాయువు ఒక జత లాలాజల గ్రంధులు ఉంటాయి. ఉదరంగా నోరు రెండు ముఖ సూక్ష్మాంకురాల మధ్య ఉంటుంది. దీనిని ఆవరించి వలయాకారములో పెదవి ఉంటుంది. నోటిలో గోళ్లవలె నున్న లేక జత దవడలు ఉంటాయి. ఇది ఆహారాన్ని పట్టుకొని ముక్కలు చేయడానికి అనువుగా ఉంటాయి. నోటిమట్టా సూక్ష్మాంకురాల కలయిక వలన అస్యకుహరము ఏర్పడుతుంది. దీని తర్వాత దళసరి కుద్యముతో నున్న గ్రసని ఉంటుంది. ఇది ఒక ఇరుకైన ఆహార వాహికలో కలుస్తుంది. నోరు, అస్యకుహరము, గ్రసని, ఆహార వాహికలు కైటిన్ అంతర్వేష్టనంతో ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతము పూర్వాహార నాళము (Foregut) లేదా ఆద్యముఖము (Stomodaeum)ను ఏర్పరుస్తాయి. తరువాత భాగమైన మధ్యాంత్రము పరభాగము చివర వరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఇది పలుచని, కైటిన్ రహిత కుద్యము (Thin, non-chitinous wall)తో ఉంటుంది. పురీష నాళము కొంత మెలిక తిరిగి మధ్యాంత్రముపై నుండి పరాంతము చివర ఖండితములో పాయువు ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది. పురీష నాళము కైటిన్ అంతర్వేష్టనముతో ఉంటుంది. దీనిని అంత్యాహార నాళము (Hind gut) లేదా పాయుపథము (Proctodaeum) అని అంటారు. లాలాజల గ్రంధులు ఒక జత ఉంటాయి. ఇవి పొడవుగా, ఇరుకైన నాళాలతో ఉన్న రూపాంతరము చెందిన వృక్కాలు. ఇవి శరీర కుహరపు పార్శ్వ అరలలో ఉంటాయి. ఇవి గ్రసనిలోకి తెరుచుకుంటాయి.


ఒనైకోఫర జీవులు పరభక్షకాలు. ఇది నత్తలు, కీటకాలు, క్రిములు మొదలైన అకశేరుక జీవులను వేటాడి భక్షిస్తాయి. అనేక జాతుల చెదపురుగుల (Termites)ను ఆహారంగా తీసుకొనటానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతాయి.

రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఇతర అర్థోపాద జీవులలో వలె ఉంటుంది. గుండె హృదయావరణముతో ఉంటుంది. ఇది పొడవైన గొట్టమువలె ఉండి శరీరం పొడవునా ఉంటుంది. ఇది పూర్వాంత్రములో తెరుచుకుని పరాంతములో మూసుకుని ఉంటుంది. ప్రతి ఖండితము పార్శ్వాలలో ఒక జత కుల్యా ముఖాలు (Ostia) ఉంటాయి. కుల్యా ముఖాలు కవాటాలతో (Valve) ఉంటాయి. సంవృత (Closed) రక్తనాళాలు పెరిపేటన్ లో లేవు. రక్త కుహరములో నుంచి రక్తము, హృదయావరణ రంధ్రాల ద్వారా హృదయంలోకివస్తుంది. హృదయ సంకోచము వలన రక్తము శరీర కుహరములోనికి ప్రవేశిస్తుంది. రక్తము వర్ణరహితముగా ఉండి భక్షక అమీబోసైట్స్ ఉంటుంది.

వ్లితమైన వాయునాళాల శ్వాస అవయవాలు. ఇది అశాఖీయంగా (Unbranched) ఉంటాయి. వీటి కుడ్యాలు అడ్డుగా అమరిన పలుచని కైటిన్ ప్లేట్లతో ఉంటుంది. ఇటువంటి వాయునాళ సమూహాలు చర్మంమీద ఉన్న చిన్న గుంతలలో తెరుచుకుంటాయి. ఈ గుంతలను వాయునాళ గుంతలని (Tracheal pits) అంటారు. సూక్ష్మంగా ఉండే వీటి రంధ్రాలను శ్వాసరంధ్రాలని (Stigmata or Spiracles) అంటారు.



(పటం: 19.2) పెరిపేటన్ - అంతర్నిర్మాణము. 1. స్పర్శకృంగమునకు నాడి 2. మెదడు 3. విసర్జక అవయవములు 4. లాలాజల గ్రంథి 5. జిగురు గ్రంథి 6. కోక్సల్ గ్రంథి 7. పాయువు 8. పురీష వాళము 9. స్త్రీ బీజకోశం 10. స్త్రీ బీజవాహిక 11: గర్భాశయము 12. అడ్డుసంధాయకాలు 13. పార్శ్వ ఆయుతనాడి దండము 14. జీర్ణాశయ - ఆంత్రవాళము 15. ఆహార వాహిక 16. గ్రహవి 17. ముఖ సూక్ష్మాంకురాలు 18. కన్ను.



పటం: 19.3 పెరిపేటన్ - వాయు నాళపు గర్భము. 1. వాయురంధ్రము 2. వాయు నాళములు.

వృక్కాలు విసర్జక అవయవాలు. ఇవి ఖండిత క్రమముతో ఖండితానికి ఒక జత చొప్పున శరీర కుహరపు పార్శ్వ అరలలో ఉంటాయి. కాళ్లమూల భాగములో (Basalpart) ఇవి బయటకు తెరుచుకుంటాయి. ప్రతి వృక్కము పలుచని కుడ్యము పలుచని కుడ్యముతోనున్న లోపలి ఆశయము (Internal vesicle)తో ఉంటుంది. ఈ ఆశయము క్షీణించి సీలోమ్ సంబంధిత భాగముగా ఉంటుంది. దీని నుండి వృక్కము అనేక మెలికలు తిరిగిన నాళికగా ఏర్పడుతుంది. ఈ నాళిక చివరి భాగము పంచి వంటి అంత్యనాళిక (Terminal duct) లోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఈ నాళిక వృక్క రంధ్రము ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది. అంత్యనాళిక సంకోచించుకొనే శక్తిగల సంచివంటి నిర్మాణము. విసర్జక పదార్థాలు ఏ రూపంలో ఉంటాయో స్పష్టంగా తెలియదు. ఇంతకు ముందు వివరించినట్లుగా పూర్వ ప్రాంతములోని కొన్ని వృక్కాలు లాలాజల గ్రంథులుగా రూపాంతరము చెంది ఉంటాయి. స్త్రీ జీవులలో పరాంతములో నున్న వృక్కాలు బీజవాహికలుగా మార్పుచెంది ఉంటాయి.

శరీర కుహర పార్శ్వ అరలలో ఖండిత విన్యాసంతో ఖండితానికి జత చొప్పున కోక్సల్ లేదా క్రూరల్ గ్రంథులు (Crural glands) ఉంటాయి. వీటి నాళాలు, వృక్క రంధ్రాలకు ప్రక్కగా బయటకు తెరుచుకుంటాయి. వీటికి లైంగిక క్రియలతో సంబంధము ఉన్నట్లుగా భావిస్తారు.

ఈ గ్రంథులే కాకుండా మరికొన్ని నిర్మాణాలు కూడా పెరిపేటస్లో ఉన్నాయి. వీటిని కోక్సల్ లేదా క్రూరల్ అవయవాలు (Coxal or crural organs) అంటారు. ఇవి పలుచని కుడ్యాలతో ఉన్న ఆశయాలు. కాలు ఉదర భాగములో ఇవి బయటకు తెరుచుకుంటాయి. ఈ అవయవాలు చెమ్మను గ్రహించుటకు సహాయ పడతాయని భావిస్తారు.

నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు రెండు లంబికలతో ఉంటుంది. ఇది తలలో స్పష్టంగా ఉంటుంది. మెదడు నుండి రెండు ఆయత వాడులు ఉదర కుడ్యము మీద బయలు దేరుతాయి. ఇవి ఒకదాని కొకటి సమాంతరంగా (Parallel) శరీర కుహరపు పార్శ్వ అరలలో శరీరము పొడవునా విస్తరిస్తాయి. పొయుపు వెనక రెండు నాడీ దండాలు కలిసిపోతాయి. ఈ రెండు నాడీ దండాలను కలుపుతూ అనేక సంఖ్యలలో అడ్డు సంధాయకాలు ఉంటాయి. ఈ అమరిక వలన నాడీ వ్యవస్థ విచ్చైన ఆకారములో ఉంటుంది. మెదడు నుండి వాడులు పుర్వశృంగాలకు, నేత్రాలకు పరస్పరా చేస్తాయి. ప్రతి ఖండితములోను ఉదర పార్శ్వనాడీ దండాలకు నాడీ సంధులు ఉంటాయి. ఈ నాడీ సంధుల నుండి శరీర కుడ్యానికి, కాళ్లకు వాడులు పరస్పరా అవుతాయి. ప్రతి పుర్వశృంగ మూల భాగములో ఒక నేత్రము ఉంటుంది. నేత్రానికి క్లెటివ్ నిర్మితమైన పెద్ద కటకము (Chitinous lens) బాగుగా అభివృద్ధి చెందిన నేత్రపటల పరము (Retinal layer) ఉంటాయి. ఒకైకోఫర జీవులు రాత్రించరాదు. వెలుతురు నుండి తప్పకుంటాయి. సూక్ష్మాంకురాలు, చర్మము ఉపరి తరము మీదనున్న కొన్ని భాగాలలో జ్ఞానకణాలు ఉంటాయి.

పెరిపేటస్లో లింగభేదము ఉంటుంది. పాధారణంగా పురుషజీవి స్త్రీజీవి కన్నా చిన్నదిగా ఉంటుంది. కాళ్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది.

స్త్రీ జీవిలో నాళికా రూపములోనున్న రెండు స్త్రీ బీజకోశాలు, ఒకజత స్త్రీ బీజ వాహికలు, రెండు గర్భాశయాలు ఉంటాయి. గర్భాశయాలు (Uterus) పొడవైన, వంకర తిరిగిన నాళాలు ఉంటాయి. ఇవి రెండూ కలిపి యోని (Vagina) ఏర్పడుతుంది. ఇది ఉదర తలంమీద చివరి జత కాళ్ల మధ్య స్త్రీ జనవేంద్రియ రంధ్రం ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది. కొన్ని జాతులలో శుక్రాధానము (Seminal receptacle) ఉంటుంది.

పురుష జీవులలో ఒకజత నాళాలవంటి ముష్కాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క ముష్కము శుక్రవాళికతో కలిపి ఉంటుంది. ఒక గరాటువంటి రంధ్రముతో ఇది శుక్రాశయము (Seminal vesicle) లోనికి తెరుచుకుంటుంది.

దీనిని అనుసరించి ఉన్న శుక్రవాహిక పొడవైన, ఇరుకైన, మెలికలు తిరిగిన నాళము. శుక్రవాహికలు రెండూ కలిసి స్కలన నాళము (Ejaculatory duct) ఏర్పడుతుంది. స్కలన నాళము స్త్రీ జీవిలోని బాహ్యరంధ్రమువలె చివరి జత కాళ్లమధ్య బయటికి తెరుచుకుంటుంది. స్కలన నాళపు పూర్వభాగములోని కుడ్డము గ్రంథియుతంగా ఉంటుంది. ఇది శుక్రకణాలను శుక్రగుళికలు (Spermatophores)గా ఏర్పరుస్తుంది.

శుక్రాధానము (Seminal receptacle) లేని పెరిపేటన్ జీవులలో శుక్రగుళికలు అండాన్ని ఒక నూతన పద్ధతిలో (Novel method) చేరుతాయి. మగజీవులు స్త్రీ జీవి శరీరముపైకి ప్రాకి శుక్రగుళికలను పార్శ్వాలలోకాని, పుష్టతలంపై గాని ఉంచుతాయి. ఇలా కొంత కాలం తరువాత స్త్రీ జీవి శరీరంపై ఈ గుళికలు సుమారుగా కూడుకుంటాయి. ఇవి రక్తములోని అమీబో సైటులను చైతన్యవంతము చేస్తాయి. అమీబో సైటులు ఈ ప్రాంతంలో చర్మమును కరిగిస్తాయి. శుక్రకణాలు ఈ విధంగా ఏర్పడిన రంధ్రము ద్వారా రక్తకుహరములోనికి ప్రవేశించి అక్కడ నుండి అండాన్ని చేరుతాయి. ఫలదీకరణ ఇందువలన జీవి శరీరములో జరుగుతుంది. శుక్రధానమున్న జాతులలో శుక్రకణాలు ఏ విధంగా అండాన్ని చేరుతాయో స్పష్టంగా తెలియదు.

ఒనైకోఫర జీవులు అండోత్పాదకాలు, అండోత్పాదక శిశుత్పాదకాలు లేదా శిశుత్పాదకాలు, అండోత్పాదక శిశుత్పాదక (Ovo-viviparous) జీవులే ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా తెలియుచున్నది. అభివృద్ధి దీర్ఘక దశలేకుండా, నేరుగా జరుగుతుంది. స్త్రీ జీవులు సుమారు ముప్పయి లేక కొంత ఎక్కువగానే పిల్ల జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. పిల్లజీవులు ప్రాథమికంగా పోలి ఉంటాయి.

19.5 భౌగోళిక విస్తరణ (Geographical Distribution)

పెరిపేటన్ జీవుల భౌగోళిక విస్తరణ చదవడానికి ముచ్చటగా ఉంటుంది. ఈ సముదాయంలో రెండు కుటుంబాలు ఉన్నవి. ఒక్కొక్కటి విచ్ఛిన్న విస్తరణకు (Discontinuous distribution) చక్కటి ఉదాహరణ. చిత్రమైన విషయమేమిటంటే ఈ రెండు కుటుంబాలలోని జాతులు ఒకేదగ్గర కనిపించవు. పెరిపాటిడే కుటుంబము భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉండగా, పెరిపెటాస్పిడే దక్షిణార్ధగోళాన పరిమితమై ఉంటుంది.

భూమధ్యరేఖ ప్రాంతము దక్షిణార్ధ గోళము ప్రాచీన యుగంలో ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉండేవని చాలా మంది భావిస్తారు. ఒనైకోఫర జీవుల పురాతన భౌగోళిక చరిత్ర, ఇతర జీవుల విస్తరణ ఈ భావనకు మరింత ఆధారాన్ని చేకూరుస్తుంది.

19.6 పెరిపేటన్ సంబంధ బాంధవ్యాలు

పెరిపేటన్ జీవికి అర్థిక ప్రాముఖ్యతలేదు. కాని జంతుశాస్త్రంలో అద్భుతమైన కుతూహలాన్ని కలుగజేసిన జీవి. దీనికి కారణము ఇది అర్ద్రోపాద అనెలిడా జీవుల లక్షణాలను, ఇతర జీవులలో లేని కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను, కలిగి ఉండటమే.

19.6.1 అనెలిడా లక్షణాలు:

1. మొండిగానున్న కొనలతో (Blunt ends)నున్న క్రిమిరూప శరీరము.
2. ఏజమైన తల లోపము.

3. కండరయుత చర్మము (Dermomuscular) శరీర కుద్యము. కండర స్తరాలు వర్తుల, ఆయత రకానికి చెందినవి.

4. నెమ్మదిగా ఉన్న గమనము.

5. పాలీకీటా జీవులలో వలెనున్న సరళ నేత్రాలు.

6. కీలులేని, బోలుగా, మొద్దుగాపున్న ఉపాంగాలు. ఇవి పాలీకీటాలోని పార్శ్యాంగాలవలె ఉంటాయి.

7. నేరుగా, నోరు పాయువుతోనున్న సరళమైన అహారనాళము.

8. ఖండిత విన్యాసముతోనున్న వృక్క ద్వందాలు.

9. జిగులు గ్రంథులు, కోక్సల్ గ్రంథులు కీటోపాదలో కొన్ని గ్రంథులవలె ఉంటాయి.

10. విసర్జక, ప్రత్యుత్పత్తి నాళాలలో శైలికలు ఉంటాయి.

19.6.2 ఆర్థ్రోపాడ లక్షణాలు:

1. స్పర్శశృంగాలు ఉంటాయి.

2. రేఖిత కండరాలతో ఉన్న హనువులు రూపాంతరము చెందిన ఉపాంగాలు.

3. గమనాంగాలు స్పష్టమైన కాళ్ళు, వీటికి కండరాలు, గోళ్ళు ఉంటాయి.

4. కైటిన్ తో ఏర్పడిన అవభాసిని.

5. శరీర కుహరము రక్తకుహరము.

6. సీలోము - విసర్జక, ప్రత్యుత్పత్తి నాళాలను ఆవరించియున్న చిన్న కుహరాలు.

7. లాలాజల గ్రంథులు రూపాంతరము చెందిన వృక్కాలు.

8. వృష్టంగా నాళికా రూపముతో (Tubular) ఉన్న గుండె దానిలోని పార్శ్వకుల్యా ముఖాలు (Ostia)

9. వాయునాళాలు శ్వాసావయవాలుగా పనిచేస్తాయి.

10. మెదడు పెద్దదిగా ఉండి ఆర్థ్రోపాడ జీవులలోవలె ఉంటుంది.

11. జననేంద్రియాలు ఆర్థ్రోపాడ జీవులలోవలె ఉంటుంది.

12. పిండాభివృద్ధిలో పోలికలు ఉంటాయి.

19.6.3 పెరిపేటన్ ప్రత్యేక లక్షణాలు:

పెరిపేటన్ జీవిలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఏ ఇతర జీవులకు సంబంధించి ఉండవు.

1. శరీరములో స్పష్టమైన బాహ్య ఖండిభవనము కనిపించదు.

2. అవభాసిని గరుకుగా ఉంటుంది. మఖ్ మల్ వంటి సూక్ష్మాంకురాలు ఉంటాయి. ఇటువంటి నిర్మాణము మరి ఏ ఇతర జీవులలో ఉండదు.

3. స్పర్శశృంగాలు ఆర్థ్రోపాడ జీవుల నిర్మాణ సామ్యాలు (Homologous) కావు.

4. మూడు ఖండితాలతోనున్న ఈ జీవితల అనెలిడా. ఆర్థ్రోపాడ జీవుల మాధ్యమిక నిర్మాణ లక్షణముతో ఉంటుంది.

5. ఒకే జత దవడలు మూత్రమే ఉంటాయి. వీటి కదలికలు పూర్వపర దిశలో ఉంటాయి.

6. గోళ్ళ కలిగిన కీళ్ళులేని కాళ్ళు.

7. శ్వాస రంధ్రాలు క్రమరహితంగా శరీరమంతటా విస్తరించి ఉంటాయి.

8. వేర్వేరుగానున్న రెండు ఉదరనాడి దండాలు వాటికి సంబంధించి అవృష్టంగా ఉన్న నాడి సంధులు.

9. నేత్ర నిర్మాణము కొంత సరళంగా ఉంటుంది.

10. జననేంద్రియాల నిర్మాణము.

19.6.4 మలస్కా జీవుల లక్షణాలు:

పెరిపేటన్ జీవి నత్త నిర్మాణమును కలిగి ఉండటము, నిచ్చేన ఆకారములోని వాచీవ్యవస్థ (Amphineura) ప్రోసో బ్రాంకియేట జీవులను పోలి ఉన్నందున పూర్వము వీటిని మలస్కా వర్గములో చేర్చినారు. ఇవి బాహ్యంగా ఉన్న పోలికలు మాత్రమే.

19.7 వర్గస్థాయి (Taxonomic position)

ఓనైకోఫర జీవులకు అనెలిడా - ఆర్థ్రోపాడ లక్షణాలు ఉంటాయి. అందువలన వీటిని ఈ రెండు వర్గాలకు మధ్యనున్న మధ్యస్థ జీవులని అంటారు. కాని ఇవి అనెలిడుల కంటే ఆర్థ్రోపాడ జీవులకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండే జీవులనిపిస్తుంది. బహుశః ఇవి ఆర్థ్రోపాడ వర్గ జీవుల పరిణామ ఆధార ప్రాంతము (Base of Arthropod line) నుండి ఒక శాఖగా ఏర్పడిన జీవులేమో అను భావన కలుగుతుంది. ఇటువంటి సంబంధ విశేషాలను ఆధారంగా తీసుకుని మాటన్ (1958) మరియు మిచిగన్ మిచిగన్ జంతుశాస్త్రవేత్తలు ఓనైకోఫర జీవులను ఆర్థ్రోపాడ వర్గములో ఒక భాగముగా లేదా ఉప వర్గముగా వివరించినారు. అయితే ప్రాథమిక లక్షణాలను కలిగి ఉండటము ఆర్థ్రోపాడ బాంధవ్యానికి అనందర్పమైన సంబంధంగా కనిపిస్తుంది. నిజము చెప్పాలంటే ఓనైకోఫర జీవులు అటు అనెలిడులు కాదు, ఇటు ఆర్థ్రోపాడ జీవులు కాదు. ఇవి ప్రత్యేక లక్షణాలతో ఏర్పడిన జీవులు. అందువలన వీటిని ఆర్థ్రోపాడ వర్గము నుండి వేరుచేసి ప్రత్యేక వర్గ ప్రతిపత్తిని ఇవ్వడము సమంజసముగా కనిపిస్తుంది.

ఇవి నిస్సందేహముగా పురాతన జీవులే. దీనికి కారణము మౌలిక కేంద్రీయల్ యుగంలో (Mid carboniferous period) అయిషియా (Ayshaia) అను శిలాజము ఆధునిక ఓనైకోఫర జీవులను పోలి ఉండటమే. ఇవి పూర్వము అనేక భౌగోళిక యుగాలు (Past geological ages)లో నివసించి వివిధ ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉండేవను సూచన వీటి ప్రస్తుత వివక్షత (Isolation) లేదా విచ్ఛిన్న విస్తరణ వలన తెలియుచున్నది. అయిషియా, పెరిపేటన్లను ఆధారంగా తీసుకొన్నట్లయితే ఆర్థ్రోపాడ వర్గజీవులు అనెలిడా వర్గజీవుల వంటి పూర్వుల నుండి పరిణామము చెందినవను సూచన ఆమోద యోగ్యంగా ఉంటుందనడంలో సందేహము లేదు.

19.8 వ్యవహారము

1. పెరిపేటన్లో ఉండే అనెలిడా ఆర్థ్రోపాడ జీవుల లక్షణాలను వేర్వేరుగా ఉద్దేశింపుము. ఎక్కువగా ఏ సమూహపు జీవులను పోలి ఉందో వివరింపుము.
2. పెరిపేటన్ ప్రదర్శించే _____, _____ భౌమశాస్త్ర రీత్యా నమ్ముతున్నట్టి దృఢీకార గోళ ప్రాంతాలు భూమధ్యరేఖ ప్రాంతాలలో వేలవంతెనల ద్వారా కలిసి ఉండేవని విరూపకమవుతున్నది.

19.9 సారాంశం

1. పెరిపేటన్ బాహ్యలక్షణాలు ఇందులో కందరయుత చర్మము, పుష్కళ్యంగాలు బోలుగా బొద్దుగా ఉన్న కాళ్ళు ఉంటాయి.

2. ఆహార నాశము వివిధ భాగాలతో ఉంటుంది.
3. లాలాజల గ్రంథులు ఉన్నవి.
4. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో సంకోచించుకొనే శక్తిగల గుండె ఉంటుంది.
5. శ్వాస అవయవాలు నాయునాళాలు.
6. ద్వంద్వ వృక్కాలు విసర్జక అవయవాలు.
7. నిచ్చెన ఆకారములోనున్న నాడీ వ్యవస్థ.
8. తైంగిక విభేదన ఉంటుంది.
9. నవీన పద్ధతిలో ఫలదీకరణ జరుగుతుంది.
10. భౌగోళిక విస్తరణలో ప్రత్యేకత గలదు.
11. అనెలిడా - ఆర్థ్రోపాడ వర్గాల లక్షణాలు వివరించబడినది.
12. ఒనైకోఫర జీవుల ప్రస్తుత వర్గస్థాయి వాటి ప్రత్యేక లక్షణాల ఆధారంగా తీసుకుని నిర్ణయించడమైనది.

19.10 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. ఆర్థ్రోపాడ
2. విచ్చిన్న, విస్తరణ

19.11 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. పెరిపేటన్ శరీర అంతర్ నిర్మాణము గురించి క్లుప్తంగా తెలుపుము.
 2. పెరిపేటన్ సంబంధ బాంధవ్యాలు చర్చించండి.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. పెరిపేటన్ బాహ్య లక్షణాలను వివరించండి.
 2. పెరిపేటన్ వర్గీకరణలో ప్రస్తుత స్థాయి ఏది?
 3. పెరిపేటన్ జీర్ణ వ్యవస్థను వివరించండి.
 4. పెరిపేటన్ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను వివరించండి.

భాగం - 20 ఉపకారులైన కీటకాలు

విషయక్రమము

- 20. 1 ఉద్దేశ్యం
- 20. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 20. 3 మానవునికి ఉపకారులైన కీటకాలు
 - 20.3.1 పరాగ సంపర్కము జరపు కీటకాలు
 - 20.3.2. పాకి పని చేయు కీటకాలు
 - 20.3.3 చీడపురుగులను అదుపులో ఉంచుకీటకాలు
 - 20.3.4 ఆహారముగ కీటకాలు
 - 20.3.5 వర్ణక పదార్థాలు
- 20. 4 ఆర్థిక ప్రాముఖ్యం
 - 20.4.1 పట్టుపరిశ్రమ
 - 20.4.2 తేనె పరిశ్రమ
 - 20.4.3 లక్క పరిశ్రమ
- 20. 5 స్వపరిశీలన
- 20. 6 సారాంశం
- 20. 7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

20.1 ఉద్దేశ్యం

కీటకాలు చిన్నవిగా, సూక్ష్మంగా ఉన్నా, వాటి క్రియాశీలత గమనించిన అతి హెచ్చుస్థాయిలో ఉంటుంది. ఈ సాతములో మానవునికి కీటకాలు ఏ విధంగా ఉపయోగంగా ఉంటాయో అవలోకించడము (Survey) జరిగినది. ఆర్థిక పరంగా కొన్ని కీటకాలు మానవుడికి, దేశానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని నీవు చదివిన తరువాత చెప్పగలుగుతావు.

20.2 ఉపోద్ఘాతం

విశ్వములో కీటకాలు ఇతర జంతువులన్నింటి కంటే అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. వాటి ఆవాస, అలవాట్లలో విభిన్నత ఉన్నందున జంతురాజ్యములో ఇవి ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని కీటకాలు ప్రత్యక్షంగా కాని, అప్రత్యక్షంగా కాని మానవుని ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితము చేస్తాయి. ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత విషయంగా కీటకాలను రెండు సముదాయాలుగా విభజించవచ్చు. 1. మానవునికి ఉపయోగకారులైన కీటకాలు 2. మానవునికి హానికరమైన కీటకాలు.

20.3. మానవునికి ఉపకారులైన కీటకాలు

ఈ కీటకాలు కొద్ది సంఖ్యలో ఉంటాయి. ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద కనబరచినవి:

20.3.1 పరాగ సంపర్కము జరుపు కీటకాలు:

కీటకాలు పుష్పాలను పరాగ సంపర్కము చేయుటకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి. తేనెటీగలు, కందిరీగలు, చీమలు, బీటీలు, సీతాకోక చిలుకలు, చిమ్మట పురుగులు (Moths) ఈగలు మొదలైనవి ప్రశంసనీయమైన పాలినేటర్లు.

20.3.2 పాకి పనిచేయు కీటకాలు: (Insects as scavengers):

కొన్ని కీటకాలు చనిపోయిన జీవుల శరీరాలను (కళేబరాలను), ఇతర మురికి పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. పిటివలన నివాస ప్రాంతాలు కుళ్లు పదార్థాల నుండి, చెడు వాసనల నుండి దూరము చేయబడతాయి. సిల్వర్ ఫిష్, చెదపురుగులు, చీమలు, ఈగలు, ఈగల డింభకాలైన మాగల్లు, బీటీలు, బొద్దింకలు మొదలైనవి చురుకైన స్కావెంజర్లు Scavengers().

20.3.3 చీడపురుగుల (Pests)ను అదుపులో ఉంచు కీటకాలు:

హానికరమైన కీటకాలను ఎదుర్కొని, భక్షించి మానవునికి అప్రత్యక్షంగా కొన్ని కీటకాలు ఉపకారులుగా ఉంటాయి. మొక్కలను హానిచేయు చీడపురుగులను (Pests) ఈ కీటకాలు భక్షిస్తాయి. గ్రౌడు బీటీలు, కందిరీగలు, కొన్ని ఈగలు పరజీవ భక్షక (Predaceous) కీటకాలు. ఏఫిడ్లు, పాలును కీటకా (Scale insects)లను లేడిబర్డ్ బీటీ (Rodolia cardination) భక్షిస్తుంది. కొన్ని పరజీవ భక్షక కీటకాలను ఫలవృక్ష తోటలలో (Orchards) పెంచి పాలును కీటకాలను నాశనమునకు తోడ్పడతాయి.

20.3.4 ఆహారముగ కీటకాలు (Insects as Food):

అనేక జంతువులు కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో మానవుడు కూడా కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాడు. చీమలను, చెదపురుగులను, గోరియతో బీటీల్ డింభకాలను కొంతమంది భారతీయులు, ఆఫ్రికన్లు, దక్షిణ అమెరికాలోని గిరిజనులు భక్షిస్తారు.

20.3.5 వర్ణక పదార్థాలు (Dyes):

టావిన్, కాకీనియల్, క్రిమిసన్ లేక్ అను రంగు పదార్థాలు (Dyes) కాక్ టైవక్టాల (Cacti) మీద వివసిస్తున్న కొన్ని పాలును కీటకాల ఎంపిక శరీర భాగాల నుండి తయారు అవుతాయి.

20.4 ఆర్థిక ప్రాముఖ్యం

పైన వివరించిన, ఉపకార విషయాల్లో కాకుండా మానవుని ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి గాను అనేక సంవత్సరాల నుండి ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నవి. ఆర్థికపరంగా పట్టుపురుగు, తేనెటీగ, లక్క కీటకము చాలా ముఖ్యమైనవి. వీనిని గురించి ఈ పాఠములో వివరముగా చర్చించబడినవి.

ఎ) పట్టుపురుగు - బాంబిక్స్ మోరై: బాల్యదశలోని జీవుల రక్షణ విమిత్తము, డింభకము వడికిన కోశము లేదా తిత్తి (Cocoon) నుండి పట్టుదారము వస్తుంది. పట్టుపరిశ్రమను పెరికల్చర్ అంటారు.

బి) తేనెటీగ - ఎపి ఇండికా: జీవి స్రవింతు తేనెను తన ఉపయోగము కోసము తేనె పట్టులో నిలువ ఉంచుకుంటుంది. కాని మానవుడు ఈ తేనెను తన స్వలాభము కోసము పట్టులో నుంచి దోచుకుంటున్నాడు. తేనెటీగల పెంపకము. తేనెను, మైనమును సేకరించు కృత్రిమ పద్ధతులను ఏపికల్చర్ అంటారు.

సి) లక్క కీటకము (Lac insect): ఇది ఒకవిధమైన మైనమును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. లాక్సీఫర్ లక్క (Laccifer lucca) అను పొలును కీటకము యొక్క స్రావక పదార్థమే ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గల లక్క.

20.4.1 పట్టు పరిశ్రమ


వేయబడిన పోగులన్నింటిలోకి పట్టుదారము మిక్కిలి నాణ్యమైనది. ఇది దీంభక దశ పూర్తి అయిన తర్వాత పట్టుపరుగు స్రవింతు అవిరళంగా నున్న పోగు, ఈ దీంభకము లేదా క్యాటర్ పిల్లర్ బాంబిక్స్ మోరై అను పట్టు చిలుకకు సంబంధించినది. దీని హనువుల కింద స్పిన్నరెట్టు అను రంధ్రము ఉంటుంది పట్టు పురుగు ప్రాటీను సంబంధమైన చిక్కటి పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పదార్థము నోటికి సమీపంగా ఉన్న రెండు సెరిఫిక్ గ్రంథుల ద్వారా బయటకు వెలువడి రెండు వేర్వేరు పోగులను ఏర్పరుస్తాయి. స్పిన్నరెట్టులో ఇవి రెండు సెరిసిన్ ఆప్లం జిగురువంటి పదార్థముచే అతకబడి ఎక్కపోగుగా ఏర్పడతాయి. ఈ పోగును ఉపయోగించి పట్టుపరుగు అండాకారంలో కోశాన్ని లేదా తిత్తిని అల్లుతుంది. తలను పలయాకారంగా త్రిప్పతూ పట్టు పరుగు స్తరము తరువాత స్తరము ఈ పోగును తన శరీరము చుట్టూ చేరుస్తుంది. ఈ విధంగా అవిరళంగానున్న ఒక పోగును అల్లుతుంది. అల్లుతున్న కొద్దీ పోగులు చాలా సన్నిహితంగాను, గుబురుగాను ఏర్పడి రెండుమూడు రోజులలో తిత్తిని పూర్తి చేస్తాయి. ఈ విధంగా పట్టుదారముచే అవరింపబడిన పట్టుపురుగు క్రిసాలిన్ అను ప్యూసా దశను చేరుకుంటుంది. పట్టుపోగును సేకరించడానికి ఈ కోశాలను వేడి నీటిలో ముంచుతారు. తరువాత పోగును విప్పి కందెలకు చుట్టుతారు. ఈ పోగు అత్యంత ఆర్థిక విలువగల ముడి పట్టుదారము (Raw silk) సెరికల్చర్లో అ) ఉత్పాదన ఆ) మల్చరీ చెల్లు వ్యవసాయము, ఇ) కోశాలను ఉత్పత్తి చేయు పట్టుపురుగులను పెంచుటకు తీసుకొను జాగ్రత్తలు గురించి ప్రత్యేక విషయాలు ఉంటాయి.

గుడ్ల ఉత్పాదన: గుడ్ల ఉత్పాదన కోసము పెంచు పట్టుచిలుకలను అవి కోశాల నుండి వెలువడు వరకు చల్లగానున్న చీకటి స్థలములో ఒకదానికొకటి వేలాడ కడతారు. తరువాత స్త్రీ పురుష జీవులను పలుచని గుడ్లమీద ఉంచి వాటిని సంపర్కము చేయిస్తారు. కొంత కాలానికి స్త్రీ జీవి గుడ్లను పెట్టుతుంది. గుడ్లు చీజ్ గుడ్ల మీద సున్నితంగా అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి. గుడ్లు పగిలి పిల్ల జీవులు బయటికి వచ్చువరకు వీటిని పొడిగా ఉన్న చల్లని ప్రదేశములో ఉంచుతారు. సంపర్కము జరుపు జీవులు రెండూ ఆరోగ్యవంతముగ ఉండి ఎటువంటి వ్యాధులు గాని వక్ర నిర్మాణము (Malformation)గాని లేనటువంటి వానిని ఎంపిక చేసుకొనుటకు కావలసిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకొనవలె. 10 గ్రాముల బరువు ఉన్నగుడ్లలో సుమారు 20 నుండి 25 వేల సంఖ్యలో గుడ్లు ఉంటాయి. వీటి వలన 50 నుండి 60 కేజీలలో తాజా కోశాలు ఉంటాయి. కోశాలన్నీ కలిసి సుమారు 50 నుండి 60 కేజీల ముడిపట్టును ఇస్తాయి.

పట్టు పరుగులు: పట్టుపురుగులలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఎ) సాగుచేయు పట్టుపురుగులు లేదా మల్చరీ ఆకులను తిను పట్టు పురుగులు. బి) వన్యపట్టు పురుగులు (Wild silk worm). ఇవి వివిధ రకాల ఆకులను తినునవి. సాగుచేయు పట్టుపరుగులు నాణ్యమైన రకము పట్టు (Fine quality silk)ను తయారు చేస్తాయి. ప్రపంచంలో ఎక్కువపట్టు ఉత్పాదనకు ఇవియే కారణము. బాంబిక్స్ మోరై మల్చరీ పట్టు పురుగులలో ప్రధానమైన జాతి. ఇవి సంపూర్ణంగా పెంపుడు రకానికి చెందినందున పట్టు ఉత్పత్తి కోసము పెంచుతారు. ఇదిమిగడ తెలుపు వర్ణములో నున్న పట్టును ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

బాంబిక్స్ మోరై జీవితములో పుష్టమైన నాలుగు దశలు ఉంటాయి. ఇవి అ) గుడ్డు (Egg), ఆ) గొంగలి

పురుగు (Caterpillar), ౩) ప్యూపా (Pupa), ఈ పట్టుచిలుక (Moth), (పటం: 22.1). రూపవిక్రీయ పూర్తికాగానే వెలువడిన రెండు మూడు రోజులలో పట్టు చిలుకలు సంపర్కము జరుపుకుంటాయి. అడజీవి 400 నుండి 500 గుడ్లు పెట్టిన వెంటనే చనిపోతుంది. కోశమునుంచి ప్రాథమీయ వెలువడునప్పుడు (రూపవిక్రీయ పూర్తి అయిన తర్వాత) కోశము పొడవుతుంది. ఇట్లాంటి కోశాల నుండి పట్టుపోగు ఒక పొడవైన దారముగ విప్పడానికి వీలుకాదు. అందువలన సాధారణంగా పట్టుపరుగు జీవిత చరిత్రను ప్యూపా దశలోనే ఆపివేసి పొడవైన దారాన్ని కండెలలో చుట్టుతారు. అయితే, తరువాత తరానికి గుడ్లను సేకరించడానికి కోశము ఎంపిక చేసిన కోశాలు, జీవిత చరిత్ర పూర్తిచేసే పట్టు చిలుకలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.



(పటం: 20.1) పట్టు పురుగు జీవిత చరిత్ర (బాంబిక్స్ మోరై). 1. ప్రాథ ప్రజీవి 2. ప్రాథ పురుష జీవి 3. మల్బరీ ఆకులపైనున్న గుడ్లు 4. గొంగళిపురుగు 5. గుడ్ల కోశము 6. గుడ్లకోశాన్నికోసి విప్పిన తరువాత.

ఒక ప్రాంతములో పెరికల్చర్ అభివృద్ధి చెందాలంటే డింభక దశలో పట్టుపరుగులు ఆహారంగా తీసుకొను మల్బరీ ఆకుల నాణ్యత (Quality), పరిణామా (Quantity)ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మల్బరీ గట్టిగాను, త్వరితంగా పెరుగు, ఆకురాలు వృక్షము. ఇది ఉష్ణ (Tropical), తక్కువ ఉష్ణ (Sub tropical) సమశీతోష్ణ (Temperate) ప్రాంతాలలో పెరుగుతుంది. మోరస్ ఆల్బా (Morus alba) జాతికి చెందిన మల్బరీ వృక్షము యొక్క ఆకులు డింభక జీవులు (కాటర్ పిల్లార్) పుష్టిగా పెరగటానికి సాధారణంగా వాడు ఆహారము.

పట్టు పురుగుల పెంపకము శ్రమతో కూడిన పని. డింభక జీవులను పళ్లాల (Trays)లో, నిరంతరము నీడగా ఉండి, 65 డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ నుంచి 78 డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ ఉష్ణోగత కలిగివున్న గదులలో (Rearing house) ఉంచుతారు. గుడ్లనుంచి వెలువడిన డింభకాలకు కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను రోజుకు మూడు — 239

ఎనిమిదిసార్లు ఆహారంగా వేస్తారు. నాలుగు, ఐదు రోజుల తరువాత తాజా ఆకులను ఆడుగు భాగములోపల ఉన్నటువంటి పళ్లెములో ఉంచుతారు. ఈ పళ్లెముపైన డింభక జీవులున్న పళ్లెమును ఉంచుతారు.

అవి పెరుగుతున్న కొద్దీ బుభ్రపరచి తాజా ఆకులతోనున్న పళ్ళాలలోనికి తరచూ మారుస్తూ ఉంటారు. పొడిగావున్న ఆకులను ఇవి అద్భుత పరిమాణములో తినివేస్తాయి.

ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని పట్టు ఉత్పత్తి చేయు దేశాలలో జపాను అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించింది. ఇది సుమారు 55 శాతం ఉత్పత్తి చేస్తుంది. చైనా, రష్యా, ఇండియా, దక్షిణ కొరియాల ఇతర ముఖ్యమైన పట్టు ఉత్పత్తి చేయు దేశాలు.

20.4.2 తేనె పరిశ్రమ:

భారత దేశములో తేనెటీగల పెంపకము (Apiculture) 1938లో ప్రారంభించారు. ఇది ఇప్పుడు తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాలలో స్థిరపడిన పరిశ్రమ. ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా క్రమంగా ఈ విషయములో శ్రద్ధ చూపుచున్నాయి. అయితే, దేశ విస్తీర్ణము, జనాభాతో పోలిస్తే (Apiaries) సంఖ్య చాలా తక్కువే.

కొంత ప్రాంతాలలో గిరిజనులు తేనె పట్టుల నుండి తేనెను సేకరించు పద్ధతి శాస్త్రవిరుద్ధంగాను (Unscientific), క్రూరంగానూ ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో తేనెపట్టు పూర్తిగా నాశనమవలమే గాక అనేక సంఖ్యలో తేనెటీగలు చంపబడతాయి. తీసిన (Extracted) తేనె కూడా మంచి రకానికి చెందినది కాదు.

ఇప్పుడు అనేక ప్రాంతాలలో ఈ పద్ధతిని మానివేసి కృత్రిమ, శాస్త్రీయ ఆధునిక పద్ధతులచే తేనెను సంగ్రహించుటకు ప్రత్యేక నిర్మాణాలను తయారు చేసినారు. కృత్రిమ పట్టుచెక్కతో తయారు చేయబడిన విశాలమైన సంతానోత్పత్తి అర (Brood chamber) ఉంటుంది. తేనెటీగలు లోపలికి వెళ్ళటానికి, బయటకు రావడానికి దారివుంటుంది. అరలో అనేక చట్రాలు ఉంటాయి. ప్రతిఒక చట్రంలో షడ్భుజాకారము (Hexagonal)లో సున్నమైనపు పత్రము వంటి నిర్మాణము ఉంటుంది. ఈ పత్రము షడ్భుజాకార అంచుల మీద తేనెటీగలు గోడలు నిర్మించి పట్టులోని గదులను నిర్మించుతాయి. మైనపు పత్రాలు పట్టుకు పునాదులవలె (Comb - foundation) ఉంటాయి. ఇవి పట్టును రెండువైపులా విర్పరచడానికి తేనెటీగలను ఆకర్షిస్తాయి. చట్రాలు అరలో నిలువుగా (Vertically) వేలాడుతూ ఉంటాయి. వీటిని కప్పుతూ మరొక చక్రము ఉంటుంది. దీనికి కూడా ఇనుపతీగలు ఉంటాయి. వీటిగుండా కూలి ఈగలు (Workers) సులువుగా ప్రవేశించగలవు.

సూపర్ (Super) అను మరొక అర సంతానోత్పత్తి అరపై వుంచుతారు. ఇందులో కూడా పట్టు పునాదులు (Comb foundation) వంటి చట్రాలు ఉంటాయి. ఇవి పట్టు విస్తీర్ణాన్ని అధికము చేయుటకు నిర్మించిన అదనపు చట్రాలు. ఒక ఇనుపతీగల వల సూపర్ కు మొదటి అరకు మధ్య ఉంటుంది. సూపర్ ఒక కప్పుచేత మూయబడి ఉంటుంది. దీనికి కొన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఇవి గాలి, వెలుతురును పంపటానికి అనువుగా ఉంటాయి.


ఈ కృత్రిమ పట్టులను పెరటి తోటలలోనూ, పొలాలలోనూ (Fields), ఫలవృక్ష తోటలలోనూ (Orchards) అమర్చుతారు. చిన్నకుటుంబముతోనున్న ఒక రాణి ఈగను పట్టులోనికి వదులుతారు. రాణిఈగ గుడ్లను పెట్టడము ప్రారంభించి మొదటి సంతతి వృద్ధి చేందగానే పట్టులో కుటుంబము (Colony) సంపూర్ణంగా యేర్పడుతుంది. పట్టు చురుకుగా తేనెను సేకరించిన కొంత కాలానికి చట్రాల నుండి పట్టులను వేరుచేస్తారు. చట్రాలను సెంట్రీఫ్యూజ్ చేసి తేనెను తీస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో మిగతా పట్టును

కలతపెట్టుకుండా ఒక్కొక్క చట్రము నుండి తేనెను సంగ్రహిస్తారు. తేనెటీగలను నెమ్మదిగా కుంచె సహాయంతో (Brushes) వేరుచేస్తారు. తేనె తీసిన తర్వాత చట్రాలను మరల అరలో ఉంచుతారు. తేనెటీగలు మరల పట్టును తయారుచేస్తాయి. పట్టులోని దీంధక జీవులకు సాధారణంగా పోని కలుగకుండా తేనె తీస్తారు.

ఎపిక్లర్లో ఈ క్రింది పరికరాలు అవసరము. కృత్రిమపట్టు, పొగచూరు వంటిది (Smoker), వల ముసుగు (Net veil) తేనెటీగలవల, ఒక జత గ్లోవ్స్, ఒక చాకు, కుంచె (Brush), తేనెను తీయటానికి పెంట్రిఫ్యూజ్.

తేనెపట్టు (Beehive): తేనెటీగల కుటుంబాలు శాశ్వతంగా అన్ని ఋతువులలో (perennial) వుంటాయి. ఆరోగ్యవంతముగా నున్న కుటుంబములో సుమారు 40 వేల నుండి 50 వేల ఈగలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క కుటుంబములో ప్రధానంగా మూడు తెగలు (Castes) ఉంటాయి. అవి రాణి ఈగ లేదా ఫలవంతమైన స్త్రీ జీవి, ద్రోనులు లేదా మగ ఈగలు, కూలి ఈగలు లేదా వంధ్యత్వమైన స్త్రీ జీవులు. ఒక కుటుంబములో ఒక రాణి ఈగ, కొన్ని ద్రోనులు, 95 శాతము కూలి ఈగలు వుంటాయి. రాణి ఈగ కూలి ఈగలు ఫలదీకరణము చెందిన అండము నుండి అభివృద్ధి చెందుతాయి. మగ ఈగలు అనిషేకజనన పద్ధతి (Parthenogenesis) లో అభివృద్ధి చెందుతాయి. (పటం 22.2)

భారతదేశములో మూడుజాతుల తేనెటీగలు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. అవి ఏపిస్ డార్నేటా, ఏపిస్ యిండికా మరియు ఏపిస్ ఫ్లోరియా, ఏపిస్ మెలిఫికా ఐరోపా దేశంలోని తేనెటీగ, ఏపిస్ ఆడమ్సోని ఆఫ్రికా దేశంలోని తేనెటీగ.



పటం 20.2 తేనెటీగ జీవిత చరిత్ర. A. కూలి తేనెటీగ. B. రాణితేనెటీగ. C. పోతుతేనెటీగ. 1. తేనెపట్టు 2. గుడ్డు 3. దీంధకము 4. పూసా

తేనె (Honey): తేనెటీగ పువ్వుల నుండి, మకరందాన్ని సేకరించి దానిని తేనెపట్టులోని గదులలోనికి వదలడానికి ముందు కొంత కాలము తన అన్నకోశములో (Crop) వుంచుకుంటుంది. తేనెటీగలలోని 241

లాలాజలము పువ్వులలోని మకరందాన్ని తేనెటీగల తేనెగా మారుస్తుంది.

మానవుని ఆహారములో తేనె ఒక ముఖ్యమైన అంశము. దీనిని ఔషధ విలు ఎక్కువగా వుంటుంది. దీనిని (Antiseptic) గా వాడుతారు. దీనిని జతర వ్యాధులను వయము చేయడానికి కూడా వాడుతారు.

తేనెటీగల మైనము (Bee Wax): తేనెటీగల పెంపకంలో చాలా ప్రాంతాలలో మైనము (Bee Wax) ఉప పుత్పత్తి (By product) పదార్థంగా యేర్పడుతుంది. తేనెపట్టులను పెంచు వ్యవసాయదారుడు తేనెపట్టులను విడగొట్టునప్పుడు లేదా ఉపయోగము లేని పట్టులను వడపోసి శుభ్రముచేయునపుడు మైనమును రాబట్టానికి ప్రయత్నము చేస్తాడు. ప్రథమంగా యిట్లాంటి పట్టుల నుండి వీలయినంత తేనెనంతటివీ సేకరిస్తాడు. తరుపరి ఈ పట్టును 145 F (62.7 C) వరకు వేడిచేసిన నీటిలో వుంచుతారు. ఈ ఉష్ణోగతతో మైనము కరిగి నీటి ఉపరి తలము మీదికి వస్తుంది. నీరు చల్లబడిన తర్వాత మైనము గట్టిపడి అట్టవలె పైన వుంటుంది.

దీనిని శుభ్రపరచి పట్టు తయారుచేయు చట్రాలలో వుపయోగిస్తారు. తేనెటీగలమైనమునకు ఇతర ఉపయోగాలుకూడా వున్నాయి. ఇవి మంచురకము కొప్పువత్తుల (Candles) ను, పరిమళ ద్రవ్యములను (Cosmetics) తయారు చేయుటలో, వ్యవసాయము, చిత్రకళ (Art) యింకా కొన్ని తదితర పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తారు.

తేనెటీగలను పెంచి అమ్ముతారు (Bees reared and sold) : ఇతర తేనెటీగలను పెంచు (Bee keepers) వారి ఏషియరీలలోని రాణి ఈగను, కుటుంబమును తిరిగి స్థిరపరచటానికి తేనెటీగలను పెంచి అమ్ముతారు.

తేనెటీగలు — పరాగ సంపర్కము (Bees as pollinators) : మొక్కలలో పరాగ సంపర్కము జరుగుటకు తేనెటీగలు అత్యంత ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నందున వ్యవసాయములో ఇవి ఉపయోగంగా ఉంటాయి. మానవుడిచేవియంత్రణ చేయబడిన పరాగ సంపర్కకర్తలు (Pollinating agent) ఇవి ఒక్కటే. కొన్ని ఫలవృక్ష తోటలకు తేనెటీగ లేకపోతే అసలు విలువే వుండదు. కీటకాలు వలన జరుగు పరాగ సంపర్కము సుమారు 80 శాతము తేనెటీగలవలనే జరుగును.


20.4.3 లక్క పరిశ్రమ:

సూక్ష్మంగావున్న లక్క కీటకము రక్షణ కోసము స్రవిండు రెజిన్ ఫంటి పదార్థము లక్క. ఇది లక్కిఫర్ (Laccifer) ప్రజాతికి, లాకాఫెరిడే (Laciferidae) కుటుంబానికి, హెమిప్టెరా క్రమానికి చెందినది. ఇది అనేక వన్యసాగుచేయు వృక్షాలపైన చీడపురుగు (Pests) వలె ఉంటాయి.

భారతదేశములో సాధారణంగా విస్తారంగా తటస్థపడు లక్క కీటకము లక్కిఫర్ లక్క ఉత్పత్తి అగుచున్న వాణిజ్యపరమైన లక్కలో ఎక్కువ భాగం, దీనిద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది.

జీవిత చరిత్ర: ఈ కీటకము పడమ ఆఫ్రికాలో ఎరుపు వర్షంలో వున్న సూక్ష్మ దీంభక జీవిగా జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. ఇది 0.55 మి.మీ నిడివితోనూ, 0.25 మి.మీ. వెడల్పుతోనూ ఉంటుంది. ఇవి అనేక లక్క కణాల నుండి దీంభక జీవులుగా ఏర్పడి అవి సాంక్రమిండు మొక్కల కొమ్మలపైకి ప్రాకుతాయి. ఆరోగ్యవంతముగానున్న స్త్రీ జీవి సుమారు 300 నుండి 1000 వరకు దీణకాను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కొంత కాలము గడచిన తరువాత వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలముగా ఉన్నప్పుడు ఇవి లక్క కణాలు నుండి బయటకు వచ్చి అనువుగా ఉన్న ప్రాంతాల కోసము వెదకి స్థిరపడతాయి. గుంతల (Brood) పురుష, స్త్రీ జీవుల నిష్పత్తి వైవిధ్యముతో వుంటుంది కాని సాధారణంగా 1:3ని దాటదు. కొమ్మలో ఇవి స్థిరపడు సాంద్రత సామాన్యంగా ఒక చదరపు సెం.మీ కు 150 180 దీంభకాలు ఉంటాయి. ఒకసారి స్థిరపడిన దీంభకాలు లక్కడ నుండి మరి కదలవు (సటం 20.3).

ఒక వారము గడచిన తరువాత డింభకాలు లక్కను ప్రవిస్తాయి. నోటి భాగాలు రెండు శ్వాసరంధ్రాలు, పాయువు తప్ప మిగత శరీర భాగాల అన్నింటిలో అవభాసిని కింద లక్కను ప్రవించు గ్రంథు లుంటాయి. ఈ విధంగా డింభక జీవి వ్యంత శ్రావక పదార్థాలుచే నిర్మింపబడిన నిర్మాణములో వుంటుంది. జీవి పెరుగుతున్న కొద్దీ బయట నిర్మాణము కూడా పెద్దదవుతూ వుంటుంది. పరిణతి చెందునంతలో డింభక జీవిమూడు సార్లు నిర్మోచనము చెందుతుంది. ఈ మూడు డింభక దశల కాలవ్యవధి, ఉష్ణోగ్రత గాలిలోతేమ, అతిధేయ (Host plant) వంటి అవరణ కారకాల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. లక్క కణము యొక్క ఆకారమునుబట్టి డింభక దశలోనే లింగభేదమును మలుపుగా తెలుసుకొనవచ్చు. పురుష లక్క కణము కూడా 'స్టిప్పర్' ఆకారంలో ఉంటుంది. రెండవ నిర్మోచనము వ్యూపాదశలు పూర్తి తరువాత రెక్కలు ఉన్న లేక రెక్కలు లేని మగ ప్రౌఢజీవులు బయటకు వస్తాయి.



పటం 20.3. లక్క కీటకము జీవిత చరిత్ర. A. రెక్కలున్న ప్రౌఢపురుష జీవి. B. రెక్కలు లేని పురుష జీవి. C. పురుష లక్కల కణము. D. ప్రౌఢ స్త్రీ జీవి. E. స్త్రీ లక్క కణము. F. డింభకము. G. జిజిఫస్ చెట్టుకొమ్మపై ఉన్న పురుష, స్త్రీ లక్క కణములు. 1. పురుష లక్క కణము 2. స్త్రీ లక్క కణము.

స్త్రీ డింభకజీవి ఉబ్బి బేరినంటి ఆకారములో లేదా గుండ్రని సంచివంటి నిర్మాణములో ఉంటాయి. ఇవి లక్క కణములోని స్థలాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమిస్తుంది. మూడవ నిర్మోచనము తరువాత స్త్రీ జీవి లైంగికంగా పరిణతి చెందుతుంది. పురుషజీవి లైంగికంగా పరిపక్వము చెంది స్త్రీ జీవితో సంవర్కము చెందుతుంది. పురుషజీవి బయటకు వెలువడిన తరువాత 62-92 గంటలు మాత్రమే జీవిస్తుంది. స్త్రీ జీవి అవరణంగా లక్కను ప్రవిస్తూ 243

ఉంటుంది. జీవి పరిమాణము దానిని ఆవరించివున్న లక్క కణము త్వరితగతిని హెచ్చుతూ ఉంటుంది. మగ లక్క కణముకంటే ఆడ లక్క కూడా చాలా రెట్లు పెద్దవిగా ఉంటుంది. గుడ్డు పెట్టుకాలము సమీపించువంతవరకు ఆడ కీటకము లక్కను ప్రవిస్తూనే ఉంటుంది.

గుడ్డు పెట్టునప్పుడు సాయువు సమీపములో ఉన్న బుడిప కణములోనికి లాగుకొంటుంది. ఉష్ణోగ్రత అనుకూలముగ ఉన్నప్పుడు గుడ్డునుండి దీంభకాలు బయటకు వస్తాయి.

అతిథేయమొక్కలు: భారతదేశములో లక్క కీటకాలు ఉన్న మొక్కలు నూరు కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు రికార్డు చేయబడినది. అయితే ఎక్కువ పరిమాణంతో ఉత్పత్తిని కలిగివున్న మొక్కలలో ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. బ్యూటీయ మోనో స్పర్మా (Butea monosperma) జిజిఫస్ మరుటియేనా (Zizphus mauritiana) జి.జైలోపైరస్ (Z. xylopyores) ఫైకస్ కుమియ (Ficus cumia) కజానస్ కజాన్ (Cajanus cajan) ఆల్ బీజియా లుసిడా (Albizzia lucida) అకేషియా కటేచు (Acacia cattehu).

లక్క సాగుపద్ధతి: అనుకూలమైన అతిథేయపున్న అడవి ఉప అడవి (Subforest) ప్రాంతాలలో రైతులు లక్కను సాగుచేయుచున్నారు. అనుబంధ వృత్తిగా వీరు దీనిని చేస్తుంటారు. మన దేశములో బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో లక్క ఉత్పత్తికి ముఖ్యమైన కేంద్రాలు.

లక్క సేద్యము కోశముతో నున్న లక్క (Brood lac) తో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది అతిథేయ మొక్క ఒక చిన్న కొమ్మ దానిమీద తల్లి కణముతో నున్న దీంభక జీవులు బయటకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. లక్కపున్న కొమ్మలను చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి వీటిని కట్టలుగా కట్టి వాటిని కొత్త అతిథేయ మొక్కలకు కట్టి ఉంచుతారు. కొంత కాలానికి దీంభకాలు గుంపులు, గంపులుగా బయటకు వచ్చి రసముతో ఉన్న కొమ్మలమీద స్థిరపడతాయి. లక్క సేద్యము చాలా జాగ్రత్తతో కూడినది బీహార్ రాష్ట్రములోని నవ్ కుమ్ వద్ద నున్న భారత లక్క రిసెర్చి యిన్ స్టిట్యూట్ వారు లక్క అభివృద్ధి గురించి చాలా కృషిచేస్తున్నారు. లక్క సాగుతో కొత్త అభివృద్ధి చెందిన పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టి లక్కను పెంచువారిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

1990 వరకు భారత దేశము లక్క ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంను ఆశ్రయించి వుండేది. మమారు 85 శాతము లక్క యా దేశములో ఉత్పత్తి అయ్యేది. ఇప్పుడు థాయ్ లాండ్ దేశము, మనదేశములో పోటికి వచ్చుచున్నది. ప్రపంచ లక్క అవసరాలలో, ఈ దేశము 25 నుండి 80 శాతము వరకు ఉత్పత్తిచేస్తుంది.

20.5. స్వపరిశీలన

1. పరాగసంపర్కం జరిపే ఒక కీటకం పేరు _____
2. బేదలు, బొద్దింకలు, ఈగలు _____ పనిచేసే కీటకాలు.
3. అనే జిగురునంటి పదార్థంతో పట్టు పోగులను స్ప్రిన్నెల్ లో పట్టుపురుగు అతుకుతుంది. ఈ పురుగు శాస్త్రీయ నామం _____,
4. పూంలోని _____ తేనెటీగ నోటితో _____ కలిసి తేనె తయారవుతుంది. తేనెటీగ ప్రజాతి పేరు _____

20.6 సారాంశం

1. ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను అనుసరించి కీటకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఉపకారులైన కీటకాలు: హానికర లేదా అపకారులైన కీటకాలు.
 2. వివిధ ఉపకారులైన కీటకాల క్రియాశీలతను క్లుప్తముగా వివరించడమైనది.
 3. పెరికల్చర్ పట్టు పరిశ్రమకు సంబంధించినది. పట్టును ఉత్పత్తి చేయు కీటకాన్ని గురించి వివరంగా చెప్పబడినది.
 4. తేనె (Honey), ఇతర ఉపయోగకరమైన వస్తువులను తేనెటీగల నుండి సంపాదించుటకు, పెంచు విషయాలను పరిశీలించు శాస్త్రాన్ని ఎపికల్చర్ అని అంటారు.
 5. తేనెటీగలను మచ్చిక చేసి తేనెను, మైనమును సంపాదించు పద్ధతిని వివరించడమైనది.
 6. లక్క కీటకము నుండి లక్క లభిస్తుంది.
 7. లక్క పేద్యము లేక సాగు లక్క లభించు పద్ధతి వివరించడమైనది.
-

20.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. సీతాకోక చిలుక 2. పాకీ 3. పెరిసెన్. 4. మకరందం, లాలాజలం, ఏపిన్, 1. బాంబిక్స్ మోరై
-

20.8 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి
 1. ఉపకారులైన కీటకాలు గురించి ఒక వ్యాసమును వ్రాయుము.
 2. పెరికల్చర్, ఎపికల్చర్, లక్క సాగు పద్ధతి గురించి వ్రాయుము.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి
 1. తేనెటీగలు మానవునికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతాయి? ఎపికల్చర్ గురించి ఒక చిన్న వ్యాఖ్య వ్రాయండి.
 2. లక్క అవగా వేమి? అది ఎట్లు ఏర్పడుతుంది? లక్క సాగు పద్ధతిపై ఒక చిన్న వ్యాఖ్య వ్రాయండి.

భాగము — 21 హానికరమైన కీటకాలు

విషయక్రమము

21. 1 ఉద్దేశ్యం
21. 2 ఉపోద్ఘాతం
21. 3 పంటలపై చీడ పురుగులు
21. 4 గాల్ను ఏర్పరుచు కీటకాలు
21. 5 మిడతలు
21. 6 ధాన్య నిలువలను నాశనముచేయు కీటకాలు.
21. 7 ఇంటిలోని చీడపురుగులు
21. 8 మానవునికి వ్యాధులను సంక్రమింపజేసే కీటకాలు
21. 9 పెంపుడు జంతువులను హాని కలుగ జేయు కీటకాలు.
- 21.10 చెద పురుగులు
- 21.11 నివారణ పద్ధతులు
 - 21.11.1 సాగు చేసే పద్ధతులు
 - 21.11.2 యాంత్రిక పద్ధతులు
 - 21.11.3 రసాయన పద్ధతులు
 - 21.11.4 జైవిక పద్ధతులు.
- 21.12 వ్యవసాయం
- 21.13 పోరాంశం
- 21.14 పనునా ప్రశ్నలు
- 21.15 పదకోశం.

21.1 ఉద్దేశ్యం

అపకారులైన కీటకాలనుగుర్తించి అవి ఎంత నష్టాన్నికలుగ జేస్తాయో తెలుసుకోవటమే ఈ పాఠంలో ముఖ్య అంశము. పంటలకు, వ్యవసాయోత్పత్తులకు నష్టాన్ని కలిగించడమేగాక, వజ్రపులకు మానవులకు రోగాలను సంక్రమింప జేస్తాయని తెలియచెప్పే సామర్థ్యాన్ని నీవు సంతరించుకొంటావు. అయితే వీటి నివారణ, వియంత్రణ చర్యలను కూడా బోధించగలుగుతావు.

20.2 ఉపోద్ఘాతము

ఇంతకుముందు చదివని పాఠములో కొన్ని కీటకాలు చాల ఉపకారిగా ఉండి అవి ఉత్పత్తి చేయు పదార్థాలు ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి ఎంతో దోహదము చేస్తాయని తెలుసుకున్నాము. అయితే కొన్ని యితర కీటకాలు మానవునికి హాని కలుగ జేసే ఆర్థిక వ్యవస్థను వినాశ పరుస్తాయి. వీటిని నిర్మూలించటానికి మానవుడు తీవ్రంగా పోరాడు

వలసి ఉంటుంది. పంట పైర్లను నాశన మొనర్చునవి, నిలువ ధాన్యాన్ని పాడు చేయునవి, వివాస స్థలాలలో వస్తువులను పాడు చేయునవి, బాధ్య విస్తరణలో పాత్ర వహించునవి, హానికరమైన లేదా అనకారులైన కీటకాలను అంటారు. విశ్వమంతటా వ్యాపించిన ఈ ఆర్థిక సమస్యను పరిష్కరించటానికి ప్రపంచములోని కీటక శాస్త్రజ్ఞులు (Entomologists) అందరూ పరిశోధనలు జరుపుచున్నారు. ఆర్థిక యిబ్బందులను కలుగ జేసే అంశాలను ఆధారంగా తీసుకొని ఈ కీటకాలను కించ కనబరచిన రకాలుగ గుర్తించవచ్చు.

1) పంట పైర్ల చీడ పురుగులు 2. నిలువ ధాన్యమును నాశనము చేయు కీటకాలు 3) ఇంటి సంబంధ వస్తువులను పాడు చేయు చీడ పురుగులు 4) బాధ్య విస్తరణ చేయు కీటకాలు 5) పెంపుడు జంతువులకు హాని కలుగ జేయు కీటకాలు 6) చెడ పురుగులు.

21.3 పంటల చీడ పురుగులు:

అనేక కీటకాలు పొలాలలోని పంటలను, పశువును, కాయగూరలను నాశనము చేస్తాయి. ఇవి కలుగ జేయు నష్టము అనేక లక్షల మేరకు ఉంటుంది.

నెఫ్టోటెటిక్స్ (Nephotettix) భారతదేశపు రైస్ లీఫ్ హాపర్ (Rice leaf hopper) లెప్టో కోరిస్సా (Leptocorisa) తూర్పు ప్రాంత దేశాలలో పొందు వరి, జొన్న వంటి మొక్కలకు చీడలుగా నున్న కీటకములు హెమిప్టెరా క్రమానికి చెందినది. ఇవి వరి మొక్కలకు విస్తారంగా సంక్రమించి ఆకులను, ఎన్నులను (కంకెలను) తిని వేస్తాయి. స్కీనోబియస్ (Schoenobius) అను ఒక మాత్ యొక్క డింభకము వరి మొక్కల కాండములో బొరియలు చేసి అహారాన్ని తీసుకొని చివరకు మొక్కను నాశనము చేస్తుంది. ఆర్థోగ్లిఫస్ (Hieroglyphus) సరూప శాఖకము. ప్రాథమిక ఎదుగుతున్న వరిమొక్కల కాండాన్ని తిని వేస్తాయి. ఇవి ధాన్యము ఉత్పత్తి కాకుండా అటంక పరుస్తాయి.

మిస్టియోలా (Mystiola) అను హెసియన్ ఈగ (Hessian Fly) ఒక చిన్న మిడ్జీ (చీకటి ఈగ). లేత వయస్సులో నున్న గోధుమ ఆకుల పువరితలముమీద నున్న గాడులలో గుడ్లు పెడతాయి. 3 నుండి 12 రోజులలో గుడ్లు విడిగి, ఎరుపు వర్ణముతో నున్న డింభక జీవులు ఆకును వదలి కాండము మీద నున్న ఆచ్ఛదము (sheath) లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఇవి కాండములోని కణజాలాలను అహారంగా తీసుకుంటాయి.

లెపిడాప్టెరా జీవులైన కైలో (Chilo) మరియు దుయాట్రీయాం డింభకాలు చెఱకు మొక్క కాండమును దొరిచి అందులో వుంటాయి. ఆ లేత కణజాలాన్ని తింటూ కాండాన్ని క్రమంగా బోలుగా (Hollow) చేస్తాయి. పైరోస్టా (Pyrausta) అను వల్లి (Bug) వంటి జీవిని సాధారణంగా చెఱకు లీఫ్ హాపర్ (Sugarcane leaf hopper) అని అంటారు. ఇది విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరించి బడినది. ఇది ఉష్ణ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా వుంటాయి. చెఱకు గడలోని రసాన్ని గ్రోలి వీటి సరూప శాబకాలు, భ్రౌడ జీవులు గడను నిస్సారము చేస్తాయి. వీటి వల్ల చక్కెర దిగుబడి తగ్గి నష్టము కలుగుతుంది. చెఱకు పంటకు హాని కలుగ జేయుయితర శత్రువులు తంత్రి పురుగులు (Wireworms), భూమిలో వివాస మేర్పరుచు కున్న కీటకాలు, యితర జీవులు.

డిస్ డిరీయస్ (Dysdercus) భారత దేశపు కాటన్ బగ్ ఆక్సికారినిస్ (Oxyearenius), ఈజిప్షియన్ కాటన్ బగ్ మరియు ప్లాటీ యెడ్ర గాస్పియెల్లా (Platyedrella gossypiella), పింక్ బోల్ వర్మ్స్ (Pink Boll Worms) ప్రత్తిపంటకు చాలా హానికరమైన కీటకాలు. ఇవి దూది గింజలను రంజన యుతం చేసి (Stain) వాణ్యతను తగ్గించివేస్తాయి. ఏఫిన్ అను హెమి ప్టెరన్ జీవి, ప్రత్తి పంటకు దారుణమైన చీడ పురుగు. ఈ చీడ పురుగును సాధారణంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రత్తి మొక్కలను సంక్రమించి వాటిని నాశనము చేస్తాయి. ఆఫిన్ (హానికర) - 247

Honey dew) అను జిగురు వంటి పదార్థాన్ని స్రవిస్తుంది. ఇది ఆకుల మీద దూది పింజల మీద జల్లినట్లు అవుతుంది. దీని వలన మొక్క విగ విగ లాడుతూ వున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. పింజలమీద పడిన హనీ డ్యూ జిగురుగా వుండి దూది నుండి దారపు పోగులను వడకుల కష్ట సాధ్య మవుతుంది.

ఆగ్రోటిస్ (Agrotis) మరియు గ్నోరిమోస్కీమ (Gnorimoschema) లు లెపిడాప్టెరన్లు. వీటిని సాధారణంగా బంగాళ దుంపల కట్ వర్మ్ల (Potata cut worms) అంటారు. ఆగ్రోటిస్ (Agrotis) దీంభకాలు బంగాళ దుంప మొక్కల ఆకులను ఆహారంగా తీసుకొని కాండాన్ని కత్తిరిస్తాయి. అయితే గ్నోరి మోస్కీమ పాలములో బంగాళ దుంపలను తిని వేస్తాయి. ఆగ్రోటిస్ దీంభకాలు బఠాణీ, కాబేజీ, పొగాకు, వేరుశనగ, గోధుమ, కాలిఫ్లవర్ వంటి కాయ గూరలకు నష్టమును కలుగజేస్తాయి. పొగాకు, టమాటోలను గ్నోరి మోస్కీమ దీంభకాలు నాశనము చేస్తాయి.

కోలియోప్టేరా (Coleoptera) క్రమములోని దీంభకాలను గ్రబ్లు (Grubs) అంటారు. వీటిని తీగెపురుగులు అని కూడా అంటారు. ఇవి వేళ్ళను తిని వేస్తాయి. (Root Feeders) ఇవి గట్టి మొక్కలు, ధాన్యపు మొక్కలను వేరు తొడుగు (Root cap) ను పూర్తిగా ధ్వంసము చేస్తాయి.

అనేక కీటకాలు, వాటి దీంభకాలు కాయ గూరలకు, ఫలములకు (Vegetable and fruits) వినాశ కారులుగా వుంటాయి. సెఫ్కోరీనీ (Siphocoryne) అను ఏఫిడ్ కాబేజీ ఆకులను తింటాయి. అనాసా అను స్క్వాష్ నల్లి (Squash Bug) కుక్కురుబీటా కుటుంబానికి (Family Cucurbitaceae) చెందిన మొక్కలను నాశనము చేస్తాయి. ఈరియస్ (Earias) మచ్చలతో నున్న బోల్ వర్మ్ బెండ మొక్కలను (Ladies finger plants) నాశనము చేస్తాయి. ఆలాకోఫార (Aulacophora) అను ఎరుపు బీటిల్ గుమ్మడి కాయలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి బ్రూకస్ (Bruchus) అను బీటిల్ మొక్క దీంభకాలు చిక్కుడు, బఠాణీకాయల (Pods) లో ప్రవేశించి గింజలన్నిటిని నాశనము చేస్తాయి.

డ్రోసికా (Drosicha) అను నల్లి మామిడి, ప్లవ్వు, బొప్పాయి, బేరి, నారింజ, వనస్ పళ్ళకు విస్తారమైన నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇడియో సీరస్ (Idea cerus) అనుమామిడి రీప్ హాపర్ (Mango leaf hopper) పుప్ప గుచ్చము (Inflorescence) మీద దాడి చేసి మొక్కలలోని రసాన్ని పీల్చివేస్తాయి. ఇవి మామిడిపళ్ళ దిగుబడికి తీరని నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. ప్సెల్లే (Psylle) అను ఆపిల్ బగ్ గుడ్డను ఆపిల్, బేరిపళ్ళ వృక్షము మీద పెడతాయి. వీటి నుండి సరూప శాబకాలు వెలువడి లేత ఆకులు, మొగ్గలను పాడుచేస్తాయి. ఆంథోనోమస్ (Anthonomus) అను బీటిల్ కూడా ఆపిల్ మొక్కలలోని పుష్పగుచ్చాన్ని పాడుచేసి ఫలాన్ని విరోధిస్తుంది. నైసియస్ అను నల్లి అనేక రకాల ఫల వృక్షాలకు వినాశకారిగా వుంటుంది.

21.4 గాల్ ను ఏర్పరచు కీటకాలు (Gall forming insects)

మొక్కల చీడపురుగుల వలన హానిపొంది వుత్పత్తిని నష్టపోతూ వుంటాయని గమనించాము. ఇవేకాకుండా మరికొన్ని కీటకాలు కూడా మొక్కలకు హాని కలుగచేస్తాయి. ఇవి మొక్కలలో కొన్ని (మాల్ ఫార్మేషన్లు) వక్రనిర్మాణాలను యేర్పరుస్తాయి. వీటిని గాల్స్ (Galls) అంటారు.

మొక్కలమీద చిత్రంగా ఏర్పడిన నిర్మాణాలను గాల్స్ అంటారు. వీటిని అనేక రకాల కీటకాలు వుత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి దిప్టేరా క్రమానికి చెందిన గాల్ మిడ్జిలు, గాల్ ఈగలు, హైమకోప్టేరాకు చెందిన గాల్ కందిరీగలు. కొన్ని జాతుల త్రిప్స్ (Thrips) లేసుబగ్స్ (Lace bugs), ప్సెల్లిడ్స్ (Psyllids), ఏపిడ్స్, బీటిల్స్, పివిల్స్ మొదలైనవి కూడా మొక్కల గాల్స్ ను వుత్పత్తి చేస్తాయి.

గాల్స్ వివిధ రకముల మొక్కలమీద యేర్పడతాయి. ఇవి సాధారణంగా 3/4" పొడవుతో వుంటాయి. చూడటానికి యివి బుల్లి అనబడుతుంది వరి (Miniature Pine apple) వుంటాయి. ఇవి సంక్రమించిన కొమ్మలు సాధారణంగా జీవరహితమై విరిగిపడి పోతాయి. ఎక్కువ గాల్స్ సంక్రమించిన వృక్షాలు కురూపత్వాన్ని (Deformity) కలిగి వుండి వీరస పడిపోతాయి. కొన్ని జాతుల కందిరీగలు ఏకాంతర తరాన్ని (Alternation of generation) ప్రదర్శిస్తాయి. ఇలాంటి జీవులు ఒక తరము గాల్స్ను కాండము మీద యేర్పరుస్తాయి. తదుపరి తరములో అవి వేళ్ళు (Roots) మీద గాల్స్ను వృద్ధి చేస్తాయి.

21.5 మిడతలు

గాల్స్ లోపల డింభకాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. గాల్స్లో అనేక యితర కీటకాలు నివసిస్తాయి. కొన్ని సమయాల్లో ఈ కీటకాలు గాల్స్ను యేర్పరుచు కీటకాన్నే తినివేస్తాయి.

కొన్ని గాల్స్ ఉపకారిని కూడా వున్నాయి. చైనాలో మెలాఫిస్ చైనెన్సిస్ (Melaphis chinensis) అను చైనీస్ ఏఫిడ్ (Chinese aphid) ను కృత్రిమంగా పెంచుతారు. ఇది రంగు పదార్థాలను, లూనిక్స్ను ఔషధము వంటి పదార్థాలను కలిగి వున్నందున వాణిజ్యపర పరిమాణము (Commercial quantities) లో వీటిని పెంచుతారు.



పటం : 21.1 A. మిడత (అర్థాపైరా). B. రాణి తెగకు చెందిన చెదపురుగు (ఐసోప్టెరా).

లోకస్టు అను పదానికి శబ్దార్థము స్టేగు అంటారు. వీటిని మిడతలు అని కూడా అంటారు. వీటి సర్వావధానాలు, ప్రాదజీవులు అనేక రకాల మొక్కలను తింటాయి. ఇవి గుంపులు, గుంపులుగా మొక్కలున్న పొలాల్లో ప్రవేశించి మొత్తము పంటను నాశనము చేస్తాయి. లోకస్టా మైగ్రేటోరియా (Locusta migratoria) (పటం 21.1A) వలస పోవు పూర్వార్ధ గోళములోని దేశపు (Eastern hemisphere) లోకస్టుకు పురాతన కాలము నుండి గొప్పపేరు ప్రఖ్యాతలు వున్నవి. అరబ్బులు దళసరిగాను. 100 మైళ్ళు వెడల్పు 300 మైళ్ళు పొడవుతోనున్న మెలనోప్లస్ మక్సికన్స్ (Melanoplus maxicans) అను ఉత్తర అమెరికా రాతి గుట్టలోకస్టు (Rocky mountain locust) గుంపులలో సుమారు 27 బిలియన్లు (12700 కోట్లు) లోకస్టులు వుండేవని అంచనా. అవి పొలాను పూర్తిగా నాశనము చేసి చూడటానికి పంట మొత్తం మంటలువేసి కార్చినట్లుగా చేస్తాయి.

21.6 ధాన్యం నిలువలను నాశనముచేయు కీటకాలు:

ప్రపంచములోని ధాన్యము పుత్తుత్తిలో కనీసము 5 శాతము కీటకాలవలన నాశనమవుతూ వుంటుంది. వీనిల్లో,

పిడిలో పున్న బీటీల్లు అనేక ఇతర బీటీల్లు వారానికి కనీసము వాటి స్వంత బరువుకు సమానముగా నున్న ధాన్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. మూడు నుంచి నాలుగువారాలు డింభక జీవనము గడుపు ఈ జీవులు మరింత వినాశకారాలుగా ఉంటాయి. ఈ కీటకాలు యితర విధంగా కూడా నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. అనేక జాతులు ధాన్యములోని బీజ పదార్థాన్ని (Germ) ఆహారంగా తీసుకొని జల్లునప్పుడు ఆరోగ్యంగావున్న విత్తనాల కంటే చీడవట్టిన విత్తనాలనే ఎక్కువగా వుపయోగించడము జరుగుతుంది. చీడలు తరచుగా ధాన్యానికి వేడిని కలుగజేస్తాయి. ముగ్గిపోయిన వాసన కూడా వస్తుంది. వేడిఅయిన ప్రాంతాల నుండి నీటి ఆవిరి చల్లటిపువ్వితల ప్థలాలకు విస్తరించి ధాన్యాన్ని కుళ్ళినట్లు చేసి నాశనము చేస్తుంది ధాన్యపుగించలపాత్తులో (Kernerls) డింభకాలు పున్నట్లుయితే ధాన్యాన్ని మర ఆడించి నప్పుడు నాణ్యత, దిగుబడి బాగా తగ్గిపోతుంది.

నిలువ ధాన్యాన్ని సంక్రమించు చీడలు వాటి ఆహారానికి నీటి మీద ఆధారపడి వుంటాయి. తేమ ఆదిన (Dry) ధాన్యము లేదా విత్తనాలు చీడల అభివృద్ధికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.

అనేక మాల్లల (Moths) గొంగళి పురుగును (Cater pillars) మరియు బీటీల్లు నిలువ ధాన్యాన్ని విపరీతంగా పాడుచేస్తాయి. టెనిబ్రియో మరియు ట్రైటోలియమ్ అను రెండు బీటీల్లు సాధారణంగా ధాన్యపు గిడ్డంగుల్లో (Godowns) యితర స్టోర్ చేయుప్రాంతాలలో ఉంటాయి. టెనిబ్రియో దశలన్నీ, మైదా, యితర నిలువ ఉంచిన ఆహార వస్తువులలోను, పిండి (Flour) లోను ఉంటాయి. నీటి డింభకాలను మీల్ వర్మలని (Meal worms) అని అంటారు. ట్రైటోలియమ్ నిలువ ఉంచిన గోధుమను ధాన్యాన్ని తింటుంది. మన దేశములో కలాండ్ర (Calandra) అని పిలిచే బియ్యపు గింజను, యితర నిలువ ఉంచిన ధాన్యమును దొరిచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి.

సాధారణంగా గింజలలోకాని, ధాన్యములోగాని నీటిని తొలగించటానికి గాలిలో లేదా ఎండలో ఆరవేస్తారు. (Dried) తరుపరి నీటివ కర్రతొట్లలో (Binds) లోగాని గోవెపంచులలో (Bags) గాని వింపి గిడ్డంగులలో వుంచుతారు. ధాన్యానికి ప్రత్యేకించిన ధూపము (Fumigants) ను వాడవలెను.

21.7 ఇంటిలోని చీడపురుగులు

ఇంటిలోని వివిధ వస్తువులపై దాడిచేయు అనేక రాకాల చీడలు అనేక యిబ్బందులను గలుగజేస్తాయి. బొద్దింగలు, పివిల్లు, చీమలు, బీటీల్లు, పిల్వర్ ఫిష్, ఈగలు మొదలైనవి మానవుని ఆహారాన్ని పంచుకోవటమో లేదా పాడుచేయడమో చేస్తాయి.

బొద్దింకలు వంటగదిలో లేదా స్నానాల గదిలోని అలమారు అరలలో నివసిస్తాయి. ఇవి విశాచరులు. ఇవి వాటికి అడ్డుతగిలిన ఎటువంటి ఆహారాన్నయినా తింటాయి. సరయుగు సమయములో నిరోధించకపోయిన అనేక సంఖ్యలో వంట యింటిలోని ప్రతిమూల (Nook and corner) సందులు, గొండులను ఆక్రమిస్తాయి.

ఇవిగాక పివిల్లు, బీటీల్లు, మాల్లు వంటయింటిలోని యితర చీడ పురుగులు. ఇవి వంట ఇంటిలోని పిండిని, మైదాను, ధాన్యమును, సుగంధ ద్రవ్యాలను యితర ఆహార పదార్థాలను సంక్రమిస్తాయి.

లెపిస్మాలు (పిల్వర్ ఫిష్లు) పుస్తకాల అరలలో, గదులలోని అరలు, చుట్టముతో నున్న ఫోటోల వెనుక, కిటికీ లేదా ద్వారబంధముల (Window or door) చుట్టము (Frame) వెనుక వుంటాయి. వేడిగా (Warm) ఉన్న ఋతువులో యివి పుస్తకాలు, కాగితాలు ఉన్న స్థలములో ఎక్కువగా ఉంటాయి. పిల్వర్ ఫిష్ గంజి వస్తువులను, కాగితాలను, పుస్తకాలను తింటాయి. కొన్ని సమయాలలో యివి ఉన్ని బట్టలను పాడుచేస్తాయి.

అంథ్రెనస్ (Anthrenus) కొన్ని సార్లు 'బఫెలోమాల్' అవబడు కార్పెట్ బీటీల్ కుల్నిన జంతుపంబంధమైన పదార్థాలను తినుస్కావెంజర్ వంటి కీటకము. దీని దింభకము కార్పెట్లను (Carpets), యితర బట్టలను నాశనము చేస్తాయి.

టెమియోలా (Temiola), టినియా (Trinea), ట్రెకోఫేజ్ (Trichophage) అను కీటకాలు బట్టలను పాడుచేయ మాత్రము. వీటి దింభకాలు ఉన్ని (Wool) రేయన్లు (Rayons), ఫర్ (Fur) మొదలైనటువంటి వానిని కలిగిన వస్తువలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. వాటి జీవిత కాలమంతా యివి ఆహారంగా తీసుకొను ఈ వస్తువులలోనే వివసిస్తాయి.

కందిరీగలు, కొన్ని రకాల చీమలు మానవుని కుట్టుతాయి నల్లులు, పేనులు, ఈగలు, దోమలు, సాండ్ ఈగలు (Sand fly) మానవుని లేదా అతని పెంపుడు జంతువుల రకాన్ని పీలుస్తాయి.

కొన్ని చీడ పురుగులు ప్రత్యేకంగా యిబ్బందులుగాని నష్టాన్ని కాని కలుగజేయును. కాని యిళ్ళలో వాటి పునికి చీడరింపుగా వుంటుంది. డ్రెయిన్ ఈగలు (Drainblies) MF: -Hz OHzP (B5V 7y)P *]) (Psocids), పుస్తకాల చీడలు (Book lice) గాలిలో ఎక్కువ తేమ (High humidity) ఉన్నప్పుడు చక్కగా జీవిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా కొత్త యిళ్ళలో పిమెంటు, కర్ర సామగ్రి నుండి వచ్చు చెమ్మ వాసనలు పోవునంత వరకు చాల ఎక్కువగా వుంటాయి.

అనేక రకాల యింటికి సంబంధించిన చీడలను నిరోధించటము గాని లేదా అదుపులో వుంచటముకాని చేయవలెనంటే చక్కని గృహ కర్మలు చేస్తు (Good house keeping), ఆరోగ్య సంరక్షణ సూత్రాలను (Principles of sanitation) తుచ తప్పకుండా పాటించవలె. మురికి పదార్థాలను తీసి వేయటము, మిగిలి పోయిన ఆహారాన్ని దూరంగా పడవేయటము, మురికిబట్టలను నిర్దిత స్థలాల్లో ఉంచటము వంటి క్రియల వలన చీడలకు నివాస స్థలము, తినడానికి తిండి లేకుండా చేసినట్లు అవుతుంది. అట్లా కాకుం డ యీ వస్తువులన్నీ నిర్లక్ష్యంగా యింటిలోనో లేక యింటికి సమీపంగానో పడవేసిన యెడల ఈ చీడలకు గుడ్డు పెట్టడానికి అవి అభివృద్ధి చెందటానికి అనువైన పరిస్థితులు కల్పించినట్లు అవుతుంది. ఈ అదను చూచుకొని అవి విస్తరించి నష్టాన్ని కలిగించటమే కాకుండా కొంత క్షోభను కల్గిస్తాయి.

21.8 మానవునికి కీటకాలు

మానవునిలో భయంకరమైన వ్యాధుల విస్తరణకు కొన్ని కీటకాలు ప్రముఖ పాత్రను కలిగి ఉంటాయి. అనేకము మాధ్యమిక అతిథేయులుగ ఉంటాయి. వివిధ రకాలజీవులు లేదా పరాన్న జీవులు వ్యాధులను కలుగ జేస్తాయి. ఇవి వైరస్లు, బాక్టీరియాలు, ప్రోటోజోవాన్లు, కొన్ని క్రిములు. కాని కీటకాలు చాలా వరకు వీటి వాహకాలుగా (Vectors or carriers) పని చేస్తాయి. ఇవి వ్యాధులను ఒక అతిథేయి నుండి మరొక అతిథేయికి సంక్రమింప జేస్తాయి. అనాఫిలస్ ప్రజాతి దోమ యొక్క వివిధ జాతులు మలేరియాను కలుజ జేయి ప్రోటోజోవాను (ప్లాస్మోడియం)ను సంక్రమింప జేస్తాయి. కొన్ని క్యూలేక్స్ (Culex) జాతి దోమలు నెమటోడ్ పరాన్న జీవమైన సైలేరియా బాంక్రాస్టిని సంక్రమింప జేస్తాయి. దీని వలన మానవునిలో బోదెకాలు (Elephantiasis) లేదా సైలేరియాసిస్ (Filariasis) అను వ్యాధి కలుగుతుంది. పసుపు వచ్చ (Yellow Fever) అను వ్యాధి స్టీగోమియా (Stegomyia) ద్వారా విస్తరింపబడుతుంది. మెదడు వాపు వ్యాధి (Encephalitis) వైరస్ వలన కలుగు తుంది. దీనిని వివిధ జాతుల దోమలు విస్తరింపజేస్తాయి. అఫ్రికా దేశాలలో నున్న భయంకరమైన దీర్ఘ నిద్ర వ్యాధి (Sleep piigsickness) ని రక్తాన్ని పీల్చుసీసీ ఈగ (Tsetse fly) ఒక అతిథేయి నుండి మరొక అతిథేయికి సంక్రమింపజేస్తుంది.

స్టీబోటమస్ అను ఈగ లిష్మేనియా డోనోవాని (Lishmania donovani) కి వాహకము. ఇది వ్యాధిని కలుగజేయు పరాన్న జీవిని రక్త ప్రవాహములోకి ఎక్కిస్తుంది. కలరా, టైఫాయిడ్, డయేరియా వంటి వ్యాధులకు వాహకము పాదారణ ఈగ (Common house fly) ముస్కా డొమెస్టికా (Musca domestica). ఈ వ్యాధులు మలినముతో కూడిన ఆహార పదార్థములు తినుట వలన కలుగుతుంది. బుట్‌వక్ ప్లేగు, రాట్‌ఫ్లే వలన తిరుగ మళ్ళిన జ్వరము (Relapsing fever) నల్ల, పేనుల వల్ల కలుగుతుంది.

21.9 పెంపుడు జంతువులకు హాని కలుగజేయు కీటకాలు

మానవుడు యే విధంగా అయితే చెప్ప నలవి కాని బాధలకు గురి అవుతాటో అదే విధముగా మానవునికి పునయోగంగా వున్న అనేక పెంపుడు జంతువులు కూడా ఈ కీటకాల వల్ల బాధితులే. గుర్రములో 'నగానా' అను వ్యాధిని కలుగ జేయు ప్రెసనోసోమా బ్రుసై (Trypanosoma brucei) ను గ్లాసీనా ఈగ విస్తరింప జేస్తుంది. గుర్రాలు, పశువులు మరొక ప్రెసనోసోమా జాతి వలన బాధలు పడుతూ వుంటుంది. టాబావస్, స్టామోక్సీస్ అను రక్తాన్ని పీల్చుఈగలు వాహకాలు, హైపోడర్మా (Hypoderma) వార్బల్ ఈగ ఆపు, ఎద్దు వంటి పశువులకు సంక్రమించి వ్యాధిని కలుగజేస్తాయి. గాసిటరోఫిల్లస్ (The bot fly) డింభకాలు గుర్రము జీర్ణాశయములో ప్రవేశించి వ్యాధిని కలుగజేస్తాయి. హిస్టోబోస్కా (the forest fly) గుర్రము, పశువు రక్తాన్ని పీల్చి వీటిలో రక్త ప్రాతవమును (Haemorrhage) కలుగ జేస్తుంది. మినోపాన్ కోళ్ళ పేను కోళ్ళ రక్తాన్ని పీల్చి, కోళ్ళ పెంపక పరిశ్రమకు (Poultry) నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి.

21.10 చెదపురుగులు

చెదపురుగులు (Termites) కుటుంబములతో (Colonies) సాంఘిక జీవనము గడుపు కీటకాలు వీటిలో బహురూపకత (Polymorphism) వుంటుంది. ఇవి ప్రధానంగా సెల్యూలోజ్ ను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. దీని ఆంత్రములో ట్రైకోలింఫా అను ప్లజిల్లేట్ సహజీవనము (Symbiont) గుడుపుతుంది. ఇది సెల్యూలోజ్ ను జీర్ణింపజేయటానికి ఉపయోగంగా వుంటుంది. ఇవి భూమిలోపల గూళ్ళనువిర్మిస్తాయి. వీటిని టర్మ టేలియములు అంటారు. ఇవి భూమిలోపల నివసిస్తాయి. కాబట్టి, వీటిని క్రిప్టోబయోటికి (Cryptobiotic) జీవులని అంటారు.

చెదపురుగులు బహురూపకతను ప్రదర్శిస్తాయి. ఇవి రెక్కలతోనున్న స్త్రీ (పటం 23.1 బి), పురుష జీవులు. ఇవి ఫలవంతము (Fertile) గ వుంటాయి. వంధ్యత్వము (Sterile) తోనున్న కూలి పేవక పురుగులు. ఇవి మానవునికి తీరని నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇవి నాశనముచేయు శక్తిని కలిగి వుంటే కర్రసాముగ్గి (Timber) ని పాడుచేస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ ఇరీదుగల ఫర్మిచర్ ను, వాకిళ్ళను, కిటికీలను, పుస్తకాలను, కాగితాలను పాడుచేస్తాయి. ఇవి ప్రత్యేకంగా రికార్డులున్న గదులను, ఇతర స్టోర్ రూములను ధ్వంసము చేస్తాయి. మానవునికి ఇవి ఉపకారులైన జీవులని వ్యాఖ్యానించనయ్యెడల కొంత విచిత్రంగాను, కొంత విరుద్ధంగాను కనిపిస్తుంది. కాని యివి వేలను సారవంతముగ చేసి వ్యవసాయదారునికి సహాయము చేస్తాయి. అఫ్రికా దేశములోని కొన్ని ప్రాంతాలలో స్వదేశయులు వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటారు. వీటిలో ఇనుము ధాతువు, కార్బియమ్, విటమిను A లు ఎక్కువగా వుంటాయి.

21.11 నివారణ పద్ధతులు

పంటలకు, నిలువ ధాన్యానికి ప్రజా ఆరోగ్యము మొదలైనవాటికి అర్థికంగా నష్టాన్ని కలుగజేయు కీటకాలను నివారించడము ఒక గొప్ప సవాలుగ పరణమిందినదనే చెప్పవలె. ఈ కీటకాలవలన యేడా ఇదు పంటలకోట్ల రూపాయల మేరకు నష్టపోతున్నట్లుగా అంచనా వేయబడినది. ఈ కీటకాలను అదుపులో పుంచుటకు ప్రపంచములోని అన్ని దేశాలు యుద్ధప్రాతిపదికమీద పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కింద కనబరచినవి కొన్ని నివారణోపాయాలు:

1. పరి జ్ఞాన పద్ధతులు 2. యాంత్రిక 3. రసాయన 4. జైవిక పద్ధతులు

21.11.1 పరి జ్ఞాన పద్ధతులు (Cultural methods)

పరి జ్ఞాన పద్ధతులు వ్యవసాయదారులు అలవర్చుకొను పద్ధతులు. ఇవి సమర్థతలో పాలము పనులను నిర్వహించు కార్యక్రమానికి (Efficient farm management) సంబంధించి వుంటుంది. ఈ పనులను చేబట్టుటలో అదనపు ఖర్చులు ఉండవు. పంటలువేయు క్రమములో చిన్నచిన్న మార్పులు చేయుటలో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు.

విత్తనాలు జల్లుట ఆలశ్యము చేసిన (Delaying the seeding) కొన్ని చీడ పురుగులను దూరముగ వుంచవచ్చు. ఇది ఈ కీటకాల జీవిత చరిత్ర. ఆహారపు అలవాట్లకు సంబంధించి వుంటుంది. అందువలన వ్యవసాయదారుల భాషలో వీటిని 'ఈగల లేమి తేదీలు' (Fly-free dates) అంటారు.

పంట పైరుల మిగులుము (Crop residues) సరి అగుపద్ధతిలో పడవేసిన ఈ కీటకాలును నివారించవచ్చు. చెత్త మొత్తలు సంతానోత్పత్తికి అభివృద్ధి చెందుతున్న డింభకాలకు అనువైన స్థలాలుగా ఉంటాయి. పూర్తిగా అరవేయటము (Drying) మిగులుమును మంట వేయటము, రసాయన పదార్థాలను జల్లుట, చీడపురుగుల్ని నిర్మూలించటానికి పునయోగించుకొన్న పద్ధతులు. పంటమిగుల్ని సక్రమంగా తీసివేయటానికి నాగరికపనిముట్లు కూడా తోడ్పడతాయి. చెత్తు, పరి, ప్రత్తిపైర్లకు యీ విధమైన పద్ధతి అవసరము.

చక్రగతిని పంటలను మార్చటము (Rotation of crops) చీడ పురుగులను నివారించు పద్ధతులలో చాల ముఖ్యమైనది. కొన్ని కీటకాలు ప్రత్యేకంగా ఒక రకమైన ఆహారాన్నే తింటూ ఉంటాయి. ఆహారసేకరణ కాలంలో ఈ పంటను తప్పించిన యెడల ఆ కీటకాలను నివారించటానికి వీలవుతుంది. ధాన్యపు పంటల తరువాత లెగ్యుమినా కుటుంబానికి సంబంధించిన పంటలనువేయట సాధారణంగ జరుగుతుంది.

తొందరగా పంటలను కోతవేసి (Early harvest of crops) కూడా నష్టాన్ని నిరోధించవచ్చు. దీని వలన ముఖ్యంగా పొత్తులను (Kernel) చీడపురుగుల బారి పడకుండ రక్షించవచ్చు.

21.11.2 యాంత్రిక పద్ధతులు:

ఈ పద్ధతిలో కీటకాలు భౌతిక ఆవరణలో మార్పులను తీసుకొని రావటానికి కొన్ని యాంత్రిక వుపాయాలను ప్రవేశపెట్టి వీటి జనాభాను తగ్గిస్తారు. చేతితో యేరటము, వలలో చిక్కించడము బాగుగా తెలిసిన కీటక నివారణ పద్ధతులు. తెరలు (Screens), హద్దులు (Barriers), జిగురు పట్టీలు (Sticky bands), చీడను కల్పించు ఉపాయాలు (Shading devices) మరికొన్ని యాంత్రిక పద్ధతులు భౌతిక నివారణ పద్ధతులలో విద్యుత్ (Electricity), శబ్దతరంగాలు (Sound waves), పర అరుణ కిరణాలు (Infra red rays), ఎక్స్ రేలు కాంతి (Light) వంటివి కొన్ని ఉన్నోగత మార్పులు, అతి వేడిగాని, అతి శీతలముగాని చేసి కీటకాల జీవక్రియను స్తంభింప జేసి మలభముగా ఏర్పూలించవచ్చు. అధిక ఉన్నోగత కీటక అభివృద్ధిని నిరోధిస్తుంది.

21.14 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. టెనెంటియా ప్రైవోరియమ్
 2. డిప్లెటా
 3. రసాయనిక
-

21.14 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. హానికరమైన కీటకాలు గురించి ఒక వ్యాసమును వ్రాయుము
 2. ఏవేని చీడపురుగుల జీవిత చరిత్రలను వివరించండి
 3. హానికరమైన కీటకాలను వివరించే పద్ధతుల గురించి వ్రాయండి.
- II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.
 1. ఇంటి పంబంధమైన చీడపురుగుల గురించి వ్రాయండి.
 2. మానవునికి వ్యాధిని కలుగజేయు కీటకాలు గురించి వ్రాయండి.
 3. ఈగ జీవిత చక్రాన్ని వివరించి, అది ఏ విధంగా జాడ్యవిస్తరణలో తోడ్పడుతుందో తెల్పండి
 4. చీడ సంహారులు అంటే ఏమిటి? క్రిమిహారుల వలన కలుగు అపదలు గురించి వ్రాయుము.

విషయక్రమము

22. 1. ఉద్దేశ్యము
22. 2. ఉపోద్ఘాతం
22. 3. సామాన్యలక్షణాలు
22. 4. వర్గీకరణ
 - 22.4.1 ఉపవర్గము — ఇత్రెనోజోవా
 - 22.4.2 ఉపవర్గము — హోమాలోజోవా
 - 22.4.3 ఉపవర్గము — క్రైనోజోవా
 - 22.4.4 ఉపవర్గము — లెప్టరోజోవా
22. 5 స్వపరిశీలన
22. 6 సారాంశం
22. 7 స్వపరిశీలనం జవాబులు
22. 8 నమూనా ప్రశ్నలు

22.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ పాఠములో ఇత్రెనోడర్మటా వర్గ లక్షణాలను, విభాగము వరకు వర్గీకరణ చేయడము జరిగింది. విభాగ లక్షణాలను ముఖ్యమైన ఉధాహరణల వివరణ కూడ చేయబడనది.

ఈ పాఠం చివర్లో నీవు పంచ వికిరణ పౌష్ట్యం, విచిత్రమైన జల ప్రసరణ వ్యవస్థ, ఎంటరోసీలన్ సీల్స్ అనే ప్రముఖ విషయాలను కేవలం సముద్ర వాసులైన ఈ జీవుల్లో ఏ విధంగా ఉంటాయో సులభంగా బోధించ గలుగుతావు.

22.2 ఉపోద్ఘాతం

ముళ్ళతో కూడిన చర్మము కలిగిన ఇత్రెనోడర్మటా (Gr. ఇకనన్ = ముళ్ళు, డర్మా = చర్మము) జీవులు బాహ్యంగా పలయసౌష్ఠవాన్ని, సాధారణంగా పంచకిరణ సౌష్ఠవాన్ని (Pentaradial symmetry) కలిగి వుండి ఐదు భుజాలతో వుంటాయి. ఇవన్నీ సముద్ర అడుగు భాగములో నివసించు జీవులు. ఒక్క ప్రజాతి మాత్రమే బ్రాకిన్ జలాలలో వుంటుంది. బాహ్యకవచము కార్నెల్ తో చేయబడి చర్మములో యిమిడి వుండి ఊచల (Rods) లేదా కంటకాలు (Spicules) లేదా ఫలకాలు (Plates) గా వుంటాయి. ఫలకాలు వాటి అంచులలో కలిసి వుండి చాలా వరకు ముళ్ళతో కప్పివుంటాయి. ఇవి త్రిస్తరిత, ఎంటరోసీలన్ జీవులు. జలప్రసరణ వ్యవస్థ ఈ వర్గజీవుల ప్రత్యేకత. ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించి వాలికా పాదాలు (Tube feet) అను మన్నితమైన విర్మాణాలు బయటికి పాడుచుకొని వుంటాయి. తల మెదడు వ్యక్తాలు వుండవు. బీజకోశాలు ప్రత్యేకమైన వాహికల ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటాయి. వీటి జీవిత చరిత్రలో అనేక దీంభక జీవులు ఉంటాయి. ఇవి

జీవ పరిణామ ప్రాముఖ్యతను కలిగి వుంటాయి. మమారు 6000 జీవించుయున్న జాతులు మరికొన్ని విలువజీవులు ఈ వర్గములో వున్నాయి.

ఇకైవోడర్మీలు చాలా పురాతన జీవులు. ఇవి 600 మిలియన్ల సంవత్సరాల ముందు కేంబ్రియన్ యుగములో అవతరించినాయి. జేకబ్ క్లీన్ (1934) వీటికి ఇకైవోడర్మీటా అనుపేరును పెట్టినాడు. 1847లో ల్యూకార్ట్ (Leuckert) యివి మెటజోవన్లలో వృష్టమైన సముదాయమని నివరించినాడు.

22.3 సామాన్య లక్షణాలు

ఇకైవోడర్మీటా జీవులు అనేక అసాధారణ లక్షణాలను కలిగి వున్నందున యితర జంతులతో యివి విభిన్నంగా వుంటాయి. ఇకైవోడర్మీటా జీవులు ఈ క్రింది సాధారణ లక్షణాలతో వుంటాయి.

1. ఇవి ప్రపంచములోని అన్ని సముద్రాల అడుగు భాగములో విస్తరించి వున్నాయి. తరుచుగా బ్రాకిష్ జలాలలో కూడా అగుపిస్తాయి.
2. ఇవి నెమ్మదిగా, స్వేచ్ఛగా కదులు ఒంటరి జీవులు. (Non-colonial) కొన్ని ప్లవకజీవులు, మరికొన్ని స్థానబద్ధ జీవులు.
3. శరీరము ఖండితరహితంగా వుంటుంది. కొన్ని జీవులు వక్షత్రాకారముతోను, కొన్ని బిళ్ళలవలె, మరికొన్ని చదునుగా లేదా స్థూపాకారంగా లేదా పువ్వులవలె విభిన్నాకారములో వుంటాయి.
4. వీటి పరిమాణము మితంగా వుంటుంది. కొన్ని సముద్రనక్షత్రాలు 32 అంగుళముల వెడల్పుతోమండగా, మరికొన్ని ఆరు అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి.
5. శరీరము వివిధ రంగులలో వుంటుంది.
6. బాహ్యంగా వలయసౌష్ఠవాన్ని కలిగి వుంటాయి. దీంభక జీవులు ద్విసార్వసౌష్ఠవము లేదా, ద్వివలయ సౌష్ఠవాన్ని (Biradial symmetry) కలిగి వుంటాయి.
7. మూడు జననస్తరాలతో త్రిస్తరిత జీవులు.
8. సాధారణంగా, తల, పూర్వ భాగము వుండవు, శరీరము వృష్టమైన రెండు తలాలతో వుంటుంది. నోరును కలిగివున్న ముఖతలము కిరణ ప్రాసారక క్రమంలో వ్యాపించిన ఐదు ఆంబులేక్రల ప్రాంతాలు (Ambulacral areas), వీటి మధ్య ఏకాంతరంగా అమరివున్న ఇంటర్ ఆంబులేక్రల్ ప్రాంతాల (Inter ambulacral areas) ను, పాయువు, రంధ్రఫలకాన్ని కలిగివున్న తలాన్ని ప్రతి ముఖతలము (Aboral surface) అని అంటారు.
9. బాహ్య, అంతరస్థిర సంజరాలు వుంటాయి. అంతర అస్థిసంజరము మధ్యత్వచ విర్మితము. ఇది దళనరిగాను కాలేగ్రిన్ ఫలకాలతో లేదా అస్థిఖండాలతో (Ossicles) వుంటుంది. ఈ ఫలకాలు కొన్నింటిమీద కదిలే ముళ్ళు (Movable spines), మరికొన్నింటి మీద కదలని ముళ్ళు (Immovable spines) ఉంటాయి. ఈ విధంగా చర్మము మీద కంటకాలు (ముళ్ళు) ఉన్నందున ఈ వర్గజీవులకు ఇకైవోడర్మీటా అను పేరు వచ్చింది.
10. అంత్రకుహరము మండి (Enterocoelous) విశాలంగా అభివృద్ధి చెంది, శైలికాయము అంత్రవేష్టనముతో (Peritoneum) నున్న శరీర కుహరము లేదా సీలోము వుంటుంది. ఇది వివిధ అవయవాలను ఆవరించి అమీబోసైటులతోపున్న సీలోమిక్ ద్రవముతో ఉంటుంది.
11. అవయవ వ్యవస్థ (Organ systems) లు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి.
12. జలప్రసరణ వ్యవస్థ లేదా ఆంబులేక్రల్ వ్యవస్థ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది. ఇందులో

విక్కువగా సముద్రజలము ప్రవరిస్తుంది. దీనికి అనుకూలంగా యిందులో జలాశయాలు (Reservoir) , నాళికలు (Ducts) ఉంటాయి.

13. గమనానికి జల ప్రసరణ వ్యవస్థ తోడ్పడుతుంది. గమనము జరుగునప్పుడు నాళికా పాదాలు (Tube feet) వెలుపలకు పొడుచుకొని వస్తాయి.
14. జీర్ణ వ్యవస్థ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది. కొన్ని సముదాయాలలో పాయువు లోపించి వుంటుంది. మరికొన్నింటిలో పాయువు క్షీణించి వుంటుంది. ఆహార సేకరణకు నాళికా పాదాలు తోడ్పడతాయి.
15. శ్వాసక్రియ సంకోచ శక్తిగల సూక్ష్మనిర్మాణాలైన చర్మీయ జల శ్వాసాయవాల (Dermal branchiae or papulae) ద్వారా జరుగుతుంది. ఇవి ప్రతి ముఖతలము (Abroal surface) మీద ఉంటాయి. పెడిసెల్లెరియాలు రూపాంతరము చెందిన ముఖ్య. ఇవి చర్మీయ జల శ్వాసాయవాలకు రక్షణ కల్పిస్తాయి.
16. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను హీమల్ వ్యవస్థ (Haemal system) అని అంటారు. ఇది పరచంగా విస్తృత లాక్యునా (Open lacuna) పద్ధతిలో వుంటుంది. వీటిలో గుండె వుండదు, కానీ రక్తనాళాలు వంటివి వుంటాయి.
17. వీటిలో విసర్జక అవయవాలు వుండవు. కానీ నత్రజని సంబంధమైన మలిన పదార్థాలు వ్యాపనం ద్వారా బహిష్కరింపబడతాయి.
18. నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు వుండదు, కావున పరచంగా ఉంటుంది. నోటి చుట్టూ పరిముఖ నాడీ వలయం (Circumoral ring) ఉంటుంది.
19. జ్ఞానేంద్రియాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది వుండవు. ఇవి స్పర్శకాలు, వర్ణక కంటే చుక్కలు (Pigment eye spots) , సమతులన కోశాలు (Statocysts) .
20. ఇవి ఏక లింగ జీవులు. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. బీజకోశాలు యింటర్ రేడియల్ స్థానాన్ని కలిగివుంటాయి. ఇవి నాళాల ద్వారా వెలుపలకు తెరుచుకుంటాయి. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా సముద్రజలంలో జరుగుతుంది.
21. పిండాభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా (Direct) లేదా అప్రత్యక్షంగా (indirect) జరుగుతుంది. డింభక జీవులు వివిధ సముదాయాలలో విభిన్నంగా వుంటాయి. వీటి తరువాత పున్నతస్థాయిలో పున్న జీవుల డింభకాలను పోలివున్నందున యివి పరిణామ ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవి.
22. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఆటోటమి (Autotomy) , పునరుత్పత్తి (Regeneration) వలన జరుగుతుంది.

22.4 వర్గీకరణ

ఇటీవల పైర్ (1965) ఇకెనోడర్మేటా వర్గాన్ని నాలుగు ఉపవర్గాలుగా విభజించినాడు. ఒక్కొక్క ఉపవర్గము అనేక విభాగాలుగా వుంటుంది. వర్గీకరణ ప్రక్కపేజీలో కనబరిచిన విధంగా ఉంటుంది:

22.4.1 ఉపవర్గము — ఇకెనోజోవా

ఇకెనోజోవా ఉపవర్గము ఐదు విభాగాలుగా విభక్తమై ఉంటుంది. ఈ విభాగాల సాధారణ లక్షణాలు ఈ క్రింది వివరించడమైనది:

i విభాగము — హెలికోస్టెలకాయడియా

1. పురాతన స్వేచ్ఛాజీవులు. కారిఫోర్సియాలో దిగువ కేంబ్రియన్ లో పీటి శిలాజాలు లభించాయి.
2. శరీరము ఇంచుమించు కదురు ఆకారముతో 35-75 మి.మీ పొడవుతో ఉండేవి.
3. శరీర కుడ్యములోని ఫలకాలు చదునుగా మన్న టెంట్లు లేదా గుల్లను ఏర్పరుస్తాయి.. ఇవి యాంటిక్లాక్ వైజ్ (Anticlock wise) దిశలో పర్చిలాకారంగా అమరి ఉంటాయి.
4. నోరు, పాయువు వ్యతిరేక దిశలలో (Opposite ends) ఉండేవి.

ఉదా: హెలికోస్టెలకన్


ii విభాగము — హోలోథూరాయిడియా (Holothuroidea)

1. ఇవి స్వేచ్ఛాజీవనము గడుపు ఇకైనోడర్మీలు.
2. శరీరము పొడవుగా, స్థూపాకారంగా వుండి రోసకాయను పాలి ఉంటాయి.
3. భుజాలు లోపించి ఉంటాయి.
4. శరీర కుడ్యము మెత్తగా ఉంటుంది. ముళ్ళు, కాల్కేరియన్ ఫలకాలు వుండవు.
5. అంతరస్థ పంజరము (Endoskeleton) క్షీణించి ఉంటుంది. కాని శరీర కుడ్యములో సూక్ష్మమైన కంకటాలు (Spicules) వుంటాయి.
6. నోటిచుట్టూ ముకులించుకోగల శాఖీయ (Retractile, branched) పుర్రుకాలు వలయాకారంగా అమరి ఉంటాయి.
7. నోటికి వ్యతిరేక దిశలో (ముఖపాయు అక్షదిశ -Oroanal axis) పాయువు వుంటుంది.
8. శరీరంలోని ఉదరతలంలో రెండు వరుసలలో చూషకాలతో కూడిన నాలికాపాదాలు (Suctorial tentacles) ఉంటాయి. పుష్కలములోని నాలికా పాదాలకు చూషకాలు ఉండవు.
9. పెడిసెల్లేరియన్లు ఉండవు.
10. జీర్ణనాళము పొడవుగా మెలికలు తిరిగి (Coiled) ఉంటుంది.
11. జలప్రసరణ వ్యవస్థ లేదా ఆంటులేక్రర్ వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది.
12. నాడీవలయము నోటి చుట్టూ ఉంటుంది, దీనినుండి ఐదు రేడియల్ నాడులు వ్యాపిస్తాయి.
13. ఇవి ఏకలింగజీవులు

ఉదా: కుకుమేరియ (పటం 22.1. ఏ), మాల్పేడియ, థయోన్ (పటం 222.1 బి)

iii విభాగము — ఇడియో ఆస్ట్రాయిడియా

1. మాధ్యమిక కేంబ్రియన్ యుగములో అవతరించి కార్బోనిఫెరస్ యుగములో విలుప్తమైనవి.



పటం 24.1 ఇకైనోడర్మీలు. A. కుకుమేరియా ప్లాన్సి B. థయోన్ 1. శాఖీకరణగా విభజమైన సామాన్య పుర్రుకాలు 2. కురువనై ఉదర మధ్యంగా ఉండే ఒక జత పుర్రుకాలు 3. ఇంట్రో పర్ట్ (కాలర్) 4. ఉదరంగా ఉండి గమనానికి ఉపయోగపడే పాదాలు 5. పాయువు:

2. టెస్టు వంగెడు (Flexible) లక్షణముతో ఉంటుంది.

3. వోరు, పాయువు, టెస్టు ఫైతలముతో ఉంటాయి.

ఉదా: ఎడియోస్టర్, ఎసోరోఫస్.

iv విభాగము — ఎకినాయిడియా

1. శరీర ఆకారము గోళాకారంగా కాని (Globular), బిళ్ళ రూపము (Discshaped) లో కాని, గుండె ఆకారం (Heart-shaped) లో కాని ఉంటాయి.

2. శరీరము బాగా అభివృద్ధి చెందిన టెస్టులో యిమిడి ఉంటుంది.


3. వోరు, పాయువు వరుసగా ముఖ, ప్రతిముఖ తలాలతో ఉంటాయి.

4. అస్థిపంజరము కదలలేని కార్టేజీయస్ అస్థిభండాలతో ఉంటుంది.


5. శరీరతలము మీద దృఢమైన, స్థూపాకారంగా వున్న కదిలే ముళ్ళు ఉంటాయి. ఇవి అన్ని దిశలలో తిరుగగలవు.

6. ఈ ముళ్ళ మధ్యలో చూషకాలతో వున్న నాలికా పాదాలు ఐదు ద్వంద వరుసల (Five double rows) లో వుంటాయి.

7. మొక్కలవలెనున్న పది జల శ్వాసావయవాలు (Dermal branchiae) పరిముఖ భాగాన ఉంటాయి.



A



B



C

పటం 22.2 ఇకెనోడెర్మలు

A. ఎక్టెన్స్

B. క్లెఫ్టోయూస్టర్ లోరెన్షియన్

C. ఇక్టెనోకార్డియమ్ కాల్టేయన్

1. అంటులేక్టమ్లు

2. అంతర (ఇంటర్) అంటులేక్టమ్లు

3. పరిముఖము

4. ముఖస్పర్శకాలు

5. దంతాలు

6. జల శ్వాసావయవాలు

7. పెంటాకాలు (ముళ్ళు)

8. రీజ రంధ్రము

9. రంధ్ర ఫంక్షము

10. పుష్కరిత రూపంలో ఉన్న అంటులేక్టమ్లు

11. మార్బురెండిన్ పూర్వార్థ అంటులేక్టమ్

12. పరిముఖస్పర్శకము

13. వోరు

14. ఎన్న అంటులేక్టర్ కంటకాలు

15. పరాంత అంతర (ఇంటర్) అంటులేక్టమ్

ముఖము పుష్కరిత రూపంలో ఉన్న ఒక దశద యంత్రాంగము ఉంటుంది. దీనిని లంఠెస్టాటిల్ దీపము (Lantern

అంటారు. ఇది ఐదు పార్శ్వాలన్న (Five sided) పిరమిడ్ వలె వుండి, పొడవుగా 261

మిల్లీమీటర్ల రెండింటి దంతాలతో ఉంటుంది.

9. పెడిసెల్లేరియాలు వ్యంతముతో వుండి మూడు దవడలను కలిగి ఉంటుంది.
 10. జల ప్రసరణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఒక ప్రసరణ గ్రంథి (Vascular gland) ఉంటుంది. ఇది విపర్ణ క్రియకు తోడ్పడవచ్చు.
 11. జీర్ణనాళము గొట్టంవలె ఉంటుంది.
 12. ఇవి ఏకలింగ జీవులు.
- ఉదా: ఎక్లెవస్ (Echinus) (పటం 24.2.ఎ)
క్లైపెస్టర్ (Clypeaster) (పటం 24.2. బి),
లోబినియా, ఎక్లెవోకార్డియస్ (పటం 24.2 సి)

v విభాగము — ఫైయోసిస్టిడెడియా

1. ఇవి విలుప్త ఇక్లెవోడర్మ్ జీవులు.
2. టెస్టుమీద బహుభుజాలతో (Polygonal) మున్న ఫలకాలు ఉంటాయి.
3. నోటిలో యింటర్ రేడియన్స్ తో అమరిన ఐదు దవడలు ఉంటాయి.
4. ప్రతి ఆంటులేక్టర్ గాడి నుండి ఎనిమిది జతల నాలికా పాదాలు ఉంటాయి.

22.4.2 ఉపవర్గము — హోమాలోజోవా


1. ఇవన్నీ విలుప్త ఇక్లెవోడర్మ్ జీవులు.
 2. శరీరము పుష్కోదరంగా అణిగి వుంటుంది.
 3. ద్విపార్శ్వ పాష్టవము లేదు.
 4. నోటికి యిరువైపుల ఒక జతల భుజాలవంటి అవయవాలు ఉంటాయి.
 5. నోటికి వ్యతిరేక దిశలో (Opposite end) తోకవలె మున్న కాడ గమన ఉపాంగముగా (Locomotor appendage) ఉంటుంది.
 6. జీర్ణనాళము U- ఆకారములో ఉంటుంది.
- ఉదా: ఎనోప్లరా, డెన్రోసిస్టై టెన్

22.4.3 ఉపవర్గము — క్లైవోజోవా

ఈ ఉపవర్గములో క్లైనాయిడియా అను ఒక విభాగము మాత్రమే ఉన్నది.

విభాగము — క్లైనాయిడియా

1. శరీరము మధ్య ఫలకము (Central disc) కలిగి ఉంటుంది. శాఖీయంగా కిరణ ప్రసారక క్రమములో అయిదు భుజాలు ఈ ఫలకము నుండి వ్యాపించి ఉంటాయి.
2. పృష్ఠంగా వున్న ప్రతిముఖ తలము, కిందవైపు వుంటుంది. ఉదరంగా వున్న ముఖ తలము, పైవైపు ఉంటుంది.
3. స్వేచ్ఛగా కదలడానికి వీలై ఈకలవలె వుండి రెండుగా విభక్తమై భుజాలు గమనావయవాలుగా వ్యవహరిస్తాయి.
4. నోరు, పాయువు ఉదరంగా ఉంటాయి.
5. డిస్కుయొక్క పృష్ఠతలములో అస్థిభండాలు ఉంటాయి.
6. జలప్రసరణ వ్యవస్థలో వలయ కుల్య, రేడియల్ కుల్యలు ఉంటాయి. నాలికా పాదాలు గమనముకు ఉపయోగంగా వుండవు. కానీ, అపార సేకరణకు పనికివస్తాయి.



పటం 22.3 ఏంటీడాన్ బైఫిడా 1. పిన్యాల్లు 2. అంబులేక్ట్ గాడులు 3. భుజాలు 4. ఉపాహితాంగాలు (Cirri)

7. ఇవి ఏకలింగజీవులు.

8. మానవునికి యివి ఉపయోగంగా లేదు కాబట్టి, ఈ జీవులకు ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత లేదు.

ఉదా: ఏంటీడాన్ (Antedon) (పటం 24.3), మెట్రాకైసన్.

22.4.4 ఉపవర్గము — అస్టరోజోవా

1. వలయ పాత్యవముతో నున్న స్వేచ్ఛాజీవులు.


2. శరీరము నక్షత్ర ఆకారములో వుండి, సెంట్రల్ డిస్కు నుండి విస్తరించిన ఐదు భుజాలతో ఉంటుంది.

3. ఉదరంగా వున్న ముఖతలము మీద నోరు ఉంటుంది. పాయువు పృష్ఠంగా వున్న ప్రతి ముఖతలంతో ఉంటుంది.

4. అంబులేక్ట్ గాడితో రెండు ద్వంద్వ వరుసలతోనున్న నాలికా పాదాలు ఉంటాయి.

5. శరీర కుహరము శైలికామయ అంతర్వేష్టనంతో వుండి సీలోమిక్ ద్రవముచే నిండి ఉంటుంది.

6. అపార నాళము బాగుగా అభివృద్ధి చెంది వివిధ భాగాలలో ఉంటుంది.



పటం 22.4 ఇక్టెరోడర్మైట్లు A. ఓసియోత్రిక్స్ B. సెటాస్టర్ 1. భుజాలు 2. హోరు 3. ఉపాంత ఫంకాలు 4. డిస్క్ (Disc)

7. పెడిసెల్లేరియాలు ఉంటాయి.

8. స్పర్శక స్పర్శాంగము (Tactile tentacles), కంటి చుక్క జ్ఞానేంద్రియాలు.

9. ఏకలింగ జీవులు (Dioecious), అభివృద్ధిలో డింభక జీవులు ఉంటాయి. వీటికి జీవ పరిణామ ప్రాముఖ్యత (Evolutinary significance) వుంటుంది.

ఉదా: ఆస్టరియాస్, ఓఫియోత్రిక్స్ (పటం 22.4 ఎ.)

సాలాస్టర్ (పటం 22.4 బి)

22.5 స్వపరిశీలన

1. అన్నివైపులా కదిలే కంటకాలతో ఉండే శరీరం గల _____ జీవులు విభాగాని చెందినవి.
2. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ _____, _____ క్రియలను నిర్వహిస్తుంది.
3. ద్విశాఖీయ బాహువులు _____ విభాగానికి చెందిన జీవులు.

22.6. సారాంశం

1. ఇక్టెనోడర్మేటా జీవులు బాగుగా అభివృద్ధి చెందిన అకశీరుకాలు.
2. ఇవి ముళ్ళుతోనున్న చర్మముకల జీవులు. అందువలన వీటి బాహ్యకవచము ముళ్ళతో ఉంటుంది.
3. శరీరము పంచ వికీరణం సౌష్ఠవముతో ఉంటుంది.
4. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ఈ వర్గ సత్యేకత.
5. శరీర ధర్మక్రియలు బాగా అభివృద్ధి చెందినవి.
6. పిండాభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. వివిధ విభాగాలలో డింభకాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి.
7. ఇక్టెనోడర్మేటా వర్గములో ఏడు విభాగాలు వుంటాయి. ఇందులో కొన్ని విలుప్తమైనాయి.
8. వివిధ విభాగాలలోని జీవులన్ని కూడా సముద్రజాలాలలో అడుగు భాగములో నివసించేవే.

22.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. ఇక్టెనాయిడియా 2. గమన, శ్వాస, 3. క్రైనాయిడియా

22.8. నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 సంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము
 1. ఇక్టెనోడర్మేటా సాధారణ లక్షణాలను పేర్కొనుము.
 2. ఇక్టెనోడర్మేటా వర్గాన్ని సోదాహరణంగా వర్గీకరించుము.
- II. ఈ క్రింది వాటికి 10 వాక్యములలో వ్రాయుము.
 1. హోతోథూరాయిడియా
 2. ఎకినాయిడియా
 3. క్రైనాయిడియా

భాగము — 23 అష్టరియన్

విషయక్రమము

23. 1. ఉద్దేశ్యము
23. 2. ఉపోద్ఘాతం
23. 3. బాహ్యలక్షణాలు
 - 23.3.1. ముఖతలము
 - 23.3.2. పరిముఖ తలము
 - 23.3.3. శరీర కుద్యము
23. 4. అంతరస్థి పంజరము
23. 5. శరీర కుహరము
23. 6. జీర్ణవ్యవస్థ
 - 23.6.1. ఆహార నాళము
 - 23.6.2. జీర్ణ గ్రంథులు
23. 7. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ
23. 8. హీమల్ వ్యవస్థ
23. 9. పెరిహీమల్ వ్యవస్థ
- 23.10. శ్వాస వ్యవస్థ
- 23.11. విసర్జక క్రియ
- 23.12. ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 23.13. స్వపరిశీలనం
- 23.14. సాదాశం
- 23.15. స్వపరిశీలనం జనాబులు
- 23.16. నమూనా ప్రశ్నలు

23.1 ఉద్దేశ్యము

ఇకైనోడర్మేలా వర్గములోని నమూనా జీవిగా అష్టరియాన్సు (సముద్ర నక్షత్రం) గురించి విస్తృతంగా వివరించడము జరిగింది. ఈ వివరణలో బాహ్య, అంతర నిర్మాణాలే కాకుండా వివిధ వ్యవస్థల జీవక్రియలు కూడా వివరించడమైనది.

ఇది చదవడం పూర్తికాగానే ఏపు వికిరణ సౌష్ఠ్యం, మధ్యస్థ విర్మితమైన, కాల్షియం అష్టికలకాం అంతరస్థిపంజరం, డింభకదశలో ఏర్పడే ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యం మొదలైన భావనలను ముఖ్యంగా బోధించగలుగుతావు.

23.3.2 పరిముఖ తలము

ఇది జీవి యొక్క ఉపరి తలము. ఇందులోని భాగాలు ఇవి.


కంటకము లేక బొడిపెలు (Spine-tubercles): ఇది కదలలేని కాలేరియస్ నిర్మాణాలు. ఇవి క్రమపద్ధతిలో అమరివుండవు. ముఖతలములో ముళ్ళవలె అస్థి ఖండాలమీద వుంటాయి (పటం 23.1).

చర్మీయ శ్వాస అవయవాలు లేదా చర్మీయ మొప్పలు: ఇవి అస్థిఖండాల మధ్యలో వుంటాయి. ఇవి మృదువైన సన్నని తంతురూప వేళ్ళవంటి నిర్మాణాలు. ఇవి శరీరములోనికి ముకుళించుకోగలవు (పటం 23.2. ఎ). ఇవి శ్వాసాంగాలుగా ఉపయోగపడుతాయి.

పాయవు: ఇది పరిముఖ తలములో సెంట్రల్ డిస్కు మధ్యలో నిర్మింపబడిన చిన్నని రంధ్రము.

రంధ్ర ఫలకము (Madreporite): ఇది చిన్నని, బల్లపరుపుగానున్న జల్లెడ వంటి (Sieve-like) రంధ్ర ఫలకము. ఈ రంధ్రం ద్వారా నీరు శరీరము లోనికి, జల ప్రసరణ వ్యవస్థలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది రెండు భుజాలకు మధ్యన వుంటుంది. ఈ భుజాలను ద్వయము (Bivium) అని మిగిలిన మూడు భుజాలను త్రయము (Trivium) అని అంటారు.

పైన వివరించిన నిర్మాణాలే కాకుండా ముఖ, పరిముఖాలల మీద మరికొన్ని ముఖ్య నిర్మాణాలున్నాయి. ఇవి పెడిసెల్లెరియవ్లు.



పటం: 23.2. సముద్ర నక్షత్రము A. పెడిసెల్లెరియవ్లు పాప్యూలాలు, బుడిపెల సమూహము B. పెడిసెల్లెరియవ్లు. i. బంధిత రకము ii. తిన్నటి (Straight) రకము. 1. బుడిపె లేదా కంటకము 2. పాప్యూలాలు 3. పెడిసెల్లెరియవ్లు 4. కవాటాలు 5. అపవర్తనీ కండరము 6. అభివర్తనీ కండరము 7. ఆధారతునక.

పెడిసెల్లెరియవ్లు Pedicellariae: ఇవి రూపాంతరం చెందిన ముళ్ళు. రెండు తలల మీద ముళ్ళమధ్య వుంటాయి. ఇవి పాట్టిగా, కదల గలిగి శ్రావణమువలె (Pincer-like) వుంటాయి. ప్రతి ఒక్క పెడిసెల్లెరియవ్ కదలే వ్యంతము, మూడు కాలేరియస్ ఫలకాలతో వుంటుంది. ఈ మూడు ఫలకాలతో ఒకటి ఆధార ఫలకము (Basilar plate) కాగా మిగిలిన రెండు కదిలే దవడల వంటి నిర్మాణాలు. అభివర్తనీ, అపవర్తనీ కండరాలచే దవడల చుట్టూ వుంటాయి. మూడు ఫలకాలతోనున్న ఈ విధమైన పెడిసెల్లెరియవ్లు ఫోర్సిప్యూలేట్ (Forceipulate) పెడిసెల్లెరియవ్ అని అంటారు (పటం 23.2.బి). ఇవి జీవి శరీరము మీద చేరిన అన్యపదార్థాలను తీసివేసి శ్వాసక్రియ జరపటానికి చర్మీయ జలశ్వాస అవయవాలను శుభ్రంగా వుంచుతుంది. జలశ్వాస అవయవాలకు రక్షణకూడా కలుగజేస్తాయి.

పెడిసెల్లెరియమ్లోని రకాలు: దవడల నిర్మాణాన్ని బట్టి పెడిసెల్లెరియమ్లు రెండు రకాలుగా వుంటాయి.

i. వేరుగా వున్న రకము లేదా శ్రావణము (Straight or forceps type) దవడలు వేరుగా వుండి ఆధార ఫలకాన్ని అతికి వుంటాయి. ఇవి ఒకదానికొకటి సమాంతరముగ శ్రావణములోని రెండు భుజాలవలె వుంటాయి.

ii. కత్తెర వలె అడ్డుగా వున్న రకము (Crossed type or scissors-like) దవడలు వంకరగా వుండి మూసుకొన్నప్పుడు కత్తెరలోని బ్లేడులవలె ఒకదాని మీద ఒకటి వుంటాయి.

23.3.3 శరీర కుడ్యము

ఒక భుజము అడ్డుకోతను గాని నిలుపు కోతను గాని పరిశీరిస్తే జీనియొక్క నిర్మాణము విశదం అవుతుంది. ఇందులో ఈ కింది స్తరాలు వుంటాయి.

అవభాసిని (Cuticle): ఇది బాహ్యంగా వుండే పలువన్నె రెండు స్తరాల పార.

బాహ్యత్వచము: ఇది అవభాసినికి దిగువ ఉంటుంది. ఇది శైలికామయ కణాలతో వుంటుంది. ఇది బాహ్య నిర్మాణాలన్నింటిని కప్పతూ వుంటుంది. ఈ త్వచములోని కణాలు వివిధ రకాలుగా వుంటాయి. ఇవి కదురు ఆకారములోనున్న నాఢీ, స్పర్శక కణాలు, వర్ణక, రేణుకా కణాలు, గదాకృతిలోని గ్రంథీ కణాలు. వర్ణక కణాలు జీవుల రంగును నిర్ణయిస్తాయి. గ్రంథీ కణాలు శ్లేష్మ పదార్థాన్ని స్రవిస్తాయి.

చర్మీయత్వచము (Dermis) లేదా మధ్య త్వచము: ఇది వెలుపల, లోపల భాగాలతో వున్న దళపరి స్తరము. కార్కేరియస్ ఫలకాలు లేదా అస్థిఖండాలను మధ్యత్వచము స్రవిస్తుంది.

కండరస్తరము (Muscle layer) : ఇది సునుపు కండరస్తరాలతో వుంటుంది. బాహ్యంగా వర్తుల కండర స్తరము, లోపలి వైపు ఆయత కండరస్తరము వుంటుంది. కండర నిర్మాణాలు భుజాల కదలికకు ఉపయోగపడుతుంది.

శరీర కుహర ఉపకళ (Coelomic epithelium) లేదా ఆంత్రవేష్టనము: ఇది లోపలి స్తరము. ఇది శరీర కుహరాన్ని ఆవరించి వుంటుంది. ఘనాకార (Cuboidal) కణాభ కణాలతో వుంటుంది.


23.4 అంతరస్థి పంజరము (Endoskeleton)

అంతరస్థి పంజరము (Endoskeleton) కార్కేరియస్ అస్థి ఖండాలతో యేర్పడి వుంటుంది. ఇది జీవి శరీరానికి దృఢత్వాన్ని యిస్తుంది. ప్రతి ఒక్క అస్థిఖండము ఊచవంటి స్టటికాకార కార్బైల్ అను నిర్మాణముచే చేయబడి వుంటుంది. అస్థిఖండాలు సంయోజక, కండర కణజాలాలచే కలుపబడి వుంటుంది. దీనివలన శరీరానికి కొంత కదల గలిగే స్థితి ఏర్పడుతుంది.

అస్థి ఖండాలు వివిధ రకాలుగా వుంటాయని యిదివరకే గమనించాము. కాని మరల ఒక్కమారు వాటిని పరిశీలిద్దాము:

i. ముఖ అస్థిఖండాలు (Oral ossicles) : నోటిని చుట్టి ఐదు ఫలకాలు వుంటాయి.

ii. అంటులేక్రల్ అస్థిఖండాలు: అంటులేక్రల్ గాడిపై వుంటాయి.



పటం 23.3 అడ్లరియాన్. A. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ. B. రంధ్ర ఫలకము ఆయత కోత (నిలువు) C శిలాకుల్య అడ్డుకోత D. ఒక నాళికా పాదం. 1. రంధ్ర ఫలకము 2. శిలాకుల్య 3. నాళికాపాదము 4. వలయనాళము 5. రేడియల్ (వ్యాసార్థ) కుల్య 6. అడ్డులేదా పార్శ్వకుల్య 7. టీడ్మన్ దేహాలు 8. రంధ్రకుల్య 9. శైలికలు 10. స్రంగహణ కుల్య 11. కలశిక 12. పటలికలు 13. శిలాకుల్య గుహ్యరము 14. నాళము 15. చూషకము.

శిలాకుల్య (Stomach canal): కలశిక శిలాకుల్యలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఇది S ఆకారంలో వుంటుంది. పేరుకు తగినట్లుగా ఈ కుల్య గోడ దృఢమైన కార్క్రియిన్ వలయాలతో ఉంటుంది. శిలాకుల్య కుహరిక కళాభ లేక శైలికామయ కణాలచే నిర్మింపబడిన ఉపకళతో ఉంటుంది. కుహరికతో పుబ్బెత్తు కటకము వంటి నిర్మాణము శిలాకుల్య కుహరాన్ని రెండు సర్పిలాకార పటలికలుగా (Spirally coiled lamellae) విభజిస్తుంది (పటం 23.3 స). అక్షియావయవము (Axial organ) అనే నిర్మాణము అక్షియ కోలర (Axial sinus) కుడ్యాలలో ఉంటుంది. ఇది శిలా కుల్యను ఆవరించి వుంటుంది.

వలయకుల్య (Ring canal): శిలాకుల్య లయిదు పార్శ్వాలతో వున్న ఒక వలయాకార కుల్య లోనికి దారితీస్తాయి. ఇది అహార వాహకను చుట్టి వుంటుంది.


టీడ్మన్ దేహాలు (Tiedmann's bodies) : ఇవి రెసిమోస్ గ్రంథులు. వలయకుల్యలో తలముతో తొమ్మిది బోలుగా వున్న టీడ్మన్ దేహాలు అను నిర్మాణాలు వుంటాయి. ఇవి ఆమీబోస్టైటులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

రేడియల్ కుల్య (Radial canal) వలయ కుల్య నుండి బాహ్యంగా లయిదు పాడవమైన శైలికామయ కుల్యలు యేర్పడుతాయి. వీటిని రేడియల్ కుల్యలని అంటారు. ఇవి భుజము చివరకు విస్తరించి స్పర్శకము వర్ణ అంతమవుతాయి.

పార్శ్వకుల్యలు లేదా పోడియల్ కుల్యలు (Lateral canals) : పార్శ్వ కుల్యలు నాళికా పాదాలలోనికి రంధ్రాల ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. ఈ రంధ్రాల గుండా ద్రవ పదార్థము వెనుకకు ప్రవహించకుండా కవాటాలు (Valves) అటంక పరుస్తాయి. నాళికా పాదాలు నాలుగు వరుసలలో వుంటాయి. ప్రతి ఒక్క నాళికా పాదము మూడు భాగాలతో వుంటుంది. చివర ఒక చూషకము, మధ్య ప్రాంతంలో నాళిక, సమీప ప్రాంతంలో ఒక కలశిక ఉంటుంది. నాళికా పాదాలు కండర పోగులను కలిగి వుంటాయి (పటం 23.5 డి).

జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అంతయు కండర కుడ్యాలతోను, శైలికామయ ఉపకళా కణాలతోను ఉంటుంది. శైలికల కదలికలు కుల్యలలో నిరంతరము నీటి ప్రవాహాన్ని కలుగజేస్తాయి.

నీటి ప్రవాహ మార్గము: రంధ్ర ఫలకము ద్వారా సముద్రపు నీరు, వ్యవస్థలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. రంధ్ర ఫలకములోని అనేక సూక్ష్మరంధ్రాలు ఈ నీటిని రంధ్ర కుల్యలోనికి సంపుటాయి. సంగ్రహణ కుల్యలు (Collecting canals) ద్వారా రంధ్ర కుల్యలోని నీరు కలశికలను చేరుతుంది. అక్కడ నుండి నీరు శిలాకుల్యలోనికి ప్రవేశించి తరువాత పంచ భూజాలతో నున్న వలయ కుల్యలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ యివి టీడ్ మన్ దేహాలలో కూడా ప్రవేశిస్తాయి. ఇక్కడ నుండి నీటి ప్రవాహము రేడియల్ కుల్య, పార్శ్వ కుల్యలు, చివరకు నాలికా పాదాలను నింపుతుంది (పటం 23.4)



పటం 23.4. సముద్ర నక్షత్రము - జల ప్రసరణ వ్యవస్థలో నీటి ప్రవాహము యొక్క మార్గము

జల ప్రసరణ వ్యవస్థ విధులు: ఇక్టెనోడర్మిలో జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ప్రథమంగా యిది గమనానికి ఉపయుక్తంగా వుంటుంది. ఇది గాక నాలికా పాదాలు అహార సేకరణకు, మరియు పదార్థాల విసర్జనకు తోడ్పడతాయి.

గమనము: సముద్ర నక్షత్రాలు కోరుకున్న దిశలో కదలగలవు. ఇది నిలుపు, అడ్డుతలాల మీద కూడా సులభంగా ప్రాకగలవు. గమనానికి నాలికా పాదాలు ఉపయుక్తంగా వుంటాయని యిదివరకే తెలుసుకున్నాము. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే జల ప్రసరణ వ్యవస్థలోని ద్రవ పీడన శక్తి (Hydraulic pressure) వలన గమనము జరుగుతుంది.

గమనములోని వివిధ దశలు ఈ కింద వివరించినట్లుగా వుంటుంది.

1. కదలు వైపు (Direction of movement) భుజాన్ని పైకి ఎత్తుతుంది.
2. నీరు రంధ్రఫలకము ద్వారా ప్రవేశించి చివరకు కలశికను చేరుతుంది.
3. కలశికలు సంకోచించు కోవడం వలన నీరు నాలికా పాదాలలోనికి ప్రవేశిస్తుంది.
4. నీటి పీడనశక్తి హెచ్చుగా వుండటం వలన నాలికాపాదము విస్తరించి, అధస్తరానికి అంటిపెట్టుకుంటుంది.
5. చూషకాలలో వాక్చుము (Vacuum) యేర్పడటం వలన అది అంటిపెట్టుకోవడానికి అనువుగా వుంటుంది. ఇదేగాక నాలికా పాదాల అంచులలో స్రవించుటకు శ్లేష్మపదార్థము కూడా దీనికి దోహదము చేస్తుంది.
6. విస్తరించిన నాలికా పాదాలు జంతువును ముందుకు నెట్టుతాయి.

7. నాళికా పాద కండరాలు సంకోచం చెంది నీటి ప్రవాహాన్ని వెనుకకు మళ్ళించుతాయి. దీని వలన నాళికా పాదాలు కురుచనపుతాయి.
8. చూషకాలు అధస్తరాన్ని వదలి వేయడంలో జీవి ముందుకు కదులుతుంది.
9. ఈ విధంగా నాళికా పాదముయొక్క సంకోచ పదలికలు, పరిమరి జరగటము వలన గమనము జరుగుతుంది.

సముద్ర నక్షత్రాలు వెమ్మదిగా ముందుకు కదలుతాయి. ఇది ఒక నిమిషానికి 15 సెం.మీ వెళ్ళగలదు.

23.8. హీమల్ వ్యవస్థ (Heamal system)

సముద్ర నక్షత్రములో రక్తసరణ వ్యవస్థ, దీనికి సంబంధించిన నాళాలు వుండవు. దీనికి బదులు పోషక పదార్థాలను తీసుకోని వెళ్ళే ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది. దీనిని హీమల్ వ్యవస్థ అంటారు. ఇది అక్షీయ గ్రంథి (Axial gland), ముఖ రక్త వలయ నాళము (Oral haemal ring), ప్రతిముఖ రక్త వలయ నాళము (Aboral haemal ring) లో ఉంటుంది. ఇది గాలి గదులున్న (Lacunar) రకానికి చెందినది.

అక్షీయ గ్రంథి (Axial gland) : ఇది వ్యవస్థలోని ముఖ్యమైనభాగం. దీనిని గుండెతో పోల్చవచ్చు. ఇది అక్షీయ కోటరము (Axial sinus) లో వుంటుంది. సీరోమోసైటులు గోధుమ వర్ణంలో ఉంటాయి (పటం 23.5)

ముఖరక్త వలయము (Oral haemal ring) : ఇది నోటి చుట్టూ వుంటుంది. ప్రతి ఒక్క భుజములో యిది రేడియల్ రక్త కోటరాన్ని యేర్పరుస్తుంది.

ప్రతి ముఖ రక్తవలయము (Aboral haemal ring) : ఇది అక్షీయ గ్రంథి ద్వారా ముఖ రక్తవలయంతో సంబంధం కలిగి వుంటుంది. ఇది అయిదు జతల జననేంద్రియ రక్తరాపకాలను (Genital haemal strands) బీజకోశాలకు పంపుతుంది.

23.9. పెరిహీమల్ వ్యవస్థ


ఇది నాళాలతోను, సీరోమిక్ కోటరాలతోను వుంటుంది. దీనిలోని భాగాలు :

అక్షీయ కోటరము (Axial sinus) : ఇది శిలా కుక్కను అక్షీయ గ్రంథిని చుట్టివున్న వెడల్పైన గొట్టము.

(i) పరిముఖ అక్షీయ కోటరము (Aboral ring sinus) : ఇది పేగును చుట్టి వుంటుంది. ఇది పది జననేంద్రియ శాఖలను యేర్పరుస్తుంది.

(ii) ముఖవలయ కోటరాలు (Oral ring sinus) : ఇది నోటి చుట్టూవుంటుంది.

(iii) కిరణ పరిరక్త కోటరము (Radial perihemal sinus) : ఇది ప్రతి ఒక భుజములో వుంటుంది. ముఖ వలయ కోటరము నుండి యిది రెండు శాఖలలో వుంటుంది.



పటం 23.5 ఆస్టరియాన్ పరిరక్త రక్త (పీమల్) వ్యవస్థలు 1. బీజకోశాలు 2. ప్రతిముఖ రక్తవలయము 3. ప్రతిముఖ పరిరక్త వలయ కోటరము 4. అక్షీయ కోటరము 5. అక్షీయ గ్రంథి 6. ముఖరక్త (పీమల్) వలయము 7. నోరు 8. రేడియల్ పరిరక్త వలయము 9. రేడియల్ పీమల్ వలయము.

23.10 శ్వాస వ్యవస్థ

శ్వాస క్రియ అనేక చర్మీయ జల శ్వాస అవయవాల ద్వారా జరుగుతుంది. ఇవి లోపల, వెలుపల కూడ శైలికను కలిగి వుంటుంది. శైలికల కదలికల వలన శ్వాసక్రియకు కావలసిన నీటి ప్రవాహము ఏర్పడుతుంది. దీనివలన వాయువుల పరస్పర మార్పిడి జరుగుతుంది. పాక్షికంగా శ్వాసక్రియ నాలికా పాదాల ద్వారా కూడ జరుగుతుంది.

23.11 విసర్జక క్రియ

ప్రత్యేక విసర్జక అవయవాల లేవు. వ్రజని సంబంధమైన మలిన పదార్థాల విసర్జన సీలోమిక్ ద్రవంతోని అమీబోసైటుల వలన జరుగుతుంది. వీటిని జల శ్వాస అవయవాలు, చర్మము నాలికా పాదాలు బయటకు పంపుతాయి.

23.12 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

ఇవి ఏకలింగ జీవులు, లైంగిక ద్వీరూపకత వుండదు. ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు సంతానోత్పత్తి కాలము

(Breeding season) లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇవి సరళంగా వృద్ధి చెందివుంటాయి. వీటిలో సంపర్క అవయవాలు గాని, అదనపు గ్రంథులుగాని, శుక్రాశయాలుగాని వుండవు. బీజకోశాలు, ఒక జత ముష్కాలు లేక ఒక జత స్త్రీ బీజకోశాలు ప్రతిభుజము యొక్క సమీప ప్రాంతంలో జఠర నిర్గమ అంధవాళాల, కలశికల మధ్య ఉంటుంది.

ప్రతి ఒక బీజకోశము శాఖీయంగా పక్షి ఈకవలె గుబురుగ వుంటుంది. బీజకోశాలు పరిణతి (Mature) చెందినప్పుడు పర్యాంతరాంగ కుహరాన్ని (Perivisceral space) పూర్తిగా ఆక్రమిస్తాయి. బీజ వాహికములు కురుచగా శైలికాయుతంగా వుంటాయి. ఇవి ముఖతలంమీద చిన్న రంధ్రం ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటాయి.

బీజకోశాలు జననోద్రియ గోళి (Genital sac) లో వుంటాయి. పరిణతి చెందిన బీజకోశాలనుండి బీజకణాలు సముద్రపు నీటిలోనికి విడుదల అవుతాయి.

ఫలదీకరణం: ఇది బాహ్యంగా సముద్రజలాలలో జరుగుతుంది. సంతానోత్పత్తి వార్షికంగా (Annual) జరుగుతుంది. సంయుక్త బీజము (Zygote) అభివృద్ధి చెది డీంభక జీవిని ఏర్పరుస్తుంది.

23.13 స్వపరిశీలనం

1. ఆస్టెరియాస్ ఉండే విచిత్రమైన జలప్రసరణ వ్యవస్థ _____ నుండి వృద్ధి చెందుతుంది
2. వాస్తవానికి పెరిపీమల్, పీమల్ వ్యవస్థల విధులు _____ కానీ ఆహార రవాణాపని _____ వ్యవస్థ చేస్తుందని నమ్ముతున్నారు.
3. ఆస్టెరియాస్ జీవులు బాగా పురోవృద్ధి చెందిన వయస్సుపటికి ఈ రెండు వ్యవస్థలు లేవనేది మాత్రం సుస్పష్టం, _____

23.14 సారాంశం

1. సముద్ర నక్షత్రం లేదా నక్షత్ర చేప (Star fish) కు అయిదు భుజాలు వుంటాయి. శరీరములో రెండు తలాలు వుంటాయి. ముఖతలము (Oral surface) పరిముఖ తలము (Aboral surface)
2. ముఖ, పరిముఖ తలాలలో ముళ్ళు వుంటాయి.
3. శరీర కుద్యము అయిదు స్తరాలలో వుంటుంది.
4. అస్థి పంజరము కార్కేరియస్ ఆస్టికండరాలతో వుంటుంది.
5. ఆహార నాశము బాగా వృద్ధి చెంది వుంటుంది. జీర్ణక్రియ జీవి శరీరం వెలుపల జరుగుతుంది. (Extraoral digestion).
6. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది.
7. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు బదులుగా పీమల్, పెరిపీమల్ వ్యవస్థలు వుంటాయి.
8. శ్వాసక్రియ, చర్మీయ జల శ్వాస అవయవాల ద్వారా జరుగుతుంది.
9. ప్రత్యేకమైన విసర్జక అవయవాలు లేవు.
10. జ్ఞానోద్రియాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది వుండవు.

11. ఏకలింగ జీవులు. బీజకోశాలు ప్రత్యుత్పత్తి సమయములో మాత్రమే ఏర్పడుతాయి. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా నీటిలో జరుగుతుంది. పిండాభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛగా ఈదు డింభకాలు వుంటాయి.

23.15 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. సీలోమ్
2. తెలియవు, పీమల్
3. వినర్జక, రక్షవనరణ

23.16. నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయుము.
1. ఆస్టెరియాన్ బాహ్యలక్షణాలు తెలుపుము.
 2. ఆస్టెరియాన్ జీర్ణ వ్యవస్థను వివరించుము.
 3. సముద్ర నక్షత్రం (ఆస్టెరియాన్) జలప్రసరణ వ్యవస్థను విపులీకరించుము.
 4. ఆస్టెరియాన్ గమన విధానము తెలుపుము.
- II. ఈ క్రింది వాటిని 10 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయండి.
1. పీమల్ వ్యవస్థ
 2. నాడీ వ్యవస్థ
 3. పెడిసెల్లెరియమ్లు
 4. శరీర కుద్యము

భాగం 24 ఇక్వెనోడర్మ్ ఒంభక దశలు

విషయక్రమము

24. 1 ఉద్దేశ్యము
24. 2 ఉపోద్ఘాతం
24. 3 అస్టిరియస్ పిండాభివృద్ధి
 - 24.3.1 డైప్లూరులా డింభకము (లేదా) తొలి బైపిన్నేరియా
 - 24.3.2 బైపిన్నేరియా డింభకము.
 - 24.3.3 బ్రాకియోలేరియా డింభకము
 - 24.3.4 బైపిన్నేరియా డింభక ప్రాముఖ్యం
24. 4 ఒఫియోస్ట్రాటియస్ డింభకము
24. 5 ఇక్వెనో ఫ్లాటియస్ డింభకము
24. 6 అరిక్యులీరియా డింభకము
24. 7 డోలియోఫీరియా డింభకము
24. 8 ఇక్వెనోడర్మ్ డింభకాల భవితవ్యము
24. 9 ఇక్వెనోడర్మ్ డింభకాల ప్రాముఖ్యం
- 24.10 స్వపరిశీలనం
- 24.11 సారాంశం
- 24.12 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 24.13 నమూనా ప్రశ్నలు
- 24.14 పదకోశం

24.1 ఉద్దేశ్యము


ఈ సాతం ఇక్వెనోడర్మేటాలోని వివిధ రకాల డింభక జీవులను గురించి వివరిస్తుంది. ఇందులో వాటి నిర్మాణ విశిష్టతలు, యితర సముదాయాలలో సంబంధాలు వివరించడం జరిగింది. ఇది నదివన తరువాత ఈ విషయాలను వీవు చక్కగా బోధించ గలుగుతావు. మౌలికంగా ఒకే పోలికలుండడం వల్ల ఇక్వెనోడర్మేట జీవులన్నిటి ఉత్పత్తికి మూలజీవి ఒక్కటే. మరో విషయం రూపవిక్రీయ జరగడం వల్ల ఏ విధంగా డింభకాల ద్విపార్శ్వసౌష్ఠ్యం భంగం చెంది వికీరణ సౌష్ఠ్యం రూపొందింది అనేది.

24.2 ఉపోద్ఘాతం

అర్థోపాద వర్గంలోని క్రస్టేషియా విభాగంలోవలె ఇక్వెనోడర్మాజీవులు కూడా విభిన్న డింభకాలతో వుంటాయి. వివిధ భాగాలలో వివిధ రకాల స్వేచ్ఛగా ఈదు డింభకాలు వుంటాయి. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధితోనే (Indirect development) డింభక దశలు వుంటాయి. పిండాభివృద్ధితో అనేక మార్పులు జరిగిన తర్వాత డింభక జీవి ఏర్పడుతుంది.

24.3 ఆస్టెరియాన్ పిండాభివృద్ధి

ఆస్టెరియాన్ ఏక లింగ జీవి. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా జరుగుతుంది. సంయుక్త బీజము (Zygote) విడళన (Cleavage) వలన అభివృద్ధి చెందుతుంది. విడళన పూర్ణభంజిత (Holoblastic), సమాన (Equal) అనిర్ధారిత (Indeterminate) రకానికి చెంది ఉంటుంది. సుమారు 24 గంటల అభివృద్ధి పూర్తి అయిన తరువాత ఏకస్తరముతో, బోలుగాను, గుండ్రంగాను, శైలికాయుతంగా నున్న పిండము యేర్పడుతుంది. దీనిని బ్లాస్టులా అంటారు. దీని కుహరికయైన బ్లాస్టోసీల్ (Blastocoel) ఒక ద్రవములతో నిండి వుంటుంది. శైలికల సహాయంతో బ్లాస్టులా నీటిలో రెండు స్తరాల శైలికాయ గాస్ట్రులా (Gastrula)గా మారుతుంది. ఇది పొడవుగా వుండి గాస్ట్రోసీల్ (Gastrocoel) లేదా ఆది ఆంత్రము (Archenteron) అను మధ్య కుహరాన్ని కలిగి వుంటుంది. ఇది బయటకు బ్లాస్టోపోర్ ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. బహిష్కర్షణము (Ectoderm), అంతస్త్వచము (Endoderm) గాస్ట్రులాలోని రెండు స్తరాలు. డింభక వోరు పూర్వోదరంగా (Antero-ventral) ను, పాయువు బ్లాస్టోపోర్ నుండి యేర్పడుతుంది. అంతస్త్వచ కణాలు మొగ్గలు వేయడం వలన మూడవ స్తరమైన మధ్యస్త్వచము (mesoderm) యేర్పడుతుంది. ఈ దశలో డింభకము బహిష్కర్షణము, మధ్యస్త్వచము, అంతస్త్వచమును మూడు స్తరాలను కలిగి యుండి త్రిస్తరిత జీవిగా వృద్ధి చెందుతుంది (పటం 24.1) ఆది ఆంత్రము పూర్వోంత (Proximal part), పరాంత భాగాలుగా (Terminal part) అభివృద్ధి చెందుతాయి.



పటం 24.1 ఆస్టెరియాన్ ఖండి భవనము A.ఫలదీకరణము చెందిన అండము B.2 బ్లాస్టోమియర్లు C.16 బ్లాస్టోమియర్లు D.బ్లాస్టులా E.బ్లాస్టులా నిలుపు కోత F.తొలిగాస్ట్రులా నిలుపుకోత G.గాస్ట్రులా నిలుపుకోత 1. బ్లాస్టోసీల్ 2. బహిష్కర్షణము 3. అంతస్త్వచము 4. ఆది ఆంత్రము 5. బ్లాస్టోపోర్.


పూర్వంత భాగము ఆహార వాహిక, జీర్ణాశయము, పేగుగా విభేదన చెందగా, పరాంత భాగము నుండి రెండు శరీర కుహర కోశాలు (Coelomic sacs) ఏర్పడతాయి. ఈ శరీర కుహర కోశాలు సీలోమ్‌గా వృద్ధి చెందుతాయి. శైలికలు ఇప్పుడు నిర్ణీత స్థానాలను ఆక్రమిస్తాయి. శైలికామయ పట్టీలు రెండు వుంటాయి. ఇందులో ఒకటి నోటిచుట్టూ వున్న పరిమళ పట్టి (Perioral band), మరొకటి ఎడోరల్ (Adoral) పట్టి. ఇది నోటిలో ఉంటుంది. త్రిస్తరిత పిండము క్రమంగా ప్లేవ్రాజీవనము గడుపు దింభక జీవిగా మార్పు చెందుతుంది. ప్రథమ దశలోని దింభక జీవులు ద్విపార్శ్వ పాష్టవాన్ని కలిగివుంటాయి. వీటిని డైప్లూరులా (Dipleurula) అంటారు. ఇది ఇక్టెనోడర్మ్ జీవుల ప్రాథమిక నమూనా దింభక జీవి (Typical larva). దీని నుండి ఈ విభాగములోని యితర దింభక జీవులు ఏర్పడతాయి.

అష్టరాయిడియా విభాగంలో ఒక దింభక జీవి దశ మరొక దింభక జీవి దశగా మారుతుంది. కానీ, యితర విభాగాలలో ప్రత్యేకమైన దింభకాలు వుంటాయి. ఇక్టెనోడర్మ్ దింభకాల ప్రత్యేక లక్షణాలు :

1. ప్రాథజీవుల్లో వలయ పాష్టవానికి వ్యతిరేకంగా ద్విపార్శ్వ పాష్టవం ఉంటుంది.
2. ఈదడానికి అనువుగా అనేక శైలికామయ పట్టీలు లేక మేఖలలు (Ciliated bands or girdles) ఉంటాయి.
3. సంపూర్ణంగా యేర్పడిన ఆహార వాళము.
4. ప్రాథ జీవులలో విభిన్న లక్షణము కలిగిన భుజాలు (Arm) వుంటాయి.
5. బాహ్యరూపము వివిధ విభాగాలలో భిన్నంగా ఉంటుంది.
6. భుజాల సంఖ్య, శైలికామయ పట్టీల అమరికలో భిన్నత్వము.

24.3.1 డైప్లూరులా దింభకము లేదా తొలి దశ బైపిన్నేరియా

1. ఇది ఇక్టెనోడర్మేటాలోని ప్రాథమిక దింభకము.
2. పిందాభివృద్ధి ముగిసిన తర్వాత యిది యేర్పడుతుంది.
3. ఇది ద్విపార్శ్వ పాష్టవముతో వుంటుంది. ఈరునప్పుడు పూర్వంతరము ముందుగా ఉంటుంది.
4. ఆకణ జీవులు (Acellular organisms) వీటి ఆహారము.
5. అగ్రభాగములో శైలికామయ గుచ్చము ఉంటుంది.
6. పరిమళ శైలికామయ పట్టి (Perioral ciliary band) లేదా పరిమళ మేఖల (Perioral ciliated girdle) నోటి చుట్టూ వుంటుంది. ఇది గమనానికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది.
7. నోటిలో మరొక శైలికామయ పట్టి ఉంటుంది. దీనిని అడోరల్ పట్టి (Adoral band) అంటారు (పటం 24.2 A).



పటం 24.2 ఇక్టెనోడర్మ్ దింభకాలు A. డైప్లూరులా దింభకాలు B. బైపిన్నేరియా దింభకాలు C. ట్రైపిన్యోలేరియా దింభకాలు

1. పరిమళ శిక్యము 2. పూర్వము శిక్యము 3. నోరు 4. ఆహార వాహిక 5. జీర్ణాశయము 6. పాయువు 7. పేగు 8. పృష్ఠ మధ్యభుజము 9. ముఖ పూర్వ భుజము 10. పూర్వ పృష్ఠ భుజము 11. పర పృష్ఠ భుజము 12. పరపార్శ్వ భుజము 13. పృష్ఠ మధ్య భుజము 14. సంసంజనక (Adhesive) కణాలు

24.3.2 బైపిన్నేరియా డింభకము

అష్టరాయిడియా విభాగములో రెండు రకాల డింభక జీవులు ఉంటాయి. మొదటి దశలో దీనిని బైపిన్నేరియా వి తర్వాత బ్రాకియోలేరియా (Brachiolaria) అని అంటారు.

1. ఇది డైప్లూరులా (Dipleurula) డింభక జీవి నుంచి యేర్పడిన స్వేచ్ఛగా ఈయ డింభక జీవి.
2. అనేక శైలికామయ పట్టీలు డింభక శరీరాన్నంతా కప్పి వుంటుంది. అవి అమరిక స్థానాన్ని బట్టి వీటికి పేర్లు ఉంటాయి.
3. డింభకముయొక్క పూర్వాలము ముఖ పూర్వ లంబిక (Preoral lobe) గా వృద్ధి చెందుతుంది. ఇది ముఖ పూర్వ శైలికామయ పట్టి (Preoral band of cilia) తో ఉంటుంది. ఇది యితర శైలిక పట్టీలతో వేరుగా ఉంటాయి.
4. రెండవ పట్టి పరముఖ పట్టి (Postoral band) ఇది శరీరాన్ని చుట్టివుంటుంది.
5. నోటిలో అడోరల్ పట్టి (Adoral band) ఉంటుంది.
6. శైలికామయ పట్టీలు అంచులుగా వున్న మూడు పార్శ్వ లంబికలు ఉంటాయి.
7. ఈ భుజాలు వేర్వేరు జట్లుగా వుంటాయి. అవి ఒక వృష్ట మధ్యభుజము (Median dorsal arm), పర వృష్ట భుజాలు (Posterior dorsal arms), పరముఖ భుజాలు (Postoral arms), పరపార్శ్వ భుజాలు (Postero lateral arms).
8. అహారనాళంలో నోరు, అహార వాహిక, జీర్ణాశయము, పేగు, పాయువు ఉంటాయి.
9. సీలోము 'U' ఆకారములో ఉంటుంది.
10. ఈ దశలో కొన్ని వారాలు గడిపిన తర్వాత యిది బ్రాకియో డింభకముగా రూపాంతరము చెందుతుంది (పటం 24.2).

24.3.3 బ్రాకియోలేరియా డింభకము (Brachiolaria larva)

1. ఆకారంలోను, నిర్మాణంలోను యిది బైపిన్నేరియా కంటే క్లిష్టంగా ఉంటుంది.
2. ముందుగా యేర్పడిన భుజాలేగాక అదనంగా మూడు కురుచ భుజాలు ముఖ పూర్వ (Preoral) లంబిక వద్ద యేర్పడతాయి.
3. వీటిని బ్రాకియోలార్ భుజాలు అంటారు. ఇవి శైలికా రహితంగా ఉంటాయి.
4. ఈ మూడింటిలో ఒకటి మధ్యలో వుండగా మిగతా రెండు పార్శ్వంగా ఉంటాయి.
5. వీటి కొనలలో సీలోమ్ విస్తరించి ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని అతికే కణాలు (Adhesive Cells) కూడా ఉంటాయి. ఈ కణాలు ఒక గ్రంథియుత భాగముగా యేర్పడి చూషకాలవలె అతకడానికి ఉపయోగంగా ఉంటాయి.
6. పార్శ్వంగా వున్న లంబికలు కొంత విడివిగా పెరిగి డింభకాలుగా వ్యవహరింపబడతాయి. ఇవి కదలగలిగే సంకోచశక్తితో ఉంటాయి.
7. 6-7 వారాల తర్వాత డింభకము పైన పేర్కొన్న చూషకాలు వంటి నిర్మాణాల సహాయంతో వీటిలోని రాళ్ళకుగాని యితర అధస్తరాలకు గాని అతికి ఉంటుంది.
8. బ్రాకియోలేరియా రూప విక్రీయం చెంది వలయ పాష్టవముతో మన్న ప్రాడ జీవిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
9. డింభక జీవి భుజాలు, శైలికామయ పట్టీలు క్షీణిస్తాయి.

10. అయిదు లంబికలు అయిదు భుజాలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

11. డింభక జీవి నోరు కూడా అదృశ్యమై ముఖతలములో కొత్తగా నోరు అభివృద్ధి చెందగా పరిముఖ తలములో పాయువు యేర్పడుతుంది.

24.3.4 బైపిన్నేరియా డింభకం ప్రాముఖ్యం

జీవి పరిణామ దృష్ట్యా (Evolutionary basis) ఆప్టరాయిడియా విభాగంలోని బైపిన్నేరియా డింభకము ప్రాముఖ్యన్ని కలిగి వున్నది. ఇది యితర ఇకైనోడర్మేటా విభాగాలలోని డింభకాలను పోలివుంటుంది. ఒఫియురాయిడియా, ఇకైనాయిడియా విభాగాల లోని ప్లాటీయస్ డింభకము, హోలోథూరాడియాలోని ఆరిక్యులేరియా డింభకము, బైపిన్నేరియాతో చాల పోలికలు కలిగి ఉంటాయి.

ఇది తన వర్గపు డింభక జీవులతో పోలికలు కలిగి వుండడమే గాక యితర నిమ్న హెచ్చు స్థాయి సముదాయాలలోని డింభక జీవులతో కూడా పోలికలు కలిగి వుంటుంది. చదును పురుగు (Flat worms) లలోని కొన్ని డింభకాలలోను, అనెలిడా, మలస్కా వర్గాలలోని డింభకమైన ట్రోకోఫోర్ (Trochophore) తో చాల స్పష్టమైన పోలికలు కలిగి వుంటుంది. ఇది హెమికార్డేటా డింభకమైన టార్పేరియాతోకూడా పోలికలు కలిగివుంటుంది. ఈ విధంగా ఇకైనోడర్మేటా యితర సముదాయాలతో పన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాలను కలిగి ఉంటుంది.


24.4 ఒఫియోప్లాటియస్ డింభకము

1. ఇది ఒఫియురాయిడియా విభాగపు సమూహ డింభకము
2. ఇది స్వేచ్ఛగా ఈదు డింభక జీవి.
3. ముఖ పూర్వ లంబిక చిన్నదిగా ఉంటుంది.
4. కార్కేరియస్ ఊచలచే దృఢత్వాన్ని కలిగివున్న శైలికామయ పట్టి ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది. బైపిన్నేరియాలో రెండు వుండేవి.
5. భుజాలు స్వల్ప సంఖ్యలో వున్నను పార్శ్వ (Posterolateral) భుజాలు చాల పొడవుగా వుండి ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చి వుంటాయి. ఇవి డింభకానికి 'V' అకారాన్ని యిస్తాయి.
6. సీలోమిక్ కుహరాలు, అది అంత్రము డింభక జీవి లోపలివైపు ఉంటాయి.
7. భుజము కొనలలో చూషకాల వంటి అంటు విర్మాణాలు ఉండవు.
8. అహారనాళము, నోరు, అహార వాహిక, జీర్ణాశయము, పేగు పాయువులతో ఉంటాయి.
9. రూప విక్రీయలో ఆధస్తరానికి అంటిపెట్టుకోకుండా నీటి అడుగు భాగమున పడిపోయి ప్రాథజీవిగా మారుతుంది (పటం 24.3 A)

24.5 ఇకైనోప్లాటియస్ డింభకము

- 282 1. ఇకైనాయిడియా విభాగంలోని డింభక జీవిని ఇకైనోప్లాటియస్ అంటారు.

2. చిన్న ముఖ పూర్వలంబిక, ఏకశైలికామయ పట్టిక మాత్రమే కలిగి వున్నందున యిది ఒఫియోఫ్లాటియస్ డింభకమును పోలి వుంటుంది.
3. కానీ, పూర్వ పార్శ్వ భుజాలు (Anterolateral) భిన్నంగా వుంటాయి. ఇవి పాట్టిగా వుండి వెనుకకు తిరిగి ఉంటాయి.
4. ముఖ పూర్వ (Preoral) , పూర్వ పృష్ఠ (Anterodorsal) , పరముఖ (Postoral) , పరపృష్ఠ (Postdorsal) భుజాలు వుంటాయి. సాధారణంగా పర పార్శ్వ భుజాలు వుండవు.
5. పూర్వ పృష్ఠ భుజాలు లోపించిన డింభకాంతో నాలుగు జతల భుజాలు మాత్రమే ఉంటాయి.
6. భుజాలు వర్ణక పదార్థముతో మున్న కొవలతో వుండి కాలేరియస్ ఊచలచే దృఢత్వాన్ని పొందివుంటాయి.
7. ఆహారనాళములో అచ్చిభాగాలు ఉంటాయి (పటం. 24.3 B)



పటం 24.3 ఇతర డింభకాలు-A. ఒఫియోఫ్లాటియస్ డింభకము B. ఇతర డింభకము C. ఆరుక్యులేరియా డింభకము D. డాలియోలేరియా డింభకము 1. పూర్వ పార్శ్వ భుజము 2. పరముఖ భుజము 3. పరపార్శ్వ భుజము 4. ఎడమ ఎక్స్‌సెల్ 5. పరపృష్ఠ భుజము 6. లంబికలతో మున్న ఎడమ హైడ్రోపిల్ 7. ఎడమ పోమాటోసిల్ 8. పేగు 9. నోరు 10. ఆహార వాహిక 11. కుడి ఎక్స్‌సెల్ హైడ్రోపిల్ 12. జీర్ణాశయము 13. పాయువు 14. కుడి పోమాటోసిల్ 15. ఇతర అవశిష్టము (Reduiment) 16. పర పార్శ్వ కీలితము 17. పర ఎపిలెట్‌లు 18. పూర్వ ఎపిలెట్‌లు 19. ముఖ పూర్వభుజము 20. ముఖ పూర్వ శిక్యము 21. గ్రహవి 22. హైడ్రోపిల్ 23. హైడ్రోఫోర్ 24. పాయుశిక్యము 25. అస్థిభండము (Ossicle) 26. అగ్ర జ్ఞాన వాలిక 27. సంసజనక గర్తము (Adhesive pit) 28. అభిందము 29. శైలికా వలయాలు 30. ఆధారాస్థి భండాలు (Basals)

24.12 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. డైప్లూరూలా
 2. బ్రాకియోలేరియా, రూపవిక్రియ
 3. వర్గ వికాసం
-

24.13 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయండి.

1. ఆప్టిరియాన్ పిండావృద్ధిని తెలుపుము
2. బైపిన్నేరియా డింభకము యొక్క విర్మాణము, ప్రాముఖ్యతను తెలుపుము.
3. ఇక్టెనోడర్మేటాలోని వివిధ డింభకాలను గురించి వ్రాయుము. వాటి జీవ పరణాను ప్రాముఖ్యత యేమి.

II. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 10 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. డైప్లూరూలా
 2. బైపిన్నేరియా
 3. బ్రాకియోలేరియా
 4. ఒఫియోప్లాటియస్
 5. ఇక్టెనోప్లాటియస్
 6. ఆరిక్యులేరియా
 7. ఇక్టెనోడర్మ్ డింభకాల ప్రాముఖ్యత
-

24.14 పదకోశం

అదవపు గ్రంథి (Accessory glands): ఒక వ్యవస్థలో అదనంగా అభివృద్ధి చెందిన గ్రంథి విర్మాణము.

ఆపవర్తనీ కండరాలు (Adductor muscles): శరీర భాగాన్ని, జీవి ముఖ్య అక్షము వైపు లాగు కండరము.

అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Indirect development): అభివృద్ధి, డింభక దశలద్వారా పూర్తి అవుతుంది.

అభివర్తనీ కండరాలు (abductor muscles): శరీర భాగాన్ని, జీవి ముఖ్య అక్షమునుండి దూరంగా లాగు కండరము.

అమీబోసైటులు (Amoebocytes): అమీబా కక్షణముతోనున్న కణ విర్మాణాలు, అనగా మిథ్యాపదాలు సహాయముతో ఆహార సేకరణ కదలికలు కలిగి వున్నవి.

ఆయిస్టర్లు (Oysters): మలస్కా ద్వికవాల జీవి

అంత్రవేష్టనము (Peritoneum): శరీర కుహరాన్ని అవరించుచున్న ఉపకళ

ఎంజైము (Enzyme): జీవ రసాయన ఉత్ప्रेరకము (Biocatalyst). జీవ రసాయన చర్యలను త్వరితగతిలో చేయు ఒక స్రావక పదార్థము

ఎంటరోకోలస్ (Enterocoelous): అది అంత్రమునుండి యేర్పడిన నీలోము కల జీవులు

కణాంతర (Intracellular): కణములోపల సంబంధించిన

కాల్కేరియస్ (Calcareous): కాల్షియమ్ లవణాలతో చేయబడిన

సూక్ష్మ (Olfactory): వాసన చూడటానికి సంబంధించిన స్పర్శ జ్ఞానము.

ద్విపార్శ్య (Bilateral): రెండు పార్శ్వాలుగల లేదా రెండు ప్రక్కలు

పూర్ణ భంజిత (Holoblastic): అండము పూర్తిగా విభజన చెందుట

ఫలదీకరణ (Fertilization): స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాల కలయిక

ఫాగోసైటులు (Phagocytes): ఇతర క్రిములు శరీరములో ప్రవేశించకుండా అటంక పరచు లేదా భక్షించు తెల్ల రక్తకణాలు.

బీజ వాహిక (Gonoduct): బీజకోశమునుండి బాహ్యనికి విస్తరించిన వాహికలు

బెంథిక్ (Benthic): సముద్ర అడుగు భాగాలలో నివసించు జీవులు

బ్రాకిష్ (Brackish): కొంత ఉప్పు పాలును కలిగివున్న నీరు. సముద్ర-నదీ జలాల మిశ్రితముగు ప్రాంతము.

రూప విక్రీయ (Metamorphosis): డింభక జీవి దశ నుండి ప్రాథ జీవి దశ చేరుటకు జరుగు మార్పులు.

రిట్రాక్టైల్ (Retractile): ముకుళించుకోగల

విదళన (Cleavage): అండములో నిర్ణీత దశలలో జరుగు విభజనలు

నృక్కము (Nephridium): ప్రాథమిక విసర్జక అవయవము

వృంతము (Peduncle): అవయవ నిర్మాణాన్ని కలిగివున్న కాడవంటి భాగము

శైలికామయ ఉపకళ (Ciliated epithelium): శైలికలతో కూడిన కణస్తరము

సంతులన కోశము (Statocyst): సమతాస్థితి అవయవము

సంసర్గ అవయవము (Copulatory organ): స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తివ్యవస్థలోని యోనిలోకి శుక్రద్రవాన్ని విడుదల చేయు పురుష జీవి లోని నిర్మాణము.

లైంగిక ద్విరూపిత (Sexual dimorphism): స్త్రీ పురుష జీవులను గుర్తించటానికి స్పష్టంగా అభివృద్ధి చెందిన బాహ్య నిర్మాణాలు.

భాగము - 25 అకశేరుకాలలో జీవ పరిణామ మార్గము

విషయక్రమము

- 25. 1 ఉద్దేశ్యము
- 25. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 25. 3 ప్రోటోజోవా
- 25. 4 మెటాజోవా
 - 25.4.1 ద్వస్తరిత జీవులు
 - 25.4.2 త్రిస్తరిత జీవులు
- 25. 5 సొప్టవము
- 25. 6 శరీర కుహరము
- 25. 7 సమఖండ విన్యాసము
- 25. 8 శిరఃప్రాధాన్యము
- 25. 9 స్వపరిశీలనం
- 25.10 సారాంశం
- 25.11 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 25.12 నమూనా ప్రశ్నలు

25.1 ఉద్దేశ్యము

మెటాజోవన్ల ఉద్భవం ఏ మార్గములో జరిగిందో తెలుసుకొని సొప్టవము, సీలోవ్ యేర్పడిన విధము, సమఖండ విన్యాసము, శిరఃప్రాధాన్యము ప్రత్యేకంగా ఆధారంగా తీసుకొని జీవ పరిణామ ప్రాముఖ్యతను వివరించడమే ఈ పాఠము యొక్క లక్ష్యము.

ఇది క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాత జంతుసామ్రాజ్యాన్ని ఒకపద్ధతిగా వ్యవస్థీకరించిన విధానాన్ని గూర్చి బహువిధ వైవిధ్యాలతో జీవపరిణామ పురోగతిని గూర్చి నీవు బాగా చెప్పగలుగుతావు.

25.2 ఉపోద్ఘాతం

పురాతన కాలంలో మున్న జీవులన్ని ప్రోకారియోట్స్, ప్రొటిష్టన్లు, మెటాఫైట్లు, ఫంజైలు, మెటాజోవన్లు అను నాలుగు రాజ్యాలుగా వర్గీకరణ చేశారు. వీటిలో ప్రొటిష్టన్లు, మెటాజోవన్లు జంతు రాజ్యములోను, ఫంజై, మెటాఫైట్లు పక్ష రాజ్యములో చేర్చారు. ఈ వివరణంలో జంతు రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే చెప్పడమైనది.

25.3 ప్రోటోజోవా

తరువాత వర్గీకరణ ప్రకారము జంతురాజ్యము ప్రోటోజోవా, మెటాజోవా అను రెండు ఉప రాజ్యాలుగా విభజింపబడినది. ప్రోటోజోవన్నను పూర్వము ఏక కణ జీవులనేవారు. ఇప్పుడు వీటిని అకణ (Acellular) జీవులని అంటారు (డోబెల్లి). ప్రోటోజోవన్న పరిమాణంలో సూక్ష్మంగా (Microscopic) ఉంటాయి. వీటి నిర్మాణము సరళంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటోజోవన్న వివిధ భాగాలు (ఉపాంగాలు — Organelles) విభిన్న క్రియలు జరుపుటకు ప్రత్యేకింపబడి వుంటాయి. ఒకే విధమైన జీవులున్న సహనివేశాల (Colonies)ను కూడ యాప్రోటోజోవన్ను యేర్పరుస్తాయి. (వాల్యాక్స్, ప్రోటోస్పొంజియా). సహనివేశములోని జీవులు క్రియాశీలతలో ఒక దానికొకటి స్వతంత్రంగా వుంటాయి.

25.4 మెటాజోవా

మెటాజోవన్న సహనివేశములు యేర్పడుటవలన పరిణామము చెంది వుంటాయని నమ్ముతారు (హెకెల్) యుగోస్లేవియా జంతు శాస్త్రజ్ఞుడైన హాడ్జీ (Hadzi) సామాన్య సిద్ధాంతము ప్రకారము మెటాజోవన్న ఒక బహు కేంద్రక సీలియేట్ (Multinucleate ciliate). కణోత్పత్తి (Cellularization) వలన యేర్పడినట్లుగా చెప్పుతారు. మెటాజోవన్నలో వర్గము పోరిఫెరా (Porifera) యితర వర్గాలలో చాలా విభిన్నంగా వున్నందున యివి వేరుగా పరిణామము చెందినదనటం సమంజసముగా వుంటుంది. పోరిఫెరా జీవులను పారాజోవాలుగా చిత్రికరిస్తారు. ఇవి యింకను కణస్థాయి నిర్మాణాన్ని (Cellular grade of organization) కలిగి వుంటాయి. కణజాల స్థాయి నిర్మాణమును పూర్తిగా సంతరించుకొన్న జీవులు మెటాజోవన్న. వీటి అవయవాలలో అనేక రకముల కణ జాలాలు వుంటాయి. ఇవన్నీ ఒకదానితో వాకటి క్రియాశీలతలో సమన్వయము కలిగి వుంటాయి. మెటాజోవన్నలో వివిధ రకాల అవయవాలు, వీటిలో విభిన్న కణజాలాలు వున్నందున, ఈ జీవులకు సరియగు నిర్వచనము యివ్వడము కొంత కష్టదాయకమే. అయినను కొంత సాధారణ వివరణ ఈ కింది విధముగా వుంటుంది.


1. ఈ జంతువులకు ఆహారనాళము, నోరు ఉంటాయి.
2. ప్రాథమిక మెటాజోవన్నకు పాయువు ఉండదు.
3. కండర కణజాలము నిష్పక్షేణి మెటాజోవన్న (Lower metazoans) లో పత్రాల (Sheets) వలెను, ఉత్తమ క్షేణి మెటాజోవన్న (Higher metazoans) లో దిమ్మెల (Blocks) వలె ఉంటాయి.
4. నాడీ కణజాలము నాడులతోను, నాడీ సంధులతోను ఉంటాయి.

మెటాజోవన్నలో చాలా వైవిధ్యాలు వున్నప్పటికి ఈ సముదాయాన్ని రెండుగా విభజించడమైనది. ఇందులో ఒకటి డిప్లాబ్లాస్టికా (Diploblastica), రెండవది ట్రిప్లాబ్లాస్టికా (Triploblastica). డిప్లాబ్లాస్టికా లేదా ద్విస్తరిత జీవులు రెండు కణస్తరాలను కలిగి వుంటాయి. మూడు కణస్తరాలు కలిగివున్న జంతువులన్నింటిని ట్రిప్లాబ్లాస్టికా (త్రిస్తరిత) జీవుల సముదాయములో చేర్చినారు. ఈ స్తరాలను ప్రాథమిక జనన స్తరాలు (Primary germ layers) అంటారు. అన్ని అవయవాలు, అవయవ వ్యవస్థలు ఈ స్తరాల నుండి అభివృద్ధి చెందుతాయి.

25.6 శరీర కుహరము

మొట్టమొదట పరిణామ చరిత్రలో రెండవ లేదా ద్వితీయంగా శరీర కుహరము (Secondary body cavity) యేర్పడుట అనునది ముఖ్యమైన దృగ్విషయము. జరీలత్వముతో, పెద్ద పరిణామ జీవులుగా అభివృద్ధి చెందవలసిన సీలోము యేర్పడుట ముందుగా కావలసిన అవసరమైన ఒకసంఘటన అని చెప్పవచ్చు. మధ్యత్వముతో ద్రవపదార్థముతో నిండిన కుహరముగా సీలోమును నిర్వచించవచ్చు. ఇది పిండ దశలో మధ్యత్వము నుండి అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ కుహరము యిరువైపుల మధ్యత్వచనిర్మితమైన పొరచే ఆవరింపబడి వుంటుంది. ఆపొర నాళాన్ని, అవయవాలను ఆవరించి వున్న పొరను అంతరాంగ ఆంత్రవేష్టనము (Visceral peritoneum) అని, శరీర కుడ్యలోతలాన్ని ఆవరించి వున్న పొరను దైహిక ఆంత్రవేష్టనము (Somatic or parietal peritoneum) అని అంటారు (పటము 25.1 C). సీలోము నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని జైలేటేరియాను మూడు ముఖ్యమైన సముదాయాలుగా విభజింపవచ్చు. అవి


1. ఎసిలోమేటా (Acoelomata), 1. మిథ్యాసీలోమేటా (Pseudocoelomata) 3. సీలోమేటా (పటం 25.1 A,B)
1. ఎసిలోమేటా (Acoelomata): ఈ జీవులలో శరీర కుడ్యము, జీర్ణనాళానికి మధ్యనున్న ప్రాంతమంతయు మధ్యక్షేష్మస్తరము (Mesenchyme) కండర పోగులచే నింపబడి వుంటుంది. అందువలన ప్రత్యేకమైన కుహరము వుండదు. ఈ పరిస్థితి ప్లాటీహెల్మింథీస్ వర్గ జీవులలో వుంటుంది.
2. మిథ్యా శరీర కుహరము (Pseudocoelomata): ఈ రకానికి చెందిన జీవులలో కనిపించు కుహరము నిజమైన శరీర కుహరము కాదు. అస్కె హెల్మింథీస్ వర్గ జీవులలో యీ విధమైన శరీర కుహరము వుంటుంది.
3. సీలోమేటా (Coelomata): ఈ జీవులలో నిజమైన శరీర కుహరము వుంటుంది. పైన వివరించిన వర్గాలు మినహా మిగతా జైలేటేరియాను సంబంధించిన వర్గాలన్నింటిలో ఈ కుహరము వుంటుంది. ఈ సముదాయము మరల మూడు రకాలుగా విభజింపబడి వుంటుంది. ఈ విభజన అంతస్త్వచ, మధ్యత్వచ (Entomesoderm) నిర్మాణము యొక్క ఉత్పత్తి మరియు సీలోము ఉత్పత్తి గురించి జరిపిన పిండోత్పత్తి శాస్త్రీయ జరిపిన కొన్ని పరిశీలనల ఆధారంగా వుంటుంది.



పటం 25.1 జైలేటేరియాలోని శరీర కుహరము పరగామాన్ని తెలిపే పటము. A. శరీర కుహర రహిత జీవి (శరీర కుహరము ఉండదు) B. మిథ్యా కుహర జీవి C. నిజమైన శరీర కుహరము ఉన్న జీవి. 1. బహిష్త్వచము 2. వలయ కండరాలు 3. అయత కండరాలు 4. పేగు 5. బీజకోశము 6. అవభాషిని 7. పిన్ సీషియల్ బహిష్త్వచము 8. కండరాలు 9. మిథ్యా శరీర కుహరము 10. శరీర కుహరము 11. పరివేష్టన శరీర కుహరోపకర 12. అంతరాంగ శరీర కుహరోపకర 13. అంతస్త్వచ్ఛాలు 14. బీజ వాహిక

(i) పైజోసీలు (Schizocoel): మధ్యత్వర పట్టిలో లేదా ఫలకాలు మధ్య చీలిక యేర్పడి యీ విధమైన సీల్ము యేర్పడుతుంది. ఈ కారణంగా పున్న సీల్ము ఖండిత విన్యాసాన్ని కలిగి పున్న ప్రోటోప్లామియాలో కనిపిస్తుంది. (పటం 25.2 A.B)


(ii) ఎంటరోసీల్ (Enterocoel) : ప్రాథమికంగా ఈ విధమైన మధ్యత్వరము ఎంటరో సీల్క్ కోశ (Enterocoelic pouching) పద్ధతిలో యేర్పడుతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఆది ఆంతుకుడ్యము యిరువైపుల బహిర్వర్తనము (Evagination) చెంది కోశాలను ఏర్పరుస్తుంది. క్రమంగా విస్తరిస్తూ ఈ కోశాలు ఆదిఆంతుము నుండి వేరు పడతాయి. తరువాత యివి విభేదన చెంది శరీర కుహరముగా యేర్పడతాయి. కోశము యొక్క కుడ్యాలు మధ్యత్వరాలుగా (Mesoderm) యేర్పడతాయి. ఈ విధమైన సీల్ము అన్ని ద్యుటరోప్లాములలో యేర్పడుతుంది (పటం 25.3. A.B).



పటం 25.2. పైజోసీల్ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చెందే శరీర కుహరము వివిధ దశలు. A గాస్ట్రూలా కోత B ప్రాథమిక సీల్ము కోత 1. బాహ్యత్వరము 2. బ్లాస్టోసీల్ 3. ఆర్కెంటులాన్ 4. మధ్యత్వర అవశిష్టాలు 5. అభివృద్ధి చెందుతున్న అంతస్తవము 6. మధ్యత్వరము 7. పేగు 8. అభివృద్ధి చెందుతున్న శరీర కుహరము 9. శరీర కుహరము 10. బహిష్టవరము 11. అంతరాంగ శరీర కుహరోపకర 12. ఆంతుయోజకము 13. సామాన్య శరీర కుహరోపకర 14. మధ్యత్వరం నిండి ఉద్భవించిన అంగాలు

iii) మీసెంక్రైమల్ సీల్ము: ఇది ఒక అసాధారణమైన సీల్ము యేర్పడే పద్ధతి. దీనిని నిమ వర్గ జీవులలో వాకటి అయిన ఫోరానిడ వర్గ జీవులలో చూడవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో మీసెంక్రైము పునః వ్యవస్థీకరించి వాక కుహరాన్ని ఏర్పరచి సీల్ముగా రూపొందుతుంది. మెటాజోవల్ల పరిణామములో సీల్ము పరిణామము వాక గొప్పపురోగిని సాధించినదే చెప్పాలి. ఎసీల్ము, మిథ్యా సీల్ము, సీల్ముతో పోల్చి చూచినట్లయితే ఈ విషయము ధృఢపడుతుంది. సీల్ము అవతరణ గురించి నాలుగు ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు వుంటాయి. అవి :

1. సెడ్జ్విక్ (Sedgwick) ఎంటరోసీల్ సిద్ధాంతము — 1884
2. బర్గు (Bergh) గోనోసీల్ సిద్ధాంతము (1885)
3. వెస్ట్రోసీల్ సిద్ధాంతము
4. పైజోసీల్ సిద్ధాంతము



పటం. 25.3 ఎంటిరో సీలిక్ పద్ధతిలో శరీర కుహరము మధ్యత్వచం నుంచి అభివృద్ధి చెందటము. A. ఎంటిరో సీలిక్ కోష్ఠకాలు ఏర్పడటము. B కోష్ఠకాలు మధ్యత్వచంగా విభేదనం చెందటం, తరువాత శరీర కుహరం ఏర్పడటం. 1. బాహ్యోత్పచము 2. ఆహార నాళం బహిర్వర్తనము (Evagination) చెంది ఎంటిరో సీలిక్ కోష్ఠకాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. 3. ఆర్కెంటరాన్ 4. అంతస్త్వచము 5. మధ్యత్వచము శరీర కుహరాన్ని ఏర్పరచటము 6. ఆహార నాళము

సీలోమ్ పుత్పత్తి, నిర్మాణ విశిష్టత లేక సీలోమ్ క్రియాశీలత కూడా జీవ పరిణామములో వాక లాభదాయకమైన విషయముగ పరిగణించవలె. అనేక జంతువులలో సీలోమ్ జలాంతర్గ అస్థిపంజరము (Hydraulic skeleton) గా వ్యవహరిస్తుంది. ఈ క్రియలో సంబంధము లేని జీవులలో సీలోమ్ క్షీణించి వుంటుంది.

బైలేటేరియా జీవుల పరిణామ తొలదశలో, యివి పంకోచ వ్యాకోచ స్థితి కలిగి కండర నిర్మాణాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నాయి. ఈ జీవులు బలహీనమైన కదిలికలతో ఈదగలిగేవి. శరీర పరిణామము హెచ్చిన కొద్ది, కండర నిర్మాణాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. క్రమంగా జీవుల భూచర జీవనానికి అలవాటు పడతాయి. భూచర జీవనములో పరిపూర్ణత యేర్పడిన తర్వాత గమనములో కూడా పురోభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఇట్లాంటి జీవులలో సీలోమ్ జలాంతర్గ అస్థిపంజరముగ ఉపయోగపడుతుంది. కండర నిర్మాణాలు కూడా హెచ్చుస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతాయి. క్రిమిరూపములో నున్న ఈ జీవులకు సీలోమ్, సీలోమిక్ ద్రవము చాలా ఉపయోగంగ వుంటాయనటంలో సందేహమేమి లేదు. జీవ పరిణామములో ఈ ద్రవరూప అస్థిపంజరము స్వతంత్రంగా అనేక సార్లు పరిణామము చెందినది. అందువలన సీలోమునకు బహువర్గ పుత్పత్తి (Polyphyletic) వుంటుందని అంటారు.

25.7 సమఖండ విన్యాసము

ఖండి భవనము (Segmentation) వలన జీవుల శరీరము క్రమ వరుసలో ఉంగరాల వంటి విభజనలలో వుంటుంది. ప్రతి దేహఖండంలోను శరీరంలో వున్న ముఖ్య అవయవాలు జతలలో లేదా కొన్ని సముదాయాలుగ లేదా అన్ని పర్యాయంగా వస్తూ ఉంటాయి. ఖండిభవనము, సమఖండ విన్యాసము (Metameric segmentation) అను పదములు మధ్యత్వచము నుండి యేర్పడిన అవయవాలకు మాత్రమే పరిమితమై వుంటుంది. ఖండిభవనము బాహ్య నిర్మాణములో మాత్రమే వున్నట్లయితే దానిని మిథ్యా ఖండిభవనము (Pseudometamerism) అని అంటారు. దీనికి బద్దె పురుగు (Tape worm) ఉదాహరణ. సమఖండ విన్యాసమును గురించి వ్యాప్తిలోనున్న సిద్ధాంతములు రెండు విషయములపై ఆధారపడి వున్నది. 1. మధ్యత్వచ నిర్మాణాలు పర్యాయంగా యేర్పడి వుండటము 2. సీలోమ్ పరిణామానికి, సమఖండ విన్యాసాల పరిణామాల మధ్యనున్న సంబంధాలు.

25.8 శిరః ప్రాధాన్యము

మెటజోవన్ల జీవ పరిణామ విషయాలలో సమఖండ విన్యాసము ఒక ముఖ్యమైన విషయమని మనము గమనించాము. కాని ఈ విషయము మెటజోవన్లు అన్నింటికీ వర్తించదు. మెటజోవన్ల పిండాలు, కొన్ని ప్రాథ జీవులు మాత్రమే యీ ప్రక్రియ ప్రదర్శిస్తాయి సమఖండ విన్యాసమునకు సంబంధించిన కారకాలలో మరొకటి పూర్వ ప్రాంతములో శిరస్సు లేక తల అను ప్రత్యేక భాగము యేర్పడును. సాధారణంగా జీవులు ఆవరణకు అనుగుణంగా జీవితాలను గడుపుతూ వుంటాయి. ఈ అవసరాన్ని బట్టి వాటి శరీర నిర్మాణము ప్రత్యేకించి వుంటుంది. తల యేర్పడటము కూడ యిటువంటి ఆవరణ అవసరమేనని భావిస్తారు. పాష్టవ నిర్మాణము కూడ శిరస్సు యేర్పడటముతో కొంత ప్రభావాన్ని కలిగి వుంటుంది. వలయ పాష్టవములో నున్న జీవులు సాధారణంగా స్థానబద్ధ జీవులుగా గాని లేక స్వేచ్ఛగా లేలుతూ జీవనము గడుపుతాయి. ఇటువంటి జీవులకు తమ శరీరముచుట్టూ వున్న ఆవరణ పరిస్థితి తెలిసి వుండవలె. అందువలన ఈ జీవుల జ్ఞాన అవయవాలు పరిధీయంగా (Peripheral) అభివృద్ధి చెంది వుంటాయి. కాని యీ పరిస్థితి ద్వీపార్వ పాష్టవముతో నున్న జీవులలో మరొక విధం వుంటుంది. అవి ప్రత్యేకించిన ఒక దిశలో మాత్రమే కదలుతూ వుంటాయి. అందువలన యిట్లాంటి జీవులలో ఆవరణలోకి ప్రధమంగా ప్రవేశించు భాగము జ్ఞాన అవయవాలు గుమిగూడి వుంటాయి. ఈ విధంగా యేర్పడిన శరీర భాగమే శిరస్సుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. దీనినే శిరః ప్రాధాన్యము (Cephalisation) అని అంటారు. దీని ఫలితంగానే జీవులలో పూర్వాంతములో ప్రత్యేకమైన భాగము యేర్పడి పూర్వ, పర అక్షయ కూడ నిర్ణయించ బడుతుంది.

25.9 స్వపరిశీలనం

1. విదేరియా టేనోఫార జీవులు మౌలికంగా వలయపాష్టవాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి కాబట్టి సామూహికంగా వాటిని _____ అని పిలుస్తారు.
2. మూడు పెద్ద వర్గాలైన _____, _____, _____ లో జీవులన్ని ద్వీపార్వ పాష్టవంతో ఉంటాయి. శరీరకుహరాన్ని అనుసరించి వీటి ఉమ్మడి సమూహం పేరు _____
3. అనెలిడా వంటి బలకారి జీవులలో సమఖండవిన్యాసం, శరీర కుహర నిర్మాణం ఏర్పడిన ఫలితంగా _____ అస్థివంజరం తయారవుతుంది.

25.10. సారాంశం

1. జంతు రాజ్యము ప్రాటిస్టా మరియు మెటజోవాలుగా విభజింపబడినవి.
2. బహుకణ జీవులన్నియు మెటజోవాలో చేర్చబడినవి.
3. ద్వీపరిత, త్రిపరిత జీవుల మధ్యనున్న భేదాలను వివరించవలెనది.
4. పాష్టవాన్ని గురించి వివరంగా చర్చించవలెనది.
5. ద్వీపార్వ జీవులను ప్రోటోస్టామియా, డ్యూటర్ స్టామియాలుగా విభజించడమైనది.
6. సీలోమ్, వాటిలోని వివిధ రకాలను గురించి చర్చించవలెనది.

7. సమఖండ విన్యాసము వాటి జీవ పరిణామ ప్రాముఖ్యత.
8. శిరఃప్రాధాన్యము, ద్విపార్శ్వ, ఇండియుత జీవుల ప్రత్యేకత.

25.11 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. రాడియోలా
2. అనెలిడా, ఆక్టోపాడ, మలస్క, ప్లె జోసీలోమేటా
3. హైడ్రాలిక్

25.12. వమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. జీవులలో కనిపించే వివిధ సాష్టవాళను విశదపరుచుము.
 2. శరీర కుహరాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని దిపార్శ్వ జీవులు (Bilateria) ను వర్గీకరించుము. ఉదాహరణలను పేర్కొనుము.
 3. వమూనా బహుకణ జీవి (Metazoan) ముఖ్య లక్షణాలను పేర్కొనుము.
- II. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. ద్విస్తరిత జీవులు
 2. త్రిస్తరిత జీవులు
 3. ప్రొటోప్లాస్మియా
 4. డ్యూటరోప్లాస్మియా
 5. యూకారియాట్

ఖండిక — II
ప్రోటోకార్టెట

BRAOU

భాగము - 26 ప్రోటోకార్డేట్లు

విషయక్రమము

26. 1 ఉద్దేశ్యము
26. 2 ఉపోద్ఘాతం
26. 3 హెమికార్డేట్లా సామాన్య లక్షణాలు
26. 4 వర్గీకరణ
 - 26.4.1. ఎంటరోపెన్యూస్టా
 - 26.4.2. టేరోబాంకియా
26. 5 కార్డేట్లా తో సంబంధ బాంధవ్యాలు
26. 6 ఇక్టెనోడెర్మాలతో సంబంధ బాంధవ్యాలు
26. 7 అనెలిడాతో సంబంధ బాంధవ్యాలు
26. 8 వ్యవరశీలనం
26. 9 సారాంశం
- 26.10 వ్యవరశీలనం జవాబులు
- 26.11 సమూహ ప్రశ్నలు.

26.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠమునందు కార్డేట్లా సాధారణ పరిచయము మరియు వర్గీకరణములో హెమికార్డేట్లా స్థానాన్ని వివరించడమైనది.

ఇదంతా చదివిన తరువాత పురుగువలె ఉండే జీవుల ఈ చిన్న సమూహ స్థానం ఇంతు శాస్త్రవేత్తలకు అతిక్లిష్ట సమస్యగా తయారయిందని, నేటికీ ఈ జీవుల బాంధవ్యాలను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించలేకపోతున్నారనే విషయాలను వివరించగలుగుతావు.


26.2 ఉపోద్ఘాతం

ద్యుటిరోస్టోమాకు చెందిన వర్గాలన్నిటి కంటే పెద్దది కార్డేట్లా వర్గం. వాటి అభివృద్ధిలోని ఏదో ఒక దశలో కనీసం కొంత వయస్సు సప్తేవరకైనా మూడు విశిష్ట లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయి. అవి:

1. పృష్ఠవంశము (ప్రక్కరుజ్జువు): ఇది పొడవుగా, గట్టిగా, స్థితిస్థాపక గుణము కలిగి ఉన్న కడ్డివంటి నిర్మాణము. ఇందులో రిక్తకలుగల పెద్ద కణాలు ఉంటాయి. ఉనికి యందు ఇది నాడీదండమునకు క్రిందుగాను ఆహారనాళానికి పైగా అక్షీయస్థానాన్ని ఆక్రమించి ఉంటుంది. ఇది రెండు తోడుగులతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఇందులో లోపలిది దళితంగా, తంతుయుత సంధాయక కణజాలంతోను, వెలుపలిది పలుచగా, స్థితిస్థాపక సంధాయక కణజాలంతోను నిర్మితమై ఉంటాయి. ఇందులోని కణాలు రిక్తకలతో, అర్థద్రవ పదార్థముతో

ఉంటాయి. ఇది స్వీతకవి కలుగ చేస్తుంది. ఇది అంతస్త్వచము నుండి ఎదుగుతుంది. ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన కార్డేటులయందు సాధారణంగా పృష్ఠవంశము ఖండితామయ మృదులాస్తితో లేదా ఎముకలతో విర్మితమైనట్టి కశేరు దండముతో మార్పిడి చెందుతుంది. ఇది ప్రతిష్ఠగాను, గట్టిగాను ఉండి దేహానికి ఆధారాన్ని ఇస్తుంది, కురచగా కాకుండా కాపాడుతుంది. ఈ నిర్మాణము చలనము నందు, కండరములు అంటి పెట్టుటకు సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఈ జీవులన్నిటికీ కార్డేటులని, వర్గాన్ని కార్డేటాయని వ్యవహరిస్తారు.

2. మొప్ప చీలికలు (జలశ్వాస చీలికలు): కార్డేటుల గ్రసనికుద్వ్యము రంధ్రములు కల్గి ఉంటాయి. రంధ్రములు గ్రసని యొక్క బహిష్త్వచ అంతర్గతత్వము మరియు అంతస్త్వచ బహిర్గతత్వముతో కలిసి పోవుటతో ఏర్పడుతాయి. ఇవి జలచరములకు శ్వాసక్రియ యందు తోడ్పడుతాయి. భూచరములందు ఇవి పిండదశలో మధ్యాంతర నిర్మాణములుగ ఉండి మాయమౌతాయి. సకశేరుకాల ప్రాథ దశ యందు జలశ్వాసపరికరము వినాశగ్రంథి రూపాంతరము చెందుతుంది. నిమ్న తరగతికి చెందిన కార్డేటులందు జలశ్వాస పరికరము ఆహార సేకరణ యందు ఉపయోగపడుతుంది.



పటం 26.1. ఆదర్శకార్డేటు 1. మెదడు 2. మొప్ప చీలికలు 3. ఉపరితిత్తి 4. నాడీ దండము 5. పృష్ఠవంశము 6. ఆశయము 7. అవస్కరము 8. అవస్కర రంధ్రము 9. అంత్యాహార నాళము 10. మూత్రపిండము 11. బీజకోశము 12. జీర్ణాశయము 13. కాలేయం 14. హృదయంతో మున్న హృదయావరణము 15. గ్రసని

3. నాడీ దండము: ఈ నిర్మాణము దేహానికి పృష్ఠతలాన బోలుగానున్న గొట్టమువలె ఉంటుంది. నాడీ కుహరము ద్రవముతో నిండి ఉంటుంది. అన్ని కార్డేటులందు ఇది జీవితాంతము ఉంటుంది. యూరోకార్డేటులందు మాత్రమే దింభక దశలో ఉండి ప్రాథ దశలో క్షీణించి పోతుంది. ఉన్నతశ్రేణి కార్డేటులందు (సకశేరుకాలలో) ఇది పూర్వ మెదడు, మధ్య మెదడు అంత్య మెదడు మరియు కశేరు దండము అను భాగములుగా విభేదింపబడి ఉంటుంది. నాన్ కార్డేటుల నాడీ దండము, ఘనమైన ద్వంద్వ ఉదర నాడీ దండముగ ఉంటుంది. దీని పొడుగున నాడీ సంధుల ఉబ్బెత్తులు, దేహ ఖండిభవనానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.

కార్డేటా వర్గీకరణము గురించి ఒక సముచిత ఒప్పందము అనునది యేదిలేదు. జెఫ్రీపార్కర్ మరియు విలియమ్ ఎ. హాస్వెల్ అనువారు ఈ వర్గాన్ని నాలుగు ఉప వర్గాలుగా విభజించినారు.

1. హెమి కార్డేటా (అడెరోకార్డేటా)
2. యూరోకార్డేటా (ట్యూనికేటా)
3. సెఫెలో కార్డేటా (ఏక్వెనియా)
4. వర్మిబేటా (క్రేనియేటా)

మొదటి మూడు వర్గాలను కలిపి ప్రోటోకార్డేటా అంటారు. 1885లో బేట్సన్, బెల్మోగ్లాసన్ అన్యనాళ

డై ఎల్ట్రైన్ మరియు ఎల్ట్రైన్ లను వివిధ రకాల పంటల అకులను, పశువుల ఆశ్రయించు చీడ పురుగుల మీద క్రిమిహారిగా వాడుతారు. ఆల్ట్రైన్, డైఎల్ట్రైన్ల కంటే ఎల్ట్రైన్ ఎక్కువగా విష తీవ్రతను కలిగి ఉంటుంది.

స్పర్శక పదార్థాలు (Contact poisons): పారా థియోరణ ల్యుస లివ థియోన్ (Parathion and Malathion) లు కర్బన ఫాస్ఫరస్ సమ్మేళనాలు (Organophosphorus Compounds). ఇవి విశాలమైన పరిధిలో వివిధ రకాల కీటకాలను నివారిస్తాయి. మిగుల చర్య (Residual action) పది నుంచి పదునాలుగు రోజులు ఉంటుంది.

ధూపాలు (Fumigants): కార్బన్ డై సల్ఫైడ్ (Carbon disulphide) ఇది విషపదార్థమే గాక హెచ్చుస్థాయిలో ప్రేలుడు శక్తిగల ద్రవపదార్థము. ఇది జాగుప్సాకరమైన (unpleasant) వాసన కలిగి ఉంటుంది. దీనిని బట్టి నేలలున్న గదులలో ధూపము వేయటానికి వాడుతారు. ఇది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. కాని ఎక్కువ ఖరీదు చేస్తుంది.

హైడ్రోజన్ సయనైడ్ (Hydrogen cyanide) మరియు మిథైల్ బ్రొమైడ్ (Methyl bromide) లు డేరాలు (Tent), గడ్డంగులు (Ware houses) లో ధూపము వేయటానికి పనికి వచ్చు విష వాయువులు.

21.12 స్వపరిశీలన

1. _____, _____ బీటికలు నిలువ ఉంచిన ధాన్యాలను పాడుచేస్తాయి.
2. మస్కా, అనాఫిలిస్, ఫిబోలునున్ కీటకాలు _____ క్రమానికి చెందినవి. ఇవి వివిధ వ్యాధికారకాలను సంక్రమింపజేస్తాయి.
3. ఇంత వరకు తెలిసిన వాటన్నిటి కంటే సమర్థవంతంగా కీటకాలను నియంత్రించేది _____ పద్ధతి.

21.13 సారాంశం

1. వివిధ రకాల పైర్లకు సంక్రమించు చీడ పురుగుల వివరణ.
2. నిలువ వుంచిన ధాన్యాన్ని నాశనము చేయు కీటకాలు, వాటి నుండి ధాన్యాన్ని రక్షించి కొనుటకు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు.
3. నివస స్థలాలలోని కీటకాలు (Household pests) అవి పాడు చేయు వస్తువులు.
4. కీటకాలు వ్యాప్తిని అరికట్టి తీసుకొనవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు.
5. జాడ్య విస్తరణలో కీటకాల పాత.
6. పశు సంపద కూడా కీటకాల వలన యిబ్బందులకు గురి అవుతుంది.
7. చెద పురుగులు అవి కలుగజేయు నష్టము.
8. కొన్ని చీడ పురుగుల వ్యాధిని కలుగ జేయు కీటకాల చరిత్రల వివరణ.
9. ఈ చీడ పురుగులను అదుపులో ఉంచుటకు వాడు వివిధ రకాల పద్ధతులు, క్రిమిహారుల గురించి వివరణ.
10. వివేచన లేకుండా చీడ పురుగులను నిర్మూలించుటకు క్రిమిహారులు వాడిన, మానవునికి, పశు పక్ష్యాదులకు హాని కలుగుతుంది.

21.14 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. టెన్సైలియా ట్రైబోలియమ్
2. డిప్టెరా
3. రసాయనిక

21.14 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది వానికి 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.

1. పోనికరమైన కీటకాలు గురించి ఒక వ్యాసమును వ్రాయుము
2. ఏవేని చీడపురుగుల జీవిత చరిత్రలను వివరించండి
3. పోనికరమైన కీటకాలను వివరించే పద్ధతుల గురించి వ్రాయండి.

II. ఈ క్రింది వానికి 10 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.

1. ఇంటి సంబంధమైన చీడపురుగుల గురించి వ్రాయండి.
2. మానవునికి వ్యాధిని కలుగజేయు కీటకాలు గురించి వ్రాయండి.
3. ఈగ జీవిత చక్రాన్ని వివరించి, అది ఏ విధంగా జాడ్యవిస్తరణలో తోడ్పడుతుందో తెల్పండి
4. చీడ సంహారులు అంటే ఏమిటి? క్రిమిహారుల వలన కలుగు అనదలు గురించి వ్రాయుము.

ముఖతలము: ఇది అధస్తనరము వైపు బల్ల పరుపుగాన్ను తలము. దీనిని ఆక్టినల్ (Actinal) తలము అని కూడ అంటారు (పటం 25.1. బి). ఈ క్రింది విర్మాణాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.

23.3.1 నోరు


దీనిని ఆక్టినోస్టోమ్ అని కూడ అంటారు. ఇది పంచ వికిరణ లేక పంచ కిరణాకృతి (Pentaradial) తో నున్న రంధ్రము. పరిముఖ త్వచము (Peristomal membrane) అను మృదువైన పొర నోటిని చుట్టి వుంటుంది. నోరు అయిదు సమూహాలతో నున్న ముఖ కంటకాల (Oral spines) చే రక్షణ కలిగి వుంటుంది. వీటిని ముఖ సూక్ష్మాంకురాలు (Oral papillae) అని కూడ అంటారు.

అంబులేక్రల్ గాడులు (Ambulacral grooves): ఇవి నోటి మూలల నుండి వికిరణ వద్దలితో (Radially) భుజము చివర వరకు విస్తరించిన ఇరుకైన గాడులు. ప్రతి ఒక్కగాడి రెండు వరుసలలో నాలికా పాదాలను కలిగి వుంటుంది.

అంబులేక్రల్ ముళ్ళు (Ambulacral spines): ఇవి కార్కేరియస్ ఫలకాలైన అస్థిభండాల మీద నున్న పొట్టి, దృఢమైన విర్మాణాలు. ఇవి ముఖతలము మీద నిర్ణీతమైన అమరికతో వుంటాయి. అంబులేక్రల్ ముళ్ళు వుంటాయి. ఈ ముళ్ళకు వెలుపల మూడు వరుసలలో కదలలేని (Immovable) ముళ్ళు వుంటాయి. ఇట్లాంటి ముళ్ళు ఒక వరుస ప్రతి భుజము యొక్క అంచులలో కూడ వుంటాయి.

నాలికా పాదాలు లేక పోడియా (Tube feet or podia): ఇవి నాలికారముతో వుండి సంకోచించుకోగల శక్తితో వుంటాయి. ప్రతి ఒక్క అంబులేక్రల్ గాడిలో రెండు ద్వంద్వ (Two double rows) వరుసలలో నాలికా పాదాలు వుంటాయి. ఇవి గమన శ్వాసానగావయవాలు.

జ్ఞానేంద్రియాలు (Sense organs): సంకోచన శక్తిలేని అయిదు ప్రమాణ స్పర్శకాలు (Olfactory tentacles) వుంటాయి. ఇవి ప్రతి ఒక్క భుజము కొనలో ఉంటుంది. ఇవి ప్రమాణ, స్పర్శాంగాలుగా వుండి ఆహార, సేకరణకు కూడా తోడ్పడతాయి. ఈ స్పర్శ కాల ఆధారభాగము (Base) లోనే నేత్రము ఉంటుంది.



పటం 23.1 అస్టెరియస్ బాహ్యలక్షణాలు A. పరిముఖ దృశ్యము, B. ముఖ దృశ్యము. 1. ఉపాంత కంటకాలు 2. రంధ్ర ఫలకము 3. సెంట్రల్ డిస్క్ 4. పాయువు 5. భుజాలు 6. ప్రమాణ స్పర్శకాలు 7. నాలికా పాదాలు 8. నోరు 9. అంబులేక్రల్ గాడులు 10. నేత్రము.

23.3.2 పరిముఖ తలము

ఇది జీవి యొక్క ఉపరి తలము. ఇందులోని భాగాలు ఇవి.


కంటకము లేక బొడిపెలు (Spine-tubercles): ఇది కదలలేని కాలేరీయన్ నిర్మాణాలు. ఇవి క్రమపద్ధతిలో అమరిపుండపు. ముఖతలములో ముళ్ళనలె అస్థి ఖండాలమీద వుంటాయి (పటం 23.1).

చర్మీయ శ్వాస అవయవాలు లేదా చర్మీయ మొప్పలు: ఇవి అస్థిఖండాల సుధ్యలో వుంటాయి. ఇవి మృదువైన పన్నని తంతురూప వేళ్ళవంటి నిర్మాణాలు. ఇవి శరీరములోనికి ముకుళించుకోగలవు (పటం 23.2. ఎ). ఇవి శ్వాసాంగాలుగా ఉపయోగపడుతాయి.

పాయపు: ఇది పరిముఖ తలములో సెంట్రల్ డిస్కు సుధ్యలో నిర్మింపబడిన చిన్నని రంధ్రము.

రంధ్ర ఫలకము (Madreporite): ఇది చిన్నని, బల్లపరుపుగానున్న జల్లెడ వంటి (Sieve-like) రంధ్ర ఫలకము. ఈ రంధ్రం ద్వారా నీరు శరీరము లోనికి, జల ప్రసరణ వ్యవస్థలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది రెండు భుజాలకు సుధ్యన వుంటుంది. ఈ భుజాలను ద్వయము (Bivium) అని మిగిలిన మూడు భుజాలను త్రయము (Trivium) అని అంటారు.

పైన వివరించిన నిర్మాణాలే కాకుండా ముఖ, పరిముఖతాలల మీద మరికొన్ని ముఖ్య నిర్మాణాలున్నాయి. ఇవి పెడిసెల్లెరియన్లు.



పటం: 23.2. సముద్ర నక్షత్రము A. పెడిసెల్లెరియన్లు పాపులాయి, బుడిపల సమూహము B. పెడిసెల్లెరియన్లు. i. బంధిత రకము ii. తిన్నటి (Straight) రకము. 1. బుడిప లేదా కంటకము 2. పాపులాయి 3. పెడిసెల్లెరియన్లు 4. కవాటాలు 5. అపవర్తనీ కండరము 6. అభివర్తనీ కండరము 7. ఆధారతునక.

పెడిసెల్లెరియన్లు Pedicellariae: ఇవి రూపాంతరం చెందిన ముళ్ళు. రెండు తలల మీద ముళ్ళసుధ్య వుంటాయి. ఇవి పాట్టిగా, కదల గలిగి శ్రావణమువలె (Pincer-like) వుంటాయి. ప్రతి ఒక్క పెడిసెల్లెరియన్ కదలే వ్యంతము, మూడు కాలేరీయన్ ఫలకాలలో వుంటుంది. ఈ మూడు ఫలకాలలో ఒకటి ఆధార ఫలకము (Basilar plate) కాగా మిగిలిన రెండు కదిలే దవడల వంటి నిర్మాణాలు. అభివర్తనీ, అపవర్తనీ కండరాలచే దవడ అడుపులో వుంటాయి. మూడు ఫలకాలలోనున్న ఈ విధమైన పెడిసెల్లెరియన్లు ఫోర్సిపులేట్ (Forcipulate) పెడిసెల్లెరియన్ అని అంటారు (పటం 23.2.బి). ఇవి జీవి శరీరము మీద చేరిన అన్యవదార్తలను తీసివేసి శ్వాసక్రియ జరపటానికి చర్మీయ జలశ్వాస అవయవాలను శుభ్రంగా వుంచుతుంది. జలశ్వాస అవయవాలకు రక్షణకూడా కలుగజేస్తాయి.

నోరు, అవోర వాహిక కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. దాలియోలేరియా ఒక్క డింభకమే స్థానబద్ధజీవి (Sedentary animal) గా మారుతుంది.

24.9. ఇక్టెనోడర్మ్ డింభకాల ప్రాముఖ్యం

బైపిన్నేరియా డింభకము యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి యిదివరకే తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ యితర డింభకాల జీవ పరిణామ ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి వృష్టము చేయడమైనది. డింభకాలన్నింటిలోకి ఆరిక్యులేరియా హెమికార్డేటాలోని బెలన్టోగ్లాసన్ డింభకమైన టార్పేరియాతో పోలికలు చాల వృష్టంగా కలిగిఉంటుంది. ఈ కారణంచేతనే ముల్లర్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు టార్పేరియా డింభకాన్ని బైపిన్నేరియా, ఆరిక్యులేరియాలతో కలిపాడు. అయితంగా అమరిన తైలికల పట్టి ఈ డింభకాలలోనే కాకుండా బైపిన్నేరియాలో కూడా ఒకే విధంగా వుంటుంది. ప్లవక జీవనము (Pelagic life), పారదర్శక విర్మాణము కలిగి వుండటము యితర దగ్గరి పోలికలు.

నమూనా డింభకమైన డైప్లూరులాలోసు, దాలియోలేరియాలోసు, అగ్రఫలకాన్ని కలిగి వుండుట టార్పేరియాలో నున్న మరి ఒక ముఖ్యమైన పోలిక.

ఈ విధంగా ఇక్టెనోడర్మ్ డింభకాలు హెమికార్డేటా, అనెలిడా, మలస్కాజీపుల డింభకాలతో పోలికలు, సన్నిహితత్వాన్ని కలిగి వున్నందున ఇక్టెనోడర్మ్లు హెమికార్డేటా జీవులకు పురా జీవులని (Ancestors of Hemichordates) నిర్ణయించవచ్చు.

24.10 స్వపరిశీలనం

1. ఇక్టెనోడర్మ్ల జీవులకు పూర్వీక డింభకంగా పరగణింపబడే దాని పేరు_____
2. బైపిన్నేరియా మార్పుచెంది_____ డింభకంగా మారిన తర్వాతనే_____ జరుపుకోంటుంది.
3. బైపిన్నేరియా, ఆరిక్యులేరియా, టార్పేరియా డింభకాలలో కనిపించే నిర్దిష్టమైన పోలికలుండడంవల్ల ఇక్టెనోడర్మ్లు, హెమికార్డేటా జీవులన్నిటి_____ ఒకే సామాన్య జీవి నుండి జరిగిందని భావించవచ్చున్నది.

24.11 సారాంశం

1. ఇక్టెనోడర్మ్ల విభాగాలలో డింభక జీవులు విభిన్నంగా వుంటాయి.
2. ప్రతి ఒక్క విభాగానికి నమూనా డింభకము ఉంటుంది.
3. బైపిన్నేరియా అష్టరాయిడియా విభాగానికి, ఒఫియోప్లాటియన్ ఒఫియురాయిడియా విభాగానికి, ఇక్టెనోప్లాటియన్ ఇక్టెనాయిడియా విభాగానికి, ఆరిక్యులేరియా హోలోథూరాడియా విభాగానికి, డోలియోలేరియా క్రైనాయిడియా విభాగానికి చెందినవి.
4. బైపిన్నేరియా, ఆరిక్యులేరియా, డోలియోలేరియా డింభకాలు బెలన్టోగ్లాసన్ టార్పేరియాను, అనెలిడా డింభకమైన ట్రోకోఫోర్ను పోలి ఉంటాయి.
5. ఈ డింభకాలు జీవపరిణామ ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

24.12 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. డైప్లూరూలా
2. బ్రాకియోలేరియా, రూపవిక్రియ
3. వర్గ వికాసం

24.13 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయండి.

1. ఆస్టేరియాన్ పిండావృద్ధిని తెలుపుము
2. టైపేన్టేరియా దీర్ఘకము యొక్క విర్మాణము, ప్రాముఖ్యతను తెలుపుము.
3. ఇక్టెనోడర్మీటాలోని వివిధ దీర్ఘకాలను గురించి వ్రాయుము. వాటి జీవ పరణాను ప్రాముఖ్యత యేమి.

II. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 10 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. డైప్లూరూలా
2. టైపేన్టేరియా
3. బ్రాకియోలేరియా
4. ఒఫియోప్లాటెయస్
5. ఇక్టెనోప్లాటెయస్
6. ఆరిక్యులేరియా
7. ఇక్టెనోడర్మ్ దీర్ఘకాల ప్రాముఖ్యత

24.14 పదకోశం

అదనపు గ్రంథి (Accessory glands): ఒక వ్యవస్థలో అదనంగా అభివృద్ధి చెందిన గ్రంథి విర్మాణము.

ఆనవర్తనీ కండరాలు (Adductor muscles): శరీర భాగాన్ని, జీవి ముఖ్య అక్షము వైపు లాగు కండరము.

అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి (Indirect development): అభివృద్ధి, దీర్ఘక దశలద్వారా పూర్తి అవుతుంది.

అభివర్తనీ కండరాలు (abductor muscles): శరీర భాగాన్ని, జీవి ముఖ్య అక్షమునుండి దూరంగా లాగు కండరము.

అమీబోసైటులు (Amoebocytes): అమీబా క్షణముతోనున్న కణ నిర్మాణాలు, అనగా మిథ్యాపదాలు సహాయముతో ఆహార సేకరణ కదలికలు కలిగి వున్నవి.

ఆయిస్టర్లు (Oysters): మలస్కా ద్వికవాల జీవి

అస్త్రపంజర నిర్మాణాన్ని, ట్యూనికేటా మరియు ఏకేవియా లోని పృష్ఠ వంశము యొక్క నిర్మాణ సామ్యమని తలచినాడు. కాని పెక్కు శాస్త్రజ్ఞులు దీనిని పృష్ఠవంశమని తలంచరు. దీనిని వారు ఆవ్య అంధభాహువు అని పేర్కొన్నారు. హెమీ కార్డేటులు కార్డేటులకన్నా ఎక్వైడర్మిలతో ఎక్కువ పోలికలు కలిగి ఉన్నాయి. (హెమీకార్డేటా సంబంధ బాంధవ్యాన్ని చూడుము). ఈ కారణంగా శాస్త్రజ్ఞులు హెమీకార్డేటాను ఒక ప్రత్యేక వర్గముగా ఎంచవలెనని తీర్మానించినారు.

హెమీకార్డేటాలో ఒక అంతర అస్త్రపంజర మూలకము ఆవ్యనాళము నుండి పెరుగుతుంది. (అపొరనాళ పూర్వభాగము). ఇది పృష్ఠ వంశము కావచ్చు. ఒక రాబ్టోఫ్లూరా (హెమీకార్డేటా యొక్క జాతి) తప్ప మిగతా అన్ని ప్రోటోకార్డేటులు గ్రహని రంధ్రములు కలిగి ఉంటుంది. జిప్సా కడ్డీల పెరుగుదల వెంబడి వీని సంఖ్య పెరుగుతుంది. పెఫెలో కార్డేటాయందు దీనిని పోలివట్టి గుణకారము గోచరిస్తుంది.

కండరక్రియా శీలతయందు కార్డేట్లు ఫాస్ఫజేన్స్ (Phosphogenes) ను ఉపయోగించుకొంటాయి. ఇదే విధంగా నాన్ కార్డేటులు ఆర్జినిన్ వాడుకొంటాయి. హెమీకార్డేటులు, ట్యూనికేట్లు మరియు ఎక్వైడర్మిలతో క్రియేటిన్ ఉంటుంది. ఇటీవల కొన్ని పాలీకీట్ లందు క్రియేటిన్ సమ్మేళనము కనుగొనబడింది. ఐనను ఇతర పాలీకీట్లు ఆర్జినిన్ సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటాయి.

26.3. హెమీకార్డేటా సామాన్య లక్షణాలు

1. ఇవి సముద్రములో నివసించు పురుగులనంటి జంతువులు. ఒంటరిగాను లేదా సహజీవులుగాను జీవిస్తాయి. దేహము పొడవుగాను, మన్నితంగాను ఉంటుంది. సాధారణముగా ఇవి U ఆకారపు గొట్టాలలో కనిపిస్తాయి. దేహము మృదువుగా బొరియలందు నివసించుటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
2. దేహము ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యము కలిగి ఖండిభవనము లేక ఉండును.
3. వీని దేహము మూడు జనన స్తరాలతో బహిష్టచము, మధ్యస్థచము, అంత్యస్థచముగా ఉంటుంది.
4. దేహము తుండము, కాలర్ మరియు మొండెము అను మూడు అసమ భాగములుగా విభజింపబడి ఉంటుంది.
5. కొన్ని జాతులు కాలర్ భాగమున పృథ్వీకయుత బాహువులు కలిగి ఉంటాయి.
6. దేహకుహరము ఐదు భాగములుగా విభజింపబడి ఉండును. తుండపు భాగమున ఒక అద్వంద కుహరము, కాలర్ మరియు మొండెము భాగమున రెండేసి కుహరాలు ఉంటాయి. తుండము మరియు కాలర్ నందలి కుహరాలు రంధ్రముల ద్వారా వెలుపలికి తెరుగు కుంటాయి. మొండెము భాగమున రంధ్రములు లేవు.
7. దేహ కుడ్యము ఏకస్తర బాహ్య చర్మములో యేర్పడును. ఇందులో శ్లేష్మము స్రవించునట్టి గ్రంథి కణాలు కలవు. వీని సంఖ్య తుండ భాగములో అధికముగా ఉండును.
8. గ్రహని భాగము పెక్కు రంధ్రములతో ఉండును. మొప్ప చీలికల సంఖ్య ఒకటి మొదలుకొని అనేక జతల వరకు ఉండును. మొప్పల రంధ్రముల ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొంటాయి.
9. ప్రసరణ వ్యవస్థ స్వేచ్ఛాయుతమైనది (కేళనాలికలు లేవు). ఈ వ్యవస్థలో నిర్దిష్ట రక్త కాలనలు, లిక్విడ్ ప్రదేశాలు, మరియు హృదయ ఆశయము ఉంటాయి.
10. వీనియందు తుండగ్రంథి (గ్లోమెరూలస్) విస్తరకాంగముగా వ్యవహరిస్తుంది.
11. వాడీ వ్యవస్థ బాహ్య చర్మాంతస్థ వాడీ జాలకముగా యేర్పడి ఉండును. ఈ జాలకము నుండి పృష్ఠ మధ్య మరియు ఉదర మధ్యవాడీ దండాలుగా యేర్పడి, ఒక వలయవాడీ పోగులతో కలుపబడి ఉంటాయి.

12. పెక్కు బీజకోశాలు జనన వక్షములందు వరుసలుగా అనుర్రబడి ఉంటాయి.
13. ఇందులో ఉభయ లింగ జీవులు మరియు లింగభేదము కలవి చేరియున్నవి.
14. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కోరిక భవనము ద్వారా జరుగును. వీనియందు పునరుత్పత్తి శక్తికలదు.
15. బాహ్య ఫలదీకరణము జరుగును.
16. బెల్నోగ్లాపస్ పెరుగుదల అప్రత్యక్షంగా జరుగును. దీని దీంభకము బార్నేరియా అంటారు. పాక్లోగ్లాపస్ నందు పెరుగుదల ప్రత్యక్షంగా జరుగును.
17. బార్నేరియా దీంభకము ఎక్సోడర్మ్ యొక్క బైపివేరియా దీంభకాన్ని పోలియుంటుంది.

26.4 వర్గీకరణ

ఉపవర్గము హెమికార్డేటా (ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు దీనిని ఒక వర్గముగా పరిగణింతురు). రెండు తరగతులుగా విభజింపబడింది. 1. ఎంటిరోస్ట్యా 2. టీరోబ్రాంకియా.

26.4.1 ఎంటిరోస్ట్యా

1. ఇవి పరభక్షయేవ దేహముకల, పురుగునంటి బిలకారి జంతువులు.
2. ఒంటరిగా జీవించును.
3. దేహము యొక్క పూర్వంత భాగము తుండము అనబడును.
4. కాలర్ సామాన్యముగ పుర్వక బాహువులు లేకుండ ఉండును.
5. U ఆకార మొప్ప చీలికలు పెక్కు ఉంటాయి.
6. జీర్ణ మార్గము ఒక తిన్నని వాళము, కాలేయ గోణులు ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉండును.
7. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థయందు వ్యవస్థీకరము, రక్తవాళము మరియు లిక్విడ్ ప్రదేశాలు ఉంటాయి.
8. వాడీ దండము కాలర్ భాగమందు ఉండును.
9. వీని యందు లైంగిక భేదము ఉండును.
10. బీజకోశాలు అధిక సంఖ్యలో జనన వక్షములందు ఉండును.
11. బెల్నోగ్లాపస్లో పెరుగుదల అప్రత్యక్షంగా జరిగి బార్నేరియా దీంభకము కలిగి ఉండును. పాక్లోగ్లాపస్ పెరుగుదల ప్రత్యక్షంగా జరుగును. దీంభక దళ లేదు.
12. దీనిలో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగదు.
ఉదా: బెల్నోగ్లాపస్ (పటం 26.1) పాక్ గ్లాపస్


26.4.2 టీరోబ్రాంకియా

1. ఇవి సముద్రములో లభించే స్థానబద్ధజీవులు. గొట్టాలలో నివసిస్తాయి.
2. ఆకారము సూక్ష్మమైనది. ఇవి సాధారణముగా పహినివేళ జీవనము గడుపును.
3. తుండము వర్మ్ ఆకారములో ఉంటుంది.
4. కాలర్ భాగమున పుర్వక బాహువులు ఉంటాయి.
5. జీర్ణమార్గము 'U' ఆకారములో ఉంటుంది. నోరు, పాయువు, ఒకే అంతరమునందు ఉంటాయి.
6. మొప్ప చీలికయందు 'U' ఆకారపు జివ్వా కట్టిలు ఉండవు.
7. వాడీ దండము కాలర్ భాగము నందు ఉండదు.
8. ఒక బీజకోశము లేదా ఒక జత బీజకోశాలు ఉంటాయి.
9. వీనియందు ఉభయలింగత్వము లేదా లింగభేదముకల రెండు రకాల జీవులుంటాయి.

10. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కోరకీభవనము ద్వారా జరుగును.

11. పెరుగుదల రెండు రకాలుగ జరుగును. (1) ప్రత్యక్ష (2) అప్రత్యక్ష. టెరోడాంకియూ తరగతి రెండు క్రమాలుగా విభజింపవచ్చును.

(i) రాబ్డోప్లూరా (ii) పెఫిలోడిస్కిడా



పటం. 26.2. హెమికార్డేట్లు. A. రాబ్డోప్లూరా (ఒక జీవి) B. పెఫిలోడిస్కిన్ (ఒక జీవి) 1. స్పర్శకాలు, 2. శిరోవర్ణము (Cephalic shield) 3. ముఖపటలిక 4. మొండెము 5. వ్యంతము 6. కాలర్ భుజములు 7. కాలర్ 8. పాయువు.

i) క్రమము— రాబ్డోప్లూరా

1. కాలర్ భాగములో రెండు స్పర్శక బాహువులు ఉంటాయి.
2. మొప్ప చీలికలుండవు.
3. బీజకోశము ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది.
4. ఇవి సహనివేశాలుగా జీవిస్తాయి.
5. వీని సహనివేశమునందు జీవులు ఐక్యస్థోలాన్ ద్వారా కలువబడి ఉంటాయి.

ఉదా: రాబ్డోప్లూరా (పటం 26.2 A.)

ii) క్రమము— పెఫిలోడిస్కిడా

1. ఇవి ఒంటరిగాను, సమూహాలుగాను (గెగారియన్) వివసిస్తాయి. సమూహాల వివిధ వ్యక్తులమధ్య సంబంధము ఉండదు.
2. జీవులన్ని ఒక సివేషియం (Coenocoelium) లో జీవిస్తాయి.
3. కాలర్ భాగాన పెక్కు స్పర్శక బాహువులు ఉంటాయి.
4. మొప్ప చీలికల ఒక జత మాత్రము ఉంటుంది.
5. బీజకోశాల జత ఒకటి ఉంటుంది.

ఉదా: పెఫిలోడిస్కిన్ (పటం 26.2 B)

26.5 కార్డేటాతో సంబంధ బాంధవ్యాలు

హెమికార్డేటా యందు రెండు కార్డేటుల మౌలిక లక్షణాలు కలవు.

1. వీని మొప్పచీలికలు, 'నిర్మాణముతో ఉన్న చేప' అనబడే ఆంఫియాక్సస్ మొప్ప చీలికలతో పోలి ఉంటాయి.
2. మొప్పచీలికల నిర్మాణము, పెరుగుదల మరియు విధులు నిమ్నకార్డేటులలో ఆంఫియాక్సస్ తో విశేషంగా పోలిఉంటాయి.
3. కార్డేటులందు ఉన్నట్లు, పృష్ఠనాళాకార నాడీతుండము నాడీసంధిరహితముగా ఉంటుంది.

కార్డేటుల మూడవ మౌలిక లక్షణము, పృష్ఠవంశ ఉనికి, కొన్ని ప్రోటోకార్డేటులందు ఇది జీవితాంతము ఉంటుంది. ఉన్నత కార్డేటులందు కశేరుదండముతో మార్పిడి చెందుతుంది. హెమి కార్డేటుల ఆన్యకుహర కప్పునందు ఆస్తిపంజర నిర్మాణ మొకటి తుండములోనికి పెరిగి ఉంటుంది. మొదట దీనిని పృష్ఠశంఖమునుకొని ఆ తరువాత దీని స్థానము ఆన్యగొట్టుము వందుండుట చేత ఆన్య అంధనాళమున్నారు. కాని కొందరు దీనికి స్ట్రోమోకార్డ్ అని పేరు ఇచ్చినారు. దీని నిర్మాణోత్పత్తిని గమనించినచో ఇది దేహ పృష్ఠమధ్యభాగాన అహార నాళము నుండి ఎదిగి, రిక్తికామయకణాలు కలిగి పృష్ఠవంశాన్ని పోలి ఉంటుంది.

కార్డేటులతో వ్యత్యాసములు:

1. మొప్ప చీలికలు హెమికార్డేటాలో పృష్ఠతలాన, కార్డేటాలో పార్శ్వతలనా ఉంటాయి.
2. పృష్ఠవంశము (ఆన్యఅంధనాళము)అనే నిర్మాణము చాల కురుచగా ఉంటుంది. ఇది కార్డేటులందు దేహము యొక్క పూర్తి పొడుగునా ఉంటుంది.
3. దీని స్థానము హెమికార్డేటులో పృష్ఠరక్త నాళానికి ఉదర తలాన, కార్డేటులందు పృష్ఠతలాన వుంటుంది.
4. హెమికార్డేటులందు పృష్ఠవంశము (ఆన్యఅంధనాళము)ను అవరించి యేలాటి తొడుగు లేదు. కార్డేటులందు దీని నావరించి రెండు తొడుగులు కలవు. వెలుపలిది పలుచగాను, స్థితిస్థాపకసంధాయక కణజాలముతో నిర్మితమయి, లోపలిది దళితముగా తంథియుత సంధాయక కణజాలముతో ఎర్పడి ఉంటాయి.
5. పృష్ఠవంశము, పూర్వ ఆహారనాళముతో ఎదిగి, హెమికార్డేటులందు దానితో కలిసి ఉంటుంది, కాని కార్డేటులందు వేరైపోతుంది.
6. నిజమయిన పృష్ఠవంశము పెద్ద పెద్ద రిక్తికామయ కణాలతో ఉంటుంది. హెమికార్డేటా ఆన్య అంధనాళములోని కణములను కొందరు రిక్తికామయ కణాలని మరికొందరు ఉపకళాకణాలని అన్నారు.
7. హెమికార్డేటా పృష్ఠనాడీ దండము కాలర్ వరకే పరిమితమయి ఉంటుంది. ఇతర భాగములందు బాహ్యచర్మాంతస్త నాడీజాలకము ఉంటుంది. కార్డేటులందు అట్లుకాక ఒక నాళాకార, బోలైన నాడీదండము దేహము పొడుగునా ఉంటుంది. దీని పూర్వాంతము మస్తిష్కమున ఎరుగుతుంది.
8. వీనియందు పెక్కు బీజకోశాలు ఉండును. కార్డేటులందు అట్లుగాక ఒక జత మాత్రమే ఉంటుంది.
9. రక్తపవాహము నాన్ కార్డేటులవలె పృష్ఠనాళముతో పూర్వాంతము వైపుకు, ఉదర నాళములో పరాంతము వైపుకు సాగును. కార్డేటులందు దీనికి వ్యతిరేకముగా నుంటుంది.
10. వీనియందు హృదయము పృష్ఠభాగాన, కార్డేటులందు ఉదరతలాన ఉంటుంది.

11. పిని బాహ్యచర్మము ఏకస్తరముతో శైలికామయములు ఉంటుంది.
12. రక్త జీవరసాయనిక పరీక్షలు, హెమికార్డేటులు, ఆకశేరకాలలో సాధారణంగా, ఎక్సెన్డర్మాలతో ప్రత్యేకంగా పోలిఉండునని తెలిపినవి.

26.6 ఎకనోడర్మాలతో సంబంధ బాంధవ్యాలు

అస్టిరియాన్, బైపిన్నేరియా డింభకమునకు, బెంబోగ్లాసన్ లార్వేరియా డింభకానికి మధ్య బలీయమైన సంబంధము గోచరిస్తుంది.

1. రెండు డింభకాలలో విదళనము, గాస్ట్రులా నిర్మాణము ఒకే విధముగా ఉండును.
2. రెండు డింభకాల శైలికామయపట్టీ ఒకేరకపు చలనాన్ని అవలంబిస్తుంది.
3. పినియందు సీలోమ్ ఆది అంత్రమునుండి ఎదుగును.
4. రెండింటి జీర్ణమార్గమునందు నోరు ఉదరభ్రాన, పాయువు పరాంతాశ ఉంటుంది.
5. రెండు డింభకాలలో పాయువు ఆది అంత్రరంధ్రము ఉండునోట యేర్పడును.
6. దేహకుహరపుట్టుక, అమరిక ఒకే విధంగా ఉంటుంది.
7. ప్రాథమికముందు నాడీవ్యవస్థ దుర్బలంగా ఉండును.
8. హెమికార్డేటుల హృదయాశయము, ఎక్సెన్డర్మ డింభక మేడ్రిపోరైట్ ఆశయముతో నిర్మాణ సామ్యత కలిగి ఉండును.

26.7 అనెలిడాతో సంబంధ బాంధవ్యాలు

1. హెమికార్డేటులు అనెలిడ్లు రెండూ నాశవానులు. వీనికి తొలుచుకొని పోపు ఆలవాటు కందు.
2. రెండు వర్గాల జీవులు బురదను అంతర్గ్రహణము చేసికొనును.
3. రెండింటి విసర్జక పదార్థము క్వాంటింగ్స్ ఆకారములో ఉంటుంది.
4. రెండింటి రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ ఒకే విధంగా ఉండి, హృదయము పృష్ఠతలాన ఉంటుంది.
5. పిటి రక్తప్రవాహము పృష్ఠ నాళమున పూర్వంతము వైపు, ఉదరనాళము నందు పరాంతమువైపు ఉంటుంది.
6. అనెలిడా ట్రోకోఫోర్ రూపాంతరము చెంది, లార్వేరియా డింభకము యేర్పడిందని భావించవచ్చు.

అనెలిడాతో వ్యత్యాసములు

1. నాడీ వ్యవస్థ రెండింటిలో భిన్నముగా ఉండును.
2. అనెలిడా విసర్జక వృక్కాలతో ఏర్పడును. హెమికార్డేటులందు ప్రత్యేకాంగములు లేవు. రక్తనాళికా గుచ్ఛము (Glomerulus) విసర్జక విధి విర్వహించునని భావించురు.
3. గ్రహవి భాగము, హెమికార్డేటాలో ఏద్రములు కలిగి, అనెలిడాలో ఏద్రములు లేక ఉంటుంది.
4. పృష్ఠవంశము లేదా ఆవ్య అంధనాళ అస్థివంశరము, అవ్యకుహర కస్పనందు ఉండును. ఇట్టి నిర్మాణము అనెలిడాలో కానరాదు.

పైన పేర్కొన్న సంబంధబాంధవ్యాల దృష్ట్యా, హెమికార్డేటాను ఎక్సెన్డెర్మేటా, కార్డేటులకు మధ్య ఒక ప్రత్యేకవర్గముగా వుంచుట సమంజసము.

26.8 స్వపరిశీలన

1. కార్డేట్‌లతోగల హెమికార్డేట్‌ల సామాన్య నిర్మాణ లక్షణాల పట్టిక ఇమ్ము.
2. స్ట్రోమెకార్డేను ఏ విధంగాను పృష్టవంశంతో సమానంగా పరగణించలేరు. అందుచేత ప్రస్తుతం హెమికార్డేట్‌ల ఉపవర్గాన్ని అకశేరుకాలలోని ఒక _____ గా స్థానం కల్పించారు.

26.9 సారాంశం

1. వెన్నుసాము (పృష్టవంశము) కలిగివున్న జంతువులను కార్డేటులంటారు. ఉత్తర సముద్రస్కర్చ్ఛి, చేపలు, కప్పలు, సర్పాలు, పక్షులు, ఎలుక, పిల్ల, కుక్క, గబ్బిలము, తిమింగలము, ఏనుగు మనవుడు మొదలగునవి చూచుటకు విభిన్నముగా ఉంటాయి. కాని వీనియందు ఐక్యలక్షణాలు చాలా కలవు.
2. కార్డేటుల పుట్టుక గురించి అభిప్రాయము వివాదస్పదముగ నున్నది.
3. కార్డేట్‌లవర్గ, వర్గీకరణ గురించి నేటివరకు ఒక సామాన్య ఒప్పందము కుదురలేదు.
4. హెమికార్డేటాయందు పృష్టవంశ ఉనికి అనుమానస్పదంగా ఉండుటచేత వర్గీకరణములో దీని స్థానము వివాదస్పదంగా ఉన్నది.
5. ఈ వర్గ జీవులు మూడు మౌలిక లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవి. 1. పృష్టవంశము 2. మొప్పచీలికలు 3. నాడీదండము.

26.10 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. మొప్ప చీలికలు, నాడీదండము
2. వర్గం

26.11 నమూనా ప్రశ్నలు

1. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. నమూనా కార్డేట్ ముఖ్య లక్షణములను పేర్కొనుము.
 2. హెమికార్డేట్ సామాన్య లక్షణములను తెలుపును.
 3. హెమికార్డేట్ ఉదాహరణలతో వర్గీకరించుము.
- H. ఈ క్రింది వాటిని 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. పృష్ట వంశము.
 2. ఏంటరోమ్యూస్టా
 3. టెరోట్రాంకియ

భాగము — 27 బెలనోగ్లాసన్

విషయక్రమము

- 27. 1 ఉద్దేశ్యము
- 27. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 27. 3 బాహ్యలక్షణాలు
- 27. 4 శరీర కుడ్యము
- 27. 5 శరీర కుహరము
- 27. 6 అస్థిపంజరము
- 27. 7 జీర్ణవ్యవస్థ
- 27. 8 శ్వాసవ్యవస్థ
- 27. 9 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
- 27.10 విసర్జక వ్యవస్థ
- 27.11 నాడీవ్యవస్థ
 - 27.11.1 జ్ఞానాంగాలు
- 27.12 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 27.13 అభివృద్ధి
 - 27.13.1 రూపవిక్రమము
- 27.14 స్వపరిశీలనం
- 27.15 సారాంశం
- 27.16 స్వపరిశీలనం ఇవాయిలు
- 27.17 నమూనా ప్రశ్నలు

27.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠంలో బెలనోగ్లాసన్ ని ఉదాహరణగా తీసుకొని విపులంగా తెలుసుకోటం జరుగుతుంది. అందువల్ల హేమికార్డేటా ఉపవర్గపు సాధారణ లక్షణాలు, వ్యవస్థీకరణ బోధపడతాయి. దీన్ని వివరంగా చదివిన తరువాత బెలనోగ్లాసన్ ను ఇతర కార్డేట్ లతో పోల్చినట్లయితే ఎన్నో భేదాలున్నాయి అనీ, ఎన్నో విధాల ఇది అకశేరుకలను సన్నిహితంగా ఉంటుందనీ, నీవు ఆత్మవిశ్వాసంతో తెలుపగలుగుతావు.

27.2 ఉపోద్ఘాతం

బెలనోగ్లాసన్ ఉష్ణ సమశీతోష్ణ నముద్రాలలో నివసించే జీవి. ఇది బొరియవాసి. దీని బొరియలు 'U' ఆకారంలో ఉంటాయి. దీని బొరియల గోడలు క్లేష్మంతో సిమెంట్ చేయబడి ఉంటాయి. జీవి చర్మములోని క్లేష్మ గ్రంథులు క్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. తుండము (Proboscis) బొరియలు త్రవ్వటానికి

ఉపయోగపడుతుంది.

వర్గీకరణము

వర్గము — కార్డేటా

ఉపవర్గము — హెమికార్డేటా

విభాగము — ఎంటరోస్ట్యూప్టా

ప్రజాతి — బెల్టోగ్లాపస్


జాతి — క్లావిజెరస్

27.3 బాహ్యలక్షణాలు

బెల్టోగ్లాపస్ వివిధ శరీర భాగాలు వివిధ రంగులను కలిగిఉంటాయి. కాలేయ ప్రాంతము మట్టిరంగులోను, తుండము పసుపు రంగులోను, కాలర్ ఎరుపు కలిసిన నారింజ రంగులోను, జలశ్వాస ప్రాంతము పసుపు కలిసిన నారింజరంగులోను ఉంటాయి. ఈ జీవి నుంచి ఆయోడోఫిన్(Iodoform) వి స్రవించి వాసన వెలువడుతుంది. ఈ వాసన భరిపరానిదిగా ఉంటుంది. చర్మము ప్రవించే జిగట పదార్థము నుంచి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు కాంతి ప్రసరించబడుతుంది.

ఆకారము, పరిమాణము : దీని శరీరము మృదువుగాను మన్నితంగాను ఉంటుంది. పొడవుగా స్థూపాకారంలో వానపామును పోలిఉంటుంది. శరీరమంతా శైలికాయుతమై ఉంటుంది. శ్లేష్మస్రావము ఆవరించి ఉంటుంది. శరీరం ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యం (Bilaterally symmetrical)లో ఉంటుంది. ఈ ప్రజాతిలోని జీవులు 4' నుంచి 2' వరకు ఉండవచ్చు. బెల్టోగ్లాపస్ జిగాస్ అనే జాతి 7 మీటర్ల పెరుగుతాయి. దీని శరీరాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు: తుండము, కాలర్, మొండెము (పటము 29.1)

తుండము (Proboscis) లేదా ప్రోటోసోమ్ (Protosome) : ఇది శరీరంలో పూర్వంతానికి ఉంటుంది. ఇది కురుచగా శంకు ఆకారంలో కండర పూరితమై ఉంటుంది. దీని పరభాగము తుండ వ్యంతము



పటం 27.1 బెల్టోగ్లాపస్ 1. తుండము 2. కాలర్ 3. జలశ్వాస జనన ప్రాంతము 4. మొప్ప రంధ్రములు 5. జనన పక్షము 6. కాలేయ ప్రాంతము 7. ఉదర లేదా కాలేయ ప్రాంతము 8. పాయువు

(Proboscis stalk) గా ఏర్పడుతుంది. దీనిని కాలర్ అవరించి ఉంటుంది. ఒకటి లేదా రెండు తుండ రంధ్రాలు (Proboscis pores) తుండము ఆధారం దగ్గర పృష్ఠతలంలో తెరుచుకొని ఉంటాయి. తుండ కుహరాలలోని నీరు ఈ రంధ్రాలద్వారా ప్రవేశించి తుండము స్థితి చెందేటట్లు చేస్తుంది.

కాలర్ లేదా మీసోసోమ్ (Mesosome): ఇది కూడా కండర పూరితమైనదే. దీని తలంమేద వర్తులాకార గాదులు ఉంటాయి. పూర్వభాగంలో కాలర్ గరాటు రూపంలో ఉంటుంది. దీనిని కాలరెట్ (Collerette) అంటారు. కాలరెట్ కు తుండ వృంతానికి మధ్యగా ఉదర భాగంలో నోరు ఉంటుంది.

మొండెము లేదా మెటాసోమ్ (Metasome): కాలర్ వెనకగా మొండెము ఉంటుంది. ఇది శరీరం అంతటిలోకి పొడవైన భాగము. మొండెమును మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. పూర్వభాగము జలశ్వాస జననప్రాంతము. మధ్యభాగము కాలేయ ప్రాంతము. పరభాగము పరకాలేయ ప్రాంతము.

జలశ్వాస ప్రత్యుత్పత్తి ప్రాంతంలో అనేక ఆయత శ్రేణులలో (Longitudinal rows) మొప్పరంధ్రాలు ఉంటాయి. అవి పృష్ఠ మధ్యగట్టు (Middorsal ridge) కి ఇరుముక్కవ ఉంటాయి: జలశ్వాస జననప్రాంతము ఇరు పార్శ్వాలకు వ్యాపించి ఉంటుంది. వీటిని జనన పక్షాలు (Genital wings) అంటారు. అవి పృష్ఠ భాగానికి ముడతపడి మొప్పరంధ్రాలను కప్పి ఉంచుతాయి. బీజకోశాలు జనన పక్షాలలో ఉంటాయి. అవి బాహ్యోనికి వన్నని రంధ్రాలద్వారా తెరుచుకొంటాయి.

కాలేయ ప్రాంతంలో కాలేయ గోళికలు ఉంటాయి. పర కాలేయ ప్రాంతము కూమగా ఉంటుంది. పాయువు పరాంతాన ఉదర భాగంలో ఉంటాయి.

27.4 శరీర కుడ్యము


వెలుపలి స్తరములో శైలికాయుత ఉపకళా కణాలు ఉంటాయి. బహిష్టర కణాల మధ్య గ్రంథి కణాలు, జ్ఞాన నాడీకణాలు ఉంటాయి గ్రంథి కణాలు శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. ఇది శరీరాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది. ఉపకళాస్తరం క్రింద కండరస్తరం ఉంటుంది. వర్తులాకార కండర తంతువులు ఉపరితలంలోను, ఆయత కండర తంతువులు లోపలి తలంలోను ఉంటాయి. ఆయత కండరాల వలన శరీరంలో సంకోచాలు జరుగుతాయి. నాడీస్తరము బహిష్టరంలో అంతర్గతంగా ఉంటుంది (Intra epidermal). తరువాతి స్తరము ఆధారత్వచము (basement membrane) (పటం 27.2)

27.5 శరీర కుహరము

శరీర కుహరోపకళ లేదా ఆంత్రమోజిక వేష్టనము శరీరకుహరాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. శరీరకుహరంలో అయిదు విడి కుహరాలు (Cavities) లేదా భాగాలు ఉంటాయి. తుండములో తుండకుహరము ఉంటుంది. ఇది అద్వంద్వంగా (Unpaired) ఉంటుంది. రక్తనాళికా గుచ్చము (Glomerules), అస్య అంధభాహువు (Buccal diverticulum) పృష్ఠకోటరము (Dorsal sinus) తుండకుహరములోని చొచ్చుకొని ఉంటాయి.


తుండకుహరము తుండ రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొంటుంది. కాలర్ లో ఒక జత శరీర కుహరభాగాలు ఉంటాయి. ఇవి అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రాంతాలలో వాకడానిలో వాకటి కలుసుకుంటాయి. అవి

ఒక జత కాలర్ రంధ్రాల ద్వారా బాహ్యునికి తెరుచుకుంటాయి. మొండెములోకూడా ఒక జత శరీర కుహరాలు ఉంటాయి. ఇవి వాకడానితో వాకటి కలిసి ఉంటాయి. తుండము, కాలర్ (శరీర) కుహరాలలో సముద్రపు నీరు ఉంటుంది. మొండెము కుహరాలు వెలుపలికి తెరుచుకోవు. శరీరకుహర కణాలున్న శరీరకుహరద్రవము పీటిలో ఉంటుంది. (పటము 29.3)



పటం 27.2 బెల్ నోగ్లాసన్ అడ్డుకోత (జలశ్వాస స్రావం ద్వారా) 1. పుష్ట నాడి 2. పుష్టనాళము 3. బీజకోశాలు 4. జలశ్వాస రంధ్రము 5. జనన పక్షము 6. టంగ్ బార్ 7. ఆయత కండరాలు 8. బహిష్కరణము 9. ఉదర నాళము 10. ఉదర నాడి 11. అపోర వాహిక 12. మొండెములోని శరీర కుహరము 13. గ్రనవి.

27.6 అస్థిపంజరం



పటం 27.3 బెల్ నోగ్లాసన్ (మధ్యాయత కోత) 1. నాడి పక్షము 2. తుండ కుహరము 3. రక్తనాళికా గుచ్ఛము (గ్లోమెరూలస్) 4. హృదయము 5. హృదయావరణము 6. స్ట్రోమోకార్డ్ 7. తుండ అస్థి పంజరము 8. తుండ

రంధ్రము 9. కాలర్ కుహరము 10. కాలర్ మొండెమునకు మధ్యనున్న విభాజకము 11. ఉదర నాడీ దండము 12. నోరు 13. అస్య కుహరము 14. ఆహార కుహరము 15. మొప్ప చీలికలు 16. పుష్ట నాడీ తంతువు 17. పుష్ట రక్తనాళము 18. నాడీ దండము 19. కాలర్లోని ఆయత కండరాలు.

1. తుండ అస్థిపంజరము 2. అస్య అంధబాహువు 3. జలశ్వాస అస్థిపంజరము లేదా మొప్పదండాలు 4. పుచ్చరజ్జువు. ఇవి బెల్వోగ్లాసన్లో ఉన్న అస్థిపంజర నిర్మాణాలు.

తుండ అస్థిపంజరము : ఇది ఫలకమునంటి నిర్మాణం. ఇది తుండవృంతంలో ఉంటుంది. దానికి కవచం (Shield) ఆకారంలో ఉన్న ఫలకము, రెండు శృంగాలు (Horns) లేదా భుజాలు, ఫలకం ఉదర మధ్య భాగంలో ఒక ద్రోణి (Keel) ఉంటాయి.

అస్య అంధ బాహువు (Buccal diverticulum): ఇది అస్యకుహరపు కప్పు భాగంలో ఉంటుంది. ఇది బోలుగా ఉండే చిన్న నాళం వంటి నిర్మాణం. ఇది ముందుకి అనగా తుండములోకి వ్యాపిస్తుంది. బెల్వోగ్లాసన్ అనే శాస్త్రవేత్త దీనిని పుష్టపంశంగా పరిగణించినాడు. కొందరు దీనిని స్టోమోకార్డ్ అని వర్ణించినారు. హైమన్, మరికొందరు శాస్త్రవేత్తలు దీనిని అస్యఅంధబాహువు అనాలని అభిప్రాయపడినారు.

జలశ్వాస అస్థిపంజరము లేదా మొప్ప దండాలు : ప్రాథమిక, ద్వితీయ గిల్బార్ట్‌కి మొప్పదండాలు ఊతని లేదా ఆధారాన్నిస్తాయి. పుచ్చరజ్జువు (Pygocord): ఇది పరకాలేయ ప్రాంతపు కుడ్యంలో ఉదరభాగాన ఉంటుంది. ఇది పుచ్చ ప్రాంతానికి ఆధారాన్నిస్తుంది.

కండరాలు (Musculature): నుసుపు కండరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తుండములో కొన్ని వర్తులాకార, బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఆయతకండరాలు ఉంటాయి. కాలరెట్లో కండరాలు బాగా అభివృద్ధిచెంది ఉంటాయి. కాలర్లో కండరాలు అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. మొండెములోని కండరాలు సమావ్యంగా ఉంటాయి.

27.7 జీర్ణ వ్యవస్థ

జీర్ణనాళము తిన్నగా (Straight) వెడల్పుగా ఉంటుంది. నోరు ఉదరభాగంలో తుండ వృంతానికి కాలరెట్‌కి మధ్యగా ఉంటుంది. అది ఎల్లప్పుడూ తెరుచుకొనే ఉంటుంది. తుండము శైలికలు నిరంతరం కొట్టుకొనటం వలన ఆహార పదార్థం నోటిలోకి చేరుకొంటుంది. జీర్ణనాళంలో సామాన్యమైన శైలికాయుత ఉపకళ ఉంటుంది. కండరాలు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందలేదు. జీర్ణ వ్యవస్థను నాలుగు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 1. అస్యనాళము 2. గ్రసవి 3. ఆహారవాహిక 4. పేగు.

అస్యనాళము కాలర్, మొండెము విభాజకంలాగా వ్యాపించిఉంటుంది. అస్యకుహరం కప్పులో అస్యఅంధబాహువు (Buccal diverticulum) గ్రసవి పుష్టభాగం శ్వాసభాగంగాను, ఉదర భాగం జీర్ణభాగంగాను విభజింపబడి ఉంటుంది. శ్వాసభాగంలో మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. జీర్ణభాగం ఆహారనాళంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రెండు భాగాలను పార్శ్వకుంచనము వేరుపరుస్తుంది. ఒక జత ఉపజలశ్వాస కటకాలు (Parabranchial ridges) గ్రసవి గర్భారంలోకి చొచ్చుకొని వస్తాయి. గ్రసవి వెనుకగా ఆహార వాహిక ఉంటుంది. అది విశాలమైన గర్భారంలో ఉంటుంది. గ్రసవిలోని పార్శ్వవిభాజకము ఆహారవాహికలో కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల దీనిని పరజలశ్వాస ప్రాంతంగా పరిగణిస్తారు. ఆహారవాహిక


పేగులోకి తెరుచుకొంటుంది. కాలేయ అంధవాళాలు లేదా కాలేయ గోణికలు కాలేయ ప్రాంతం లోని పృష్ఠకుడ్యంలో ఉంటాయి. కాలేయ ప్రాంతంను తరువాత పరకాలేయ ప్రాంతము లేదా పేగు ప్రాంతము ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతములో పుచ్చరజ్జువు (Pygochord) అనే అస్థిపంజర నిర్మాణం ఉంటుంది. పరకాలేయ ప్రాంతము పాయువు లోకి తెరుచుకొంటుంది. పాయువు బాహ్యోనికి తెరుచుకొంటుంది. పాయువు దగ్గర సంవరణి (sphincter) ఉంటుంది.

ఆహారము, ఆహారపుటలవాట్లు : బెలనోగ్లాసన్ వానపామువలె ఆహారాన్ని గ్రహిస్తుంది. పేంద్రియ (Organic) ఆహారపదార్థాలు మట్టితో కలిపి నోటిద్వారా లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఆహారగ్రహణము శ్లేష్మ - శైలికారకానికి చెందినది. ఆహార రేణువులు, ఇసుకరేణువులు, శ్లేష్మరజ్జువులలో చిక్కుపడతాయి. తుండము శ్లేష్మాన్ని ప్రవిస్తుంది. ఆహార రేణువుతో కూడిన శ్లేష్మరజ్జువు నోటిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆహార రేణువులను వేరుగా గ్రహించటం కూడా పరిశీలించినారు.


జీర్ణక్రియ : పూర్తి ఆహార వాళం శైలికాయుతమైనది. శైలికల కదిలికల పలన ఆహారము ముందుకు ప్రయాణిస్తుంది. శ్లేష్మంలో ఎమైలేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది కార్బోహైడ్రేట్లను (పిండి పదార్థాలను) జీర్ణిస్తుంది. కాలేయాంధవాళాలు ప్రాచాలలో ఎమైలేస్, ప్రోటీయేస్, లైపేస్ ఉంటాయి. ఇవి పరుషగా కార్బోహైడ్రేట్లను ప్రోటీన్లను, క్రొవ్యులను జీర్ణిస్తాయి. మలపదార్థము వానపాము మలపదార్థంవలె ఉండలరూపం (Castings) లో ఉంటుంది.

27.8 శ్వాసవ్యవస్థ

శ్వాస పరికరంలో రెండు విలువు (Longitudinal) వరసలలో మొప్ప కోష్ఠకాలు లేదా మొప్ప గోణులు ఉంటాయి. ఇవి గ్రహి పృష్ఠప్రాంతంలో ఉంటాయి. మొప్ప గోణిలో 'U' అకారంలో ఉండే మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. మొప్ప చీలికల అంగాలు పృష్ఠభాగంలో ఉంటాయి. 'U' అకారంలో ఉండే మొప్పచీలిక రెండు భుజాల మధ్య భాగాన్ని బంగ్ బార్ అంటారు. ఇది శరీరకుహర భాగమే. గిల్ బార్ లకి, మొప్ప విభాజకాలకి (Gillsepta) మొప్పదండము (Gillrods) అస్థి పంజరం వలె ఉపయోగపడి ఆధారాన్నిస్తాయి. ప్రతి మొప్పదండము U అకారంలో కొప్పు పిన్నువలె ఉంటుంది. దీని ఒక భుజము విభాజకంలోను మరొక భుజము బంగ్ బార్ లోను ఉంటాయి. ప్రతి విభాజకమునకు ప్రతి బంగ్ బార్ కి ఊతనోచ్చే రెండు భుజములు



పటం 27.4 బెలనోగ్లాసన్ - మొప్పచీలికలతో ఉన్న గ్రహి కుడ్యంలోని ఒక భాగం 1. మొప్ప రంధ్రము 2. మొప్పగోణి 3. మొప్ప విభాజకము 4. బంగ్ బార్ 5. మొప్ప చీలిక 6. అస్థిపంజర దండము.



పటం 27.5 బెల్నోగ్లాస్-జలశ్వాస పరికరానికి రక్తము పరఫరా 1. పుష్కరక్తనాళము 2. అపవాహి జలశ్వాస నాళము 3. మొప్ప చీలిక 4. టంగ్ బార్ 5. మొప్ప విభజకము 6. ఉదర రక్తనాళము 7. అభివాహి జలశ్వాస నాళము.

లేదా బాహువులు ఒకే మొప్పదండానికి చెందినవికావు. ఒక బాహువు వొక దండానికి చెంది వుంటే మరొక బాహువు పక్కనే ఉన్న మరొక మొప్పదండానికి చెంది ఉంటుంది. విభజకాలలో ఉన్న బాహువులు ఒక దానితో ఒకటి ఐక్యమయివుండి పరభాగంలో మూత్రం విడిపోతాయి. అందువల్ల అవి ఫోర్క్స్ మాదిరిగా ఉంటాయి. జలశ్వాసగోళి మొప్ప రంధ్రముద్వారా బాహ్యోనికి తెరుచుకొంటుంది. ఇది గుండ్రంగా గాని అందాకారంలో గాని ఉంటుంది. మొప్పచీలికలలోను టంగ్ బార్ లలోను, విభజకాలలోను పొడవైన శైలికలున్న కణాలు, గ్రంథికణాలు ఉంటాయి. శైలికలు విరంతర ప్రవాహాన్ని ప్రచలితం చేస్తాయి. ఈ జలప్రవాహం నోరు, గ్రహవి, మొప్ప చీలికలు మొప్పకోష్ఠాల ద్వారా ప్రవహించి మొప్పరంధ్రాల ద్వారా వెలుపలికి వెళ్ళిపోతుంది. టంగ్ బార్ లలో కేశనాళికాజాలకము ఉంటుంది. జలశ్వాస పరికరంలో నాయుమూర్చిడి జరుగుతుంది (పటం. 27.4).

27.9 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ

బెల్నోగ్లాస్ లో అబంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందినది. ఈ వ్యవస్థలో లయబద్ధంగా పంకోచించే పుష్కకోటరము లేదా హృదయంము "నిర్దిష్టమయిన రక్తనాళాలు, లిక్విడ్లు అవకాశాలు ఉంటాయి. పుష్కకోటరాన్ని ఆవరించి హృదయావరణ త్వచము ఉంటుంది. హృదయావరణత్వచాన్ని హృదయగోళి అని హృదయాశయముని అంటారు. హృదయగోళి ఉదరకుడ్యంలో కండర తంతువులు ఉంటాయి. అది లయబద్ధంగా పంకోచిస్తుంది. పుష్కకోటరం పూర్వారంతం నుంచి అనేక అభివాహిరక్త నాళాలు ఉద్భవిస్తాయి. అవి రక్తనాళికా గుచ్ఛాన్ని (తుండగ్రంథి)ని ఏర్పరుస్తాయి.

శరీరంలోని వివిధ భాగాలనుంచి రక్తము పుష్కకోటరంలోకి చేరుతుంది. అది రక్తాన్ని రక్తనాళికా గుచ్ఛంలోకి పంపిస్తుంది. అక్కడనుంచి రక్తము ఒక జత అభివాహి రక్తనాళాలు లేదా పూర్వరక్త నాళాల్లోకి, ఒక జత పరరక్త నాళాలు లేదా అపవాహి రక్తనాళాల్లోకి పోతుంది. అభివాహి రక్తనాళాలు రెండింటిలోను ఒకటి పుష్కమధ్య తుండధమని గాను, రెండవది ఉదరమధ్య తుండధమని గాను తుండములోకి ప్రయాణిస్తాయి. వీటి అభి వాహి రక్తనాళికా గుచ్ఛ ధమనులని (Afferent glomerulus arteries) అంటారు. రక్తనాళికా గుచ్ఛము పరాంతము నుంచి ఇరు ప్రక్కల చెరోక అపవాహి నాళాము బయలుదేరుతుంది. ఈ రెండు అపవాహి నాళాన్ని మట్టిన తరువాత ఒకదానితో ఒకటి ఐక్యమైపోతాయి. వాటిని (Peribuccal vessels) అంటారు. రెండూ

కలిసి పోయిన తరువాత ఆ నాళాన్ని ఉదర ఆయత రక్తనాళము (Ventral longitudinal vessel) అంటారు. ఉదర నాళము ఒక పన్నవి కాలర్ నాళాన్ని ఇస్తుంది. ఇది కాలర్ కి రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. ఉదర నాళము కాలర్-మొందెము విభజకం దగ్గర ఒక వలయాన్ని (Ring vessel) ఇస్తుంది. ఈ నాళం నుంచి రెండు ప్లక్షాలు లేదా జాలకాలు ఉద్భవిస్తాయి. ఒకటి శరీర కుడ్యంలో ఏర్పడుతుంది. మరొకటి అస్యనాళంలో ఏర్పడుతుంది. ఉదర నాళం పరాంతంలో పాయువు దాకా ప్రయాణిస్తుంది. మార్గమధ్యంలో ఆహార వాహికకు, జలశ్వాస పరికరానికి, శరీర కుడ్యానికి రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. లిక్విడుల జాలకము లేదా ప్లక్షము ద్వారా రక్తము సరఫరా అవుతుంది.

ప్రతి మొప్ప విభజకంలోను ఉదర నాళం అభివాహికానాళాన్నిస్తుంది. అది రెండుగా చీలి టంగ్ బార్ లో ప్లక్షాలవిస్తుంది. అపవాహనాళము ప్రతి టంగ్ బార్ నుంచి రక్తాన్ని సేకరిస్తుంది. ఇవి రక్తాన్ని పృష్ఠ రక్తనాళంలోకి చేరవేస్తాయి (పటం 29.5)

పృష్ఠ రక్తనాళము పాయువు నుంచి బయలుదేరి పూర్వభాగానికి ప్రయాణిస్తుంది. మార్గమధ్యంలో జీర్ణనాళము నుంచి, కాశేయాంధనాళాల నుంచి, శరీరకుడ్యంనుంచి, జలస్వాస పరికరం నుంచి రక్తాన్ని గ్రహిస్తుంది. పేగు కుడ్యంలో ఇది రక్తప్లక్షాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అది ఒక జత పార్శ్వతుండ సిరలను గ్రహిస్తుంది. ఈ సిరలు తుండానికి ఇరుప్రక్కలా ఉంటాయి. పృష్ఠనాళము పృష్ఠకోటరం లోకి తెరుచుకొంటుంది.

పృష్ఠ ఉదరనాళానికి అంతర్వేష్టంగా ఎండోథీలియమ్ ఉంటుంది. అందువలన అవి నిజమైన రక్తనాళాలు. రక్తము ఉదర రక్తనాళంలో పూర్వార్వం నుంచి పరాంతానికి, పృష్ఠరక్తనాళంలో పరాంతం నుంచి పూర్వార్వంలానికి ప్రయాణిస్తుంది. ఇది అకశేరుక లక్షణం. రక్తము వర్ణరహితంగాను, కొన్ని శ్రేణికణాంతోను ఉంటుంది.

27.10 విసర్జక వ్యవస్థ

తుండగ్రంథి లేక రక్తనాళిక గుచ్చము విసర్జకాంగముగా పరిగణించబడుతుంది. దీనినుంచి విసర్జక పదార్థాలు తుండకుహరంలోకి నెట్టి వేయబడుతాయి. ఇక్కడనుంచి తుండ రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి పోతాయి.

27.11 నాడీ వ్యవస్థ

నాడీ వ్యవస్థ ప్రాథమిక రకానికి చెందినది. నాడీ ప్లక్షము బహిష్టచం (Epidermis) లో నెలకొని ఉంటుంది. మొందెము పృష్ఠ మధ్య ఉదర మధ్యరేఖలలో మందబారి వుంటుంది. వీటి పృష్ఠ, ఉదర నాడీదండాలంటారు. ఈ దండాలను కలుపుతూ మరొకవలయ నాడీదండం ఉంటుంది. ఇది కాలర్, మొందెము పరిహద్దులో ఉంటుంది. పృష్ఠ నాడీదండము కాలర్ లోకి న్యాపించి ఉంటుంది. ఇక్కడ అది విశాలమై కాలర్, కార్డ్ లేదా నాడీదండమును ఏర్పరుస్తుంది. దీని లోపల ఒక కుహరం ఏర్పడి ఉంటుంది. దీనిని నాడీ కేంద్రముగా భావిస్తున్నారు. సకశేరుకాలలో వలెనే ఈ జీవిలో కూడా పృష్ఠ, బహిష్టచనాడీ వ్యవస్థ ఉంది. కాని ఇది శరీర పాడగునా వ్యాపించి ఉంటుంది.

27.11.1 జ్ఞానాంగాలు

ఈ జీవిలో నిర్దిష్టమైన జ్ఞానాంగాలు ఉండవు. శరీర కుడ్యంలోని బహిష్టంలో కొన్ని జ్ఞాన నాడీకణాలు


ఉన్నాయి. తుండము ఆధారం దగ్గర ఉదరభాగంలో 'U' ఆకారంలో ఉన్న ఒక గుండ వంటి చిన్నబోతు ప్రాంతము ఉంటుంది. దీనిని ముఖ పూర్వ శైలికాలింగము (Preoral ciliary organ) అంటారు. దీనిని రసాయన గ్రాహకాంగముగా పరిగణిస్తున్నారు.

27.12 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

లింగ విభేదనము ఉంది. బీజకోశాలు (ముష్కాలు అయినా, అండాలు అయినా) సామాన్యంగానైనా లేదా శోభోపశాఖలైన గోణులవలెనైనా ఉండే నిర్మాణాలు. జలశ్వాస జనన ప్రాంతంలో పృష్ఠ పార్శ్వభాగంలో రెండు శ్రేణులలో అమరి ఉంటాయి. ప్రతి బీజకోశానికి ఒక వన్నని వాహిక ఉంటుంది. ఇది జనన రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొంటుంది. పరిపక్వమయిన (Mature) అండాలు, శుక్రకణాలు సముద్రము నీటిలోకి విడుదల అవుతాయి. బాహ్య ఫలదీకరణ జరుగుతుంది.

27.13 అభివృద్ధి

అభివృద్ధి అప్రత్యక్షంగా జరుగుతుంది. దీని డింభకము టార్పేరియా, పూర్ణభంజిత విదళనము జరుగుతుంది. దాదాపు పసుంగా ఉంటుంది. విదళనము ఫలితంగా ఏకస్తర సీల్ బ్లాస్టులా ఏర్పడుతుంది. తరువాత ద్విస్తరిత గ్లాస్టులా (ద్వితీయ పిండాభివృద్ధి దశ) ఏర్పడుతుంది. త్వరలో బ్లాస్టోపోర్ మూసుకుంటుంది. ఆది అంత్రకుహరము (Archenteron) పూర్వ ప్రోటోసీల్ గాను పరి అహార వాళంగాని విభేదన చెందింది. వారు,



పటం 27.6 బెల్వోగ్లాసన్-టార్పేరియా డింభకము (ప్రప్రదృశ్యము) 1. శైలికాలింగము 2. నేత్రము 3. శైలికామయపట్టీ 4. తుండకుహరము 5. తుండరంధ్రము 6. జీర్ణాశయము 7. శైలికాయుతమయిన పరభాగపు పట్టీ 8. పేగు 9. పాయువు 10. హృదయ ఆశయము (Heart vesicle)

సాయువు అంతర్వలనాలుగా ఏర్పడుతాయి. సాయువు బ్లాష్టోసోర్ వద్ద ఏర్పడుతుంది. ఆవ్య అంధబాహువు ఏర్పడుతుంది. పిండము లార్వేరియా దీంభకముగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది 5 మి.మీ పొడవుతో ఉంటుంది. ఇది శైలికాయుతమై ఉండి స్వేచ్ఛగా ఈద గలుగుతుంది. దీంభకము పూర్వంతం దగ్గర బహిష్టవ నిర్మితమయిన అగ్రఫలకం ఏర్పడుతుంది. నిడుపైన శైలికలు ఈ ఫలకంలో అగ్ర గుచ్చంగా ఏర్పడుతాయి. వెంటనే శైలికల అగ్ర గుచ్చము మాయమవుతుంది. పన్నవి శైలికల పట్టి యేర్పడుతుంది. ఎక్సెన్డర్మోటా వర్గానికి చెందిన ఆప్టిరియాన్ దీంభకము అయిన టైపిస్టేరియా దీంభకము కూడా ఇదే విధంగా శైలికల పట్టి ఏర్పడుతుంది.

లార్వేరియా దీంభకము అండాకారంలో ఉండే పొర దర్శకమయిన నిర్మాణం. దీనికి రెండు శైలిక పట్టీలు ఉంటాయి. పూర్వంతంలో ఉండే పట్టిని పరివృత ముఖపట్టి (Circumoral band) అంటారు. ఇది ఆహార సేకరణకు ఉపయోగపడుతుంది. దానికి కురచవైన శైలికలు ఉంటాయి. సరాంతపట్టిని టీల్-ట్రాక్ అంటారు. ఇది గమనాంగముగా ఉపయోగపడుతుంది. దానికి పొడవైన శైలికలు ఉంటాయి. అగ్ర ఫలకం మీద కురచ శైలికల గుచ్చము కొత్తగా ఏర్పడుతుంది. దీనిని శైలికాంగము అంటారు. శైలికాంగము ఆధారము దగ్గర ఒక జత కంటి చుక్కలు ఉంటాయి. ఉదర భాగంలో నోరు ఏర్పడుతుంది. సామాన్యంగా ఉండే జీర్ణాశయ ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయము, పేగు, సాయువుగా విభేదనం చెందుతుంది. శరీర కుసారాల హార్డికాశయము, ఇతర అంతరంగాలు యేర్పడుతాయి (పటము 27.6)

27.13.1 రూపవిక్రియ

రూపవిక్రియ జరిగేటప్పుడు దీంభకము పలుచని చర్మము మందబారుతుంది. దీంభకము పరిమాణము తగ్గుతుంది. శైలికల పట్టీలు, జ్ఞానసంబంధమయిన శైలికాగుచ్చము, కంటిచుక్కలు, అగ్రఫలకము అవ్వ మాయమవుతాయి. దీంభకములో కుంచనము యేర్పడుతుంది. ఫలితంగా తుండము మిగతాశరీరం నుంచి విభేదనం చెందుతుంది. త్వరలోనే మరొక కుంచం యేర్పడుతుంది. ఇప్పుడు కాలర్, మొండెము యేర్పడుతాయి. మొండెము పొడగుగా సాగుతుంది. జలశ్వాస జనన ప్రాంతంలో మొప్పదండాలు, బీజకోశాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. లార్వేరియా దీంభకము పూర్తిగా రూపవిక్రియ చెంది ప్రాథజీవిగా యేర్పడుతుంది.

27.14 స్వపరిశీలన

1. ద్యుటెరోస్టోమ్ జంతు శరీరం _____, _____, _____, నే మూడు ప్రాంతాలుగా విభక్తమవుతుంది. ప్రతి ప్రాంతంలోపల శరీరకుహరం ఉంటుంది.
2. హెమికార్డేట్ తొలి పిండోత్పత్తి దశ కోటవచ్చినట్లుగా _____ జీవులను నోలి ఉంటుంది.

27.15 సారాంశం

1. బెల్వోగ్లాసన్ నానసామువలె వుండే బోరియా నాసి.
2. శరీరము తుండము (Proboscis) కాలర్, మొండెము అనే మూడు భాగాలుగా విభజింపబడింది.

3. శరీరకుడ్యము ఉప కణాకణాలతో (Epithelial) నిర్మితమైంది. గ్రంథి కణాలు శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. ఈ శ్లేష్మము బొరియని గట్టిపరచటానికి సీమెంటువలె ఉపయోగపడుతుంది.
4. శరీరకుహరంలో (Coelom) అయిదు విడివిడి కుహరాలు ఉంటాయి. సీలోమిక్ ద్రవంలో అమీబారూపంలో ఉండే సీలోమోసైట్లు ఉంటాయి.
5. తుండములోని అస్థిపంజరము, ఆన్యఅంధబాహువు (Bucca diverticulum), జలశ్వాస అంతరస్థిపంజరము (Bracchial skeleton), మొప్ప దండాలు (Gel bars) పుచ్చరణపు (pygochord) మొదలైనవి అంతరస్థిపంజర నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి.
6. వర్తులాకార, ఆయత కండరాలు ఉంటాయి.
7. అహారము శ్లేష్మ — శైలికాయుత (Muco-ciliary method) పద్ధతిలో గ్రహించబడుతుంది.
8. జలశ్వాస పరికరములో 'U' ఆకారముకల మొప్పచీలికలు ఉంటాయి. మొప్పచీలికలలోని శైలికలు నిరంతర జలప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
9. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అబంధిత రకానికి (Open type) చెందినది. ఈ వ్యవస్థలో పృష్ఠకోటరము (Dorsal sinus) లేదా హృదయము (Heart), నిర్దిష్టమైన రక్తనాళాలు, లిక్విరుల అవకాశాలు ఉంటాయి.
10. తుండగ్రంథి (Proboscis gland) లేదా రక్తనాళికా గుచ్ఛము (Glomerulus) వినర్జకాంగముగా పరగణించబడుతోంది.
11. నాడీ వ్యవస్థ స్లక్షము రూపంలో ఉంటుంది. ఇది బహిష్కరములో వెలకొని ఉంటుంది.
12. ఔలినోగ్లాసెస్లో నిర్దిష్టమైన జ్ఞానాంగాలు ఉండవు.
13. లింగవిభేదనం ఉంది. జలశ్వాస ప్రత్యుత్పత్తి ప్రాంతం (Branchiogenital region) లో బీజకోశాలు ఉంటాయి. ఇవి సామాన్యంగా ఉంటాయి.
14. అభివృద్ధి అప్రత్యక్షం (Indirect) గా జరుగుతుంది. దీని డింభకము టార్పేరియా.

27.16 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. ప్రోటోసోవా, మిసోసోవా, మెటాసోవా
2. ఇకైనోడర్మెటా.

27.17 నమూనా ప్రశ్నలు

I ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. ఔలినోగ్లాసెస్ బాహ్యలక్షణాలను వ్రాయుము.
2. టంగ్‌వర్మ్ (ఔలినోగ్లాసెస్) జీర్ణవ్యవస్థను విపులీకరించుము.
3. ఔలినోగ్లాసెస్ శ్వాస వ్యవస్థ గురించి వ్రాయుము.

II ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. ఔలినోగ్లాసెస్ ఆవాసము అలవాట్లు
2. అంతరస్థి పంజరము.
3. అహార సేకరణ
4. టార్పేరియా డింభకము.

భాగము — 28 ఉపవర్గము యూరోకార్డేటా సామాన్య లక్షణాలు, వర్గీకరణ

విషయక్రమము

- 28.1 ఉద్దేశ్యము
- 28.2 ఉపోద్ఘాతం
- 28.3 సామాన్య లక్షణములు
- 28.4 వర్గీకరణ
 - 28.4.1 విభాగం ఆసీడియస్
 - 28.4.2 విభాగం థాలియస్
 - 28.4.3 విభాగం ఆస్పెండిక్యులేరియా
- 28.5 స్వపరిశీలనం
- 28.6 సారాంశం
- 28.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 28.8 నమూనా ప్రశ్నలు

28.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ సాతమునందు దీర్ఘక దశలో పృష్ఠవంశము కలిగి ఉండే విచిత్రజీవుల సామాన్య లక్షణాలను వివరించి, వీరి వర్గీకరణ మరియు ఇంతు సామ్రాజ్యమునందు వీరి స్థానమును చర్చించబడింది. మౌలికంగా కార్డేటా లక్షణములతో ఉండే ఈ ఇంతు సమూహం దీర్ఘక దశలో చలనయుతంగా ఉంటూ ప్రాథమిక ప్రాప్తిచగానే చలన రహితం స్థానబద్ధం అయిపోతాయి. ఈ అధ్యయనం చివర్లో ఈ విషయాలను నీవు సమర్థవంతముగా బోధించగలుగుతావు.

28.2 ఉపోద్ఘాతం

యూరోకార్డేటాకు (యూరో: తోక; కార్డా: పృష్ఠ వంశము) చెందిన జీవులందు పృష్ఠవంశము తోక భాగము ఉండును. ఇందు వలన వీరిని యూరోకార్డేటా అని వ్యవహరిస్తారు. వీరికి పీప్లస్టోమ్ అను సామాన్య నామము కలదు. కార్డేటా లక్షణాలన్నీ దీర్ఘక దశయందు మాత్రమే గోచరించును. రూప విక్రీయ కాలమున కార్డేటా లక్షణాలు నశించిపోవును.

యూరోకార్డేటాలను ట్యూనికేట్లని (టూనికా = తోపలి రుస్తు) సైతము వ్యవహరిస్తారు. దేహము గుల్ల లేక కంచుకముతో కప్పి ఉండుటవలన వీరికి ఆసీడియన్స్ (Ascidians) అను పేరు ఏర్పడినది (ఆస్కొన్ తోలునంచి).

అరిస్టాటిల్ (384-322 క్రీ.పూ) మొదట సామాన్య ఆసీడియన్స్ ను వర్ణించినాడు. లామార్క్ (1816) గుల్ల 318 పరిక్షించి, వీరికి 'ట్యూనికేటా' అని నామకరణము చేసినాడు. కౌవాలెవ్స్కీ (Kowalevsky), రష్యన్

శాస్త్రజ్ఞుడు వీని దీంభకాలము వివరంగా పరిశీలించి వీనిని విజయైన కార్డేటులతో చేర్చినాడు. హార్డ్ మాన్, జేట్ సన్, గార్బాంగ్, బెరిల్ మరియు దాన్ మొదలగు వారి పరిశోధనలు యూరోకార్డేటుల గురించి విలువైన సమాచారము అందచేసినవి.

28.3 సామాన్య లక్షణములు

1. ఇవి సముద్రజీవులు. ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చెందియున్నవి.
2. వీనియందు ఏకాంత జీవులు, సహానివేశ జీవులు చెరియున్నవి.
3. దీంభక జీవియైన చిరుకప్ప ఈదుచు స్వతంత్ర జీవితాన్ని గడుపును. ప్రాథ జీవి చైతన్య ర తమైన స్థానబద్ధ జీవి. ఏదేని ఆధారతలమును అంటిపెట్టుకొని గడుపును.
4. దేహము వివిధ రకాల వర్ణములతో పారదర్శకముగా, పాక్షిక పారదర్శకముగ లేదా కాంతి విరోధకముగ ఉండును.
5. దేహ పరిమాణము, ఆకారము వివిధ జాతులందు వివిధ రకాలుగ ఉంటుంది.
6. దేహము ట్యూనిసిన్ తో యేర్పడిన గుల్లలేదా కంచుకముతో ఆవరించి ఉంటుంది.
7. ఈ జీవియొక్క పూర్వభాగవ ఒక జలశ్వాస అంకుశవాలిక, పృష్ఠభాగవ ఒక యేట్రీయల్ అంకుశవాలిక ఉంటాయి.
8. వీరు జలశ్వాస రంధ్రము ద్వారా జలశ్వాస అంకుశ వాలికలోనికి ప్రవేశించి యేట్రీయల్ అంకుశవాలిక యొక్క రంధ్రము ద్వారా బయటకు వచ్చును.
9. విశాలముగా నున్న పరి జల శ్వాస లేక ఏట్రీయల్ కుహరమునందు అంతరాంగములు ఉంటాయి.
10. గ్రసని, ఆట్రీయల్ కుహర పెద్దభాగమును ఆక్రమించి ఉంటుంది. గ్రసనిలోని శ్వాస రంధ్రములు (Stigmata), ఏట్రీయల్ కుహరములోనికి తెరుచుకొంటాయి.
11. గ్రసనికి పృష్ఠమధ్యతలాన హైపర్ గ్రసని మడత లేదా పృష్ఠదళము, ఉదరతలాన ఎండోస్టెయిల్ ఉంటాయి.
12. ఆక్సిజన్ మరియు అవోర పదార్థాలు వీటి ద్వారా లోనికి ప్రవేశించి, మంము, మలిన పదార్థాలు, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు లైంగిక కణాలు వీటి ప్రవాహముతో బయటపడతాయి.
13. ఒక గొట్టపు ఆకార పృథ్వీయము, ఉదర భాగమునందుండును. ప్రసరణ వ్యవస్థ యందు రక్తకుహరాలు, రక్తనాళాలు ఉంటాయి. రక్తమునందు వివిధ రకాల కణములు కలవు. రక్తప్రవాహము నియమిత కాలములందు వెనుకకు తిరుగును. దీనివలన ఒకే రక్తనాళము కొంతకాలం ధమనివలె, కొంతకాలం పీరవలె వ్యవహరిస్తుంది. ఈ విధంగా శ్లేభరక్తము, మలిన రక్తము, ఏకాంతరంగ ప్రస రు ముందును.
14. అలైంగికోత్పత్తి కోరకీభవనము చేత, లైంగికోత్పత్తి స్త్రీ, పురుష బీజకోశాల ద్వారా జరుగుచుండును.
15. ఇందులో ఉభయలింగత్వము ఉంది. ఒకే జీవియందు ఆడ, మగ లైంగికాంగములు ఎదుగును. బీజకోశంలోని ప్రతి లంబికయందు రెండు రకముల బీజకణాలు ఉంటాయి.
16. వీనియందు పునరుత్పత్తి, ద్విరూపకత, బహురూపకత సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది.
17. పెరుగుదల అప్రత్యక్ష రకానికి చెందింది. దీంభకము చిరుకప్ప అంటారు. రూప విక్రియ కాలంలో కార్డేటు లక్షణాలు తిరోగామిత్వము చెందును. ఇట్టి చర్యను తిరోగమున రూప విక్రియ అంటారు.
18. వీనియందు నియోటిని లేదా శాబకజననము కూడ ఉండును.


28.4 వర్గీకరణ

యూరోకార్డేటా (ఓయూనికేటా) మూడు తరగతులుగా విభజించబడింది.

1) అసీడియేసీ (Ascidiae) 2) థాలిసీ (Thaliaceae) 3) అప్పెండిక్యులేరియా (Appendicularia)
(లార్వేసీ, Larvaceae)

28.4.1 అసీడియేసీ

1. ఇవి స్వంతరహితమైన స్థానబద్ధజీవులు.



పటం 28.1 కొన్ని యూరోకార్డేట్లు A. అసీడియా B. మాల్గూలా C. బోట్రీస్ సహనివేశము D. డోలోయోమ్
(సత్కుత్తుత్తి - Gonozoid) 1. జల శ్వాస రంధ్రము 2. స్పర్శకాలు 3. పృష్ఠ లఘువము (Dorsal tubercles)
4. నాడీ గ్రంథి 5. నాడీ పంథి 6. అవస్కరము 7. ఎట్రీయల్ రంధ్రము 8. పాయువు 9. జనన రంధ్రము 10.
బీజవా క 11. ఆహార వా క 12. జీర్ణాశయము 13. ఎట్రీయల్ కుహరము 14. కవచము (Test) 15.
ప్రావారము 16. అధారము 17. బీజకోశము 18. పేగు 19. ఎండోస్టైట్ 20. గ్రసవి 21. జలశ్వాస
అంకుశనాళిక 22. ఎట్రీయల్ అంకుశ నాళిక 23. కండర పట్టీకలు 24. పురీష వాళము 25. కాలేయ లంబిక
26. సహనివేశంలో ఒక జీవి జలశ్వాస రంధ్రము 27. ఐక్య (Common) ఆట్రీయల్ రంధ్రము 28. చెత్త
చెరారము 29. జీవకాలు 30. ఐక్య కవచము (Common test) 31. జలశ్వాస లంబికలు 32. పరిగ్రసవి పట్టీక
33. శ్వాస రంధ్రాలు 34. హృదయము 35. పూర్వ జలశ్వాస మండలము.

2. వీని పరిణామము అస్థిరమైనది, సముద్రమున జీవించు జంతువులు.
3. ట్యూనిస్కోత్ తయారైన గుల్లతో దేహము కప్పి ఉంటుంది. గుల్ల సందాయక కణజాల తంతువులు, కణాలు మరియు రక్తకణాలు కలిగి ఉంటుంది.
4. అన్నిటియందు పూర్వంతాన జల శ్వాస రంధ్రము, పృష్ఠతంతున ఎప్రియల్ రంధ్రము ఉంటుంది.
5. అసీడియన్లు ఏకాంతముగను, సహనివేశులుగను జీవిస్తాయి. సహనివేశమునందు జీవకాలు, వేరు వేరు గుల్లతో లేదా ఒకే సంయుక్త గుల్లతో ఉంటుంది.
6. ఎప్రియల్ లేదా పరిజల శ్వాస కుహరము బాగా ఎదిగి ఉంటుంది.
7. మొప్పరంధ్రాలు గ్రహనికుద్వముపై ఉంటాయి. రంధ్రకుద్వము దట్టముగ శైలికామయమైఉంటాయి.
8. పృష్ఠవంశము డింభకదశయందు మాత్రమే ఉంటుంది.
9. ఆంత్రము శిక్యముతమై ఉంటుంది.
10. నాడీవ్యవస్థ ఒక ఘనమైన నాడీపంథీవలె, కొన్ని నాడులు మాత్రమే కలిగిఉంటుంది.
11. హృదయము, నాలికాకారహృదయావరణముతో అవరించి ఉంటుంది.
12. అలైంగికోత్పత్తి కోరకీభవనము వలన జరుగును.
13. మొగ్గలు, జలశ్వాసకోశ బాహ్యవృద్ధివలన, ఆధార స్థిలోననుండి ఉత్పన్నమౌతాయి. ఈ తరగతి బీజకోశ స్థానాన్నిబట్టి రెండు క్రమాలుగ విభజింపబడింది.

క్రమము — i ఎంటెరోగోనా (Enterogona)

1. బీజకోశము ఒంటరిగా, అంత్రశిక్యమునందు అమర్చబడి ఉండును.
2. సాధారణముగ నాడీ గ్రంథి, నాడీపంథి ఉదరభాగాన ఉండును.
3. డింభకదశయందు, పరశనేత్రాలు (Ocelli) మరియు కర్లజ్ఞాన కణాలు (Otoliths) జ్ఞానాంగములు.

ఉ. అసీడియా, పియోనా (పటం 28.1.A).

క్రమము —ii ప్లూరోగోనా (Pleurogona)

1. ద్వంద్వ బీజకోశాలు, ఎప్రియల్ కుద్వమునందు ఇమిడిఉంటాయి.
2. నాడీ గ్రంథి, నాడీపంథికి పృష్ఠ లేక పార్శ్వతలాన ఉంటుంది.
3. డింభకము కర్లజ్ఞాన కణము మాత్రము కలిగి ఉంటుంది, పరశనేత్రాలు ఉండవు. చూషకాలు, సంనజనక సూక్ష్మరీకురాలు కలిగి ఉంటుంది.

ఉ. హెర్మూమావియా, మొల్గులా (Molgula), బోట్రిల్లిస్ (Botryllis) (పటం 28.1 B-C)

28.4.2 విభాగం థాలియేసి (Thaliaceae)

1. ఇవి స్వతంత్రముగా ఈదుచు బ్రతికే ట్యూనికేటులు, విశాలమైన విస్తరణ కలిగిఉన్న జీవులు.
2. ఇందులో కొన్ని సహనివేశులుగ, కొన్ని ఒంటరిగ జీవనము గడుపును.
3. ప్రాథ దశయందు పుచ్చియ ఉపాంతము ఉండదు.
4. గుల్ల స్వచ్ఛముగాను, పారదర్శకముగాను, స్థిరమైనదిగ ఉండును.
5. ఆకారము పీపావలె, పరిమాణము మార్థమికముగ ఉంటుంది.
6. దేహకుద్వములోని కండర తంతువులు, పూర్ణముగ లేక అసంపూర్ణముగ వలయాకారపట్టీలతో అమరి ఉంటాయి.
7. జలశ్వాస మరియు ఎప్రియల్ కుహరాలు దేహమునకు విరుద్ధ వివరలందు ఉంటాయి.

8. చిన్న చిన్న జలశ్వాస రంధ్రాలు పెక్కు ఉంటాయి. కొన్నింటిలో రెండు పెద్ద జల శ్వాస రంధ్రాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి ఎట్రయిల్ కుహరములోనికి, చివరకు వెలుపలికి తెరుచుకుంటాయి.
9. ప్రాథ జీవియందు పృష్ఠవంశము, వాడిదండము తోక ఉండవు.
10. ఇవి ఉభయలింగ జీవులు
11. పెరుగుదల ప్రత్యక్ష, అప్రత్యక్ష రెండు పద్ధతులలో జరుగును.
12. అసాధారణమైనట్టి తరముల యేకాంతరత వీనియందు కనబడును.
13. కొన్నింటిలో వలనము, దేహసరాంతమునుండి నీటిధార వెలుపలికి రావటం వలన జరుగును.

ఈ తరగతిని మూడు క్రమములుగా విభజించడమైనది.


క్రమము - (i) డొల్ఫోలిడా లేదా (పైక్లోమియేరియా)

1. ఇవి ఉష్ణ మరియు సమశీతోష్ణ సముద్రాలలో నివసిస్తాయి.
2. పీసాకారదేహము వీని ప్రత్యేక లక్షణము.
3. కండరపట్టీలు పూర్ణముగ ఉండును. అందువలన పైక్లోమియేరియా అను పేరు వచ్చినది.
4. దీంభకదళలో తోక ఉంటుంది.
5. ఉత్పాదక జీవకము లేదా యేకాంత లైంగికదళ, అండజ జీవకము లేదా పామదాయక అలైంగిక దళతో యేకాంతరత చెందును.

ఉ. డొల్ఫోలిఫ్ట (పటం 28.1D)

క్రమము (ii) పైరోసోమిడా

1. ఇవి సహనివేళ జీవులు. సహనివేళము ఒకబోలు స్తూపము వలెనుండును.
2. ఇవి కాంతియుతాలు.



పటం. 28.2 A. పైరోసోమా సహనివేళము. B. పైరోసోమా. ఏక అసీడియా జూలాయిడ్ (Single Ascidianzooid) 1. కిఫర్ కీలితము 2. జల శ్వాస రంధ్రము 3. స్వర్ణకాలు 4. కండర పట్టీలు 5. కవచము 6. దీప్తి అంగము (Luminiscent organ) 7. జలశ్వాస రంధ్రాలు 8. ఎండోస్టయిల్ 9. పేగు 10. హృదయము 11. కోరకము 12. వీజికోశము 13. ఎట్రయిల్ రంధ్రము 14. పాయువు 15. జీర్ణకయము 16. జలశ్వాస గోణి 17. పృష్ఠ దళము (Dorsal lamina) 18. పరిగ్రసన పట్టి 19. పృష్ఠ లతనము 20. వాడీ


3. సహనివేశమును చుట్టుకొని ఒక జత తవగుల్ల ఉంటుంది.
4. కండర పట్టీలు దేహానికి పరాంతవ అల్పసంఖ్యలో ఉంటాయి.
5. వీనియందు డింభకదళ ఉండదు.
6. ఫలదీకరణము, పెరుగుదల దేహము లోపల జరుగును.

ఉ. పైరోసోమా (పటం. 28.2 A.B)

(కమము - (iii) పాల్పిడా (హెమిమియేరియా)

1. దేహము పారదర్శకంగా, సెజిన్ ఆకారంతో ఉంటుంది.
2. నీటి ప్రవాహముతో ముందుకు త్రోయబడి, దేహ చలనము సంభవిస్తును.
3. వీనియందు ద్విరూపకత కలదు. ఒకటి యేకాంత అండజీవకము, రెండవది సామదాయక బ్లాస్టోజోవావిడ్. ఇవి రెండు ఒకదానితో రెండవది ఏకాంతరము చెందును.
4. అసంపూర్ణకండరపట్టీలు ఉండుటవలన వీనికి హెమిమియేరియా యని పేరు వచ్చినది.
5. పెద్దదైన మొప్ప చీలికల జత ఒకటి ఉంటుంది.
6. డింభకదళ ఉండదు, ప్రత్యక్ష పెరుగుదల జరుగును.

ఉ. సాల్పా (పటం 28.3 A)



పటం 28.3 A. సాల్పా జీవకము B. సహనివేశములో ఉన్న ఒయికోస్టెరా 1. జల శ్వాస రంధ్రము 2. జలశ్వాస కండరాలు 3. పుష్ట సంఘనము 4. నాడి సంధి 5. కండరపట్టీకలు 6. కవచము 7. కవచ కీలితాలు 8. స్ట్రానస్ 9. పేగు 10. హృదయము 11. పుష్ట దళము లేదా మొప్పము దండ 12. ఎండోస్టైట్ 13. స్రావరము 14. అంతర్యా కా రంధ్రము 15. జీవి 16. వడపోత పరికరము 17. బహిర్వాహికా రంధ్రము 18. అత్యవసర ద్వారము.

28.4.3 అప్పెండిక్యులేరియా (తార్వేసి)

1. ఇవి పారదర్శకముగ కనపడి, స్వతంత్రజీవనము గడిపే సముద్ర జీవులు.
2. గుల్ల (ఇల్లు) అనబడే కప్పు (Envelop) లో ఉంటుంది. కప్పడాన్ని పలుమార్లు మార్చుకుంటుంది.
3. ఇల్లు అనే విర్మాణము, రక్షణ, ప్లవనస్థితికి, శ్వాస మరియు ఆహారాన్ని వడపోయుట మొదలగు పనులందు తోడ్పడుతుంది.

4. పృష్ఠవంశము తోకభాగమునందు ఒక తొడుగుతో కప్పబడి ఉంటుంది.
5. ఏట్రీయం ఉండదు.
6. నాడీదండము, తోక చివర భాగము వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది.
7. ఇది ఉభయలింగజీవి.
8. డింభక దశలో లైంగికాంగములు పెరిగి ప్రత్యుత్పత్తి జరుపును. ఈ దృగ్విషయాన్ని వియోటిసి లేదా శాబకజననము (Paedogenesis) అంటారు. ఈ కారణంగా వీనికి లార్వేసీ (Larvaceae) అను నామము పొందబడింది.

ఉ. ఓయకోఫ్లూరా (పటం 28.3 B)

28.5 స్వపరిశీలనం

1. ఎపెండికులేరియా జంతువులు లార్వా దశలోనే ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతాయి. ఈ దృగ్విషయాన్ని _____ అంటారు.
2. కొన్ని బహురూపక భాలియసి జీవులు నాటి జీవిత చక్రంలో తరాల _____ మ ప్రదర్శిస్తాయి.

28.6 సారాంశం

1. దేహము, చర్మము గుల్లతో లేదా కంఠకతో పరివేష్టించి ఉంటుంది.
2. దేహములోనికి నీరు, జలశ్వాస అంకుశ నాలిక ద్వారా ప్రవేశించి ఏట్రీయం అంకుశ నాలికద్వారా బయటికి పోతుంది.
3. దేహములోని విశాలమైన ఏట్రీయల్ కుహరం నందు ఆంతరాంగాలు అమర్చి ఉంటాయి.
4. ఉదర తలనా, హృదయము ఒక గొట్టపు ఆకారముతో ఉంటుంది.
5. రక్తనాళాలలో రక్తము, నియమిత కాలంలో తిరిగి వెనుకకు ప్రవహించుట వీని ప్రత్యేక లక్షణము.
6. ఎండోస్టైయిల్ మరియు పృష్ఠదళము, గ్రసని భాగములో ఉంటాయి.
7. గ్రసని విశాలముగ పెక్కు మొప్ప వీలికలతో ఏదితమై ఉండును.
8. హెడ్ మానియూ యందు శైలికామయ ఆహార పేకరణ జరుగును.
9. ఇది స్థానబద్ధ జీవి. నీరు క్రమబద్ధముగ, అవిచ్ఛన్నముగ ప్రవహించుట అత్యవసరము.
10. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కోరికీభవనము ద్వారా జరుగును.
11. లైంగికోత్పత్తి, ప్రీ పురుష చీజకోశాల ద్వారా జరుగుతుంది.
12. వీని పెరుగుదల అప్రత్యక్షముగ జరుగును. డింభక దశను చిరుకప్ప అంటారు.
13. వీనియందు తెల్లగమన రూపవిక్రీయ జరుగుతుంది. జంతు సామ్రాజ్యమునందు ఇట్టి దృగ్విషయము మరెక్కడ కానరాదు.

28.7 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. శాబక జననం
2. ఏకాంతరత

28.8 సమూహ ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. యూరోకార్డేటాను ఉదాహరణముతో వర్గీకరించుము.
2. యూరోకార్డేటా సామాన్య లక్షణాలను పేర్కొనుము.

II. ఈ క్రింది వాటిని 10 వాక్యములలో జవాబులు వ్రాయండి.

1. అసిడియేషియా.
2. లార్వేసి.

BRAOU

భాగము - 29 హార్డ్ మేనియా

విషయక్రమము

29. 1 ఉద్దేశ్యము
29. 2 ఉపోద్ఘాతం
29. 3 బాహ్య లక్షణాలు
29. 4 శరీర కుద్యము
29. 5 శరీర కుహరము, ఏట్రీయమ్.
29. 6 జీర్ణవ్యవస్థ
29. 7 శ్వాస వ్యవస్థ
29. 8 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
29. 9 విసర్జక వ్యవస్థ
- 29.10 వాచీ వ్యవస్థ
- 29.10.1 జ్ఞానాంగాలు
- 29.11 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 29.12 స్వపరిశీలనం
- 29.13 పారాంశం
- 29.14 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 29.15 సమూహ ప్రశ్నలు

29.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠంలో హార్డ్ మేనియా గురించి విశదంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీని దశలో కార్డేటా లక్షణాలు ఉండి ప్రాథ జీవిగా మారగానే అకశేరుక లక్షణాలన్నీ పోవడం వంటి విచిత్ర విర్మాణం బాగా అవగాహన అవుతుంది.

దీని అంతంలో నీవు ఈ జీవి ప్రాథదశలో కార్డేటాలక్షణాన్నీ అదృశ్యమై పోవడానికి దాని స్థావరత్వ జీవనానికి సంబంధముందని అందువల్లనే దీని దశలో కార్డేటా మూల లక్షణాలన్నీ గోచరిస్తాయని సందేహరహితంగా వర్ణించగలుగుతావు.

29.2 ఉపోద్ఘాతం

హార్డ్ మేనియా పొల్లిడా ఏకాంత స్థానబద్ధమైన జీవనాన్ని గడిపే సరళమయిన అసిడియన్. దీనిని మోనో అసిడియన్ అంటారు. ఇది విశ్వవ్యాప్తజీవి.

వర్గీకరణము

వర్గము - కార్డేటా

ఉపవర్గము - యూరోకార్డేటా (ట్యూనికేటా)

విభాగము - అపీడియేసియే.

క్రమము - ప్లూరోగేనా

ప్రజాతి - హార్డ్ మేనియా

జాతి - పాల్లిడా

ఆవాసము, అలవాట్లు : పొలకీటాలు, గొస్త్రోపోడ్లు నివసించే చోట్ల హార్డ్ మేనియా నివసిస్తుంది. ఈ జీవి ఇసుకలో, బురదలో తను పొదము సహాయంతో కూరుకుపోయి ఉంటుంది. పొదము పెద్దదిగా శంకు ఆకారం లేదా అండాకారం ఉంటుంది. ఇది కవచము (Test)లోని భాగమే. ఈ జీవి గొస్త్రోపోడ్లలో సహభోజకత్వము (Commensal) జరుపుతుంది. హార్డ్ మేనియా గొస్త్రోపోడ్ని రక్షిస్తుంది. గొస్త్రోపోడ్ హార్డ్ మేనియా ను ఒక చోటి నుంచి ఒకచోటికి తీసుకొని వెళుతుంది.

29.3 బాహ్య లక్షణాలు


ఆకారము, పరిమాణము, రంగు : ఇది దాదాపు అండాకారంలో ఉంటుంది. 6-13 సెం.మీ పొడవులోను, 5 సెం.మీ. వెడల్పులోను ఉంటుంది. జీవించి ఉన్నప్పుడు లేత ఎరుపు రంగులోను (Pinkish), నిలవచేసినప్పుడు (Preservation) బూడిదరంగులోను లేదా మట్టి రంగులోను ఉంటుంది (పటం. 29.1)

కవచము : పూర్తి శరీరాన్ని కవచము (Test) లేదా ట్యూనిక్ (Tunic) కప్పి ఉంటుంది. ఇది చాలా పటిష్ఠమయిన రక్షణ కవచము. దీనిపై ఉపాంతము (Upper margine) లో రెండు రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఒక పూర్వ జలశ్వాస రంధ్రము, రెండవది పుష్ట ఏట్రీయ రంధ్రము.



పటం 29.1 హార్డ్ మేనియా పాల్లిడా 1. పెదవులు 2. ఏట్రీయ రంధ్రము 3. ఏట్రీ అంకుశ వాళిక 4. కవచము 5. పొదము 6. ఇసుక రేణువులు, ఇతర పదార్థాలు 7. జలశ్వాస అంకుశవాళిక 8. జలశ్వాసరంధ్రము.

ఈ రెండు రంధ్రాలు కురుచనైన వాళికవంటి జలశ్వాస, ఎట్రీయ అంకుశ వాళికల మీద ఉంటాయి. ప్రతి రంధ్రము దగ్గర నాలుగు పెదవులవంటి విద్యాణాలు ఉంటాయి. జలశ్వాస రంధ్రము పెద్దదిగా ఉండి వెలుపలికి (Out warss) తెరుచుకోగా, ఎట్రీయ రంధ్రము చిన్నదిగా ఉండి పైకి (Upwards) తెరుచుకొంటుంది. దీని కవచము మృదువుగా తోలువలె పాక్షికపారదర్శకంగా ఉంటుంది. దీనికి రక్తం పరఫరా హెచ్చుగా ఉంటుంది. రక్తనాళాల అంత్యాలు కవచము ఉపరితలంమీద రక్తకణశిలను ఏర్పరుస్తాయి. కవచము వెలుపలి తలం చాలా గరుకుగా ఉంటుంది. చిన్న ఇనుకరేణువులు కర్పరపు తువకలు కవచానికి ముఖ్యంగా పాదానికి అంటుకొని ఉంటాయి. ట్యూనిసిన్ అనే పదార్థంతో కవచం నిర్మితమవుతుంది.



పటం 29.2 హార్డ్ మేనియూ కవచములోని కణాలు 1. అమీబాయిడ్ కణాలు 2. ఇసినోఫిల్ కణాలు 3. రిక్తికాకణాలు 4. కణికాకణము 5. ఉపకణకణాలు 6. వాడీకణాలు 7. మెగస్టియర్లు (మూలకణాలు) 8. మైక్రోస్టియర్లు (సూక్ష్మకణాలు)

కవచములోని కణాలు (పటం 29.2)

1. అమీబాయిడ్ కణాలు : చిన్నవిగా, కేంద్రకయుతమయి, మిథ్యాపాదాలతోటి మాత్రికతో ఉంటాయి.
2. ఇసినోఫిల్ కణాలు : గోళాకారం లేదా అండాకారంలో రవ్వల కణద్రవ్యంతో ఉంటాయి. ఆప్లవర్ణము (Acid dye) ఇయోసిన్ తో ఎరుపురంగునిస్తాయి.
3. రిక్తికామయ కణాలు : రిక్తికలలో ఉండే గోళాకారకణాలు, కేంద్రకము ఉండదు.
4. గ్రాన్యులార్ కణాలు (గ్రాహక కణాలు) : పీటిలో రవ్వలవలె ఉండే కణద్రవ్యం ఉంటుంది. కేంద్రకము పుష్టంగా ఉంటుంది.
5. వాడీ కణాలు : ఇవి చిన్నవి, శాఖాయుతమయిన అంత్యాలతో ఉంటాయి. సాధారణంగా 26 శాఖలు పొరుగుఉన్న కణాల అంత్యాలతో కలిసిపోయి (Anastomose) ఉంటాయి. ఇవి అంకుశవాళికలమీద కవచం ఉపరితలంమీద ఎక్కువగా ఉంటాయి.
6. శల్కల ఉపకణకణాలు : ఇవి అణగిన్నట్లున్న బాహ్య భుజాకృతిగల కణాలు. రక్తకణశిలలో ఎరుపు వర్ణకంతో ఉంటాయి.

మధ్యస్థకాలక కణాలు (Interlacing cells) : కనచంలోని మాత్రకలో ఈ కణాల తంతువులు వ్యాపించి ఇతర కణాల తంతువులతో జాలకంగా (Interlacing anastomose) యేర్పడతాయి.

కనచంలోని కంటకాలు : కాల్క్యేరియస్ కంటకాలు ఉంటాయి. ఇవి రెండు రకాలు. మైక్రోస్ప్లియర్లు చిన్నవిగా 70µ పొడవుతో ఉంటాయి. మెగాస్ప్లియర్లు పెద్దవిగా 3.5 మి.మీ. పొడవుతో ఉంటాయి. మెగాస్ప్లియర్లలో మళ్ళీ రెండు రకాలుంటాయి. కదురు ఆకారంగల మెగా స్ప్లియర్లు పిపెట్ ఆకారంలో పొడవుగా ఉండి 3.5 మి.మీ. పొడవులోను ఉంటాయి. అన్ని కంటకాలకి వలయాకార శ్రేణులు (Annular rows) చిన్న కంటకాలు ఉంటాయి. మెగాస్ప్లియర్లు శరీర కుడ్యంలోను, హృదయం మినహా అన్ని అంతరాంగ భాగాలలోను ఉంటాయి. కనచము శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. కనచము ఏర్పరచిన పొడము అధస్తరాన్ని (Substratum) అంటిపెట్టు కొంటుంది. కనచము శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది.

29.4 శరీర కుడ్యము

విర్మాణము : శరీర కుడ్యాన్ని ప్రావారము అనికూడా అంటారు. ఇది కనచాన్ని స్రవిస్తుంది. ఇది అంకుశ నాళికల ప్రాంతంలో మందంగానూ శరీర పర ఉదరభాగంలో పలుచగాను పారదర్శకంగాను ఉంటుంది. శరీరకుడ్యం సువిశాలమయిన యెట్రేయ లేదా పరిజలశ్వాస కుహరాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. ప్రావారము గ్రహవి పృష్ఠకుడ్యంతో ఉదరమధ్యరేఖలో ఐక్యమయిఉంటుంది. ఫలితంగా ఏట్రేయ కుహరం కుడి ఎడమ కక్షలుగా విభజింపబడతాయి. ఈ రెండు కక్షలు పృష్ఠభాగంలో కలిసిపోయి పెద్ద అవస్కరన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది ఏట్రేయ అంకుశ నాళికలోకి తెరుచుకొంటుంది. ఇది 1.5 సెం.మీ పొడవు ఉంటుంది. జలశ్వాస అంకుశనాళిక 1 సెం.మీ ఉంటుంది. కనచము (Test) అంతర్వలనం చెందటం వలన రెండు అంకుశనాళికలలోను ఇది అంతర్వేష్టనంగా ఉంటుంది.


కణజాల విర్మాణము (Histology) : ప్రావారములో 3 స్తరాలుంటాయి. వెలుపల బాహ్యచర్మము (Epidermis), మధ్యన మధ్య భూణ కణజాలము (mesenchyme), లోపల అంతశ్చర్మము ఉంటాయి. వెలుపలి బాహ్యచర్మములో షడ్బుజాకృతగల బహిష్టచ కణాలు ఒకే స్తరంలో అణగివట్టుంటాయి. జలశ్వాస అంకుశనాళిక ఆద్యముఖము (Stomodaeum) గాను యెట్రేయ అంకుశనాళిక పాయుపథంగాను వ్యవహరిస్తాయి. మధ్యస్థచర్మమునుంచి మధ్య భూణకణజాలము అభివృద్ధి చెందుతుంది. దీనిలో రక్త కోటరలు, కణాలు వాడీతంతు కండరతంతువులు ఉన్న సంధాయక కణజాలము ఉంటుంది. కండరతంతువులు పొడవుగాను, అణగిన పట్టీవలె ఉంటాయి. ప్రతి కండర తంతువులోను ఒక కేంద్రకము ఉంటుంది. కండరాలు పృష్ఠపూర్వప్రాంతంలో ఉంటాయి. ఇవి రెండు రకాలు — ఆయత, వర్తులాకార కండరాలు. ఆయత కండరాలు జలశ్వాస, యెట్రేయ అంకుశ నాళికలనుంచి విససక్రవలె క్రిందకి విస్తరిస్తాయి. వర్తులాకార (Annular) కండరాలు అంకుశ నాళికచుట్టూ అంగురీయకము (Ring) వలె చుట్టే ఉంటాయి. కొన్ని ఆయత కండరాలు అంతర అంకుశ నాళికల ప్రాంతంలో (Intersiphonal region) ఒకదానిమీదకు ఒకటి వస్తాయి. (Cross with each other). అంకుశ నాళికలలో బలిష్ఠమయిన వర్తులాకార (Circular) పవరణి కండరాలు ఉంటాయి. రెండు అంకుశ నాళికలను కలుపుతూ జలశ్వాస యెట్రేయ కండర పట్టీలు ఉంటాయి. ఇవి మధ్యభూణ కణజాలంలో లోపలికి ఉంటాయి. లోపలి బాహ్యచర్మములో అణగిన కణాలున్న యొక స్తరము ఉంటుంది. అది బహిష్టచర్మమునుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది ఏట్రేయవోకి వేష్టనంగా ఉంటుంది.

శరీర కుద్యము లేదా ప్రావారము మృదువైన అంతరంగాలను రక్షిస్తుంది. బాహ్యచర్మము కవచాన్ని స్రవిస్తుంది. కవచము అనుబంధ శ్యాపాంగముగా వ్యవహరిస్తుంది.

29.5 శరీర కుహరము, ఏట్రీయమ్

ఏట్రీయమ్ విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందటం వలన శరీరకుహరం బాగాక్షీణించింది. హృదయావరణ కుహరములోను, పక్కాలు, జనవేంద్రియాలు ఉన్న కుహరాలు మాత్రమే విజశరీర కుహర భాగములు.

ఏట్రీయమ్ విశాలమైన కుహరము. బహిష్టచముతో వేష్టనము చెందినది. ఏట్రీయమ్లోని ఒకభాగము గ్రహవి పరివేష్టించి ఉంటుంది. కాని పూర్వ ఉదరభాగాలలో మాత్రం ఆవరించి ఉండరు. ఈ ప్రాంతంలో గ్రహనీకుద్యము ప్రావారంతో కలిసి ఉంటుంది. ఈ కుహరాన్ని ఏట్రీయ లేదా పరిజలశ్యాపకుపరము (Peribranchial cavity) అంటారు. ఏట్రీయమ్ భాగంలో కొంత గ్రహవి పుష్టతలంలో ఉంటుంది. దీనిని అవస్కరం అంటారు. బీజవాహికలు, పురీషవాళము అవస్కరంలోకి తెరుచుకొంటాయి. అవస్కరం ఏట్రీయ అంకుశనాళికతోనిక తెరుచుకోగా అది ఏట్రీయ రంధ్రముద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొంటుంది. దాని దగ్గర వాలుగు పెడవివంటి విర్మాణాలు ఉంటాయి. ఏట్రీయ అంకుశ నాళిక దగ్గర ఏట్రీయ పుర్యకాలు ఉంటాయి. కాని ఇవి అవశేష (Vestigial) దశలో ఉంటాయి.




పటం 29.3 పార్ట్ మేనియా — శరీరము (కుడిభాగము) 1. జలశ్యాపరంధ్రము 2. జలశ్యాప అంకుశనాళిక 3. వలయ కండరపట్టి 4. ప్రావారము 5. ఆయత కండరపట్టిలు 6. కుడి నీ బీజకోశము 7. హృదయావరణము 8. కాలేయము 9. ఏట్రీయల్ అంకుశనాళిక 10. ఏట్రీయల్ రంధ్రము 11. వాడీ గ్రంథి.

29.6 జీర్ణ వ్యవస్థ

ఈ వ్యవస్థ జీర్ణనాళము, జీర్ణగంధులు ఉంటాయి. వీరు, ఆస్యకుహరము, గ్రహవి, ఆహారనాళిక, జీర్ణాశయము, పేగు, పురీషనాళము, సాయువు జీర్ణనాళములోని భాగము (పటం 29.4). ఆస్యకుహరము

బహిష్కృతముతో వేస్తవము (Lined) చెంది ఉంటుంది. ఇది పిండదశలో ఆద్యముఖము (Stomoedaeum) జలశ్వాస రంధ్రమును నోరుగా పరిగణించవలె. దానికి నాలుగు సంకోచించగల పెదవులు ఉంటాయి. జలశ్వాస అంకుశనాళిక ఆధారం దగ్గర జలశ్వాస సంవరణి ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు ఇది మూసుకోవగలదు. సంవరణి కండరం వద్ద 60-64 జలశ్వాస స్పర్శకాలు ఉంటాయి. ఈ స్పర్శకాలలో నాలుగు రకాల సమూహాలు ఉంటాయి. మొదటి సమూహం చాలా పొడవుగా ఉండి, రెండవ సమూహమైన మధ్యస్థంగా ఉండేనాటితో ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. ఈ రెండింటితో ఏకాంతరంగా చిన్న స్పర్శకాలున్న మూడవ సమూహం ఉంటుంది. మరీ చిన్న స్పర్శకాలున్న నాల్గవ సమూహంపై మూడు రకాలతో ఏకాంతరంగా ఉంటుంది. ప్రతి స్పర్శకము ద్వీపీచ్ఛాకార (Bipinnately branched) పత్రము వంటి నిర్మాణము. పార్శ్వశాఖలను టెంటాక్యులేట్లు (Tentaculet) అంటారు. వీటికి ద్వితీయశాఖలు ఉంటాయి. వీటికి టెర్మియరీ శాఖలుంటాయి. స్పర్శకాలన్నీ వటిపైపై వడపోత సాధనంగా ఏర్పడి చిన్న ఆహారరేణువులను మాత్రమే మధ్యాహారనాళంలోని పంపుతాయి. ఇవి రసాయనిక గ్రాహకాలుగా ఉపయోగిస్తారు.




పటం 29.4 హెర్మియోనియా - జీర్ణనాళము 1. జలశ్వాస అంకుశనాళిక 2. ఏట్రీయల్ అంకుశనాళిక 3. ఏట్రీయల్ రంధ్రము 4. ఏట్రీయల్ స్పర్శకాలు 5. సంవరణి 6. అవస్కరము 7. కాలేయము కుడిఅంచు 8. జీర్ణాశయము 9. ఆస్యకుహరము 10. జలశ్వాస స్పర్శకాలు 11. గాడులతో ఉన్న పరిగ్రసనీ పట్టీలు 12. శ్వాస రంధ్రాలు 13. జలశ్వాసగోళి 14. అడ్డునాళము 15. ఎండోస్టైట్ 16. కాలేయము ఎడమఅంచు 17. పేగు 18. పురీషనాళము 19. పాయువు.

జలశ్వాస అంకుశనాళిక గ్రసనిలోకి తెరుచుకొంటుంది. జీర్ణనాళం ఇది అన్నిటికంటే పెద్దభాగము. గ్రసనికుడ్యము ఉదర మధ్యరేఖలో ప్రావారంతో ఐక్యమవుతుంది. ఒకజత పరిగ్రసనీపట్టీలు గ్రసనిని రెండు అసంపూర్ణ కక్షలుగా విభజిస్తుంది. పూర్వకక్ష్యను గ్రసనీ పూర్వమండలము (Prepharyngeal zone) అని పిలుస్తారు. ఇది పరిమాణంలో చిన్నది. పరకక్ష్య పెద్ద జలశ్వాసగోళి (Branchial sac) (పటం 29.5) శైలికాయుతమైన పరిగ్రసనిగా రెండు పరిగ్రసనీ పట్టీ కలను (Peripharyngeal bands) వేరుచేస్తుంది. పట్టీల శైలికలు గాడిశైలికల కంటే పొడవుగా ఉంటాయి. పూర్వపట్టీ సంపూర్ణవలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. గ్రసనీ పూర్వ మండలంలో చిన్న, శైలికారహితమైన ఘనాకార (Cuboidal) కణాలుంటాయి.

జలశ్వాసగోళి పెద్ద పరిమాణంలో ఉండి శరీరము పరభాగంలాగా వ్యాపించిఉంటుంది. ఏట్రీయ కుహరంలో అధికభాగం ఆక్రమిస్తుంది. దీని పరపట్టిక (Posterior band) లో పుష్ట మధ్యరేఖలో పుష్టపత్రకము (Doral lamina) ఉదర మధ్యరేఖలో ఎండో స్టైట్ ఉంటుంది. జలశ్వాసగోళి పైకప్పు భాగం నుండి వేలాడే వాక

ముదతే పృష్ఠ పత్రకము. గోణి అడుగు భాగంలోని వాకగాడి పేరు ఎండోస్టైట్. జలశ్వాసగోణికి అసంఖ్యాకమైన శ్వాసరంధ్రాలు ఉంటాయి. అవి ఎక్రియ కుహరంలోకి తెరుచుకొంటాయి. గోణి లోపల నెలవంక ఆకారంలో 6-10 ఆయతముదతలు ఉంటాయి. అవి పరిగ్రహనీ పట్టిక నుండి ఆహార వాహికదాకా వ్యాపించి ఉంటాయి. పృష్ఠ పత్రకం చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ ముదతలు తిన్నగాను, కురుచగాను, ఉంటాయి. ఉదర భాగంలో ఇవి పొడవు గాను చాపం మాదిరిగా వంపు తిరిగి ఉంటాయి. శ్వాసగోణి మొత్తం శైలికాయుతమై ఉండి నిరంతర జలప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. సంధాయక కణజాలంలో అనేక రక్తనాళాలు, కోటరలు ఉంటాయి. బ్రాబెక్యులాలు జలశ్వాసగోణిని శరీరకుడ్యంలో కలుపుతాయి. ఇది మున్నితమైన బోలుతంతువులు (Strands). జలశ్వాస గోణికుడ్యము నుంచి రక్తనాళం బయలుదేరి శరీరకుడ్యానికి చేరుకుంటుంది. ఈ రక్తనాళం బ్రాబెక్యులా ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది. బ్రాబెక్యులాలు శ్వాసగోణిని యధాస్థానంలో ఉంచుతాయి.




పటం 29.5 హైడ్రేమేనియా - గ్రహనీ అంతర్గత నిర్మాణము 1. జలశ్వాస రంధ్రము 2. ఆస్యకుహరము 3. పూర్వ పరిగ్రహనీపట్టి 4. పర పరిగ్రహనీపట్టి 5. పరిగ్రహనీగాడి 6. పృష్ఠలకునము 7. ఎండోస్టైట్లు 8. పృష్ఠదళము 9. ఆహారవాహికాద్వారము 10. జలశ్వాస ముదతలు 11. ఎడమ పెదవి. 12. తుది జలశ్వాసముదత 13. కుడిపెదవి 14. మొదటి జలశ్వాస ముదత 15. జలశ్వాస పూర్వముండలము 16. పృర్వకాలు 17. పంవరణి.

జలశ్వాస గోణికి రక్తం సరఫరా అధికంగా ఉంటుంది. దాని లోపలి తలంలో అసంఖ్యాకమైన అంతర ఆయతనాళాలుంటాయి. జలశ్వాసగోణి కుడ్యానికి 80-130 అంతర ఆయత నాళం (Internal longitudinal vessels) ఉంటాయి. ఆయత నాళాలు అడ్డునాళాలు ఒకదాన్నొకటిదాటి (Cross) వ ఫలితంగా 10,000 చిన్న చతురస్రాలు (Squares) యేర్పడతాయి. వీటిని శ్వాసరంధ్ర ప్రాంతాలు అంటారు. ప్రతి రంధ్ర ప్రాంతంలోను 20 శ్వాసరంధ్రాలు ఉంటాయి. ఫలితంగా దాదాపు 2,00,000 శ్వాసరంధ్రాలు గోణికుడ్యంమీద ఉంటాయి. బాహ్య అడ్డునాళాలు అనేక సన్నని శాఖలను ఇస్తాయి. ఇవి శ్వాస రంధ్రాలమధ్యగా ప్రయాణిస్తాయి. వీటిని జలశ్వాస రంధ్రాంతరనాళాలు (Inter stigmatic vessels) అంటారు. అదేవిధంగా అంతర ఆయతనాళాలు అనేక సన్నని శాఖలను జలశ్వాసప్రాంతాలకి ఇస్తాయి. వీటిని రంధ్రాంతరనాళాలు (Intrastigmatic vessels) అంటారు.

పృష్ఠపత్రకము : పృష్ఠపత్రకాన్ని అధిగ్రహనీపట్టిక (Hyper pharyngeal band) అంటారు. జలశ్వాసగోణి పృష్ఠ మధ్యరేఖనుంచి ఇది వేలాడుతుంది. ఇది సన్నని పత్రము వంటి ముదత. ఇది పరిగ్రహనీ పట్టికకు ఆహారవాహికా ప్రాంతానికి మధ్య ఉంటుంది. దీని స్వేచ్ఛా ఉపాంతానికి 20-30 కురుచనైన శంకు ఆకార లాంగ్యేట్లు.

ఉంటాయి. ఇవి ముందర కురుచగాను వెనుక పొడవుగాను ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి చుట్టుకొని ఒక నాళంవలె ఏర్పడి ఆహారరజ్జువు ప్రయాణించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఆహార వాహికలోని తెరుచుకొంటుంది. పుష్టతలము (Dorsal tubercle) పుష్టప్రతకమునకు ముందర ఉంటుంది.



ఫటం 29.6 హార్డ్ మేనియా — ఎండోస్టైట్ అడ్డుకోత 1. శైలికా ఉపకళ 2. సంధాయక కణజాలము 3. రక్తకోటరము 4. శైలికలు 5. శైలికా ఉపకళ 6. గ్రంథి ఉపకళ.

ఎండోస్టైట్ లేదా అధోగ్రహనీగాడి : జలశ్వాసగోళి ఉదర మధ్యాక్షము గుండా ఒక ప్రముఖమైన గాడి ఉంటుంది. ఇది పర సరిగ్రహనీపట్టిక నుంచి ఆహార వాహిక వరకు ప్రయాణిస్తుంది. పూర్వభాగం లోతుగాను వెడల్పుగాను ఉండగా పరభాగంలో మెరకగా, పన్నుగా ఉంటుంది. ఎండోస్టైట్ లో అయిదు గ్రంథి సంబంధమైన పట్టిలు (Tracts) నాలుగు శైలికాయుత పట్టితో ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. ఈ గాడిలో పెదశైలికలు కుచ్చువలె ఏర్పడతాయి (ఫటం.29.6). ఉపకళాస్తరం క్రింద రక్త నాళాలతో నాడి అంత్యంతో ఉన్న సంధాయక కణజాలంతో ఉంటుంది. ఎండోస్టైట్ శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తుంది. శైలికల కదలికలు శ్లేష్మాన్ని ముందుకు వెల్టుతాయి. ఆహారరేణువులు శ్లేష్మంలో చిక్కుపడతాయి.

ఎండోస్టైట్ జ్ఞానాంగముగా కూడా వ్యవహరిస్తుంది. ఇటువంటి నిర్మాణమే పెఫలోకార్డేటాలోకూడా ఉంటుంది. కార్డేటాలో ఇది అనటు గ్రంథి (Thyroid gland) ని ఏర్పరుస్తుంది.

జలశ్వాస గోళితో పుష్టప్రకానికి వెనుక చిన్న వర్తులాకార ఆహార వాహికాప్రాంతము ఉంటుంది. అక్కడ రెండు అర్థ చంద్రాకార పెదవులు ఉండి ఆహారవాహిక రంధ్రాన్ని కప్పి ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో శ్వాస రంధ్రాలు, ముడతలు ఉండవు. ఆహార వాహికమందమయిన గోడంతో ముదురు మట్టిరంగులో ఉంటుంది. కొంతదూరము ప్రయాణించిన తరువాత ఇది జీర్ణవయములోకి తెరుచుకొంటుంది. దీని లోపలి ఉపకళతో స్థూపాకార కణాలున్న ఏకస్తరము (Single layer) ఉంటుంది. దానిలో నాలుగు శైలికాయుతగాడులు ఉంటాయి. వీటిద్వారా ఆహార రజ్జువు ప్రయాణిస్తుంది.

జీర్ణశయము పలుచని గోడలున్న వెడలైన నాళము. దానికి ఇరువైపుల సంవరణి ఉంటుంది. ప్రెలోరిక్ గ్రంథి యొక్క సున్నితమయిన శాఖలు, రక్తకోటరాలు జీర్ణశయ కుడ్యంలోకి తెరుచుకొంటాయి.

జీర్ణశయము పేగులోకి తెరుచుకొంటుంది. ఇది పొడవుగా ఉండి 'U' ఆకార శిక్యాన్ని (loop) ఏర్పరుస్తుంది. ఈ శిక్యంలో సమీపాంగము (Proximal limb), దూరాంగము (Distal limb) అనే భాగాలు ఉంటాయి. శిక్యము మధ్యభాగములో ఎడమ బీజకోశము ఉంటుంది. శోషణము నిమిత్తము పేగు కుడ్యానికి పలుచని

వేస్తనము ఉంటుంది. పేగు కుడ్యంలో పెద్ద రక్త కోటరాలు, ప్రైలోరిక్ గ్రంథిశాఖల అంత్యాలు ఉంటాయి.

పేగు పురీషనాళంలోకి తెరుచుకొంటుంది. ఇది నన్ను కురుచనైన నాళము, ఇది ఏట్రీయమ్‌లోకి పాయువుద్వారా తెరుచుకొంటుంది. పాయువుకి వెలుపలి ఉపాంతంలో నాలుగు పెదవులు ఉంటాయి. జీర్ణవ్యవస్థ జలశ్వాసగోళికి ఎడమ ప్రక్కన ఉంటుంది.

జీర్ణగ్రంథులు : హెర్టుమేనియాలో కాలేయము, ప్రైలోరిక్ గ్రంథి ముఖ్యమైన జీర్ణగ్రంథులు. కాలేయము రెండు లంబికలున్న, చాక్లెట్ బ్రౌన్ రంగులో ఉండే పెద్ద గ్రంథి. పెద్ద లంబిక జీర్ణాశయానికి ఎడమప్రక్కన చిన్న లంబిక కుడిప్రక్కన ఉంటాయి. అనేక నాళాలద్వారా అది జీర్ణాశయంలోకి తెరుచుకొంటుంది. అది ప్రవించే మట్టిరంగు కలసిన పసుపు ప్రానమును సున్నితమైన శైలికాయుత వాహికలు జీర్ణాశయానికి తీసుకువెడతాయి. ఈ ప్రానంలో శక్తి వంతముయిన ఎమైలేన్, ప్రోటియేన్, అంత శక్తి వంతముకాని లైపెస్ అనే జీర్ణ ఎన్‌జైమ్‌లు ఉంటాయి. కాలేయంలో అనేక శాఖాయుతమైన అంధనాళాలుంటాయి. ప్రతి అంధనాళంలో గ్రంథి సంబంధమైన ప్రంభాకార ఉపకళ ఉంటుంది.

ప్రైలోరిక్ గ్రంథి శాఖోపశాఖలైన పెద్దగ్రంథి. దీని అంత్య శాఖలు జీర్ణాశయం, పేగుకుడ్యాలలో వ్యాపించి ఉంటాయి. నాలికలన్నీ కలిసి ఒక వాహికగా ఏర్పడి జీర్ణాశయం, పేగులోకి తెరుచుకొంటాయి.

జీర్ణక్రియా విధానము : హెర్టుమేనియాలో శైలికాయుత ఆహారపేకరణ పద్ధతి ఉంటుంది. ఆహారరేణువులను లోనికి తీసుకొనివెళ్లే నీరు వడపోయబడుతుంది. కనుక దీని ఫిల్టర్ ఫీడర్ (Filter feeder) అంటారు. డయాటమ్‌లు, శైవాలాలు ఇన్‌ఫ్యూసోరియన్‌లు దీని ముఖ్యాహారము శ్వాసరంధ్రాల చుట్టూ ఉండే శైలికలు విరంతర జలప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. నీరు జల శ్వాసరంధ్రములద్వారా జలశ్వాస అంకుశ వాళికలోకి అక్కడినుంచి గ్రసనిలోకి వెడుతుంది. గ్రసనినుంచి శ్వాసరంధ్రాల ద్వారా ఏట్రీయమ్‌లోకి అక్కడినుంచి గ్రసనిలోకి వెడుతుంది. గ్రసని నుంచి శ్వాసరంధ్రాల ద్వారా ఏట్రీయమ్‌లోకి అక్కడినుంచి ఏట్రీయ రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి వెళ్ళిపోతుంది. జలశ్వాస స్పర్శకాలు వడబోత సాధనంగా యేర్పడి సూక్ష్మ ఆహారరేణువులను మాత్రమే గ్రసనిలోకి పంపుతుంది. స్పర్శకాలు రుచి గ్రాహకంగాలు (Gustato receptors) గా కూడా ఉపయోగపడవచ్చు. శక్తివంతముయిన తిరోగమన ప్రవాహము గ్రసనినుంచి చిమ్మినట్లు పోవటం వలన పేరుకొన్న చెత్తచెదారాలు పోయి జల శ్వాస స్పర్శకాలు శుభ్రపడుతాయి.

ముందుగా ఏట్రీయ అంకుశవాళిక మూసుకొంటుంది, కండరాలు సంకోచించడం వలన గ్రసనిలో ఉన్న నీరు జలశ్వాస అంకుశ వాళికలోకి వేగంగా చేరుకొంటుంది. జలశ్వాస రంధ్రము ద్వారా వెలుపలికి చిమ్మించి కొట్టినట్లు వెళ్ళి పోతుంది. జలశ్వాస గోణా గ్రంథి ప్రాంతాలు హెచ్చు పరిమాణంలో క్లేష్టాన్ని ప్రసరిస్తాయి. శైలికలు కొట్టుకొనటం వలన క్లేష్టుము పుష్టప్రతకాన్ని చేరుకుంటుంది. ఇది పలుచని రేకుల (Sheets) వలె ఉంటుంది. జలప్రవాహంతో వచ్చే ఆహారరేణువుల క్లేష్టుంలో చిక్కుపడతాయి. ఇది పుష్టప్రతకపు లాంగ్వెట్‌లు యేర్పరచిన నాళం ద్వారా ప్రయాణించి రజ్జువు (Cord) రూపంలో ఆహార వాహికను చేరుకొంటుంది. శ్వాసరంధ్రాల (Stigmata) వద్ద ఉండే శైలికలు ఆహార రేణువులు తప్పించుకు పోకుండా కాపాడతాయి. ఆహారవాహిక హెచ్చు పరిమాణంలో క్లేష్టాన్ని దానికి చేరుస్తుంది. చివరికి ఆహారం జీర్ణాశయాన్ని చేరుకుంటుంది. అక్కడ జీర్ణ ఎన్‌జైమ్‌లైన ఎమైలేన్, ప్రోటియేన్, లైపేస్‌లు ప్రవీణపడుతాయి. ఎమైలేన్ కార్బోహైడ్రేట్‌లను, ప్రోటియేన్ ప్రోటీన్‌లను, లైపేస్ కొవ్వులను జీర్ణిస్తాయి. ప్రైలోరిక్ గ్రంథి ప్రానము కూడా జీర్ణక్రియను నిర్వహిస్తుంది. జీర్ణముయిన ఆహారాన్ని పేగు శోషణము (Absorption) చేస్తుంది. మల వదార్థము పురీషనాళము ద్వారా పాయువులోకి అక్కడి నుంచి ఏట్రీయమ్‌ద్వారా వెలుపలికి పోయే నీటితో కలిసి వెళ్ళిపోతుంది. ముంము మెలితిరిగిన తాడు (Strings) రూపంలో ఉంటుంది. హెర్టుమేనియాలో కణాంతస్థజీర్ణక్రియ (Intracellular digestion) జరుగదు. ఆహారము పిండివదార్థరేణువుల రూపంలో జీర్ణాశయం, పేగు, కాలేయంలో నిలువ ఉంటుంది.

29.7 శ్వాస వ్యవస్థ

జలశ్వాసగోణి ముఖ్యమయిన శ్వాసాంగము. కవచము (Test) అనుబంధ శ్వాసాంగము. జలశ్వాసగోణిలో ఉన్న అసంఖ్యాకమైన ఉపకళ ముడతలు నిరంతర జల ప్రవాహంలో తడుస్తూ ఉంటాయి. ఆయత అడ్డురంధ్రాంతర నాళాలకు, రక్త కోటరాలకు పలుచని గోడ బున్నందువలన వాయుమార్పిడి జరుగుతుంది. బ్రాచియ్యలలోని రక్తనాళాలు కూడా ఆక్సిజన్ ని గ్రహిస్తాయి.

రక్తకలశికలు (Vascular ampullae) కవచము బాహ్యతలంలో ఉంటాయి. కనుక అవికూడా శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి. వాటికి పలుచటి గోడలుంటాయి. శ్వాసవర్ణకం ఉంటుంది. రక్తకలశికలకు, చుట్టూ ఉన్న నీటికి మధ్య వాయుమార్పిడి జరుగుతుంది.


29.8 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ

రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ చాలా ప్రత్యేకతతో ఉంటుంది. హృదయము హృదయావరణ త్వచము, రక్తనాళాలు, కోటరాలు ఈ వ్యవస్థలో ఉంటాయి. హృదయావరణ త్వచము పారదర్శకంగా నాళరూపంలో ఉన్న సంకోచ రహిత విర్మాణము. అది కుడి పుష్కోదరభాగంలో ఉంటుంది. అది 7 సెం.మీ పొడవులో 3 మి.మీ వెడల్పులో ఉంటుంది. హృదయావరణ త్వచము మందంగాను, రక్తకోటరాలున్న సంధాయక కణజాలంతో విర్మితమైన సంకోచ రహిత (Noncontractile) కుడ్యంతో ఉంటుంది. దానికి వేష్టనముగా శల్కల ఉపకళ ఉంటుంది. దానిలో వర్ణరహితమైన హృదయావరణ ద్రవము (Pericardial fluid) ఉంటుంది. ఈ ద్రవంలో ప్రత్యేకత కల కణాలు (Corpuscles) ఉంటాయి.

హృదయాన్ని ఆవరించి హృదయావరణత్వచము ఉంటుంది. పలుచని సంధాయకకణజాలపు పట్టీ (Connective tissue flap) ఈ రెంటిని కలుపుతుంది. హృదయము హృదయావరణమంత పొడవుగా ఉండి రెండు వైపులా తెరిచి ఉంటుంది (పటం 29.7). హృదయము కుడ్యము పలుచని కండరంతో విర్మితమై సంకోచశక్తి కలిగి ఉంటుంది. హృదయంలో కవాటాలు ఉండవు. హృదయము ఒకమారు ఒకవైపునకు ప్రసరించి మరొక మారు వ్యతిరేక దశలో ప్రసరిస్తుంది. పియర్ ఆకారం (Pear shaped) కల ఒక విర్మాణం రక్తమైన ప్రసరణ జరుగుతుంది. హృదయము విస్తారము (relaxation-Diastole). ఈ విర్మాణము కుహర మధ్యభాగంలో ఉంటుంది. హృదయము సంకోచము (contract-Systole) చెందినప్పుడు అది హృదయ సంకోచతరంగానికి వ్యతిరేక దిశలోకి ప్రయాణించి అక్కడి అంత్యభాగాన్ని నొక్కుతుంది. రక్తము ప్రయాణించవలసిన దిశలోనే ప్రసరిస్తుంది, వ్యతిరేక దిశలో ప్రసరించకుండా నిలుపుచేస్తుంది.

రక్తనాళాలు : ఈ జీవిలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన రక్తనాళాలు ఉంటాయి. పెద్దనాళాల్లో, ఎండోథీలియం వేష్టనము ఉంటుంది. కేశనాళికా వ్యవస్థ లోపించింది కాని కోటరాలు లేదా సిరాపరిత్తులు (Sinuses), లిక్విడాలు (Lacunae) ఉంటాయి.

ఉదర మహాధమని, పుష్టమహాధమని, జలశ్వాస అంతరాంగనాళం (Branchiovisceral vessel) హృద్విక అంతరాంగ నాళము (Cardio visceral vessel) ముఖ్యమయిన రక్తనాళాలు. ఉదర మహాధమని అన్నిటిలోకి పెద్దనాళము. అది హృదయము ఉదర అంత్యమునుంచి బయలుదేరి పూర్వ, పర భాగాలుగా విభజింపబడుతుంది. ఇది శ్వాసగోణిలో సరిగ్గా ఎండోస్టైయిట్ కింద ఉంటాయి. పూర్వనాళము జలశ్వాసగోణి



పటం 29.7 హార్డ్ మేవియా - రక్తవసరణ వ్యవస్థ 1. అథోస్పర్మిక నాళము 2. ఆట్రీయల్ రంధ్రము 3. జలశ్వాస అంతరాంగ నాళము 4. కుడి ఆహార వాహికానాళము 5. బీజ గ్రంథి నాళము 6. హార్డిక-అంతరాంగ నాళము 7. కవచ నాళము 8. జతర నాళము 9. ఎడమ కాలేయ నాళము 10. కవచ పుష్ప నాళము 11. పుష్ప ఆంత్ర నాళము 12. ఉదరాంత్ర నాళము 13. అడ్డు నాళము 14. కవచము 15. ప్రావారము 16. ఉదర మహోధమని 17. కవచ ఉదర నాళము 18. ఉదర మహోధమని పూర్వ శాఖ 19. జలశ్వాస రంధ్రాలు 20. అడ్డు నాళాలు 21. పరిగ్రహనీ నాళము 2. అథోస్పర్మిక నాళము 23. స్పర్మిక నాళము 24. జలశ్వాస రంధ్రము 25. అంకుశ వాళిక-నాళము 26. వాడీ నాళము 27. పుష్ప మహోధమని.

కుడ్యానికి అనేక అడ్డునాళాల నిస్తుంది. పరిగ్రహనీ నాళము, అథోస్పర్మిక నాళము పూర్వనాళాన్ని కలుసుకొంటాయి. పరిగ్రహనీ నాళము ప్రావారానికి అనేక శాఖల నిస్తుంది. అథోస్పర్మిక నాళము స్పర్మిక నాళాలను స్పర్మికాలకి, అంకుశనాళ రక్తనాళాలను (Siphoral vessels) జలశ్వాస అంకుశ వాళికకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. పరనాళము ఆహార వాహిక ప్రాంతానికి ప్రయాణించి పూర్వనాళం మాదిరిగానే జలశ్వాసగోళి కుడ్యానికి అడ్డునాళాలను (Transverse vessels) సరఫరా చేస్తుంది. ఉదర మహోధమని పెద్ద ఉదర కవచనాళాన్ని (Ventral test vessel) కవచానికి ఇస్తుంది.

పుష్పమహోధమని జలశ్వాసగోళి పుష్పమధ్యకుడ్యంలో పరిగ్గా పుష్పవత్రకానికి క్రిందుగా ఉంటుంది.

పూర్వభాగంలో ఇది వాడీ సంక్లిష్టానికి రక్తాన్ని పరఫరాచేసే తరువాత పరిగ్రహిస్తే, అధోస్పర్శక నాళాలతో కలుస్తుంది. పరాంతంలో అది జలశ్వాస అంతరాంగ నాళాలతో కలుస్తుంది. పరాంతంలో అది జలశ్వాస అంతరాంగనాళంగా మేర్పడుతుంది. జలశ్వాస కుడ్యం ద్వంద్వ అడ్డునాళాలను పృష్ఠమహాధమనికి ఇస్తుంది. జలశ్వాస అంతరాంగనాళము పృష్ఠమహాధమని పరాంతంనుంచి బయలుదేరుతుంది. కొంతదూరము ప్రయాణించిన తరువాత అది రెండుగా చీలుతుంది. పెద్ద ఎడమ ఉదరాంత్రనాళము చిన్నకుడి ఆహారవాహికానాళము, ఉదరాంత్రనాళము ఆహార వాహికా ప్రాంతపు ఎడమ పెదవికి, ఎడమ కాలేయ లంబికకి, జీర్ణాశయానికి రక్తాన్ని ఇచ్చి పేగు ఉదరకుడ్యంలో సున్నితమయిన నాళాలుగా రూపొందుతుంది. కుడి ఆహారవాహికానాళము కాలేయ కుడి లంబికకి, ఆహార వాహికకి రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తుంది.

హృదయము పృష్ఠాంతం నుంచి హార్టిక అంతరాంగనాళము బయలుదేరి పృష్ఠభాగానికి చేరుకొని అక్కడ అసంఖ్యాకమైన శాఖలుగా ఏర్పడుతుంది. కుడి కాలేయనాళము కాలేయముకుడిలంబికకు, ఆహారవాహికానాళము ఆహార వాహికకు రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తుంది. కవచనాళము ప్రావారము గుండా ప్రయాణించి కవచానికి (Test) రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తుంది. హార్టిక అంతరాంగనాళము శరీరంలో ఎడమవైపునకు తిరిగి మూడుశాఖలుగా విభజింబడుతుంది. మొదటిశాఖ పృష్ఠమధ్యనాళము, రెండవశాఖ ఎడమ బీజకోశనాళము, మూడవశాఖ జీర్ణాశయాంత్రకవచనాళము (Gastro intestinal test vessel) పృష్ఠమధ్య నాళము పృష్ఠమధ్యరేఖ ద్వారా ప్రయాణించి ఏట్రయ అంకుశ నాళికకు చేరుకున్న తరువాత మూడు శాఖలు ఉద్భవిస్తాయి. ఒకటి కవచానికి, రెండవది ఆహారవాహిక ఎడమ పెదవికి, మూడవది బీజకోశానికి రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తాయి. చివరిగా పృష్ఠమధ్య నాళము 6 8 రక్తనళాలను అంకుశ నాళికకు ఇచ్చి అది వర్తులాకారంలో ఉన్న ఆధో స్పర్శకనాళంతో కలుస్తుంది.

ఎడమ బీజకోశ శాఖ ఎడమ బీజకోశానికి రక్తాన్నిస్తుంది. అతి పొడవైన జీర్ణాశయాంత్రనాళము రెండుగా విడిపోతుంది. మొదటిదైన పృష్ఠాకుడ్యానికి వెళ్ళి జీర్ణాశయానికి పేగుకు కాలేయము ఎడమ లంబికకు రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తుంది. రెండవదైన జీర్ణాశయ కవచనాళము (Gastro-test vessel) జీర్ణాశయ నాళంగాను కవచ నాళంగాను చీలిపోయి వరుసగా జీర్ణాశయానికి కవచానికి రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తాయి.

రక్తప్రసరణ : హృదయము పృష్ఠ భాగమునుంచి ఉదర భాగానికి సంకోచించినప్పుడు అపరిశుభ్రరక్తము హార్టిక అంతరాంగ నాళాన్ని చేరుకొని అక్కడినుంచి హృదయానికి వెడుతుంది. హృదయమునుంచి ఉదరమహాధమనికి అక్కడినుంచి జలశ్వాస నాళాలద్వారా జలశ్వాసగోళికి, ఉదర కవచ నాళాలద్వారా కవచానికి రక్తం చేరుకుంటుంది. గోళిలో వాయు మార్పిడి జరుగుతుంది. పృష్ఠమహాధమని పరిశుభ్ర రక్తాన్ని పంపిణీంచి జలశ్వాస అంతరాంగనాళంలోకి పంపుతుంది. అది రక్తాన్ని అన్ని అంతరంగభాగాలకు చేరవేస్తుంది. అపరిశుభ్ర రక్తము హార్టికా అంతరాంగ నాళముద్వారా హృదయాన్ని చేరుకొంటుంది. (పటం 29.8)

హృదయము ఉదర భాగం నుంచి పృష్ఠభాగానికి సంకోచించినప్పుడు ఉదరమహాధమని పరిశుభ్ర రక్తాన్ని హృదయానికి చేరవేస్తుంది. హృదయము ఈ రక్తాన్ని హార్టిక అంతరాంగనాళంలోకి పంపగా అది శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు రక్తాన్ని చేరవేస్తుంది. జల శ్వాస అంతరాంగనాళము అపరిశుభ్ర రక్తాన్ని గ్రహించి పృష్ఠమహాధమనికి ఇస్తుంది. ఇది రక్తాన్ని జలశ్వాస నాళాలద్వారా గోళికి వాయు మార్పిడి విమిత్తం పంపుతుంది. పరిశుభ్రపడిన తరువాత రక్తము ఉదరమహాధమనిలోకి చేరుకుంటుంది. ఉదర కవచనాళము (Ventral test vessel) పరిశుభ్రరక్తాన్ని ఉదర మహాధమనికి పంపుతుంది. ఫలితంగా హృదయము ఒకమారు దైహిక హృదయము (Systemic heart) గాను ఏకాంతరంగా వ్యవహరిస్తుంది. హృదయ సంకోచం వొక దశలో 2 లేక 3 నిమిషములు ఉండి ఆ దిశలో రక్త ప్రసారముజరిగిన తరువాత వ్యతిరేక దిశలో అదే మోదిరిగ జరుగుతుంది. ఈ పర్యవర్తనము (Reversal) విరంతరం జరుగుతుంది.

7. శ్వేత కణాలు (మహాభిక్షకణాలు) (Macrophages) : ఇవి పరిమాణంలో మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. వర్ణరహితమైనవి అమీబా ఆకారంలో, పెద్ద కేంద్రకం కణమధ్యంలో ఉంటుంది.
8. నెఫ్రోసైట్లు — వృక్కకణాలు : పెద్ద రిక్తికలు ఉంటాయి. విసర్జక క్రియ జరుపుతాయి.

29.9 విసర్జక వ్యవస్థ

హెర్టుమేనియాలో నాడీగ్రంథి ముఖమైన విసర్జనాంగము. ఇవి ప్రావారంలో రెండు అంకుశనాళికల మధ్య ప్రాంతంలో నాడీసంధికిపైన, పృష్ఠలఘునానికి వెనక ఉంటుంది. ఇది అండాకారంలో ఉంటుంది. అది మట్టి రంగులో 4 మి.మీ పొడవులో 1 మి.మీ. వెడల్పులో ఉంటుంది. కొన్ని కేంద్రనాళికలు నాడీగ్రంథి పరిధీయ ప్రాంతం నుంచి వెలుపలికి చొచ్చుకొని వస్తాయి. కేంద్రనాళికలు (Central tubes) పొడవైన శైలికా రహిత కేంద్రనాళము (Central canal) లోకి తెరుచుకొంటాయి. ఈ నాళము పూర్వ ప్రాంతంలో సన్నని వాహికలోకి దారితీస్తుంది. దానిలో శైలికా కణాలుంటాయి (పటము 29.9). అది క్రిందివైపునకు వంగి పూర్వనాడుల మధ్యకి ప్రయాణిస్తుంది. అది పూర్వగ్రహిణి మండలంలోకి ఒక రంధ్రము ద్వారా తెరుచుకొంటుంది. దానికి అంశభ్యాకమైన శైలికలు ఉంటాయి. అది పృష్ఠలఘునం (Dorsal tubercle) ఆధారం దగ్గర తెరుచుకొంటుంది. నాడీగ్రంథి కేంద్రనాళికలు, కేంద్రనాళము, వాహిక అన్నింటికీ చిన్న వర్తులాకార శైలికారహిత కణాలున్న ఏకస్తరిత కుడ్యం ఉంటుంది. మిగతా గ్రంథిలో ముదురు కణికలు ఉంటాయి. రక్తకోటరాలు రక్త కణాలుకూడా ఉంటాయి. సంధాయక కణజాలంనుంచి విసర్జక పదార్థం కేంద్రనాళికలోనికి అక్కడి నుంచి కేంద్రనాళంలోకి చేరుకొంటుంది. కేంద్రనాళం నుంచి నాడీగ్రంథి ద్వారా గ్రహిణిలోకి వెల్లుబడి బయటకు వెళ్ళిపోయే ప్రవాహంలో కలిసి విసర్జింపబడుతుంది. విసర్జక పదార్థం జాంఘీన్, యూరేట్ల రూపంలో ఉంటుంది. ఇది నెఫ్రోసైట్లు లేదా వృక్క కణాలలో విక్షిప్తం అయిఉంటాయి. నాడీగ్రంథి, నాడీసంధి, పృష్ఠలఘునము ఈ మూడింటిని కలిపి నాడీ సంక్లిష్టము (Neural complex) అంటారు. దీనిని సకశేరుక పీయూష గ్రంథి (Pituitary gland) గా పరిగణిస్తారు.

29.10 నాడీ వ్యవస్థ

డింభక దశలో నాడీవ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెందినది. డింభకంలో నమూనా సకశేరుకంలో ఉన్నట్లుపొడవైన నాళ రూపంలో ఉన్న నాడీదండం ఉంటుంది. కాని తిరోగమన రూపవిక్రియ జరిగిన తరువాత ప్రాథ జీవిలో సకశేరుక లక్షణాలన్నీ క్షీణించిపోతాయి. నాడీ వ్యవస్థ క్షీణించి పొడవైన లేత నిరుపురంగులో నాడీసంధి (Nerve ganglion)గా మిగిలిపోతుంది (పటం 29.9). అంకుశ నాళికల మధ్య ప్రావారంలో నాడీగ్రంథికి ఉదరంగా ఇది ఉంటుంది.

దాని వెలుపలి వల్కుల ప్రాంతం (Cortical region) లో పెద్ద నాడీసంధి కణాలు, లోపలి దవ్వప్రాంతం (Medullary region) లో మౌత్రిక ఉంటాయి. మౌత్రికలో నాడీతంతువులుంటాయి. నాడీకణాలు ద్విధ్రువ (Bipolar) బహుధ్రువ (Multi polar) రకానికి చెందినవి. నాడీసంధి ప్రతికార చర్యలకు ఉత్పాదక చేస్తుంది.

నాడీ సంధికి మూడు పూర్వ, రెండు పరనాడులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ మిశ్రమనాడులు (Mixed nerves) మూడు పూర్వనాడులలో రెండు మందంగాను వొకటి సన్నగాను ఉంటాయి. సన్నటి నాడీ వోరు, వోటి

చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతానికి వెదుతుంది. మొదటి రెండూ శ్యావ అంకుశనాళికను చుట్టి ఉంటాయి. పూర్వ నాడులన్నీ, పుర్యకాలక్కు కండరాలకు, ఆహార నాపికకు ఇతర అంతరంగ భాగాలకు వెల్లాయి. కవచంలో నాడీ అంత్యాలు నాడీజాలకాన్నీ నిర్మిస్తాయి. ఇది జ్ఞాన కణాల చుట్టూ హెచ్చుగా ఉంటాయి.

29.10.1 జ్ఞానాంగాలు

హెర్మమేనియాలో ఈ క్రింద పేర్కొన్న జ్ఞానాంగాలుంటాయి.

పుర్యక గ్రాహకాంగాలు : ఇవి కవచంలోని ప్రసరణ, ప్రసరణ రహిత ప్రాంతాలలోను, అంకుశ నాళికల కండరాలలోను ఉంటాయి. ఇవి రవ్వల కణజీవ ద్రవ్యాన్ని, కేంద్రకాలని కలిగి ఉండే కణాలు.

కాంతి గ్రాహకాలు (Photoreceptors): అంకుశ నాళికల ఉపాంతాలలో ముదురు ఎరుపు రంగు బిందువులుంటాయి. వీటిలో రవ్వల కణ జీవ ద్రవ్యం ఉంటుంది, ఇవే కాంతిగ్రాహకాలు.

రసాయన గ్రాహకాలు (Chemoreceptors) : ఇవి వీటి రసాయన ప్రకృతిని పరీక్షిస్తాయి. పుర్యకాలు, పుష్టలకునము రసాయన గ్రాహకాలు.

రియోరిసెప్టర్లు (Rheoreceptors) : భూమ్యాకర్షణ శక్తిలోని మార్పులను గమనిస్తాయి. ఇవి జలశ్యావ, ఏప్రియ అంకుశ నాళికలలో ఉంటాయి.

ఉష్ణ గ్రాహకాలు (Thermoreceptors) : ఇవి ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను గ్రహిస్తాయి. అంకుశ నాళికల వేష్టన కణాలలో ఇవి ఉంటాయి.


సూణ గ్రాహకాలు (Olfactoreceptors) : ఇవి వాసనను పసికడతాయి జలశ్యావ పుర్యకాల వేష్టన కణాలలో సూణగ్రాహకాలు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. తొనికి వచ్చే వీటిని ఇవి పరీక్షిస్తాయి.

పుష్ట లకునము (Dorsal tubercle): ఇవి జలశ్యావ పూర్వమండలంలో పుష్ట స్రవకానికి పూర్వంగా ఉంటుంది. దానికి వెడల్పైన ఆధారం, వాక జత పర్మిలంగా మెలితిరిగి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ రెండూ వాకే స్థలము నుంచి వాకే ఆధారం నుంచి ఉద్భవిస్తాయి. ప్రతి పర్మిలాకార లంబికలో పర్మిలాకారంగా ఉన్న శైలికాయుత నాళము ఉంటుంది. లంబికలలో అవి అనిచ్ఛన్నం (Continuous)గా ఉంటాయి. గదాలు ఆకారంలో ఉన్న నాడీరంధ్రము పుష్టలకునము ఆధారభాగం దగ్గర తెరుచు కొంటుంది.

29.11 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ


హెర్మమేనియా అండ్‌త్పాదక (Oviparous), ఉభయలింగిక (Hermaphrodite) జీవి. స్త్రీ జననేంద్రియాలు ప్రథమంగా పరిపక్వతకి వస్తాయి. కనుక స్వయం ఫలదీకరణ (Self fertilization) జరుగదు. ఏటివి (Protogynous) జీవులు అంటారు. ఈ జీవిలో రెండు పెద్ద బీజకోశాలు ప్రావారం నుంచి ఏప్రియ కుహరం లోకి వచ్చుకు స్తాయి. పేగు శిక్యపు రెండు అంగాల మధ్యన ఎడమ బీజకోశము ఉంటుంది. కుడి బీజకోశము హృదయానరణానికి ప్రావారానికి మధ్యన ఉన్న ప్రాంతంలో ఉంటుంది. ప్రతి బీజకోశము పాడవుగా లంబికలలో ఉంటుంది (పటం 29.10). ప్రతి బీజకోశానికి 10-25 లంబికలు కేంద్ర అక్షానికి (Central Axis) ఇరుప్రక్కల ఉంటుంది. బీజకోశము ఉదర భాగంలో వెడల్పుగా వుండి పుష్ట అంత్యములో సన్నగా వుంటుంది. ఉదర భాగపు లంబిక బాగా పెద్దదిగా వెంపంక (Crescent) ఆకారంలో వుంటుంది. మిగిలినవి ద్వంద్వంగా (Paired) వుంటాయి. ఇవి అందాకారంలో వుండి రాసురాసు ఏప్రియ అంత్యానికి చిన్నవిగా ఏర్పడతాయి. బీజ కోశపు ప్రతి లంబికలోను పురుష స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు ఉంటాయి.

లంబికలోని పరధీయ భాగంలో ఎరుపు రంగులో ఉండి సూక్ష్మాంకురాలలో (Papillated) ఉండే ముష్కాలు వుంటాయి. లోపలి ప్రాంతము లేత గులాబీ రంగులో వుంటుంది. ఇది స్త్రీ బీజకోశ ప్రాంతము. ముష్క ప్రాంతంలో అవంభ్యాకమైన శుక్ర అంధబాహువులు ఉంటాయి. వీటి వెలుపలి స్తరంలో శుక్రమాతృకణజన్యాలు (Spermatogonia) లోపలి స్తరంలో శుక్ర మాతృకకణాలు వుంటాయి. శుక్రమాతృకణము శుక్రకణంగా రూపాంధుతుంది. ఇవి అంధబాహువు గహ్వరంలోకి విడువబడుతాయి.




పటం 29.10 హేర్టుమేనియా ఎడమ బీజకోశము 1. స్త్రీ బీజవాహికా రంధ్రము 2. స్త్రీ బీజకోశాలు 3. ముష్కాలు 4. శుక్రవాహిక 5. స్త్రీ బీజవాహిక 6. పురుషీజ వాహికా రంధ్రము.

శుక్రకణం 4" పొడవు వుండే చిన్న విర్మాణము. దీని శిరోభాగం పూర్వ ప్రాంతంలో ప్రముఖ భాగంగా రూపాంధుతుంది. గ్రీవాభాగము లేదా మధ్య తువక తోడువాత పువ్వు ప్రాంతం చాలా పొడవుగా వుంటుంది. మూడు రకాల శుక్ర కణాలను గుర్తించినారు. మొదటిరకంలో ముక్కు (beak) లేదా పూర్వభాగం, గ్రీవాభాగం వాకే పొడవుతో ఉంటాయి. రెండవ రకంలో పొడవైన ముక్కు మూడవ రకంలో పొడవైన గ్రీవాభాగం వుంటాయి. విడుదలైన శుక్ర కణాలు శుక్రవాహికలోకి చేరుతాయి. శుక్రవాహికలు చక్కమై వాహికగా ఏర్పడి ఇవన్నీ కలిసి శుక్రవాహిక (Vas deferens) గా ఏర్పడుతుంది. ఇది కేంద్ర అక్షయ ద్వారా ప్రయాణించి పుష్ట అంశము మీద వున్న, మందమైన కుడ్యాలు గల ఒక సూక్ష్మాంకురం (Papilla) మీద తెరుచుకొంటాయి. శుక్రవాహిక లోపలి భాగం శైలికాయుతమైనది.



పటం 29.11 హేర్టుమేనియా - పరిపక్వ అందము 1. పీతకము 2. పరిపీతక ద్రవము 3. వెలుపలి పుటికాకణాలు 4. కేంద్రక బిందువు 5. కేంద్రకము 6. పరాయపు 7. పీతకత్వము 8. వెలుపలి పరాయపు.

ఖండాలు పృష్టభాగాన అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఫలితంగా పిండానికి వంకర తిరిగిన పుచ్చము ఏర్పడుతుంది. (పటం. 30.1 D-G.)



పటం 30.1 పార్ట్ మేనియా అభివృద్ధి దశలు A. సంయుక్త బీజము B. రెండు కణాల దశ C. నాలుగు కణాల దశ D. గాస్ట్రులా కోత E. గాస్ట్రులా అడ్డుకోత (C.S.). F. అభివృద్ధి చెందుతున్న భ్రూణము G. దీంభక ప్రథమ దశ (అప్పడే ఏర్పడిన దీంభకము) 1. జాంతవ ధ్రువము 2. ధ్రువ దేహాలు 3. బహిష్టచము 4. వంశ-నాడి నాళము 5. బ్రహ్మ ఖండ ధ్రువము 6. అంతస్థచము 7. మధ్యస్థచము 8. ఎడమ సంయుక్త బీజ ఖండితము 9. కుడి సంయుక్త బీజ ఖండితము 10. పరాంత సంయుక్త బీజ ఖండితాలు 11. పూర్వంత సంయుక్త బీజ ఖండితాలు 12. నాడి ఫలకము 13. పృష్ట వంశము 14. అర్కెంటరాన్ 15. ఆది ఆంత్ర రంధ్రము (బ్లాస్టోపోర్) 16. నాడి దండము 17. మధ్యాంత్రనాళము 18. నాడి ఆశయము.

30.6 దీంభక అంగాల అభివృద్ధి

నాడిదండము : పృష్ట మధ్యరేఖలోని బహిష్టచ కణాలు విభేదనం చెంది మెడ్యులరీ ఫలకంగా రూపొందుతాయి. దాని పార్శ్వభాగాలలో ముడుతలు ఏర్పడతాయి. మెడ్యులరీ ఫలకం క్రిందికి కుంగుతుంది. ఫలితంగా మెడ్యులరీ గాడి యేర్పడుతుంది. పార్శ్వ ముడతలు రెండూ కలిసి సోతాయి. ఆ విధంగా నాడి నాళము (Naural tube)


లేదా పృష్ఠనాడీదండము యేర్పడుతుంది. మిగతా బహిష్టచము నుంచి ఇది పూర్తిగా విడిబడుతుంది. మొదట్లో పరాంతము మూసుకొంటుంది. నాడీనాళము కుడి సగభాగంలో సుస్తిష్క్ర ఆశయం యేర్పడుతుంది. రెండు వర్ణక చుక్కలు (Pigment spots) లేదా వేత్రీయ బిందువులు (Ocelli), సంతులన కణము (Organ of equilibrium) మస్తిష్క్రశయం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతాయి. దీనిని నాడీ ఆశయమని లేదా జ్ఞానాశయమని అంటారు. ఆశయానికి పృష్ఠంగా వేత్రీయ బిందువు ఉండగా, సంతులన కణము ఉదరంగా ఉంటుంది. ఎడమ సగభాగము ప్రాథ జీవిలో నాడీ వాహికను యేర్పరుస్తుంది. యేర్పడిన వెంటనే వాహిక యొక్క రెండు అంత్యాలు మూసుకుంటాయి. కాని తరువాత పూర్వాంతము లార్వా యొక్క అద్యముఖములోనికి తెరుచుకొంటుంది. ప్రాథజీవిలో అధి గ్రసని యొక్క పూర్వ జలశ్వాస మండలం (Prebranchial zone) గా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

పృష్ఠవంశము : మెదుల్లరీగాడి క్రింద ఉన్న అంతస్త్వచ కణాలు సన్నగా పాడవుగా ఉన్న సట్టిగా యేర్పడతాయి. ఇదే పృష్ఠవంశము. ఆహారనాళము ఆర్కెంటరాన్ నుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది. నాడీనాళము పుచ్చమురోకి వ్యాపిస్తుంది. ఇది పృష్ఠవంశానికి పృష్ఠ భాగంలో ఉంటుంది (dorsal to the notochord). ఇది భవిష్యత్ నాడీ దండము. మస్తిష్క్ర ఆశయము వెనుకనున్న పృష్ఠ మధ్య ప్రాంతపు బహిష్టచము అంతర్వలనం చెంది ఏట్రీయమ్ గా ఏర్పడుతుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న గ్రసనిని ఏట్రీయమ్ అవరిస్తుంది. ఆహార నాళము వివిధ భాగాలు ఆర్కెంటరాన్ నుంచి అభివృద్ధి చెందుతాయి. పృష్ఠభాగంలో నోరు బహిష్టచ అంతర్వలనంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది అంతస్త్వచ ప్రలంబనం (Evagination) తో కంపి అవిచ్ఛిన్నమైన ఆహారనాళాన్ని యేర్పరుస్తుంది. గ్రసని జలశ్వాస గోళి (Branchial) గా రూపొందుతుంది. జలశ్వాస గోళి ఉదర కుడ్యంలో ఎండోస్టమిల్, పార్వకుడ్యంలో మొప్ప చీలికలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. మొప్ప చీలికల సంఖ్య హెచ్చుతుంది. జలశ్వాస గోళిమొప్ప చీలికల ద్వారా ఏట్రీయమ్ లోకి తెరుచుకొంటుంది. గ్రసని ఉదర కుడ్యంలో రెండు బాహ్యవృద్ధులు (out growths) అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇవి హృదయము, హృదయావరణత్వచముగా రూపొందుతాయి. బాహ్యవృద్ధి యొక్క లోపలి కుడ్యము హృదయముగాను వెలుపలి కుడ్యము గ్రసని నుంచి విడివిడి హృదయావరణ త్వచముగాను యేర్పడుతాయి. లార్వా పూర్వభాగంలో మూడు ప్రోత్తాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇవి సంసజనక పాపిల్లాలు. కవచము శరీర ఉపరితలం మీద అంతటా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది నోటి మీద కూడా అభివృద్ధి చెందటం నోరు విధ నిర్వహణను జరుపలేదు. శరీరకుహరము మధ్యత్వచముంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది. మధ్యత్వచ ఫలకీకలు చీలటం వలన ఇది యేర్పరుంది. ఏట్రీయల్ కుహరము అభివృద్ధి చెందటం వలన శరీరకుహరం క్షీణిస్తుంది. ఇప్పటివరకు పిండము పీఠకాన్ని ఆహారంగా గ్రహించింది. తరువాత లోపలి పుటికా కణాలు పిండానికి పోషణ నిస్తాయి. ఇవి లోపలి పరాయుపు (Chorion) నుంచి విడిపడతాయి.

ఫలదీకరణ జరిగిన తరువాత 8 గంటలలో లార్వా సంపూర్ణంగా ఏర్పడుతుంది. పుచ్చము నిరంతరంగా కదలటం వలన పరాయుపు పొరలు చిల్లుతాయి. పుచ్చము తిన్నగా అవుతుంది. పొదగటం పూర్తవగానే టాడ్ పోల్ లార్వా పీటిలోకి విడుదలఅయి ఈదుతూ కొంతకాలం స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని గడుపుతుంది.

30.7 అసిడియన్ టాడ్ పోల్ లార్వా

లార్వా 1.2mm. పాడవు ఉంటుంది. పలుచని కవచం కప్పి ఉన్నందువల్ల ఇది పారదర్శకంగా ఉంటుంది. మొండెము స్థూపాకారంలో ఉంటుంది. పూర్వాంతానికి మూడుసంసజనక పాపిల్లాలు ఉంటాయి. ఈ పాపిల్లాలో ప్రత్యేకమైన బహిష్టచ కణాలు ఉంటాయి. అవి స్రవించే జిగట పదార్థం వలన జీవి అధస్తరాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటుంది. పెద్ద బహిష్టచ కణాలు శరీరాన్ని కప్పి ఉంచుతాయి.



పటం 30.2 హెర్బుమేనియా-టాడ్ పోల్ డింభకము 1. సంస జనక సూక్ష్మాంకురాలు 2. జలశ్వాస రంధ్రాలు 3. గ్రసని 4. కర్ణజ్ఞాన కణము 5. నేత్రాంశము (నేత్ర బిందువు) 6. ఎప్రియమ్ 7. ఎప్రియల్ రంధ్రము 8. నాడీ దండము 9. నాడులు 10. పుచ్చనాడీ సంధులు 11. పుచ్చ వాజము 12. పుచ్చము 13. కండర ఖండితము 14. పృష్ఠవంశము 15. జీర్ణాశయము 16. హృదయము 17. ఎండోస్టైట్.

లార్వాలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన జీర్ణాశయము ఉంటుంది. అది ముస్తీష్కమునకు క్రిందుగా ఉంటుంది. నోరు పృష్ఠపూర్వంతంలో ఉండి ఆవ్య కుహరంలోకి తెరుచుకొంటుంది. గోణివలె వున్న గ్రసనిలో మూడు జతల శ్వాసరంధ్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. గ్రసని ఉదర మధ్యభాగంలో ఎండోస్టైట్ అభివృద్ధి చెందుతుంది. శ్వాసగోణి కురుచగా వుండే ఆహారవాహికలోకి తెరుచుకోగా అది శక్యరూపంలో ఉండే పేగులోకి తెరుచుకుంటుంది. పేగు పాయువులోకి తెరుచుకుంటుంది. పాయువు ఎప్రియమ్లోకి తెరుచుకోగా ఎప్రియమ్ ఎప్రియరంధ్రం ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకుంటుంది. హృదయావరణత్వము హృదయాన్ని అవరించి ఉంటుంది. ఇది గ్రసని పరాంత క్రింద భాగంలో ఉంటుంది (పటం 30.2).

నాడీ దండము, పృష్ఠవంశము, పుచ్చము : నాడీకణాలు ఏర్పరచిన భాగానికి పూర్వంతాన ముస్తీష్క శంకువు ఏర్పడుతుంది. జ్ఞాన ఆశయము ముస్తీష్క శంకువుకు వెనుకగా ఏర్పడుతుంది. జ్ఞాన ఆశయంలో రెండు నేత్ర బిందువులు (Ocelli), ఒక సంతులన కణము (Otocyst) ఉంటాయి. జ్ఞానాశయము అవశేష ముస్తీష్కము కావచ్చునని భావిస్తున్నారు.

అంతరాంగ నాడీసంధి జ్ఞాన ఆశయానికి వెనుకగా ఉంటుంది. దానిలో నాడీసంధి కణాలు (ganglionic cells) ఉంటాయి. "కశేరు నాడీదండము" అంతరాంగ నాడీసంధి నుంచి పుచ్చము అంత్యము వరకు వ్యాపిస్తుంది. దీనిని హెచ్చుచాతి సకశేరుకాల కశేరునాడీ దండంతో పోల్చవచ్చు. అది నాడీసంధి ఉబ్బెత్తులను (Ganglionic swellings) కలిగి ఉంటుంది. అవి సమఖండ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. పుచ్చము నుంచి ఐదు జతల నాడులు ఉద్భవిస్తాయి. పృష్ఠవంశంలో పెద్దరిక్తికామయ, స్థితి కణాలు (Turgid cells) ఉంటాయి. ఇవి అంతస్త్వవం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతాయి. పృష్ఠవంశం నాడీదండం క్రింద ఉంటుంది. దానిలో రిక్తికామయ కణాలు ఒక వరుసలో అమరి ఉంటాయి.

పుచ్చము పార్శ్వంగా అణిగి వుంటుంది. దాని అక్షభాగము మందముగా ఉంటుంది. పుచ్చానికి, వెడల్పుగాను మధ్యగాను వుండే పుచ్చవాజము ఉంటుంది. పుచ్చంలో నాడీదండము, పృష్ఠవంశం పుచ్చకండరాలు ఉంటాయి. పుచ్చవాజంలో ఆధారాన్నిచ్చే వాజరేఖలువుంటాయి. అవి అవనయం (Oblique) గా ఉంటాయి. పుచ్చంలో బలిష్ఠమైన మూడు కండర పట్టీలు వుంటాయి. సకశేరుక కండర ఖండితాలవలె ఇవి బాహ్య వమ ఖండిభవనాన్ని చూపుతాయి.

వాజరేఖలతో వాజముదతలతో వున్న పుచ్చము, పృష్ఠవంశము నాడీదండము ఆహారనాళ అంధబాహువుగా ఏర్పడిన హృదయము, మొప్ప చీలికలున్న గ్రసని, కండర పట్టీలు ఇవన్నీ నమూనా సకశేరుక లక్షణాలు.


లార్వా కొంతకాలం చురుకుగా ఉంటుంది. కాని నోరు కవచంతో మూసుకుపోయి నందువల్ల అపోరాన్ని గ్రహించలేదు. అది నీటి అడుగు భాగానికి చేరుకొని అధస్తరాన్ని అంటిపెట్టుకొని రూపవిక్రీయం చెందుతుంది.

30.8 రూపవిక్రీయం

1. పుచ్చము : పుచ్చము కురచ జారుతుంది. ఇది రెండు పద్దతులవల్ల జరుగుతుంది. కొంత పుచ్చభాగము ఊడి రాలిపోతుంది. మిగతా భాగాన్ని భక్షక కణాలు గ్రహించి వేస్తాయి. ఆ విధంగా పృష్ఠవంశము, నాడీదండము, కండర పట్టీలు అన్నీ క్షీణించిపోతాయి.

2. కవచము (Test) : దీంభక బహిష్టచ ఉపకళ ట్యువిసిస్ ని నిమిస్తుంది. ఈ విధంగా కవచం ఏర్పడుతుంది.

3. కలశికలు (Ampullae) : కవచము మీద నాలుగు ప్రముఖ బాహ్యవృద్ధులు (Out growths) ఏర్పడతాయి. ఇవి బహిష్టచ కలశికలు. ఇవి శ్వాసక్రియకు అధస్తరాన్ని అంటిపెట్టు కోవటానికి పునయోగపడతాయి. నాలుగింటిలో రెండు పెద్దగాను రెండు చిన్నగాను వుంటాయి. కొన్ని ఇతర అసిడియన్ లలో చిన్న కలశికలు అభివృద్ధి చెందవు.



పటం 30.3 హెర్ట్ మేనియా - తిరోగమన రూపవిక్రీయం. A. తిరోగమన రూపవిక్రీయం చెందుతున్న టాడ్ పోల్ దీంభకము. B. రూపవిక్రీయ పూర్తిఅయిన తరువాత ఏర్పడిన ప్రాథ జీవి 1. జలశ్వాస రంధ్రాలు 2. సంసజనక సూక్ష్మాంకురాలు 3. గ్రహవి 4. నాడీ ఆశయము 5. నోరు 6. సైపోస్టేస్ యల్ నాఫిక 7. ఆట్రీయమ్ 8. ఆట్రీయల్ రంధ్రము 9. క్షీణిస్తున్న పుచ్చము 10. పృష్ఠవంశము 11. అంత్రము (పేగు) 12. ప్రానారము 13. అపోరనాఫిక 14. హృదయము 15. కవచము 16. సాయువు 17. నాడీ గ్రంథి 18. ఆట్రీయల్ రంధ్రము 19. ఆట్రీయల్ అంకుశ నాళిక 20. పృష్ఠలఘునము 21. కాలేయము 22. అంతస్తవ కలశిక 23. ఎండోస్టైయిల్ 24. జలశ్వాస అంకుశనాళిక 25. జలశ్వాస రంధ్రము 26. నాడీ పంథి.

4. జలశ్వాస గోణి : జలశ్వాస గోణి కుద్యంలో అసంఖ్యామైన మొప్ప చీలికలు అభివృద్ధి చెందతాయి. జీర్ణాశయము పెద్దనాళంగా పెరుగుతుంది. పేగు పొడవు జారి వంకర అవుతుంది. కాలేయ అందికలు ప్రముఖంగా ఏర్పడతాయి.

5. అంకుశ నాళికలు : వెలుపల నున్న కవచం లోభాగం జలశ్వాస, ఏప్రియల్ రంధ్రాల్లోకి అంతర్వలనం చెందుతుంది. ఫలితంగా జలశ్వాస అంకుశనాళిక ఏప్రియల్ అంకుశ నాళిక ఏర్పడతాయి.

6. నాడీ వ్యవస్థ : మస్తీష్కాశయము దాని నేత్ర బిందువులతో, సంతులన కణంతో సహా క్షీణించి పోతుంది. అంతరాంగ నాడీసంధి మినహా నాడీదండం పూర్తిగా క్షీణించి పోతుంది. అంతరాంగ నాడీసంధి అంతరాంగా వాడులుగా మార్పు చెందుతుంది. మస్తీష్కాశయ పూర్వ భాగంలో నాడీ గ్రంథి అభివృద్ధి చెందుతుంది. అది గ్రసనిలోకి తెరుచుకొంటుంది.

7. శరీర భ్రమణము(Rotation of the body) : అధస్తరాన్ని అంటి పెట్టుకొన్న భాగానికి నోటికి మధ్యనున్న ప్రాంతము అతి త్వరగా అభివృద్ధి చెంది 180° లో శరీరము భ్రమణము జరుగుతుంది. జలశ్వాస రంధ్రము, ఏప్రియ రంధ్రము ఒకే తలము లోకి చేరుతాయి. అంటి అధస్తరానికి వ్యతిరేక దిశలో ఏర్పడుతాయి.

8. నోటిని ఆవరించి ఉన్న కవచము విడిపోతుంది. నోటి ద్వారా నిరంతర జల ప్రవాహము గ్రసనిలోకి వెళుతుంది.

9. శరీరం చుట్టు మందంగా ఉన్న గట్టిగా ఉన్న పాక్షిక పారదర్శకంగా ఉన్న కవచం ఏర్పడుతుంది. అది పొదాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

10. రక్తనాళాలు, రక్తకోటరాలు, హృదయము పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

11. మధ్యత్యవము బీజకోశాలను, బీజవాహికలను ఏర్పరుస్తుంది.

ఆ విధంగా చురకుగా, స్వేచ్ఛగా ఈదే లార్వా స్థానబద్ధ జీవిగా మారుతుంది. లార్వా సకళేరుక లక్షణాలను కోల్పోతుంది. కొన్ని సకళేరుక లక్షణాలు మార్పుచెందుతాయి. ప్రాథ జీవి అకళేరుకంగా కనిపిస్తుంది. పురోగమన రూపవిక్రీయకు వ్యతిరేకంగా లార్వాలో తిరోగమన రూపవిక్రీయ జరుగుతుంది. ఇంకా ప్రముఖంగా సకళేరుక లక్షణాలు ఏర్పడవలసి ఉండగా ఉన్న సకళేరుక లక్షణాలు కూడా క్షీణించిపోతాయి. ఈ రకమైన రూపవిక్రీయను తిరోగమన రూపవిక్రీయ (Retrogressive metamorphosis) అంటారు.

ప్రాముఖ్యము : స్వేచ్ఛగా ఈదే లార్వా ఈ ప్రజాతి వ్యాప్తి చెందుటలోను, స్వజాతి పోరాటం (Intra specific struggle) అరికట్టటంలోను ప్రముఖ పాత్రవహిస్తుంది.

30.9 సకళేరుకాలతో సంబంధ బాంధవ్యాలు

స్వేచ్ఛగా ఈదే లార్వా పోల్ డింభకములో గ్రసని మొప్ప చీలికలు, శరీరం అంతపొడవుగా బోలుగా ఉండే నాడీదండము, పుచ్చభాగంలో ఉండే పృష్ఠవంశము ఉంటాయి. ఇవి ప్రముఖమైన కార్డేట్లు అనలావికి ఇవి బలమైన పాక్ష్యాధారాలు. కొన్ని అసిడియన్ల అండాలు ఆంఫియాక్స్ అండాలును పోలుతాయి. విదళనము, గాస్ట్రలేషన్ అసిడియన్లలోను కార్డేట్లలోను ఒకే విధంగా జరుగుతాయి.

అసిడియన్ ప్రాథజీవి కూడా కొన్ని సకళేరుక లక్షణాలను పదర్శిస్తుంది.

1. యూరోకార్డేట్ల జలశ్వాస స్పర్శకాలు ఆంఫియాక్స్ స్పర్శకాంశు పోలుతాయి.
2. యూరోకార్డేట్ల ఏప్రియన్ పెఫలోకార్డేట్ల ఏప్రియన్ వలనే ఉంటుంది.

3. రెండు ఉపవర్గాలలో మొప్ప చీలికలు ఒకే మూదిరిగా ఉంటాయి.
4. క్లేష్టు-శైలికాయుత ఆహార సేకరణ యూరోకార్డేటాలోను, సెఫలోకార్డేటాలోను, పెట్రోమైజాన్ డింభకమైన అమ్మోసిట్ లార్వాలోను ఒకే విధంగా ఉంటుంది.
5. ఈ జీవులలోని ఎండో స్టెయిల్ ను సకళేరుకాలలోని డైరాయిడ్ గ్రంథితో పోల్చవచ్చు.
6. మ్యూరల్ గ్రంథి, వాడీ సంధులను సకళేరుకాల పీయూషగ్రంథి (Pituitary gland) తో పోల్చవచ్చు.

ప్రత్యేక లక్షణాలు :

1. దీనిలోని అనేక ప్రజాతులు స్తబ్దజీవనానిన గడుపుతాయి.
2. ఈ జీవుల శరీర కవచమైన టెస్ట్ (Test) పెయ్లోజ్ వలె నుండి ట్యూనిసిన్ తో నిర్మితమైనది.
3. శరీర కుహరము లోపించిగాని లేదా చాలా వరకు క్షీణించిగాని ఉంటుంది. ఏప్రియమ్ అతిగా వృద్ధి చెందటమే ఇందుకు కారణము.
4. రక్త ప్రసరణ ఏకాంతరంగా వ్యతిరేక దిశలో జరుగుతుంది. రక్తప్రసార ప్రత్యావర్తనాలు కార్డేటాకే పరిమితమైనాయి. ఏ ఇతర జీవులలోను కనిపించవు.
5. డింభకము (Larva) తిరోగమన రూపవిక్రియని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ లక్షణం కూడా జంతురాజ్యంలో మరెక్కడా కనిపించదు.

యూరోకార్డేటాకి, హెమికార్డేటాకి మధ్యని అంతగా పోలికలులేవు. ఉన్నా అవి అంత ప్రముఖమైనవి కావు. గ్రవనిలో మొప్ప చీలికలు ఉండటం వరకే ఈ పోలికలు పరిమితమైనవి. సెఫలోకార్డేట్ కంటే అసిడియన్ ప్రాథ జీవి ప్రాథమికమైనదిగా పరిగణించ బడుతుంది. యూరోకార్డేటాలో శరీర కుహరము లోపించి లేదా బాగా క్షీణించిఉండటము, సముఖండ విన్యాసం లోపించటము ఈ దృక్పథాన్ని బలపరుస్తున్నాయి. గార్స్టాంగ్ 1928లో సకళేరుకాల ఉద్యవాన్ని గురించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినాడు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని 1955లో బెరిల్, 1959లో రోమర్ బలపరచినారు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం సకళేరుకాల పూర్వజీవులు స్తబ్దమైన జీవనాన్ని గడిపేవని, సముద్రనామలని, వడబోత విధానంలో ఆహారాన్ని గ్రహించేవని తెలుస్తోంది.

అసిడియన్లు హెమికార్డేటాకి చెందిన టిలోట్రాంక్ అనుంచి అభివృద్ధి చెంది వుంటాయి. అదికాలం నాటి అసిడియన్లు పుచ్చనహితమైన డింభకాలు (లార్వాలు) అతి కొద్ది కాలం స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని గడిపి ఒక అధస్తరాన్ని (Substratum) అంటేపెట్టుకొని తిరోగమన రూపవిక్రియ ఫలితంగా స్తబ్దజీవితాన్ని గడపటం ప్రారంభించి వుండవచ్చు. ఈ పుచ్చరహిత లార్వాలు వియోటెనీని ప్రదర్శిస్తున్నాయని శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు. (లార్వా దశలో పున్నప్పుడే బీజకోశాలు అభివృద్ధి చెంది ప్రత్యుత్పత్తిని కొనసాగించాలన్న వియోటెనీ అంటారు. ఇవి ప్రాథ జీవులుగా రూపవిక్రియ నొందవు). అవి నదీ ముఖ ద్వారాలకు ఆహారం నిమిత్తం వెళ్లి వుండవచ్చు. అక్కడ కొత్త పరిస్థితులకు అలవాటు పడవలసిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల అవి అతి ముఖ్యమైన శక్తివంతమైన మూర్ఖులను సంతరించుకున్నాయి. ఉదా: శక్తివంతమైన గమనాంగాలు, కండరాలు సామర్థ్యముగల జ్ఞానాంగాలు, విపర్యకాంగాలు ఇవి జీవనానికి అనుకూలంగా ఏర్పడినాయి. మంచి నీటి ఆవాసాన్ని ఎంచుకున్నాక అవి జయప్రదంగానే జీవనాన్ని గడప నారంభించినాయి. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆంఫియాక్సుస్ కూడా ఇదే విధంగా అభివృద్ధి చెంది వుంటుంది.

ఆధునిక కాలానికి చెందిన యూరోకార్డేట్లు కొన్ని ప్రాథమిక లక్షణాలను, కొన్ని క్షీణించిన లక్షణాలను, కొన్ని సకళేరుక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. యూరోకార్డేట్ల పురాజీవ చరిత్రని తెలిపే శిలాజ ప్రమాణము లేని దొరక నందువల్ల నీటి ఉద్యమము, వర్ష చరిత్ర సంకయూత్యకంగానే ఉండిపోయింది.

30.10 స్వపరిశీలనం

1. అసిడియన్ టాడ్ లార్వాలో ఒక వమూనా _____ వర్గ లక్షణాలుంటాయి.
2. ఎన్టోస్టేల్ ను కొంతవరకు వెన్నెముక జీవుల _____ గ్రంథితో నిర్మాణసామ్యం అంటారు.
3. జంతుసామ్రాజ్యంలో చేరిన హెర్డ్ మేనియా కవచంలో వృక్షకణ సంబంధమైన _____ ఉంటుంది.

30.11 సారాంశం

1. విదళనము ఫలితంగా సీల్ బ్లాస్టులా ఏర్పడుతుంది.
2. గాస్ట్రోటేషన్ ఫలితంగా ద్విస్తరిత బ్రూణము ఏర్పడుతుంది.
3. బహిష్టచ కణాలు విభేదనం చెంది మెడ్యుల్లరీ ఫలకాన్ని (Medullary plate) ఏర్పరుస్తాయి. నాడిడండము ఈ ఫలకం నుంచి ఏర్పడుతుంది.
4. అంతస్త్వచ కణాలనుంచి పృష్ఠవంశము అభివృద్ధి చెందుతుంది.
5. నోరు బహిష్టచ అంతర్వలనము (Ectodermal invagination) వలన ఏర్పడుతుంది.
6. మస్టిస్క్ ఆశయము (Cerebral vesicle) వెనుకనున్న బహిష్టచ ప్రాంతము నుంచి ఏప్రియమ్ ఏర్పడుతుంది.
7. ఆహారనాళము ఆర్కెంటరాన్ నుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది.
8. మూడు సంసజనక సూక్ష్మాంకురాలు (Adhesive papillae) పూర్వ ప్రాంతమున ఏర్పడతాయి.
9. శరీర ఉపరితలం మీద కవచము లేదా టెస్ట్ ఏర్పడుతుంది.
10. శరీర కుహరము మధ్యత్వచ విర్మితము.
11. ఏప్రియమ్ ఎక్కువగా అభివృద్ధిచెంది నందువలన శరీర కుహరము క్షీణిస్తుంది.
12. భక్షక కణాలు (Phagocytes) పుచ్చాన్ని పూర్తిగా గ్రహించి నేయటం వలన తోక క్షీణిస్తుంది. అందువలన నకశేరుక లక్షణాలేని ఈ జీవి కోల్పోతుంది.
13. 180° లో దీని శరీరము భ్రమణము (Rotation) చెందుతుంది.
14. జంశ్వాస ఏప్రియల్ రంధ్రాలు యేర్పడుతాయి.
స్వేచ్ఛా జీవితానికి అలవాటు పడి మరుకుగా తిరిగిన డింభకము (Larva) ప్లబ్బజీవిగా రూపవిక్రమం చెందుతుంది.

30.12 స్వపరిశీలనం జవాబు

1. కార్డేటా
2. అవటు (ఔరాయిడ్)
3. పెల్యూరోజ్

30.13 నమూనా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. తిరోగమన రూపవిక్రమ అనగా వేమి ? ఏ జీవిలో ఈ ప్రక్రియ జరుగునో విపులముగా వ్రాయుము.

2. యూరోకార్డేటా సంబంధ బాంధవ్యాలను పేర్కొనుము.

II. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. హెర్డ్ మేవియా లాడ్ సోల్ దీంభకము.

2. గాస్ట్రులేషన్ (Gastrulation).

భాగము-31 పెఫలోకార్డేటా-అంఫియాక్స్

విషయక్రమము

- 31. 1 ఉద్దేశ్యము
- 31. 2 ఉపోద్ఘాతం
- 31. 3 పెఫలోకార్డేటా సాధారణ లక్షణాలు
- 31. 4 అంఫియాక్స్ వర్గీకరణ
- 31. 5 బాహ్య లక్షణాలు
- 31. 6 శరీర కుడ్యము
- 31. 7 కండర వ్యవస్థ
- 31. 8 అస్థిపంజరము
- 31. 9 శరీర కుపారము
- 31.10 అంఫియాక్స్ అంతరంగాలు
- 31.11 ఆహార నాళము
- 31.12 శ్వాస వ్యవస్థ
- 31.13 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
- 31.14 విపర్లక వ్యవస్థ
- 31.15 నాడీ వ్యవస్థ
 - 31.15.1 జ్ఞానాంగాలు
- 31.16 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
- 31.17 స్వపరిశీలనం
- 31.18 సారాంశం
- 31.19 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 31.20 నమూనా ప్రశ్నలు

31.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠంలో అంఫియాక్స్ అంతర, బాహ్య లక్షణాలను విశదంగా తెలుసుకుంటాము. ప్రత్యేకించి సకళేరుక లక్షణాలను వివరంగా గ్రహించవచ్చు.

వెన్నెముక జంతువులకు ఉండే అత్యవశ్యక లక్షణాలైన పృష్ఠపంశం, చోలునాడిదండం, గ్రసని భాగంలో మొప్ప చీలికలు వంటి గుణాలను అద్భుత జీవి అంఫియాక్స్ లో యధాతథంగా చూడవచ్చుననే విషయాన్ని వీవు వివరించగలుగుతావు.

31.2 ఉపోద్ఘాతం

శిరోవ్యవస్థ తప్ప సెఫలోకార్డేటా, కార్డేట్ జంతువుల సామాన్య లక్షణాలకు అద్దంపడుతుంది. ఇతరకార్డేట్ల మాదిరి కాకుండా పృష్ఠవంశం మెదడును దాటి బాగా ముందుకు పెరుగుతుంది. అది కఠినంగా దండంమాదిరిగా తయారయి స్వేచ్ఛగా ఈదడానికి, బొరియ తవ్వడానికి ఉపయుక్తమవుతుంది. ఆంఫియాక్సుస్ (బ్రాంకియోస్టోమా) ఈ ఉపవర్గంలో విశేషంగా తెలిసినట్టి ప్రజాతి. జనసామాన్యం దీన్ని లాన్సెట్ (చిన్నబల్లెడు) అంటారు.

31.3. సెఫలోకార్డేటా సాధారణ లక్షణాలు

1. ఇవి విశ్వవ్యాప్తమైన ఒంటరి సముద్ర జీవులు.
2. ఇవి బొరియ వాసులు, సముద్రంలో ఈద గలవు. శరీరము మత్స్యము ఆకారంలో ఉంటుంది.
3. ఆంఫియాక్సుస్లో పృష్ఠవం ఉంది. కాని ఎసిమ్మెట్రాన్ అనే ప్రజాతి పృష్ఠవ రహితంగా ఉంటుంది.
4. సెఫలోకార్డేట్లలో శిరస్సు, లోపించింది కనుక శిరస్సులోని భాగాలయిన మస్తీష్కము, నేత్రాలు, శ్రవణ పరికరము, లోపించినాయి. దవడలు, ద్వంద్వ ఉపాంగాలు కూడా లోపించినాయి.
5. పృష్ఠవాజము కురుచనైన ముడతవలె ఉంటుంది.
6. పుచ్చవాజము లంబికల రూపంలో ఉంటుంది.
7. శరీరానికి ఉదర పూర్వభాగంలో ఉన్న చర్మము బాహ్యభివృద్ధి ముఖఫణము (Oral hood) గా ఏర్పడుతుంది.
8. ముఖఫణము నుంచి 10-12 జతల శైలికాయుతమైన కడ్డిలవంటి ఆస్యకేసరాలు (Buccal cirri) ఉంటాయి. వీటిని మొప్పలనుకొని పారబడినారు. అందువల్లనే ఈ జీవి ప్రజాతికి బ్రాంకియోస్టోమా అని పేరు పెట్టినారు.
9. ముఖఫణములో ఉన్న విశాలమైన కుహరాన్ని అళిందము (Vestibule) అంటారు.
10. అళిందము ఆధారం దగ్గర వర్తులాకార సంవరణీ విభాజకము (Sphincter Partition) ఉంటుంది. దీనిని పటిస్తరము (Velum) అంటారు. దీనికి పటిస్తర సర్పకాలు ఉంటాయి. నోరు లేదా ఎంటెరోస్టోమ్ పటిస్తరానికి మధ్యగా ఉంటుంది.
11. చర్మము పలుచగా, మృదువుగా, పాక్షిక పారదర్శకంగా స్తంభాకార కణాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. శరీరకుడ్యంలో అవభాసిని, బహిష్కరణము ఉంటాయి.
12. కండర ఖండితాలు 'V' ఆకారంలో (50-85 వరకు) ఉంటాయి.
13. ఏట్రీయల్ లేదా పరిజలశ్వాస కుహరం విస్తరించటం వలన శరీరకుహరము క్షీణించింది
14. గ్రనవి కుడ్యంలో అసంఖ్యాకమైన మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. ఇది ఏట్రీయల్ కుహరంలోకి తెరుచుకొంటాయి. శ్వాస, ఆహారము నిమిత్తము జలప్రవాహము అవిచ్ఛిన్నం (Continuous)గా ఉంటుంది. నోటివించి ప్రవేశించి నీరు గ్రనవి లోకి వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఏట్రీయల్ కుహరంలోకి ప్రవహించి ఏట్రీయల్ రంధ్రము ద్వారా బాహ్యనికి వెళ్లిపోతుంది.
15. కాలేయాంధ్రవాశము (Hepatic caecum) ఒక్కటే ఈ జీవిలో ఉన్న జీర్ణగంధి.
16. రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ, సకశేరుక ప్రసరణ వ్యవస్థలో సాదృశ్యాన్ని సమానత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

17. నాడీవ్యవస్థ కూడా సకళేరుక నాడీవ్యవస్థను పోలుతుంది. బోలుగా ఉండే పృష్ఠ నాడీదండము పృష్ఠవంశానికి పైన ఉంటుంది.
 18. విసర్జక వ్యవస్థ వృక్కాల (నెఫ్రీడియమ్ల) రూపంలో ఉంటుంది. ఇది అనెలిడా జీవుల లక్షణము.
 19. లింగ విభేదనం ఉంది. అసంఖ్యాకమైన బీజకోశాలు సఖండ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. బీజనాళాలు లోపించినాయి.
 20. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా జరుగుతుంది. ఖండిభవనము (Segmentation) సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. డింభకము అసౌష్ఠంగా ఉంటుంది. ఇది రూపవిక్రియ చెంది సౌష్ఠవంగా ఉండే ప్రాథ జీవిగా ఏర్పడుతుంది.
- పెఫలోకార్డేడా ఉప వర్గములో ఒక విభాగము ఉంది. ఈ విభాగం (పెఫలోకార్డా)లో ఆంఫియాక్స్, ఎసిమెట్రన్ (Asymmetron) అనే రెండు ప్రజాతులున్నాయి.

31.4 ఆంఫియాక్స్ — వర్గీకరణ


వర్గము — కార్డేటా

కుటుంబము — పెఫలోకార్డేటా (ఎ కేనియా)

కుటుంబము — బ్రాంకియోస్టోమాటిడి

ప్రజాతి — ఆంఫియాక్స్ (బ్రాంకియోస్టోమా)

అవాసము, అలవాట్లు: ఆంఫియాక్స్ చాలా హెచ్చుగా వ్యాపించిన సముద్రజీవి. ఇది మెడిటరేనియన్ సముద్రంలోను హిందూ మహాసముద్రంలోను ఎక్కువగా దొరకుతుంది. ఇది బొరియవాసి. నీటిలో ఘురుకుగా ఈద గలదు. ఇది లోతు తక్కువ ప్రాంతంలో నివసిస్తుంది.



- పటం 31.4 ఆంఫియాక్స్ — బాహ్య లక్షణాలు A. పొర్చు దృశ్యము B. ఉదర దృశ్యము 1. ఆస్య (ముఖ) కేసరాలు 2. ముఖఫణము 3. త్రోటి 4. కండర ఖండితాలు 5. పృష్ఠ వాజము 6. పృష్ఠవాజ కిరణ పేటికలు 7. పుచ్చవాజము 8. అట్రీయల్ రంధ్రము 9. ఉదర వాజము 10. మెటాస్ట్రాల్ ముడతలు 11. బీజ కోశాలు 12. మయోకొమ్మాటా 13. అశింధము 14. పృష్ఠవంశము 15. ఎసిఫ్లార్ 16. పాయువు 17. ఉదరవాజ కిరణాలు 18. ఉదర తలము.

31.5 బాహ్య లక్షణాలు

ఇది దాదాపు పారదర్శకంగా 2" పొడవులో ఉండే చిన్న జీవి. దీని శరీరము అణగిన్నట్లును, పొడవుగాను రెండువైపుల కూసుగాను ఉంటుంది. పృష్ఠ మధ్యరేఖలో ఆయతంగా ఉండే ఒక ముడత ఉంటుంది. ఇది పృష్ఠవాజము. ఇది పరాంతపు పుచ్చవాజంతో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. పుచ్చవాజము కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉంటుంది. ఉదరభాగంలో ఉదకవాజము కూడా పుచ్చవాజంతో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. పూర్వార్థంలో పృష్ఠవాజము ముఖభాగముతో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది కుచ్చులవలె ఉండే త్వచము. ముఖభాగము ఉదర అంచునుంచి వేలాడుతూ 10-20 అస్య కేసరాలు (Buccal cirri) ఉంటాయి.

ఉదరభాగంలో ముఖభాగం నుంచి ఉదరవాజం దాకా వ్యాపించి ఉన్న భాగాన్ని అధిపార్శ్వకము లేదా ఎపిప్లూర్ (Epipleur) అంటారు. ఎపిప్లూర్ పార్శ్వ అంచుల (Lateral edges) ను మెటాప్లూరల్ ముడతలు (Metaplural folds) అంటారు. వీటినే ఏట్రియల్ ముడతలని కూడా అంటారు. ముఖభాగంలో ఉన్న అవకాశాన్ని (Space) ఆలించము (Vestibule) అంటారు. ఆలించము ఆధారంలో పర్చులాకారంలో ఉండే సంవరణి (Sphincter) ఉంటుంది. దీనిని పటిష్ఠరము (Velum) అంటారు. దీని మధ్యభాగంలో ఎంటిరోస్టామ్ అనే అందాకార రంధ్రము ఉంటుంది. ఆలించము కుడ్యము చక్రాంగము (Wheel organ) ను ఏర్పరుస్తుంది. ఆహార సేకరణకి అత్యవసరమైన సుడి తిరిగే ప్రవాహాన్ని (Whirling current) ఏర్పరుస్తుంది. ఆలించము కప్పు భాగంలో శైలకాయుతమైన హేట్స్ చెక్ గాడి లేదా గర్తము ఉంటుంది. (పటం 31.4)

రెండు మెటాప్లూరల్ ముడతలు కలిసేచోట, మధ్యరేఖలో ఏట్రియరంధ్రం (Atriopore) ఉంటుంది. పరపాయు ప్రాంతమును పుచ్చము (Tail) అంటారు. పృష్ఠతలంలో పూర్వార్థములో కోలికర్ గర్తము (Kolliker's pit) ఉంటుంది. ఇది ప్రాణాంగము. శరీరాన్ని శిర, ఏట్రియ, పరఏట్రియ లేదా ఉదర, పాయు ప్రాంతాలుగా విభజించవచ్చు.

31.6 శరీర కుడ్యము

దీనిలో స్తంభాకార కణాలతో నిర్మితమైన ఏక స్తరిత బహిష్టచము (Epidermis) ఉంటుంది. దీని లోనికొన్ని కణాలు నాడీ కణాలుగాను మరికొన్ని ఏకకణ గ్రంథులు (Unicellular glands) గాను మార్పు చెందుతాయి. బాహ్యచర్మం మీద అవభాసిని (Cuticle) ఉంటుంది. అస్య కేసరాల ఉపకళలో నాడీ కణాలు ఉంటాయి. కొన్నింటితో గట్టి జ్ఞాన కంటక రోమాలు (Stiff sensory bristles) ఉంటే మరికొన్నింటితో శైలకలు ఉంటాయి. బాహ్యచర్మం క్రింద అంతశ్చర్మము ఉంటుంది. అది సంధాయక కణజాలంతో నిర్మితమైనది దానిలో నాడీతంతువులు రక్తనాళాలు ఉంటాయి.

31.7 కండర వ్యవస్థ


కండర స్తరము సమఖండ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. కండరాలు మందంగా పృష్ఠ భాగంలోను, పృష్ఠపార్శ్వ భాగంలోను ఉంటాయి. దాదాపు 60 కండర ఖండితాలు (Myotomes or myomeres or muscle segments) ఉంటాయి. కుడివైపు కండర ఖండితాలు ఎడమవైపున ఉన్న వాటికి ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. అందువల్ల అవి

సౌష్ఠవ రహితంగా ఉంటాయి. అవి 'V' ఆకారంలో రేఖిక శ్రేణులలో అమరి ఉంటాయి. 'V' యొక్క అగ్రాలన్నీ ముందు వైపునకు నెలకొని ఉంటాయి. సంధాయక కణజాల అచ్చదాలు కండర ఖండితలను ఆవరించి ఉంటాయి. వీటిని కండర విభజకాలు (Myosepta or Myocommata) అంటారు. కండరాలన్ని నియంత్రిత రకానికి చెందినవి.

ఈ కండరాల సంకోచము, యధాస్థితికి రావటం అనే ప్రక్రియల వలన గమనము జరుగుతుంది. బొరియలు చేయటంలోను, ఈదటం లోను ఈ కండరాలు కదలికలో ఉపయోగపడతాయి. కండరాలను కప్పి ంత్రయోజక వేష్టనము ఉంటుంది. కాని అది గ్రసని ప్రాంతంలో కొన్ని చోట్లకి మాత్రం పరిమితమైనది.

31.8 అస్థిపంజరము

అంఫియాక్స్‌లో బాహ్య అస్థిపంజరము లోపించినది. పృష్టవంశము మొప్ప దండాలు ముఖ్యమైన అస్థిపంజర నిర్మాణాలు. పృష్టవంశము ఇరువైపుల కూసుగా ఉండే స్థూపాకార దండము. ఇది జీర్ణ నాళంపైన శరీరం పొడవునా ఉంటుంది.



పటం 31.2 అంఫియాక్స్—అంతర్గత నిర్మాణము. 1. కంటి చుక్క 2. ఘ్రాణగర్తము 3. మస్టిస్కోశయము 4. పృష్టవంశము 5. నాడీదండము 6. ఆహారవాహిక 7. పృష్టవాజ కిరణ పేటీకలు 8. పృష్టవాజము 9. పుచ్చవాజము 10. పాయువు 11. ఉదరవాజము 12. ఆట్రియల్ రంధ్రము 13. అంత్యాహార నాళము 14. ఆట్రియమ్ 15. మధ్యాహార నాళము 16. మధ్యాంత్ర అంధ బాహువు 17. మెటాఫ్లూరల్ ముడతలు 18. గ్రసని 19. ప్రాథమిక, ద్వితీయ మొప్పదండాలు 20. మొప్పచీలిక 21. ముఖఫణము 22. ఎంటరోస్టోమ్ 23. ముఖ (ఆస్య) కేసరాలు 24. చక్రాంగము 25. పటిష్ఠరము.



31.9 శరీర కుహరము

ఇతర సకశేరుకాలలో వలెనే అంఫియాక్స్ కూడా (నిజ) శరీర కుహరము (True coelom) లేదా ఎంటెరోస్టీట్ ఆర్కెంటులాన్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. అది పేగు ప్రాంతంలో సువిశాలంగా ఉంటుంది. గ్రసని ప్రాంతంలో ఇది బాగా క్షీణించి గ్రసనికి ఇరుప్రక్కలా పృష్ట పార్శ్వ అయత నాళముగా ఏర్పడుతుంది. ఉదర మధ్యభాగంలో

ఒక అద్వంద్వ అథో అంతః కీలక నాళము (Sub endostylar channed) ఉంటుంది. ప్రాథమిక గ్రాన్ బార్ ద్వారా ప్రయాణించే అయత శరీర కుహర (సీరోమిక్) నాళాలు (Vertical coelomic canals) దీనిని పృష్ఠపార్శ్వ నాళాలతో కలుపుతుంది.

31.10 ఆంఫియాక్స్ ఆంతరంగాలు

గ్రసనిని ఆవరించి విశాలమైన ఏట్రీయమ్ లేదా పరిజల శ్వాసకుహరము ఉంటుంది. బహిష్టచము (Ectoderm) దీనికి అంతర్వేష్టనంగా వుంటుంది. ఇది బాహ్యనికి ఏట్రీయ రంధ్రం ద్వారా తెరుచుకొంటుంది. ఏట్రీయమ్ పూర్వ, పరభాగాలకి అంధ కోష్ఠకాలు (Blind pouches) వ్యాపిస్తాయి. గ్రసని పరభాగంలో అది ఒక జత నాళాలుగా పృష్ఠ శరీర కుహరనాళాలతోకి వ్యాపిస్తుంది. వీటిని బ్రౌన్ గరాటులు (Brown funnels) అని లేదా ఏట్రీయ శరీరకుహర నాళాలనీ అంటారు. బహిష్టచము భాగమే ఏట్రీయమ్. అనుపార్శ్వక పుటాలు (Metapleural folds) ఈ బహిష్టచ భాగాన్ని లోపలికి నెట్టి మూసివేసినట్లు ఉంటుంది. అందువల్ల బాహ్యచర్మము (Epidermis) ఏట్రీయల్ లోపలి వేష్టనంగా ఉంటుంది (పటం 31.2; 31.3)



పటం 31.3 ఆంఫియాక్స్ అడ్డుకోత A. గ్రసని ప్రాంతం నుంచి తీసిన అడ్డుకోత B. పేగు ప్రాంతం నుంచి తీసిన అడ్డుకోత 1. బహిష్కర్మము 2. అంతర్వచము 3. మయోకామ్మాటలు 4. పృష్ఠవంశ ఆచ్ఛాదము 5. పృక్కము 6. మొప్పదండము 7. మొప్ప చీలిక 8. గ్రసని 9. మెటాప్లూరల్ ముడత 10. పృక్కసూక్ష్మింకురాలు 11. ఎండోస్టైట్ 12. ఎపిప్లూర్ 13. ఉదర మహాధమని 14. సబ్ ఎండోస్టైట్ లార్ శరీర కుహరము 15. లసికాంతరాళము 16. అడ్డు కండరము 17. ఆట్రీయమ్ 18. స్త్రీ బీజకోశము 19. శరీర కుహరము 20. మధ్యాంత్ర అంధ బాహువు 21. పృష్ఠ శరీర కుహర నాళము 22. బ్రౌన్ గరాటు 23. పార్శ్వపృష్ఠ మహాధమని 24. కండర ఖండితము 25. అథోగ్రహణి గాడి 26. పృష్ఠవంశము 27. వాడిదండము 28. వాడి కుహరము 29. పృష్ఠవాజ రేఖా పేటిక 30. పృష్ఠవాజము 31. ఆంత్రయోజక వేష్టనము 32. ఉదరవాజ కిరణ పేటికలు 33. ఉదరవాజము 34. అవాంత్ర నాళము 35. ఆంత్రము (పేగు) 36. మధ్య పృష్ఠ మహాధమని.

ఆహార నాళము వివిధ భాగాలలో వివిధ వ్యాసాలుగల తిన్నని నాళము. ఇది పుష్ట ఆంత్రయోజకాలతో అనలంబితమై ఉంటుంది. దీనిని నోరు, ఆవ్య కుహరము లేదా అలిందము, గ్రసని, ఆహారవాహిక, పేగు పాయువు, అనుబంధ జీర్ణ గ్రంథులుగా విభజింపవచ్చు.

పూర్వంతములో ముఖఫణములో ఆవరించబడి వెడల్పుగా ఉన్న రంధ్రము ఉంటుంది. ఇది నోరు. జీర్ణనాళంలో ఈ భాగం ఒకటే అద్యముఖ భాగము (Stomodaeal part). ముఖఫణము అంచునుండి 10 లేక 12 సున్నితమైన గట్టిగా ఉన్న నిర్మాణాలుంటాయి. వీటిని ఆస్యకేసరాలు (Oral cirri or buccal cirri) అంటారు. వాటిమీద జ్ఞాన సూక్ష్మాంకురాలుంటాయి. ఆహార సేవనములో ఈ ఆస్యకేసరాలు ఒక జల్లెడ వలె ఏర్పడుతాయి.

ముఖఫణములో అలిందములేదా ఆస్యకుహరము అనే విశాలమైన కుహరము ఉంటుంది. ఎంటెరోస్టోమ్ (Enterostome) అనే ఒక వర్తులాకార రంధ్రము ద్వారా అలిందము గ్రసనిలోకి తెరుచుకొంటుంది. పటిష్టరము ఎంటెరోస్టోమ్ను ఆవరించి ఉంటుంది.

పూర్వంతములో అది నాడీ దండాన్ని కందర ఖండితాలను దాటి ఉంటుంది. అందువల్లనే ఈ జీవులు ఉండే ఉప వర్గానికి పెఫలోకార్డేటా అను పేరు వచ్చింది. పుష్టవంశంలో ప్రత్యేకతగల పుష్టవంశ కణజాలం ఉంటుంది. పెద్ద ఫలకీకల వంటి కణాలు ఉండటం దీని విశిష్టత. కణాల మధ్యలో ద్రవము నిండిని అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవి స్థితి (Turgidity) లక్షణాన్ని పుష్టవంశానికి అపొదిస్తాయి. పుష్టవంశం చుట్టూ ఆవరించి తంతుయుత సంధాయక కణజాలం ఉంటుంది. దీనిని పుష్టవంశ ఆచ్ఛాదము (Notochord sheath) అంటారు.

ముఖఫణానికి అధారాన్నివేసే వలయాకార అంగుళీయకము (Annular ring) వంటి నిర్మాణము చిన్న మృదులాస్థి తునకతో ఏర్పితమైనది. ప్రతి ఆస్యకేసరానికి ఒక్క తునక అధారాన్నిస్తుంది.

అసంఖ్యాకమైన కురుచని, వెడల్పైన సంధాయక కణజాల పేటికలు. లేదా "వాజరేఖా పేటికలు" (Fin ray boxes) పుష్ట ఉదరవాహికానికి ఊతనిస్తాయి. అటువంటి పేటికల శ్రేణి పుష్టవాజంలో ఒకటి, ఉదరవాజంలో రెండు శ్రేణులు ఉంటాయి.

గిల్ బార్ లకి ఊతనిస్తూ సున్నితమైన అస్థిపంజర మొప్ప దండాలు (Skeletal gill rods) ఉంటాయి. స్థితిస్థాపక గుణం కల తంతువులు, గట్టి జాంతన కణజాలము ఈ మొప్పదండాలను నిర్మిస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో ఒక భాగమైన గ్రసనిని గుర్తించి విశదంగా తెలుసుకునేటప్పుడు మొప్పదండాలను గురించి కూడా ప్రస్తావించటం జరుగుతుంది.

అలింద కుడ్యము అనేక మందమైన శైలికాయుతమైన వేళ్ళవంటి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడతాయి. వీటిని చక్రాంగము అనీ లేదా ముల్లర్ ఆంగము అనీ అంటారు. ఇది అలిందములో ఒక సుడిప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. చక్రాంగము పుష్ట మధ్య భాగంలో అలిందకుడ్యము గ్రంథి సంబంధమైన హేల్స్ చెక్ గాడి లేదా గర్తమును ఏర్పరుస్తుంది. ఇది శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తుంది.


ఎంటెరోస్టోమ్ చివర పటిష్టరంలో ఒక సంవరణి ఉంటుంది. పటిష్టరానికి 6 జతల పటిష్టర సర్పకాలు ఉంటాయి. ఆహార సేవనము సమయంలో ఇవి కూడా జల్లెడ వలె ఉపయోగపడతాయి.

ఆహారనాళంలో అన్ని భాగాల కంటే గ్రసని చాలా పెద్దది, విశాలమైనది. ఇది శరీరంలో పగభాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఇది పార్శ్వంగా అణిగి ఉంటుంది. దీని కుడ్యంలో 150 సన్నని మొప్ప చీలికలు లేదా జలశ్వాస

రంధ్రాలు ఉంటాయి. గ్రసని ఈ రంధ్రాల ద్వారా ఏట్రీయమ్‌లోకి తేరుచుకొంటుంది. 'U' ఆకారంలో ఉండే మొప్ప చీలికలను గిల్ బార్‌లు లేదా జలశ్వాస పటలికలు (Branchial lamellae) వేరుచేస్తాయి. వీటిలో ప్రాథమిక, ద్వితీయ (ద్వితీయ) అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఒక దానికొకటి వికాంతరంగా ఉంటాయి.

ప్రాథమిక బార్ (Primary gill bars) డింభక దశలో ఏర్పడతాయి. అభివృద్ధి జరిగేటప్పుడు ద్వితీయ బార్ లు ఏర్పడతాయి. ప్రాథమిక ద్వితీయ బార్‌లను కలుపుతూ అసంఖ్యాకమైన అడ్డుబార్‌లు (Horizontal bars) లేదా సైనాప్టిక్యులమ్‌లు ఉంటాయి (పటం 34.4 A). ఈ సైనాప్టిక్యులాల వలన గ్రసని సంక్లిష్టంగా (Complicated) ఒక బుట్ట (Basket) వలె తయారువుతుంది. ప్రతి ప్రాథమిక, ద్వితీయ బార్ అకు అస్థిపంజర దండం (Skeletal rod) ఆధారాన్నిస్తుంది. దండం గట్టి జాంతన కణజాలంతో నిర్మితమవుతుంది. ప్రాథమిక బార్‌ల దండాలు ఉదర అంత్యాల దగ్గర చీలి ఫోర్క్ (Fork) వలె ఏర్పడుతాయి. ప్రతి గిల్ బార్ పాక్షికంగా గ్రసని కుడ్యంతోను పాక్షికంగా శరీరకుడ్యంతో నిర్మితమవుతుంది.

ప్రతి ప్రాథమిక గిల్ బార్‌లో శరీరకుహర అవకాశం (Coelomic space) ఉంటుంది. ప్రాథమిక ద్వితీయ గిల్ బార్‌లు తైలికా ఉపకళతో కప్పి ఉంటాయి. గ్రసని ప్రాంతంలోని తైలికలు పాదపుగా ఉంటాయి. వీటిని ముఖ తైలికలు (Frontal cilia) అంటారు. పూర్వ పరతలాలలోని తైలికలను పూర్వతైలికా (Lateral cilia) అంటారు. (పటం 34.4 B).




పటం 34.4 ఆంఫియాక్స్ - శ్వాస వ్యవస్థ A. సైనాప్టిక్యులాలలో ఉన్న ప్రాథమిక ద్వితీయ మొప్ప దండాలు. B. ప్రాథమిక ద్వితీయ మొప్పదండాల అడ్డుకోతలు. సైనాప్టిక్యులాయి. 2. ప్రాథమిక మొప్ప దండము 3. ద్వితీయ మొప్పదండము 4. పుష్టభాగము 5. ఉదర భాగము 6. పూర్వతైలికా గుచ్చము (ముఖతైలికా గుచ్చము) 7. పూర్వ తైలికలు 8. ఏట్రీయమ్ ఉపకళ 9. రక్తనాళము 10. అస్థిపంజర దండము 11. సైనాప్టిక్యులమ్ 12. సీలోమిక్ కుల్య.

డింభక దశలో ఎన్ని కండర ఖండితాలు ఉంటే అన్ని మొప్ప చీలికల సంఖ్య పెరుగుతుంది. గ్రసని కుడ్యంతోని ఉదర మధ్య గాడిని (Midventral groove) ఎండోస్టైయిల్ లేదా అంతః కీలకము లేదా ఆఫ్ గ్రసని గాడి (Hypopharyngeal groove) అంటారు.

గ్రసనీ కుడ్యంలోని పృష్ఠమధ్య గాడిని అధిగ్రసనీ గాడి(Epiphyrnygeal groove) అంటారు. దాని ఉపకళ శైలికాయుతమైనది. గ్రసని పూర్వభాగంలో ఎండోస్టైమ్ని, అధిగ్రసనిగాడిని, పరిగ్రసనీ పట్టికలు (Peripharyngeal bands) కలుపుతాయి. ఇది కూడా శైలికాయుతమైనది.

గ్రసని ఆహారవాహిక (Oesophagus) లోకి తేరుచుకొంటుంది. ఇది సన్నని, కురచనైన శైలికాయుతమైన నిర్మాణము. ఇది పేగు లోకి తేరుచుకొంటుంది. పేగును మధ్యాహారనాళం (Mid gut) గాను, అంత్యాహార నాళం (Hind gut) గాను విభజింపవచ్చు. మధ్యాహార నాళం నుంచి గదాకారం లో ఉన్న అంధకోష్ఠకము ఉదర మధ్య భాగాన కాలేయ అంధబాహువు (Hepatic diverticulum) లేదా కాలేయము (Liver) అని అంటారు. ఇది ఏట్రీయమ్లోకి చొచ్చుకొని వస్తుంది. ఏంజైమ్స్ని స్రవించే గ్రంథి ఉపకళ (Glandular epithelium) ఈ కాలేయ అంధ బాహువులో వేష్టనం (Lined)గా ఉంటుంది. ఆంఫియాక్స్లో ఇది ఒకటే జీర్ణగ్రంథి. ప్రోటియేస్, ఎమైలేస్, లైపేస్ అనే జీర్ణ ఏంజైమ్లను ఇది స్రవిస్తుంది. మధ్యాహార పరాంత భాగంలో శీషాంత్రిక పురీషనాళ అంగుళీయ ప్రాంతము (Ilio-colic ring) ఉంటుంది. దీనిలో శైలికాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి, జీర్ణనాళంలో ఉన్న శైలికలన్నీ నిరంతరంగా కొట్టుకొంటాయి. అప్పుడు ఆహార రజ్జువు ఆయతాక్షము మీద భ్రమణము చెందుతూ ముందుకు సాగుతుంది. అంత్యాహారనాళ పరాంతంలో అసంఖ్యామైన శైలికాలు ఉంటాయి. అంత్యాహార నాళాన్ని పురీష నాళము అంటారు. ఇది పాయువులోకి తేరుచుకొంటుంది. పుచ్చవాణము ఆధారం దగ్గర ఉదరభాగంలో పాయువు ఉంటుంది. ఇది వర్తులాకార రంధ్రము. దీనిని ఒక సంవరణి నియంత్రిస్తుంది (పటం 31.5).



పటం 31.5 ఆంఫియాక్స్ — ఆహారనాళము (బాణాల గుర్తులు ఆహారగమనాన్ని సూచిస్తాయి. 1. అన్యకేసరాలు 2. చక్రాంగము 3. పట్టివర పుర్యకాలు 4. అలిందము 5. ఎంటరోస్టోమ్ 6. మధ్యాంత్ర అంధ బాహువు 7. ఆహార రజ్జువు 8. శీషాంత్రిక పురీషనాళ అంగుళీప్రాంతము 9. పాయువు 10. అంత్యాహార ప్రాంతము 11. శైలికామయ ప్రాంతము (Ciliated tract) 12. ఆహారవాహిక ప్రాంతము 13. మొప్ప చీలికలు 14. గ్రసనీ ప్రాంతము.

ఆహార సేవన విధానము: శైలికాయుత ఆహారసేకరణ లేదా వడపోత ఆహారసేకరణ పద్ధతి (Filter feeding) ఆంఫియాక్స్లో పంజ్ఞిష్టంగా ఉంటుంది. శైలికలు నిరంతర జల ప్రవాహాన్ని కలిగిస్తాయి. డయాటమ్లు(Diatoms) ప్రోటోజోవాలు, డెస్మిడ్లు, డింభకాలు దీనికి ఆహారంగా ఉదయోగపడతాయి. జలప్రవాహం వరుసగా నోరు, అన్యకుహరము ఎంటరోస్టోమ్, గ్రసనిలోకి అక్కడి నుంచి మొప్ప చీలికల ద్వారా ఏట్రీయమ్లోకి అక్కడినుంచి ఏట్రీయ రంధ్రముద్వారా వెలుపలికి వెడుతుంది. అన్యకేసరాలు, ముఖభాగము, చక్రాంగము, పట్టివరము, పట్టివర శైలికలు, శైలికాయుత ఆహారసేకరణలో అనుబంధ అంగాలుగా ఉపయోగపడతాయి. అవన్నీ జాలకంగా ఏర్పడి ఆహార రేణువులను వడపోత పద్ధతిలో సేకరిస్తాయి.

పట్టివర పుర్యకాల వద్ద, అన్యకేసరాల వద్ద చెత్త చెదారాలు పేరుకుపోతే జీవిలోపల ఉన్ననీరు వెనకకు చిమ్మి వెంటనే శుభ్ర పరుస్తుంది. ముందుగా ఏట్రీయరంధ్రము మూసుకొంటుంది. ఏట్రీయమ్ కొద్దిగా పైకి

లేస్తుంది. గ్రహవిఘనపరిమాణం ఉన్నట్టుండి తగ్గుతుంది. వీరు అత్యంత శక్తితో అలించడము ద్వారా బయటకి వెళ్లి వేయబడుతుంది. ఫలితంగా ఆప్యకేసరాలు, పటిష్టర వృర్ధకాలు శుభ్రపడతాయి. గ్రహవిలోని ఆహారరేణువులు ఎండోప్లయిల్ (సవించిన క్లేష్మంతో చిక్కుపడతాయి. క్లేష్మంతో కలసిన ఆహారరేణువులు అధిగ్రహవీ గాడి (Epipharyngeal groove) లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ గాడిలోని శైలికలు వెనుకకు కొట్టుకొనడం వల్ల క్లేష్మరజ్జువు ఆహారవాహికలోకి వెట్టబడుతుంది. కొన్ని పెద్ద రేణువులు ముఖఫణంలోకి పడిపోతాయి. చక్రాంగము ఏర్పరచే మడి ప్రవాహము అక్కడి రేణువులు చిక్కుపడి నిలిచిపోకుండా కాపాడుతుంది. హేట్స్చెక్ గర్తము సవించే క్లేష్మముతో కూడా ఆహారరేణువులు చిక్కుపడతాయి ఆహారంతో కూడిన క్లేష్మముజల ప్రవాహంద్వారా ఎంటెరోస్టోమ్ లోనికి ప్రవేశిస్తుంది.

జీర్ణ క్రియ : ఆహార క్లేష్మరజ్జువు శైలికలు కొట్టుకొనటం వలన ఆహారవాహికలోకి, మధ్యాహారవాళంలోకి చేరుకొంటుంది. అది శీషాంత్రిక పురీషనాళ అంగళీయక ప్రాంతము (Ilio colic ring) లో శైలిక కదలికల వలన భ్రమణముచెందుతుంది. ఎమైలేస్, లైపేస్, పోట్రయేస్ అనే జీర్ణ ఎంజైమ్‌లు మధ్యాహార నాళ అంధబాహువులో ఉత్పన్నమవుతాయి. ఇవి ఆహారాన్ని జీర్ణిస్తాయి. జీర్ణక్రియ పేగులో కూడా కొనసాగుతుంది. మధ్యాహారనాళ అంధ బాహువులో కణాంతర్గత జీర్ణక్రియ (Intra-cellular digestion) జరుగుతుంది. జీర్ణమైనఆహారము అంత్యాహార నాళములో శోణము చెందుతుంది. కణాంతర్గత జీర్ణక్రియ, భక్షక కణ క్రియ (Phagocytosis) ఆంఫియాక్స్‌లో జరగటం గమనార్హము. హెచ్చుజాతి పక్షిచేరుకాలలో ఈ రెండు క్రియలు జరుగవు.

31.12 శ్వాస వ్యవస్థ

ఆంఫియాక్స్‌లో ప్రత్యేకమైన శ్వాసాంగాలుఉండవు. రక్తంలో శ్వాసవర్ణకం లోపించి నందు వల్ల గ్రహని శ్వాసక్రియలో ముఖ్య ప్రాత వహించదు.

అతి హెచ్చుగా శైలికలున్న గ్రహనికి ఆక్సిజన్ సరఫరా కూడా హెచ్చుగానే ఉండవలె. అభివాహి జలశ్వాస గిల్ బార్ల రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. కనుక కావలసినంత ఆక్సిజన్ గ్రహనికి చేరుతుంది. గ్రహని ముఖ్యంగా ఆహారపేకరణకి ఉపయోగించే నిర్మాణము.


శరీర ఉపరితలం మొత్తంమీద పరస్పరసవ్యాపనం (Diffusion) వలన వాయు మార్పిడి జరుగుతుంది.

31.13 రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ

ఆంఫియాక్స్‌ రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సరళం (Simple) గా ఉంటుంది. ఇది బంధిత రకానికి (Closed types) చెందినది. నిరిష్టమైన హృదయము, రక్తంలో శ్వాస వర్ణకము (Respiratory pigment) లోపించినాయి. రక్తము వర్ణ రహితంగాను, కొన్ని శ్వేతకణాలతోను ఉంటుంది. రక్తనాళము సరళంగా ఉంటాయి. కేశనాళికా వ్యవస్థ (Capillary system) లోపించింది. అయినా పూర్తి వ్యవస్థ సకళేరుక పద్ధతిలో నిర్మితమైంది.


గ్రహనికి పరాంతముల ఉదర భాగాన సరళమైన, లఘునమ్మ (bulb) వంటి సిరా సరణి (Sinus venosus) ఉంటుంది. అది శరీరము అన్ని భాగములు నుంచి రక్తాన్ని సంగ్రహిస్తుంది. ఉదర మహాధమని పృష్ఠ మహాధమనులు, అధ్యాంత్ర సిర, కాలేయనిర్వాహక, కాలేయ సిరలు, కార్డినల్ సిరలు మొఖ్యమైన రక్తనాళాలు (పటము 34.6).

ఉదర మహాథమని: : ఉదరమహాథమని (ఎండోస్టైలార్) మహాథమని అంత: కీలక థమని, సిరా పరణి మంచి బయలుదేరిగ్రహని క్రిందుగా మధ్య ఉదరభాగంలో ఆఫ్ అంత: కీలక ప్రాంతంలో (Sub endostylar region) ప్రయాణిస్తుంది. దీనికి సంకోచశక్తి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది యుబద్ధంగా కొట్టుకొనటం వలన రక్తము ముందుకు ప్రయాణిస్తుంది. ఆసంఖ్యామైన ద్వంద్వ పార్శ్వ శాఖలు లేదా అభివాహి శ్వాస రక్తవాళాలు (Afferent branchial vessels) ఉదర మహాథమని మంచి ఉద్యమించి ప్రాథమిక గిల్ బార్ లకి రక్తాన్ని పరఫరా చేస్తాయి. ప్రతి అభివాహి జలశ్వాస థమని గిల్ బార్ ఆధారం దగ్గర కొద్దిగా విస్తరించి చిన్న లకునమునలె ఏర్పడుతుంది. దానికి సంకోచ ప్రకృతి ఉంటుంది. కనుక దీనిని "శ్వాస పూదయము" అంటారు. పైవాప్టిక్యులాల రక్తవాళాలు ప్రాథమిక గిల్ బార్ ల, ద్వితీయ గిల్ బార్ ల నాళాలనుకలుపుతాయి. ద్వితీయ గిల్ బార్ లు రక్తవాళాలు ఉదర మహాథమనితో నేరుగా కలవదని ప్రవృత్తమవుతోంది. ప్రాథమిక, ద్వితీయ గిల్ బార్ లు థమనులు కేశవాళికలుగా ఏర్పడవు. అవి అపవాహి థమనులుగా వెలువడి వెంటనే ఐక్యమై పార్శ్వ పుష్ట థమనులుగా ఇరుప్రక్కలా ఏర్పడతాయి. ప్రతి అభివాహి థమని రక్తప్రక్ష జాలకముగా (Net work) ఏర్పడుతాయి. గ్లోమర్స్ అనబడే ఈ విర్మాణం పుష్టి మహాథమనిలోకి తెరుచుకోనే ముందు ఆదేవైపున ఏర్పడు తుంది. గ్లోమర్స్ పుక్కుము నెఫ్రెడియమ్ (Nephridium) దగ్గర ఉంటుంది.



పటం 31.6 అంఫియూక్స్ రక్తసవరణ వ్యవస్థ 1. కుడి పూర్వ (ముఖ్య) కార్టినల్ సిర 2. కుడి పర కార్టినల్ సిర 3. కార్టోటథమని 4. పార్శ్వ పుష్టి మహాథమనులు 5. మధ్య పుష్టి మహాథమని 6. పుచ్చథమని 7. క్యునియర్ నాళాలు 8. అపవాహి జలశ్వాస థమనులు 9. ఎడమ పర కార్టినల్ సిర 10. కుడ్యసిర 11. పుచ్చసరి 12. అంత్ర కేశనాళికలు 13. అవాంత్ర సిర 14. కాలేయ సిర 15. కాలేయ నిర్వాహక సిర 16. సిరా పరణి 17. ప్రాథమిక అభివాహి జలశ్వాస థమని 18. సంకోచ లకునము 19. ద్వితీయ అభివాహి జలశ్వాస థమని 20. అభి వాహి జలశ్వాస థమనులు 21. ఉదర మహాథమని 22. ఎడమ పూర్వ కార్టినల్ సిర 23. గ్లోమర్స్.

పుష్ట మహాథమని (Dorsal aorta): పార్శ్వ పుష్ట మహాథమనులు అధిగ్రహనిగాడి (Epipharyngeal groove) కి ఇరుప్రక్కల చెరి ఒకటి ఉంటుంది. ప్రతి పుష్ట మహాథమని కార్టోట థమని (Carotid artery) గా ముందుకు ప్రయాణించి ముఖభాగానికి రక్తాన్నిస్తుంది. గ్రహనికి వెనుకగా రెండు పార్శ్వ థమనులు ఐక్యమై మధ్య పుష్ట మహాథమని (Median dorsal aorta) గా రూపొందుతుంది. ఇది పుష్టనంతానికి క్రిందుగా పుష్ట అంత్రయోజకము ధ్వారా ప్రయాణిస్తుంది. పుష్ట మహాథమనికందర ఇండితాలకు ఇండిత థమనులను (Segmental arteries), పేగుకు కొన్ని థమనులను ఇస్తుంది. ఇది ఇంకా ముందుకు ప్రయాణించి పుచ్చథమనిగా పుచ్చాన్ని చేరుకొంటుంది. పేగు కుడ్యాలలో థమనులు అతి సూక్ష్మమైన కేశనాళాల వలె ఉన్న ప్లక్లూన్ని ఏర్పరుస్తాయి.



పటం 31.7 అంఫియాక్టో రక్తప్రసరణ విధానము

అవాంత్రనాళము (Subintestinal), కాలేయ నిర్వాహక (hepatic portal), కాలేయ సిరలు (Hepatic veins) : కేశనాళికల వంటి నాళాలు రక్తాన్ని సంగ్రహించి మధ్యాయత నాళము లేదా అవాంత్ర సిరలోకి చేరుస్తుంది. ఇది పేగు క్రిందుగా వుంటుంది. దీనిలో రక్తము ముందుకు ప్రవహిస్తుంది. ఇది కుడి వైపునకు తిరిగి కాలేయాంధ బాహువు లేదా కాలేయ కుడ్యంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ స్తక్మముగా ఏర్పడుతుంది. దీనిని ప్రాథమిక కాలేయ నిర్వాహక వ్యవస్థగా పరిగణిస్తారు. ఈ వ్యవస్థ సకళేరుకాలలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఒక కురచనైన కాలేయ సిర కాలేయాంధ నాళం కేశనాళికల వంటి నాళాల నుంచి రక్తాన్ని సంగ్రహించి సిరా సరణిలోకి తెరుచుకొంటుంది. పుచ్చం నుంచి పుచ్చ సిరలు బయట దేరి ఆహారనాళం రక్తనాళాల లోకి తెరుచుకొంటాయి.

కార్డినల్ సిరలు : కండర ఖండితాల నుంచి, శరీర కుడ్యం నుంచి రక్తాన్ని ఇరుప్రక్కల నుంచి ఒక జత పూర్వ, ఒక జత పరకార్డినల్ సిరలు సంగ్రహిస్తాయి. ఈ కార్డినల్ సిరలు శరీరకుహరము పై భాగాన పుష్టకుడ్యంలో నుంచి ప్రయాణించి ఎక్సమై క్యువేరియన్ నాళాలను ఏర్పరుస్తాయి. రెండు క్యువేరియన్ నాళాలు సిరా సరణి లోకి తెరుచుకొంటాయి.

పుష్ట శరీరకుడ్యం నుంచి రక్తాన్ని ఒక జత కుడ్య సిరలు సంగ్రహించి పేగు మీదగా ప్రయాణించి సిరా సరణిలోకి తెరుచుకొంటాయి. ఆహారము సరఫరా చేయుట రక్తము ముఖ్యవిధి. ఆక్సిజన్ సరఫరాలో రక్తము ముఖ్య పాత్ర వహించదు.


31.14 విసర్జక వ్యవస్థ

విసర్జక వ్యవస్థలో ప్రాథమిక వృక్కాలు (Protonephridia) ఉంటాయి. ప్రతి వృక్కానికి అసంఖ్యాకమైన సాలెనోసైట్ లు లేదా జ్వాలా కణాలు ఉంటాయి. వృక్కాలు గ్రసనిమీద సఖండ (Segmentally) అమరికను

ప్రదర్శిస్తాయి. దాదాపు మూడు జతలు ఒకే శ్రేణిలో అమరి ఉంటాయి. ప్రతి వృక్కము చిన్నసరిమాణంలో ఉన్న బంధిత నాళము. ఇది పలుచని కుడ్యంతో పాక్షికంగా తైలికాయుతంగాను పాక్షికంగా గ్రంథియుతంగాను ఉంటుంది. ఇది సమకోణం (లంబకోణం Right angle) లో వంగి ఒక పొడవైన అయత భుజముతోను ఒక కురచవైన అడ్డు భుజముతోను ఉంటుంది. అయత భుజము అంధంగా అంతమవుతుంది. ఇది ప్రాథమిక గిల్ బార్ శరీర కుహరనాళంలో ఉంటుంది. అడ్డు భుజము ఉదర తలంలో వృక్కరంధ్రం (Nephridiopore) అనే చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది. ద్వితీయ గిల్ బార్ కి వ్యతిరేకదిశలో అది ఏట్రీయమ్ లోకి తెరుచుకొంటుంది. ప్రతి వృక్కానికి 500 సాలెన్ పైట్లు ఉంటాయి. ఇది అంధబాహువు వంటి ప్రోథాలమీద ఉద్భవిస్తాయి. ఇవన్నీ శరీర కుహర ద్రవంలో మునిగి ఉంటాయి. ప్రతి సాలెన్ పైట్ ఏకకణ నిర్మాణము. ఇది కణదేహము (Cell body) అనే గుండ్రని నిర్మాణంతో అంతమవుతుంది (పటం 31.8). దానికి ఒక కేంద్రకము, పొడవైన నున్నితమైన కదలిక గల జ్వాల వంటి విర్మాణం లేదా కశాభం (Flagellum) ఉంటాయి. అన్నిసాలెన్ పైట్ల నాళాలు వృక్క గహ్వరము (Lumen) లోకి తెరుచుకొంటాయి.

అపవాహి జలశ్వాస ధమని, వృక్కమువద్ద పృష్ఠ శరీరకుహర నాళంలో ఒక రక్త నాళికా గుచ్చాన్ని (Glomerulus) ఏర్పరుస్తుంది. ఏట్రీయ సీల్ మిక్ నాళాలు లేదా బ్రౌన్ గరాటులు (Brown funnels) వివర్ణక ప్రకృతిని కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఇవి గ్రహని పృష్ఠభాగం ఉన్న పెద్ద నాళంవంటి నిర్మాణాలు.

హేల్స్ చెక్ వృక్కము సన్నగా పొడవుగా ఉన్న నాళంవంటి నిర్మాణము. ఇది గ్రహని మీద ఉంటుంది. పరాంతంలో ఇది పటిష్ఠరానికి (Velum) వెనుకగా గ్రహని లోకి తెరుచుకొంటుంది. పూర్వాంతంలో ఇది హేల్స్ చెక్ గర్తములోకి తెరుచుకొంటుంది.



పటం 31.8 అంఫియూక్స్ . A. వృక్కము B. వృక్కములోని ఒక భాగము. C. ఒక సాలెన్ పైట్. 1. సాలెన్ పైట్ 2. అడ్డు బాహువు 3. వృక్కరంధ్రము 4. అయత బాహువు 5. అంధ నాళాలు 6. కశాభము 7. అంధ నాళము 8. కణదేహము 9. కేంద్రకము 10. గహ్వరము 11. నాళిక 12. కశాభము 13. సేచ్ఛాకశాభము.

వృక్క సూక్ష్మాంశురాలు (Renal papillae) ఏట్రీయమ్ లో ఉన్న ప్రంభాకార ఉపకళతో నిర్మితమైన చిన్న సమూహాలు. ఇవి కూడా అనుబంధ వివర్ణకాంగాలుగా భావింపబడుతున్నాయి.

వివర్ణన క్రియను గురించి పరిచయ అవగాహన కలుగలేదు. నైట్రోజన్ సంబంధ వ్యర్థపదార్థాలు (గ్లోమ్యులార్) రక్తనాళికా గుచ్చములోని రక్తం నుంచి వృక్కము సాలెన్ పైట్ లోనికి చేరుకుంటాయి. కదలిక గల

కళాభాలువాటిని ఏటియమ్లోకి తీసుకువెడతాయి. ఇవి ద్రవాభివరణ క్రమతను కూడా నిర్వహిస్తాయని భావిస్తున్నారు.

31.15 నాడీ వ్యవస్థ

నాడీ వ్యవస్థ కేంద్ర, పరిధీయ, మహానుభూత భాగములుగా విభజింపవచ్చును. ఇది నమూనా పకళేరుక పద్ధతిలోనే ఉంటుంది.



కేంద్రనాడీ వ్యవస్థ : నాడీ నాళము పృష్ఠ పంశము పైన మధ్య పృష్ఠరేఖలో ఉంటుంది. ఇది దాదాపు శరీరం పొడుపునా ఉంటుంది. అడ్డుకోతలో ఇది త్రిభుజాకృతిలో ఉంటుంది. నాడీ నాళ కుహరము లేదా కేంద్రనాళము (Central canal) అనే పన్నని కుహరాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. ఈ కుహరంలో మస్తిష్క-మేరుద్రవము (Cerebro-spinal fluid) ఉంటుంది. కేంద్రనాళము పూర్వంతాన మస్తిష్కాశయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కాని నాడీదండము వ్యాసము మారదు. పృష్ఠ అంధబాహుపు (Dorsal diverticulum) అనే బాహ్యభివృద్ధి మస్తిష్కాశయం నుంచి అభివృద్ధి చెంది కేంద్ర నాళం మీద వ్యాపిస్తుంది. మస్తిష్కాశయము (Cerebral vesicle) అడుగు భాగంలో కాలాంబికాంగము (Infundibular organ) ఉంటుంది. బాల్య దశలో మస్తిష్కాశయం నాడీ రంధ్రం ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకుంటుంది. కాని ప్రాథ జీవిలో ఇది మూసుకుపోతుంది. కేంద్ర నాళానికి అతి దగ్గరగా ఎపెండైమా (Ependyma) అనబడే నాడీ రహిత కణాల స్తరము ఉంటుంది. దానిని ఆవరించి నాడీకణాలస్తరము "బూడిద రంగు పదార్థము" ఉంటుంది. దీనిని ఆవరించి దవ్వరహిత (Non-medullated) శ్వేత పదార్థము (White matter) నాడీతంతువులలో ఉంటుంది. ఈ అమరిక నమూనా పకళేరుకంలో కనిపిస్తుంది. కేంద్రనాళం చుట్టూ నాడీకణాల కణ దేహాలు సమూహంగా ఉంటాయి. పకళేరుకాలలో కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది (ముం 31.9).

నాడీ కణాలు రెండు రకాలు.

1. చిన్న కణాలు వీటి పన్నని విద్యాణాలుపరిధీయ నాడులలోకి ప్రవేశిస్తాయి.

2. బృహన్నాడీ కణాలు ఇవి బహు బాహువులతో (Multipolar) పెద్దవిగా సామాన్యకణాలకు మధ్యగా ఉంటాయి. బృహన్నాడీ కణాలకు అతి పొడవైన మందమైన డెండ్రైట్లు ఉంటాయి. ఈ కణాలు, తంతువులు అనెలిడా, క్రస్టేషియన్ కణాలను పోలుతాయి. ఇవి గమనాన్ని సమన్వయ (Coordinate) పరుస్తాయి.

పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థ : పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థలో రెండు జతల కపాల నాడులు ఉంటాయి. ఇవి మస్తిష్కాశయమునుంచి, అనేక కళేరునాడులు నాడీదండం నుంచి బయలుదేరుతాయి. త్రోటి (Rostrum) ముఖభాగము, ఆస్యకేసరాల జ్ఞానాంగాల నుంచి మస్తిష్క నాడులు లేదా పృష్ఠమూలాలు జ్ఞానప్రచోదనాలను నాడీదండానికి తీసుకొని వస్తాయి. శిరోప్రాంతంలో వీటిని అనుగుణమైన ఉదర మూలాలు ఉండవు. పృష్ఠ నాడీదండం నుంచి పృష్ఠ, ఉదర మూలాలు ఉద్భవించి ప్రతి ఖండితానికి చేరుకొంటాయి. ఈ జీవిలో నాడీ మూలాలు ఐక్యము చెందవు కాని హెచ్చు జాతి పకళేరుకాలలో ఇవి కలిసిపోతాయి. ప్రతి కండర ఖండితానికి ఉదరమూలము చాలక నాడులను తీసుకువెడుతుంది. పకళేరుకాలలో వలె ఈ తంతువులు కండర తంతువుల మీదచాలక అంత్య ఫలకాల వద్ద అంతమవుతాయి. ఒకవైపున ఉన్న ఉదర మూలాలు, రెండోవైపున ఉన్న పృష్ఠమూలాలకు ఎదురుగా ఉంటాయి. ఫలితంగా అసౌష్ఠ్యం ఏర్పడుతుంది.



పటం 31.9 ఆంఫియక్స్ నాడీ వ్యవస్థ .A కపాల నాడులు కళేరునాడులతో ఉన్ననాడీదండం పూర్వ భాగం. B. నాడీదండం అడ్డుకోత. 1. మొదటి కపాల నాడి 2. శిరోభాగపు వర్ణకపు చుక్క 3. రెండవ కపాలనాడి 4. ఉదరమూలము 5. పృష్ఠ మూలము 6. మొదటి కళేరు నాడి 7. నాడీ దండము 8. రెండవ కళేరు నాడి 9. నేత్ర బిందువు 10. కేంద్రనాళము 11. నాడీ కణాలు 12. నాడీ తంతువులు 13. ఊతగా ఉంచే తంతువులు 14. పృష్ఠ కణజాలము 15. బృహత్ తంతువులు 16. ఆచ్ఛాదము.

సహజభూత నాడీ వ్యవస్థ : రెండు నాడీ స్లక్షాలున్న ఆనోరనాళకుడ్యంలోని అనియంత్రిత కండరాలను (Involuntary muscles) ఇది నియంత్రిస్తుంది. ఇవి పృష్ఠ మూలాలలో అంతరాంగ నాడుల ద్వారా నాడీదండంతో కలుస్తాయి. ఏప్రియన్ కుడ్యంలో ఉపకళ క్రిందుగా నాడీకణాలుంటాయి. ఇవి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇది జాలక, జ్ఞాన ప్రకృతిని కలిగి ఉండవచ్చు. నాడీ సంధులు విచ్ఛేదనం.

31.15.1 జ్ఞానాంగాలు


ఆంఫియక్స్ జ్ఞానాంగాలు కొద్దిగాను, సరళంగాను ఉంటాయి. ప్రాణ గర్తము లేదా కోలికర్ గర్తము, మధ్యస్థ కేంద్ర నేత్రము (Median central eye) లేదా శిరస్థ వర్ణకయుత బిందువు (Cephalic pigment spot), కాలాంచి కాంగము (Infundibular organ) మొదలైనవి ముస్టిస్కెళయానికి అనుబంధంగా ఉంటాయి. నాడీ దండం మీద నేత్రబిందువులు ఉంటాయి. చర్మం (Integument) మీద స్పర్శ గ్రాహకాలు (Tangoreceptors), ఆప్యకేసరాల మీద, హేచ్చెక్ గాడితోను రసాయన గ్రాహకాలు (Chemoreceptors) ఉంటాయి. కండారలలో జ్ఞాన కణాలు ఉంటాయి.

ప్రాణ గర్తము లేదా కోలికర్ గర్తము: ముస్టిస్కెళయానికి పృష్ఠ పూర్వ ప్రాంతంలో ఎడమ ప్రక్కన, ఈ గర్తము ఉంటుంది. దీనిలో బహిష్కృత శైలికామయ ఉపకళ ఉంటుంది. కాని జ్ఞాన కణాలు ఉండవు. ఇది నాడీ రంధ్రము (Neuropore) ద్వారా ముస్టిస్కెళయానికి కలుప బడి ఉంటుంది. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు దీనిని రసాయన గ్రాహకాంగముగా పరిగణిస్తున్నారు.

మధ్యనేత్రము లేదా శిరస్త వర్ణకయుత బిందువు: ముప్పిష్కాశము పూర్వంతంలో ఒక పెద్ద బిందువు ఉంటుంది. దీనిలో నమూనా కంటిలో ఉండ వలసిన కటకము(Lens) అనుబంధ నిర్మాణాలు దీనిలో లోపించినాయి. కనుక ఇది కాంతి గ్రాహకాంగంగా పనిచేయదు. బహుశ ఇది కాంతిని విరోధించవచ్చు. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులుదీనిని ఉష్ణగ్రాహకాంగముగా భావిస్తున్నారు.

నేత్రాంశములు (Ocelli) లేదా నేత్ర బిందువులు (Eye spots) : ఇవి నాడీ దండం మీద ఉంటాయి. ఇవి కాంతిని గ్రహిస్తాయి. ప్రతి నేత్రాంశం లోను రెండు కణాలుంటాయి. కాంతిని గ్రహించే కటకము వంటి కణము క్రింద భాగంలోను దీనికి పైన సలుపు కలిపిన మట్టిరంగులో కప్పు (Cup) ఆకారంలో టోపీ వంటి వర్ణక కణము ఉంటాయి. ఫలితంగా రేఖితంగా కనిపిస్తుంది. కటకం వంటి నిర్మాణం ఉండి కనుక ఇవి కాంతిని గ్రహిస్తాయి (పటం 31.10)

నాడీదండానికి నేత్రబిందువు పన్నవి తంతువులను పంపిస్తుంది. ఇది ఉదర పార్శ్వ భాగంలో రెండు వరసలో అపొస్థనంగా అమరిఉంటాయి. నేత్ర బిందువుల అపొస్థన అమరిక వలన కాంతి గ్రహణము ఒకవైపునే ఉంటుంది. అందువల్లనే ఈ జీవి సర్పిలాకార (Spiral) గమనాన్ని సాగిస్తుంది.



పటం 31.10 ఆఫియూక్స్ A. నేత్రబిందువులో ఉన్న నాడీ దండము అడ్డుకోత B. ఒక నేత్ర బిందువు 1 నాడీ దండము 2. నేత్ర బిందువులు 3. కేంద్రనాళము 4. పుష్టి కణజాలము 5. వర్ణక కణాలు 6. అగ్రం 7 కటకమువంటి సదార్థము 8. కేంద్రకము 9. నాడీ తంతువు.

కాలాంచిక (Infundibulum): ముప్పిష్కాయము అడుగు భాగంలో పొడవైన శైలికాయుత ప్రంభాకార కణాలు నమూనాగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇది వరకు రోజుల్లో ఇది పకాకేరుక కాలాంచికకు సమజాతంమని భావించేవారు. కాని ఇప్పుడది నేత్రము వంటి నిర్మాణముగా పరిగణింపబడుతోంది. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు దానికి ప్రాసక ప్రకృతి (Secretory nature) కందని భావిస్తున్నారు.

సర్పకాంగాలు (Tangoreceptors) లేదా ఇన్ టెగ్యుమెంట్ లోని జ్ఞాన కణాలు (Sensory cells of Integument): ఇవి ఇన్ టెగ్యుమెంట్ లో అసంఖ్యాకంగా ఉన్న బహిష్టక కణాలు. ఇవి పృష్టతలం లోని బహిష్టకంలో హెచ్చుగా ఉంటాయి. ప్రతి జ్ఞానకణము సున్నితమైన కదురు ఆకారంలో ఉన్న నిర్మాణము. దాని స్వేచ్ఛా అంత్యమునకు ఒక చిన్న రోమం వంటి జ్ఞాన కీలితము (Sensory process) ఉంటుంది. రెండవ అంత్యము ఒక నాడీ తంతువును కలుసు కొని ఉంటుంది. ఈ నాడీ తంతువు నాడీదండము యొక్క పుష్ట

మూలానికి సంధించబడి ఉంటుంది. ఈ కణాలు సర్పగ్రాహకాలుగా ఉండి ఇసుక యొక్క ప్రకృతి (లక్షణాలను) ని పరీక్షిస్తుంది.

జ్ఞాన సూక్ష్మాంకురాలు (Sensory papillae): చిన్న సూక్ష్మాంకురాలు జ్ఞాన శైలికలుకల కణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి ఆవ్యకేష రాలమీద, పటిష్టర పర్యాంగాల మీద ఉంటాయి. ఆవ్యకేషరాల మీద ఉన్న సూక్ష్మాంకురాలు పర్యాంగాలుగాను, పటిష్టర పుర్యకాలు రసాయన గ్రాహకంగాలు గాను విధి నిర్వహిస్తాయి.

అలిందము పై భాగాన (కస్టుభాగం) హేట్స్చెక్ గాడి ఉంటుంది. ఇది రుచి గ్రాహకంగాము (Gustatoreceptor) ఆహారవాళంలో జ్ఞానకణాలు రసాయన గ్రాహకంగాలు కండరాలలో అసంఖ్యాకమైన వాడి అంత్యాలుంటాయి. ఇవి అంతర్గతమైన ఉద్దీపనాలను గ్రహిస్తాయి. వీటిని ప్రాప్రియాసెప్టర్లు (Proprioceptors) అంటారు.

31.16 ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ

ఆంఫియాక్స్స్ ఏకలింగ జీవి. హెచ్చు జాతి సకళిరూపంలో వలెలింగ విభేదనం ఉంది. కాని లైంగిక ద్విరూపకత (Sexual dimorphism) ఉండదు. బాహ్యంగా స్త్రీ పురుష జీవులను గుర్తించలేము.

బీజకోశాలు (ముష్కాలు, స్త్రీ బీజకోశాలు) 26 జతలు సఖండ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అవిగ్రహనీ ప్రాంతం ఉదరపార్శ్వ శరీరకుడ్యంలో రెండు శ్రేణులలో అమరి ఉంటాయి. ఇవి ఏట్రయన్స్ లోకి వాచ్చుకొని వస్తాయి. బీజవాహికలు లోపించినాయి. పరిసక్వము చెందిన శుక్రకణాలు లేదా స్త్రీ బీజకణాలు (అండాలు) శరీర కుపార ఏట్రీయ ఉపకళ చిట్టటం వలన ఏట్రీయన్స్ లోకి ప్రవేశిస్తాయి. బీజకణాలు (Gametes) విడుదల కాగానే తాత్కాలికంగా ఏర్పడిన రంధ్రము మూసుకుపోతుంది. ఈ చిట్ట ప్థలాలను "సిక్తామైసెస్" (Cicatrices) అంటారు. బీజకణాలు ఏట్రీయన్స్ చేరుకొని ఏట్రీయ రంధ్రము ద్వారా సముద్రపు నీటిని చేరుకొంటాయి. ఫలదీకరణం అభివృద్ధి బాహ్యంగా జరుగుతుంది.

31.17 వ్యవర్తిలనం

1. ఆంఫియాక్స్స్ శైలికాహారి. ఈ క్రియ వివిధ అనుబంధ అంగాలతో జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు
2. _____ అనేది ఆంఫియాక్స్స్, హెర్డ్ మేనియాలో ఉండే సామాన్య అవసయం. దీని శైలికా చలనాలవల్లక్షేప్తంలో చిక్కిన ఆహార రేవులు పైకి ఆహార వాహికలో ప్రవేశిస్తాయి.
3. _____ అనే మాంస ఖండాలు ఒక శ్రేణిలో అమరి ఉండి, ఆంఫియాక్స్స్ విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.

31.18 సారాంశం

1. పెఫలోక్టార్డేటా జీవులలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన, జీవిలో శాశ్వతంగా వుండే పుష్కవంశము ఉంటుంది. పూర్వభాగంలో ఇది వాడి దండాన్ని దాటి వుంటుంది. కనుక ఈ ఉపవర్గానికి పెఫలోక్టార్డేటా అనే పేరు వచ్చింది.

2. సెఫలోకార్డేటా ఒంటరి (Solitary) జీవనాన్ని గడిపే సముద్రవాసులు.
3. ఇవి విశ్వవ్యాప్త జీవులు.
4. ఆంఫియాక్సుస్ ఈ ఉపవర్గంలోని సమూహ (Typical) జీవి.
5. ముఖభాగము (Oral hood), ఆలించము (Vestibule), పటివర్తన వృద్ధుకాలు (Velar tentacle), చక్రాంగము (Wheel organ), హేట్చ్‌చెక్ గాడి (Hatschek groove) మొదలైన ప్రత్యేక అంగాలు ఉంటాయి.
6. నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలు, పకకేరుక నాడీ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలతో సారూప్యాన్ని చూపిస్తాయి.
7. విసర్జక వ్యవస్థ వృక్కాం (Nephridia) రూపంలో ఉంటుంది.
8. లింగ భేదం ఉంది కాని లైంగిక ద్విరూపకత ఉండదు.

31.19 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. ఆస్యకేసరాలు, చక్రాంగం, పటివర్తనం.
2. ఎవ్డోస్టైల్.
3. కండర ఖండితాలు, సమఖండ.

31.20 సమూహ ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. ఆంఫియాక్సుస్ బాహ్య లక్షణాలను తెలుపుము.
 2. బ్రాంకియోస్టోమా జీర్ణ వ్యవస్థను, జీర్ణ విధానమును విశదీకరించుము.
 3. శ్వాస వ్యవస్థను వివరించుము.
 4. బ్రాంకియోస్టోమా రక్త ప్రసరణ వివరిస్తూ ఆ వ్యవస్థలోని విశిష్ట లక్షణాలను పేర్కొనుము.
 5. ఆంఫియాక్సుస్ విసర్జన వ్యవస్థను వివరించి దాని ప్రాముఖ్యతను తెలుపుము.
- II. ఈ క్రింది వాటిని 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. శరీర కుహరము
 2. ఆట్రీయం.
 3. ఆహార సేకరణ విధానము
 4. గ్రహని నుంచి అడ్డుకోత
 5. పేగు నుండి అడ్డుకోత
 6. జ్ఞానాంగములు

భాగము-32 ఆంఫియాక్స్ సంబంధ బాంధవ్యాలు

విషయక్రమము

31. 1 ఉద్దేశ్యము
32. 2 ఉపోద్ఘాతం
33. 3 కార్డేట్ లక్షణాలు
33. 4 సకేరుకాలతో బాంధవ్యం
33. 5 అదిమ లక్షణాలు
33. 6 ప్రత్యేక లక్షణాలు
33. 7 స్వపరిశీలనం
33. 8 పారాంశం
33. 9 స్వపరిశీలనం జవాబులు
- 33.10 నమూనా ప్రశ్నలు
- 32.11 పదకోశం

32.1 ఉద్దేశ్యము

ఆంఫియాక్స్‌కు ఇతర సకేరుకాలతో మధ్యన ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యాలను, ఆంఫియాక్స్ ప్రాథమిక లక్షణాలను ఈ పాఠంలో వివరించటం జరిగింది.

ఆంఫియాక్స్‌ను గూర్చి విమర్శనాత్మక పరిశీలన జరిపిన తరువాత దానికి కార్డేట్, వెన్నెముక జంతువులకు ఉండే అంతరబాంధవాన్ని, కొన్ని అదే లక్షణాలను విలుపుకొంటూ అది ఏ విధంగా కొన్ని స్వంత అనుకూలాలను ఏర్పరచుకున్నది అనే విషయాలను వీరు స్పష్టంగా విశదపరచగలుగుతారు.

32.2 ఉపోద్ఘాతం

వివిధ నైవిధ్యజంతు సమూహాల పోలికలుండడం వల్ల ఆంఫియాక్స్ స్థానం జంతుజాలంలో ఒక విశిష్టమైనది. ఆంఫియాక్స్ కనుగొనలేకపోయినట్లయితే జంతు శాస్త్రజ్ఞులు ఆంఫియాక్స్ నంటే జంతువులను పరికల్పించే ప్రోద్బలం ఏర్పడ్డా అశ్చర్య పడవక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా కల్పన చేయడం వల్లనే కార్డేట్ల క్రమ పరిణామ మార్గానికి బాటవేయడమవుతుంది. పూర్వీక కార్డేట్ నంటే జంతువునుండి అదర్శవంతమైన ఒక కార్డేట్ ఉత్పత్తి అది సువిశిష్టంగా ప్రదర్శిస్తుంది.

32.3 కార్డేట్ లక్షణాలు

నాళరూపంలో ఉన్న పృష్ఠ వాడీదండము, చిద్రాలు కలిగిన గ్రువని (గ్రువనిలో అసంఖ్యామైన మొవ్వ చీలికలు ఉంటాయి)

32.4 సకళేరుకాలతో బాంధవ్యం

1. అంపియాక్స్ శరీర నిర్మాణం మత్స్య నిర్మాణాన్ని పోలుతుంది.
2. పుచ్చము లేదా పరపాయు ప్రాంతము (Post anal region) ఉంటుంది.
3. నోరు పూర్వంతపు ఉదర భాగంలో ఉంటుంది.
4. మధ్యవాణ ముడతలు (Median fin folds) ఉంటాయి.
5. మెటాప్లూరల్ ముడతలు ఉంటాయి. మత్స్య భూగంలో కూడా ఇటువంటి ముడతలే ఉంటాయి. **పీచీ** నుంచి ద్వంద్వ వాజాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.
6. సఖండ కండర ఖండితాల అమరిక (Segmentally arranged myotomes) ఉన్నది.
7. శరీర కుహరం సుదృఢ్యచం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది. కవక ఇది విజమైన శరీర కుహరము (True coelom).
8. పృష్ఠ రక్తనాళంలో రక్తము ముందునుంచి వెనుకకు ప్రవహిస్తుండగా ఉదర రక్తనాళంలో వెనుక నుంచి ముందుకు ప్రవహిస్తుంది.
9. కాలేయ నిర్వాహక వ్యవస్థ ఉంటుంది.
10. "కాలేయము" లేదా మధ్యాహారనాళము లేదా కాలేయ అంతర్యామిపు ఉంటుంది. దీనిని సకళేరుక కాలేయంతో పోల్చవచ్చు.
11. చర్మము ద్విస్తరితం (Two layered) గా ఉంటుంది.
12. వాడీ వ్యవస్థ ఉద్భవము, నిర్మాణము సకళేరుకాలను పోలుతుంది.
13. అభివృద్ధి కూడా సకళేరుకాల అభివృద్ధిని పోలుతుంది.

32.5 ఆదిమ లక్షణాలు

1. శిరః ప్రాధాన్యము (Cephalization), ద్వంద్వ వాజాలు అనేక అకళేరుకాలతో వలెనే లోపించినాయి.
2. ఇక్టెనోడర్మిలలో వలెనే ఈ జీవులు పొష్టవ రహితంగా ఉంటాయి.
3. అనెలిడ్లలో వలెనే సమఖండ విన్యాసము ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి కండర ఖండితాలు పూర్వంతం నుంచి వరాంతం వరకు సంపూర్ణ సమఖండ విన్యాసాన్ని చూపుతాయి.
4. అనెలిడ్లలో వలెనే బాహ్య చర్మము ఏకకణ మందము కలిగి ఉంటుంది. సకళేరుకాలలో బహిష్టచము ఘన ఉపకళ (Stratified epithelium) గా మార్పు చెందుతుంది.
5. మృదులాస్థి, ఆస్టినిర్మితమైన అంతరస్థిపంజరము లోపించింది.
6. యూరోకార్డేట్లోను, సెఫలోకార్డేటాలను, అమ్మోసిట్ లార్వా (పెట్రోమైజాన్ డింభకము) లోను ఎండోస్టైయట్ ఉంటుంది. ఇది ఆహార సేకరణ లోను, ఆహార గ్రహణము లోను ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. పెట్రోమైజాన్ ప్రాథ జీవులలోను ఇతర సకళేరుకాలలోను ఇది అవటు గ్రంథి (Thyroid gland) గా మార్పు చెందుతుంది.

7. నాడీ వ్యవస్థ, పుష్టవంశము యూరోకార్డేట్ లో వలనే అభివృద్ధి చెందుతాయి.
8. కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ ప్రాథమిక రకానికి చెందినది. మస్తిష్కము (Brain) చాలాకొద్దిగా విభేదనము చెందినది. పుష్ట, ఉదరమూలాలు విడివిడిగా అసమాన సంఖ్యలో అమరికలో పొష్టన రహితంగా గాను ఉంటాయి.
9. ఎండోస్టయిల్, అధిగ్రహనీ గాడి (Epipharyngeal groove), పరిగ్రహనీ పట్టికలు (Peripharyngeal bands) వడపోత విధానంలో ఆహారాన్ని గ్రహించడానికి ఉపయోగిస్తాయి. ఈ పద్ధతి యూరోకార్డేట్, పెఫలోకార్డేట్ లలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అమ్మోసీట్ లార్వాలోను, ఎంటరోమ్యూస్టా దింభకాలలోను, ఆంఫీబియన్ ల లార్వాలోను ఆహార పేకరణ ఈ పద్ధతిలోనే జరుగుతుంది. ఇది ప్రాథమిక పద్ధతి అని విస్మందేహంగా చెప్పవచ్చు.
10. అహారనాళం తిన్నగా (straight gut) ఉంటుంది. ఇది అకళేరుక లక్షణం. పకళేరుకాల ఆహారనాళంలోని పేగు శిక్యరూపం (Loop) లోకాని, మెలితిరిగి (Coiled) గాని ఉంటుంది. శరీర పరిమాణం కంటే ఆహారనాళం ఎక్కువ పొడవుగా ఉండటం వలన పేగు మెలి తిరుగుతుంది. కాలేయాంధబాహువు (Hepatic diverticulum) మాత్రమే ప్రావక ప్రకృతిని కలిగి ఉంటుంది. పకళేరుకాలలో కాలేయం, క్లోమము ఉంటాయి.
11. ఆంఫీయాక్స్ శరీరకుహారం ఇకైనోడర్మ్ శరీర కుహరాన్ని పోలుతుంది. రెండింటి లోను అది ఆర్కెంటరాన్ నుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది (Enterocoelous). పకళేరుకాలలో ఆంధ్రకుహార శరీరకుహారం (Enterocoelous coelom) మార్పుచెంది ఏర్పడుతుంది.
12. ఆంఫీయాక్స్ శ్వాస వ్యవస్థ ముఖ్యంగా జలశ్వాస జాలక విర్మాణం (Branchial basket), హెమికార్డేట్లా ఉపవర్గానికి చెందిన బెల్గోస్టేజిన్ శ్వాస వ్యవస్థతో పూర్తిగా పోలి వుంటుంది.
13. విసర్జక వ్యవస్థ ప్లాట్ వర్మ్ ల (Helminths), అవెలిడీల విసర్జక వ్యవస్థతో పోలుతుంది.
14. ఆంఫీయాక్స్ పుష్టవంశము జీవితాంతం మార్పుచెందకుండా ఉంటుంది. పకళేరుకాలలో ఇది కళేరు దండం (Vertebral column) గా రూపాంతరం చెందుతుంది.
15. ప్రాణాంగాలు, దృష్టి అంగాలు, శబ్ద గ్రహణ అంగాల వంటి ద్వంద్వ జ్ఞానాంగాలు ఉండవు.
16. పుష్టవంశము అధిక శిరః ప్రాధాన్యము ఏర్పడలేదు. దీనికి పెరుగుదల కారణం కావచ్చును. (అందువల్లనే పెఫలోకార్డేట్లా అని పేరు వచ్చినది). శిరస్సు లోపం వలన కపాలము, మస్తిష్కము శిరస్సులోని జ్ఞానాంగాలు ఏర్పడలేదు.
17. పకళేరుక వృక్కము ఉండదు. అవెలిడాలో ఉండే ప్రాథమిక వృక్కా లే దీనిలోను ఉన్నాయి. పకళేరుకాలలో వృక్కము మధ్యస్థవం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది.
18. ఆంఫీయాక్స్ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కూడా ప్రాథమిక లక్షణాలు కలిగి ఉంది. హృదయము ఏర్పడలేదు. రక్తనాళాలు ధమనులుగా, సిరలుగా విభేదనము చెందలేదు. శ్వాస వర్ణకము (Respiratory pigment) ఉండదు.
19. బీజ కోశాలు (Gonads) హెచ్చు సంఖ్యలో ఉండి సమఖండ విన్యాసాన్ని పదర్శిస్తాయి. బీజవాహికలు లోపించినాయి. ఇది అకళేరుక లక్షణము. పకళేరుకాలలో బీజకోశాల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోతుంది. సాధారణంగా ఒక జత ఉంటాయి. బీజ వాహికలు ఏర్పడతాయి.

32.6 ప్రత్యేక లక్షణాలు

- 374 1. పుష్టవంశము : పుష్ట వంశము, నాడీదండము కంటే పొడవుగా ఉంటుంది. దీని అధిక వృద్ధి త్వరగా అది వేగంతో బొరియలు చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

2. ఏట్రేయమ్ : సున్నితమైన గ్రసనిని పరి రక్షించటానికి ఏట్రేయమ్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది.
3. అసౌష్ఠ్యము లేదా సౌష్ఠ్య రహితము : సున్నితమైన గ్రసనిని పరి రక్షించటానికి ఏట్రేయమ్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది.
4. అలీందముతో కూడిన ముఖభాగము : ముఖభాగముతో ఆన్యకేపరాలు (Buccal cirri), పటిస్తర పుచ్చకాలు(Velar tentacles) బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి. ఇది ఆహార సేకరణ పద్ధతిలో విస్తృతంగా ఉపయోగపడతాయి. చక్రాభ అంగము (Wheel organ) లేదా ముల్లర్ అంగము(Organ of Muller) అలీందముతో నిరంతరంగా జలప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ నిర్మాణము, దీని విధి నిర్వహణ ఆంఫియాక్సన్ కే పరిమితమైనది.

ఆహార వాహికతో అలీందము మాత్రమే ఆద్యముఖ భాగము (Stomodaeal part). అందువలన నోటి స్థానము (Position of the mouth) వివాదాంశముగా పరిణమించింది. కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ఎంటెరోస్టోమ్ నేరుగా గ్రసనిలోకి తెరుచుకుంటుంది. కనక దీనినే నోరుగా పరిగణిస్తున్నారు.

5. గ్రసని : విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందిన గ్రసని అధిక పరిమాణంలో నీటిని జీవికి అందజేస్తుంది. అట్లా నిరంతరాయంగా వచ్చే నీటి ప్రవాహంతో కావలసినంత ఆహారం జీవికి అందుతుంది.
6. మొప్ప చీలికలు : గ్రసనిలో అధిక సంఖ్యలో మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. నీటి లోని శైలికలు కొట్టుకొనుట వలన నిరంతర నీటి ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది. ఆహార రేణువులు జారిపోకుండా శైలికలు సహాయపడుతాయి.

గ్రగరీ అనే శాస్త్రవేత్త ఆంఫియాక్సన్ ని ప్రత్యేకీకరణము చెందిన, క్షీణించిన ఆప్టోకోడర్మలుగా వర్ణించినాడు. (ఆప్టోకోడర్మలు విలుస్తమైన అహను కశేరుకాలు (Agnathans). ఇవి ఘన కవచాన్ని కలిగి ఉండి ఆర్థోవిషియన్ కాలానికి చెందినవి).

సెఫలోకార్డేటా (ఏకేనియ) యొక్క సరియైన స్థానము ఇంకా నిర్ధారించ బడలేదు. దీని విస్తృతమైన అధ్యయనము వలన ఇది సకశేరుకాలకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్లు నిశ్చయమవుతుంది. ఇవి ఫైలారియన్ కాలానికి చెందిన మత్స్యముల వలె నుండిన జీవులను పోలుతున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఆధునిక మత్స్యాలు ఇటువంటి జీవుల నుంచే ఉద్భవించి ఉంటాయి.

32.7 న్యపరిశీలన

1. వెన్నెముక జంతువులలో ఆంఫియాక్సన్ బాంధవ్యం దిగువ చెప్పిన అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణాలుండడం వల్ల నిరూపితమవుతున్నది.
 - i) _____
 - ii) _____
 - iii) _____
2. _____ మొదలైన ఆంఫియాక్సన్ అతిముఖ్యమైన ఆదిమలక్షణాలు.
3. ఆంఫియాక్సన్ జీవన విధానం, పరిపూర్ణంగాను, అత్యంత ప్రత్యేకంగాను ఉండే ఈ రెండు విర్మాణాలు అంటే _____ పై ఆధారితమై ఉంది.

32.8 సారాంశం

1. ఆంఫియూక్స్కి వర్గ ప్రాముఖ్యం ఉంది.
2. ఈ ప్రజాతికి ముఖ్యమైన మూడు పకళీరక లక్షణాలు ఉన్నాయి.
3. దీనిని నిర్మాణంలో ఉన్న మత్స్యముగా అభివర్ణించినారు.
4. దీనిలో అనేక ప్రాథమిక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఉదా: హెర్మింఫీస్ లోను, అనెలిడ్ లో ఉన్నట్లు దీనిలో అదివృక్కు వ్యవస్థ ఉంది.
5. శ్వాస వ్యవస్థలో ఇది బెలనోగ్లసన్ ని పోలుతుంది.
6. హెర్డ్మేనియాలో మాదిరిగా దీనిలో కూడా ఏట్రీయమ్, ఎండోస్టైట్ ఉంటాయి.

32.9 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. i) కండర సమఖండ విన్యాసం
ii) ఎన్టెరో సీల్
iii) నిర్వాహక వ్యవస్థ
2. పృష్ఠవంశం, శైలికాయుత ఆహార నేకరణ, శిరరహితం, ప్రాథమిక వృక్కాలు.
3. పృష్ఠవంశం, ముఖపణం

32.10 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. ఆంఫియూక్స్ సంబంధ బాంధవ్యములను విపులీకరించుము.
 2. బ్రాంకియోస్టోమా (ఆంఫియూక్స్)ను "పిర్మడుతున్న మత్స్యము" (Fish in making)గా అభివర్ణిస్తారు. ఎందుచేత ? సోదాహరణముగా వివరించుము.
- II. క్రింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబుల వ్రాయుము.
 1. ఆంఫియూక్స్ లోని అదిమ లక్షణాలను క్లుప్తంగా చర్చించుము.
 2. ఆంఫియూక్స్ ప్రత్యేకత లక్షణాలను ఉల్లేఖింపుము.

32.11 పదకోశము

Affinities : ఇతర జీవులతో కల సంబంధ బాంధవ్యాలు.

Atrio-coelomic canal : ఆంఫియూక్స్ గ్రువి పరభాగంలో వృష్ణ శరీర కుహర కుల్యలలోకి వ్యాపించి ఉన్న ఏట్రీయమ్.

ఏట్రీయమ్ (Atrium) : గ్రువిని ఆవరించి బహిష్కరణముతో వేష్టనము చెందిన విశాలమైన కుహరము

జంశ్వాస గోణి (Branchial Sac), మొప్ప కోష్ఠకము (Gill pouch) : 'U' ఆకారంలో ఉండే మొప్ప చీలికలను కలిగి ఉన్న గోణి వంటి శ్వాస నిర్మాణము. ఇది మొప్ప రంధ్రం ద్వారా వెలువలికి తెరుచుకొంటుంది.

జంశ్వాస పుష్పకాలు (Branchial tentacles) : అంకుశవాలిక ఆధారం దగ్గర ఉండే శాఖలుగా ఏర్పడి సున్నితమైన నిర్మాణాలు.

జంశ్వాస జనన ప్రాంతము (Branchiogenital region) : బెలనోగ్లాసన్ లో మొండెములో మొప్ప రంధ్రాలు ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉండే ప్రాంతము.

బ్రౌన్ గొట్టాలు (Brown funnels) : ఏట్రీయోసీలోమిక్ కుళ్ళు (Atrio coelomic canals).

అస్యకేసరాలు (Buccal cirri or Oral cirri) : అంఫియాక్స్ లో ముఖఫణపు ఉదరాంతంలో ఉండే పాదమైన నిర్మాణాలు.

అస్య అంధబాహువు (Buccal diverticulum), స్టోమోకార్డ్ (Stomochord) : బెలనోగ్లాసన్ అస్యకుహరంలోని కప్పుభాగంలో ఉండే బోలు, కురచమైన గట్టి నిర్మాణము.

సీలోబ్లాస్టులా (Coeloblastula) : మధ్యత్వర నిర్లితమైన, శరీర కుహరోపకళతో వేష్టవమైన శరీర కుహరము.

కాలర్ (collar) : బెలనోగ్లాసన్ లో తుండము వెనుక ఉండే భాగము.

కాలర్ కార్డ్ (Collar cord) : కాలర్ లో ఉండే పుష్టనడి తంతువు.

పుష్టవక్రకము (Dorsal Lamina) : హెర్డ్ మేనియాలోని జంశ్వాస గోణిలో పుష్ట మధ్యరేఖ నుంచి వేలాడే పట్టి వంటి ముడత.

పుష్టకోటరము (Dorsal Sinus) : బెలనోగ్లాసన్ హృదయము.

పుష్టతటవము (Dorsal tubercle) : హెర్డ్ మేనియాలో గ్రసనీ పూర్వమండలంలో ఉన్న గుండ్రవి చిన్న జ్ఞానాంగము.

ఎండోస్టైల్ (Endostyle or Hypopharyngeal groove) : అంఫియాక్స్ లోని గ్రసనీ కుడ్యములో ఉన్న ఉదర మధ్యగాడి.

ఎంటరోస్టోమ్ : అంఫియాక్స్ పటిస్తరము (Velum) మధ్యన ఉన్న అందాకార రంధ్రము. ఇది గ్రసనీలోకి తెరుచుకొంటుంది.

అధిగ్రసనీ గాడి (Epipharyngeal groove) : అంఫియాక్స్ లోని గ్రసనీ కుడ్యం లోని పుష్ట మధ్యగాడి.

ఎపిప్లూర్ (Epipleur) : అంఫియాక్స్ లో ముఖఫణానికి, ఉదర వాజానికి మధ్య అణిగి ఉన్న పార్శ్వ భాగము.

గాస్ట్రులా (Gastrula) : తృతీయ పిండభివృద్ధి దశ. ఈ దశలో పిండంలో రెండు పొరలు ఉంటాయి.

మొప్ప విభాజకము (Gill Septum) : ఒక మొప్ప గోణి ముందర కుడ్యం మరొక మొప్ప గోణి వెనుక కుడ్యంతో కలిపిన భాగము.

రక్తనాలికా గుచ్చము (Glomerulus), తుండ గ్రంథి (Proboscis gland) : బెలనోగ్లాసన్ లో అసవాహితమములు ఏర్పరచే రక్త గుచ్చము.

హేట్చ్ చెక్ గాడి (Hatschek's groove) : అంఫియాక్స్ లో అభిందము (Vestibule) లో ఉండే గ్రంథి సంబంధమైన గాడి.

హార్టికాశయము (Heart vesicle) : బెలనోగ్లాసన్ లో దాదాపు త్రిభుజాకారంలో ఉండే సంకోచశక్తిగల నిర్మాణము. దీని ఇరుస్క్రల రక్తనాలికా గుచ్చం ఉంటుంది.

కాలేయ అంధ నాళము (Hepatic caecum) : అంఫియాక్స్ లో మధ్యాహార నాళము లేదా కాలేయం నుంచి ఏర్పడే గదాకార కోష్ఠకం వంటి నిర్మాణము.

ఉభయ లైంగికత (Hermaphrodite) : పురుష స్త్రీ లైంగికావయవాలు ఒకే జీవిలో ఉండటం.
 శీషోత్రిక పురీషాశయ అంగుళి ప్రాంతము (Iliocolic ring) ఆంఫియాక్స్‌లో మధ్యాహారనాళిక పరాంత భాగంలో దట్టంగా శైలికలున్న ప్రాంతము.
 కోలికర్ గర్తము (Kolliker's pit) : ఆంఫియాక్స్ పూర్వ పృష్ఠతలంలో ఉన్న చిన్న పూత గర్తము.
 లాంగ్వెట్‌లు (Languets) : హెర్మమేనియాలోని పృష్ఠ పత్రకము (Dorsal lamina) నకు పేర్చా ఉపాంతం (free margin)న ఉన్న శంకు ఆకార నిర్మాణాలు. అవి చుట్టుకొని ఆహారవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
 మధ్యనేత్రము (Median eye) : ఆంఫియాక్స్ మస్తొస్కిశయము పూర్వాంతంలో ఉండే ఖర్చుక పదార్థము మెటాప్లూరల్ ముడతలు (Metapleural folds) : విపిప్లూర్ పార్శ్వపు అంచులు.
 ముల్లర్ అంగము (Muller's organ), వక్రాంగము (Wheel organ) : ఆంఫియాక్స్ అలీంద కుడ్యంలో శైలికాయుతమైన వేళ్లవంటి గట్టు (Ridges) .
 మయోకోమ్మాటా (Myocommta), మయోటోమ్‌లు (Myotomes) : కండర ఖండితాలు.
 నెఫ్రీడియం (Nephridium) : ఆంఫియాక్స్‌లో విసర్జకాంగము. దానిలో ఒక పొడవైన అంగము (భుజము), ఒక కురుచ అంగము ఉంటాయి.
 నాడీ గ్రంథి (Neural gland) : హెర్మమేనియాలోని విసర్జకాంగము. ఇది అందాకారంలో ఉన్న చిన్న నిర్మాణము. రెండు అంకుశ నాళికల మధ్యలో ఉంటుంది.
 నాడీ కుహరము (Neurocoel) : నాడీ దండములోని కుహరము
 నేత్రాంశాలు (Ocelli) : నాడీ దండం మీద ఉండి వేత్రాల వలె ఉపయోగపడతాయి.
 గ్రసని (Pharynx) ఆహారనాళము లోని ఒక భాగము. అన్యకుహరము తరువాత ఉంటుంది. పృష్ఠభాగము శ్వాసకర్మ వలెను, ఉదర ప్రాంతము జీర్ణనాళముగాను ఉపయోగపడతాయి.
 అన్యపూర్వ శైలికాంగము (Preoral ciliary organ) : బెలనోగ్లాసన్‌లో తుండము ఆధారంలో 'U' ఆకారంలో ఉండే బహిష్కర్తగర్తము.
 తుండము (Proboscis or Protosome) : బెలనోగ్లాసన్‌లో కురుచవైన పూర్వభాగము.
 తుండ అస్థిపంజరము (Probosics Skeleton) : బెలనోగ్లాసన్‌లో తుండములో ఉన్న ఫలకము వంటి నిర్మాణము.
 ప్రాప్రియోసెప్టర్‌లు (Proprioceptors) : అంతర్గత ఉద్దీపనాలను క్రియ (Response) ను పొందే జ్ఞానాంగము.
 ప్రోటోగైనస్ (Protogynous) : స్త్రీ బీజకోశము ముందుగా అభివృద్ధి చెంది పక్వతకి వచ్చుట.
 పుచ్చరుజ్జుపు (Pygochord) : బెలనోగ్లాసన్‌లో ఉదర ప్రాంతంలో ఉండే గట్టి దండము వంటి నిర్మాణము
 పైలోరిక్ గ్రంథి (Pyloric gland) : హెర్మమేనియా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించినద జీర్ణగ్రంథి.
 తిరోగమన రూపవిక్రీయ (Retrogressive metamorphosis) : అసిడియన్ డింభకములో అభివృద్ధి చెందిన, పక్షిరూప లక్షణాలను ప్రదర్శించే ముఖాంగాలు క్షీణించి, అదృశ్యమైన తరువాత ప్రాథ జీవి ఏర్పడుతుంది.
 పురోగమనము చూపవలసిన డింభకము తిరోగమిత లక్షణాలను చూపుతుంది.
 లైంగిక ద్విరూపకత (Sexual dimorphism) : ప్రకృతిలో స్త్రీ పురుష జీవులు విడివిడిగా (విభేదనంతో) ఉండటం.
 అస్థిపంజర దండము (Skeletal rod) : ప్రాథమిక, ద్వితీయ గిల్‌బార్‌లకు ఉపనిచ్చే నిర్మాణము
 సాలెనోసైట్ (Solenocyte) : ఆంఫియాక్స్ వృక్కము (Nephridium) అంధ బాహువులో ఉండే గుండ్రని ఏకకణ నిర్మాణము.

శ్వాస రంధ్రాలు (Stigmata) : శ్వాస గోళికి ఉండే రంధ్రాలు. వీటి ద్వారా వీరు గోళి నుంచి ఏట్రీయమ్ లోకి పోతుంది.

సైనాప్టిక్యులాలు (Synapticulae) : ప్రాథమిక, ద్వితీయ గిల్ బార్లను కలిపే అడ్డుదండాలు, కవచము (Test), ట్యూనిక్ (Tunic) : తోలు పలే నుండంగా పాక్షిక పారదర్శకంగా ట్యూనిసిన్ ఆవేపదార్థంతో నిర్మితమైన కవచము.

టంగ్ బార్ (Tongue bar) : మొవ్వు చీలికల రెండూ అంగాలను (భుజాలను -Limbs) వేరు చేసే భాగము.

టార్నేరియా (Tornaria) : బెలవోగ్లాఫస్ డింభకము. ఇకైవోడర్మటా వర్గానికి చెందిన ఆప్టిరియస్ బైపెన్టీరియా డింభకాన్ని పోలుతుంది.

ట్రాబెక్యులాలు (Trabeculae) : హెర్మమేవియాలో శ్వాస గోళిని శరీరకుద్యానికి కలిపే సున్నితమైన బోలు తంతువులు.

వెలర్ వర్మకాలు (Velar tentacles) : ఆంఫియూక్స్లోని వెలర్ వర్మ నుంచి అభివృద్ధి చెందే జ్ఞాన విర్మాణాలు.

వెలమ్ (Velum) : ఆంఫియూక్స్లో అలందము ఆధారం దగ్గర ఉండే వర్తులాకార సంవరణి (Sphincter).

అలందము (Vestibule) : ఆంఫియూక్స్లో ముఖభాగముచే ఆవృతమైన భాగము.

BRAOU

డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

బి.యస్.సి. రెండవ సంవత్సరపు పాఠ్యప్రణాళిక

జంతుశాస్త్ర కోర్సు-1

పేషరు-1 అకశేరుకాలు మరియు ప్రోటోకార్డేట్సు.

ఖండిక-1 అకశేరుకాలు

జంతుశాస్త్రము గురించి సామాన్య పరిచయము.

జంతు వర్గీకరణ మరియు సిస్టెమాటిక్స్ మూత్రాలు.

ప్రోటోజోవా-తరగతుల వరకు వర్గీకరణ, దాని సామాన్య లక్షణాలు మరియు ఉదాహరణలు.

ఎల్వీడియం, మోనోసిస్టిస్ మరియు వర్మిఫెర్లా యొక్క బాహ్యలక్షణములు మరియు జీవిత చరిత్రలు.

మానవునికి సంబంధించిన ప్రోటోజోవా వ్యాధులు (కాలాజార్, అమీబియాస్, మలేరియా) వాని జీవిత చక్రాలు, వ్యాధిగ్రస్తత-వానిని అదుపులో పెట్టుకున్నారు.

ఫిరిఫెరా వర్గ సామాన్య లక్షణాలు, తరగతులు వరకు వర్గీకరణ, కొన్ని ఉదాహరణలు, పైకాన్ము ఒక నమూనాజీవిగా చదువులు.

విడేరియా వర్గ సామాన్య లక్షణాలు, తరగతులు వరకు వర్గీకరణ, ఉదాహరణలు.

బిలిరియా ఒక నమూనా జీవిగా అధ్యయనము.

ప్లాటీ హెల్మింథిస్ సామాన్యలక్షణాలు, తరగతుల వరకు వర్గీకరణ మరియు ఉదాహరణలు.

మానవుడు మరియు పెంపుడు జంతువుల ముఖ్యమైన ప్రిమిటోడ్ మరియు పెస్టోడ్ పరాన్న జీవుల పాష్చాతా హెపాటికా, సిస్టోసోమా హిమటోబియం.

టీనియా సోలియం, ఎక్టెనోకోకస్ (గామ్యబోసస్)

జీవిత చక్రాలు, వ్యాధిలక్షణాలు మరియు వాని వియంత్రణ పద్ధతులు.

ఆస్క్ హెల్మింథిస్ సామాన్య లక్షణములు, తరగతులు వరకు వర్గీకరణ ఉదాహరణలు.

ముఖ్యమైన నిమటోడా పరాన్నజీవులు-ఆస్కారిస్ లుంబికాయిడిస్, అంకైలోస్టోమా టుయోడినేల్, పుకడేరియా బాంక్రాఫ్టీ, డ్రాకంకులస్ మెడిసన్సిస్ ల జీవిత చక్రాలు, రోగ లక్షణాలు మరియు వియంత్రణ పద్ధతులు.

అనెలిడా వర్గపు సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ, సిరిస్ నమూనా జీవిగా అధ్యయనము మలస్కా వర్గపు సాధారణ లక్షణాలు, వర్గీకరణ, పైలాగోబోసా నమూనా జీవిగా అధ్యయనము.

మలస్కా జీవుల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత.

ఆర్థోపాడ-సామాన్యలక్షణాలు మరియు విభాగాల వరకు వర్గీకరణ, పేలిమాన్ (మంచిపిటి రొయ్య)

నమూనా జీవి.

ఒకైవోపార (పెరిపేటన్) జీవుల సాధారణ లక్షణాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు.

ఉపకారులైన కీటకాలు, హానికరమైన కీటకాలు.

ఇకైవోడర్మేటా సాధారణ లక్షణాలు, విభాగముల వరకు సోదాహరణంగా వర్గీకరణ, ఆస్టేరియాన్, బాహ్యలక్షణాలు, అంతర్మర్మాణము, ఇకైవోడర్మేటా డింభక జీవులు (సముద్ర నక్షత్రములు పిందాభివృద్ధి డింభక దశ వరకు).

అకశేరుకాలలో జీవపరిణామ మార్గము—సీల్‌వో, వలయ, ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాలు, తిర: ప్రాధాన్యము, సమఖండ విశ్వాసము మొదలైన వాటి భావన మరియు జీవపరిణామములో పీటిసాత్ర.

ప్రోటోకార్డేట్లు—కార్డేట్లుల లక్షణాలు, ఉపోద్ఘాతము, ఉపవర్గము, హెమికార్డేట్ల లక్షణాలు, మరియు వర్గీకరణ, బెల్‌వోగ్లాసెన్, ఒక నమూనా జీవిగా చదువుట, హెమికార్డేట్ల సంబంధ బాంధవ్యాలు, ఉపవర్గము—యురోకార్డేట్ల సామాన్య లక్షణాలు వర్గీకరణ, హెర్ట్‌మేనియా అభివృద్ధి యూరోకార్డేట్ల సంబంధ బాంధవ్యాలు.

ఉపవర్గము—సెఫలోకార్డేట్ల—ఆంఫియాక్సస్ ఆంఫియాక్సస్ సంబంధ బాంధవ్యాలు.

FACULTY OF SCIENCE
SECOND YEAR (3-YEAR DEGREE COURSE EXAMINATION)
MODEL QUESTION PAPER
ZOOLOGY
COURSE - I NON - CHORDATA AND PROTOCHORDATA

Time: 3 Hours

Max.Marks: 75

Section - A

Answer any 3 questions

ఏదేని 3 ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వండి

Each question carries 15 marks

ప్రతి ప్రశ్నకు 15 మార్కులు

Answer the following in about 30 lines each.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము?

1. Describe briefly the life cycle of Plasmodium.

Plasmodium యొక్క జీవిత చక్రాన్ని గూర్చి క్లుప్తంగా వ్రాయుము.

2. Mention the differences between polyp and medusa of obelia.

Obelia లోని పాలిప్, మెడూసాలను పరిచోల్చుము.

3. Describe the life history of Schistosoma hematobium. Add a note on its pathogenecity.

Schistosoma hematobium జీవిత చక్రాన్ని వివరించి దాని రోగ లక్షణాలను గురించి తెలుపుము.

4. Write an essay on harmful insects.

హానికరమైన కీటకాలు గురించి ఒక వ్యాసమునను వ్రాయుము.

5. Give a brief account of larvae found in Echinodermata. What is their evolutionary importance.

ఇతైనిడర్మేటాలు వివిధ దీంభకాలను గురించి వ్రాయుము. వాటి జీవన పరిణామ ప్రాముఖ్యతను వివరింపుము.

6. Discuss the digestive system and physiology of digestion of sea squirt (Herdmania)

సీ స్క్విర్డు జీర్ణ వ్యవస్థను, జీర్ణక్రియా విధానము వివరింపుము.

Section - B

Answer any 5 questions

ఏవేవి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానలిమ్ము

Each question carries 6 marks

ప్రతి ప్రశ్నకు 6 మార్కులు

Answer the following in about 10 lines each.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము?

1. Alternation of generations in Elphidium.

Elphidium లో ఏకాంతర కణాల గూర్చి వ్రాయుము.

2. Write a note on Kalaazar.

కాలాజార్ గురించి వ్రాయుము.

3. Asexual reproduction in Sycon

సైకాన్ ల అలైంగికోత్పత్తి.

4. Pathogenicity and controlling measures of Echinococcus granulosus.

Echinococcus granulosus యొక్క రోగ లక్షణాలు, దాని నివారణోపాయములు వ్రాయుము.

5. Nereis parapodium.

నీరెస్ పార్పాడియములు.

6. Describe the structure of a gill in prawn.

రొయ్యిలోని మొవ్వు విర్మాణమును వివరింపుము.

7. What is lac? How is it formed? Add a note on lac cultivation.

లక్క అవగానేమి? అది ఎట్లు ఏర్పడుతుంది? లక్క సాగు పద్ధతిపై ఒక చిన్న వ్యాఖ్య వ్రాయుము.

8. Tornaria larve.

టార్నేరియా డింభకము.

9. Pharynx of Herdmania.

Herdmania ల గ్రంథి.

10. Specialized characters of Amphioxus.

Amphioxus ప్రత్యేక లక్షణాలు.

UNDERGRADUATE COURSE - SECOND YEAR
ZOOLOGY
COURSE - 1 NON - CHORDATA & PROTOCHORDATA
ASSIGNMENT - 1

I. Answer the following questions in about 30 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము

1. Describe briefly the life cycle of Plasmodium.

ప్లాస్మోడియం జీవిత చక్రాన్ని గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయుము

2. Explain the canal system of Sycon and enumerate its advantage.

సైకాన్ కుల్యా వ్యవస్థను విశదీకరించి దాని వలన గల ప్రయోజనములను లెక్కింపుము.

3. Describe the life history of Schistosoma hematobium.

Add a note on its pathogenesis.

Schistosoma hematobium జీవితచక్రాన్ని వివరించి దాన్ని రోగ లక్షణము గురించి తెలుపుము

II. Answer the following questions in about 10 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. Anti malarial schemes.

మలేరియా వివారణ పథకాలు

2. Write a note a Kalaazar.

కాలాజీర్ గురించి వ్రాయుము.

3. Describe the structure of Medusa.

మెడ్యూసా నిర్మాణమును వివరింపుము.

BRAOU

UNDERGRADUATE COURSE - SECOND YEAR
ZOOLOGY
COURSE - 1 NON - CHORDATA & PROTOCHORDATA
ASSIGNMENT - 2

I. Answer the following questions in about 30 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము

1. Describe the life of *Wuchereria bancrofti* and add a note on its pathogenicity.

పుకరేరియా బాంక్రాఫ్టీ జీవిత చక్రాన్ని వివరించి, అది రోగిపై ఎట్టి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో తెలుపుము.

2. Describe the Digestive system of pila. Add a note on the physiology of digestion.

పైలా జీర్ణవ్యవస్థను వివరించి, జీర్ణక్రియా విధానమును తెలుపండి.

3. Give a brief account of larvae found in Echinodermata. What is their evolutionary importance.

Echinodermata లోని వివిధ డింభకాలను గురించి వ్రాయుము. వాటి జీవవర్ణానుసారముగా ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

II. Answer the following questions in about 10 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. Describe the general character of the class Polychaeta along with few examples.

పాలీకీటా విభాగ సామాన్య లక్షణాలు వివరించి, దాని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.

2. Describe the tachophore larva with the help of neat labelled diagram.

ట్రాకోఫోర్ డింభక విర్మాణాన్ని, భాగాలు గుర్తించిన పటము ద్వారా వివరింపుము.

3. Describe the distinguishing characters of onychophora.

ఓనీకీఫోరా యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలను వివరింపుము.

BRAOU

UNDERGRADUATE COURSE - SECOND YEAR
ZOOLOGY
COURSE - 1 NON - CHORDATA & PROTOCHORDATA
ASSIGNMENT - 3

I. Answer the following questions in about 30 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. Discuss the affinities of Hemichordata with Chordates.

Hemichordata కు పక్కేరుకాలతో ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యములను తెలుపుము.

2. Define retrogressive metamorphosis.

తిరోగమన రూపవిక్రమ అనగావేని? ఏ జీవిలో ఈ ప్రక్రియ జరుగువో విపులంగా వ్రాయుము?

3. Give an account of External features of Amphioxus.

Amphioxus బాహ్య లక్షణాలను తెలుపుము.

II. Answer the following questions in about 10 lines.

ఈ దిగువ ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.

1. Haemal system of Asterias.

Asterias లో హీమల్ వ్యవస్థ.

2. Tadpole of Herdmania.

Herdmania - Tadpole డింభకము.

3. Enteropneusta.

ఎంటరోప్నెస్టా.

BRAOU

10. నాళరూపంలో ఉన్న హృదయము పృష్ఠోదర భాగంలో ఉంటుంది.
11. ముఖ్యమైన విసర్జక అంగము నాడీ గ్రంథి (Neural gland).
12. డింభక దశలో నాడీ వ్యవస్థ బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది.
13. ఇది ఉభయ లైంగిక జీవి. ఫలదీకరణ బాహ్యంగా జరుగుతుంది.
14. డింభక దశలోని సకళేరుక లక్షణాలు క్షీణిస్తాయి. దీనిని తిరోగమన రూప విక్రమ అంటారు.

29.14 స్వపరిశీలనం జవాబులు

1. శైలికాచార పేకరణ
2. హృదయావరణం.
3. నాడీ, గ్రంథి, పియూషి.

29.15 నమూనా ప్రశ్నలు

- I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. హెర్డ్మేనియా బాహ్య లక్షణాలను తెలుపుము.
 2. సీస్కర్టు (హెర్డ్మేనియా) జీర్ణవ్యవస్థను, జీర్ణక్రియా విధానము వివరించుము.
 3. హెర్డ్మేనియా శ్వాస వ్యవస్థను విపులీకరించుము.
 4. సీస్కర్టు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను తెలుపుము.
 5. హెర్డ్మేనియా ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ గురించి వ్రాయుము.
- II. ఈ క్రింది వాటికి 10 పంక్తులలో జవాబులు వ్రాయుము.
 1. ఆచార పేకరణ విధానము.
 2. పర్యావర్తక ప్రసరణ (Shuttle circulation)
 3. కవచము (Tunic)
 4. గ్రహవి.

భాగము-30 హెర్డ్ మేనియా అభివృద్ధి, యూరోకార్డైట్ ల సంబంధ బాంధవ్యాలు

విషయక్రమము

30. 1 ఉద్దేశ్యము
30. 2 ఉపోద్ఘాతం
30. 3 అభివృద్ధి
30. 4 విదళనము
30. 5 గాస్ట్రోలా దళ
30. 6 డింభక అంగాల అభివృద్ధి
30. 7 అసిడియన్ ట్రాన్స్ ఫాల్ టార్వా
30. 8 రూపవిక్రియ
30. 9 సకశేరుకాలతో సంబంధబాంధవ్యాలు
- 30.10 స్వపరిణామం
- 30.11 సారాంశం
- 30.12 స్వపరిణామం జవాబులు
- 30.13 సమూహ ప్రశ్నలు.

30.1 ఉద్దేశ్యము

ఈ పాఠంలో హెర్డ్ మేనియా అభివృద్ధి జరిగే పద్ధతిని గురించి తెలుసుకుంటాము. తిరోగమన రూపవిక్రియ యూరోకార్డైట్ ల ప్రత్యేకత. ఈ పాఠంలో యూరోకార్డైట్ ల సంబంధబాంధవ్యాలను గురించికూడా తెలుసుకుంటాము.

దీన్ని సంపూర్ణంగా చదివిన తరువాత చిరుకప్ప దళలోని హెర్డ్ మేనియా స్వేచ్ఛగా ఈదుతూ, కార్డైట్ లా ముఖ్యలక్షణాలన్నిటిని చక్కగా ప్రదర్శించినా, రూపవిక్రియ జరిగేటప్పుడు ఆలక్షణాలన్నీ తిరోగమిస్తాయని, దీనితో బాటు స్త్రావ బద్ధ జీవితం ముడిపడి కార్డైట్ లా జీవుల ఉత్పత్తికి ఒక ప్రధాన ఘట్టాన్ని సమకూర్చుతుందని స్పష్టంగా బోధించగలుగుతావు.

30.2 ఉపోద్ఘాతం

హెర్డ్ మేనియా అండాలు హోమోలెసిథల్ రకానికి చెందినవి. చిన్నగా తక్కువ పీతక పదార్థంతో ఉంటాయి. సముద్ర నీటిలో ఫలదీకరణం జరిగిన తరువాత, ఇవి విదళన, విభజన వరసగా జరుపుకుంటాయి. తత్ఫలితంగా స్వేచ్ఛగా ఈదే ట్రాన్స్ ఫాల్ డింభకం ఏర్పడుతుంది. ఇది అసిడియన్ లో జరిగే అతిచిత్తమైన పద్ధతిలో రూపవిక్రియకు లోనవుతుంది. దానినే తిరోగమితరూపవిక్రియ (Retrogressive metamorphic) అని

30.3 అభివృద్ధి

బ్రహ్మోంధ (ధ్రువము (Vegetal pole) వద్ద నుంచి శుక్రకణము అండముతో ప్రవేశించి ఫలదీకరణ జరుపుతుంది. అండములో జీవసదార్థము మూడు ముఖ్య ప్రాంతాలుగా విభేదనము చెందుతుంది. 1. పుష్టమైన పైటోప్లాస్మిక్ ప్రాంతము. ఇది భవిష్యత్ బహిష్టవము. 2. బూడిద రంగులో నున్న పీతక ప్రాంతము. ఇది బ్రహ్మోంధ (ధ్రువము వద్ద యేర్పడుతుంది. భవిష్యత్ అంతస్త్వవము. 3. అర్ధచంద్రాకారంలో ఉన్న పసుపుపచ్చని క్రొవ్య (Lipoid) ప్రాంతము. ఇది మధ్యరేఖకు దగ్గరగా అండం చుట్టూ యేర్పడుతుంది. ఇది భవిష్యత్ మధ్యత్యవము.

పసుపుపచ్చని నెలవంక ఆకారానికి ఎదురుగా మరయొక నెలవంకాకారము కనిపిస్తుంది. ఇది భవిష్యత్ వంశ నాడినాళము (Chorda—neural tube), దీని నుంచి పృష్ఠవంశము, నాడిదండము అభివృద్ధి చెందుతాయి.


30.4 విదళనము

ఫలదీకరణ జరిగిన అరగంట తరువాత విదళనము (Cleavage) ప్రారంభమవుతుంది. ఖండిభవనము సంపూర్ణమైనది. పూర్ణభంజిత విదళనము (Holoblastic segmentation) జరుగుతుంది. ఫలితంగా గోళాకారంలో ఉండే సీతోబ్లాస్టులా యేర్పడుతుంది. దీనిలో సంయుక్త బీజ కుహరిక (Blastocoel) ఉంటుంది. ప్రథమ విదళనము ఆయతంగా ఉంటుంది. ద్వితీయ విదళనము కూడా ఆయతంగానే ఉంటుంది. కాని మొదటి విదళనానికి సమకోణం (Right angle) లో ఉంటుంది. విదళనము నిర్దారిత రకానికి (Determinate type) చెందినది. పరభాగం లోని కణాలు చిన్నవిగాను పూర్వభాగంలోని కణాలు పెద్దవిగాను ఉంటాయి. తృతీయ విదళనము మధ్యరేఖకు పైగా అడ్డంగా జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఎనిమిది సంయుక్త బీజ ఖండితాలు (Blastomeres) ఏర్పడుతాయి. వాటిలో పై భాగాన ఉన్న నాలుగు చిన్నవాటిని సూక్ష్మ ఖండితాలని (Micromeres) క్రింద భాగాన ఉన్న నాలుగు పెద్ద వాటిని స్థూల ఖండితాలని (Macromeres) అంటారు. వరుసగా మూడు విదళనాలు జరిగిన తరువాత అణిగ నట్లుండే సీతోబ్లాస్టులా ఏర్పడుతుంది. దానిలో ద్రవము నింబడియున్న సంయుక్త బీజ కుహరిక ఏర్పడుతుంది. దీనిని అవరించి స్థూల సూక్ష్మఖండాలు ఉంటాయి. ఇవి ఏకకణ మండమగు మధ్యముగా ఏర్పడుతాయి. (పటం. 30.1 A,B,C)

30.5 గాస్ట్రులా దశ

అరవ విభజన తరువాత స్థూల ఖండాల అంతర్యవనము (Invagination) వల్ల గాస్ట్రులా ఏర్పడుతుంది. దీనిని ఎంబోలీ (Emboly) అంటారు. ఈ దశలో భవిష్యత్ అంతస్త్వవము (Presumptive endoderm) బీజకుహరికలోకి కుంగుతుంది. అందువల్ల కుహరిక క్షీణిస్తుంది. వ్యతిరేక దిశలో అంతస్త్వవము బహిష్టవాన్ని కలుసుకుంటుంది. ఫలితంగా ద్విస్తరిత గాస్ట్రులా ఏర్పడుతుంది. స్థూల ఖండాలు అంతర్యవనం చెంది ఆర్కెంబరాన్ అనే విశాలమైన కుహరాన్ని అవరించి ఉంటాయి. అది తొలి దశలో పెద్దదిగా ఉండి అంత్యంలో చాలా చిన్నదై పోతుంది. ఈ లోపున బీజకుహరిక పూర్తిగా క్షీణించిపోతుంది. పిండము పొడుగు పొడుగుగా ఉంటుంది. ఆదిఅంత్ర రంధ్రము (Blastopore) మూసుకుంటుంది. ఇది పిండ పరాంతభాగము. సూక్ష్మ 345

ఖండాలు పృష్టభాగాన అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఫలితంగా పిందానికి వంకర తిరిగిన పుచ్చము ఏర్పడుతుంది.
(పటం. 30.1 D-G.)



పటం 30.1 హార్డ్ మేనియా అభివృద్ధి దశలు A. సంయుక్త బీజము B. రెండు కణాల దశ C. నాలుగు కణాల దశ D. గాస్ట్రూలా కోత E. గాస్ట్రూలా అడ్డుకోత (C.S.). F. అభివృద్ధి చెందుతున్న భూతము G. డింభక (సథము) దశ (అప్పుడే ఏర్పడిన డింభకము) 1. జాంతవ ధ్రువము 2. ధ్రువ దేహాలు 3. బహిష్టచము 4. వంశ-నాడీ నాళము 5. బృహత్ ఖండ ధ్రువము 6. అంతస్థచము 7. మధ్యస్థచము 8. విడమ సంయుక్త బీజ ఖండితము 9. కుడి సంయుక్త బీజ ఖండితము 10. పరాంత సంయుక్త బీజ ఖండితాలు 11. పూర్వంత సంయుక్త బీజ ఖండితాలు 12. నాడీ ఫలకము 13. పృష్ట వంశము 14. అర్కెంటరాన్ 15. ఆది ఆంత్ర రంధ్రము (బ్లాస్టోపోర్) 16. నాడీ దండము 17. మధ్యాంత్రనాళము 18. నాడీ ఆశయము.

30.6 డింభక అంగాల అభివృద్ధి

నాడీదండము : పృష్ట మధ్యరేఖలోని బహిష్టచ కణాలు విభేదనం చెంది మెడుల్లరీ ఫలకంగా రూపొందుతాయి. దాని పార్శ్వభాగంలో ముడుతలు ఏర్పడతాయి. మెడుల్లరీ ఫలకం క్రిందికి కుంగుతుంది. ఫలితంగా మెడుల్లరీ గాడి యేర్పడుతుంది. పార్శ్వ ముడుతలు రెండూ కలిసి పోతాయి. ఆ విధంగా నాడీ నాళము (Naural tube)