



భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం
భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

ఖండాలు: 1-3



డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

హైదరాబాదు

1996

CM-0403

31-3-97

రచయితల బృందం

సంపాదకులు

ప్రొఫెసర్ ఎ. శ్రీరామదాస్
ప్రొఫెసర్ ఎన్. రమణారావు

సహసంపాదకులు

డా. ఎన్.వి. రాజశేఖరరెడ్డి

రచయితలు

ప్రొఫెసర్ ఆర్. జగదీశ్వరరావు
డా. బి. సత్యనారాయణ
డా. వై.వి. ఉమాపతి పర్మ
డా. డి.ఎల్. సత్యనారాయణ


ముఖచిత్రం

రమేష్

551
620

డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,

హైదరాబాద్



కాపీరైటు © 1985 డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

అన్ని హక్కులు విశ్వవిద్యాలయానివి. ఈ పుస్తకంలోని ఏ భాగం అయినా ఉపయోగించుకుంటే విశ్వవిద్యాలయం అనుమతి పొందాలి.

ఈ పాఠ్యాంశాలు సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్య ప్రణాళికలో భాగం.

పాఠ్యప్రణాళిక మొత్తం వివరాలు ఈ పుస్తకం చివరలో ఉన్నాయి.

ఇతర వివరాలకు: డైరెక్టరు (అకాడమిక్), డా.బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
జూబిలీహిల్స్, రోడ్ నెం. 46, హైదరాబాద్.

ముద్రణ: బాయిన్ టాన్ L.T.C., జహనుమా, హైదరాబాద్-500 053.

ముందు మాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం బి.ఎస్సీ.రెండవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టిన భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర పాఠ్యప్రణాళిక ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచాం. మూడు సంవత్సరాల బి.ఎస్సీ. డిగ్రీ కోర్సు రెండోసంవత్సరం భూవిజ్ఞాన విషయాల మౌలిక (Core) అంశాల్ని చర్చించాం. పాఠ్యాంశాల సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పాఠ్య విషయాల్ని ఖండాలుగా, వివిధ భాగాలుగా విభజించాం. ప్రతి ఖండంలోనూ ఒక అంశాన్ని అధ్యయనాంశంగా పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేసాం. పాఠ్యాంశాల్ని అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు సులభంగా అందరికీ అర్థమయే రీతిలో రాశారు. లక్ష్యాలతో ప్రారంభమై, సారాంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, విషయ చర్చను చేసాం. పాఠ్యాంశాల మధ్యలో అభ్యాసాలు పొందుపరిచాం. విద్యార్థుల అవగాహనా స్థాయిని విస్తృతపరచడానికి ఇది తోడ్పడుతుందని ఆశిస్తున్నాం. కఠినంగా అనిపించే పారిభాషిక పదాలకు కొన్నింటికే 'పదకోశంలో' అర్థాన్ని వివరించాం.

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అర్థంచేసుకోవడంలోనూ, ప్రధాన అంశాన్ని తెలుసుకోవడంలోనూ పాఠ్యాంశాలు దోహదం చేస్తాయని విశ్వవిద్యాలయం భావిస్తోంది.

ఈ రచన ప్రధానోద్దేశం- 'భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర' -వరిధిని, లక్ష్యాన్ని, విజ్ఞాన శాస్త్రంలో దీనికున్న ప్రాధాన్యాన్ని వివరించడం. స్థితిక శాస్త్రంలో స్థితికాల అధ్యయనం, ధర్మాలు చర్చించాం. ఖనిజ విజ్ఞానంలో - ఖనిజాలు రూపొందడం, సూక్ష్మ దర్శినిలోనూ, బయటా ఖనిజలక్షణాల ప్రాధాన్యాన్ని ప్రస్తావించాం. భౌతిక భూవిజ్ఞాన, స్థితిక, ఖనిజశాస్త్రాల ప్రధాన భావనల్ని, సూత్రాల్ని విద్యార్థి అర్థం చేసుకోగలడని ఆశిస్తున్నాం.

BRAOU

ఖండం 1 భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

1. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం పరిధి, అక్ష్యాలు ... 1
2. భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, అంతర్నిర్మిత ప్రక్రియలు ... 11

ఖండం 2 బహిర్భామ ప్రక్రియలు

3. శిలాశైథిల్యం ... 20
4. నదుల చర్య ... 32
5. వదీ వ్యవస్థల, నవాస్థిత భూదృశ్యాల అభివృద్ధి ... 42
6. భూగర్భజలం ... 58
7. హిమానీనదాలు, హిమానీనదనం ... 76
8. సరస్సులు ... 90
9. సముద్రాలు ... 100
10. పవనాల చర్య ... 113

ఖండం 3 అంతర్భామ ప్రక్రియలు

11. అగ్ని పర్వతాలు ... 125
12. భూకంపాలు ... 134
13. పర్వతాలు ... 141

BRAOU

ಖಂಡಾಯ: 1-3

BRAOU

ఖండం 1 : భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

భాగం-1 : భూవిజ్ఞానశాస్త్రం పరిధి, లక్ష్యాలు

పాఠ్యాంశాలు

- 1.0 లక్ష్యాలు
- 1.1 పరిచయం
- 1.2 భూవిజ్ఞానశాస్త్రం పరిధి
- 1.3 భూవిజ్ఞానశాస్త్రంలోని విభాగాలు
 - 1.3.1 భౌతిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
 - 1.3.2 స్థరశాస్త్రం, చారిత్రక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
 - 1.3.3 పురాజీవ శాస్త్రం
 - 1.3.4 ఖనిజ శాస్త్రం
 - 1.3.5 శిలాశాస్త్రం
 - 1.3.6 నిర్మితీయ భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
 - 1.3.7 అర్ధిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
 - 1.3.8 ఇంజనీరింగ్ భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
- 1.4 భూవిజ్ఞానశాస్త్ర ప్రయోజనాలు
- 1.5 భూవిజ్ఞానశాస్త్ర చరిత్ర, అభివృద్ధి
- 1.6 ఇతర విజ్ఞానశాస్త్రాలతో సంబంధం
- 1.7 సారాంశం
- 1.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు
- 1.9 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు
- 1.10 పదకోశం

1.0 లక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో భూవిజ్ఞానశాస్త్ర ప్రాముఖ్యం, దాని పరిధి, విభాగాలు, చరిత్ర, ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలతో దానికున్న సంబంధాలు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం.

ఈ అంశాల అధ్యయనం తర్వాత మీరు

- భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్వచనాన్ని,
- భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో విభాగాలని,
- భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర పరిధి, ప్రయోజనాలు, చరిత్రను,
- ఇతర విజ్ఞానశాస్త్ర విభాగాలతోగల సంబంధాన్ని వర్ణించగలుగుతారు.

1.1 పరిచయం

నిర్వచనం : భూమిని గురించి విపులంగా చెప్పే విజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగాన్ని భూవిజ్ఞానశాస్త్రమని నిర్వచించారు. భూవిజ్ఞానశాస్త్రాన్ని ఇంగ్లీషులో 'జియాలజీ' అంటారు. జియో(Geo) అంటే భూమి, లాగాస్ (Logus) అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం (Science) అని అర్థం.

భూమి అనేది ఒక గ్రహం. భూమి రూపం, పరిమాణం, పుట్టుక, వయస్సు, పదార్థాల సంఘటనా వంటి వాటిని గురించి చక్కగా విశదీకరిస్తుంది భూవిజ్ఞానశాస్త్రం. ప్రకృతిలో దృశ్యమాన విషయాలు అంటే అగ్నిపర్వతాలు, భూకంపాలు, పర్వత శ్రేణులు, సరస్సులు, సముద్రాలు, హిమానీనదాలు, నదులు మొదలైన వాటిని గురించి తెలుపుతుంది.

ఘనరూప భూమి ప్రాదుర్భావం, అభివృద్ధిని గురించి భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం చక్కటి పరిశీలనకు దోహదపడుతుంది. భూ నిర్మితి సంఘటనాన్ని గురించి, భూ ఉపరితలంపైన, అంతర్భాగంలో జరిగే వివిధ ప్రక్రియల గురించి వివరంగా తెలుపుతుంది. వాతావరణం, జలావరణం వంటి విషయాల పరిజ్ఞానం దీనికి ఎంతో అవసరముంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

1. మన భూమిని గురించి తెలిపే శాస్త్రం

(అ) ఖగోళశాస్త్రం

(ఆ) భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

(ఇ) భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

(ఈ) శిలాశాస్త్రం

.....

.....

.....

.....

1.2 భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం-పరిధి

ఆధునిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం ముఖ్యోద్దేశం భూమి సంపూర్ణ పరిణామం, అభివృద్ధి, భూఉపరితలంపైన జీవజాలం పుట్టుక, చోటుచేసుకున్న మార్పులను తెలుసుకోవడమే. అంతేకాక స్వాభావిక ప్రక్రియల వల్ల ఏర్పడిన ఉత్పాదితాలు ఏవిధంగా ఉంటాయోతెలుపుతుంది. భూమిపైన, లోపల, ఆప్రక్రియలు ఏవిధంగా పనిచేస్తాయని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మానవాళిని అనాదినుంచి వేదిస్తున్న అనేక ప్రశ్నలు - భూమిమీద జీవం ఎప్పుడు, ఎట్లా ఏర్పడింది? ఎంతకాలం నుంచి ఈ భూమిపైన జీవజాలం మనుగడ సాగిస్తోంది? అగ్నిపర్వతాలు, భూకంపాలు అంటే ఏమిటి? ఉన్నత శృంగాలుండే హిమాలయ పర్వతశ్రేణులలాంటి పర్వతమాలలు ఏవి శక్తుల ప్రభావం వలన ఏర్పడ్డాయి వంటి వాటికి సమాధానాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

మనం నివసిస్తున్న భూమిని గురించి ఎన్నో రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి ఇతరవిజ్ఞాన, సాంకేతి కశాస్త్రాల పరిజ్ఞానంతోపాటు భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పరిజ్ఞానమూ దోహదపడుతుంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వివిధ అంశాల సమాచారాన్ని గ్రహించడం మాత్రమే కాదు. వాటి మూలాధారసూత్రాలను కను

గొనడం. అవి ఏ విధంగా జరుగుతాయని కాదు ఎందుకు అట్లా జరుగుతాయని తెలుసుకోవడం. ఇతర శాస్త్రాలలోలాగే భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా తనకు తెలిసిన వాటినుంచి తెలియని వాటి వైపు దృష్టిసారించి విషయపరిజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. వర్తమాన కాలంలో జరుగుతున్న విషయాలను నిశితంగా పరిశీలించి వాటివల్ల పొందిన జ్ఞానంవల్ల అతి ప్రాచీన కాలంనుంచి భూమి పరిణామవికాసాన్ని తెలుసుకొని, విషయ నిరూపణకు కావలసిన భూమి స్థూల, సూక్ష్మరూప వివరణ, భూమి ఏయే పదార్థాలవల్ల నిర్మితమై ఉందో కనుగొనగలుగుతాడు. భూమిపై ఎటువంటి కారకాల (agents) వల్ల ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయో గ్రహించడానికి వీలుకలుగుతుంది. భూవిజ్ఞానశాస్త్రం ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలపై - ముఖ్యంగా, భౌతిక, రసాయనిక జీవశాస్త్రాలపై - ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి భూవిజ్ఞానశాస్త్ర విషయాలు కొన్ని సందర్భాలలో ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్ర విషయాలతో ముడిపడి సమ్మిళితమై ఉంటుంది.

భూమిని గురించిన పరిశీలనాత్మక అధ్యయనం మానవ పురోభివృద్ధికి పనికి వచ్చే ఎన్నో కొత్త విషయాలను ముఖ్యంగా ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిన అంశాలను తెలుపుతాయి. మానవాళి అభ్యున్నతికి అవసరమైన అనేక రకాల సహజవనరులు భూమినుంచి గాని దాని చుట్టూ ఆవరించిఉన్న జల వాతావరణాల నుంచిగాని సమకూరుతున్నాయి. పంటలను సమృద్ధంగా పండించగలిగే సుక్షేత్రాలైన మృత్తికలు (Soils), పరిశ్రమలకు కావలసిన ముఖ్యమైన ముడిసరుకులు నేల బొగ్గు(Coal), సహజవాయువు (Natural gas) రాతినూనె (Petroleum), ఇతర ప్రయోజనకర ఖనిజాలు, వాటినుంచి తయారయ్యే వివిధ రకాల పారిశ్రామిక ఉత్పాదితాలు భూమినుంచే లభ్యమౌతాయి. ఇటువంటి సహజసిద్ధ ప్రకృతివనరులను భూగర్భంనుంచి వెలికితీయడానికి మానవుడు తన విజ్ఞానసంపదను, ప్రావీణకౌశలాన్ని పూర్తిగా వినియోగించాలి. దానికి సుశిక్షితమైన భూవిజ్ఞానశాస్త్రజ్ఞులు ఎంతో అవసరం. అందుకే ఏ దేశమైనా తనకు అవసరమైన ఖనిజాలను, మిగతావనరులను క్రమపద్ధతిలో అన్వేషణజరిపి బహిర్గతం చేయగలిగిన భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుల బృందాన్ని ఏర్పరచి దాని సహకారాన్ని పొందుతుంది. ఆ విధంగానే మన భారతదేశంలో కూడా క్రీ.శ. 1853 సంవత్సరంలోనే భారత భూవిజ్ఞాన సర్వేక్షణశాఖ (Geological Survey of India) ఒకటి ఏర్పడింది. దేశస్వాతంత్ర్యం సాధించిన తర్వాత బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ (Bureau of Mines), రాతినూనె సహజవాయువుల కమిషన్ (Oil and Natural Gas Commission), ఖనిజాన్వేషణ కార్పొరేషన్ (Mineral Exploration Corporation) మొదలైన కొత్త సంస్థలు ఏర్పడి ఎన్నో ప్రాంతాలలో ఖనిజాన్వేషణ జరిపి వాటిని వెలికితీసి అభివృద్ధి పరచడంలో ఎంతో దోహదకారులుగా ఉంటున్నాయి.

1.3 భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలోని విభాగాలు

సంప్రదాయానుసారం భూవిజ్ఞానశాస్త్రాన్ని రెండు పెద్ద విభాగాలుగా విభజించారు. అవి భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం, చారిత్రక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం.

సాధారణ లేదా భౌతిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం భూమిఏయే పదార్థాలతో నిర్మితమై ఉన్నదో పరిక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. భూమిపైన, లోపల ఏయేప్రక్రియలు జరుగుతుంటాయో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడానికి కృషి చేస్తుంది. అయితే చారిత్రకభూవిజ్ఞాన శాస్త్రం ముఖ్యోద్దేశం సుదీర్ఘ కాలగతిలో భూమి పుట్టుక, దాని క్రమాభివృద్ధిని గురించి తెలుసుకోవడం. ఆ విధంగా ఈ విభాగం భూమిపై జరిగిపోయిన కాలాల్లో సంభవించిన వివిధ భౌతిక, జీవశాస్త్ర సంబంధ మార్పులను ఒక క్రమానుగత శ్రేణిలో నిర్ధారించడానికి గట్టి ప్రయత్నంచేస్తుంది.

ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలవలెనే భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని కూడా కొన్ని ముఖ్య శాఖలుగా విభజించవచ్చు. వీటిలో ప్రతి విభాగం కొన్ని నిర్దిష్ట విషయాలను స్పష్టంగా పరిశీలించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

1.3.1 భౌతిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం (Physical Geology)

ఈ విభాగంలో భూమి భౌతిక స్వరూపస్వభావాలను ముఖ్యంగా తెలుసుకోవచ్చు. భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, సంఘటనం భూమిపై వివిధ కారకాల వల్ల నిరంతరంజరిగే ప్రక్రియలను గురించి

- (ఇ) భౌతిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం
(ఈ) ఆర్థిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం

1.4 భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోజనాలు

మానవ చర్యలకు సంబంధించిన వివిధ రంగాలలో భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పరిజ్ఞానం అవసరం ఉంది. పరిశ్రమలు చాలావరకు భూమినుంచి లభించే ఖనిజాలు, ఇంధనాలు, భూగర్భజలం వంటి సహజ వనరులపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. సహజవనరుల అవశ్యకత పరిశ్రమలలోనేకాదు, భవన నిర్మాణం, రోడ్లు వేయడం వంటి పనులలో కూడా ఉంటుంది. తాగడానికి, వ్యవసాయం కోసం నీటి సరఫరా చేయడం ప్రధాన అంశంగా మారింది. వనరుల అన్వేషణ, వాటిని నిర్ధారించి వెలికి తీయడం వంటి కార్యక్రమాలకు భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి.

ఇంజనీరింగు రంగంలో భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అనకట్టలకు, భవనాలకు తగిన స్థలాలను నిర్ణయించడం, వరదల నియంత్రణ, నీటిసరఫరా, సౌరంగాలనిర్మాణం, రోడ్లకు, వంతెనలకు, వెప్లెన్లకు అనువైన స్థలాలను ఎంపిక చేయడం వంటి కార్యక్రమాలకు ఆయా ప్రదేశాల భూవిజ్ఞానపరిజ్ఞానం అవసరమవుతుంది.

ఖనిజనిక్షేపాలు భూపటలంలో కొద్దిమేర ప్రదేశాలలో మాత్రమే సాంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఏ దేశానికైనా కావలసిన ఖనిజాల స్వయంసమృద్ధి సాధ్యపడదు. కొన్ని ఖనిజాల విషయంలోనైనా దిగుమతులపై ఆధారపడవలసి వస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా వ్యాపార, రాజకీయాలకు సంబంధించి సమస్యలు కొన్ని ఈ సందర్భంగా తలెత్తుతే, ఖనిజవనరులు వునర్వృద్ధి చెందవు కనుక వాటి సేకరణ, వినియోగం, వ్యాపారవిషయాలలో జాగ్రత్త అవసరం.

భూవిజ్ఞానశాస్త్ర అనువర్తనల అధ్యయనాన్ని అనువర్తిత భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం (Applied Geology) అంటారు. గెని భూవిజ్ఞానశాస్త్రం (Mining Geology), భూగర్భజలవిజ్ఞాన శాస్త్రం (Hydrogeology), పెట్రోలియమ్ భూవిజ్ఞానశాస్త్రం (Petroleum geology), ఇంజనీరింగ్ భూవిజ్ఞానశాస్త్రం (Engineering geology) ఖనిజ ఆర్థికశాస్త్రం (Mineral economics) వంటివి అనువర్తిత భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర అంశాలుగా పేర్కొనవచ్చు.

1.5 భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్ర, అభివృద్ధి

భూమి, సూర్యునిచుట్టూ పరిభ్రమించే తొమ్మిది గ్రహాలలో ఒకటి. ఇది అందరికీ తెల్సిన విషయమే. పాలపుంత (Milkyway) అనేది పెద్దగెలాక్సీ. నూరు బిలియన్లనక్షత్రాలుంటాయి. వాటిల్లో అతిసామాన్య నక్షత్రం సూర్యుడు. అలాగే పాలపుంత గెలాక్సీ విశ్వాంతరాళంలో ఉండే కోటాసుకోట్ల గెలాక్సీలలో సాధారణమైనది. మన విశ్వమెంత అనూహ్యమైనదీ, పెద్దదో దీన్నిబట్టి గ్రహించవచ్చు.

ఆధునిక అభిప్రాయాలకు, కొద్ది శతాబ్దాలకిందవరకు అభివ్రాయాలకు మధ్య వ్యత్యాసం, భేదం కనిపిస్తుంది. అప్పట్లో భూమి విశ్వంలో ప్రముఖస్థానంలో కేంద్రంగాఉండేదని భావించేవారు. పురాతనగ్రీకులు భూమి విశ్వానికి కేంద్ర స్థానంలో ఉందని భావించారు. దానినే జియోసెంట్రిక్ (Geocentric) విశ్వసిద్ధాంతమన్నారు. భూమి గుండ్రంగా, చలనం లేకుండా, విశ్వానికి కేంద్ర స్థానంలో ఉందని,

దాని చుట్టూ నభోంతరాళగోళం (Celestial Sphere) వ్యాపించి ఉండేదని భావించేవారు. నక్షత్రాలు వేలాడుతూ భూమి చుట్టూ ప్రతినిత్యం తిరుగుతూ అక్కడ ఉండేవని విశ్వసించేవారు.

భూమి గోళాకృతిలో ఉన్నదని, చంద్రగ్రహణ సమయంలో వంపులుకలిగిన ఛాయను ఏర్పరుస్తున్నదని కనిపెట్టిన మొట్టమొదటి గ్రీకు విద్యావేత్త అరిస్టాటిల్ (క్రీ.పూ. 384-322). అరిస్టార్క్స్ (క్రీ.పూ. 312-230) అనే గ్రీకు తత్వవేత్త హీలియోసెంట్రిక్ (Heliocentric) విశ్వసిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. సూర్యుడు విశ్వంలో కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నాడనేది అతని సిద్ధాంతం. అతడు సామాన్య భౌమితిసూత్రాలను ఉపయోగించి భూమికి, సూర్యునికి, చంద్రునికి మధ్య గల దూరాలను కనుగొనగలిగాడు. అయితే భూకేంద్రస్థ విశ్వసిద్ధాంతాన్ని మాత్రం యూరోపులో రెండు వేల సంవత్సరాలు ప్రభలంగా విశ్వసించడంజరిగింది. అరిస్టాటిల్ వంటి గ్రీకుమేధావుల ప్రోద్బలంవల్ల ఆ సిద్ధాంతాన్ని క్లాడియస్ తోలెమీ (Claudius Ptolemy) క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దంలో చక్కగా విశదీకరించాడు. ఒక పద్ధతిలో వివరించాడు. పదమూడు శతాబ్దాల కాలం వారి అభిప్రాయాలే శిరోధార్యాలై వెలుగొందాయి. కానీ, పోలిష్ అంతరిక్ష శాస్త్రజ్ఞుడు నికోలస్ కోపర్నికస్ (Nicolaus Copernicus 1473-1543) మొట్టమొదటగా భూమి ఒక గ్రహమనీ, సౌరవ్యవస్థలో ఒక భాగమని ప్రతిపాదించాడు. అంతే కాక సౌరకుటుంబంలో సూర్యుడు కేంద్రంలో ఉంటూ దాని చుట్టూ, బుధుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి, శని గ్రహాలు పరిభ్రమిస్తుంటాయని సిద్ధాంతీకరించినాడు. తదుపరి కెప్లర్ (Kepler), గెలిలియో (Galileo), న్యూటన్ (Newton)ల కృషివల్ల అంతరిక్ష శాస్త్రంలో కొత్త దృక్పథం ఏర్పడింది. గత 500 సంవత్సరాలలో భూమి, గ్రహాల అవగాహనలో ఈ దృక్పథాలు ఎంతో మార్పును తెచ్చిపెట్టాయి. భూకేంద్రస్థ విశ్వసిద్ధాంతం నుంచి భూమి ఒక చిన్న గ్రహమనీ, అది మరొక సామాన్యనక్షత్రం సూర్యుడి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నదనే సిద్ధాంతానికి మారింది.

భూమిపై జరిగే వివిధ దృగ్విషయాలమీద బహుశా మొట్టమొదట ప్రాచీన గ్రీకులు తమ పరిశీలనల ద్వారా నిర్ణయమైన కొన్ని ప్రతిపాదనలను చేయగలిగారు. అయితే చీగటియుగాలుగా పరిగణింపబడిన మధ్య యుగాల కాలంలో అవిమరుగున పడిపోయి ఉండవచ్చు. మళ్ళీపునరుద్ధిపన (Renaissance) యుగంలోనే గ్రీకులమాదిరిగా అప్పటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ విషయాలను గ్రహించగలిగారు. ఆకాలంలో డాంటే (Dante), సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి, (St. Francis of Assisi), మార్కోపోలో (Marco Polo) వంటి శాస్త్రవేత్తలను విషయపరిగ్రహణధురీణులుగా చెప్పకోవచ్చు. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న అనేక విషయాలను కొత్తగా కనిపెట్టగలిగినారు. ఆకాలంలోనే కొలంబస్ (Columbus), మెగెల్లామ్ (Magellam) వంటి ప్రఖ్యాత భూగోళశాస్త్రవేత్తలు వెలుగులోకి రాగలిగారు.

ఆధునిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రం (Modern Geology) పదునెనిమిదవ శతాబ్దం చివరి భాగంలో ఒక రూపుదిద్దుకొన్నది. ఆధునిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రానికి గట్టి పునాదులు వేసినవాడు స్కాట్లండ్ దేశస్థుడు జేమ్స్ హట్టన్ (James Hutton). క్రీ.శ. 1785 లో ఒక నూతన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. అది విజ్ఞానశాస్త్రప్రపంచంలో సంచలనాన్ని సృష్టించిన "ఏకరీతి విధాన" (Uniformitarianism) సూత్రం. ఒక పరమ విశిష్టమైన సత్యాన్ని చాటి చెప్పే మూల సూత్రం. ప్రస్తుతం భూమిపై జరుగుతున్నట్లే అతి ప్రాచీన యుగాలలో కూడా కొద్దిపాటి తరతమ భేదాలతో ప్రకృతి కార్యకలాపాలు, సంగతులు జరిగి ఉంటాయన్నది ఈ మూలసూత్రంవాదన. జేమ్స్ హట్టన్ ఒక్క వాక్యంలో క్లుప్తంగా "The Present is the key to the past" అని అభివర్ణించాడు. అంటే వర్తమానకాలంలో జరుగుతున్న విషయాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే అతి ప్రాచీన కాలాలకు సంబంధించిన విశేషాలను బహిర్గతం చేయవచ్చు.

భౌమవిజ్ఞానప్రక్రియలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లే ప్రాచీన కాలాలలో కూడా జరిగి ఉంటాయని చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నంత వేగంతో, ఆ విధంగానే జరిగి ఉంటాయని చెప్పడం మాత్రం కాదు. ప్రక్రియలు ఒకే విధంగా జరుగుతున్నప్పటికీ, భౌమకాలాల్లో వాటి వేగం, ప్రమాణాలలో కొంత వ్యత్యాసం ఉండి ఉండవలసివచ్చేది. ఈ సూత్రాన్నిబట్టి భూమి చరిత్ర చాలా సుదీర్ఘమైనదని ఒప్పుకోవలసి ఉంటుంది. ప్రక్రియల తీవ్రతలో భేదమున్నా భూమిపై నున్న స్థూలరూప లక్షణాలు అంతరించడానికి, ఆవిర్భవించడానికి ఎంతో సుదీర్ఘ కాలపరిమాణం

అవసరం. సుదీర్ఘ భౌమకాలక్రమంలో భూమిపై నిరంతరం కొనసాగే మార్పుల గురించి హట్టన్ “భూమి ఆద్యవశేషాలు లేవు; అంతమయే సూచనలూ కన్పించవు” (There is no vestige of a beginning, nor the prospect of an end) అని వర్ణించారు.

మరొక కొత్త మూలసూత్రం సాధారణమైనది. సరస్సుల్లోగాని, సముద్రాలలో గాని నిక్షేపణ చెందిన అవక్షేపాలు క్షితిజసమాంతర పొరలుపొరలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ మౌలికక్షితిజసమాంతరతను స్వాభావిక క్షితిజసమాంతరత (Original horizontality) అని పిలుస్తారు. పొరలు క్షితిజ సమాంతరంగా లేనప్పుడు తర్వాత విరూపణ ద్వారా అవి ఏర్పడి ఉంటాయని భావించవచ్చు. ఇక మూడవ సూత్రం. ఉపరివ్యాప్తతమనియమం (Law of superposition). సంస్తరాల శ్రేణి ఏదైనా ఏ విధమైన విరూపణ చెందకుండా యధాతథంగా ఉన్నప్పుడు అడుగు భాగాన ఉన్న సంస్తరాలు వృద్ధదశవనీ, ఎగువనున్న సంస్తరాలు తరుణదశకు చెందినవనీ సూచిస్తుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. “Present is the key to the past” అనే దానికి ఆధారం.

- (అ) భూవిజ్ఞానశాస్త్ర సూత్రాలు
- (ఆ) శిలాశాస్త్ర సూత్రాలు
- (ఇ) ఏకరీతివిధాన సూత్రాలు

1.6 ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలతో సంబంధం

బహుశార్థపరంగా భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర అధ్యయనంలో ఖండాలు, మహాసముద్రాలు, వాతావరణం, భూఅయస్కాంత, రేడియేషన్ క్షేత్రాల అధ్యయనాన్ని ప్రస్తావించాలి. ఇది బహు విస్తృత పరిధి. కాబట్టి భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు ఘనస్థితిలో భూఅధ్యయనానికి శాస్త్రాధ్యయనాన్ని పరిమితం చేశారు. ఈ కారణంగా భూమి ఇతర అంశాల అధ్యయనానికి ఇతర శాస్త్ర శాఖలు ఏర్పడినవి. భూ అంతర్భాగాన్ని అయస్కాంత, విద్యుత్, గురుత్వాకర్షక క్షేత్రాలను గురించి పరీక్ష విధానాల ద్వారా విపులంగా తెలుసుకొనే వారిని భూభౌతిక శాస్త్రజ్ఞులని పిలుస్తారు. భూ ఉపరితలంపైన సముద్రజల అధ్యయనాన్ని సాగరశాస్త్రం (Oceanography) అని పిలుస్తారు. వాతావరణాన్ని గురించి తెలివే శాస్త్రాన్ని వాతావరణ శాస్త్రం (Meteorology) అని అంటారు. ఇంజనీర్లు ఎలక్ట్రానిక్స్, బిల్డింగ్స్ వంటి శాఖలను ప్రత్యేకంగా విడిగా అధ్యయనం ఎలా చేస్తారో, అదేవిధంగా భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు కూడా భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలోని ఏదో ఒక శాఖను తీసుకొని అధ్యయనం చేస్తారు.

ఖనిజాలు, శిలల్ని అధ్యయనం చేయడానికి రసాయన, భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రాలతో పరిచయం, పరిజ్ఞానం కావలసి ఉంటుంది. భూమిలోపలి వివిధ రసాయన ప్రక్రియలతో సంబంధమున్న శాస్త్ర శాఖను అధ్యయనం చేసేవారిని భూరసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు (Geochemist) అని అంటారు. శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసేవారు అకశేరుకాల, సకశేరుకాల జీవ విజ్ఞానశాస్త్ర పరిచయం ఉండాలి. భూగర్భజల విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు (Hydrogeologists), రాతినూనె భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు జలగతిశీల శాస్త్రాన్ని (Hydrodynamics) బాగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది. రేడియోధార్మికతామానంతో గట్టి పరిచయముంటుంది. ఈ విజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగాలన్నీ ఒక దానితో ఒకటి కలిసేమెలిసి అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

6. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని, భౌతిక శాస్త్రాన్ని కలిపే విజ్ఞాన శాస్త్రం

- (అ) భూభౌతిక శాస్త్రం
- (ఆ) భూరసాయన శాస్త్రం
- (ఇ) భూస్వరూప శాస్త్రం
- (ఈ) జియో ఇంజనీరింగ్

1.7 సారాంశం

ఈ భాగంలో భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం పరిధి, విభాగాలు, ప్రయోజనాలు, చరిత్ర ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలలో దానికి గల సంబంధాన్ని తెలుసుకొన్నాం. భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర పరిధి, ప్రాముఖ్యాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాం. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఎన్నో విభాగాలున్నప్పటికీ కొన్ని ముఖ్యమైన విభాగాలను పరిచయం చేశాం. భూవిజ్ఞానశాస్త్రానికి సంబంధించిన ఆధునిక పరికల్పన- జేమ్స్ హట్టన్ ప్రతిపాదించిన "Present is the key to the Past" అన్న భావాన్ని చర్చించాం. ఇతర విజ్ఞానశాస్త్ర విభాగాలతో ఉన్న సంబంధాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడమూ జరిగింది.

1.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మూదిరి సమాధానాలు

- (1) భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం
- (2) భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం, ఖనిజ శాస్త్రం, శిలా శాస్త్రం, నిర్మితీయ భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం, పురాజీవ శాస్త్రం, స్తరశాస్త్రం, చారిత్రకభూవిజ్ఞాన శాస్త్రం, ఆర్థికభూవిజ్ఞాన శాస్త్రం.
- (3) పురాజీవ శాస్త్రం
- (4) భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం
- (5) ఏకరీతి విధాన సూత్రం
- (6) భూభౌతిక శాస్త్రం

1.9 మూదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో జవాబులు రాయండి.

- 1. భూవిజ్ఞానశాస్త్ర లక్ష్యాలను వివరిస్తూ వివిధ విభాగాలను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.
- 2. భూవిజ్ఞానశాస్త్రానికి సంబంధించిన మూడు మూలసూత్రాలను చర్చించండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. భూవిజ్ఞానశాస్త్ర ప్రయోజనాలను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.
2. భూవిజ్ఞానశాస్త్రానికి ఇతర మౌలిక విజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగాలతో గల సంబంధాన్ని తెలియజేయండి.

1.10 పదకోశం

Fossil శిలాజం	: శిలాస్తరాలలో భద్రపరచబడిన జీవజాల అవశేషం.
Geocentric భూ కేంద్రీయ	: ప్థిరంగా ఉండే భూమి విశ్వానికి కేంద్రంగా ఉంటుందని నమ్మే సిద్ధాంతం.
Geo Chemistry భూరసాయన శాస్త్రం	: భూసంఘటనాన్ని, విశ్వంతరాళ రూపకల్పనకు దోహదం చేసిన రసాయన ప్రక్రియల్ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం.
Heliocentric హీలియోసెంట్రక్	: సూర్యుడు విశ్వానికి కేంద్రంగా వ్యవహరిస్తాడని నమ్మే సిద్ధాంతం.
Hydrosphere జలావరణం	: భూమి చుట్టూ నీటి చక్రం
Lithosphere శిలావరణం	: భూపటలం పైభాగంలో కన్పించే శిలావిన్యాసం.
Oceanography సముద్రవిజ్ఞాన శాస్త్రం	: సముద్ర విషయాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం.

భాగం-2 : భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, అంతర్నిర్మితి, ప్రక్రియలు

పాఠ్యాంశాలు

- 2.0 అక్ష్యాలు
- 2.1 పరిచయం
- 2.2 భూమి ఆకృతి, పరిమాణం
- 2.3 భౌతిక పరిసరాలు
 - 2.3.1 వాతావరణం
 - 2.3.2 జలావరణం
 - 2.3.3 శిలావరణం
- 2.4 భూమి అంతర్నిర్మితి
- 2.5 భూఖండ భాగాలు, సముద్ర హరివాణాలు
- 2.6 భౌమ ప్రక్రియలు
- 2.7 సారాంశం
- 2.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మూదిరి సమాధానాలు
- 2.9 మూదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

2.0 అక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, అంతర్నిర్మితి, ప్రక్రియలమీద దృష్టి కేంద్రీకరించాం.

ఈ భాగం అధ్యయనం తర్వాత మీరు-

- సౌరవ్యవస్థలో భూమి స్థానం, భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, భౌతిక పరిసరాలు, భూమి అంతర్నిర్మితి, భౌమ ప్రక్రియలను గురించి వివరించగలుగుతారు.

2.1 పరిచయం

మనకు అతిసన్నిహితంగా ఉన్న నక్షత్రమైన సూర్యుడిచుట్టూ తొమ్మిదిగ్రహాలు పరిభ్రమిస్తుంటాయిన్నది తెల్సినవిషయమే. అందులో ఒకగ్రహమే మనం జీవిస్తున్న భూమి. ఆ తొమ్మిదిగ్రహాలు వరుసగా బుధుడు, భూమి, అంగారకుడు, గురుడు, శని, బృహస్పతి, శుక్రుడు, శని, యూరేనస్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో. ఈ గ్రహాలన్నీ సూర్యునిచుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుతుంటాయి. సూర్యుడు కేంద్ర స్థానంలో కాక ఒక నాభి (Focus) వద్ద ఉంటాడు.

సౌర కుటుంబ వ్యవస్థ ఒక బృహత్ భ్రమణం కలిగినది. కేంద్ర స్థానంలో సూర్యుడు ఉన్నాడు. సౌరకుటుంబంలో తొమ్మిది గ్రహాలు, వాటి ఉపగ్రహాలు, చిన్న చిన్న అసక్తిదాయకాలైన గ్రహాశకలాలు (Asteroids), తోకచుక్కలు (Comets), ఉల్కలు ఉంటాయి. నూటికి 99.85 పాళ్లు సూర్యవ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి సూర్యునిలో ఇమిడిఉంది. గ్రహాలు, మిగతావి నూటికి 0.15 పాళ్లు ఉంటాయి. సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావానికిలోబడి ప్రతి గ్రహం కొంత దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుతూ ఉంటుంది.

దాని భ్రమణం అవసర్యంగా (Counter Clock-wise) ఉంటుందని గ్రహించారు. శుక్రుడు, యూరేనస్ తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్నీ అవసర్యభ్రమణాన్ని కలిగిఉన్నాయి. కెప్లర్ సూత్రాలకు అనుగుణంగా సూర్యునికి అతినన్నిహితమైన గ్రహం బుధుడు. నెకండుకు 48 కి.మీ. వేగంతో కక్ష్యలో తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగిరావడానికి 88 రోజులు పడుతుంది. ఇది గ్రహాలన్నిటి పరిభ్రమణ కాలాలకన్న చాలా తక్కువ. అతిదూరంగా ఉండేది ప్లూటోగ్రహం. నెకండుకు 5కి.మీ. వేగంతో తిరుగుతూ 248 సంవత్సరాలలో సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి వస్తుంది.

పట్టిక 1 : సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాల భ్రమణ-పరిభ్రమణ కాలాల వివరాలు

గ్రహం	దూరం (మైళ్ళలో)	ఉష్ణగ్రహం సంఖ్య	సూర్యునినుంచి నగలు దూరం మిలియన్ మైళ్ళలో	భ్రమణ కాలం	పరిభ్రమణ కాలం	నగలు విశిష్టగురుత్వం
బుధుడు	3015	---	36	59 రోజులు	88 రోజులు	5.10
శుక్రుడు	7525	---	67	243 "	225 "	5.30
భూమి	7920	1	93	23౫.56౩.4౩.	365.25 "	5.52
అంగారకుడు	4216	2	142	24౫.37౩.23౩.	687 "	3.94
బృహస్పతి	88700	15	483	9౫. 50౩.	12సంవత్సరాలు	1.34
శని	75000	15	886	10౫. 25౩.	29.5 "	0.70
యూరేనస్	29000	5	1780	10౫. 45౩.	84 "	1.55
నెప్ట్యూన్	28000	2	2790	18౫. 00 ౩	165 "	2.27
ప్లూటో	1500	1	3670	64 రోజులు	248 "	1.52

పై నున్న పట్టికను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే గ్రహాలను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. 1 భౌమిక లేదా భూసంబంధ గ్రహాలు-బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు. 2. భౌమ్యేతర (Extraterrestrial) గ్రహాలు- గురుడు, శని, యూరేనస్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో. సూర్యునికి 367 కోట్ల మెళ్ళదూరంలో ఉన్నందువల్ల, దాని ప్రమాణం అతి చిన్నదిగా ఉండడంవల్ల, దాని స్వభావాన్ని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం కష్టంగా ఉంది. భౌమ్యేతరగ్రహాలలో అతి చిన్నదైన నెప్ట్యూన్ గ్రహం వ్యాసంలో 1/4 వ్యాసం కలిగి ఉన్నది భూమి వ్యాసం. అందుచేతనే భౌమ్యేతర గ్రహాలను బృహత్ గ్రహాలు అని పిలుస్తారు. భూసంబంధగ్రహాల సరాసరి విశిష్టగురుత్వం 5. భౌమ్యేతరగ్రహాల సరాసరి విశిష్ట గురుత్వం 1.5. భూసంబంధగ్రహాలు చాలావరకు బరువు కలిగిన శిలలు, ధాతువులతో నిర్మితమై ఉంటాయి. భౌమ్యేతర గ్రహాలు గడ్డకట్టిన ఆమ్మోనియామిథేన్ వాయువులతో నిర్మితమై ఉన్నందువలన వాటి సాంద్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

చంద్రుడు (MOON)

భూమి చుట్టూతిరిగే ఏకైక ఉపగ్రహం చంద్రుడు. సూర్యుని చుట్టూ భూమితో కూడా కలిసి తిరుగుతుంటాడు. ఇది సౌరకుటుంబంలో ప్రత్యేకప్రతిపత్తి కలిగిన ఉపగ్రహం. భూమితో పోల్చినప్పుడు చంద్రుడు ఇతర ఉపగ్రహాలకన్నా పెద్దపరిమాణం కలిగి ఉన్నాడు. భూమినుంచి చంద్రుడి సగటు దూరం 3,48,000 కి.మీ. లేదా 2,40,000 మైళ్లు. చంద్రగోళవ్యాసం 3475కి.మీ. లేదా 2160 మై. విశిష్టగురుత్వం 3.3. మన భూమిపైనున్న భూపటలశీలల సాంద్రతకు దగ్గరగాఇది ఉంది. చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణశక్తి భూగురుత్వాకర్షణశక్తిలో $\frac{1}{6}$ వ వంతు.

భూమివలనే చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను భ్రమణం చేస్తుంటాడు. అయితే దాని వేగం భూభ్రమణవేగం కంటే చాలాతక్కువ స్థాయిలోఉంటుంది. ఆ భ్రమణ కాలపరిమాణం సుమారు 27½ రోజులు. అందువల్ల చంద్రుని ఒక అర్ధభాగం మనకు అసలు కనిపించదు. భూమి, సూర్యుల గమనాలవల్ల చంద్రకళలు (Phases), గ్రహణాలు (Eclipses) ఏర్పడుతుంటాయి.

చంద్రుడు, సూర్యుడు కలిసి భూమిపై తమ ప్రభావాన్ని ఆటు పోట్లు (Tides) రూపంలో చూపిస్తారు. దీనివల్ల సముద్రాలు, పెద్ద జలాశయాల్లో జలఉపరితలం పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆటుపోట్ల వల్ల నదులు, సముద్రాల భౌమ ప్రక్రియలపై చాలా ప్రభావం కనబడుతుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

1. సూర్యుని నుంచి వరసగా తొమ్మిది గ్రహాల పేర్లు రాయండి.

.....

.....

.....

.....

2.2 భూమి ఆకృతి, పరిమాణం

భూమి గుండ్రంగా బులివలె ఉంటుందన్నది జగమెరిగిన సత్యం. మన పూర్వులు చెప్పే తార్కాణాలలో మొదటిది సముద్రంమీద రేవునుంచి వెళ్లేటడ క్రమంగా కనబడకపోవడం. సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం సంభవించినప్పుడు భూమిచాయ చంద్రుని ఉపరితలం మీద పడడం. ఇవి జ్యోమితిశాస్త్రప్రకారం గోళాకారంగా ఉండే వస్తువు మాత్రమే నేరొక గోళంమీద వృత్తాకార చాయను ఏర్పరచగలదు. కాబట్టి భూమి గోళాకారంలో ఉందని స్పష్టపడుతున్నది.

భూగోళశాస్త్రజ్ఞుల కృషిఫలితంగా భూమి పరిపూర్ణ గోళంగా (Sphere) లేదని, గోళంవలె కాక గోళాభంగా (Spheroid) ఉందని తెలిసింది. భూగోళంనారింజ పండు లేదా పియర్ (Pear-shaped) పండువలె ధ్రువాలవద్ద కొద్దిగా బల్లవరుపుగా ఉంటుందని తెలిసికొన్నారు. ధ్రువాలను కలుపుతూ భూమి అడ్డుకోత దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉంటుందని భూమధ్యరేఖవద్ద అదివృత్తాకారంలో ఉంటుందని తెలుసుకొన్నారు. ధ్రువాలవద్ద బల్లవరుపుగా ఉండడం ముఖ్యంగా భూభ్రమణంవల్ల, అవకేంద్ర బలాల వలన (Centrifugal Forces) ఏర్పడే శక్తుల కారణంగా భూమధ్యరేఖాప్రాంతంలో భూగోళం ఉబ్బుగా ఉంటుందని భావిస్తారు. నవీన భూగోళశాస్త్రంలోని ముఖ్య విభాగం భూపరిమాణశాస్త్రం (Geodesy) ప్రకారం భూమి గోళాభంవలె కాకుండా జియాయిడ్ (Geoid) వలె ఉందని తెలుస్తోంది. సముద్రమట్టాన్ని ఊహమాత్రంగా సరాసరి ఖండాలలోనికి పొడిగించినప్పుడు ఏర్పడే ఉపరితలమే జియాయిడ్ అని చెప్పుకోవాలి.

ధృవాలవద్ద భూమివ్యాసం 12,756 కి.మీ. భూమధ్యరేఖవద్ద వ్యాసం 12,714 కి.మీ. పై రెండు వ్యాసాల మధ్య ఉండే భేదం 42 కి.మీ. ఇది చాలా కొద్దిపాటిది. సరాసరి వ్యాసంలో 1/300 వంతు కూడా ఉండదు. దీనికన్నా మిగతా వ్యత్యాసాలు కొద్దిపాటివి. ఉదాహరణకు భూమిపై అత్యున్నత శిఖరం 5.5 మైళ్ళు ఎత్తున ఉంది. అట్లాగే సాగరగర్భంలో అతి లోతైన ప్రదేశం 7 మైళ్ళు లోతున ఉన్నది. ఇవన్నీ ధృవాలవద్ద ఉన్న బల్లవరుపు కంటే చాలా తక్కువ. భూమి ద్రవ్యరాశి (Mass) 7×10^{21} టన్నులని లెక్కగట్టారు. భూమి విశిష్ట గురుత్వం 5.5 గా తెలుసుకున్నారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

2. భూమధ్యరేఖా వ్యాసం

.....

.....

.....

.....

3. భూమి ధృవవ్యాసం

.....

.....

.....

.....

4. భూమి సగటు విశిష్టగురుత్వం.

.....

.....

.....

.....

2.3 భౌతిక పరిసరాలు

డిశంబరు 1968లో అపోలోయాత్ర ఫలితంగా మొట్టమొదటిసారిగా మానవుడు చంద్రమండల ఉపరితలంపై కాలుపెట్టి చరిత్రను సృష్టించాడు. అపోలో అంతరిక్షయాత్రకులు తీసిన భూమి ఫోటోలు ఎంతో విలువైనవి. మన భూమిని గురించి సరైన అవగాహనకు తోడ్పడ్డాయి. అటువంటి దృశ్యాల వల్ల మానవుడు భూమి భౌతికప్రకృతిఆవరణాన్ని ఎందుకుమూడు విభాగాలుగా విభజించాలో అవగాహన ఏర్పడింది. భూమికి పైనపైతైన వాయుమండలం కలదని, దానికి వాతావరణం పేరుతగిందని తెలుసు కున్నారు. రెండవది నీటితో కూడిన ఆవరణం- జలావరణం. మధ్యస్థంగా ఘనస్థితిలో ఉన్నశిలామయ గోళాన్ని శిలావరణంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భూమిపైన ఉన్నశిలలు, నీరు, గాలి మాత్రమే కాకుండా వాటి పరస్పర చర్యలు సైతం ఎంతోప్రభావంతమైనవి.

2.3.1 వాతావరణం

భూమ్మీద జీవజాలం మనుగడ సాగించడానికి అనువైనదాన్నే వాతావరణం అంటారు. పరిస్థితులకు పనికివచ్చే వాయువదార్థాలతోకూడిన పొరఆవరించి ఉంది. భూమిపైకి ప్రసరించే సూర్యుడి తీవ్రతరమైన

వేడి, రేడియోవికిరణాల నుంచి ఈ పొర మన భూమిని రక్షిస్తుంది. భూఉపరితలం మీద వాతావరణ ప్రభావంవల్ల వివిధశీతోష్ణస్థితి మండలాలు ఏర్పడతాయి.

వాతావరణమనగా భూమిచుట్టూ ఆవరించిన వాయువుల ఆవరణం. నైట్రోజన్ (77.9%) ఆక్సిజన్ (20.60%) నీటిఆవిరి (1.04%). కార్బన్ డయాక్సైడ్ (0.03%) ప్రధాన వాయుపదార్థాలు. అంతకుముందు పూర్తిగా నైట్రోజన్ అని భావించబడే వాయువులో అతి తక్కువ పరిమాణంలో హీలియం, ఆర్గాన్, అనే వాయువులు కూడా ఉన్నాయని తెలుసుకున్నారు.

2.3.2 జలావరణం

జలావరణంలో భూమిపైన కనిపించే వివిధ రకాల ప్రకృతి, జలవనరులతో ఇమిడి ఉంటాయి. నూటికి ముప్పాతిక వంతులు భూఉపరితలంపై ఉన్న మహాసముద్రాలు, సరస్సులు, నదులు మొదలైనవి ఇందులో బాగాలే. ఇట్లా పైకి కనిపించే జలాధారాలే కాకుండా భూగర్భంలో నిక్షేపితమై అంతర్వాహినులుగా ఉండే జలాధారాలు కూడా ఉన్నాయి. బావులు, బుగ్గల (Springs) లో ఈ జలాధారాలని చూస్తాం. జలావరణప్రభావం భూఉపరితలంపైన కనిపించే శిలల మీద ఎక్కువే.

భూగోళ ఉపరితలంపైన నూటికి 71 పాళ్ళు ఆవరించిన మహాసముద్రాలు కనిపిస్తాయి. భూమిపైన లభించే నీటిలో 97 శాతం సముద్రాలలోనే ఇమిడి ఉంటుంది.

వాతావరణం, జలావరణాల మధ్య ఉన్న శిలావరణానికి మధ్యగా జీవా (Biosphere) వరణం అనే మరొక అవరణం కలదు. ప్రపంచంలో కనిపించే కోటానుకోట్ల జీవరాసులు కూడా ఉంటాయి. వీటిలో మహారణ్యాలు, వివిధ జంతువులు, క్రిమికీటకాలు కలసి ఉంటాయి.

2.3.3 శిలావరణం

భూమ్మీద కఠినశిలాయామయపొరను శిలావరణమని పిలుస్తారు. ఈ అశ్మావరణపు పైభాగం పొరలు పొరలుగా ఉండి గుల్లబారినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ మండలాన్ని భూపటలం (Crust) అని అంటారు. భూపటలంలో వివిధ రకాల శిలలుంటాయి. చాలాచోట్ల ఈ శిల మట్టిపొరలతోగాని, ఇనక పొరలుగాని కప్పి ఉంటాయి. భూపటలం ఇంచుమించు 50-60 కి.మీ. లోతువరకు వ్యాపించి ఉన్నట్లు శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం. దీనికింద ఒకేరకమైన శిలవల్ల నిర్మితమై ఉన్న మరొక పొర ఉంది. దీనిని అధఃస్థర (Substratum) అని అంటారు.

2.4 భూమి అంతర్నిర్మితి

శిలామయ భూపటలం రెండు పొరలుగా ఉన్నట్లు గ్రహించారు. అందులో పైన ఉన్న పొరను సియాల్ మండలం అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గ్రానైట్, తత్సంబంధ శిలలతో నిర్మితమై ఉన్నది. దీని విశిష్ట గురుత్వం 2.7. రసాయన దృష్టితో చూస్తే ఈ శిలల్లో సిలికా (Silica), అల్యూమినా (Alumina) అనే ఘటకాలు ప్రముఖంగా ఉండడం వల్ల సియాల్ అనే సంజ్ఞాసూచకమైన పేరు వచ్చింది.

ఆ విధంగానే కిందిపొరను సిమా (Sima) పొర అంటారు. ఈ పొరలో ఉండే శిలలు చాలా వరకు బసాల్ట్ (Basalt) ను పోలి ఉంటాయి. ఇవి చాలా బరువుగా ఉంటాయి. వీటి సరాసరి విశిష్ట గురుత్వం 3.3. వీటిలో సిలికా, మెగ్నీషియా (Magnesia) ప్రముఖ ఘటకాలుగా ఉండడంవల్ల ఈ పొరకు సిమా అని పేరు పెట్టారు. భూఉపరితలం మీద కనిపించే పెద్దఖండాలు (Continents) పైనున్న సియాల్ పొరలోని ముఖ్యభాగాలు. సముద్రాల అట్టడుగు ఉండే ప్రదేశాలు చాలా వరకు సిమాపొరతో నిర్మితమై ఉంటాయి.

మన ప్రితిలోని శిలావరణంలో ఉన్నది 4 ముఖ్య విభాగాలు. 1. అంతరకేంద్ర మండలం (innercore). దీని వ్యాసార్థం సుమారు 1300 కి.మీ./ 800 మైళ్లు. 2. బాహ్యకేంద్ర మండలం

ఇది 2000 కి.మీ./1350 మైళ్ల వ్యాసార్థం కలిగి ఉంటుంది. ఇది కొంతవరకు ద్రవస్థితిలో ఉంటుందని ఊహించినారు. 3. ప్రావారం (Mantle) ఇది 2900. కి.మీ./1800 మైళ్ల వ్యాసార్థం కలిగి ఉంటుంది. ఇది కేంద్రమండలానికన్న తక్కువసాంద్రత కలిగి ఉంటుంది. 4. భూపటలం (Crust) ఇది బాగా తక్కువ సాంద్రత కలిగిన శిలలచేత నిర్మితమై ఉంటుంది. ప్రావారంలో 70 నుంచి 700 కి.మీ. లోతున ఒక విశిష్ట మండలం ఉంది. దీనిని బలహీన ఆవరణం (asthenosphere) అని పిలుస్తారు. అంటే ఇది వేడిగా, బలహీనంగా ఉండి దీనిలో శిలామయపదార్థాలు వత్తిడికి లోనైనప్పుడు కొంతవరకు కదులుతాయి. దీనిపైననే కఠిన శిలామయ శిలావరణముంది. దీనిలో వేడి తక్కువగా ఉంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. భూమిలోని ప్రధానమైన పోరలు.

.....

.....

.....

.....

6. బలహీన ఆవరణంమధ్య ఉండేది.

.....

.....

.....

.....

7. సియాల్, సిమా అనే పదాలను వివరించండి.

.....

.....

.....

.....

2.5 భూఖండభాగాలు, సముద్రపరివాణాలు

భూగోళ ఉపరితల వైశాల్యం సుమారు 197 మిలియన్ చదరపు మైళ్ళు. అందులో సుమారు 71% భాగాన్ని జలాలు ఆవరించిఉన్నాయి. భూఖండాలు మిగతా 29% భాగాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాయి. ఈ జలావరణంలో అన్నిటి కంటే గొప్ప జలాశయమైన పసిఫిక్ (Pacific) మహా సముద్రం భూఉపరితల వైశాల్యంలో సుమారు 1/3 భాగం ఆక్రమించుకొని ఉన్నది. దీని సగటు లోతు 14000 అడుగులు. యూరేషియా, ఆఫ్రికా, ఉత్తర దక్షిణఅమెరికాలు, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా మొదలైన భూఖండాలు (Continents) సియాల్ పొరలోని ముఖ్య భాగాలు. తక్కువ సాంద్రత కలిగిన శిలలచే నిర్మితమైఉండటంవల్ల ఖండాలుఎత్తుగా, సముద్రంలోతేలియాడే మంచుఖండాల (Icebergs) వలేకనిపిస్తాయి. సముద్రమట్టానికన్న ఎత్తుగా ఉంటాయి. మహా సముద్రాంతర ప్రదేశాలు బరువైన శిలలచే నిర్మితమైనందువలన ఖండాలవలే పైకి కనిపించవు. భూఉపరితల ప్రాంతం అంతా ఒకేవిధంగా సమతలంలో ఉండదు. ఖండాలలో ఉన్నతంగాను, మహా సముద్రగర్భాలలో చాలా నిమ్నం

గాను ఉంటుంది. భూగోళంలో వేరువేరు ప్రదేశాలలో భూపటల ఉపరితలాన్ని కనుగొనగా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఒక విధంగా పరిశీలిస్తే రెండు ప్రత్యేక వేదికలు (Platforms) కనిపిస్తాయి. అవి 1. భూఖండవేదిక (Continental platform) 2. మహా సముద్రాంతర వేదిక (Oceanic platform). వీటికి మధ్యనున్న మెరక ప్రదేశాన్ని తీరపుటంచు (Shelf) అంటారు. దానిపక్కనే తీరపువాలు (Slope) కూడా ఉంది.

సముద్ర తీరంనుంచి సుమారు 200 మీటర్ల లోతువరకు ఉన్న సముద్రగర్భస్థప్రాంతాన్ని తీరపుటంచు (Continental shelf) అంటారు. నిజానికి ఈ తీరపు అంచునుంచే అసలు సముద్రగర్భ ప్రాంతాలు మొదలవుతాయి. హరివాణం (Basin) ఆకారంలో ఉన్న మహాసముద్రగర్భాలు జలాలతో పూర్తిగా నిండి భూఖండవేదికపైకి పారలి సుమారు 10 మీలియన్ చదరపు మైళ్ల ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నాయి. ఇటువంటి వాటిని తక్కువ లోతుగల సముద్రాలని అంటారు. ఉదా. బాల్టిక్ సముద్రం, నార్త్ సముద్రం మొదలైనవి. భూఖండ విభాగంలో కూడా ఈ రకంగానే వివిధ నైసర్గిక రూపాలు ఉన్నాయి. వీటిలో పర్వత శ్రేణులు, పీఠ భూములు, లోయలు, మైదానాలు, డెల్టాలు అని చాలా రకాలు ఉన్నవి. వీటిలో అత్యున్నత నైసర్గికరూపం హిమాలయపర్వతశ్రేణులు. వీటిలో మహాస్వతశిఖరం ఎవరెస్ట్ శిఖరం (29,140 అ). మహా సముద్రాంతర ప్రదేశాలను భూఖండభాగంలో ఉన్నట్లుగా వివిధనైసర్గికరూపాలుగా విభజించడం కష్టం. మొన్నటివరకు ఇవన్నీ హరివాణాల వలె అతిసామాన్యంగా ఉండేవని భావించేవారు. కాని ఇటీవలి పరిశోధనలవల్ల సముద్రాలలో కూడా పర్వతాలు, లోయలు, పీఠభూములున్నాయని తేలింది. సముద్ర గర్భంలో ఉన్న పర్వతశ్రేణులలో అతిముఖ్యమైనది మధ్యఅట్లాంటిక్ రిడ్జ్. ఆ విధంగానే అగాధకందకాలు (Trenches), లోయలు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నారు. అతి లోతైన కందకం 34,340 అ. లోతు కలిగినది. మిండనావో అనేచోట ఫిలిప్పీన్ దీవులలో ఉన్నది. దీనినే స్వైర్డీప్ (Swiredeep) అని అంటారు.

2.6 భౌమ ప్రక్రియలు

భౌమ కాలమంతటా భూపటలంలోను, దాని ఉపరితలంమీద, దాని పదార్థాలలో, వాటి నిర్మితులలో, భూ, సముద్ర భాగాల విస్తరణలో, పర్వతాలు, మైదానాలలో, చివరకు శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా ఎన్నోరకాల మార్పులు సంభవిస్తూ వచ్చాయి. ఈ మార్పులకు కారణభూతమైన ప్రక్రియలను భౌమ ప్రక్రియలు (Geological processes) అంటారు. వీటిని స్థూలంగా కింది విధంగా విభజించవచ్చు.

1. బహిర్ భౌమ ప్రక్రియలు (External geological processes) లేదా బహిర్జనిత ప్రక్రియలు: శైథిల్యం, క్రమక్షయం, నిక్షేపణ ఈ రీతికి చెందినవి.
2. అంతర్ భౌమ ప్రక్రియలు (Internal geological processes) లేదా అంతర్జనిత ప్రక్రియలు: భూ చలనాలు, అగ్నిమయక్రియ ఈ రీతికి చెందినవి.

బహిర్ భౌమప్రక్రియలు భూఉపరితలం మీద జరుగుతూ, భూమి మీద ఉండే ఎత్తు-వల్లలు ఒక సాధారణ మట్టానికి రావడానికి దోహదం చేస్తాయి. అందువల్ల వీటిని శ్రేణీకరణ (Gradation) లేదా వికోషీకరణ (Denudation) ప్రక్రియలు అంటారు. శైథిల్యం అంటే శిలలు ప్రకృతిసిద్ధ ప్రక్రియలవల్ల విచ్ఛిన్నంకావడం, విఘటన చెందడం. శిలాపదార్థాలు తొలగిపోవడం, రవాణాకావడం క్రమక్షయం కిందికి వస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలు భూఉపరితలంమీద ఉండేఉన్నత భాగాలను కోసేస్తూ అవి రూపుమాసిపోవడానికి దోహదంచేస్తాయి. కాబట్టి వీటిని అధఃశ్రేణీకరణ (Degradation) ప్రక్రియలు అంటారు. వీటికి భిన్నంగా నిక్షేపణ ప్రక్రియలు భూఉపరితలం మీద ఉండే నిమ్న భాగాలను నింపి, వాటి మట్టం పెరగడానికి దోహదం చేస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ఉత్తరేణీకరణ (Aggradation) ప్రక్రియలు అంటారు.

ఈ శ్రేణీకరణ ప్రక్రియలు మన చుట్టూ ఎప్పుడూ పనిచేస్తూ భూదృశ్యాలలో మార్పులను తెస్తూ ఉంటాయి. శ్రేణీకరణ కారకాలు లేదా భూమికారకాలలో ముఖ్యమైనవి (అ)నదులు, (ఆ)భూగర్భ జలం, (ఇ) కదిలేమంచు (హిమానీనదాలు), (ఈ) సముద్రాలు, (ఉ) సరస్సులు, (ఊ) పవనాలు. గురుత్వాకర్షణ, కొద్దిమేర జీవజాలం కూడా ఈ ప్రక్రియలలో పాలుపంచుకుంటాయి.

అంతర్భౌమ ప్రక్రియలు భూమిలోపల ఉద్భవించినప్పటికీ, వాటి ప్రభావం భూఉపరితలం మీద కూడా కనిపిస్తుంది. ఘనరూపంలో ఉన్న భూపటలం అన్నిరకాలలోని పెద్ద లేదా చిన్న భాగాలు ఉన్నతంకావడానికి (Elevation) లేదా అవతరణం చెందడానికి (Subsidence) మూలమైనవి. ఖండోద్భవ చలనాలు (Epeirogenic movements) వీటికి భిన్నంగా శిలలను సంపీడనకు, సంకర్షణకు గురిచేస్తాయి. పర్వత వంక్తులుగా ఉత్థానం చెందడానికి మూలమైన పర్వతోద్భవ చలనాల (Orogenic movements) లవంటి మంద(Slow) చలనాలు, భూకంపాలవంటి ఆకస్మిక చలనాలు భూచలనాల కిందికి వస్తాయి.

భూపటలంలోను, దాని ఉపరితలం మీద వేడిగా ఉండే శిలాద్రవం (మాగ్మా లేదా లావా) చలనాలకు సంబంధించిన అన్ని దృగ్విషయాలు (Phenomena) అగ్నిమయ క్రియ కిందికి వస్తాయి. ఈ దృగ్విషయాలు అంతర్గమ (Intrusive) రీతికి చెందినవి (భూమి అంతర్భాగానికి పరిమితమైనవి) కావచ్చు లేదా ఉద్రవ (Extrusive) రీతికి చెందినవి (భూఉపరితలం మీద సంభవించేవి - అగ్ని పర్వత ఉద్బోధనలు) కావచ్చు.

గతిశీలతగల భూమిని గురించి ఇటీవలి కాలంలో ముఖ్యంగా గతకొద్ది దశాబ్దాలలో ఎంతో విలువైన కొత్త సమాచారం తెలిసింది. అధునాతన సిద్ధాంతాలలో పేర్కొనదగినది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ (Plate Tectonics) సిద్ధాంతం. దీనివలన భూఅంతర్భాగంలో జరిగే వివిధ ప్రక్రియల గురించిన జ్ఞానం మనకు కలుగుతుంది. ఈ సిద్ధాంతాన్ని సుసరించి భూమిపైన ఉన్న కఠినశిలామయ శిలాపరణం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా వగిరి ఉన్నట్లు తెలుసుకోవచ్చు. వాటిని ప్లేట్స్ అని అంటారు. బలహీన ఆవరణంలో ఏర్పడిన స్వల్ప చలనాలవల్ల ఈ ప్లేట్లు కొంత జరుగుతూ ఉంటాయి. అగ్నిమయక్రియ, భూచలనాలు, సముద్ర భూతల విస్తరణ మొదలైన వాటికి ఈ ప్లేట్ల కదలికలే కారణమని భావిస్తున్నారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

8. భూమిపైన సంభవించే మార్పులకు కారణమైన రెండు ప్రధాన ప్రక్రియలను పేర్కొనండి.

.....

.....

.....

.....

.....

9. పై ప్రక్రియలలో పాల్గొనే ప్రధాన కారకాలను తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 సారాంశం

ఈ భాగంలో భూమికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను - ఆకృతి, పరిమాణం, అంతర్నిర్మితి, ప్రక్రియల వంటి వాటిని గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాం. ఈ భాగంలో భూమి భౌతిక పరిసరాలను గురించి కూడా ప్రస్తావించాం. భూనిర్మితిలోని ప్రధాన విభాగాలను గురించి చెప్పాం. భూ ఖండభాగాలు, సముద్ర హరివాణాలకు సంబంధించిన విషయాలను కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాం. ప్రధానమైన భౌమ ప్రక్రియలు, కారకాలను గురించి కూడా ఈ భాగంలో క్లుప్తంగా చెప్పాం.

2.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి, శని, యూరేనస్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో.
2. 12,756 కి.మీ.
3. 12,714 కి.మీ.
4. 5.5
5. భూపటలం, ప్రావారం, కేంద్రమండలం
6. 70 నుంచి 700 కి.మీ. మధ్య
7. శిలలతో కూడుకొని ఉండే భూపటలం. 30-33 కి.మీ. లోతువరకు ఉంటుంది. దీనిని రెండు పొరలుగా విభజిస్తారు. పై పొర సిలికా (Si-సి), అల్యూమినా (Al-అల్) అధికంగా ఉన్న శిలలతో కూడుకొని ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని 'సియాల్' పొర అంటారు. క్రింది పొర సిలికా (Si-సి), మెగ్నీషియా (Ma-మ) అధికంగా ఉన్న బసాల్టిక్ శిలలతో కూడుకొని ఉంది కాబట్టి దీనిని 'సిమా' పొర అంటారు.
8. (అ) బాహ్యభౌమ ప్రక్రియలు (శైథిల్యం, క్రమక్షయం, నిక్షేపణ) (ఆ) అంతర్ భౌమ ప్రక్రియలు (అగ్నిమయక్రియ, భూచలనాలు)
9. కారకాలు-నదులు, భూగర్భం, హిమానీనదాలు, సముద్రాలు, సరస్సులు, పవనాలు, గురుత్వాకర్షణ.

2.9 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. సూర్యుడి నుంచి క్రమంగా తొమ్మిది గ్రహాల పేర్లు రాయండి. వీటిలో భౌమగ్రహాలను ఏవి? వాటి వ్యాసాలను, విశిష్ట గురుత్వాలను పోల్చండి.
2. భూఉపరితల ప్రధాన రూపురేఖలను వర్ణించండి.
3. వివిధ భౌమప్రక్రియలను వర్ణించండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. భూమి ఆకృతి, పరిమాణం గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.
2. భూమి అంతర్నిర్మితిని గురించి క్లుప్తంగా రాయండి.

ఖండం 2 బహిర్ భామప్రక్రియలు

భాగం-3 : శిలాశైధిల్యం

- | పాఠ్యాంశాలు | సరస్సుల |
|-------------|--|
| 3.0 | అక్షయలు |
| 3.1 | పరిచయం |
| 3.2 | యాంత్రిక శైధిల్యం |
| 3.2.1 | యాంత్రిక శైధిల్యం పై ప్రభావం చూపే అంశాలు |
| 3.3 | రసాయన శైధిల్యం |
| 3.3.1 | రసాయన శైధిల్యంలోని ప్రధాన ప్రక్రియలు |
| 3.4 | శైధిల్యంపై శీతోష్ణస్థితి ప్రభావం |
| 3.5 | శైధిల్యఉత్పాదితాలు |
| 3.6 | బృహత్ వ్యర్థత |
| 3.7 | సారాంశం |
| 3.8 | మీ అవగాహనను పరీక్షించుకొండి - మాదిరి సమాధానాలు |
| 3.9 | మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు |
| 3.10 | పదకోశం |

3.0 అక్షయలు

ఈ భాగం ప్రకృతిలో నిర్విరామంగా జరిగే శైధిల్యప్రక్రియ, దానిప్రభావం, ఉత్పాదితాలను గురించి పరిచయం చేస్తున్నాం.

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీకు కిందివిషయాలు తెలుస్తాయి.

- 'శైధిల్యం' నిర్వచనం
- విఘటన లేదా యాంత్రిక శైధిల్యం, విఘటన లేదా రసాయన శైధిల్యం.
- శైధిల్యం పై శీతోష్ణస్థితి ప్రభావం.
- శైధిల్య ఉత్పాదితాలు - పుత్రికలు.

3.1 పరిచయం

భూఉపరితలం మీద వివిధ రకాల ప్రక్రియలవల్ల బహిర్గతశిలలు విచ్ఛిత్తితో క్షీణస్థితిని కలుగచేసే విధానాన్ని శైధిల్యం అంటారు. గాలి, తేమ, శీతోష్ణస్థితి వంటివాటి ప్రభావానికి లోనై శిలాపదార్థాలు మార్పుచెందే ప్రక్రియను శైధిల్యత అంటారు. వాతావరణంలోని ముఖ్యాంశాలు ఉష్ణోగ్రత, పీడనం, చెమ్మ, వేడి, చెమ్మవలన రసాయన చర్యకు ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. రసాయన విఘటనం చెంది సంక్లిష్ట ఖనిజాలు సామాన్య లవణాలుగా మారతాయి. ఉష్ణోగ్రతలో భేదాలవల్ల, రుతుకాల భేదాలవల్ల, వాతావరణ పీడనలోని మార్పులవల్ల శిలలు భౌతికవిచ్ఛిత్తికి లోనై శిథిలమౌతాయి. నీటి ఆవిరి, తేమ శిలలలో సహజ సిద్ధమైన పగుళ్ళు, చీటలు మొదలైన వాటిద్వారా లోపలికి ప్రవేశించి ఖనిజాలను కరిగేబట్లు చేసి వాటిని మారుస్తాయి. అలాగే లోపల ఉన్న నీరు శితాకాలంలో గడ్డ కట్టి వ్యాకోచం

చెందినప్పుడు, ఆ పగుళ్ల బీటలు మరింత పెద్దవిగా అవుతాయి. ఈ విధంగా పగుళ్ళులో మొదలైన శైథిల్య ప్రక్రియ, క్రమంగా రాతినంతా మార్చివేస్తుంది.

భూఉపరితలం మీద ఉండే శిలల కఠిన్యంలో వైవిధ్యమున్నప్పుడు వాటిలో తక్కువ కఠిన్యం కలిగిన శిలలు శైథిల్య ప్రక్రియకు ముందుగా లోనవుతాయి. ఈ రకపు శిలలు త్వరగా గుల్లభారి నట్లుకనిపిస్తాయి.

శైథిల్య ప్రక్రియ వల్లసాధించబడే భౌమికచర్య రెండు విధాలు.

1. భౌతిక మార్పులు : శితోష్ణస్థితివల్ల, మంచువల్ల, జీవకోటివల్ల కలిగే మార్పులు ముఖ్యమైన భౌతిక మార్పులు.

2. రసాయన మార్పులు : నీరు, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, బాక్టీరియంలు మొదలైన వాటి వల్ల కలిగే మార్పులు రసాయనిక మార్పులలో ముఖ్యమైనవి. భౌతిక, రసాయన, జీవకారకాలు ఒక దానితో ఒకటి ఎక్కువగా సహకరించుకొంటాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. భూపటలంలోని శిలా పదార్థాలు వదులైపగిలిపోవడం :

- (అ) పర్వతోద్భవప్రక్రియ
- (ఆ) శైథిల్యం
- (ఇ) భౌతిక లేదా యాంత్రిక శైథిల్యం
- (ఈ) రసాయన శైథిల్యం

3.2 యాంత్రిక శైథిల్యం (MECHANICAL WEATHERING)

శిల ఏదైనా భౌతిక విచ్ఛిత్తికి లోనయినప్పుడు చిన్న ముక్కలుగా ముక్కలుగా మారుతాయి. కాని వాటి ప్రాథమిక లక్షణాలను కోల్పోదు. భౌతికవిచ్ఛిత్తి వల్ల పగిలినశిలలు ఎప్పుటికప్పుడు కొత్త ఉపరితలాలను గాలికి, తేమకు బహిర్గతం చేస్తుంటాయి. అందువల్ల విచ్ఛిత్తి రసాయనవిఘటనానికి దోహదకారి అవుతుంది. దానివల్ల శిలా పదార్థాలు రసాయనికంగా మార్పుచెందుతాయి. కొన్నిరసాయనిక మార్పులు పెద్ద ఎత్తున శిలభౌతికవిచ్ఛిత్తికి దారితీస్తాయి. సాధారణంగా భౌతిక, రసాయన శైథిల్యకార్యక్రమాలు రెండూజంటగానే ఏకకాలంలో జరుగుతుంటాయి. ప్రకృతిలో శిలలు ముక్కలుకావడానికి దోహదంచేసే ప్రక్రియలు నాలుగుఉన్నాయి. అవి తుహినక్రియ, ఉష్ణోగ్రత ప్రభావాలు, జంతువులు వృక్షాల యాంత్రిక చర్యలు, గురుత్వాకర్షణ.

3.2.1 యాంత్రిక శైథిల్యానికి కారణమైన అంశాలు

అ. తుహిన క్రియ

తుహినక్రియాప్రభావం ముఖ్యంగా దైనందిన శితోష్ణస్థితిలోని తీవ్రతర మార్పుకు గురిఅయ్యే శిలలమీద బాగా కనిపిస్తుంది. ఉన్నత పర్వతశిఖరాల మీదకనిపించే శిలలలో ఇది బాగా ఉంటుంది.

ఇక్కడ మధ్యాహ్నకాలంలో ఉష్ణోగ్రత 120°F వరకు పెరుగుతుంది. అర్ధరాత్రిలో నీరు గడ్డకట్టే స్థితి వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇటువంటి విపరీతఉష్ణోగ్రతా వత్సాసాలుండేచోట్ల శిలలలో సహజంగా పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. వాటిలో చేరిన నీరు గడ్డక కడుతుంది. నీరు ఘనీభవించినప్పుడు దాని ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది. హిమం వ్యాకోచం చెంది రాళ్ళమీద చాలా వత్తిడి కలగజేస్తుంది. అందువల్ల చిన్నచిన్న పగుళ్ళు క్రమంగాపెద్దవై కాలక్రమాన శిలలను బద్దలుచేసి బండలుగా మారుస్తాయి. అవిక్రమేణా జారుతూ పర్వతసానువులవద్దకు జేరతాయి. పర్వతసానువులలో దీనికారణంగా కొనలుదేరిన శిథిలశిలాఖండసముదాయాలు (Angular rock debris) కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి వాటిని స్క్రీ (Scree) అని అంటారు. కాలక్రమేణా స్క్రీ కూడా కిందకు జారిపోవడంవల్ల శిలాపాతాలు (Rock falls) సంభవిస్తుంటాయి.

ఆ. తీవ్రతీవ్రోష్ణస్థితి మార్పుల ప్రభావం

ఎడారి ప్రదేశాలు, పాడిగాలులు వీచే ప్రాంతాలలో, ఋతుసవనాల ప్రభావానికి లోనయ్యే భూములలో, శీతోష్ణస్థితిలో తీవ్రమైన మార్పులు ఉంటాయన్నది తెలిసినవిషమయే. అక్కడ పగటివేళలలో విపరీతమైన వేడి, రాత్రిలో విపరీతమైన చలి ఉంటుంది. శిలలు కూడా విపరీత మార్పులకు లోనవుతాయి. శిలలకు చాలా కొద్ది పాటి ఉష్ణసంపానశక్తి ఉండటంవల్ల వాటి పైభాగాలు ఈ ప్రభావానికి లోనవుతాయి. రాతి పైభాగాలు పగటివేళ అధిక ఉష్ణానికి వ్యాకోచించి రాత్రివేళ సంకోచిస్తాయి. లోపల ఉన్న గట్టిరాయినుంచి పేరుపడి రాతిపైభాగాలు పొరలవలె మారతాయి. ఈ పొరలు క్రమంగా ఉల్లి పొరలవలె రాలిపోతుంటాయి. దీనినే అవదళనం (Exfoliation) అని పిలుస్తారు. గాలిలో ఎక్కువగాఉంటే ఈఅవదళనక్రియ బాగాజరుగుతుంది. దీనివల్ల శిలలు క్రమేణా గుండ్రటి రాళ్ళుగా మార్పుచెందుతాయి. దీనినే గోళాభ శైథిల్యం (Spheroidal Weathering) అంటారు. ఇది ఎక్కువగా గ్రనైట్, బసాల్ట్ మొదలైన శిలలలో కనిపిస్తుంది. రాతికొనలనుంచి, అంచులనుంచి ఈ శైథిల్యం క్రమంగా పగుళ్ళుద్వారా దానిని చుట్టుముట్టి చివరకు కొండలు కలశాకారం (Dome Shaped) పొంది చూడడానికి ఎంతో వింతగా కనిపిస్తాయి. కుంభాకారంగా ఉండే పర్వతసానువులలో ఇండ్లకప్పులమీద ఉన్నట్లుగా రాతి పొరలు ఒక దాని మీద ఒకటి పేర్చినట్లుగా కనబడతాయి. ద్వీపాలవలె కనబడే ఇటువంటి కొండలు, గుట్టలని ఆఫ్రికా మొజాంబిక్ ప్రాంతంలో ఇన్ సెల్ బర్గ్స్ (Inslebergs) అంటారు. బ్రెజిల్ దేశంలోని ముఖ్య పగరమైన రయో-డి-జెసిరో వద్ద షుగర్ లోఫ్ హిల్ (Sugarloaf Hill) ఈ ఇన్ సెల్ బర్గ్లకు చక్కని ఉదాహరణ.

ఇ. వృక్షాలు, జంతువులవల్ల కలిగే యాంత్రిక మార్పులు

అక్కడక్కడ రాళ్ళమధ్య మొక్కలు, చెట్లు పెరుగుతుండడం మనం చూస్తుంటాం. ఆ మొక్కలు లేదా చెట్లు పెరుగుతున్న కొద్ది వాటివేర్లు పెద్దవయి శిలలమీద అధికపీడితనాన్ని కలగజేస్తాయి. పీడన శక్తి వల్ల రాళ్ళలోని పగుళ్లు బీటలు మరింత వెడల్పుగారాళ్ళనుముక్కలుగా చేస్తాయి. రంధ్రాలు, బొరియలుచేసే ఎలుకలు, వానపాములుమొదలైన జంతువులు మట్టిని హరించే సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి. కొంత వరకు మార్పుచెందిన శిలాభాగాలను లోపలినుంచి ఈ జంతువులు ఉపరితలం మీదకు తీసుకొనివస్తాయి. దానివల్ల ఆ శిలలు మరింత శిథిలమవుతాయి. ఈ చిన్న చిన్న జంతుజాలంచేసే పనులు ఒక్కొక్కప్పుడు అమిత అశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. వానపాములు ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎకరానికి సుమారు 10 బున్నుల మట్టిని కింది నుంచి ఉపరితలానికి తీసికొని వస్తాయని శాస్త్రజ్ఞులు అంచనా కట్టారు.

శిలీంధ్రాలు (Fungi) లైకన్ (Lichens) వృక్షజాతులు రసాయనశైథిల్యానికి చాలా దోహదం చేస్తాయి. ఎందుకంటే అవి తాము నివసించే శిలలనుంచి వాటిజీవన విధానానికి పనికి వచ్చే కొన్ని మూలకద్రవ్యాలను సేకరించుకొనగలుగుతాయి. బాక్టీరియంలతో కూడిన జలాలు రాళ్ళలోని పగుళ్ళుద్వారా లోనికి ప్రవేశించి రసాయనికంగా రాళ్ళను శిథిల పరచడానికి బాగాపనికివస్తాయి. అంతే కాకుండా చనిపోయిన జంతువృక్షజాలాలను ఈ బాక్టీరియంలు కుళ్ళబెట్టి కృశింపచేసి, చివరకు నాశనం చేస్తాయి. అట్లా ఏర్పడిన జీవసంబంధ ఆవశేషాలను “హ్యూమస్” (Humus) అంటారు. మృత్తికలలో

కనిపించే జీవ సంబంధ పదార్థాలలో హ్యూమన్ చాలా ముఖ్యమైనది. మెత్తగా జెల్లీ(Jelly) వలే ఉండి నేలల్ని బంకగా, జిగురుగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. వ్యవసాయానికి నేలని అనువుగా మారుస్తాయి.

ఈ. గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం

గురుత్వాకర్షణ ప్రభావంవల్ల శిథిలమైన శిలలు తక్కిన కఠినశిలాభాగాలనుంచి వేరుపడి కిందికి జారతాయి. శిలలలోని కొత్తభాగాలు బయటపడి శైథిల్యక్రియకు లోనవుతూఉంటాయి. బాగా ఏటవాలుగా ఉన్న కొండచరియలలో శిథిలశిలాభాగాలు క్రమంగా గురుత్వాకర్షణ శక్తివల్ల కిందికి జారిపడిపోయి కొండమొదట్లలో పోగవుతుంటాయి. అటువంటి శిథిలశిలానిక్షేపాలను టాలస్ (Talus) అంటారు. క్షితిజసమాంతరరేఖకు 25° నుంచి 30° వాలులో ఉపరితలం మీదనే ఈటాలస్ ఏర్పడడానికి వీలుంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

2. యాంత్రికశైథిల్యం పై ప్రభావం చూపే అంశాలను పేర్కొనండి?

.....

.....

.....

.....

3. అవదళనం అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

4. గోళాభశైథిల్యం అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

3.3 రసాయన శైథిల్యం (CHEMICAL WEATHERING)

రసాయన మూలకాలను తొలగించడం లేదా చేర్చడం ద్వారా ఖనిజ రసాయన సంఘటనలోను, అంతర్నిర్మితిలోనూ మార్పులుతెచ్చే సంక్లిష్ట ప్రక్రియలు రసాయనశైథిల్యంలో కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులు సంభవించినప్పుడు మూలశిల ఉపరితలపరిసరాలకు సరిపడే కొత్త పదార్థంగా విఘటన చెందుతుంది. దీనిఫలితంగా రసాయన శైథిల్యఉత్పాదితాలు కొత్త పరిసరాలలో ఉన్నంతకాలం ఎటువంటి మార్పులకు గురికాకుండా అట్లాగే ఉంటాయి. రసాయనశైథిల్యానికి అతి ముఖ్యమైన కారకం నీరు, నీరు శిలలను విఘటనచేయడంలో పాత్రవహించే ప్రధాన ప్రక్రియలు ద్రావణీకరణ, ఆక్సీకరణ, ఆర్థికరణ. ఈ ప్రక్రియలకు ముఖ్యంగా వర్షపునీరు, భూగర్భజలాలు మంచి దోహదకారులు. అవి తమప్రసర

ణంలో కొంత అక్సిజన్, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్లను, కొన్ని ఆర్గానిక్ పదార్థాలను జీర్ణించుకొంటాయి. రసాయనశైథిల్యం ఈ వివిధ పదార్థాల గాఢత, శీతోష్ణ పరిస్థితులు, బాక్టీరియంల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవి ద్రావణీకరణం (Solution) అక్సీకరణం (Oxidation), అర్దీకరణం (Hydration) కార్బనేటీకరణం (Carbonation) అనేవి. శిలల్లో ఉండే వివిధ ఖనిజాలు ఈ రసాయన శైథిల్యానికి లోనవుతాయి. శిథిలతకులోనుకాని ఖనిజాలలో పేర్కొనదగినవి క్వార్ట్జ్ (Quartz), మస్కోవైట్ (Muscovite) లు. కాల్సైట్ (కార్బనేట్) లు సునాయనంగా ద్రావణరూపంలో బయటికిపోతాయి. సిలికేట్ (Silicate) ఖనిజాలలో చాలా భాగం రసాయనమార్పులవల్ల విఘటనంచెంది విశిష్ట అద్రావణ (insoluble) నిక్షేపాలు రూపొందుతాయి. కొన్ని కఠినపదార్థాలుగా మారి పదార్థాలు ద్రావణరూపంలో బహిష్కృతమవుతాయి.


మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా శిలలు విఘటన చెందడం

- (అ) రసాయనశైథిల్యం
- (ఆ) యాంత్రికశైథిల్యం
- (ఇ) శైథిల్యం
- (ఈ) జీవకృతశైథిల్యం

6. 'రసాయన శైథిల్యం' నిర్వచనాన్ని తెలియ జేయండి.

ద్రావణీకరణం : వర్షజలంలో, వాతావరణంలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కొంత మేర కరిగిఉంటుంది. శిలల లోని పగుళ్లుద్వారా లోపలికిచేరి ఎన్నో రసాయనమార్పులను కలిగిస్తుంది. కార్బనేట్లుగా మార్పుచెంది సునాయనంగా ద్రావణీకరణ క్రియకు లోనవుతాయి. కాబట్టి సున్నపురాళ్ళ (Limenstones) లో ఈ ప్రక్రియ అతి వేగంగా జరుగుతుంది.




సున్నపురాయి విస్తారంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ ద్రావణీకరణ క్రియ వల్ల కలిగే ఫలితాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. రాళ్ళమీద చారలు, చాళ్లు (groves) విశేషంగా కనిపిస్తాయి. ఈ సున్నపురాళ్ళలో మాలిన్యాలుగా ఉండే క్వార్ట్జ్, పంకసంబంధ పదార్థాలు (clay minerals) సాధారణంగా కరగవు. అవి మట్టిఅడుగు భాగానికిచేరతాయి. ఎర్రభూములు (Terra Rosa) అనే ప్రత్యేకమైన నేలలు

ఈ విధంగా ఏర్పడినట్టివే. సుదూరాళ్ళతో కూడిన నేలలో కనిపించే ఫ్లింట్ జంబాలం (Clay with Flints) కూడా ఒక విశిష్ట అవశిష్ట నిక్షేపమే (Residual Deposit).

ఆక్సికరణం : ఈ ప్రక్రియలో ఆక్సిజన్ కరిగి ఉన్న జలాలు ఎంతో ప్రాముఖ్యం పోస్తాయి. ఇనుప ఖనిజాలు వీటి ప్రభావానికి ముందుగా లోనవుతాయి. పైరాక్సీన్ (Pyroxene) ఏంఫిబోల్ (Amphibole), ఆలివీన్ (Olivine) మొదలైన అయోధాత సిలికేట్ ఖనిజాలలో ఉన్న ఫెర్రస్ (Ferrous) ఇనుముగా మారుతుంది. మరికొన్ని పైరాక్సీడ్లుగా మారతాయి. ఆక్సికరణ క్రియవల్ల గోయ్థైట్ (Goethite), లిమోనైట్ (Limonite) వంటి పైరాక్సీడ్లు శిలల్లో ఏర్పడతాయి. వీటివల్ల ఏర్పడే శిథిలత రాళ్లను ఎరుపు, పసుపు, పచ్చ రంగులలో కన్పించేలా చేస్తాయి.

ఆర్టికరణం : ఈ ప్రక్రియలో కొన్ని ఖనిజాలకు రసాయనికజలం అదనంగా చేరడంవల్ల పైరాక్సీడ్లుగాను, ఆర్థోసిలికేట్ ఖనిజాలుగాను మారతాయి. గ్నైట్ వంటి కఠినశిలల్లో విరివిగా కనిపించే ఫెల్స్పార్ (Felspar) ఖనిజం త్వరగా శిథిలమై కెయిలిన్ (Kaolin) అనే తెల్ల సుదృఢంగా మార్పు చెందుతుంది. సామాన్య మృత్తికలలో దొరికే ముఖ్యమైన జంబాల విశేషం ఇది.



ప్లేజియోక్లేజ్ (Plagioclase) ఫెల్స్పార్ శిథిలతకూడా ఈ రకమైనదే. ఆర్థోసిలికేట్ ఖనిజాలలో చెప్పుకోదగినవి లాల్క్ (Talc), సర్పెంటైన్ (Serpentine), క్లోరైట్ (Chlorite), జియోలైట్ (Zeolites)లు.

కార్బనేటీకరణం : రసాయన శైథిల్యంలో మరొక ముఖ్యమైన క్రియ ఇది. క్షారఆక్సిదాలైన కార్బియమ్, మెగ్నీషియమ్, సోడియమ్, పోటాషియమ్ ఆక్సైడ్లతో కార్బనడైఆక్సైడ్ సంయోగం చెందడంవల్ల అవి కార్బనేట్లు లేదా బైకార్బనేట్లుగా మారతాయి. భూఉపరితలజలాల వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కొంతమేర కరిగిఉంటుంది. అట్లా సమ్మిశ్రితమైన జలాలకు వివిధ రకాల పదార్థాలను కరిగించే పరిమేళజలం కన్న చాలాత్వరగా కరిగించే శక్తి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ జలాలు శిలాశైథిల్యానికి మంచి దోహదకారులు.

బయోటైట్ (Biotite) ఆగైట్ (Augite) హోర్న్బ్లెండ్ (Hornblende) మొదలైన ఖనిజాలలో ఉన్న అల్యూమినా (Alumina) ఇనుపఆక్సిదాలు (Fe_2O_3) శైథిల్యప్రక్రియ జరిగిన తర్వాత క్లోరైట్, జంబాలపదార్థాలు (Clay materials) లిమోనైట్ మొదలైన అవక్షేప పదార్థాలుగా మిగులుతాయి. ఈ లిమోనైట్ వల్లనే శిథిలశిలలు సాధారణంగా మట్టిఎరుపు రంగు (Earthy Red or Brown) లో ఉంటాయి.

రసాయన శైథిల్యంవల్ల కొన్ని ఖనిజాలు కరిగేలవణాలుగా మారి ద్రావణరూపంలో శిలలనుంచి వేరువుతాయి. మరికొన్ని ఖనిజాలు తమనిరోధశక్తిని కోల్పోయి వేరువేరు శైథిల్యప్రక్రియల ప్రభావానికి లోనయి క్రమంగా కృశించిపోతాయి. ఖనిజాల పరస్పర సంబంధాలను బలహీనపరిచి భౌతికంగా వాటిని శిథిలపరచడానికి రసాయనశైథిల్యం కొన్ని సమయాలలో తోడ్పడుతుంది. వర్షపు నీరు శిలలలోని పగుళ్ళలోకి చొచ్చుకొనిపోయి అక్కడ కొన్ని ఖనిజాలను లవణాలుగా మార్చివేసి వాటిని క్రమంగా తొలగించడంవల్ల శిలలు సచ్చిద్రవం (Porous) గా మారి చివరకు నశించిపోతాయి. ఉదాహరణకు ఇసుక రాళ్ళు (Sandstone) లో మేళన (Cement) పదార్థ ఖనిజాలు కరిగిపోతాయి. ఇసుక రేణువులు క్రమంగా విడివిడిపోతాయి. శైథిల్య ప్రక్రియ అనంతరం కొన్ని ఖనిజాలు ఘనపరిమాణంలో పెరిగి పెద్దపై అవదళనానికి దోహదకారులవుతాయి.

3.4 శైథిల్యం పై శీతోష్ణస్థితి ప్రభావం

భూగోళం మీద శిలాశైథిల్యం అన్ని ప్రాంతాలలోను ఒకే విధంగా ఉండదు. శీతోష్ణస్థితుల ననుసరించి మారుతూఉంటుంది. ప్రధాన శీతోష్ణమండలాలు నాలుగింటిని శిలాశైథిల్యం రీతిగా పరిశీలిద్దాం.

అ. భూమధ్య రేఖాప్రాంతం (Equatorial region)లో అధికఉష్ణం, వర్షపాతం వల్ల శిలాశైథిల్యం చాలా ఎక్కువ. వేడి, తేమ ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల రసాయనిక మార్పులు సులభంగాను, త్వరితంగాను జరుగుతాయి. శిలల్లోని సిలికేట్ ఖనిజాలు పూర్తిగా శిథిలమవుతాయి. సిలికా ద్రావణరూపంలో పూర్తిగా తొలిగిపోతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఆర్గానిక్ పదార్థాల ఉనికి ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతపు శిథిలశిలావిశేషాలను లేటరైట్ (Laterite) లు అంటారు. ఇది ఇనుప పైడ్రాక్సైడ్ లతో కూడుకొని ఉండి చూడటానికి ఎర్రగాఉంటుంది. అల్యూమినియమ్ పైడ్రాక్సైడ్ తో ఉండి లేటరైట్ ను బాక్సైట్ (Bauxite) అంటారు.

ఆ. నిర్జల, మరుభూములలో (Hot and dry deserts) అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలుండి విపరీత శీతోష్ణపరిస్థితులుండడం సహజం. అటువంటి శుష్క ఎడారులలో వృక్ష సంతతి ఎక్కువగా మనలేదు. శిలలు తీవ్ర వ్యాకోచనంకోచాలకు లోనవుతాయి. వర్షపాతం చాలా తక్కువ కావడంవల్ల వాన నీరు కాస్తా భూమిలోపలికి త్వరగాఇంకిపోవడం జరుగుతుంది. సూర్యతేజాపం ఎక్కువగా ఉండి గాలిలో తేమ అత్యల్పంగా ఉండటంవల్ల భూగర్భజలాలు, కేశాకర్షణ (Capillarity) ప్రభావం వల్ల ఉపరితలానికి దగ్గరగా నిక్షేపితమవుతాయి. కేశాకర్షణశక్తివల్ల పైకిఉదికివస్తున్న ఉష్ణజలాలు శిలలలోని కొన్ని ఖనిజాలతో రసాయన సంయోగంచెంది వాటిశైథిల్యానికి కారణమవుతాయి. కొత్త ఖనిజాలు స్ఫటికరణ సందర్భంలో ఏర్పడే పీడనం శిలలలో కొత్తకొత్త పగుళ్లను ఏర్పరుస్తాయి. కేశాకర్షణవల్ల పైకి ఉదికివచ్చే జలాలుకొన్ని లవణాలను ఉపరితలం వద్దకు చేరుస్తాయి. అవి క్రమంగా ఒక గట్టి పొరవలె ఏర్పడతాయి. దీనిని కఠినతలం (Hard Pan) అంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు శిలలపైన కూడా ఒక రకమైన బూడిద రంగుపూత ఏర్పడుతుంది. దీన్నే ఎడారి మెరుగు (Desert varnish) అంటారు.

ఇ. సమశీతోష్ణ మండలాల (Temperate zones) లో శిలాశైథిల్యం చాలారకాలుగా ఉండడానికి ఋతువులలోని తారతమ్యాలే కారణం. శీతాకాలంలో మంచు విపరీతంగావడడంవల్ల తుహినక్రియ ప్రభావం చాలా ఎక్కువ. వేసవి కాలంలో రసాయన శైథిల్యం హెచ్చుగా ఉంటుంది. నీరు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ద్రావణీకరణ ద్వారా రసాయనశైథిల్యం హెచ్చుస్తాయిలో జరుగుతుంది.

ఈ. అతిశీతల ఆర్కిటిక్, అంటార్క్టిక్ మండల ప్రాంతాలలో సంవత్సరంలో చాలా భాగం నేలను మంచు కప్పిఉంచుతుంది. అందువల్ల కిందఉన్న శిలలోనిపగుళ్ళలో ఉండే మంచు కరిగి హిమజలాలు (Melt waters) ఏర్పడతాయి. అవి తిరిగిఘనీభవించి మరలాద్రవీభవిస్తాయి. అందువల్ల ఈ ప్రాంతాలలో నీరు గడ్డకట్టినప్పుడు ఏర్పడే ఒత్తిడులకు యాంత్రికంగా శిలలు బద్దలై ముక్కలై పోతాయి. దీని పర్యవసానంగా ఈ ప్రదేశాలలో పర్వతశ్రేణులలో ఉన్నతమైన శిఖరాలు (Peaks) తీక్షణమైన అంచులు, కొనలుదేరిన శిలలు దర్శనమిస్తాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో సాధారణంగా భౌతికశిలాశైథిల్యం ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది.

3.5 శైథిల్య ఉత్పాదితాలు

కొత్తగా పర్వతప్రాంతంలో రోడ్డువేసినచోటగాని క్వారీ (Quarry) లో గాని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే వివిధరకాల భౌమపదార్థాల అనుక్రమం మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అడుగున కఠినమైన ఘనశిలలు కనిపిస్తాయి. వాటినిఆధారశిల (Bed-Rock) లు అంటారు. అవి చాలా వరకు చెక్కుచెదరకుండా మార్పులేకుండా ఉంటాయి. వాటిపైన మృదుస్వభావం కలిగిన ఖనిజ పదార్థాలతో కూడిన పొర ఒకటిఉంటుంది. దీనిని రెగోలిత్ (Regolith) అంటారు. ఆధారశిలల భౌతిక, రసాయనిక విచ్ఛిత్తి, విఘటనాల వల్ల ఏర్పడిన పదార్థాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఖనిజ అణువులు విడివిడిగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు రెగోలిత్ ఏదోవిధంగా తొలగించబడినప్పుడు ఆధారశిలల బహిర్గతాలు బయటపడతాయి. భూమిమీద ఉన్న నేలసంతా కప్పిఉండే ప్రావారాన్ని అశ్మావరణం అంటారు. దీనిలో విడివిడిగా ఉండే బండరాళ్ళు శిథిలం చెందిన శిలావశేషాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆధార శిలలపైన కప్పువలె కనిపిస్తాయి. వాటిని కప్పిఉండే అవశిష్ట శిలావశేషాలను (Residual Deposits) ప్రావార శిలలు (mantle-rocks) అంటారు. వీటిని ఆవరించి ఉండే పై పొరనే వృత్తిక (Soil) అంటారు.

ఈ మృత్తికల మీదనే ఆధారపడి ప్రకృతిలో అనేక వృక్షజాతులు జీవించగలుగుతున్నాయి. అయితే ఈ భాగం చాలారకాలుగా క్రమక్రమానికి హేతువు అవుతుంది. కాని ఈ మృత్తికలే లేకపోతే శైథిల్యప్రక్రియ మరింత ఎక్కువగా జరిగి ఉండేది. అందువల్ల దీనిని ప్రావారం అని పిలవడం ఎంతో సమంజసం.

చాలచోట్ల ఈ మృత్తికలు క్రమంగా కింది భాగాన ఉపమృత్తిక (Subsoil) గా పిలువబడుతూ ఉంటాయి. శైథిల్యం చెందిన శిలాభాగాలే చాలావరకు వీటిలో కనిపిస్తాయి. దీనినే రెగోలత్ అనికూడా అంటారు.

మృత్తికలు(Soils) భూఉపరితలం మీద ఉండే శిలలు రకరకాల శైథిల్యాన్ని పొందినప్పుడు ఏర్పడే శిథిల శిలావశేషాలలో అతి ముఖ్యమైనవి మృత్తికలు లేదా నేలలు. మృత్తికలలో కృశించిన ఆర్గానిక్ పదార్థాలు హెచ్చు తగ్గులుగా ఉంటాయి. వీటిలో పూర్తిగా శిథిలమైన ఆర్గానిక్ పదార్థాలు కూడా కలిసి ఉంటాయి. ఏయే శిలలనుంచి మృత్తికలు ఏర్పడినాయో వాటి రసాయన లక్షణాలను బట్టి ఈ మృత్తికలు గూడా కొన్ని విశిష్టరకాలుగా విభజింపవచ్చు. మృత్తికలు ఏర్పడడానికి కిందచెప్పిన అంశాలు ఆధారమవుతాయి. అవి 1. ఆధార శిలలు, 2. శీతోష్ణస్థితి, 3. జీవజాల కార్యకలాపాలు, 4. నేలమట్టం లేదా వాలుతలం, 5. కాలం. ఈ కారణాలవల్ల వివిధ రకాలైన మృత్తికలు ఏర్పడతాయి. నేల మట్టం బాగా వాలుగా ఉంటే మృత్తిక ఏర్పడిన వెంటనే క్రమక్రమ కారకాల ప్రభావానికి లోనయి అక్కడ నుంచి తొలగిపోతుంది. ఇట్లా మృత్తికలు తొలగిపోవడానికి ముఖ్యంగా పారుతున్న నీరు మృత్తిక పదార్థాలలో ముఖ్యమైనది. జంబాలం (Clay) దీనిలో కయిలిన్ అనేది ముఖ్య ఖనిజం. సన్నని ఇసుక, మక్ (Muck) కూడా ఉంటాయి. మక్ నల్లని ఆర్గానిక్ పదార్థాల సమ్మేళనం. మృత్తికలలో ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలున్నాయి. వాటిని కింది పేర్కొన్నాం.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

7. శైథిల్యం తుది ఉత్పాదితం

- (అ) ఆధారశిల
- (ఆ) బహిర్గతం
- (ఇ) మృత్తిక
- (ఈ) శిలలు

8. మృత్తిక ఏర్పడటంలో పాత్ర వహించే ముఖ్య అంశాలు

మృత్తికల రకాలు

లేటరైట్ మృత్తిక(LATERITIC SOIL) ఇది ముఖ్యంగా భూమధ్య రేఖామండల ప్రాంతాలలో తీవ్ర శైథిల్య ప్రక్రియకు లోనైన శిలల నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఋతుపవన (Monsoon) ప్రాంతాలలో

కూడా ఇవి కనిపిస్తాయి. దీనిలో ఇనుము, అల్యూమినియమ్, ఆక్సైడ్లు, ఫైట్రాక్సైడ్లు ఎక్కువగా ఉండటంవల్ల ఇవి ఎరుపు, పసుపు, జేగురు రంగులలో కనిపిస్తాయి. వ్యవసాయానికి అంతగా అనువైన మృత్తికలు కావు.

నల్లరేగడి నేలలు (BALCK COTTON SOILS) లేదా చెర్నోజెమ్ (CHERNOGEM)
పేరుకు తగినట్లు ఇవి నల్లటి రంగుతో సూక్ష్మకణ సమన్వితమై ఉంటాయి. ఇందులో నల్లటి జంబాల పదార్థాం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మృత్తికావశేషాలు ముఖ్యంగా బసాల్టు వంటి అల్పసిలికాశిల (Low Silica Rocks) నుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ శిలలలో ఉండే ఇనుప ఖనిజ లవణాలవల్ల, హ్యూమస్ వల్ల ఈ మృత్తిక చాలా నల్లగా ఉంటుంది. ఈ నల్లరేగడి మృత్తికలు నీటితో తడి సినప్పుడు ఉబికి నీటిని నిలువచేస్తాయి. అందువల్ల ఈ మృత్తికలున్న క్షేత్రాలు (Fields) చాలా సారవంతంగా ఉంటాయి. భారతదేశంలో పత్తి చాలా విస్తారంగా పండడంవల్ల వీటిని పత్తి నేలలు (Black Cotton Soils) అని అంటారు. ఇవి సమశీతోష్ణమండలాలలో కూడా ఏర్పడి విశాలమైన పచ్చిక బయళ్ళుగా ప్రసిద్ధిచెందినాయి.

పాడ్ సోల్ (Podsol) మృత్తిక : ఇది సాధారణంగా శీతల ప్రదేశాలలో ఏర్పడే మృత్తికావశేషం. ఇచట కోనిఫెరస్ (Coniferous) అరణ్యాలుంటాయి. ఈ మృత్తిక సామాన్యంగా బూడిద రంగులో ఉంటుంది. ఇందులో ఆర్గానిక్ పదార్థాలు, హ్యూమస్ తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఇటువంటి నేలలను అంత సారవంతమైనవిగా పరిగణించరు.

లోమ్ (LOAMY SOIL) మృత్తిక : దీనిలో నన్నటి ఇసుక, జంబాల పదార్థాలు సమపాళ్ళలో కలిసి ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ లోమ్ మృత్తికలు చాలా సారవంతమైవి. ఇవి ముఖ్యంగా పండ్లతోటలు పెంచడానికి చాలా అనువుగా ఉంటాయి.

3.6 బృహత్ వ్యర్థత

భూఉపరితలం మీద ఉండే శిలలు శైథిల్యానికి లోబడి, భౌతికంగాను, రసాయనికంగాను ఎన్నో మార్పులు చెందుతాయని తెలుసుకొన్నాం. దీనినే బృహత్ వ్యర్థత (Mass Wasting) అని అంటారు. అట్లా ఏర్పడిన శిథిలశిలాసముదాయాలు కొన్ని ప్రదేశాలలో అక్కడే ఉండి పోవటానికి వీలుంటుంది. కాని బాగా ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రదేశాలలో అవి చాలా నెమ్మదిగాను, కొన్ని సమయాలలో అతివేగంగాను గురుత్వాకర్షణ శక్తివల్ల కిందికి జారతాయి. ఇటువంటి చలనాన్ని బృహత్ ద్రవ్య చలనం (Mass Movement) అని అంటారు. ఈ చలనమే భూఉపరితలం మీద ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త శిలలను బహిర్గతం చేసి ఒక విధమైన శిల్పచాతుర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. వీచే పవనాలు, ప్రవహించే జలసముదాయాలు, హిమానీనదావల్ల కూడా ఈ బృహచ్ఛలనం జరుగుతుంది. అందువల్ల భూఉపరితలం మీద ఏదీ స్థిరంగా ఉండదు. పైనుదహరించిన కారణాలు భూమట్టం సమతలానికి రావడానికి దోహదకారులవుతాయి. బాగా ఏటవాలుగా ఉండే చోట్ల బృహత్ ద్రవ్యచలనానికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి మూల కారణం. అటువంటి చోట్ల బృహత్ శిలాసముదాయంతో నీరుకూడా కలిస్తే అది ఆపదార్థాలను బాగా జారేటట్లు చేస్తుంది. అందుకే కొన్ని సమయాలలో భూపాతాలు (Landslides) సంభవిస్తుంటాయి.

3.7 సారాంశం

శైథిల్యానికి సంబంధించిన అంశాలను గురించి దాని ఉప ప్రక్రియలైన యాంత్రిక, రసాయనశైథిల్యాలను గురించి వివరంగా చర్చించాం. విభిన్న రీతుల శైథిల్యంపై ప్రభావంచూపే అంశాలను తెలిపాం. శైథిల్యం తుది ఉత్పాదితం మృత్తిక అని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. మృత్తికలు ఏర్పడే విధానం, మృత్తికలలోని రకాలు గురించి ప్రస్తావించాం.

3.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి - మాదిరి సమాధానాలు

1. శైధిల్యం
2. తుహినక్రియ, ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులు, జంతువుల, వృక్షాల చర్యలు, గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం వల్ల శిలలు రసాయన మార్పు పొందకుండా కేవలం ముక్కలుగా పగిలి పోవడానికి సంబంధించిన శైధిల్య ప్రక్రియ.
3. శిలారాశుల నుంచి ఏకకేంద్ర పాఠాలు లేదా ఫలకాలు ఒక దాని తరువాత ఒకటిగా ఊడిపోవడానికి కారణమైన ప్రక్రియ. శిలలోని ఖనిజ రేణువులు లేదా దాని బహిర్గత ఉపరితలం ఉష్ణోగ్రతలో తీవ్రమైన మార్పులకు గురి అయినప్పుడు అది వ్యాకోచం, సంకోచం చెందడంవల్ల ఇది సంభవిస్తుంది.
4. ఇది శైధిల్యంలో ఒక ప్రత్యేక రీతి. దీనిలో శిలనుంచి గోళీయపాఠాలు ఒక దాని తరువాత ఒకటిగా ఊడిపోయి వేరుకావడం జరుగుతుంది. ఇది అతిస్థూలరీతిలో జరిగిన అవదళన వంటిది.
5. రసాయన శైధిల్యం
6. క్రొత్త పరిసరాలలో స్థిరంగా ఉండగల కొత్త రసాయన పదార్థాలుగా శిలలను, ఖనిజాలను మార్పు చేసే రసాయన ప్రతిచర్యలకు (ద్రావణీకరణ, ఆక్సీకరణ, ఆర్థోక్సరణ, కార్బనీకరణ) సంబంధించిన శైధిల్య ప్రక్రియ.
7. మృత్తిక
8. మృత్తిక ఏర్పడటంలో పాత్ర వహించే ముఖ్య అంశాలు.
 - (అ) మాతృశిల
 - (ఆ) నిర్మితి
 - (ఇ) శీతోష్ణస్థితి
 - (ఈ) జీవజాలచర్య
 - (ఉ) భూఉపరితలంవాలు
 - (ఊ) కాలం

3.9 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. శిలల భౌతికశైధిల్య ప్రక్రియ కారణాలను వర్ణించండి.
2. శిలల రసాయన శైధిల్యంలో పాత్రవహించే ప్రక్రియలను వర్ణించండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు వ్రాయండి.

1. మృత్తికలు ఎల్లా ఏర్పడతాయి.? వివిధ రకాల మృత్తికలను తెలియజేయండి.

2. క్రింది పదాలను వివరించండి.

అ బృహత్ స్వర్ణత

ఆ రెగోలిత్

3.10 పదకోశం

Bed Rock ఆధార శిల	: అట్టుడుగున ఉండే కఠిన శిల. శైథిల్యక్రియకు లోనుకానిది, మార్పు చెందనిది.
Carbonation కార్బనీకరణం	: వర్షం నీరు, మట్టినీరు, భూగర్భ జలాలు - ఖనిజాలతో కార్బనికామ్లమం ప్రతిచర్యలు. ఎక్కువగా కార్బోనేట్లు ప్రభావితమౌతాయి, ఇది ఒక రసాయనిక ఉపరితలాల ప్రతిచర్యగా చెప్పకోవచ్చు.
Corrosion ఘర్షణ	: ఆధారశిలల కాలువ దారిలో కాలువనీటికి, ఖనిజ ఉపరితలాలకు మధ్య ఉండే ప్రతిచర్యల కారణంగా ఆధారశిల క్షయం చెందడం.
Decomposition విఘటనం	: శిల క్రమక్షయ ప్రక్రియ. అదేకాదు ఖనిజాల వల్లకానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్ల కారణంగా గాని శిల మార్పులకు గురవడం.
Denudation వికోషీకరణం	: ఖండ ప్రాంతాలలో బహిర్గత శిలలును పూర్తిగా విచ్ఛిత్తి గావించే ప్రక్రియ. ఈ విధంగా విచ్ఛిత్తి చెందిన ముక్కలను కొన్ని కారకాలు సముద్రాలలోనికి కొనిపోతాయి.
Erosion క్రమక్షయం	: ఇది వికోషీకరణ ప్రక్రియ. భూఉపరితలం యాంత్రిక చర్యల కారణంగా క్రమక్షయానికి గురవుతుంది.
Exfoliation అపదళనం	: సాధారణంగా వలయాకారంలోనో, ఏక కేంద్రకంగా బాహిరశిలలపైన పొలుసులు, కర్పరాలు, ఏర్పడడం.
Frost Action తుహినక్రియ	: నీరు గడ్డ కట్టుకోవడంలో ఉండే శక్తుల కారణంగా శిల విచ్ఛిత్తి చెందడం.
Humus హ్యూమస్	: చిక్కటి బ్రౌన్ - నల్ల రంగుల్లో - మట్టిలో కానీ, పైన కానీ కన్పించే ఆర్గానిక్ పదార్థం. మొక్కల భాగాలు వాటిని తిన్న పదార్థాలతోపాటు ఆక్సీకరణం చెంది కన్పిస్తాయి.
Hydration ఆర్ద్రీకరణం	: సీటిని పీల్చుకోవడం ఈ ప్రక్రియలో కన్పిస్తుంది. ఉదా : $2Fe_2O_3 + \rightarrow 3H_2O_2Fe_2O_3.3H_2O$.
Landslide భూపాతం	: పెద్ద పెద్ద భూభాగాలు ఎత్తైన పర్వతప్రాంతాలనుంచో, ప్రదేశాల నుంచో విరిగిపడడం.
Laterite లేటరైట్	: శిలలాగే ఉండే నిక్షేపం - మట్టిపొర కింద ఏర్పడుతుంది. ఇసుము, అల్యుమినియం, మాంగనీస్ వంటి ఖనిజ పదార్థాలు కలిగి ఉంటుంది. లిమోనైట్, బాక్సైట్ల వంటిది.
Loamy Soil లోమీ మృత్తిక	: ఇసుక, స్టీలు, బంక సమపాళ్లలో కలిగి ఉండే మట్టి (మృత్తిక)

Mud Flow
పంక ప్రవాహం

: త్వరితగతిన ప్రవహించే బంకమన్న ప్రవాహం. పర్వత శ్రేణుల మైదాన ప్రదేశాలలో పరుచుకొంటుంది.

Out Crop
బాహిర శిల

: ఆధారశిల బహిర్గతంగా కనిపిస్తుంది.

Podsol
పోడ్ సాల్

: స్రవ్యకమైన మట్టి చల్లని ప్రదేశాలలో వెచ్చని వాతావరణం కారణంగా ఏర్పడుతుంది.

Regolith
అదృఢ శిలావరణం

: ఆధార శిలపైన ఏర్పరచుకొని ఉండే ఖనిజాంశాల పొర.

Solifluction
మృత్తిక మందసర్పణం

: ఊండ్రా రకపు భూప్రవాహం.

Talus
టాలస్

: విరిగిపడ్డ శిలా భాగాల పోగు.

Weathering
వైధిల్య ప్రక్రియ

: శిలను భౌతికంగానూ, రసాయనికంగానూ విచ్ఛిత్తి చేయడానికి దోహదపడే ప్రక్రియ.

BRAOU

భాగం-4 : నదుల చర్య

పాఠ్యాంశాలు

- 4.0 అక్ష్యాలు
- 4.1 పరిచయం
- 4.2 ప్రవహించే నీరు
- 4.3 నదుల భౌమచర్య
 - 4.3.1 క్రమక్షయం
 - 4.3.2 రవాణా
 - 4.3.3 నిక్షేపణ
- 4.4 నిట్రుగిలామయజలమార్గాల భౌమరూపురేఖలు
- 4.5 విశాలదరీభూతలాల భౌమరూపురేఖలు
 - 4.5.1 ఆక్స్ బౌసరస్సులు
 - 4.5.2 ఒండలి వీచనలు
 - 4.5.3 డెల్టాలు
- 4.6 సారాంశం
- 4.7 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి - మాదిరి సమాధానాలు
- 4.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

4.0 అక్ష్యాలు

భౌమకారకంగా ప్రవహించే నీటి చర్యను వర్ణించడం ఈ భాగం అక్ష్యం. నదులచర్య విభాగ అధ్యయనంపూర్తిచేసేసరికి ఈ కింది అంశాలు తెలుస్తాయి.

- వర్షపు నీటి విస్తరణ
- ప్రవహించే నీరు
- నదుల భౌమచర్య
- నిట్రుగిలాదరుల భౌమఅక్షణాలు
- విశాలదరీభూతలాల భౌమఅక్షణాలు

4.1 పరిచయం

సర్వసాధారణంగా భూఉపరితలం మీద నీరు వర్షం, వడగండ్లు, మంచు రూపంలో చేరుతుంది. చేరిన నీటిలో కొంతభాగం నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది. మరికొంతభాగం భూఅంతర్భాగంలోకి ఇంకిపోయి క్రమంగా భూగర్భజలం (ground water) గా మారుతుంది. మిగిలిన దానిలో కొంత భాగం భూతలం మీదనే కొద్దికాలంపాటు హిమసంచయాలగా ఏర్పడి క్రమంగా హిమానీనదాలు (glaciers) గా రూపొందుతుంది. కొంతమేర భూమిమీద ఏర్పడి, చిన్న చిన్న కాల్వలు, పెద్ద నదులుగా ప్రవహిస్తూ చివరికి సముద్రాలలోనో, మహా సముద్రాలలోనో కలుస్తుంది.

ఆధునిక వాతావరణ శాస్త్రజ్ఞుల అంచనాలను బట్టి వర్షపాతంలో సుమారు 22 శాతం భూమిపై ప్రవహించే ప్రవాహాలు. ఈ నీటి ప్రవాహాలు చాలా శక్తివంతమైన క్రమక్రమ కారకాలు. భూతలం మీద నైసర్గికమార్పులు తేవడంలో ఈ ప్రవాహాల పాత్ర చాలా గణనీయమైనది. వివిధ ప్రాంతాలలోని క్రమక్రమ ప్రక్రియ విధిగా ఆ ప్రాంతవర్షపాతంమీద ఆధారపడిఉంటుంది. ఏ ప్రాంతం లోనైనా వర్షపాతం అక్కడి శీతోష్ణస్థితులమీద, ముఖ్యంగా ఋతుపవనాల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. అందువల్ల ఒక ప్రాంతంలోని నైసర్గికస్వరూపాన్ని ప్రవాహజలాలు ఏ విధంగా మార్పుచేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి, ఆప్రాంతపు శీతోష్ణస్థితి, ఋతుపవనాల ప్రభావాన్ని నిశితంగా పరిశీలించవలసి ఉంటుంది. ఆప్రదేశపుఉనికి - అంటే అది పర్వత ప్రాంతమా, పీఠభూమి ప్రాంతమా, సముద్రానికి చేరువగా ఉన్నదా, దూరంగా వున్నదా మొదలైన అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.

భౌతిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రవిభాగంలో నదులకు ఒక విశిష్టస్థానం వుంది. నదులు ఆర్థికంగా మానవునికి అత్యంత ఉపయోగకరమైనవి. సేద్యపునీటికి, ప్రయాణానికి, విద్యుచ్ఛక్తికి మనిషి నడులమీద ఆధారపడి వున్నాడు. నదుల సారవంతమైన లోయప్రాంతాలు మానవికాసానికి, నాగరికతకు ఎంతో దోహదం చేసాయి. అవిగొప్పక్రమక్రమకారకాలే కాకుండా భూతలాన్ని అజ్ఞాతశిల్పిలాగా చక్కగా మరిచే ప్రకృతి సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి.

4.2 ప్రవహించే నీరు

నీరు ప్రవహించటం వర్షపాతంనుంచే ప్రారంభమవుతుంది. చదునుగా ఏటవాలు ప్రదేశాలలో పడిన వాననీరు ఉపరితల శిలలపైన సన్నటి పొరల్లా ప్రవహిస్తుంది. మిట్టపల్లాల ప్రాంతంలో వడ్డ వర్షంనీరు గుంటలలోకి చేరుతుంది. కొంతకాలానికి ఇది వంకలు (rills) గా మారుతుంది. వంకలు క్రమంగా ప్రవాహబలాన్నిబట్టి పెద్దపై అవనాళికలు (gullies) గా మారతాయి. అటువంటి అవనాళికలు ఒకదానితోఒకటి కలిసి ఝురులు (streams) గా ఏర్పడి, వాటికలయిక వల్ల చివరకు నదులు, పెద్దనదులుగా రూపొందుతాయి. ఎత్తైన భూభాగాలనుంచి నిమ్నప్రాంతాలకు మట్టిని, రాళ్ళను తీసుకొనివచ్చి క్రమంగా సరస్సులలోను, సముద్ర గర్భంలోను అవక్షేపించే రవాణా కారకాలు ఈ నదులు. ఆ విధంగా అవక్షేపితమైన శిలాపదార్థాలే కాలక్రమంలో అవక్షేపశిలలుగా పరిణామం చెందుతాయి.

నదులు సేద్యపునీటి వనరులేకాదు, జలవిద్యుత్పాదక కేంద్రాలకు ముఖ్యఆధారాలుకూడా. అయితే నదులవల్ల కొన్ని అనర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. వెల్లువ లేదా వరద ప్రభావం ఈ అనర్థాలలో ఒకటి. ఈ వరదల్ని అనువైన సేద్యపునీటి వనరులుగా మార్చుకోవడం పరిశీలించవలసిన అంశం. అలాగే వర్షపునీరు భూతలంమీద ప్రవహిస్తున్నప్పుడు సారవంతమైన నేలలు క్రమక్రమంచెందుతాయి. నేలలు క్రమక్రమానికి గురికాకుండా భూసంరక్షణ కార్యక్రమాలను అవగాహన చేసుకోవాలి.

నిర్ణీతమార్గంలో రాళ్ళతోను, ఇసుకరేణువులతోను, పంకంతోను, మృత్తికాపదార్థాలతోను కూడుకొని ఎగువనుంచి దిగువకు ప్రవహించే జలసంచయాన్ని నది అని నిర్వచించవచ్చు. నిర్ణీత ప్రవాహమార్గాన్నే జలమార్గం (channel) అని పిలుస్తారు. జలమార్గంలో ఒక నిర్ణీత భాగం వద్ద నది కొంత సగటు వేగంతో ప్రవహిస్తుంది. జలమార్గపు వాలును సాధారణంగా ప్రవణత (gradient) అంటారు. ప్రవహవేగాన్ని అడుగులు/సెకండులు లేదా మైళ్ళు/గంటలలో కొలుస్తారు. ప్రతినదికీ దాని ఘనపరిమాణాన్ని, సగటువేగాన్ని బట్టి కొంతశక్తి వుంటుంది. ఘనపరిమాణంలో మార్పులు లేకుండా స్థిరంగా ఉండవచ్చు. కాని సగటు వేగం ఇతరకారణాలవల్ల ముఖ్యంగా ప్రవణత వల్ల మారుతుంది. మార్గ మధ్యంలో అది ఎదుర్కొనే ఘర్షణ, సంక్లుబ్ధత (turbulence) లను బట్టి వేగం మారుతుంది. కాబట్టి జలమార్గ స్వరూపాన్ని బట్టి కూడా దాని ప్రభావం మారుతుంటుందని చెప్పవచ్చు. నదికి ఉండే శక్తి కొంతవరకు అది ఎదుర్కొనే ఘర్షణలవల్ల వ్యయమవుతుంది. కొంత శక్తి శిలాభాగాలు, వాలుక, జంబాలం వంటి ఘనరూపాలను రవాణాచేయడానికి వినియోగపడుతుంది.

నదీ ముఖద్వారపు ఎత్తు దాని చరమసమతలం (base level) మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నది తన జలమార్గాన్ని కోయగలిగిన గరిష్ఠపులోతుమట్టాన్ని దాని చరమసమతలం అంటారు. నదుల చరమ

సమతలంసముద్రమట్టానికి సమాంతరంగా భూమిలోకి గిసిన ఊహారేఖ. కాని సరస్సులలోకి ప్రవహించే నదుల చరమసమతలాలు సరస్సులమట్టాలకు సమంగా ఉంటాయి. దీనినే స్థానిక చరమసమతలం (local base level) అని పిలుస్తారు. నదికి అడ్డంగా కట్టడాన్ని కట్టినప్పుడు జలాశయం వల్ల నది చరమసమతలం మారి ఎత్తుగా ఉంటుంది. నదికి ఎగువన నది ప్రవాహవేగం తగ్గి పోతుంది. అప్పుడు నది తన భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి తను మోసుకొనిపోయే పదార్థాలను వదిలివేస్తుంది. జలమార్గం వెడల్పు, లోతు తగ్గిపోతాయి. కొంతకాలానికి నదిప్రణవత మళ్ళీ యధాస్థితికి చేరుకుంటుంది. అట్లా కాకుండా చరమసమతలం ముఖ్యంగా భూమిపైకి లేచుటవలనగానీ, సముద్రలతం తగ్గినాగానీ, నది తిరిగి యధాస్థితికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. చరమసమతలం కన్నావైన ఉన్ననది అధికశక్తి కారణంగా తన జలమార్గాన్ని లోతుచేసుకుంటూ కొత్తచరమసమతలానికి ధీటుగా ఉండగలుగుతుంది.

ఇక్కడ మనం గ్రహించదగిన విషయాలు- నదులు చరమసమతలాల మార్పు నది పార్శ్వరేఖకృతులను మార్చడం గమనించవచ్చు. దీనివలన శ్రేణీబద్ధరయురి (garded stream) అనే అంశం వెలుగులోకి వస్తుంది. శ్రేణీబద్ధరయురి అనగా నదితన జలమార్గాన్ని కావల్సినంత ప్రవణతలో ఉంచుకోగలదు. నది తగినంత ప్రవాహవేగం కలిగిఉండి తనలోని భారాన్ని విసర్జించకుండా ప్రవహించగలుగుతుంది. ఈ రకపు నదిలో క్రమక్షయం ఎక్కువ ఉండదు. శిలాపదార్థ విక్షేపణమూ ఎక్కువగా ఉండదు. రెండూ సమతూకంలో ఉంటాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. 'చరమసమతలం' అనే పదానికి నిర్వచనం.

.....

.....

.....

.....

4.3 నదుల భౌవ చర్య

నదుల భౌవ చర్యలు మూడు విధాలు. 1) క్రమక్షయం, 2) రవాణా, 3) నిక్షేపణ

4.3.1 క్రమక్షయం

క్రమక్షయం (erosion) కొన్ని ఇతర కారకాల సహకారంతో జరుగుతుంది. క్రమక్షయ ప్రక్రియలో (i) జలోత్పీడకచర్య (hydraulic action) (ii) అపఘర్షణ (abrasion) (iii) ద్రావణీకరణ (solution) ముఖ్యాంశాలు.

(i) జలోత్పీడకచర్య : ప్రవహిస్తున్న జలాలకు కొంత ఉత్పీడకశక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తివల్ల ఇవి ఘనరూపంలో ఉన్న చిన్నకణాలను (particles) లేవనెత్తి తమతో బాటు మోసుకొని పోతాయి. ఇటువంటి చర్యనే జలోత్పీడకచర్య అంటారు. విడివిడిగా కుప్పలుగా పడి ఉండే శిలాపదార్థాలున్న చోట్ల ఈ జలోత్పీడకచర్య చాలా శక్తివంతంగా జరుగుతుంది. ప్రవాహమార్గం మధ్యలో ఉన్న రాళ్ళలోని సందులు, పగుళ్లు, ఇతర ఖాళీప్రదేశాలలోకి జొరబడి వాటిని చిలికినట్లు చేసి పైకి తేల్చివేస్తుంది. ఇట్లా తేలిన పదార్థాలను నదులు దూర ప్రదేశాలకు మోసుకొని పోతాయి.

(ii) అపఘర్షణ : కఠినశిలాపదార్థాలు, ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న బండరాళ్లు, ఇసుక, మట్టి, పంకం ఒక దానితో ఒకటి ఢీకొనడం వల్ల కొంత అరుగుదల జరుగుతుంది. పెద్దవి చిన్నవిగాను, కొనలు దేలినరాళ్లుగుండంగాను మారతాయి. దీనినే అపఘర్షణమంటారు. నదీశీర్షభాగంలో రాళ్లు పెద్దవిగా

ఉంటాయి. కాని అవి ముఖద్వారం చేరేటప్పటికే అపఘర్షణవల్ల చిన్నచిన్నవిగా మారిపోతాయి. వాటి కారణంగానే నదిలో వివిధ ఆకృతుల శిలాభాగాలు మనకు కనిపిస్తాయి. నదీ జలాలకు వాటిని పరిమాణక్రమంలో శ్రేణీకరించే శక్తి కూడా ఉంటుంది. నదివేగం రెండింతలు పెరిగితే అపఘర్షణశక్తి నాలుగింతలు పెరుగుతుంది. ఈ శక్తి ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న శిలల లక్షణాలను బట్టి మారుతుంది. ఇది నదిమోసుకొనిపోమే రాళ్ళను బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటుంది.

(iii) ద్రావణీకరణ : నదీజలాలు ద్రావణీకరణ చర్యకు అనువుగా ఉన్న రాళ్ళపైన ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఈ చర్య సహజంగా జరుగుతుంది. నదీగర్భంలో రాళ్ళను బట్టి ఇది మారుతుంది. రాళ్ళలోని కొన్ని ఖనిజాలు సులువుగా రసాయనికంగా మారతాయి. అటువంటి ఖనిజాలు నదీజలాల్లో సులభంగా కరుగుతాయి. కాని ఈ చర్య నదికి రెండువైపులా కొండచరియలున్నప్పుడు ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ చర్యవల్ల ఎన్నో కొత్తపదార్థాలు ద్రావణరూపంలో నదీజలాలను చేరతాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

2. ప్రవహించే నీటి తాకిడి వల్ల ప్రాదేశికశిలలు అరిగిపోవడం.

- (a) క్రమక్షయం
- (b) జలోత్పిడక చర్య
- (c) అపఘర్షణ

.....

.....

.....

.....

.....

3. నీటి తాకిడికి అధారశిలలు యాంత్రికంగా పగిలిపోయే ప్రక్రియ.

- (a) క్రమక్షయం
- (b) జలోత్పిడక చర్య
- (c) ద్రావణీకరణ

.....

.....

.....

.....

.....

4.3.2 రవాణా

నదీజలాలతో రవాణాఅయ్యే పదార్థాల సముదాయాన్ని నదీభారం అంటారు. ఇది ఎన్నో మూలల నుంచి పలురకాలుగా నదిలోకి చేరుతుంది. చాలావరకు ఇవి స్వస్థానం నుంచి వేరైన శిథిలశిలాభాగాలే. అవి క్రమంగా ఉన్నతమైన పర్వతాల నుంచి కొద్దికొద్దిగా జారుతూచివరకు నదులను చేరతాయి.

ఈ బరువు రెండు రకాలు. (i) అవక్షేపాలుగా రవాణా అయ్యే పదార్థాలు, (ii) నీటిలో కరిగి ద్రావణరూపంలో రవాణా అయ్యే పదార్థాలు.

కోణాలతో పెద్ద ముక్కలుగా రాళ్ళను నది తన గర్భంలో కిందిభాగానికి తెచ్చి వాటిని ముందుకు దొర్లిస్తూ రవాణా చేయగలుగుతుంది. చిన్నచిన్న ముక్కలను, రేణువులను తేల్చి ఇనక రేణువులు, జంబాలం (clay) పంకం (mud) రూపంలో ద్రావణీకరణ చెందిన పదార్థాలుగామార్చి దూరప్రదేశాలకు తీసుకొని పోతుంది.

పెద్దపెద్ద గోళశిలలు (boulders), గులకరాళ్లు (pebbles) నదీగర్భంలో ప్రవాహవేగాన్ని బట్టి నెమ్మదిగా జారుతూ, దొర్లుతూ రవాణా అవుతాయి. కొన్ని ముక్కలు ఒక చోటనుంచి మరొక చోటికి ఎగిరిపడుతూ ప్రయాణిస్తాయి. ఇటువంటి గమనాన్ని సాల్టేషన్ (saltation) అంటారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

4. నదులవల్ల రవాణా వివిధవిధాలుగా జరుగుతుంది. తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

.....

.....

4.3.3 నిక్షేపణ


నది తాను మోసుకొనిపోయే భారంలో వుండే సూక్ష్మశిలాపదార్థాలను జలమార్గంలో కిందిభాగంలో నిక్షేపిస్తుంది. ఇటువంటి పదార్థసముదాయాన్నే ఒండలి (alluvium) అంటారు. దీనిలో చాలా భాగం చివరకు సముద్రాన్ని చేరుతుంది. ఖండతీరపుటంచులో చాలాభాగాన్ని ఇటువంటి అవక్షేప సముదాయాలే కప్పి ఉంచుతాయి.

నది అరగాణి హరివాణం(catchment basin)లో పడేవర్షపాతాన్ని బట్టి కొన్ని ఋతువులలో నదుల విస్తర్తన అపరిమితంగా ఉంటుంది. దానివల్ల నదులు తమ జలమార్గాలద్వారా ఎక్కువగాకురిసిన వర్షపు నీటిని విస్తర్తించలేక ఒడ్డును అతిక్రమించి పొర్లిప్రవహిస్తాయి. అప్పుడు నదికి వరదలు వచ్చాయని చెబుతారు. వరదలు వచ్చినప్పుడు నదివిస్తర్తన దాని సాధారణ విస్తర్తనకన్నా కనీసం పదిరెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది మోసుకొని పోవలసిన భారం కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. విపరీత వర్షపాతం వల్ల క్రమక్రమం అధికమై ఎక్కువ మొత్తంలో శిలాపదార్థాలు ఉపనదులద్వారా పెద్ద నదిని చేరుకొంటాయి. అందువల్లనదులలో వరదల సమయంలో భౌమచర్య అధికస్థాయిలో ఉంటుంది. మామూలు సమయాల్లో ఈ చర్య తక్కువస్థాయిలో ఉంటుంది.

4.4 నిల్వశిలామయ జలమార్గాల భౌమ రూపురేఖలు

కఠిన శిలామయ పర్వత శ్రేణుల నుంచి కిందికి ప్రవహించే నెలయేటి జలమార్గాలు చాలా లోతుగాను నిట్టనిలువుగా వుండే పార్శ్వాలతో ఉంటాయి. నీటారుగా వున్న పార్శ్వాలనుంచి జలమార్గంలోకి దూకే జలాలు నదీగర్భాన్ని మరింతలోతుగా చేస్తాయి. నదీగర్భంగాడా భాగా ఏటవాలుగా వుంటుంది. అందువల్ల అటువంటి చిన్న నదులలో జలాలు ఉరకలతో ప్రవహిస్తూ దిగువ ప్రవాహ భాగం (down stream) లో సౌక్ష్మీభాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఈ ప్రవాహాలు జలోత్పీడకచర్యలవల్ల, ఆపమర్షణశక్తివల్ల పెద్దశిలాఖండాలను కూడా కిందికిఈడుస్తాయి. శిలామయజలమార్గాలలో ప్రవహించే

సెలయేళ్లు తమమార్గంలో అక్కడక్కడ కుంభాకార బిలాలను (pot holes) తొలుస్తాయి. ఈ బిలాలు స్థూపాకృతిలో ఉంటాయి. నదీ ప్రవాహంలో సహజంగా సుడిగుండాలు (eddies) ఏర్పడే చోట్ల ఇవి ఏర్పడతాయి. అక్కడ నదీభారంలో ఉండే చిన్నచిన్న రాళ్ళముక్కలు, ఇసుక గిరగిరా తిరుగుతూ వేధని (drilling) వలె పనిచేసి ఇటువంటి బిలాలను తొలుస్తాయి.




పటం 41 రాపిడ్లు,
జలపాతాలు a. సున్నపురాయి b. డోలమైటు c. షేల్ w. జలపాతం.

కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ముఖ్యంగా ఎత్తుగా, నిటారుగా ఉండే ప్రాంతాలనుంచి కిందికి దూకే జలపాతాల దగ్గర - నదీగర్భం మరింత లోతుగా కోసుకొని పోతుంది. నీటికి ఈడ్చేశక్తి ఉండడంవల్ల ఇక్కడ ఘర్షణ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని ఫలితంగా కొండ మొదలు క్రమంగా కోతలుపడి కొండచరియలు విరిగిపడతాయి. ఈ విధంగా జలపాతం కొంచెం కొంచెంగా వెనుకకు జరుగుతూ ఉంటుంది. శుష్క ప్రాంతాల నదుల ఇరుపార్శ్వాలు నిటారుగా ఎత్తుగా ఉంటాయి. అయితే ఆర్ద్రమైన శీతోష్ణస్థితులున్న ప్రాంతాలలో నదీలోయలు అధఃక్షయం ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల V-ఆకారపు అడ్డుకోతలను కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ లోయలు చాలా ఇరుకుగా ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల గోర్జలు (gorges) ఏర్పడతాయి. అటువంటి చోట్ల నదులలో చిన్నవి పెద్దవి జలపాతాలు (waterfalls) ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ నది పార్శ్వరేఖాకృతిలో ఆకస్మాత్తుగా తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. నయాగరా జలపాతం దీనికి మంచి ఉదాహరణ. ఇక్కడ అడుగున ఉండే షేల్ శిలలు క్రమంగా బలహీనపడి శిథిలమవడం వల్ల వైభాగంలోఉండే కఠిన డోలమైట్ శిలలు కిందికి విరిగిపోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల జలపాతం వెనుకకు జరుగుతూపోతుంది. ఈ విధంగానే నయాగరాజలపాతం దాని ప్రారంభదశనుండి ఇప్పటివరకు 11 కిలో మీటర్ల దూరం నది ఎగువ భాగానికి జరిగినట్లు అంచనా.

4.5 విశాలదరిభూతలాల భౌమరూపురేఖలు

4.5.1 ఆక్స్ బౌ సరస్సులు

ఇరుకైన జలమార్గాలలో ప్రవహించే నదులకు ఇవి విరుద్ధంగా ఉంటాయి. విశాల జలమార్గాలున్న నదీదరులలో నదీవక్రత (meandering of the river) కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతుంది. నదీవక్రత అంటే నదీ ప్రవాహమార్గం చాలా వంపులు తిరిగి ఉండటం. ఈ వక్రబద్ధత చిన్ననది మొదలు పెద్ద నదులైన గంగ, సింధు, నైల్, మిస్సిసిప్పీ వరకు అన్నింటిలోనూ కనిపిస్తుంది. నదీప్రవాహవేగం తగ్గినప్పుడు నదీవక్రతలు ఏర్పడతాయి. నదీభారం పెచ్చినా, తగ్గినా ఇవి ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ బరువులతో కూడుకొని మందంగా ప్రవహించే ప్రదేశాలలో నదీవక్రతలు ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ భారాన్ని మోయలేకపోవడంవల్ల నది అవక్షేపాలను నిక్షేపిస్తుంది. అట్లా ఏర్పడిన తీన్మెలు ఒక క్రమంలో ఉంటాయి. సాధారణంగా ఇవినెలవంక (Crescent) ఆకారంలో వుంటాయి. వీటిని పాయింట్ బార్ (Point bar) లు అని అంటారు. ఈ నదీవక్రత వున్నా లేకపోయినా విశాలమైన నదీలోయలలో నది ఒడ్డులను కోతకోనే క్రమక్రమచర్య జరుగుతూనే వుంటుంది. పుటాకారంలో వున్న ఒడ్డులలో క్రమక్రమం ఎక్కువగా వుండడంవల్ల కోతకూడా ఎక్కువగానే వుంటుంది. అందువల్ల ఈ వక్రతలు కొద్దికొద్దిగా కిందికిజరిగినట్లు కనబడతాయి. ఒడ్డున ఉండే శిలలు ఒకే విధంగా ఉంటే ఈ నదీ వక్రతలు చాలా సాష్టవయుతంగా నిర్మితమవుతాయి.



పటం 2 నదీదరులలో నదీవక్రత
(N) మెడవంటి, (s) సిల్టుక్లే ఆక్స్ బౌ సరస్సు

అట్లాకాకుండా వివిధరకాల శిలలతో నిర్మితమైవుంటే అవి సాష్టవయుతంగా ఉండక కొన్ని చోట్ల వంపులుతెగి మెడలు విరిచినట్లు (Neck cut of) ఉంటాయి. అట్లా మెడతెగిన వంపులలో నదీజలాలు సరిగా ప్రవహించక భారాన్ని వదలి వేయడంవల్ల వంపు రెండు చివరలా ఒండలి నిక్షేపిత మవుతుంది. మధ్యలో కొంత నీరు మిగిలిపోవడం వల్ల చిన్నచిన్న సరస్సులేర్పడతాయి. వీటినే ఆక్స్ - బౌ (Ox-bow) సరస్సులు అంటారు. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ విచ్ఛేదనం మరోవిధంగా ఉంటుంది. దీన్నే చూట్ (chute) విచ్ఛేదనం అంటారు. నదీవక్రతలో కుంభాకారపు ఒడ్డున ఏర్పడే పాయింట్ బార్ ద్వారా నది కొత్తదోవ తొక్కినప్పుడు ఏర్పడే సరస్సు చూట్ విచ్ఛేదనానికి మంచి తార్కాణం. ఇటువంటి విచ్ఛేదనం నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది. వరద సమయాలలో నదీ ప్రవాహం వంకర తోవలో పోకుండా నేరుగా పాయింట్ బార్ ను చాటుకుంటూ కొత్తదోవ ఏర్పరచుకొంటుంది. అందువల్ల నదీవక్రతలు నిక్షేపణంవల్ల మెరకవుతాయి.

విశాలమైన నదీలోయలలో కనిపించే వేరొక విశిష్టరూపం వరదమైదానాలు (Flood plains). ఇవి నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు వరదనీటిలో మునిగి పోతాయి. తక్కిన సమయాలలో విశాలమైన

మైదానాలుగా కనిపిస్తాయి. ఇవి కూడా నదీలోయలోని అంతర్భాగాలే. వక్రతల ద్వారా పోయేనదులకు రెండువైపులా సన్నటి ఒండలిమట్టితో కొద్దిపాటి ఎత్తులో నిర్మితమైన తిన్నెలు కనిపిస్తాయి. వీటిని సహజలేవీలు (natural levees) అంటారు. వీటిలోని సన్నటిఇసుక మరింతసన్నగా మారుతూ సన్నటి పంకంతో కూడుకొని వుంటుంది. నదికి వరదలు తీవ్రంగా వచ్చినప్పుడు ఈ సహజలేవీలుకూడా నీటిలో మునిగిపోతాయి. నది రెండుపార్శ్వాలవద్ద జలప్రవాహ వేగం, సాంద్రత చాలా మందంగా వుండడంవల్ల ముతకగా వుండే పదార్థాలు అక్కడ నిక్షేపితమవుతాయి.

మందంగా ప్రవహించే నదీలోయలలో జడవలే అల్లుకొని పోయిన నదీప్రవాహాలు కనిపిస్తాయి. వీటిలో నీరు రెండు లేదా మూడు జలమార్గాల ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. వీటిని జటాకృతి (Braided) ప్రవాహాలు అంటారు. నదికి మధ్యగా ముతకగా ఉండే ఒండలి చిన్నచిన్న ద్వీపాలుగా ఏర్పడడంవల్ల ఇవి ఏర్పడతాయి. హిమాలయదాటడే ప్రాంతాలనుంచి వచ్చే ఏరులలోను, ఎడారిప్రదేశాలలో ఉండే నదులలోను ఈ జటాకృతి ప్రవాహాలు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. నదీవక్రత అంటే ఏమిటి. ?

.....

.....

.....

6. 'ఆక్స్ బౌ సరస్సు'ను వివరించండి.

.....

.....

.....


4.5.2 ఒండలి వీచనలు

ఎత్తైన పీఠభూముల నుంచి బాగా ఎటవాలుగా ఉండే మార్గద్వారా వాగులు, ఏరులు కిందికి ప్రవహించేటప్పుడు ప్రవాహం ఆకస్మికంగా తగ్గుతుంది. అందువల్ల నది సామర్థ్యం కొంత సన్నగిల్లు తుంది. దానివల్ల నది తాను మోసుకొనిపోయే పదార్థసముదాయాన్ని కొండమొదట్లో వీచనాకారంలో నిక్షేపిస్తుంది. అందువల్ల అటువంటి నిక్షేపాలను వీచనలు (fans) అని పిలుస్తారు. వీచనలమీద ప్రవాహం కొంతవరకు జటాకృతిలోనే వుంటుంది. కాని నదికి వుండే క్రమక్రమ శక్తివల్ల ఈ వీచనలు కొద్దికొద్దిగా ధ్వంసమవుతాయి. అందువల్ల ఇవి శాశ్వతంగా ఉండేరూపాలు కావు.

4.5.3 డెల్టాలు

నదులు నిశ్చలంగా వుండే సరస్సులను, సముద్రాల దగ్గరికి చేరినప్పుడు వాటి భారం చాలా వరకు నిక్షేపితమవుతుంది. ఈ భారం ముఖ్యంగా ఒండలిరూపంలో ఉంటుంది. అటువంటి ఒండలి నిక్షేపాలతో నిర్మితమైన భూభాగాన్ని డెల్టా అంటారు. ఇది గ్రీకు ఆక్షరం Δ డెల్టాను పోలి వుండడంవల్ల దీనికి ఆ పేరు సార్థకమయింది. డెల్టాకు ఒండలివీచనకు రెండు ముఖ్య భేదాలున్నాయి. (i) డెల్టాలో నదిశక్తి చాలాక్షీణిస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ ఏర్పడే అవక్షేపాలు క్రమరీతిలో ఉంటాయి. వీచనలవద్ద నది ఆకస్మికంగా తన శక్తిని కోల్పోతుంది, కాబట్టి ఆ నిక్షేపాల శ్రేణీకరణ (Gradation) అంత స్పష్టంగా ఉండదు. (ii) సరస్సు ఉపరితలం సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి డెల్టాలో అవక్షేపితమైన శిలావశేషాలు ఉపరితలానికి సమాంతరంగా ఉంటాయి. వీచనలలో అట్లా ఉండవు.

నది మోసుకొని వచ్చే భారంలోని పదార్థాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో అవక్షేపితమవుతాయి. అవక్షేపంలో కణ పరిమాణం (particle) కణాకృతి (shape) పదార్థ విశిష్టగురుత్వం ముఖ్యాంశాలు. నది కింది భాగంలో బరువుగా ఉండే పదార్థాలు పరిమాణ క్రమంలోగానీ, విశిష్టగురుత్వ క్రమంలోగానీ అవక్షేపితమవుతాయి. ఈ పదార్థాలలో అధిక విశిష్టగురుత్వం, పరిమాణం గలవి ముందూ తక్కువ విశిష్ట గురుత్వం, పరిమాణం గలవి తర్వాత అవక్షేపితమవుతాయి. వీటి తర్వాత నీటిలో విలంబిత (suspended) మైఉండే కణాలు, వాటి తర్వాత ద్రావణరూపంలో సాంద్రీపదార్థాలు అవక్షేపితమవుతాయి. ఈ కారణాలవల్ల నది ముఖ ద్వారం వద్దముతకగా ఉండే శిలాపదార్థాలు చేరతాయి. సముద్రంలోకి లేదా సరస్సులోకి పోయిన కొద్దీ సన్నటి, మెత్తటి పదార్థాలు అవక్షేపణ చెందుతాయి. ఈ విధంగా ఋతువుల ననుసరించి అవక్షేపాలు పొరలు పొరలుగా ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి పొరలతో ఏర్పడిన గట్టు (Embarkment) బయటికి విస్తరిస్తుంది. ఇందులో ముందు భాగంలో ముతకరాతి పదార్థాలతో నిర్మితమైన పొరలను ఫోర్ సెట్ (Foreset) స్తరశిలలు అంటారు. సముద్రంలోకి పోతున్న కొద్దీ సన్నటి కణాలతో నిర్మితమైన పొరలు పల్చగా వుండి, కొంచెం సరళంగా వారి ఉంటాయి. వీటిని బాటమ్ సెట్ (Bottomset) స్తరశిలలు అంటారు. కాలక్రమంగా డెల్టా పుద్గిపొందుతున్న కొద్దీ ముతకగా వుండే ఫోర్ సెట్ స్తరశిలలు అడుగున వున్న బాటమ్ సెట్ స్తరశిలలమీద ఏర్పడి వాటితో కలసి పోతాయి. ఈ విధంగా డెల్టా పెరుగుతున్న కొద్దీ నది ముఖద్వారం సముద్రంలోనికి చొచ్చుకొని పోతుంది. నదులు వరదలకాలంలో ఫోర్ సెట్ శిలలను కొంతవరకు క్రమక్షయం చేసి, వాటిమీద జలమార్గాలను ఏర్పరచుకొంటాయి. ఇతరసమయాలలో నది తన భారాన్ని కొంతవరకు ఈ జలమార్గాలలోనే వదలిపెడుతుంది. అట్లా ఉపరితలమీద ఏర్పడే నిక్షేపాలను టాప్ సెట్ (Topset) స్తరశిలలు అని అంటారు. ఇవి ఫోర్ సెట్ శిలల మీద ఏర్పడతాయి. విపరీతంగా వరదలు వచ్చే సమయాలలో నది తన మునుపటి జలమార్గాలలోనే కాకుండా ఇతర జలమార్గాలద్వారా కూడా సముద్రాన్ని చేరుతుంది. వీటినే విభాజక జల మార్గాలు (distributory channels) అంటారు.



పటం 13 డెల్టా
(T) -టాప్ సెట్ (F) -ఫోర్ సెట్ (B) -బాటమ్ సెట్

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

7. డెల్టా నిర్మితిలో ఇవి ఉంటాయి.

- (అ) మూడురకాల సంస్తరాలు.
- (ఆ) రెండురకాల సంస్తరాలు
- (ఇ) నాలుగురకాల సంస్తరాలు.
- (ఈ) టాప్ సెట్, బాటమ్ సెట్, ఫోర్ సెట్.

.....

.....

.....

4.6 సారాంశం

ఈ భాగంలో నదుల చర్యగురించి స్థూలంగా తెలుసుకున్నాం. నదుల భౌమచర్య క్రమక్షయం, రవాణా, నిక్షేపణ ప్రక్రియల ద్వారా జరుగుతుందని గమనించాం. ప్రక్రియలను తెలుసుకున్నాం. నదీవక్రతలు, అక్స్‌బౌసరస్సులు, ఒండలి వీచనలు, డెల్టాలను వివరించి తద్వారా దరీభూతలాల భౌమరూపురేఖలను అవగాహనచేసుకున్నాం.

4.7 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి - మాదిరి సమాధానాలు

1. భూమి ఉపరితల క్రమక్షయం జరిగే సైద్ధాంతిక అవధిలేదా కనిష్ఠమట్టం. ఒక నది తన ఆధారశిలను ఈ మట్టానికి దిగువన క్రమక్షయం చేయలేదు. చరమసమతలాలలో రెండురకాలు ఉన్నాయి - (అ) సాధారణ లేదా (ultimate) చరమసమతలం, (ఆ) తాత్కాలిక చరమసమతలం. భూతలానికి చరమసమతలం సముద్రమట్టమే. కాని సరస్సులకు, నదులకు సంబంధించి తాత్కాలిక చరమసమతలాలు కేవలం స్థానికమైనవే.
2. జలోత్పిడక చర్య.
3. అనఘర్షణ.
4. నదుల పల్ల రవాణా కేంది విధంగా జరుగుతుంది.
(అ) అవక్షేపాలను నెట్టడంలాగడం.
(ఆ) ఉపకోణీయ, పర్తులాకారపు గులకరాళ్లను దొర్లించడం.
(ఇ) విలంబితస్థితిలో మోసుకొనిపోవడం.
(ఈ) ద్రావణీయ స్థితిలో మోసుకొనిపోవడం.
5. నదీ ప్రవాహ మార్గంలో ఒక క్రమమైన రీతిలో రూపొందే వక్రతలు, వంపులు, టాప్‌లు, చుట్టను నదీవక్రతలు అంటారు.
6. నదీవక్రత కోతకు గురికాగా ఆ వక్రతలో నీరు నిలవడం పల్ల రూపొంది, నదికి ఒక పక్కగా ఉండేదిచంద్రవంక ఆకారపు సరస్సు.
7. టాప్‌సెట్, బాటమ్‌సెట్, ఫోర్‌సెట్ సంస్తరలు.

4.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

- I. క్రింది ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.
 1. నదుల భౌమచర్యను వర్ణించండి.
- II. క్రింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.
 1. క్రమక్షయ చరమసమతలం అంటే ఏమిటి?
 2. డెల్టాల నిర్మితిని వర్ణించండి.
 3. నదీవక్రతలు అంటే ఏమిటి?
 4. అక్స్‌బౌ సరస్సులు ఎట్లా ఏర్పడతాయి?

భాగం-5 : నదీవ్యవస్థల, సహస్థిత భూదృశ్యాల అభివృద్ధి

పాఠ్యాంశాలు

- 5.0 లక్ష్యాలు
- 5.1 పరిచయం
- 5.2 పరివాహ వ్యవస్థలు
- 5.3 నదీలోయల పెరుగుదల, అభివృద్ధి
 - 5.3.1 లోయల అభివృద్ధిలోనిదశలు
- 5.4 అవరుద్ధ క్రమక్రమచక్రాలు
 - 5.4.1 భూఅవతరణం
 - 5.4.2 పునరుద్ధీవనం
- 5.5 నదీ ప్రవాహాలవర్గీకరణ, చరిత్ర
 - 5.5.1 అనువుత్త ప్రవాహాలు
 - 5.5.2 ఉత్తరావుత్త ప్రవాహాలు
 - 5.5.3 ప్రత్యనువుత్త ప్రవాహాలు
 - 5.5.4 పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు
 - 5.5.5 ఉపరినస్త ప్రవాహాలు
- 5.6 నదీగ్రహణం
- 5.7 నదీచర్యవల్ల రూపొందే భూదృశ్యాలు
 - 5.7.1 అగాధదరులు, గోర్ట్లు
 - 5.7.2 సంకోచాలు, అవకాశాలు
 - 5.7.3 నదీవేదికలు
 - 5.7.4 శిలాధ్వజాలు, శృంగాలు, శిలా స్తంభాలు
 - 5.7.5 రిడ్జ్లు
 - 5.7.6 కుయోస్టా, హాగ్ బాక్
 - 5.7.7 మెసా, బ్యూట్
 - 5.7.8 మొనాడ్ రాక్
- 5.8 సారాంశం
- 5.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు
- 5.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు
- 5.11 పదకోశం

5.0 లక్ష్యాలు

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు కింది అంశాలను తెలుసుకుంటారు.

- పరీవాహ వ్యవస్థలు, ప్రతిరూపాలు
- నదీలోయ పెరుగుదల, అభివృద్ధి
- నదుల అవరుద్ధక్రమక్రమ చక్రాలు
- అవతరణం
- పునరుజ్జీవనం
- ప్రవాహాల వర్గీకరణ, చరిత్ర
- ప్రవాహాల చర్యకు సంబంధించిన భూదృశ్యాలు

5.1 పరిచయం

ఝరులను విశాలమైన నదీవ్యవస్థలోని చిన్న అంశాలుగా పరిగణించవచ్చు. ప్రతినదీవ్యవస్థకు నీటిని సరఫరా చేసే ఒక భూభాగం ఉంటుంది. దీనిని పరీవాహపరివాణం అంటారు. ఒకనది పరీవాహపరివాణాన్ని మరొకనది పరీవాహపరివాణం నుంచి వేరుచేసే ఒక ఊహాత్మకరేఖను విభాజకం (divide) లేదా ఇంటర్ ఫ్లూవ్ (interfluv) అంటారు. ఇటువంటి విభాజకాలు పరిమాణంలో రెండు చిన్నకాలవలను వేరుచేసే చిన్నరిడ్జ్ మొదలుకొని ఖండాలను అతివిశాలమైన పరీవాహపరివాణాలుగా వేరుచేసే ఖండంతర విభాజకాలవరకు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు ఉత్తర-దక్షిణాలలో విస్తరించే పడమటికనుమలు తూర్పువైపుకు ప్రవహించే గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి నదుల పరీవాహపరివాణాలను పడమరవైపు అరేబియన్ సముద్రంలోకి ప్రవహించేనదుల పరివాణాలనుంచి వేరు చేసే విభాజకాలు.


విభాజకాలు రెండు ఝరుల పరీవాహాలను వేరుచేసినప్పటికీ ఆ ఝరులు ఒకేనది ఉపనదులైతే, అవి స్థూలపరీవాహవ్యవస్థలో ఒక భాగమవుతాయి.

5.2 పరీవాహ వ్యవస్థలు

నదులు ప్రవహించే జలమార్గాలు, వాటి రూపాలుముఖ్యంగా అక్కడక్కడ ఉండే శిలల స్వభావంమీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆ ప్రాంతాల పూర్వభౌమ చరిత్రను బట్టికూడా ప్రవాహ ప్రతిరూపాలు ఏర్పడతాయి. అవి ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు (చిత్రం 4).

1. శాఖాయుత ప్రతిరూపం (Dendritic pattern): ఇటువంటిది సామాన్యంగా ముద్దగా (massive) ఉన్న శిలాప్రాంతాలలో ఏర్పడుతుంది. చెట్టుకుశాఖలు, ఉపశాఖలున్నట్లే ఈ ప్రతిరూపం నదులతోను, ఉప నదులతోను, వాటి చిన్న శాఖలతోను చూడడానికి శాఖాయుతంగా కనిపిస్తుంది.
2. దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్రతిరూపం (Rectangular pattern): ఈ ప్రతిరూపపు వాగులలో, నదులలో అక్కడక్కడ చతురస్రాకారపు వంపులు కనిపిస్తాయి. నదులు, సందులు, భ్రంశాలలో ఉన్న కఠినశిలలలో ప్రవహించేటప్పుడు ఈ వంపులు ఏర్పడతాయి.
3. ట్రెల్లిస్ ప్రతిరూపం (Trellis pattern): ఇది బద్దలతో అర్జిత తడికవలె ఉంటుంది. నదీ ప్రవాహమార్గంలో ఉపనదులు ఒకదానితో ఒకటి సమాంతరంగా ఉండటంవల్ల ఈ ప్రతిరూపం ఏర్పడు తుంది. సమాంతర పర్వతపంక్తులున్న ప్రాంతాలలో ఇవి ఏర్పడతాయి. అపలాషియన్ (Appalachian) పర్వతశ్రేణులలో ఇది బాగా కనిపిస్తుంది. మన దేశంలో హిమాలయపర్వతప్రాంతాలలో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది.

4. రేడియల్ ప్రతిరూపం (Radial Pattern): దీనిలో ఉన్నతంగా ఉండే ఒక కేంద్రప్రాంతం నుంచి అన్నివైపులకు పరివాహం వృద్ధిచెందుతుంది. సాధారణంగా ఇటువంటి ప్రతిరూపాలు అగ్నివర్షత సానువులలో వృద్ధిచెందుతాయి.



పటం 4 ప్రవాహ ప్రతిరూపాలు
a. శాఖాయుత b. ట్రెల్లిస్ c. రేడియల్

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. పరివాహవ్యవస్థ అంటే ఏమిటి? వివిధ రకాల పరివాహ వ్యవస్థలను వివరించండి

.....

.....

.....

5.3 నదిలోయల పెరుగుదల, అభివృద్ధి

వర్షపాతంగా కురిసిన నీటిలో చాలాభాగం భూఉపరితలంమీద ప్రవహిస్తూ చిన్న వాగులు, ఏరులుగా ఏర్పడి క్రమంగా నదులు, మహానదులుగా రూపొందుతాయని గ్రహించాలి.

నదీదరిశీర్షం (head) క్రమక్రమం చెంది క్రమంగా వెనుకకు జరగడంవల్ల లోయలు పెరిగి పెద్దవి అవుతాయి. వానపడిన చోటునుంచి నీరు వాలుగా ఉండేవైపు ప్రవహించడం సహజం. శీర్షదిశాక్రమ క్షయం వల్ల ఎగువప్రాంతంలో పడనీరంతా ఏటిలోకి ప్రవహిస్తుంది. ఏదైనా అవరోధం వచ్చినప్పుడు ఈ క్రమక్షయం చాలావరకు తగ్గిపోతుంది. కఠినశిలలు అవతలివైపున ఏర్పడిన ఒక పర్వతమయ ప్రాంతంలో రెండు లోయలు రెండువైపులా ఏర్పడినట్లైతే వాటికి మధ్యగా ఉండే ఉన్నతమైన భూభాగాన్ని జలవిభాజక క్షేత్రం (water divide) లేదా అంతర్నదీక్షేత్రం (Interflow) అని అంటారు. ఈ జలవిభాజక క్షేత్రానికి ఇరువైపులా ఉన్న నదులక్రమక్షయప్రభావం సమానంగా ఉంటే ఆ జల విభాజక క్షేత్రం స్థిరంగానే ఉంటుంది. అట్లాకాకుండా రెండువైపులా క్రమక్షయం అసమానంగా ఉన్నట్లైతే ఆ జలవిభాజక క్షేత్రం స్థిరంగా ఉండలేదు. క్రమక్షయం తక్కువగా జరిగిన లోయవైపుకు ఈ క్షేత్రం జరుగుతుంది.

ఈ విధంగా లోయ పొడవు పెరుగుతున్నప్పుడే నది లోతుకూడా క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందువల్లనంటే శీర్షదిశాక్రమక్షయం జరుగుతున్నప్పుడే నది అడుగుభాగం కూడా నీటికోతకు లోన పడంవల్ల లోతు ఎక్కువ అవుతూ వుంటుంది. తీవ్ర వర్షపాతం సంభవించిన ప్రతి సారి ఏరులలో ప్రవహించే నీరు ఎక్కువ కావడంవల్ల వాటి లోతుకూడా ఎక్కువయి, అవి క్రమంగా వాగులుగా మారతాయి. వాటి పార్శ్వాలలోకూడా ఈ విధంగా ఏర్పడిన వాగులు వాటి నీటిని మొదట ఏర్పడిన వాగులోకి వదలిపెడతాయి. ఈ విధంగా ఒక అరగాణిహరివాణంలో ఎక్కువసంఖ్యలో వాగులు ఏర్పడినా అవి అన్ని మొదటఏర్పడిన వాగులోకి తమజలాలను చేరవేస్తాయి. ఈ అధిక జలాలవల్ల

మొట్టమొదట ఏర్పడిన వాగు క్రమక్రమశక్తి అధికమై అదితనలోయను మరింత లోతుగాను, వెడల్పుగాను చేసుకుంటుంది. వర్షాకాలంలో మాత్రమే ప్రవహిస్తూ తక్కిన సమయాలలో ఎండిపోయే వాగులను సవిరామరువులు (Intermittent streams) అంటారు. నదీగర్భం లోతు పెరుగుతున్నప్పుడు అక్కడే భూగర్భజలతలం నదీగర్భంలోని భూతలానికి సమమట్టుగా రావచ్చు. అటువంటప్పుడు ఆ భూగర్భజలాలు వాగులలోకి ఊరతాయి. ఆ కారణంగా లోతు ఎక్కువగా వున్న వాగులలో అన్ని సమయాలలోనూ నీరు పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇటువంటి వాగులను శాశ్వత రువులు (Permanent Stream) అంటారు. వాటినే జీవనదులు అని కూడా పిలుస్తారు. నదీభూతలాల ప్రవణత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రువులు, నదులు ఎక్కువ శక్తివంతంగా అడుగుభాగాన్ని క్రమక్రమంచేసి బాగా లోతుగా అవుతాయి. అట్లా వాలుతక్కువగా వుంటే రువులు మందగతితో ప్రవహిస్తాయి. అప్పుడు అధఃక్షయం (undercutting) చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది. వాలు మధ్యస్థంగా ఉంటే నదులు సాధించే క్రమక్రమం, నిక్షేపణం సరిసమానస్థాయిలో వుంటాయి. అటువంటి నదులను శ్రేణీకృత (graded) నదులు అంటారు. నదులు కోయగలిగిన గరిష్ఠపు లోతు ఆ నది ప్రవహించే సరస్సుల లేదా సముద్రాల నీటిమట్టానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఈగరిష్ఠపు లోతును నదీ ప్రవాహపు దిగువభాగాలలోనే ఉంటాయి. ఇంకెక్కడా అంతలోతు వుండడానికి పీలులేదు. అట్లాఉంటే అక్కడ నదీప్రవాహం అగిపోయే ప్రమాదముంటుంది. నదులు సాధించే ఈ గరిష్ఠపు లోతును క్రమక్రమ చరమసమతలం (base level of erosion) అని అంటారు.

నదులలో అధఃక్షయం జరుగుతున్నప్పుడే వాటి రెండు పార్శ్వాలలోనూ పార్శ్వక్రమక్రమం జరుగుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో అధఃక్షయం చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. కాబట్టి నదులు చాలా ఇరుక్కుగా ఉండే జలమార్గాలద్వారా ప్రవహిస్తాయి. వీటినే గోర్జ్ (Gorge)లు అంటారు. ఇవి హిమాలయ పర్వతాల నుంచి ప్రవహించే ముఖ్య నదుల ఉపనదులలో కనిపిస్తాయి. కొలరాడ్ నదిలో కనిపించే గోర్జ్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినది. దీనిలోతు కొన్ని వేల అడుగులవరకు ఉంది. సాధారణంగా నదీదరుల వెడల్పు, వాటి ప్రవాహపు లోతుకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మార్గమధ్యంలో ఉండే శిలల కఠిన్యాన్ని తదితరలక్షణాలను బట్టి నదీదరులు కొన్ని చోట్ల చాలా ఇరుక్కుగాను, మరికొన్నిచోట్ల వెడల్పుగాను ఉంటాయి. రకరకాల శిలలున్న ప్రాంతాలలో ఏదైనా ఒక నది ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని లోయ మృదువైన శిలలున్న చోట్ల వెడల్పుగాను, కఠినశిలలున్న చోట్ల చాలాఇరుక్కుగాను ఉంటుంది. ఇట్లా ఇరుక్కుగాఉన్న ప్రవాహాన్ని సంకుచిత ప్రవాహం (narrow) అంటారు.

నదీలోయలు సాధారణంగా ఈ కింది కారణాల వల్ల వెడల్పు అవుతూఉంటాయి. 1. రాతిపెళ్ళలు, మట్టి పెళ్ళలు ఒడ్డునుంచి విరిగి పడడం 2. వాననీటి కోత 3. జంతువులు వృక్షాల కార్యకలాపాలు 4. హిమానీనదాల అపవర్షణ 5. అధఃక్షయం, పార్శ్వక్షయం 6. ఉపనదుల కలయిక.

నదీజలమార్గం ఎప్పుడూ రుజుమార్గంలో వుండక అక్కడక్కడ వంకరలుతిరిగి వంపులలో ఉంటుంది. అటువంటి వంపులలో బయటిగట్టు వద్ద జలప్రవాహవేగం వేగంగా వుంటుంది. అందువల్ల నీటికోత ఎక్కువై క్రమంగా గట్టను కోసివేస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రవాహమార్గం వెడల్పు అవుతుంటుంది. ఈ స్థితిలోనే నదీవక్రతలు ఏర్పడతాయి. ఈ నదీ వక్రతల అభివృద్ధిని అనుసరించి నదీ జలమార్గంక్రమంగా వెడల్పు అవుతుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

2. నదీ లోయలు ఏయేకారణాలవల్ల వెడల్పు అవుతాయో తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

5.3.1 నదిలోయ అభివృద్ధిలోని దశలు

కొత్తగా ఏర్పడిన ఉన్నత ప్రదేశంలో వర్షపు నీరు బయటికి పోవలసి ఉంటుంది. అట్లా అన్ని వైపులకు గానీ, నిర్ణీత మార్గంలో గానీ ప్రవహిస్తున్న జలాలు తమ క్రమక్రమశక్తివల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఏరులుగా, వాగులుగా, ఉపనదులుగా ఏర్పడి చివరకు నదులుగా మారతాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఉపరితల స్తలాకృతిలో ఉండే శిలలకఠినత సంఘట్టనల మీద చాలావరకు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏవరో అజ్ఞాత శిల్పి చెక్కినట్లుగా ఉపరితలం మీద రకరకాల వర్ణతాలు, పీఠభూములు, లోయలు ఏర్పడతాయి.

క్రమక్రమ ప్రభావంవల్ల ఏ ప్రాంతంలోనైనా మొదట ఏరులు, వాగులు, లోయలు ఏర్పడతాయి. వాటిమధ్య జలవిభాజక క్షేత్రాలుగా కొండలు, గుట్టలు ఉండిపోతాయి. కాలక్రమంగా ఈ కొండలు, గుట్టలు కూడా తరిగిపోయి చివరకు ఒక మైదానం ఏర్పడుతుంది. ఇట్లా ఆ ప్రాంతంలో వివిధ నైసర్గికరూపాలు పొందే పరిణామదశలన్నిటినీ కలిపి క్రమక్రమ చక్రం (erosioncycle) అంటారు. ఎత్తైన కొండలుండే దశనుంచి చివరిదశ అయిన చరమ సమతలం వరకు పొందే పరిణామమే ఈ క్రమక్రమచక్రం. దీని ఆరంభదశలో ఉపరితలం మీద నదుల ప్రవణత ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల క్రమ క్షయం బాగా చురుకుగా జరుగుతుంది. దానివల్ల నదులు తమ లోయలను చాలాలోతుగా కోస్తాయి. ఇట్లా శక్తివంతమైన లోయల అభివృద్ధి దశను తరుణదశ (youthful stage) అంటారు. ఈ దశలో నది అధఃక్షయం ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల లోయల అడ్డుకోత V ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ లోయలు చాలా ఇరుకుగా ఉంటాయి. కొన్నిచోట్ల గోర్జలు ఏర్పడతాయి. ఆ ప్రదేశాలు భౌమకాల రిథ్యా కొద్దికాలంకిందటనే ఉద్గమనం చెందితే వాగులు, ఏరులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాని వాటికి ఉపనదులు (tributaries) వుండవు. ఎక్కువస్థాయిలో క్రమక్రమం చెందే సమయం లేనందువల్ల ఈ నదులలో అక్కడక్కడ చిన్నవీ పెద్దవీ జలపాతాలు (water falls) ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి నదులలో ముఖ్యంగా పేర్కొనదగినది ప్రపంచఖ్యాతి చెందిన కొలరాడో (Colorado) నది.

నదీపరిణామదశలో వచ్చే తరువాతదశ ప్రాడదశ (mature stage). ఈ దశలో స్తలాకృతి వివిధ మార్పులకు లోనవుతుంది. క్రమక్రమ ప్రక్రియ సాగుతున్న కొద్దీ తరుణదశలో ఉండే నైసర్గిక రూపాలు మరింత నిశితంగా మార్పుచెందుతాయి. భూదృశ్యంలో వదునుగా ఉండే కొండలతో కనిపించే పార్శ్వరేఖాకృతులు ఇప్పుడు కొంచెం మృదువుగా కనిపిస్తాయి. జలవిభాజకక్షేత్రాలు మరింత ఇరుకుగా తయారవడం వల్ల ఈ ప్రాంతం చాలా భాగం కొండలతో లోయలతో నిండిపోయి కర్కశం (rugged)గా కనిపిస్తుంది. ఈ అరగాణిహారివాణంలో పడే వర్షపాతాన్నిబట్టి ఇక్కడ ఉపనదుల సంఖ్య మారుతూఉంటుంది. ఎడారి ప్రాంతాలలో నదులకు ఉపనదులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండవు. కాని వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో నదులు, వాటి ఉపనదులు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంటాయి. ఉపనదుల లోయలు కూడా ఎక్కువలోతుకు క్రమక్రమం చెంది, వాటివల్ల రవాణా అయిన శిలావదారాల్తో సరస్సులు నిండిపోతాయి. అంతకుముందు ఎత్తిపోతలు (rapids), జలపాతాలు ఉన్న ప్రదేశాలు క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. నదీ ప్రవాహమార్గపు ప్రవణత కొంత సరళంగామారి దానివల్ల క్రమక్రమశక్తికూడా మందగిస్తుంది. ఇటువంటి దశలో నది కొంతస్వాస్థ్యం పొందుతుంది. దానికారణంగా ఈ నదులను శ్రేణీకృత (graded) నదులు అంటారు.

తరువాతి దశలో భూదృశ్యం మరికొన్ని మార్పులు చెందుతుంది. లోయలు చరమసమతలం వరకు క్రమక్రమం చెంది పూర్వంకన్నా మరింత విశాలం అవుతాయి. జలప్రవాహ మార్గపు ప్రవణత చాలా వరకు క్షీణనమాంతరరేఖకు చేరువగాఉంటుంది. ఇటువంటి దశలో ఉన్న నదీదరిని వృద్ధదశ (old age) చేరిందని అంటారు. ఈ వృద్ధదశలో నదులు ఎంతో విశాలమైన లోయలగుండా ప్రవహిస్తుంటాయి. నదుల మధ్యపుండే జలవిభాజక క్షేత్రాలు చాలా తక్కువ ఎత్తులో వుంటాయి. నదీజల మార్గాలు చాలా తక్కువలోతు కలిగివుంటాయి. దీనికి ముఖ్యకారణం నదులు తమ క్రమక్రమశక్తిని కోల్పోవడమే. అంతే కాకుండా ఈ దశలో నిక్షేపణ ప్రక్రియ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. నదీజల మార్గ ప్రవణత చాలా తక్కువగా ఉండడంవల్ల అది తనలోపున్న భారాన్నంతటినీ ప్రవాహమార్గంలో అనువైన చోట్ల నిక్షేపిస్తుంది. దానివల్ల ప్రవాహవేగం బాగా తగ్గిపోతుంది. ప్రవాహమార్గం వంకరలు తిరిగి ఉండడంవల్ల

నదీవక్రతలు ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి విశాలమైన మైదానాలను పెనిప్లేన్లు (peneplains) అంటారు. వీటిలో కొన్నిచోట్ల ఇంకా ఒకటిలేదా రెండుకొండలు ఒంటరిగా మిగిలిపోతాయి. ఇట్లా పెనిప్లేన్లలో వుండే అవశిష్టవర్షత అవశేషాలను ఏకాంత వర్షతాలు (monad rocks) అంటారు. వీటికి చక్కటి ఉదాహరణ అమెరికాలోని న్యూహాంప్షైర్ లో ఉన్న మౌంట్ మొనాడ్ రాక్ (monadrock).

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

3. నది క్రమక్షయం అంతిమ ఉత్పాదితం

a) ప్లేన్

b) పెనిప్లేన్

.....

.....

.....

.....

.....

ఝరులు, నదులు అవి ప్రవహించేలోయలను తామే తొలుచుకొంటాయి. ఈ విషయాన్ని ప్రవ్రధ మంగా పరిశీలించి, ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి జేమ్స్ హట్టన్. తరువాతి భూవిజ్ఞానశాస్త్రపరిశోధనలు ఆయన అభిప్రాయాలను బలపరచాయి. నదీలోయలు ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో క్రమంగా వృద్ధాచెందుతాయని నూచిస్తున్నాయి. నదీలోయ అభివృద్ధి ప్రధానంగా మూడు దశలలో జరుగుతుందని భావిస్తారు. అవి 1. తరుణదశ 2. ప్రాధదశ 3. వృద్ధదశ.

చరుమనమతలంతో శ్రేణీకృతస్థితిని పొందటానికి నది అధక్షయం జరిపినంత మేరకు అది తరుణదశలో ఉందని అంటారు. ఎత్తిపోతలు, జలపాతాలు, ఇరుకైన V ఆకారపులోయాలు క్రియాశీల అధక్షయానికి చిహ్నాలు. అత్యధిక మైదానాలు, వరదమైదానాలు లేకపోవడం, నదీవక్రతలు లేకుండా దాదాపు సరళంగా ఉన్న ప్రవాహమార్గం వంటివి తరుణదశకు చిహ్నాలే.

నదిక్రమంగా ప్రాధదశలోకి చేరేటప్పటికి అధక్షయం తగ్గుముఖంపట్టి, పార్శ్వక్షయం అధికమవుతుంది. ఈ విధంగానది వరదమైదానాన్ని కోసుకుంటూ, దానిమీద నదీవక్రతలను రూపొందించుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రాధదశలో వక్రతలు చేదించుకొనిపోయి, ఆక్స్-బౌ సరస్సులు ఏర్పడుతుంటాయి. కొన్ని నదులు ఎత్తుతక్కువ సహజలేవీలను రూపొందించవచ్చు. తరుణదశలోని నదీవాలుతో పోల్చిచూస్తే ప్రాధదశలో నదీవాలు చాలా తక్కువగా ఉండటమే కాక, పార్శ్వరేఖాకృతి చాలా పృదువుగా ఉంటుంది. ఎత్తిపోతలు, జలపాతాలు లేకపోవడమే దీనికి కారణం.

నది తన నది వక్రతమేఖల కన్నా ఎన్నోరెట్లు విశాలమైన వరదమైదానాన్ని ఏర్పరచుకొన్నప్పుడు అది వృద్ధదశలోకి చేరినట్లు గుర్తించాలి. ఈ దశకు చేరినప్పుడులోయవక్రతలకు దగ్గరలో నది ప్రవాహం ఉండటం అరుదు. అందువల్ల అది వరద మైదానాన్ని వెంచలేదు. ఈ విధంగా వృద్ధదశలో నది ప్రధాన చర్య అదృఢభూత వరదమైదాన నిక్షేపాలను పునశ్చయం చేయడమే. ఇది ఆధారశీలను క్షయంచేయడం కంటే సులభం కాబట్టి వృద్ధదశలో ఉన్న నది ప్రాధదశలో ఉన్న నది కంటే ఎక్కువగా తన మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. సాధారణంగా నది చరుమనమతలం తరుణదశలో కంటే వృద్ధదశలో స్థిరంగా ఉంటుందని అనుకున్నప్పటికీ, సాధారణంగా చాలా సందర్భాలలో నేల ఉత్థితం అయి నదిని పునర్దీనించేయడం జరుగుతుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

4. నది అభివృద్ధిలోని మూడు ప్రధాన దశలను నిర్వచించండి.

.....

.....

.....

.....

5. ఆకారపులోయ దీనికి చిహ్నం

అ) నెమ్మదిగాజరిగే అధఃక్షయం

ఆ) తీవ్రంగాజరిగే అధఃక్షయం

ఇ) ఒకమోస్తరు అధఃక్షయం

.....

.....

.....

.....

5.4 అవరుద్ధక్రమక్షయ చక్రాలు

ప్రతి నదికీ ముందు చెప్పిన వివిధ దశలు సాధారణ క్రమక్షయచక్రంలో ఉంటాయి. అయితే కొన్ని సమయాలలో ఈ క్రమక్షయ చక్రానికి కొన్ని అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. అటువంటి అవరోధాలవల్ల మార్పుచెందిన వాటిని అవరుద్ధక్రమక్షయ చక్రాలు (Interrupted cycles of erosion) అంటారు. ఈ అవరోధాలు కింది విధంగా ఉంటాయి. 1. ఆ ప్రాంతం హిమమయమై దానిని చాలా కాలం వరకు మంచు కప్పి వేయబడి ఉండడం. 2. అగ్నివర్షతాల చర్యలు. 3. భూపటల విరూపణం (diastrophism).

కొన్నిచోట్లనదీదరులు హిమానినదాల చేత ఆక్రమితమవుతాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మంచు కప్పివుంటుంది కాబట్టి ఉపరితలం మీద ఉన్న శిలలశైలిల్య ప్రక్రియకు లోనుకావు. అటువంటి ప్రదేశాలలో నదులుండవు. కాబట్టి క్రమక్షయం అంతగా జరగదు. మహాహిమయుగం (great ice age)లో ఉత్తరార్ధగోళంలోని చాలా ప్రాంతాలు అంతకు ముందే ప్రౌఢదశను చేరుకున్నాయి. కాని చాలాకాలం మంచుకప్పి వున్న తర్వాత హిమానీనదాలు కరిగిపోవడంవల్ల పెద్దపెద్ద మొరేన్లు (moraines) ఏర్పడి ఆ ప్రాంతాలను కొంతవరకు కప్పివేశాయి. ఆ కారణంగా ఒకప్పుడు ప్రౌఢదశకు చేరిన ఆప్రాంతం మళ్ళీ తరుణదశను పొందింది. ఉత్తర అమెరికాఖండంలో మహా సరోవరాల (great lakes)కు అగ్నేయదిశలో ఇటువంటి ప్రాంతాలున్నాయి.

అగ్నివర్షతాలు బద్దలవడంవల్ల ఏర్పడిన లావా ప్రవాహాలు కొన్నిచోట్ల నదీలోయల ద్వారా ప్రవహించ దానికి వీలుంటుంది. అటువంటి పరిస్థితులలో సాధారణ క్రమక్షయచక్రానికి అంతరాయం మేర్పడుతుంది. తిరిగి ఒక నూతన క్రమక్షయచక్రం లావాక్షైత్రాల మీద ఆరంభమవుతుంది. కొంత భూభాగం కుంగడం, కొంత పైకి లేవడం వంటి భౌమ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అక్కడ తప్పనిసరిగా క్రమక్షయ చక్రానికి ప్రతి బంధకాలు ఏర్పడతాయి. కొత్తక్రమక్షయచక్రాలు ప్రారంభమవుతాయి. అటువంటివి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయో పరిశీలించాలి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

6. క్రమక్రమచక్రానికి అవరోధాలుకలిగించే భౌమప్రక్రియలను తెలియజేయండి.

5.4.1 భూ-అవతరణం (Subsidence or Drowning)

భూభాగం కొంత కుంగిపోయినప్పుడు, సముద్రమట్టం పైకి లేచినప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి వృద్ధదశ త్వరగా సంప్రాప్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం కుంగడంవల్ల చరమసమతలానికి దగ్గరగా వస్తుంది. అందువల్ల ఆ ప్రాంతపు నదుల క్రమక్రమశక్తి తగ్గిపోతుంది. అవి మోసుకొనిపోయే భారంకూడా తక్కువగా వుంటుంది. సముద్రతీర ప్రాంతంలో ఇటువంటి భూఅవతరణం జరిగితే సముద్రం నదీదరుల చివరి భాగాలలోకి చొచ్చుకొని వచ్చి ఎస్చువరీ (Estuaries) లుగా మారుతుంది. అంటే లోయలు మునిగాయని అర్థం. భూఅవతరణంవల్ల అటువంటి నదులకు, వాటి ఉపనదులకు ఉండే సంబంధాలు తెగిపోతాయి. విడివిడిగా సముద్రాన్ని కలుస్తాయి. ఈ ఉపనదులను విచ్ఛిన్ననదులు (dismembered streams) అంటారు.

5.4.2 పునరుజ్జీవనం (Rejuvenation)

ఏ భూభాగామైనా పెనిఫ్టేన్ గా మారకముందు దశవిదైనా అది ఉత్థాపితమైన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో సాధారణ క్రమక్రమచక్రానికి అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. అటువంటి ఉద్ధరణ (uplift) వల్ల ఆ భూభాగంలోని వాగులు, నదుల ప్రవణతలు ఎక్కువ అవుతాయి. వాటి అధఃక్షయశక్తి పెరుగుతుంది. దానివల్ల అది తనపూర్వపు లోయలలోనే బాగా లోతైన గోర్ట్లు తవ్వడం, భూవిజ్ఞానదృష్ట్యా పునరుజ్జీవనం పొందిందని అంటారు. ఆ భూభాగాలలో కొత్తశక్తిని పుంజుకొని ఎక్కువ ప్రవణతలలో ప్రవహించే నదులను పునరుద్ధిపిత (revived or rejuvenated) నదులని అంటారు. అవి ఆ ప్రాంతంలో ఒక వినూత్న క్రమక్రమ చక్రాన్ని ప్రారంభిస్తాయి. పెద్దపెద్ద నదీలోయలలో ఇవి కొట్టవచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. పునరుద్ధిపనానికి ముందే నదీవక్రతలు ఏర్పడివుంటే అవి మరింత లోతుగా మారతాయి. ఎందుకంటే పునరుద్ధిపనంచెంది నది తనప్రవాహమార్గాన్ని విడిచిపెట్టినప్పటికీ తమ పూర్వచరిత్రను మరవలేదని అర్థం. ఉద్ధిత భూభాగాలలో కనిపించే లోతైన నదీవక్రతలను పరిఖానదీవక్రతలు (incised or entrenched meanders) అంటారు. ప్రపంచప్రఖ్యాతి పొందిన పరిఖానదీవక్రతలు అమెరికాలో సాన్యువాన్ (San Juan) నదికి ఉన్నాయి. మన దేశంలో కృష్ణానదికి శ్రీశైలం ప్రాంతంలో ఇటువంటి పరిఖానదీవక్రతలు ఉన్నాయి. అమెరికాలోని ఊటా (Utah) రాష్ట్రంలోని సహజమైన వంతెనలు (natural bridges) పరిఖానదీ వక్రతల తలలు తెగిపోవడం వల్ల ఏర్పడినట్టినవి. రెయిన్ బో వంతెనగా ప్రపంచఖ్యాతి గాంచిన సహజవంతెన 90మీ ఎత్తు 80మీ వెడల్పు ఉంది. పూర్తిగా కోతమైనదానంగా మారిన ప్రాంతం ఉద్ధితమైతే అది కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రాంతంవలె కనిపిస్తుంది. దానిమీద వాగులు, వంకలు మామూలుగానే ఏర్పడతాయి. ఆప్రాంతం పునరుజ్జీవనం పొందిందని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం.

ఈ ఉద్ధరణ కార్యం అన్ని వైపులా జరిగితే పాతక్రమక్రమ చక్రంలో ఒకే ఒక మార్పు కలుగుతుంది. అంటే ఎత్తు మాత్రమే ఎక్కువవుతుంది. ప్రవణతలో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు. అట్లాకాకుండా

ఆ ప్రాంతం క్రమరహితంగా పునరుజ్జీవనం చెందితే దాని ఎత్తులో మాత్రమేగాక వాలులోకూడా మార్పు వుంటుంది. అమెరికాలోని కోలరాడోనది పీఠభూమి వాయువ్యప్రాంతం పునరుద్ధిపనానికి పూర్వం చాలావరకు వృద్ధదశను చేరుకున్న ప్రాంతం. పునరుజ్జీవనం ప్రాప్తించడంవల్ల ఆ భూభాగం సుమారు ఎనిమిదివేల అడుగుల ఎత్తుకు లేచి డక్సిటానికి కొంచెం వారిపున్నట్లుగా ఏర్పడింది. దానివల్ల పూర్వవర్తి అయిన కోలరాడోనది ఆ పీఠభూమిలో బ్రహ్మాండమైన గోర్జ్లను సృష్టించింది.

మన దేశంలో దక్కన్ పీఠభూమి గుండా ప్రవహిస్తున్న కృష్ణా, గోదావరి నదులకూడా పూర్వవర్తి నదుల కోవకు చెందినవే. ఇవి కూడా బ్రహ్మాండమైన గోర్జ్లను నిర్మించాయి. వాటిలో చెప్పకోదగినవి శ్రీశైలంవద్ద పీఠభూమి మధ్యగా కృష్ణానది తవ్విన పరిఖానదివక్రతలు.

నదులలో అక్కడక్కడ రెండువైపులాకనిపించే వేదికలు (terraces) వాటి పునరుజ్జీవన విధానాన్ని సూచించే ప్రత్యేక లక్షణాలు. నదీదరులకు రెండువైపులా బెంచీలఆకారంలో ఉండేఉన్నత ప్రాంతాలు. చదునుగా ఉంటాయి. విశాలమైన నదీదరులు పునరుద్ధిపితమైనప్పుడు సూతన రీతులలో క్రమక్రమం ర్యలకు లోనయి చాలావరకు హరించుకొని పోగా మిగిలిన ప్రాంతాలే ఈ వేదికలు. వీటిని గోదావరి, కృష్ణా కావేరి నదులలో అక్కడక్కడా ఇప్పటికీ చూడవచ్చు.

నదీ ప్రవాహానికి ఏదైనా కఠిన శిలామయ ప్రాంతం అడ్డువచ్చినప్పుడు సాధారణంగా అక్కడ నదీదరి చాలా ఇరుకుగా తయారవుతుంది. తక్కినచోట్ల వెడల్పుగానే ఉంటుంది. అటువంటి ఇరుకైన నదీప్రవాహ మార్గాలను జలావకాశాలు (water gaps) అంటారు. ఇవి శ్రేణిలో సన్నటి కనుమ(pass) ల వలె కనిపిస్తాయి.

5.5 నదీ ప్రవాహాల వర్గీకరణ, చరిత్ర

ప్రతిరూపాలు, లక్షణాలను బట్టి నదులను కొన్ని విశిష్ట విభాగాలుగా విభజించవచ్చు. అటువంటి విభాగ కార్యక్రమం, వర్గీకరణ సహజంగా నదులపుట్టు పూర్వోత్తరాల మీద ఆధారపడి వుంటుంది.

5.5.1 అనువృత్త ప్రవాహాలు (Consequent streams)

భౌమచరిత్ర దృష్ట్యా కొత్తగా ఏర్పడిన ఏ భూభాగంమీదనైన సహజసిద్ధంగా కొంత ప్రణవత ఉండి వుంటే దాని ఫలితంగా ఏర్పడిన నదీప్రవాహాలు అనువృత్త నదీప్రవాహాలుగా రూపదిద్దుకొంటాయి. సాధారణంగా కఠిన, ముద్దకట్టిన రాళ్ళుండే ప్రదేశాలలో ఈ రకపు నదీప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. వీటిలో సాధారణంగా శాఖాయుత ప్రతిరూపాలున్న నదీప్రవాహాలు ఉంటాయి.

5.5.2 ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలు(Subsequent streams)

కఠినతవెద్దగా లేని బలహీన శిలలుండే చోట్ల ఇటువంటి నదీ ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. సహజసిద్ధ నైసర్గికస్వరూపాన్ని బట్టి కాకుండా, అనువృత్త ప్రవాహాలు ఏర్పడిన తరువాత వాటితో నిమిత్తం లేకుండా, వాటికి భిన్నంగా ఏర్పడే ప్రవాహాలను ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలు అంటారు. శిలకఠినత, నిర్మాణవైవిధ్యం, నిరోధకశక్తి మొదలైన వాటిమీద ఈ ప్రతిరూపాలు ఆధారపడివుంటాయి. ఇవి అనువృత్త ప్రవాహాలకు ఉపనదులు (tributaries)గా ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రవాహాలు ట్రైల్లిన్ ప్రతిరూపంలో ఉంటాయి. ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలు ఉపనదులుగా లేని కొన్ని అనువృత్తప్రవాహాలు సకృత్తుగా ఏర్పడవచ్చు. అటువంటి ప్రదేశాలలో మొదటినుంచి నదులకు, ఉపనదులకు ఒక విధమైన సంబంధం ఉంటుంది. ఇటువంటిచోట్ల శాఖాయుత ప్రతిరూపమున్న నదీప్రవాహాలు కనిపిస్తాయి.

5.5.3 ప్రత్యనువృత్త ప్రవాహాలు (Obsequent streams)

ఇవి ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలకు ఉపనదులుగా ఏర్పడి ప్రముఖ అనువృత్త ప్రవాహమార్గానికి సరిగ్గా అభిముఖంగా ప్రవహిస్తుంటాయి. ఇటువంటివి ముఖ్యంగా ఆవర్జితశిలాస్తరాలతో నిర్మితమైన పర్వతశ్రేణులలో కనిపిస్తాయి.

5.5.4 పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు (Antecedent streams)

నదీదరులలో కొంత ప్రాంతం కాలక్రమంలో ఉత్థితమైనప్పుడు కూడా కొన్ని నదులు తమ పూర్వ జలమార్గాలను విడిచిపెట్టక వాటిలోనే కొత్త శక్తితో ప్రవహిస్తాయి. అటువంటి నదులను పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు అని పిలుస్తారు. పూర్వవర్తి అంటే ఉత్థానానికి పూర్వంకూడా ఉన్నదని అర్థం.

5.5.5 ఉపరిన్వస్త ప్రవాహాలు (Superimposed streams)


పైకి కనిపించే శిలలలో మామూలుగా అనువృత్త ప్రవాహాలుగా ఏర్పడి క్రమంగా కిందవున్న శిలాస్తరాలమీద స్వస్థతకనపర్చే ప్రవాహాలను ఉపరిన్వస్త ప్రవాహాలు అంటారు. ఇటువంటి ప్రవాహ జలమార్గాలు ఇప్పుడు ప్రవహించే మార్గంలోని శిలలమీద ఆధారపడి వున్నవేకాని వాటికింద ఉన్న పురాతన శిలలమీద ఆధారపడి వుండవు. ఈ కారణంగా ఇటువంటి ప్రవాహాలను ఉపరిన్వస్త లేదా క్రమానుగత (inherited) ప్రవాహాలని అంటారు. ఉదాహరణకు పైభాగంలో మృదువైన శిలాస్తరాలున్న ప్రాంతంలో ఏర్పడి ప్రవాహాలు కాలక్రమాన లోపల ఉండే కఠిన శిలలమీద స్వస్థమవడం వల్ల నదీప్రవాహ మార్గంలో ఏ విధమైన మార్పువుండదు. అంటే మృదువైన శిలలలో ఏర్పడిన ప్రవాహరీతి అట్లాగే వుంటుందన్న మాట.

5.6 నదీ గ్రహణం

ఏ ప్రాంతంలోనైనా వర్షపునీటిలో చాలా భాగం నదుల ద్వారా సరస్సులలోకి, సముద్రాన్ని చేరుతుంది. అట్లా ఏర్పడిన ఏరులు, వాగులు, ఉపనదులు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకదాని జలాలను మరొకటి అవహరిస్తాయి. ఈ క్రియను నదీగ్రహణం (Piracy) అంటారు. ఒకజలవిభాజక శ్రేణిని కిరేండువైపుల రెండు ఉపనదులు ప్రవహిస్తున్నాయని అనుకొందాం. వాటిలో ఒక ఉపనది శక్తివంతంగా తన శీర్షక్రమక్షయాన్ని జరిపి జలవిభాజక శ్రేణిని అధిగమించి అవతలివైపున ఉన్న ఉపనదిలోకి ప్రవహించే నీటినికూడా తమవైపు మరలేలా చేయగలుగుతుంది. ఇట్లా ఒక ఉపనది మరొక ఉపనది జలాలను అవహరించే క్రియను నదీగ్రహణం అంటారు (చిత్రం 5).

అట్లా ఒక దాని శిర్షాన్ని తుంచేసి, దాని జలాలను గ్రహించే నదిని ఉపగ్రస్తనది (beheaded stream). ఈ విధంగా చాలా ఉపనదులు గ్రహణ క్రియ సహాయంతో కఠిన శిలామయ ప్రాంతాలకంటే బాగా మృదువుగా ఉన్న శిలలున్న చోట్ల ప్రవహించే స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఉపనదులు తమ ప్రవాహ మార్గాలను ఆ ప్రాంతంలోని వివిధ రకాల శిలల స్వభావాన్నిబట్టి మార్పుకొంటాయి. అంటే శిలానిర్మాణరీతులనుబట్టి నదీ ప్రవాహ మార్గాలుంటాయన్న మాట.


ముఖ్య నదికి ఉపనదులు శక్తివంతమైన ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలుగా ఉంటే ఈ నదీ గ్రహణక్రియ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ప్రతి నదీ మృదువైన శిలలున్న చోట్ల శక్తివంతంగా క్రమక్షయం చెంది బలహీనంగా ఉన్న ఉపనదిలో ప్రవహించే జలాలను తన వైపు మళ్లించుకొంటుంది.



పటం 5 నదిగ్రహణం

పటం 6 చూపినట్లుగా S1 అనే ఉత్తరావృత్తనది C1 అనే అనువృత్తనదికి శక్తివంతమైన ఉపనదిగా ఉంటుంది. ఇది క్రమక్రమంగా శక్తివంతంగా జరిపి కొంత ఎత్తులో ఉన్న C2 వైపు జరుగుతుంది. కొంత కాలానికి C2ను అడ్డగించి C2లో ప్రవహించే జలాలను S1 తనవైపు మళ్లించుకొంటుంది. అందువల్ల C2 నది కింది భాగానికి తలకొట్టివేసినట్లు అవుతుంది. గ్రహణకూర్పకం అనే చోట చతురస్రాకారపు వంపు ఉంది. దానిని గ్రహణకూర్పకం (elbow of capture) అంటారు. తల పోగొట్టుకున్న ఆ చిన్న ప్రవాహాన్ని (Wg) అయుక్తం (misfit) అంటారు. ఎందుకంటే దాని లోయ పరిమాణం దాని ప్రస్తుతపు స్వల్పప్రవాహానికి తగినట్లు ఉండదు. దాని శీర్షంపైన చెప్పిన వంపుకు చాలా కిందగా ఉంటుంది. వీటికి మధ్యన నీటి ప్రవాహమే కనిపించని శుష్క ప్రాంతం కొంత ఉంటుంది. దీనిని వాతావకాశం (wind gap) అంటారు. అంటే ఇక్కడ వాయువుతప్ప నీరు లేదని అర్థం. S2 ఉత్తరావృత్తనది C2 అనే అనువృత్త ప్రవాహానికి ఉపనదిగా ఉండేది. నదిగ్రహణం జరిగిన తర్వాత అది కూడా S1 లోనికి ప్రవహించడం మొదలుపెడుతుంది. అట్లే C2 అనే అనువృత్త ప్రవాహజలాలను అపహరించడానికి S1, తీవ్రంగా ప్రయత్నించి చివరకు సాధించగలుగుతుంది. ఇట్లా ఒక ముఖ్యనది తన శక్తివంతమైన ఉపనదుల మూలంగా ఒక విశాల అరగాణిహరివాణంలో పడే

వర్షపు నీటిలో చాలా భాగాన్ని తనవైపు జయప్రదంగా మళ్లించుకొంటుంది. ప్రపంచంలోని పెద్ద పెద్ద నదులన్నీ ఈ జలావహరణ క్రియవల్ల విశాల భూభాగంలో పడే జలాలన్నిటినీ పోగుచేసుకొని గంభీరంగా ప్రవహిస్తుంటాయి.



పటం 6 ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాల వల్ల నదీగ్రహణ ప్రక్రియ

C1 C2 C3 అనువృత్త ప్రవాహాలు

S1 S2 S3 ఉత్తరావృత్త ప్రవాహాలు

e గ్రహణ కూర్చకం

Wg..... వాతావకాశం

B1 B2 Beheaded ప్రవాహాలు

5.7 నదీచర్యలవల్ల రూపొందే భూదృశ్యాలు

5.7.1 అగాధదరులు (canyons), గోర్డ్స్ (gorges)లు

వెడల్పునుబట్టి చూస్తే ఇవి చాలా అసాధారణమైన లోతు గల నదీదరులు. నిట్టనిలువైన పార్శ్వాలతో ఉండే ఇరుకైన లోయను గోర్డ్స్ అనీ, అంతకంటే అగాధమైన లోయను అగాధదరి అనీ పిలుస్తారు. ఉదాహరణకు మన రాష్ట్రంలో గోదావరి నది పాపికొండలు వద్ద ఇటువంటి గోర్డ్స్ లోనుంచే పారుతుంది. గండికోట వద్ద పెన్నానది అగాధదరిలో ప్రవహిస్తోంది. అల్మో కృష్ణానది శ్రీశైలం వద్ద ఇటువంటి అగాధదరిలోనే ప్రవహిస్తోంది. ఇటువంటి అగాధదరులన్నిటిలోను కోలరాడ్ (colorado) నది ప్రవహించే మహా అగాధదరి (Grand canyon) ప్రఖ్యాతిపొందినది. ఇది యాత్రికులు విధిగా చూడవలసిన గొప్పక్షేత్రం. ఇది చూడడానికి ఎంతో గంభీరంగా ఉంటుంది. ఈ అగాధదరులలో పార్శ్వాలకంటే అభోభాగం ఎక్కువ క్రమక్షయం చెందడంజరుగుతుంది. ఇటువంటి అగాధదరులు సామాన్యంగా కొద్దిపాటి వర్షపాతం ఉన్న పీఠభూములలో ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ శైథిల్యం అంత ఎక్కువగా, చురుకుగా ఉండదు. హిమాలయ పర్వతప్రాంతాలలో సింధు, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర మొదలైన పెద్ద నదుల ఉపనదులలోయలు కొన్ని చోట్ల ఇటువంటి గోర్డ్స్ లతో ఉన్నాయి. వాటిలో పేర్కొనదగినది, స్పిటిలోయ (spiti valley).

5.7.2 సంకోచాలు, అవకాశాలు(narrows & gaps)

ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన గోర్డ్స్ లు. కఠినశిలామయ పర్వత శ్రేణులలో నది అడ్డంగా ప్రవహిస్తే అక్కడ దాని జలమార్గం చాలా సంకుచితంగా గాని అవకాశం (gap) వలె గాని ఉంటుంది. తక్కిన చోట్ల ప్రవాహమార్గం వెడల్పుగానే ఉంటుంది. బాగా చిన్నవిగాఉండే ఇటువంటి ఇరుకైన అవకాశాలను జలావకాశాలు (water gaps) అనీ అంటారు. ఇటువంటి జలావకాశం ఒక్కొక్కప్పుడు నీటిప్రవాహం లేకుండా వాతావకాశంగా మారుతుంది. అంటే జలప్రవాహంలేని జలావకాశం వాతావకాశంగా మారుతుందన్నమాట. ఇటువంటి అవకాశాలలో గాలి ఎక్కువగా వీస్తుంటుంది. కాబట్టి దీనికాపేరు వచ్చిఉంటుందని చెప్పకోవచ్చు. వాతావకాశాలు జలావహరణక్రియవల్ల ఏర్పడినట్టివని చర్చించుకున్నాం.

5.7.3 నదీవేదికలు (River Terraces)

నదీ దరులలో ఒక్కొక్కప్పుడు ఎత్తుగా, చదునుగా ఉండే ప్రదేశాలు కనిపిస్తాయి. వాటిని నదీవేదికలు అంటారు. ఇవి నది రెండు పార్శ్వాలలోను చదునుగా ఉండి ఒండలి చేత కప్పబడిన ప్రాంతాలు. ఇవిబాగా ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా నీటిలో మునిగిపోవు. వీటి పార్శ్వతలాలు చాలా నిటారుగా, చాలాలోతుగా ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా ఇటీవలి కాలంలో ఉద్భవనం చెందిన నదులలో కనిపిస్తాయి. పునరుజ్జీవన దశకు పూర్వమే ఆ ప్రాంతం ముదిరిన ప్రాథమికదశకు (late mature) గాని వృద్ధదశకుగాని చేరుకొని ఉంటుంది. ఆ వృద్ధదశలో నదీదరి చాలా విశాలంగా ఉండి చాలా భాగం ఒండలితో నిండి ఉంటుంది. అటువంటి దశలో పునరుజ్జీవనప్రాప్తి చెందేటప్పటికి ఆ నది తిరిగి అధికమైన క్రమక్షయ శక్తిని పుంజుకొని అధఃక్రమక్షయాన్ని ఎక్కువ స్థాయిలో జరుపుతుంది. అందువల్ల విశాలమైన లోయమధ్యగా అగాధమైన గోర్ట్లు ఏర్పడతాయి. కాని పూర్వపు విశాలమైన లోయకు అవశేషచిహ్నాలుగా రెండువైపులా ఎత్తైన బెంపిల పంటి నదీ వేదికలు మిగిలి పోతాయి. ఇవి కొన్ని ముఖ్య నదీదరులలో చక్కగా అమర్చిన మెట్లవలే ఏర్పడి ఉంటాయి.

5.7.4 శిలాధ్వజా (Rock Tower)లు, శృంగ (Pin nacle)లు, శిలా స్తంభా (Rock pillar)లు


ఏ ప్రాంతంలోనైనా శిలాశైథిల్యం నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. శిలలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తముఖాలను చూపగల్గుతాయి. కాని అన్ని ప్రదేశాలలోను క్రమక్షయం ఒకే విధంగా జరగదు. శిలల వివిధ లక్షణాలను బట్టి కొన్నిచోట్ల నెమ్మదిగా, మరికొన్ని చోట్ల త్వరగాను, శక్తివంతంగాను, శైథిల్య ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రదేశాలలో కొన్ని శిలలు ఉన్నతంగాను, విడివిడిగా ధ్వజాకారంలోను, స్తంభాకారంలోను ఉండిచూడటానికి వింతవింతగా కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి క్రమక్షయవశిష్టాలను వాటివాటి రూపాలను గురించి శిలా ధ్వజాలని, శృంగాలని, శిలాస్తంభాలని పిలుస్తారు.

5.7.5 రిడ్జ్ (Ridge)లు

బాగా ఏటవాలుగా లేదా ముడతలు పడిన (folded) శిలాస్తరాల చేత నిర్మితమైన పర్వత ప్రాంతాలలో, కఠిన శిలామయ ప్రదేశాలలో క్రమక్షయం తక్కువగాను, మిగిలిన చోట్ల ఎక్కువగాను జరగడం వల్ల కఠినశిలామయ భాగాలు ఉన్నతంగా పంక్తులు తీరినట్లు కనిపిస్తాయి. వీటిని రిడ్జ్లు అని పిలుస్తారు.

5.7.6 కుయోస్టా (Cuesta), హోగ్ బాక్ (Hog back)

ఇవి రెండూ బాగా ఏటవాలుగా ఉన్న శిలాస్తరాలుండే ప్రదేశాలలో ఏర్పడతాయి. హోగ్ బాక్ అంటే ఒక వైపు తక్కువవాలుతోను రెండోవైపు బాగా ఎక్కువ వాలుతోను ఉండే పర్వత పంక్తి.



పటం 7 వివిధ భూరూపాలు

Sh, షేల్ RR, కఠినంగా ఉండే శిల H, హోగ్ బాక్
E, ఎస్కార్ప్ మెంట్ D, వాలునతి M, మెసా B, బ్యూట్

ఇది సాధారణంగా రెండు మృదువైన శిలాస్థరల మధ్య కఠిన శిలాస్థర ఉండడంవల్ల ఏర్పడుతుంది. కుయేస్టా కూడా హోగ్ బాక్ వలెనే ఏర్పడుతుంది. కాని ఇది రెండో వైపున బాగా ఏటవాలుగా ఉండి అంచుతేలినట్లుగా కనబడుతుంది. దీనినే ఎస్కార్ప్ మెంట్ (escarpment) అని కూడా అంటారు.

5.7.7 మెసా(Mesa) బ్యూట్ (Butte)

క్రమక్రమ చక్రపు చివరిదశలో చాలా వరకు ఉన్నత పర్వతాలుండవు. అక్కడక్కడ అవశిష్టాలుగా కొన్ని మిగిలిపోతాయి. ఉన్నతంగా ఉండే పైభాగంలో ఇవి చదునుగా ఉండే చిన్న పర్వతాలు. పైభాగంలో ఉండే శిలలు కఠినంగా ఉంటే త్వరగా క్రమక్రమం చెందవు. ఇట్లా నిటారుగా ఉండి ఒంటరిగా మిగిలిన పర్వతాన్ని మెసా అని పిలుస్తారు. ఈ మెసాలలో ప్రపంచఖ్యాతి చెందినది కేప్టౌన్ (Capetown) వద్ద ఉన్న టేబుల్ పర్వతం.

ఈ మెసాలే కాలక్రమంలో మరింత క్రమక్రమం చెంది చిన్నచిన్న కొండలుగా మారతాయి. ఇవి విశాలమైన పెనిన్సైన్ లో అక్కడక్కడ చిన్న కొండలుగా కనబడతాయి. వీటిని అమెరికాలో బ్యూట్ (butte) అనీ, దక్షిణ ఆఫ్రికాలో కోప్ (kopje) అని అంటారు (చటం 7).

5.7.8 మొనాడ్ రాక్ (Monadrock)

ఒక భూభాగం చరమసమతలానికి సమంగా క్రమక్రమం చెందినప్పుడు, ఎక్కడో ఒకటి రెండు చిన్నచిన్న కొండలు అవశిష్టాలుగా మిగిలిపోతాయి. ఇటువంటి ఒంటరిగా ఉన్న అవశేషపర్వతాలు మొనాడ్ రాక్ లు.

5.8 సారాంశం

ఈ భాగంలో నదీ వ్యవస్థలు వాటికి సహస్థితంగా ఉండే భూదృశ్యాలను గురించి ప్రస్తావించాం. పరీవాహకవ్యవస్థలు, వాటి ప్రతిరూపాలను గురించి తెలిపాం. నదీలోయల అభివృద్ధి, క్రమక్రమ చక్రాలను గురించి కూడా చెప్పాం. ప్రవాహాల వర్గీకరణ, చరత్రను కూడా వివరించాం. చివరలో నదుల చర్యకు సంబంధించిన భూదృశ్యాలను గురించి సవివరంగా తెలియజేశాం.

5.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. ఒక ప్రాంతంలోని జలవిస్తరణకు మూలమైన నదీప్రవాహాలు, సరస్సులు, తదితర ఉపరితల జలస్య రూపాలన్నిటికీ కలిపి పరీవాహకవ్యవస్థ అనే పదాన్ని వాడతారు. వివిధరీతుల పరీవాహ ప్రతిరూపాలు ఉన్నాయి. అవి అ) శాఖయుత ప్రతిరూపం ఆ) ట్రెల్లిస్ ప్రతిరూపం ఇ) రేడియల్ ప్రతిరూపం వంటివి.

శాఖాయుత ప్రతిరూపంలో ప్రవాహాలు వృక్షశాఖల వలె అన్ని దిశలలో వ్యాప్తిస్తాయి.

ట్రెల్లిస్ ప్రతిరూపంలో ప్రధాన నదీ ప్రవాహాన్ని దాని ఉపనదులు లంబకోణంలో లేదా దాదాపు లంబకోణంలో ఖండిస్తాయి. ఉపరితలంపైన నిరోధక, అల్పనిరోధక శిలలపట్టీలు ఏకాంతరంగా బహిర్గతమైన చోట్ల ఈ ప్రతిరూపం వృద్ధిచెందుతుంది.

రేడియల్ ప్రతిరూపంలో ప్రవాహాలు చక్రంలో మాదిరిగా ఎత్తుగా ఉన్న ఒక కేంద్ర ప్రదేశం నుంచి వికిరణ రీతిలో అన్నివైపులకు విస్తరిస్తాయి. కలశం లేదా అగ్ని పర్వతం వంటి ఉన్నత ప్రదేశం ఉన్న చోట ఇది బాగా వృద్ధిచెందుతుంది.

2. నదీ ప్రవాహాల మూడు ప్రధానదశలు అ) తరుణదశ, ఆ) ప్రౌఢదశ, ఇ) వృద్ధదశ

తరుణదశ : ఇది నదీప్రవాహం అభివృద్ధి మొదటిదశ. ఈ దశలో నది క్రమక్రమ చర్యను అప్పుడే

ప్రారంభించి తన ప్రవాహ మార్గాన్ని తొలచుకోవడంలో శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది. జలపాతాలు, నిట్రమైన, క్రమరహితమైన వాలులు గల ఇరుకైన లోయలు తరుణదశకు నిదర్శనాలు. ఉపనదులు, వరదమైదానాలు ఉండక పోవడం మరొక అక్షణం.

ప్రాథమిక : ఈ దశలో నది సామర్థ్యం గరిష్ట స్థాయిని చేరి ఉంటుంది. ఈ దశలో అధఃక్షయం క్రమేణా తగ్గి, పార్శ్వక్షయం అధికమవుతుంది. తక్కువ వాలుగల పార్శ్వాల మరొక అక్షణం. ఈ దశలో నదీవక్రతలు ఏర్పడి, ఆక్స్ బౌ సరస్సులు రూపొందడానికి కారణమవుతాయి.

వృద్ధదశ : నది దాని వరదమైదానాన్ని వక్రతా రేఖలకన్నా ఎన్నోరెట్టువిస్త్రుతంగా ఖండించుకొన్నప్పుడు వృద్ధ దశలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ దశలో క్రమక్షయ శక్తి, సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వాలు తగ్గుతూ ఉండగా (aggradation) అధికమవుతుంది.

3. ఉధృతమైన అధఃక్షయం

4. క్రమక్షయ చక్రానికి అవరోధాలు కలిగించే ప్రక్రియలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో ముఖ్యమైనవి
- అ) హిమానీనదనం
 - ఆ) అగ్ని వర్షత చర్య
 - ఇ) భూపటల విరూపణ.

5.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- నదీలోయ అభివృద్ధిదశలను వర్ణించండి.
- వివిధరీతుల పరివాహ ప్రతిరూపాల గురించి తెలియజేయండి
- ప్రవాహాలవర్గీకరణ గురించి క్లుప్తంగా రాయండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- 'నదీపునరుజ్జీవనం' అంటే ఏమిటి?
- 'నదీగ్రహణం' అంటే ఏమిటి?

5.11 పదకోశం

Abrasion అఘర్షణ	:	విచ్చిత్తి చెందిన పదార్థాలతో కూడుకున్న రవాణాకారకాలు శిలల విచ్చిత్తికి దోహదం చేయడం. కోత పరికరంలా పనిచేయడం.
Alluvium ఒండ్రుమట్టి	:	నది అవక్షేప ఉత్పాదితాలు
Corrosion ఘర్షణ	:	రసాయన ద్రవాలవల్ల ఏర్పడే క్రమక్షయ ప్రక్రియ

- Delta
డెల్టా : సముద్రం, సరస్సులలో కలిసే పెద్ద నదీముఖద్వారాల వద్ద అవక్షేప నిక్షేప పదార్థం.
- Flood Plain
పరద మైదానం : వరద వచ్చినప్పుడు పొంగిపొరలే ప్రక్కప్రాంతాలు.
- Gullies
అరనాళికలు : ఆకారపు కంకణాలు. కొత్తగా ఏర్పడే కాలువలు ముందుకు చొచ్చుకొని మృత్తికాక్షయం కారణంగా ఏర్పడతాయి.
- Meander
నదీవక్రం : నదీ ప్రవాహంలో గుర్రపునాడా ఆకారంలో ఏర్పడే వంపు.
- Sheetflow
పటప్రవాహం : నేల మీద పల్చని పొర రూపంలో నిరంతరం శిలవంటి వాటి నున్నటి తలంమీద ప్రవహించే నీటిపొర.

BRAOU

భాగం-6 : భూగర్భజలం

పాఠ్యాంశాలు

6.0 అక్ష్యాలు

6.1 పరిచయం

6.2 భూగర్భజల విస్తరణ

6.2.1 భూగర్భజలతలం

6.3 సచ్చిద్రవ

6.4 పారగమ్యత

6.4.1 జలమయస్తరాలు, జలనిరోధక స్తరాలు

6.4.2 బావులు, బుగ్గలు

6.5 భూగర్భజలాల భౌమచర్య

6.6 భూగర్భజల ఉపయోగాలు

6.7 సారాంశం

6.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

6.9 మాదిరి పరీక్షాప్రశ్నలు

6.10 పదకోశం

6.0 అక్ష్యాలు

భూగర్భజలం గురించి, దాని భౌమ చర్యను గురించి వివిధ అంశాలు స్థూలంగా తెలియ జేయడం ప్రధాన అక్ష్యం.

ఈ భాగం పూర్తయ్యేసరికి మీకు క్రింది విషయాలు తెలుస్తాయి.

- భూగర్భజలాలనికీ మూలం
- భూగర్భజలాల విస్తరణ
- నీటి బుగ్గలు, బావులు
- భూగర్భజలాల భౌమ చర్య
- కార్స్ట్ స్థలాకృతి

6.1 పరిచయం

భూఉపరితలం కింద ధృఢీభూత, అధృఢీభూత శిలల్లో చిన్న పగుళ్లు, బీటలు, చిద్రాలు మొదలైన వాటిలో చేరివున్న జలాలనే భూగర్భజలమని (ground water) పిలుస్తారు. ఆశ్మావరణంలోని శూన్య ప్రదేశాలను నింపే జలాన్నే భూగర్భజలం లేదా అంతర్జలం (ground water,) అంటారు. భూమ్మీద సీటిలో 0.6% శాతం నీరు భూగర్భజలంగా వుంటుందని అంచనా. భూగర్భజలం మానవాలి మనుగడకు చాలా ఉపయోగ పడుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాలు చాలావరకు తమ నిత్యావసరాలకు భూగర్భజలాల మీదే ఆధారపడి వుంటాయి. అంతేకాకుండా చాలా చోట్ల పారిశ్రామికవసరాలకు కూడా

భూగర్భజలాల పైనే ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. మనదేశంలో సూటికి 15 నుండి 20 శాతం జనాభా మంచినీటికోసం భూగర్భజలం మీదే ఆధారపడి వుంది. నదీప్రవాహానికి తగిన స్థిమితాన్ని భూగర్భజలం కలుగజేస్తుంది. ఇది భౌమాకారకంగా మంచి ప్రాముఖ్యం కలిగివుంది. దీని క్రమక్రమయవలన గుహలు తదితర నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి.

భూగర్భజల మూలాలు (Sources of ground water) :

వాతావరణం నుంచి అవపాతనం చెందిన వర్షపాతం, హిమపాతంవల్ల లభించే నీటిలో సుమారు సగానికి పైగా ఆవిరిచెంది, బాష్పీత్యేకం వల్ల తిరిగి వాతావరణాన్ని చేరుతుంది. సూమారు 1/4 భాగం వాగులు, ఏరులు, నదుల రూపంలో భూఉపరితలంపైన ప్రవహించి నీరు సముద్రాన్ని చేరుకుంటుంది. మిగిలినది భూపటలంలోని వుండే రాళ్ళ సంధులు, చిద్రాలు తదితర మార్గాలద్వారా ఇంకి అంతఃశ్రవణం (percolation) చెందుతుంది. భూపటల శిలలలోకి నీరు సమృద్ధిగా ఇంకడానికి నీటిఆవిరి అర్ధగ్రత, శీతోష్ణస్థితులు, దట్టమైన అడవులు, సచ్చిద్రత, శిలల అధిక పారగమ్యత ముఖ్య పాత్రను వహిస్తాయి.

భూపటలంలోకి చేరిన జలమంతా ఏమవుతుందనే అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం. నీటిలో ఎక్కువ శాతం తిరిగి భూఉపరితలాన్ని నీటి బుగ్గలద్వారా, స్రోతస్సులద్వారా చేరుకొంటుంది. కొంతభాగం కేశాకర్షణ శక్తి (capillarity) వల్ల వదులుగా వున్న శిలలలోని సంధులద్వారా ఉపరితలానికిచేరి వేడిమికి ఆవిరిగా మారి పోతుంది. మరికొంతభాగం వృక్షాలలోకి వ్రేళ్ళద్వారా ప్రవేశించి బాష్పీత్యేకం ద్వారా వాతావరణాన్ని చేరుకొంటుంది. మానవుని నిత్యావసరాలైన ఇంటిపనులకు, పారిశ్రామికావసరాలకు బావులు, గొట్టపుబావులద్వారా చాలామటుకు వుపయోగపడుతుంది. కొంతభాగం ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా జరిగే రసాయన సమ్మేళనాలలో పాల్గొని యుగాలతరబడి నిలిచిపోతుంది.

భూగర్భజలాలకు రెండవ మూలస్థావరం ప్రస్తుత ఖండాల్లో వున్న అవక్షేపశిలా సముదాయాలు. ఇవి ఏర్పడేటప్పుడు ప్రతి ఇంకరేణువుచుట్టు, ప్రతి మృత్తికారేణువు చుట్టూ సన్నటి పొరగా ఆవరించివున్న నీరు క్రమంగా ఒకచోట చేరి శిలాస్థమై వుంటుంది. ఇటువంటి శిలాస్థజలం (connate water) సాధారణంగా రాతినూనెతోను, సహజ వాయువులతో కూడి వుంటుంది. నూనెగనుల ప్రాంతాలలో ఇది దొరుకుతుంది.

భూగర్భజలాల మూడవ మూలస్థావరం భూగర్భంలో లోతైన ప్రదేశాలలో ఏర్పడే మాగ్మాలు. ఈ జలాలను మాగ్మాజలాలు (magmatic waters) లేదా తరుణ జలాలు (juvenile water) అని పిలుస్తారు. ఆయా ప్రాంతాల లోపలనుంచి పెద్దఎత్తునమాగ్మాలు భూపటలంలోకి చొచ్చుకొనివచ్చినప్పుడు అక్కడ సహజంగావున్న అంతర్జలాలతో ఈ మాగ్మాజలాలు కలిసిపోతాయి. కొన్ని ఉష్ణస్రోతస్సులలోను, ఉష్ణద్రవ నిర్వరాలలోను ఏర్పడే జలాలుకొంతవరకు మాగ్మా సంబంధమైనవి. అమెరికాలోని యల స్టోన్ నేషనల్ పార్కులోనూ, న్యూజిలాండ్ లోని కనిపించే శక్తివంతమైన ఉష్ణద్రవ నిర్వరాలలోవుండే జలాలు ఈ జాతికి చెందినవి. విశిష్ట నిక్షేపాలు ఇక్కడ వుంటాయనడం అతిశయోక్తికాదు.

6.2 భూగర్భజల విస్తరణ

తమ నిత్యావసరాలకు మానవుడు యుగయుగాలనుంచి నీటికోసమే అన్వేషణ జరిపి, బావులు తవ్వి, భూగర్భ జలాలనుగురించి చాలా పరిజ్ఞానాన్ని పొందగలిగినారు. దీనినిబట్టి భూగర్భంలో ఎక్కడెక్కడ, ఏ విధంగా భూగర్భ జలాలు ఏర్పడతాయో తెలిసికోగలిగినారు. ఉపరితలంకింద కొద్దిలోతువరకు ఉన్న మండలం (zone) లో నీరు ఉండదు (పటం 8).

3. వేడోడ్ జలంతో నిండి ఉండే మండలం.

4. నూరుశాతం భూగర్భజలం ఉండే మండలం.

6.3 సచ్చిద్రత

భూఉపరితలం వైన ప్రవహించే జలాలవలె కాకుండా భూగర్భజలాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాయి. వాటి సగటు వేగం సంవత్సరానికి కొద్దిమీటర్లనుంచి కొన్ని వందల మీటర్లవరకు ఉంటుంది. వీటి చలనాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఉండే శిల సచ్చిద్రతను, పారగమ్యతను పరిశీలించగలగాలి.

శిలల ఘనపరిమాణంలో చిద్రత శాతం, వాటి సచ్చిద్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే శిలలలో ఉండే బీటలు, చిద్రాలు, విడరాలు మొదలైనవాటిమీద సచ్చిద్రత ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని మూలంగానే శిలలలో నీరు ఒక చోటనుంచి మరొకచోటుకు కదులుతుంది. ఈ సచ్చిద్రత శిలలో ప్రకృతి స్వభావాల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. స్తరిత శిథిలశిలలు భూగర్భజల చలనానికి చాలా తోడ్పడతాయి. ఎందుకంటే అప్రవేశయోగ్యంగా ఉండే అగ్నిశిలకన్న వీటికి ఎక్కువ సచ్చిద్రత ఉంటుంది. భూమిలో ఉండే వివిధ శిల సచ్చిద్రత వివిధ రకాలుగా వుంటుంది. ఉదాహరణకు ఇటీవల కాలంలో ఏర్పడిన మృత్తికా (argillaceous) శిలలలో 90% వరకు నీరు ఉంటే, అగ్ని శిలల్లో ముఖ్యంగా గ్రనైట్ శిలలలో నీరు 1 - 2% మాత్రమే ఉంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. 'సచ్చిద్రత' ను ఉదాహరణలతో వివరించండి.

6.4 పారగమ్యత

శిలలు తమద్వారా జలాలను చొరనిచ్చే స్వభావాన్ని పారగమ్యత అంటారు. పారగమ్యతకు సచ్చిద్రతకు, ఎంతో వ్యత్యాసముంది. శిలలు తమద్వారా నీటిని చొరనిచ్చే వేగం మీద దీని ప్రమాణం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పారగమ్యత చాలావరకు రాళ్లలో ఉండే పెద్దపెద్ద రేణువులు, చిన్న

భూగర్భజలాల పైనే ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. మనదేశంలో నూటికి 15 నుండి 20 శాతం జనాభా మంచినీటికోసం భూగర్భజలం మీదే ఆధారపడి వుంది. నదీప్రవాహానికి తగిన స్థిమితాన్ని భూగర్భజలం కలుగజేస్తుంది. ఇది భౌమాకారకంగా మంచి ప్రాముఖ్యం కలిగివుంది. దీని క్రమక్రమంవలన గుహలు తదితర నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి.

భూగర్భజల మూలాలు (Sources of ground water) :

వాతావరణం నుంచి అవపాతనం చెందిన వర్షపాతం, హిమపాతంవల్ల లభించే నీటిలో సుమారు సగానికి పైగా ఆవిరిచెంది, బాష్పోత్పేకం వల్ల తిరిగి వాతావరణాన్ని చేరుతుంది. సుమారు 1/4 భాగం వాగులు, ఏరులు, నదుల రూపంలో భూఉపరితలంపైన ప్రవహించి నీరు సముద్రాన్ని చేరుకుంటుంది. మిగిలినది భూపటలంలోని వుండే రాళ్ళ సంధులు, చిద్రాలు తదితర మార్గాలద్వారా ఇంకి అంతఃశ్రవణం (percolation) చెందుతుంది. భూపటల శిలలలోకి నీరు సమృద్ధిగా ఇంకడానికి నీటిఆవిరి అర్ధగ్రత, శీతోష్ణస్థితులు, దట్టమైన అడవులు, సచ్చిద్రత, శిలల అధిక పారగమ్యత ముఖ్య పాత్రను వహిస్తాయి.

భూపటలంలోకి చేరిన జలమంతా ఏమవుతుందనే అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం. నీటిలో ఎక్కువ శాతం తిరిగి భూఉపరితలాన్ని నీటి బుగ్గలద్వారా, స్రోతస్సులద్వారా చేరుకొంటుంది. కొంతభాగం కేశాకర్షణ శక్తి (capillarity) వల్ల వదులుగా వున్న శిలలలోని సంధులద్వారా ఉపరితలానికిచేరి వేడిమికి ఆవిరిగా మారి పోతుంది. మరికొంతభాగం వృక్షాలలోకి ప్రేళ్ళద్వారా ప్రవేశించి బాష్పోత్పేకం ద్వారా వాతావరణాన్ని చేరుకొంటుంది. మానవుని నిత్యావసరాలైన ఇంటివసులకు, పారిశ్రామికావసరాలకు బావులు, గొట్టపుబావులద్వారా చాలామటుకు వుపయోగపడుతుంది. కొంతభాగం ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా జరిగే రసాయన సమ్మేళనాలలో పాల్గొని యుగాలతరబడి నిలిచిపోతుంది.


భూగర్భజలాలకు రెండవ మూలస్థావరం ప్రస్తుత ఖండాల్లో వున్న అవక్షేపశిలా సముదాయాలు. ఇవి ఏర్పడేటప్పుడు ప్రతి ఇంకరేణువుచుట్టూ, ప్రతి మృత్తికరేణువు చుట్టూ సన్నటి పొరగా ఆవరించివున్న నీరు క్రమంగా ఒకచోట చేరి శిలాస్థమై వుంటుంది. ఇటువంటి శిలాస్థజలం (connate water) సాధారణంగా రాతినునెత్తోను, సహజ వాయువులతో కూడి వుంటుంది. నూనెగనుల ప్రాంతాలలో ఇది దొరుకుతుంది.

భూగర్భజలాల మూడవ మూలస్థావరం భూగర్భంలో లోతైన ప్రదేశాలలో ఏర్పడే మాగ్మాలు. ఈ జలాలను మాగ్మాజలాలు (magmatic waters) లేదా తరుణ జలాలు (juvenile water) అని పిలుస్తారు. ఆయా ప్రాంతాల లోపలనుంచి పెద్దఎత్తునమాగ్మాలు భూపటలంలోకి చొచ్చుకొనివచ్చినప్పుడు అక్కడ సహజంగావున్న అంతర్జలాలతో ఈ మాగ్మాజలాలు కలిసిపోతాయి.కొన్ని ఉష్ణస్రోతస్సులలోను, ఉష్ణద్రవ నిర్జరాలలోను ఏర్పడే జలాలుకొంతవరకు మాగ్మా సంబంధమైనవి. అమెరికాలోని యల స్టోన్ నేషనల్ పార్కులోనూ, న్యూజిలాండ్ లోని కనిపించే శక్తివంతమైన ఉష్ణద్రవ నిర్జరాలలోవుండే జలాలు ఈ జాతికి చెందినవి. విశిష్ట నిక్షేపాలు ఇక్కడ వుంటాయనడం అతిశయోక్తికాదు.

6.2 భూగర్భజల విస్తరణ

తమ నిత్యావసరాలకు మానవుడు యుగయుగాలనుంచి నీటికోసమే అన్వేషణ జరిపి, బావులు తవ్వి, భూగర్భ జలాలనుగురించి చాలా పరిజ్ఞానాన్ని పొందగలిగాడు. దీనినిబట్టి భూగర్భంలో ఎక్కడెక్కడ, ఏ విధంగా భూగర్భ జలాలు ఏర్పడతాయో తెలిసికోగలిగారు. ఉపరితలంకింద కొద్దిలోతువరకు ఉన్న మండలం (zone) లో నీరు ఉండదు (పటం 8).

ఒకవేళ ఉన్నా చాలా సక్యతగా వుంటుంది. ఈ మండలాన్ని వాయుప్రసారిత మండలం (zone of Aeration) అంటారు. ఈ మండలంలో శిథిలశిలలు, మూలాధార శిలలు పగుళ్ళతో, బీటలతో నిండివుంటాయి. అందువల్ల ఈ మండలంలో వాయుప్రసారమేగాని జలసముదాయాలే ఏర్పడివుండవు. తర్వాత కనిపించే మండలాన్ని సంతృప్తమండలం (Zone of saturation) అంటారు.



పటం 8 భూగర్భ జల విస్తరణ

ఈ మండలంలో వుండే రాళ్ళలో పగుళ్ళు బీటలు అన్నీ నీటితో నిండివుంటాయి. కాబట్టి ఈ మండలానికి ఆ నేరు పెట్టారు. ఈ మండలంలో నీటిపై మట్టాన్ని భూగర్భజలతలం (watertable) అంటారు. ఇది ఎగుడు దిగుడుగా వుంటుంది. ఉపరితలం మీద కనిపించినన్ని ఎగుడుదిగుళ్ళు ఈ భూజలతలంలో కనిపించవు. కాని రెండింటికి మధ్య కొంత సామీప్యముంటుంది. ఎత్తైన కొండలమీది భాగాలలో ఈ భూజలతలం లోతుగా వుంటుంది. పర్వతసానువులలో పైనే వుంటుంది. లోయలలో యిది భూ ఉపరి తలానికి సన్నిహితం గా వుంటుంది. ఉపరితలం నుంచి ఈ భూగర్భజలం సాధారణంగా కొన్ని మీటర్ల నుంచి కొన్ని వందల మీటర్లవరకు లోతులో వుంటుంది.

ఇక్కడ ప్రథమ మండలాన్ని వేడోజ్ మండలం అని కూడా అంటారు. దీనిలో మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ మట్టిరేణువులను ఆవరించి నీరు వుంటుంది. ఆ నీటి చెమ్మనే (moisture) మొక్కలు, వృక్షాలు, తమ వేళ్ళద్వారా గ్రహిస్తాయి. తర్వాత వాటి ఆకుల ద్వారా బాష్పోత్సేకం జరగడంవల్ల కొంత నీరు వాతావరణాన్ని చేరుతుంది. ఈ నేలలో ఉండే చెమ్మభాగానికి భూజలతలానికి మధ్యన ఉండే మండలంలో అణువుల ఆకర్షణశక్తి నీటిని బంధించి ఉంచుతుంది. వర్షం కురిసినప్పుడు మినహా మిగతా సమయాలలో ఇక్కడ జలప్రసారం తక్కువ. కేశాకర్షణశక్తి ప్రభావంవల్ల భూగర్భజలతలం మీదకొన్ని సెం.మీ. నుంచి కొన్ని మీటర్లవరకు తడిఅంచు (moist fringe) ఏర్పడి ఉంటుంది.

6.2.1 భూగర్భజలతలం

సంతృప్తమండలం ఎగువతలాన్ని భూగర్భజలతలం అంటారు. ఇది భూగర్భజల వ్యవస్థలో ఒక ముఖ్య అంశం. బావులలో నీటి ఉనికి, ఊటలు, నదుల ప్రవాహాలలోని మార్పులను వివరించడానికి, సరస్సులలో నీటి మట్టాలలోని మార్పులను వివరించడానికి భూగర్భజలతల మట్టం చాలా ముఖ్యం.

భూగర్భజలతలాన్ని మనం చూడలేకపోయినప్పటికీ, బావులలోని నీటిమట్టం సంతృప్త మండల వై తలంతో ఏకీభవిస్తుంది. బావులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలో భూగర్భజలతలాన్ని చిత్రీకరించి, అధ్యయనం చేయవచ్చు. ఇటువంటి చిత్రాలనుంచి భూగర్భజలతలం చదునుగా ఉండటం అరుదని, అది చాలా వరకు స్థలాకృతికి సమాంతరంగా ఉంటుందని అవగాహన అవుతుంది. ఇది కొండ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ లోతులోనూ, లోయలవైపుకు తక్కువ లోతులోను కనిపిస్తుంది.

భూగర్భజలతలం క్రమరహితంగా ఉండటానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు వర్షపాతంలో ప్రవేశయోగ్యతలో వైవిధ్యాలవల్ల అంతస్రవణం భిన్నరీతులలో జరగడం మూలంగా భూగర్భజలతల మట్టంలో మార్పులుండవచ్చు. అయితే ముఖ్యమైన కారణం భూగర్భజలం వివిధ పరిస్థితులలో అతినెమ్మడిగా, పేరుపేరు వేగాలలో కదలడమే. ఉదాహరణకు కొండల మధ్యనదిలోయలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో భూగర్భజలం నదులకు దగ్గరగా ఉన్న భూగర్భజలం కంటే చాలా నెమ్మడిగా కదులుతుంది. అందువల్లనే కొండల కింద భూగర్భజలం ఎక్కువగా పోగువుతుంది.

నదికి ఇరుపక్కల ఉండే ప్రాంతాలలో భూగర్భజలతలం సాధారణంగా నదివైపు వంగి వుంటుంది. నదులవల్ల అంతర్జల నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయని, వృద్ధి చెందుతాయని అనుకొంటాం. అది నిజంకాదు. నిజానికి నీరు అంతర్జలనిక్షేపాలనుంచి నీటిబుగ్గల (Springs) ద్వారా, నెర్రెల (Seepages) ద్వారా నదులలోనికి చేరుతుంది. శీతోష్ణస్థితి ప్రభావంవల్ల శుష్క (aird) ప్రాంతాలలో జలసంతృప్త మండలం నదులకన్నా చాలా లోతుగా ఉంటుంది. కాబట్టి నదులు, వాగులలో నీరు క్రమంగా భూగర్భంలోకి ఇంకిపోతుంది. ఇటువంటి వాటిని అంతర్వాహినులు (ephemeral streams) అని పిలుస్తారు. దీనికి భిన్నంగా జలాలు అంతర్జల నిక్షేపాలనుంచి నదులలోనికి బుగ్గలు మొదలైనవాటి రూపంలో చేరినప్పుడు వాటిని బహిష్కారనదులు (Effluent streams) అని వ్యవహరిస్తారు. అటువంటి నదుల ప్రవాహమార్గాలు భూగర్భజలతలం కన్నా వల్లంగా ఉంటాయి. అందువల్ల భూగర్భజలం వాటిలోకి ప్రవహిస్తుంది.

కొన్నిచోట్ల వేడ్కోక్ మండలంలో కొంత నీటి సముదాయం ముఖ్యమైన భూగర్భజలతలం వైభాగంలో ఉంచినట్లుగా ఏర్పడుతుంది. దీనిని ఉపవిష్ట భూజలతలం (Perched water table) అని పిలుస్తారు. వేడ్కోక్ మండలంలో ఉండే అప్రవేశయోగ్య (Impervious) శిలల వైభాగంలో కొన్ని చోట్ల ఏర్పడిఉన్న ప్రవేశయోగ్య (pervious) శిలల్లో ఇది సామాన్యంగా చేరిఉంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. భూగర్భజల విస్తర్ణ ఏ విధంగా జరుగుతుందో క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

2. సంతృప్త మండల ఎగువ తలాన్ని పిలిచేసేరు.

.....

.....

3. వేడోడ్ జలంతో నిండి ఉండే మండలం,

4. సూర్యశాతం భూగర్భజలం ఉండే మండలం.

6.3 సచ్చిద్రత

భూఉపరితలం పైన ప్రవహించే జలాలవలె కాకుండా భూగర్భజలాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాయి. వాటి సగటు వేగం సంవత్సరానికి కొద్దిమీటర్లనుంచి కొన్ని వందల మీటర్లవరకు ఉంటుంది. వీటి చలనాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఉండే శిలల సచ్చిద్రతను, పారగమ్యతను పరిశీలించగలగాలి.

శిలల ఘనపరిమాణంలో చిద్రత శాతం, వాటి సచ్చిద్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే శిలలలో ఉండే బీటలు, చిద్రాలు, విదరాలు మొదలైనవాటిమీద సచ్చిద్రత ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని మూలంగానే శిలలలో నీరు ఒక చోటనుంచి మరొకచోటుకు కదులుతుంది. ఈ సచ్చిద్రత శిలలో ప్రకృతి స్వభావాల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. స్తరిత శిథిలశిలలు భూగర్భజల చలనానికి చాలా తోడ్పడతాయి. ఎందుకంటే అప్రవేశయోగ్యంగా ఉండే అగ్నిశిలలకన్న వీటికి ఎక్కువ సచ్చిద్రత ఉంటుంది. భూమిలో ఉండే వివిధ శిలల సచ్చిద్రత వివిధ రకాలుగా వుంటుంది. ఉదాహరణకు ఇటీవల కాలంలో ఏర్పడిన మృత్తికా (argillaceous) శిలలలో 90% వరకు నీరు ఉంటే, అగ్ని శిలల్లో ముఖ్యంగా గ్రనైట్ శిలలలో నీరు 1 - 2% మాత్రమే ఉంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. 'సచ్చిద్రత' ను ఉదాహరణలతో వివరించండి.

6.4 పారగమ్యత

శిలలు తమద్వారా జలాలను చొరనిచ్చే స్వభావాన్ని పారగమ్యత అంటారు. పారగమ్యతకు సచ్చిద్రతకు, ఎంతో వ్యత్యాసముంది. శిలలు తమద్వారా నీటిని చొరనిచ్చే వేగం మీద దీని ప్రమాణం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పారగమ్యత చాలావరకు రాళ్లలో ఉండే పెద్దపెద్ద రేణువులు, చిన్న

రేణువుల అమరికమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పెద్దరేణువులతో కూడిన శిలలలో గ్రావెల్ (gravel) లో, గండ్ల ఇసుకలో ఈ పొరగమృత ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పంక శిలలు (mud stones) మొదలైన వాటికి చాలా కొద్ది పొరగమృత ఉంటుంది. లేదా అవి కొన్నిచోట్ల అప్రవేశయోగ్యంగా ఉంటాయి.

ఎక్కువ సచ్చిద్రతతో ఉన్న శిలలు ఎక్కువ పొరగమృతతో ఉండాలనే నియమం ఏదీ లేదు. ఉదాహరణకు జంబాలం (clay) ఇసుక కన్న ఎక్కువ సచ్చిద్రంగా ఉంటుంది. జంబాలం లోని రేణువులు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి కణాల మధ్య ఉండే శూన్యప్రదేశాలు కూడా చాలా చిన్నవిగానే ఉంటాయి. అందువల్ల జంబాలాల సచ్చిద్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటి సూక్ష్మరంధ్రాల ద్వారా నీరు ప్రసరించదు. వీటిలో రేణువుకు, రేణువుకు మధ్య దూరం చాలా తక్కువ కాబట్టి అణ్వకర్షణశక్తి (molecular attraction) ఎక్కువగా ఉండి నీటిని చొరసీయదు. కాని ఇసుకలో నీరు ధారాళంగా ప్రసరించగలుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటి రేణువుల మధ్య దూరం జంబాలరేణువుల మధ్య దూరం కన్న చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మీ అవగాహను పరీక్షించుకోండి.

6. పొరగమృతను నిర్వచించండి.

6.4.1 జలమయస్తరాలు(aquifers)

ఇవి పొరగమృత ఎక్కువగా ఉన్న శిలాస్తరాలు. వీటి ద్వారా అంతర్జలాలు ధారాళంగా ప్రసరిస్తాయి. వీటినే జలమయస్తరాలుగా పిలుస్తారు. గ్రావెల్, గండ్ల ఇసుక మొదలైనవి చాలా విశిష్టమైన జలమయస్తరాలు. అయితే జంబాలం వంటి మృత్తికా పదార్థాలు అప్రవేశయోగ్యంగా ఉండడంవల్ల అవి జలమయస్తరాలుకావు. కాని ఇసుకరాళ్లు (sand stones) మంచి జలమయస్తరాలు. కొన్ని సున్నపురాళ్ళలో సంస్తరణ సమతలాలు (bedding planes), సంధులు (joints) ఎక్కువగా ఉండడం చేత అవి అంతర్జలచలనానికి బాగా దోహదం చేస్తాయి. అగ్ని శిలలు, రూపాంతరప్రాప్త శిలలు, షేల్ (shale) అనే స్తరీత శిలలు అప్రవేశయోగ్యంగాఉంటాయి. మంచి, జలమయస్తలు కాలేవు. కాని వాటిలో కూడా పెద్ద పెద్ద బీటలు, విడరాలు, సందులు ఏర్పడి ఉన్నట్లైతే అవి కొంత వరకు జలమయస్తరాలుగా మారగలవు.

వీటికి భిన్నంగా నీటి చలనాన్ని నిరోధించే జంబాలం వంటి పదార్థాలతో కూడుకొన్న ఉన్న అప్రవేశయోగ్యమైన స్తరాలను జలనిరోధక స్తరాలు అంటారు. ఛిద్రాలు చిన్నవి అయ్యేకొద్దీ నీరు నెమ్మదిగా కదులుతుంది. రేణువుల మధ్యనున్న స్థలాలు చాలా చిన్నవిగా ఉంటే రేణువులకు అతుక్కొని ఉండే పల్లవి నీటి పొరలు ఒక దానికొకటి దగ్గర కావచ్చు లేదా అతిపాతంచెందవచ్చు. దీనివల్ల రేణువులకు నీటిని బంధించి ఉంచే అణుఆకర్షణశక్తి ఖాళీ స్థలం అంతా విస్తరించడం వల్ల నీరు అది ఉన్న చోటనే ఉండి పోతుంది. ఇటువంటి జలనిరోధకస్తరాలకు జంబాలం ఒక ఉత్కృష్టమైన ఉదాహరణ.

అంతఃస్రవణం మూడు అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవి 1. అక్కడ దొరికే శిలలు, వాటి పొరగమృత 2. అక్కడ భూగర్భజలతలంవాలు 3. అంతఃస్రవణవేగం. ఈ మూడు ఎప్పటికప్పుడు పరస్పర సంబంధ సమన్వయంతో ఒక దానితో ఒకటి సమతాస్థితి (equilibrium) ని కలిగి ఉంటాయి. వర్షపాతం ఎక్కువైనప్పుడు భూగర్భజలతలంవాలు ఎక్కువవడం వల్ల అంతఃస్రవణవేగం పెరుగుతుంది. ఎక్కువ నీరు సదులలోకి చేరుతుంది. ఉపరితలం మీద కురిసిన వర్షంనీరు అక్కడి శిలల ప్రకృతిని బట్టి వందల మీటర్ల నుంచి వేల మీటర్ల లోతువరకు ఇట్లా స్రవిస్తుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

7. భూగర్భజలాలు లభించే శిలలు.

(A) జలనిరోధకస్తరాలు (B) జలమయస్తరాలు (C) ఏకీకృతాలు.


8. భూగర్భజల చలనాన్ని నిరోధించే అవక్షేపాలు

(A) జలనిరోధక స్తరాలు(B) జలమయస్తరాలు(C) ఏకీకృతాలు.

6.4.2 బావులు, బుగ్గలు (Wells and Springs)

భూగర్భజలాలను వినియోగించడానికి బావులను తవ్వుకొంటారు. భూగర్భజలతలానికంటే ఎక్కువ లోతుకు తవ్వితేనే బావులలో నీరు సమృద్ధిగా ఉంటుంది. నీరు వాడకంఎక్కువైతే బావిలో నీటిమట్టం కొంత దిగిపో తుంది. బావి చుట్టూ గర్తకాశంకుపు (cone of depression) ఏర్పడుతుంది. నేద్యానికి (irrigation) ఉపయోగించే బావులచుట్టూ ఇట్లా ఏర్పడిన గర్తకాశంకుపు చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల బావులలో నీటి మట్టాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. లోతు ఎక్కువ బావులలో నీరు వేసవికాలంలో కూడా ఉంటుంది.

శిలావైవిధ్యాన్ని బట్టి బావులలో నీటి మట్టాలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. అగ్ని శిలలు, రూపాంతరప్రాప్త శిలలు ఉన్నచోట్ల పెద్ద పెద్ద సందులు, విదరాలు ఉండవచ్చు సామాన్యంగా నీళ్లు పడవు. శిలలలో పెద్ద సందులు ఉంటేనే నీరు లభించడానికి వీలుంటుంది. విదరాలు సాధారణంగా భూమిలోతుల్లోకి వెళ్లినకొద్దీ తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి విదరాలున్న శిలా ప్రదేశంలో తక్కువ లోతులో నీరు దొరికినప్పుడు పుష్కలంగా లభించవచ్చు. అదే ఎక్కువ లోతు తవ్వితే నీరు చాలా తక్కువగా లభిస్తుంది. ఆ విధంగానే ప్రవేశయోగ్య, అప్రవేశయోగ్య శిలలు ఒక దాని పక్కన ఒకటి కలిసి ఉంటే ఆ ప్రాంతంలోని బావులలో నీటి ప్రమాణాలు రకరకాలుగా ఉండవచ్చు (చిత్రం-9).



చిత్రం-9 భూగర్భజలతలం తీరు


N W T సాధారణ భూగర్భజలతలం
W₁ బావి

W T భూగర్భజలతలం
str ప్రవాహం

సర్వసాధరణంగా బావులు భూగర్భజలతలంకంటే లోతుగా ఉంటాయి. చిత్తడి ప్రాంతాలబావుల నీటి మట్టం సాధారణంగా 20 మీటర్లలోతుకు మించి ఉండదు. అధుడీభూతశిలాప్రదేశాలలో బావులను తవ్వడానికి ఆగర్ (augur) లు ఉపయోగపడతాయి. చాలా కఠినశిలలున్న చోట్ల వేధని (Drilling) సహాయంతో చాలా లోతు వరకు తవ్వవచ్చు. ఇటీవలకాలంలో గొట్టపుబావులు (Tube wells) తవ్వకంవక్కువ వాడుకలోకివస్తున్నది. వాటిలో భ్రమణవేధన వద్దతిని ఉపయోగిస్తున్నారు.

నీటిబుగ్గలు లేదా స్తోతస్సులు : భూగర్భంలో స్రవించే నీరు ఏదో ఒక మార్గం ద్వారా ప్రకృతిసిద్ధంగా బయటకు వచ్చినప్పుడు దానిని నీటి బుగ్గ అంటారు. ఉపరితలంనుంచి లోపలికి స్రవించిన నీరు భూగర్భజల తలాన్ని చేరుకొంటుంది. అటువంటి భూగర్భజలాలు వగుళ్ళనుంచి బయటికి ధారాళంగా లేదా అప్పుడప్పుడు గాని ప్రవహిస్తుంటుంది. ఆ ప్రవాహమార్గాలను స్తోతస్సులు లేదా నీటి బుగ్గలు అని పిలుస్తారు.

బుగ్గలు పర్వత ప్రదేశాలలో, కొండచరియల వద్దగాని లోయలలోగాని ఏర్పడతాయి. కొండచరియలలో బుగ్గలు జలమయస్తరాలైన ఇసుకరాయి, గ్రావెల్ ఉన్నచోటే ఏర్పడతాయి. ఎస్కార్ప్ మెంట్ లా ఉన్న కొన్ని చరియలలో చిన్న చిన్న బుగ్గలు వరసగా ఏర్పడతాయి. వాటి ద్వారా నీరు బయటికి వస్తుంది.



పటం 10 జలమయ స్తరస్తోతస్సు

అప్రవేశయోగ్య శిలల మధ్య జలమయస్తరలున్నట్లయితే కొండచరియలలో జలమయ స్తరస్తోతస్సులు (aquifer springs) ఏర్పడతాయి (పటం 10).


మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

9. భూగర్భజలం ఏదో ఒక ప్రకృతిసిద్ధ మార్గం ద్వారా భూమి ఉపరితలానికి రావడాన్ని ఏమంటారు.

ఆర్టిసియన్ స్తోతస్సులు, బావులు (Artesians springs & wells) :

ఇవి నీటి బుగ్గలలో చాలా విశిష్టమైనవి, ప్రముఖమైనవి. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా ఎక్కువ వాలుగా వున్న శిలాస్తరలుండే చోట్ల ఇవి ఏర్పడతాయి. ప్రవేశయోగ్యమైన

ఇనకరాయి, గ్రావెల్ వంటి జలమయస్థరలు అప్రవేశయోగ్య షేల్లతో ఆచూదితమై ఉండాలి. అటువంటి శిలలు పర్వతాగ్రభాగంలో బహిర్గతమై ఉండాలి. వర్షంకురియగానే వర్షపునీరు ప్రవేశ యోగ్యమైన జలమయస్థరలలోనికి ఇంకి ఇనకరాళ్లలోనే ఉండిపోతుంది. ఈ ఇనకరాళ్లు అప్రవేశయో గ్యమైన షేల్లతో ఆచూదితమై ఉన్నాయి, కాబట్టి వీటిలోకి ఇంకిన నీరు పైకి రావడానికి వీలుండదు. అటువంటిచోట్ల బావులు తవ్వినప్పుడు అప్రవేశయోగ్యమైన రాళ్ళద్వారా పైకి మార్గమేర్పడడంవల్ల నీరు పైకిచిమ్మినట్లుగా బహిర్గతమవుతుంది. ఇటువంటి వాటినే ఆర్టిసియన్ బావులు అంటారు. వీటిని మొట్టమొదట ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ఆర్టాయ్స్ (Artois) అనే ప్రదేశంలో కనుగొనడం వల్ల వీటికి ఆర్టిసియన్ అనే పేరు వచ్చింది. ఇటువంటి పరిస్థితులు చాలా దేశాలలో అనేక చోట్ల వుండటానికి వీలుంది. మన దేశం లో కూడా ఎన్నో ప్రాంతాలలో ఈ ఆర్టిసియన్ బావులు తవ్వడానికి కావలసిన పరిస్థితులు వున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ్యంగా తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో ఈ ఆర్టిసియన్ బావులను ఇటీవల కనుగొన్నారు. ఇవి రాజమండ్రి, చింతలపూడి ఇనకరాళ్లలో ఏర్పడి ఉన్నాయి. తమిళనాడులో కడలూర్ ఇనకరాళ్లు వున్నచోట్ల ముఖ్యంగా దక్షిణ ఆర్కాట్ జిల్లాలో ఈ ఆర్టిసియన్ బావులుచాలా వున్నాయి.



పటం II ఆర్టిసియన్ బావి-నిర్మాణం
(Lst) సున్నపురాయి, (Aqf.sh) జలనిరోధకషేల్, (Aqf.ss) జలమయఇనకరాయి
(As) ఆర్టిసియన్ సోతస్సు (Dy) డైక్


ఉష్ణ సోతస్సులు(Hot Springs) : కొన్ని బుగ్గలలో వేడిగా ఉన్న నీరు బయటకి వస్తుంటుంది. వాటిని ఉష్ణ సోతస్సులు అంటారు. వాటి జలాలఉష్ణోగ్రత సాధారణ సోతస్సుల ఉష్ణోగ్రత కన్న సుమారు 10°C ఎక్కువ వుంటుంది. ఈ అధికఉష్ణశక్తి వీటికి భూగర్భంలో పైకి ఉబికితే మార్గా (magma) లనుంచి లభ్యమవుతుందని భావించవచ్చు. కొన్ని చోట్ల, ముఖ్యంగా ఇటీవలికాలంలో ఏర్పడిన కొత్తఅగ్ని పర్వతప్రాంతాలలో ఈ వేడినీటిబుగ్గలు విశేషంగా వుంటాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన యల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ లో ఈ వేడినీటి బుగ్గలు కొకొల్లాలుగావున్నాయి. ఆ ప్రదేశంలో కొంతకాలంకిందటే విస్తృతంగా ఏర్పడిన లావా ప్రవాహాలు వున్నాయి.

కొన్ని ప్రాంతాలలో భూగర్భజలాలు చాలా లోతువరకు చొచ్చుకొని పోవడంవల్ల అక్కడ సహజంగా ఉండే అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు ఈ జలాలువేడెక్కి తిరిగిబహిర్గతమైనప్పుడు వేడినీటి బుగ్గలుగా అవతరిస్తాయి. భూమిలో సరి 30 మీటర్లలోతుకు 1°C ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని శాస్త్రజ్ఞులు అంచనా. అందువల్ల ఎన్నో వందల మీటర్లలోతునుంచి పైకి ఉబికిన నీరు సామాన్యంగా వేడిగానే ఉంటుంది. అయితే మరి అంత వేడిగా ఉండదు. ఇటు వంటి వేడి నీటిబుగ్గలు సాధారణంగా పర్వత ప్రాంతాలలో భ్రంశాలు ఉన్నచోట్ల కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు వర్జీనియారాష్ట్రం (U.S.A.) లోని ఉష్ణసోతస్సులు, మనదేశం ఒరిస్సా రాష్ట్రం లోని “తప్తసాని” అనే చోట ఉన్న వేడినీటి బుగ్గలు ఏర్పడవచ్చు. రేడియో ధార్మికశక్తి (Radio activity) వల్ల జనించే ఉష్ణశక్తి నుంచి కూడా వేడినీటి బుగ్గలేర్పడవచ్చు.

ఉష్ణద్రవనిర్జరాలు (Geysers) : ఇవి విశిష్టమైన ఉష్ణస్థోతస్సులు. ఇవి క్రమరీతిలో చాలా శక్తివంతంగా వేడినీటిని ఆకాశంలో విరజిమ్ముతాయి. వీటినే ఉష్ణద్రవ నిర్జరాలు అని పిలుస్తారు. ఐస్‌లాండ్‌లో ఈ రకమైన గెయిసర్స్ పల్లనే వీటికి ఈ పేరు వచ్చింది (పటం 12).

ఈ ఉష్ణద్రవనిర్జరాలు ప్రస్తుతకాలంలో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఇటువంటివి ఐస్‌లాండ్, న్యూజిలాండ్ దేశాలలో కనిపిస్తాయి. ఇవి నీటిని విరజిమ్ముడాన్ని యల్టోస్టాన్ నేషనల్ పార్క్‌లో చక్కగా గమనించవచ్చు. అక్కడ వేడినీటిని, ఆవిరిని 100 మీటర్ల ఎత్తుదాకా ఆకాశంలో విరజిమ్మే నిర్జరాలు ఉన్నాయి. అటువంటి వాటిలో విశిష్ట స్థానాన్ని పొందిన ఉష్ణద్రవ నిర్జరం “ఒల్డ్ ఫెయిత్‌ఫుల్” (Old faithful). గా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందింది. ఇది ప్రతి 70 నిమిషాలకు ఒకసారి కొన్నివేల గాలిని వేడినీటిని, ఆవిరిని క్రమంతప్పకుండా 50 నుంచి 60 మీటర్ల ఎత్తుదాకా ఎగజిమ్ముతుంది. దీనికి ఇది సార్థకనామం అనిపిస్తుంది. వేడినీటిని విరజిమ్ముడానికిగల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన వారిలో ముఖ్యులు బున్సెన్ (Bunsen) అనే ప్రఖ్యాత శాస్త్రజ్ఞుడు. ఐస్‌లాండ్‌లో విస్తృత పరిశోధనలు చేసి బున్సెన్ ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. నీటి మరుగు ఉష్ణగ్రత (Boiling point) పీడనాన్ని బట్టి మారుతుందనే భౌతికసూత్రంపైన ఈ సిద్ధాంతం ఆధారపడి వుంది. భూఉపరితలం మీద మరిగేనీటి ఉష్ణగ్రత 100°C . అక్కడ పీడనశక్తి ఒక వాతవరణం (One atmosphere). భూగర్భంలోకి పోయిన కొద్దీ ఉష్ణగ్రత, పీడనశక్తి పెరగడంవల్ల అక్కడ నీరు మరిగే ఉష్ణగ్రత 100°C కన్న చాలా ఎక్కువ వుంటుంది.

ఉష్ణద్రవ నిర్జర నిర్మాణం : ఉష్ణద్రవ నిర్జర అసాధారణ చర్య జరగడానికి ముఖ్యకారణం అది ఉన్న ప్రదేశాలలో భూగర్భజలాలు అసంబద్ధంగా ప్రసరించడమేనని తెలుసుకోవచ్చు. ఉష్ణద్రవ నిర్జరం వైభాగంలో ఒక ఎత్తైన కుప్ప ఉంటుంది. ఇది గెయిసర్‌రైట్ (Geyserite) అనే నిక్షేపం. ఉష్ణద్రవ నిర్జరం వైకి విరజిమ్మే వేడినీటినుంచి అవసాతనం చెందిన కార్బియమ్ కార్బనేట్ ఆ కుప్పమధ్య హరివాణంవలె ఒక కుంట వుంటుంది. దాని మధ్యనుంచి లోపలికి నాళంగా లాగ వుండే ఒక



పటం 12 ఉష్ణద్రవ నిర్జరం

a లావాప్రవాహాలు, భస్మం, W.T. భూగర్భజల తలం,
b వేడిగా ఉన్న అగ్నిశిల

బిలం సుమారు 30 నుంచి 50 మీటర్లవరకు వ్యాపించి వుంటుంది. ఆ నాళంలో భూగర్భజలాలు నిండినప్పుడు అవిక్రమంగా వేడెక్కుతాయి. కాని అధికజలం పీడనశక్తివల్ల మరిగే ఉష్ణోగ్రతను పొందలేవు. అయితే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతవల్ల కొంతకాలానికి గొట్టం అడుగు భాగంలో నీరు మరిగే ఉష్ణోగ్రతను చేరుకుంటుంది. అప్పుడు నీరు మరగడం మొదలు పెడుతుంది. దీనివల్ల కొంతనీరు అకస్మాత్తుగా అధికోష్ణంగల ఆవిరిగా మారి దాని పీడనశక్తికి వ్యాకోచం చెందడంవల్ల వైన ఉన్న హరివాణం నుంచి కొంత వేడినీరు వైకి పార్లి ప్రవహిస్తుంది (నట్య 12).

ఈ విధంగా కొంతనీరు తగ్గిపోయేటప్పటికి నాళం అడుగు భాగంలో ఉన్న నీటి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల చాలా భాగం నీరు అకస్మాత్తుగా ఆవిరిగా మారి ప్రచండశక్తితో నీటిని బయటికి విరజిమ్ముతుంది. గొట్టపుఆకారంలో వేడినీరు, ఆవిరి ఆకాశంలోకి చిమ్ముతుంది. నాళంలో వున్న వంకరలవల్ల ఇటువంటివి సంభవిస్తాయి. ఈ వక్ర స్వభావం వల్ల నాళంలోని నీటిలో ఉష్ణసంవహనకార్యం జరగడానికి వీలుపడక కింది భాగాలు ఎక్కువ వేడెక్కినప్పటికీ ఆ నీరువైకిరాదు. అట్లా ఉష్ణసంవహనం జరిగినట్లైతే ఉష్ణద్రవ నిర్జరాలకు బదులుగా ఉష్ణస్రోతస్సులు ఏర్పడి వుండేవి.

ఖనిజ సమన్విత స్రోతస్సులు(mineral springs): భూగర్భజలాల ప్రసారంలో కొన్ని అనువైన చోట్ల ఖనిజలవణాలను తమలో కరిగించుకొంటాయి. ద్రావణం (solution) ముఖ్యంగా నీటివేడిమీద, పీడనశక్తిమీద, వాటిలో కరిగి వున్న వాయువుల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఆ విధంగా లవణాలను కరిగించుకొన్న జలాలు కొన్ని చోట్ల భూమి ఉపరితలం మీదకు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఖనిజ సమన్విత స్రోతస్సులు అంటారు. వీటిలో వేడి నీరుగాని, చల్లటి నీరుగాని వుండవచ్చు. వీటిలో సామాన్యంగా కేల్సైట్ (calcite), డోలమైట్ (dolomite), జిప్సమ్ (gypsum) అనే ఖనిజాలుంటాయి. ఈ నీటిలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ మొదలైన వాయువులు కూడా కరిగి వుంటాయి. ఈ బుగ్గలలో కొన్ని ఆరోగ్యాన్ని సమకూర్చే కేంద్రాలుగా ప్రసిద్ధి కెక్కినాయి. మరి కొన్ని పుణ్యక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినాయి. వాటిలో ఎన్నదగినది కర్నూలు జిల్లాలోని నంద్యాల వద్ద వున్న మహానంది పుణ్యక్షేత్రం. బుగ్గ అనేది కూడా కర్నూలు జిల్లాలోని మరొక విశేషమైన విషయం.

ప్రపంచ వివిధప్రాంతాలలో ఉన్న సహజసిద్ధ ఉష్ణద్రవనిర్జరాలు, ఉష్ణస్రోతస్సులు భౌమోష్ణశక్తికి అనువైన మూలస్థావరాలని చెప్పవచ్చు. సహజసిద్ధమైన నీటిఆవిరి ఉపయోగించి విద్యుచ్ఛక్తిని ఉత్పాదన చేస్తారు. న్యూజిలాండ్, ఇటలీ, మెక్సికో, రష్యా, అమెరికా దేశాలలో భూగర్భం నుంచీలభించే అధిక ఉష్ణోగ్రతగల నీటి ఆవిరిని విద్యుచ్ఛక్తి ఉత్పాదనలో వాడతున్నారు. అమెరికాలో ప్రప్రథమ వాణిజ్యపరమైన భౌమోష్ణవిద్యుత్ ప్లాంట్ ను 1960 ప్రాంతంలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు ఉత్తరంగా ఉన్న ఉష్ణద్రవ నిర్జరాల వద్ద నిర్మించారు.

6.5 భూగర్భజలాల భౌమచర్య

భూగర్భజలాల భౌమ చర్యలలో మిక్కిలి విశిష్టమైన చర్య ద్రావణక్రియ (solution). నీరు భూమిలోకి ఇంకుతున్నప్పుడు ఖనిజాలను కొద్దిగానైనా కరిగించుకొంటుందని ఘుండే తెలుసుకొన్నాం. స్వచ్ఛమైన నీటికి ప్రూతం ఖనిజలవణాలను కరిగించుకొనేశక్తి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాని క్రమంగా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మొదలైన వాయువులనుగ్రహించడంవల్ల, మృత్తికలోని అంగారిక పదార్థాల సంపర్కంవల్ల నీరు తన ద్రావణక్రియను పెంచుకొంటుంది. భూమిలోపలకి పోయిన కొలది భూగర్భజలాలు వేడెక్కుతాయి. అందువల్ల వాటి ద్రావణిక క్రియ ఎక్కువవుతుంది. అటువంటి జలాల ద్రావణక్రియకు మొట్టమొదట లోబడేవి సున్నపురాళ్లు, జిప్సమ్. క్షారలవణపదార్థాలు గల రాళ్లు కూడా త్వరగా ఈ క్రియకు లోనవుతాయి.

భూగర్భపువైపారలలో ప్రసరించే జలాలు తాము కరిగించే లవణాలను కొన్ని సంధులు, విధాలు, బీటలు మొదలైన అనువైన స్థలాల్లో అవక్షేపించవచ్చు. లేదా బుగ్గల ద్వారా బయటికి తీసుకొనివచ్చి వాగులలోను, నదులలోను కలిపివేసి అంతిమ విశ్రాంతి స్థానమైన సముద్రానికి చేర్చవచ్చు. అందువల్ల భూమివై పారలను శిథిలపరచే భూచర్యలలో నదులకు ఈ భూగర్భజలాలు చాలా సహాయకారులుగా ఉంటాయి.

గుహలు (caves)

సున్నపు రాళ్లు పుష్కలంగా లభించే ప్రాంతాలలో భూగర్భజలాల ద్రావణీకచర్య ఫలితంగా భూగర్భ గుహలు (underground caves) ఏర్పడతాయి. భూగర్భజలాలు భూమిలోపల ఉన్న సున్నపురాళ్లను పెద్ద ఎత్తున కరిగించగా ఇవి ఏర్పడతాయి. వీటిలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందినవి అమెరికాలోని కెంటక్సీ (kentucky) రాష్ట్రంలో వుండే మేమత్ గుహలు (mammoth caves). ఈ గుహలు పదిలేక పదిపాను కిలో మీటర్ల దూరం వరకు వ్యాపించి వుంటాయి. వీటిలో క్లిష్టమైన మార్గాలు వుంటాయి. వీటి లోపలి మార్గం ఎగుడుదిగుడుగా గాలరీలవలె వుంటుంది. వాటిలో ఒక గాలరీ ఎంతో పెద్దదిగాను చూడటానికి వింతగాను, భయం కలిగించేదిగాను వుంటుంది. న్యూమెక్సికో రాష్ట్రంలోని కారల్స్ బాడ్ అనే గుహలు కూడా చెప్పుకోదగ్గవి.

ఇటువంటివి మన ఆంధ్రరాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నాయి. సున్నపురాళ్లు విస్తారంగా వుండే పల్నాడు, రాయలసీమ, విశాఖపట్నం ప్రాంతాలలో ఇటువంటి గుహలు ఉన్నాయి. ప్రఖ్యాతి చెందిన బొర్రాగు హలు (Borra caves) విశాఖపట్నం దగ్గర అనంతగిరి కొండలలో వున్నాయి. అనంతపురంజిల్లాలోని కాయలచెరువువద్ద వున్న కోనరామేశ్వరం గుహలు కూడా ప్రసిద్ధిచెందిన గుహలే.

గుహలతో కూడిన సున్నపురాళ్ల ప్రదేశాలలో ద్రావణీకక్రియకూడా చాలా త్వరగా జరుగుతుంది. కొన్నిచోట్ల ఈ గుహలు వైకష్ట్య దాని బరువువల్ల కూలిపోతుంది. అప్పుడే గుంటవలె పెద్ద గొయ్యి ఏర్పడుతుంది. దీనినే నిమజ్జనకృత రంధ్రం (Sink Hole) అని పిలుస్తారు. ఇది పైన ప్రవహించే నీటి క్రియవల్ల కూడా ఏర్పడి ఉండవచ్చు. అట్లా వైకష్ట్యకూలినప్పుడు కొనిచోట్ల కష్ట పూర్తిగా పడిపోకుండా కొంత భాగం మిగిలితే చూడడానికి వింతగానే సహజవారధి (Natural bridge) గా ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటిదే వర్జీనియా రాష్ట్రంలో (U S A) ఉంది. ఇటువంటి వంతెనలు ఇతర కారణాలవల్లకూడా ఏర్పడవచ్చు. ముఖ్యంగా వంకరగా ప్రవహించే నదులున్న ప్రదేశాలు పునర్జీవనం పొందిన చోట్ల కనబడతాయి. వాటిలో ప్రఖ్యాతి చెందినది రెయిన్ బో (Rainbow bridge) వంతెన. ఇది అమెరికాలోని ఊటా (Utah) రాష్ట్రంలో ఉంది.

కార్స్ స్థలాకృతి (Karst Topography) : సున్నపురాళ్లు విస్తారంగా లభ్యమయ్యే ప్రాంతాలలో గుహలు, నిమజ్జిత రంధ్రాలు అపరిమితంగా వుంటే అక్కడ స్థలాకృతి చూడడానికి వింతగా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా చిన్నచిన్న గుంటలు, గోతులు ఏర్పడి వుంటాయి. అందువల్ల అక్కడ నదులు, వాగులు పున్నట్లుండి మాయమయి, తిరిగి బుగ్గలద్వారా ఒరుటికి వస్తాయి. ఇటువంటి విపరీత స్థలాకృతిని మొట్టమొదట యుగోస్లావియా దేశంలోని కార్న్ స్ట ప్రాంతంలో కనుగొన్నారు. కాబట్టి ఆ పేరు దానికి స్థిరపడిపోయింది.

భూగర్భ జల నిక్షేపాలు (ground water deposit) : భూగర్భజలాలవల్ల కరిగే ఖనిజలవణాలలో అతి ముఖ్యమైనవి కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ కార్బోనేట్ లు, కొల్లాయిడ్ లు, సిలికా మొదలైనవి ఆ జలాలలో చేరతాయి. సున్నపురాళ్లన్న ప్రదేశాలలో కాల్షియం బై కార్బనేట్ చేరుతుంది. భూగర్భజలాల ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా అధ్విభూత శిలలలోని రేణువుల మధ్య సన్నటి పొరగా వుండి, ఆ రేణువుల మేళన (Cementing)చర్యకు పనికి వస్తాయి. కేల్సైట్, సిలికా, ఇనుప లవణాలు వంటి మేళనపదార్థాలు ముఖ్యమైనవి. అధ్విభూతంగా ఉన్న స్తరాలు, అవక్షేపాలు (sediments) వీటి సాయంతో దృఢీభూతమై కఠినమైనశిలలుగా మార్పు చెందుతాయి.


భూగర్భజలాల అంతఃస్రవణం వల్ల రాళ్లలోవున్న కొన్ని లవణాలు కరిగిపోయి వాటిస్థానంలో ఇతర లవణాలు ప్రతిక్షేపణం (replacement) చెందవచ్చు. ఈ ప్రక్రియనే రసాయనప్రతిస్థాపన (metasomatism) అంటారు. అంతర్జలాలలో కలిసివున్న ఖనిజ లవణాలు సాంద్రీకరణం ఎక్కువవడం వల్ల అవి స్రవించే మార్గంలోని శిలల ఖనిజాలను తాము మోసుకొనివచ్చిన ఖనిజాలతో అణువుకు అణువును ప్రతిస్థాపన చేస్తాయి. అయితే ఇవి ఆక్రమించిన శిలల అణునిర్మాణం ఎటువంటి మార్పు చెందదు. ఈ రసాయన ప్రతిస్థాపనకు విల్క్షణమైన ఉదాహరణలు సున్నపురాళ్లు ఎక్కువగా లభించే ప్రదేశాలలో కనిపిస్తాయి. కేల్సైట్ బదులుగా ఛోలమైట్ గాని చాల్ బైట్ (Chalybite) గాని ఏర్పడవచ్చు.

కొన్ని చోట్ల ఈ రసాయన ప్రతిస్థాపనవల్ల పురాజంతువృక్షవశేషాలు మార్పుచెందుతాయి. ఇట్లా శిలారూపం పొందే ప్రక్రియలు పాషాణీభవనం (petrification) అంటారు. దీనివల్ల పురాజీవయుగాలలో జీవించి విలువైన జంతువృక్షవశేషాలు శిలారూపాన్ని పొంది చూడడానికి వింతగా కనిపిస్తాయి, అతి సున్నితమైన సూక్ష్మ నిర్మాణరీతులు కూడా చెక్కుచెదరకుండా భద్రమయి ఉండడం ఈ ప్రక్రియలోని ప్రత్యేకత. అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రంలోని అరిజోనా రాష్ట్రంలో పాషాణీభవనం చెందిన ఆరణ్యాన్ని గొప్ప ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు. భారతదేశంలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని సాత్రనూర్ గొప్ప ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు. ఇక్కడ ఇటువంటి పాషాణీభవనం చెందిన ఆరణ్యముందని ప్రఖ్యాత శాస్త్రజ్ఞుడు ఫ్రాంసెస్ ఎమ్. ఎస్. కృష్ణన్ కనుగొన్నారు.

అసక్షేపశిలలలో అక్కడక్కడ కనిపించే పర్వకలు (Nodules), సంగ్రధనాలు (Concretions) భూగర్భజలాలవల్ల నిక్షేపణం చెందిన మరికొన్ని ముఖ్య పదార్థాలు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో వృక్ష, జంతు అవశేషాలు లేదా చిన్న గులకరాతి ముక్కల చుట్టూ కొన్ని పదార్థాలు రసాయనికంగా అవపాతం చెందినప్పుడు ఈ పర్వకలు ఏర్పడతాయి. ఈ అవపాతం ఒకసారి జరిగినా మళ్ళీమళ్ళీ జరుగుతుంది. కాబట్టి కొంతకాలానికి ఏకకేంద్రపు పొరలు (concentric layers) ఏర్పడతాయి. పొరగమ్య శిలల్లో ఇటువంటివి మనకు కనబడతాయి. నేల బొగ్గుపొరలలో పసుపుపచ్చకాంతి స్థితికాలు కనబడతాయి. అవి మార్కసైట్ (Marcasite) ఖనిజ జాతికి సంబంధించినవి. సాధారణంగా ఇటువంటి పర్వకలు సంగ్రధనాలు క్వార్ట్జ్, జిప్సమ్, బెరైట్, కాల్షియమ్ పాస్ఫేట్ లతో నిర్మితమై వుంటాయి.

శిలల్లో అక్కడక్కడ వుండే కన్నాలు, కంటలు ఒకప్పుడు ఇతర ఖనిజాలతో వుంటాయి. ఆ గుండ్రటి కన్నాలలోపల భూగర్భజలాలతో నిక్షేపం చెందడంవల్ల స్థితికరూపంలో ఏర్పడివుంటాయి. ఇటువంటివాటిని జియోడ్ (Geodes)లు అని పిలుస్తారు. వర్షపాతం చాలాకొద్దిగా వుండే ప్రాంతాలలో కేశాకర్షణశక్తి ప్రభావం వల్ల భూగర్భంలోని సున్నంతో కలిసి నీరు పైకివస్తుంది. అది ఉపరితలంమీదగాని కొద్దిగా కిందగాని దీని సహజ వేడివల్ల ఆవిరిఅయిపోతుంది. అప్పుడు సున్నపురాతితో కూడిన ఒక నిక్షేపం ఏర్పడుతుంది. దీనినే కంకర్ (Kankar) అంటారు. ఆ విధంగానే సుద్ద (Chalk) ఎక్కువగా దొరకే ప్రదేశాలలో ఫ్లింట్ (flint) పర్వకలు కలిసి ఉంటాయి. సున్నపురాళ్ళలో చెర్ట్ (Chert) సంగ్రధనాలు కలిసివుంటాయి. కాని వీటన్నిటినీ మించి చెప్పకోతగ్గ నిక్షేపాలు మనకు భూగర్భగుహలు, పర్వతగుహలలో కనిపిస్తాయి.

గుహాంతర నిక్షేపాలు (Cave deposits) : సున్నపురాళ్ళు విస్తారంగా లభించే ప్రాంతాలలో భూమి అంతర్భాగంలో గుహలు ఏర్పడతాయని తెలుసుకొన్నాం. గుహలలో చిన్న కాలువలు, ఏరులు ప్రవ



పటం 13 స్టాలక్టైట్, స్టాలక్టయిట్లు

హిస్ట్రోటామిని మనకు తెలుసు. అంతేకాకుండా భూగర్భజలం గుహలపై కప్పలనుంచి నెమ్మదిగా బొట్టుబొట్టుగా క్రిందికి ప్రవహిస్తుంది. ఈ జలాలలో అప్పటికే సున్నపు రాళ్ళలో చాలా శాతం కరిగి వుంటుంది. బొట్టుబొట్టుగా నీరు జారుతున్నప్పుడు దానిలోకరిగివున్న సున్నపురాళ్ళ కొంతభాగం పైకప్పుభాగంలో ఆవపాతనం చెందుతుంది.

ప్రవించిన నీటిలోని కేల్షియమ్ కార్బోనేట్ బొట్టుకింద పడినప్పుడు కూడా కొంత నిక్షేపం చెందుతుంది. కొంతకాలానికి పైభాగం నుంచి స్టాలక్ టైట్ లు (Stalactites), కిందినుంచి స్టాలగ్ మైట్ లు (Stalagmites) లు అనే స్తంభాకృత కార్షియమ్ కార్బోనేట్ నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి చూడడానికి చాలా వింతగాఉంటాయి. కొన్నిచోట్ల ఎవరో వీటిని చెక్కినట్లుగా అద్భుతరూపాలను పొంది ఉంటాయి. విశాఖపట్నం, విజయనగరం పట్టణాల సమీపంలో అనంతగిరి కొండల బొర్రగుహలలో ఇటువంటి అద్భుతాలను మనం చూడవచ్చు (చటం 13).

నీటిబుగ్గ నిక్షేపాలు (Spring deposits) : భూగర్భంలో కొంతదూరం పయనిస్తూ ఖనిజలవణాలను సేకరించుకొంటు వస్తున్న జలాలు కొన్ని అనువైన చోట్ల నీటిబుగ్గల రూపంలో బయటికి వస్తాయి. బయటికి వచ్చినచోట్ల కొంత ఖనిజ భాగాన్ని అక్కడ నిక్షేపిస్తాయి. భూగర్భంలోంచి ఉపరితలంమీదకు వస్తున్నప్పుడు సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రత పెరిగి పీడనశక్తి తగ్గుతుంది. అందువల్ల కార్బనడై ఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుంది. దానివల్లే అక్కడ ఖనిజ నిక్షేపణ జరుగుతుంది. చల్లని నీటిని వెలువరించే బుగ్గలచుట్టు సున్నపురాతి నిక్షేపాలు కనిపిస్తాయి. ఈ నిక్షేపాలను సాధారణంగా బ్రావర్టైన్ (Travertine) అని పిలుస్తారు. అట్లాగాకుండా పారగమ్యంగా వుండి టుఫ్ (Tuff) ఆకారంలో కంతలలో నిండి వుండే నిక్షేపాలను సున్నపు టుఫా (Calcareous tuffa) అంటారు. పెద్ద పెద్ద ఉష్ణజల ప్రోతస్సుల వద్ద విలక్షణమైన బ్రావర్టైన్ నిక్షేపాలు విస్తారంగా కనబడతాయి. అమెరికాలోని మేమత్ గుహలవద్ద ఇటువంటివి కోకోల్లలు. అక్కడే కొన్నిచోట్ల ముఖ్యంగా ఉష్ణద్రవ నిర్ధారాల వద్ద సిలికా నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి. వాటినే గెయిసరైట్ లు (geyserites) అని పిలుస్తారు.

కొన్నిచోట్ల ఖనిజలవణాలతో కూడిన భూగర్భజలాలు రాళ్ల విడరాల, బీటల సందులలో ప్రసరించే వాటి గోడలపైన ఖనిజాలను స్థిరీకరూపంలో నిక్షేపించే వాటిని ఖనిజసిరలు (mineral veins) గా మారుస్తాయి. ఇటువంటి నిక్షేపాలు చాలా వేడిగా వుండే మాగ్మాసంబంధ జలాలు తమ ఉష్ణాన్ని కొంతవరకు పోగొట్టుకొంటాయి. అందువల్ల అవపాతనం జరుగుతుంది. వేడి తక్కువగా వుండే లేదా చల్లని భూగర్భజలాల వల్ల నిక్షేపణ చెందిన వాటిలో ముఖ్యమైనవిక్వార్ట్జ్, కేల్సైట్ ఖనిజాలు. కొన్ని సమయాలలో పైరైట్ స (Pyrite) గా కూడా ఏర్పడవచ్చు.

మీ అవహానను పరీక్షించుకోండి.

10. నిమజ్జనకృత రంధ్రాలు అంటే ఏమిటి?

.....
.....
.....

11. కార్ప్స్ స్ట్రాక్చర్ లో ముఖ్యమైన రూపు రేఖలు

(అ) గుహలు (ఆ) నిమజ్జనకృత రంధ్రాలు (ఇ) స్టాలక్ టైట్ లు

.....
.....
.....

12. గుహల పైకప్పులనుంచి క్రిందికి వేలాడే కార్నియమ్ కార్బనేట్ నిక్షేపాలు

(అ) స్టాలక్టైట్లు (ఆ) స్టాలగ్ మైట్లు (ఇ) బ్రావర్ట్లయిన్

.....

.....

.....

.....

13. గుహలు నేలపై ఏర్పడి పైకిపెరిగే కార్నియంకార్బనేట్ నిక్షేపాలు

(అ) స్టాలక్టైట్లు (ఆ) స్టాలగ్ మైట్లు (ఇ) బ్రావర్ట్లయిన్

.....

.....

.....

.....

6.6 భూగర్భజల ఉపయోగాలు

ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలలో ప్రజలు తమ నిత్యావసరాలకు వాడుకోడానికి భూగర్భజలాల మీదనే ఆధారపడుతున్నారు. నదులు, సరస్సులు దూరంగావున్న పట్టణాలకు, నగరాలకు కావలసిన నీటి సదుపాయాలు భూగర్భజలాలనుంచే లభిస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో భారీ సరఫరా కావలసిన పరిశ్రమలకు కూడా భూగర్భజలాల మీద ఆధారపడక తప్పదు. పల్లెప్రాంతాలలో వ్యవసాయానికి కావలసిన సాధారణమైన బావులు, గొట్టపు బావుల ద్వారా భూగర్భజలాలను వినియోగిస్తున్నారు. నేలబొగ్గు, పెట్రోలియం, ఇనుము, యురేనియంవంటి ఖనిజాలలాకాక భూగర్భజలాన్ని తీసినకొద్దీ ఊరుతూ వుంటుంది. భూగర్భజలసంపదను తరగని పెన్నిధిగా చెప్పుకోవచ్చు. నీరు వాడుకొంటున్న కొద్దీ తిరిగి అంతఃస్రవణం ద్వారా ఉపరితలంనుంచి భూగర్భంలోకి చేరుకొంటుంది. తగుపాళ్లలో భూగర్భజలాలనుపయోగిస్తుంటే సంవత్సరాలతరబడి వాటిమీద ఆధారపడి వ్యవసాయాన్ని, పరిశ్రమలను నడపవచ్చు.

భూగర్భంలో ఇటువంటి అపార జలనిధులు ఉన్నవని గ్రహించినా ఇప్పటివరకే వీటిని గురించి బాగా పరిశోధించి పరిమాణాన్ని నిర్ధారించి ఉపయోగంలోనికి తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా మంచి జలమయస్తరల ఉనికిని గుర్తించడానికి భూవిజ్ఞాన, భుభౌతిక పరిశోధనలు అవసరం. శిలల సచ్చిద్రత, పారగమ్యత పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి. శిలల నిర్మాణరీతులను అధ్యయనం చేయాలి. శిలల సంధులు, విడదాలు, బీటలు మొదలైనవాటిని గురించి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే అక్కడ బాగా ఉపయోగకరమైన బోరు, గొట్టపుబావుల నిర్మాణం జరగటానికి వీలుకలుగుతుంది. సామాజిక ఆర్థిక పురోగతికి, అభ్యున్నతికి పనికివచ్చే వాటిలో భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఈ విధంగా చాలా అవసరమవుతుంది. నేడు ప్రతి రాష్ట్రంలో భూగర్భజల విజ్ఞానశాఖలు ఉన్నాయి.

6.7 సారాంశం

ఈ భాగంలో భూగర్భజలాల ఉనికి, చర్యలను గురించి చర్చించడం జరిగింది. భూగర్భజలతలం, సచ్చిద్రత, పారగమ్యత వంటి మౌలిక అంశాలను వివరించాం. జలమయస్తరలు, జలనిరోధకస్తరలు గురించి ప్రస్తావించాం. స్రోతస్సులలోని రకాలు, బావుల గురించి ప్రధానంగా చెప్పాం.

6.8 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి- మాదిరి సమాధానాలు.

1. భూఉపరితలంపై పడే నీరు శిలలోని చిద్రాలు, భగ్నాలు ద్వారా ఒక అప్రవేశయోగ్య మైన శిలాస్తరం దానిని అడ్డగించే వరకు నెమ్మదిగా క్రిందికి కదులుతూ ఉంటుంది. భూగర్భ జలానికి మూలాలు మూడు. అవి (1) వర్షపునీరు, (2) అవక్షేపశిలలలోని రేణువుల మధ్య అవక్షేపణ కాలంలో చేరి ఉన్న శిలాస్థజలం, (3) మాగ్మా నుంచి లభించే జువైనైల్ జలం. భూగర్భ జలం ఉనికి దృష్ట్యా ఉపరితలానికి క్రింద ఉన్న శిలారాశులను రెండు మండలాలు గా విభజింపవచ్చు. అవి (1) పైన ఉండే వాయుప్రసారిత మండలం, (2) క్రింద ఉండే సంతృప్తమండలం. పైన ఉండే మండలం ద్వారా నీరు క్రిందికి దిగుతుంది. దీనిలోని చిద్రాలు గాలితో నిండి ఉంటాయి. ఈ మండలంలో అక్కడక్కడ ఉండే నీటిని వాడోక్ట్ జలం (సంచరించే జలం) అంటారు. నీరు చేరే క్రింది మండలాన్ని సంతృప్తమండలం అంటారు. ఈ మండలంలోని నీటిని భూగర్భజలం అంటారు. సంతృప్తమండలం ఎగువ తలాన్ని భూగర్భజలతలం అంటారు. భూగర్భజలతలం ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి, ఒక కాలంనుంచి మరొక కాలానికి మారుతూ ఉంటుంది.

వాయుప్రసారిత మండలంలోని నీటికి కొంతవరకు చెల్లు గ్రహిస్తాయి. వీటి నుంచి తిరిగి కొంత నీరు బాష్పోత్సేకం వల్ల వాతావరణంలోకి చేరుతుంది. భూగర్భజలం ప్రోతస్ఫుట వంటి సహజసిద్ధమైన మార్గాల ద్వారా, కేశనాళికా చర్యవల్ల తిరిగి ఉపరితలానికి చేరుతుంది.

2. భూగర్భజలతలం
3. వాయుప్రసారిత మండలం.
4. సంతృప్త మండలం.
5. శిలలో ఉండే ఖాళీ స్థలాన్ని సచ్చిద్రత అంటారు. దీనిని కొంత ఘనపరిమాణంకల శిలలో ఉండే ఖాళీ స్థలం శాతంగా సూచిస్తారు. సచ్చిద్రతశిలారీతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
6. ఒక శిల లేదా మృత్తిక ద్వారా ద్రవం లేదా వాయువుల ప్రసారం కావడానికి ఉండే అనుకూలతను పాఠగమ్యత అంటారు. ఇది శిల లేదా మృత్తిక (మాధ్యమం) టెక్స్చర్ కే కాని, ఇది ద్రవం లేదా వాయువు టెక్స్చరాలకు సంబంధించినది కాదు.
7. జలమయస్థర
8. జలనిరోధకస్థర
9. ప్రోతస్ఫుట
10. కార్స్ట్ స్థలాకృతి ఉన్న ప్రాంతంలో ఒక గుహను ఉపరితలంతో కలిపే గుండ్రని గోతిని నిమజ్జనకృత రంధ్రం అంటారు. ఇవి గరాటు ఆకారంలో కాని, క్రమరహితంగా కాని ఉండవచ్చు
11. నిమజ్జనకృతరంధ్రాలు
12. స్టాలక్ టైట్లు
13. స్టాలగ్ మైట్లు

6.9 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

1. కింది ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి

1. భూగర్భ జలాల భౌమ చర్యను వర్ణించండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి

1. భూగర్భజలానికి మూలాలు ఏవి?
2. సచ్చిద్రతకు, పారగమ్యతకు భేదాలేవి?
3. సున్నపురాతి గుహలు ఎట్లా ఏర్పడతాయి?
4. ట్రాన్సెర్షయిన్ అంటే ఏమిటి?
5. ఆర్టిసియన్ బావులు అంటే ఏమిటి?

6.10 పదకోశం

Aquiclude ప్రసార నిరోధక జలమండలం	: ఎక్విక్లూడ్-ఒక శిలోదకం. సరంధ్రత కలిగి ఉంటుంది కానీ నీటిని చోరనియ్యదు. నీటి ప్రసారాన్ని నిరోధిస్తుంది.
Aquifer జలధారశిల	: శిల లేదా శిలాస్తర నీటిని చోరనిస్తుంది. నీటిని నిలుపుకోగలుగుతుంది. అంతేకాదు చక్కటి సరంధ్రత, పారగమ్యత కలిగి వుంటుంది.
Artesian well ఆర్టిసియన్ బావి	: తవ్వినబావిలో నీరు హైడ్రాలిక్ శక్తి ద్వారా చుట్టు ఉండే నీటిమట్టాన్ని కంటే కూడా పైకి వస్తుంది. ఉపరితలంపైకి కూడా వచ్చే అవకాశముంది.
Cone of depression శంక్వాకార తలం	: బావిలో నీటిని త్వరితగతిన తోడినప్పుడు బావి ప్రారంభంలో కనిపించే తరిగిన నీటిమట్టపు శంక్వాకార తత్వం.
Connate water శిలస్థజలం	: నీరు ఇంకుతున్నప్పుడు అవక్షేపాలలో 'శిలాస్థ జలంగా' చేరడం.
Effluent Stream భూగర్భజలాధార	: కాలువ నది-భూగర్భజలాలనుంచి నీటిని పొందడం.
Geyser నీటిబుగ్గ	: వేడినీటిని, ఆవిరిని ఎగజిమ్మే బుగ్గల వంటివి.
Ground water భూగర్భజలం	: నేల అడుగుపొరలలో "సంతృప్తమండలాన్ని" ఆవరించుకున్న నీరు గురుత్వాకర్షణశక్తి ప్రభావంతో ప్రవహిస్తుంది.
Hot spring వేడినీటి బుగ్గ	: వేడినీటిని మరుగుతున్న స్థాయిలో వెలువరించే బుగ్గలు, సాధారణంగా లోతులో అగ్నిశిల ఇంబ్రూజన్ తో సంబంధించి వుంటాయి.
Influent stream అంతర్వాహిని	: కాలువ, నదుల్లోంచి నీరు భూగర్భజలాల్లోకి తిరిగి వెళ్ళడం.
Juvenile జవనైలు	: భూమి అడుగున మాగ్మా సోర్సు కారణంగా వాయు, జలాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించేపదం.
Karst topography కార్స్ స్థలాకృతి	: భూగర్భజలాల ప్రభావంతో ఏర్పడే స్థలాకృతి శాఖాయుతరూపం అస్తవ్యస్తంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా సున్నపురాతి ప్రదేశాలలో ఇటువంటి స్థలాకృతి ఏర్పడుతుంది.

Permeability
చోరనిచ్చేగుణం
(పారగమ్యత)

: పత్తిడి తేడాల్లో శిలాస్తరాలలో భూగర్భజలాల కదలికలో సాపేక్షతను వివరించే ధర్మం.

Porosity
సరంధ్రత

: ఏదేని ఒక శిలలో ఉండే మొత్తం సరంధ్రత.

Runoff
ప్రవాహరయం

: భూఖండాలనుండి సముద్రానికి నీరు కాలువలు, నదులు ద్వారా, భూగర్భజలాల రూపంలో ప్రవహించడం.

Stalagmite
స్టాలగ్మైటు

: కాల్షియం కార్బోనేటు నిక్షేపాలు సున్నపురాతి కందరాలలో పెద్ద ఎత్తున ఉన్నప్పుడు చెప్పడానికి వాడేపదం. ప్రత్యేకించి స్పాల్క్ సైట్ పైకి ఉదికి రావడాన్ని సూచిస్తుంది.

Vadose water
వాడోక్ జలం

: భూగర్భ నీటిమట్టం, భూఉపరితలానికి మధ్య ఉండే నీరు.

Water table
జలమట్టం

: భూగర్భజలమట్టం, సంతృప్తమండలం ఉపరితలం.

Zone of aeration
వాయుప్రసారిత మండలం

: ఆధారశిలలో ఖాళీలు గాలితో నిండి వుండటం. ఈ ఖాళీలలో నీరుఉంటే క్రొద్దిగానో లేకపోతే అసలే ఉండదు.

Zone of saturation
సంతృప్తమండలం

: భూమి అడుగుపొరల్లో సరంధ్ర ప్రదేశాలన్నీ పూర్తిగా నీటితో నిండివుండటం.

Dr. BRAOU
LIBRARY

Acc. No: CM-0403
Class No: 551

శివకుమార్
జూలై 2018

భాగం-7 : హిమానీనదాలు, హిమానీనదనం

పాఠ్యాంశాలు

- 7.0 అక్ష్యాలు
- 7.1 పరిచయం
- 7.2 జలచక్రం
- 7.3 హిమానీనదాల వర్గీకరణ
 - 7.3.1 గర్తహిమానీనదాలు
 - 7.3.2 లోయహిమానీనదాలు
 - 7.3.3 పీడ్ మాంట్ హిమానీనదాలు
 - 7.3.4 హిమపటాలు
- 7.4 హిమానీనదాల చలనం
- 7.5 హిమానీనదాల రూపురేఖలు
 - 7.5.1 హిమానీనదాల ద్రవీభవనం
- 7.6 హిమానీనదనం లేదా హిమానీనదాల భౌమచర్య
 - 7.6.1 హిమానీనద క్రమక్షయం
 - 7.6.2 హిమానీనద రవాణా
 - 7.6.3 హిమానీనద నిక్షేపణ
- 7.7 నిమ్నోన్నతాలపైన, పరివాహంపైన హిమానీనదనం ప్రభావం
- 7.8 ప్రస్తుతపు హిమానీనదాలు
- 7.9 హిమానీనదనానికి కారణాలు
 - 7.9.1 ఉష్ణవితరణ సిద్ధాంతం
 - 7.9.2 సౌరవికిరణ సిద్ధాంతం
 - 7.9.3 సౌర స్థలాకృతి సిద్ధాంతం
- 7.10 సారాంశం
- 7.11 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు
- 7.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

7.0 అక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో హిమానీనదాలు ఏర్పడటం, వాటి రూపురేఖలు, హిమానీనదనం, హిమయుగాల గురించి చెప్పటం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యే సరికి మీకు కింది విషయాలు అవగాహనకువస్తాయి.

- హిమానీనదాలు, అవి ఏర్పడే విధానం
- జలచక్రం
- హిమనీనదాలలోని రకాలు
- హిమనీనదాల చలనం, వాటి రూపురేఖలు

- హిమానీనదాల భౌమచర్య, ప్రభావం
- హిమానీనదనానికి కారణాలు
- మహాహిమయుగాలు

7.1 పరిచయం

ప్రధానంగా పునఃస్థటికీకరణ చెందిన హిమంతోవర్షడి భూఉపరితలం మీద నది మాదిరిగా ప్రవహించే మంచురాశిని హిమనదనం అంటారు. అత్యున్నత స్థలాలు, ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో మంచు కురవడం అతి సామాన్యంగా జరుగుతుంది. ఇటువంటి ప్రాంతాలలో సగటు సాంవత్సరిక ఉష్ణోగ్రత నీటి ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రతకు దగ్గరగా ఉన్న చోట్లు మంచులో చాలా భాగం ఒక సంవత్సరం నుంచి మరొక సంవత్సరానికి కరగకుండా ఎంతో మందమైన పొరలుగా పేరుకొని హిమక్షేత్రాలను రూపొందిస్తుంది. ఈ విధంగా అవిచ్ఛిన్నంగా పోగువడే మంచురాశి దిగువ మట్టాన్ని హిమరేఖ (Snow line) అంటారు. ఈ మట్టం ధ్రువ ప్రాంతాలలో సముద్రమట్టం నుంచి సమశీతోష్ణ మండలాలలో పర్యంత ప్రాంతాలలో సుమారు 20, 000 అడుగుల వరకు ఉండవచ్చు.

హిమం సాధారణంగా పెచ్చులరూపంలో అనార్థంగా ఉంటుంది. కాని అది హిమక్షేత్రాలలో పోగువడేకొద్దీ, దట్టంగా అయి, పాక్షికంగా కరిగి మళ్ళీ ఘనీభవించడంవల్ల రేణుమయరూపాన్ని పొందు తుంది. దానిని నేవే (Nevé) అంటారు. హిమస్థటికాలు అడుగుకుపోయి దట్టంగా మారేటప్పుడు నాటి మధ్య ఉండే గాలి బయటకు పోతుంది. కరిగే మంచునుంచి వచ్చేనీరు ఈ స్థటికాల మధ్యచేరి ఘనీభవించడంవల్ల మందంగా లోతుగా ఉన్న మంచుపొరలు దట్టమైన హిమంగా మారతాయి. అప్పటికి ఇది ఇంకా సచ్చిద్రంగానే ఉంటుంది.

హిమపాతాలు దీర్ఘకాలం అవిచ్ఛిన్నంగా సంభవించడంవల్ల హిమక్షేత్రపరిమాణం, లోతు పెరిగి, బాగా అడుగున ఉన్న మంచు మీద పీడనం అధికం కావడంవల్ల ఆ మంచు హిమానీనదనం (Glacier) రూపంలో బయటకు ప్రవహిస్తుంది. హిమం బలహీనమైన ఘన పదార్థం. దీని మందం 200 నుంచి 300 అడుగుల వరకు ఉన్నప్పుడు దాని బరువు కారణంగానే దృఢత్వాన్ని కోల్పోయి బయటకు, కిందకి ప్రవహిస్తూ విరూపణ పొందుతుంది. ఇట్లా ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ దానికి ఇంకా ఘనరూపమే ఉంటుంది. ఒక హిమరాశి ఈ విధంగా ప్రవహించడానికి తగినంత మందమెక్కినప్పుడు అది హిమానీనదనం అవుతుంది.

లోయల శీర్షభాగాలలో ఉద్భవించే హిమానీనదాలు జిహ్వల వంటి హిమప్రవాహాలుగా కిందవైపుకు జారతాయి. నెవెక్షేత్రాలు ప్రతి సంవత్సరం కొత్త మంచుతో నిండుతూ ఉండటంవల్ల ప్రవాహం అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. చిట్ట చివరకు హిమనీనదనాలు కరగడంవల్ల, బాష్పీభవనంవల్ల క్షీణించిపోతాయి. హిమానీనదాలు పరిమాణంలో ఎంతో వైవిధ్యం చూపుతాయి. ఇవి ఇరుకైన క్లిఫ్ లలో ఉండే పొట్టి, నెడలైన హిమ జిహ్వలు మొదలుకొని ఆల్ప్స్, హిమాలయా మొదలైన పర్వతాలపైనుంచి లోయలలోకి విస్తరించి ఉండే హిమ జిహ్వల వరకు ఉంటాయి. ఈ హిమానీనదాలు స్నిగ్ధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాయి. అందువల్ల అవి లోయలను లోతులవరకు ఆక్రమించి ఉంటాయి. హిమానీనదాలు నేలపై ప్రవహించి సముద్ర జలాలలో బాగాలోతుగా అంతమైనప్పుడు హిమం నీటిపై తేలుతుంది, హిమానీనదం నుంచి పెద్దరాశులు విడిపోయి, హిమఖండాలు ఏర్పడతాయి.

మీ ఆవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. 'హిమానీనదనం' అనే పదాన్ని నిర్వచించండి

.....

.....

.....

7.2 జలచక్రం, హిమానీనదాలు

భూఉపరితలంపైన, లోపల ఉన్న నీరు అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఈ నీరు సముద్రంనుంచి వాతావరణంలోకిచేరి అక్కడనుంచి భూమిమీద ఆవహతంచేంది సదులు, అంతర్భూమి ప్రవాహాలద్వారా తిరిగి సముద్రాన్ని చేరుతుంది. అయితే ఎక్కువ ఉన్నతులలో లేదా అధిక ఆక్షాంశాలలో ఆవహతం జరిగినప్పుడు నీరు వెంటనే ప్రవహించదు. భూమిలోకి ఇంకిపోదు. అది ఒక పెద్ద కదిలే హిమరాశి అంటే హిమానీనదంలోకి చేరి దానిలో ఒక భాగంగా మారవచ్చు. హిమం చివరకు కరిగి సముద్రం వైపుకు ప్రయాణం సాగించినా అది కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల మేరకు హిమానీనదంలో ఉండిపోవచ్చు. ఉదాహరణకు గ్రీన్ లాండ్ లోని హిమానీనదాల నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్నిబట్టి ఆక్కడ హిమంలో కొంతభాగం 25,000 సం. లకు మించి ఉన్నదని తెలుస్తున్నది.

7.3 హిమానీనదాల వర్గీకరణ

పరిమాణం, ఉనికి ఆధారంగా హిమానీనదాలను నాలుగు రకాలని గుర్తించవచ్చు. అవి -

- i) గర్తహిమానీనదాలు (Cirque glaciers)
- ii) లోయహిమానీనదాలు (Valley glaciers)
- iii) పీడ్ మాంట్ హిమానీనదాలు (Piedmont glaciers)
- iv) హిమపటాలు (ice sheets)

7.3.1 గర్తహిమానీనదాలు: ఇవి హిమగర్తాలను ఆక్రమించి గాని లేదా వాటి శీర్షకుడ్యాన్ని ఆనుకొనిగానీ ఉండే చిన్న హిమానీనదాలు.

7.3.2 లోయ హిమానీనదాలు: ఇవి లోయ వెంబడి కిందకి ప్రవహించే హిమానీనదాలు. చాలా వరకు ఇవి జలప్రవాహాల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తాయి. ఇవి ఆల్ప్స్ పర్వత ప్రాంతంలో అభిలాక్షణికంగా అభివృద్ధి చెంది ఉండటంవల్ల వీటిని ఆల్పైన్ హిమానీనదాలు (Alpine glaciers) అని కూడా అంటారు.

7.3.3 పీడ్ మాంట్ హిమానీనదాలు: ఇవి పర్వత పీఠాలవద్ద ఒకటి లేదా ఇంకా ఎక్కువ లోయ హిమానీనదాల కలయిక వల్ల రూపొందుతాయి. ఉదా: అలాస్కాలోని మలాస్పిన్ (Malaspin) హిమానీనదనం.

7.3.4 హిమపటాలు: ఇవి విశాలమైన భూఖండఉపరితలాన్ని కప్పేఉండే స్థూలహిమానీనదనాలు. వీటి ఆకారం క్రమరహితంగా ఉంటుంది. ఉదా: అంటార్క్టికా, గ్రీన్ లాండ్ లు హిమపటాలతో కప్పబడి ఉన్నాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

2. హిమానీనదాల వర్గీకరణను ఇచ్చి ఒక్కొక్క దానిని గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయండి

.....

.....

.....

.....

7.4 హిమానీనదాల చలనం

హిమానీనదాల చలన వేగం నదుల చలన వేగానికంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రోజుకు కొన్ని అడుగులకు మించి ఉండదు. ఆల్పైన్ హిమానీనదాలు రోజుకు నూరు అడుగుల వరకు కదుల్తున్నట్లు కదుల్తాయి. గ్రీన్ లాండ్ లోని కొన్ని హిమజీవ్యాలు రోజుకు నూరు అడుగుల వరకు కదుల్తున్నట్లు కనుగొన్నారు. హిమానీనదచలనం నదీ చలనాన్ని పోలి ఉంటుంది. లోయపక్కభాగాల నిరోధకతవల్ల ప్రవాహం పక్కలకంటే మధ్యలో ఎక్కువ వేగంగా కదులుతుంది. హిమంలోని అడుగు భాగాలకంటే ఉపరి భాగం వేగంగా కదులుతుంది. ప్రవాహమార్గంలో పంపులున్న చోట కుంభాకారభాగం పుటాకార భాగంకంటే వేగంగా కదుల్తుంది. ఈ విధంగా హిమంలో కొన్నిభాగాలు ఇతర భాగాలకంటే వేగంగా కదుల్తాయి. కాబట్టి హిమానీనదచలనాన్ని భేదాత్మక చలనం అంటారు.

హిమప్రవాహం రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది. హిమరాశిలో అంతర్ చలనంవల్ల జరిగేదొకటి. హిమరాశి అంతా భూతలం వెంబడి జారడం రెండవది. హిమానీనదాల అడుగు భాగాలుజారుడు ప్రక్రియవల్ల కదుల్తాయని భావిస్తారు. హిమానీనదాలు వాలువెంబడి ప్రధానంగా గురుత్వాకర్షణ ప్రభావంవల్ల కదుల్తాయి.

7.5 హిమానీనదాల రూపురేఖలు

పర్వత హిమానీనదాల శిర్షాలు లేదా వైఅంచుల వద్ద అగాధమైన కందకాలు ఉంటాయి. వీటిని హిమదరాలు (Bergschrund) అంటారు. హిమం ఇరుకైన లోయలోగుండా ప్రవహించేటప్పుడు మందం పెరగడంవల్ల గట్టిగా ఉన్నవైభాగం అలలవంటి రిడ్జులుగా రూపొందుతుంది. లోయ వెడల్పుగా ఉన్న చోట హిమం విస్తరించడంవల్ల దానిలో గర్తాలు ఏర్పడతాయి. హిమానీనదాలకు అడ్డంగా ఏర్పడేవి తిర్యక్ గర్తాలు, ప్రవాహాదిశకు సమాంతరంగా ఏర్పడేవి దైర్ఘ్యగర్తాలు. పార్శ్వాలలో 45° కోణంలో ఏర్పడేవి పార్శ్వగర్తాలు.

7.5.1 హిమానీనదాల ద్రవీభవనం: హిమరేఖకు దిగువన కనీసం వేసవి కాలంలోనైనా కొంత నీరు కనిపిస్తుంది. ఈ నీరు హిమానీనదం కరగడం వల్ల రూపొందుతుంది. ఇది హిమానీనదం ఉపరితలంమీద చిన్న గుండాలు, ప్రవాహాల రూపంలో ఉంటుంది. కొంత నీరు హిమానీనద అంతర్ భాగంలో ఏర్పడి పార్శ్వాల వెంబడి నీటి బుగ్గలుగా బయటకు వస్తుంది. సాధారణంగా హిమం కరగడం వల్ల ఏర్పడే నీరు హిమానీనదం అడుగుభాగంలో చేరి హిమప్రవాహ అంత్యభాగంలో బయటకు ప్రవహిస్తుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

3. ప్రవహించే హిమంలో ఏర్పడే కందకాలను పిలిచే విధానం.

7.6 హిమానీనదనం లేదా హిమానీనదాల భౌమచర్య

హిమానీనదనం (Glaciations):

హిమానీనదాల భౌమచర్య హిమానీనదన ప్రక్రియ ద్వారా విధితమౌతుంది. భూఉపరితలం మీద హిమానీనదం చలనంద్వారా వచ్చేమార్పులను హిమానీనదనం (glaciation) అంటారు. క్రయక్షయం, రవాణా, నిక్షేపణ అనే మూడు ప్రక్రియలు హిమానీనదనంలో ఉన్నాయి.

7.6.1 హిమానీనద క్రమక్రమం

హిమానీనదాలు భూభాగాన్ని రెండు విధాల క్రమక్రమం చేస్తాయి. నదీ క్రమక్రమం మూదిరిగానే హిమానీనద క్రమక్రమంలో కూడా అపమర్దణ, ఏరడం (Plucking) వంటి ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. వీటికి ముందుగా కొంత తుషారక్రియ (Frost action) జరిగి వుంటుంది. ప్రప్రథమంగా హిమానీనదం పగుళ్ళుబారిన ఆధారశిల ఉపరితలం మీద ప్రవహించినప్పుడు అది శిలాఖండాలను వదులు చేసి పైకెత్తి మంచులో ఇరికించుకొని ముందుకు తీసుకొనివెళ్తుంది. ఈ విధంగా ఆధారశిల నుండి శిలాఖండాలను పైకిలేపి తొలగించటాన్ని క్వారీయింగ్ (Quarrying) లేదా ఏరడం (Plucking) అంటారు. మంచుపడటం వల్ల పేరుకొన్న నీరు కిందనున్న శిలలోని పగుళ్ళలోనికి, సందులలోనికి చేరి ఘనీభవిస్తుంది. ఇట్లా ఘనీభవించినప్పుడు నీరు వ్యాకోచం చెందడంవల్ల పగుళ్ళు వెడల్పు శిల పగిలిపోతుంది. ఈ విధంగా వివిధ పరిమాణాల శిలాఖండాలు-సూక్ష్మరేణువులు మొదలుకొని స్థూల ఖండాల వరకు ఏర్పడతాయి.

క్రమక్రమంలో మరొక ప్రధాన ప్రక్రియ అపమర్దణ. హిమం, దానిలోని శిలాఖండభారం చలించేటప్పుడు అడుగునవున్న శిలాతలం మీద ఆకురాయివలె అపమర్దణ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా హిమానీనద ప్రక్రియ వల్ల రూపొందిన రాతిపొడిని శిలాచూర్ణం అంటారు. హిమంలో ఇవిడి ఉన్న శిలా ఖండాలు పెద్దవిగా ఉన్నప్పుడు శిలాతలమీద గీతలు, గొళ్ళు ఏర్పడతాయి. పొడవుగా ఏర్పడ్డ ఈ గీతలు, గొళ్ళు ఆ శిలలపైన చలించిన హిమానీనదం చలనదశను సూచిస్తాయి. అయితే అపమర్దణ జరిగినప్పుడల్లా గీతలు, గొళ్ళు ఏర్పడవు. అవక్షేపం ప్రధానంగా సూక్ష్మరేణువదారంతో కూడుకొని ఉన్నప్పుడు హిమానీనదం ప్రవహించిన శిలాతలాలు బాగా నునుపుగా తయారౌతాయి. గీతలు, గొళ్ళు హిమానీనదం దిశలు కచ్చితంగా తెలియచేయవలసిన అవసరం లేదు. హిమానీనదం ప్రవాహదశను అసౌష్ట్యంగా ఉన్న కొండలు, చిన్న బుడివెలు నుండి తెలుసుకోవచ్చు. సాధారణంగా రాతికొండ ఊర్వ ప్రవాహపార్శ్వం ప్రముఖంగా అపమర్దణచెంది గీతలను చూపుతూ అల్పనతితో ఉంటుంది. హిమానీనద క్రమక్రమం వల్ల, పీఠశిలపైన రూపొందే ఇటువంటి నిరోధకగుట్టలను, బుడివెలను రోషీమోటోనీలు (Roche motonues) అంటారు. ఇవి గొర్రెలు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఉండే ఆకారంలో ఉంటాయి. కాబట్టి వాటికి ఆ పేరు పెట్టినారు.

క్రాగ్ (Crag), టైల్ (Tail) కూడా హిమానీనద క్రమక్రమానికి నిదర్శనమే. క్రాగ్, టైల్-ఇవి హిమానీనద మార్గంలో కఠినశిలలనుంచి రూపొందుతాయి. ఇవి కలపచెక్కలలో ఉండే ముడుల మూదిరిగా ఉంటాయి. సాధారణంగా అపమర్దణను బాగా ఎదుర్కొంటాయి. వీటిని క్రాగ్ లు అంటారు. వీటి వెనుక తోకవలె ఉండే భాగంలో క్లే పేరుకొనిఉండడంవల్ల కొంచెంమందంగా ఉండి అపమర్దణకు గురికాదు. ఇది చాలా వరకు కొద్ది సతితోవాలిఉంటుంది. ఇటువంటి క్రాగ్, టైల్ లకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఉదాహరణ ఎడింబరో వద్ద ఉన్న కాజిల్ రాక్ (Castle Rock).

హిమగర్తాలు: (Cirques or corries) హిమానీనద క్రమక్రమంవల్ల ఏర్పడిన రూపురేఖలలో ఇవి అతి ముఖ్యమైనవి. ఇవి నిట్రమైన పార్శ్వాలతో అర్ధగచ్ఛద్రాకారంలో ఉండే హిమకుండాలు. వీటిని హిమగర్తాలు అంటారు. హిమక్షేత్రం అడుగుభాగాన హిమరేఖకు ఎగువన హిమగర్తం ఏర్పడడం మొదలౌతుంది. ఎండాకాలంలో మంచు కరగడంవల్ల వచ్చిన నీరు హిమక్షేత్రం అడుగున ఉన్న శిలల రంధ్రాలలోనికి చేరుతుంది. రాత్రి సమయంలో ఈ నీరు ఘనీభవించి వ్యాకోచం చెందడంవల్ల శిలాఖండాలు విడిపోతాయి. చిన్నచిన్న శిలారేణువులు నీటితోపాటు కొట్టుకొని పోతాయి. ఈ చర్యలవలన పీఠశిలలో గొయ్యి ఏర్పడి క్రమేణా వెద్దదౌతుంది. హిమక్షేత్రం వెరిగి హిమానీనదంగా మారినప్పుడు హిమగర్తం ఏర్పడి క్రమేణా వెద్దదౌతుంది. హిమక్షేత్రం వెరిగి హిమానీనదంగా మారినప్పుడు హిమగర్తం ఇంకా వెద్దదౌతుంది. హిమగర్తాలలో చాలా భాగం ప్రస్తుతం సరస్సులుగా రూపొంది ఉన్నాయి. హిమానీనదం కరిగిపోయిన తర్వాత హిమగర్త హరివాణం నీటితో నిండడం వల్ల ఈ సరస్సులేర్పడతాయి. వీటిని హిమగర్త సరస్సులు (Cirque lakes) అంటారు.

హిమానీనదనంచెందిన లోయల లక్షణాలు:

హిమానీనదరం చెందిన లోయలు నదీ లోయలకు భిన్నంగా కన్పిస్తాయి. ఇవి హిమానీనదనానికి విశిష్టమైన నిదర్శనలను చూపుతాయి. వీటిని కింద పర్చించాం.

1. హిమానీనదనానికి గురైన లోయ అడుగుభాగం విశాలంగా ఉంటుంది. పార్శ్వాలు చాలా నిట్రంగా ఉంటాయి అంటే వాటి మధ్యచ్ఛేదం U ఆకారంలో ఉంటుంది. నదీలోయ V ఆకారంలో ఉంటుంది. హిమానీనదంలోయ అడుగుభాగాన్నే కాక పక్కలలో కూడా క్రమక్రమం జరపడంవల్ల లోయఅడుగున వెడల్పుఅయి పార్శ్వాలలో నిట్రంగా తయారౌతుంది.

2. పర్వత ప్రాంతాలలో ఉండే హిమానీనదాలలోయలు మామూలు నదుల లోయలకంటే ఎక్కువ దూరం రుజుమార్గంలో ఉంటాయి. నదికంటే సాధారణంగా హిమానీనదం రుజుమార్గంలో ప్రవహిస్తుంది. అందువల్ల మార్గంలో అడ్డువచ్చే శిలలను ఖండిస్తూ ముందుకుపోవడం వల్ల లోయలు ఏర్పడతాయి.

3. ఉపహిమానీనదలోయలు ప్రధానహిమానీనదలోయల కంటే ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల వాటిని లంబమానదరులు (hanging valleys) అంటారు. ఇటువంటి లోయలలో ప్రవహించే నదులు ప్రధాననదిలో జలపాతాలే వీటికి మంచి ఉదాహరణ.

4. పర్వత ప్రాంతాలలో హిమానీనదలోయల మరొక ముఖ్యలక్షణం వాటి శీర్షాలలో ఉండే హిమగర్తాలు. రెండు హిమగర్తాలు ఒకదాని వైపు మరొకటి విస్తరించినపుడు వాటి మధ్యనున్న భాగం చాలానన్నగా ఉండి చూడడానికి పడునైన కత్తివలె కన్పడుతుంది. దీనిని ఏరేట్ (arete) అంటారు. రెండు హిమగర్తాలను వేరుచేస్తున్న పర్వతభాగంలో కనుమ ఏర్పడితే దానిని కాల్ (col) అంటారు. ఒక పర్వత శిఖరంచుట్టూ మూడు లేదా నాలుగు హిమగర్తాలు ఏర్పడి ఉంటే ఆ పర్వత శిఖరాన్ని మాటర్ హోర్న్ (matter horn) అంటారు. స్విట్జర్లాండ్ లోని ఆల్ప్స్ పర్వతాలలో ఉన్న మెటర్ హోర్న్ శిఖరం దీనికి మంచి ఉదాహరణ.

5. హిమానీనదలోయలకు సంబంధించిన మరొక సాధారణ లక్షణం సముద్రాన్ని చేరే హిమనదాలు లోయను సముద్రమట్టానికంటే దిగువగా క్రమక్రమం చేయడం. నిట్రమైన పార్శ్వాలతో ఏర్పడే సన్నని ఈ ముఖద్వారాలను ఫియర్డ్లు (fjords) అంటారు. నార్వే, స్వీడన్, అలస్కా, చిలీ తీరాల వెంబడి ఉన్న ఫియర్డ్లు హిమానీనదంవల్ల ఏర్పడి కొంతవరకు సముద్రంలో ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

4. హిమానీనదనం చెందిన లోయల రూపురేఖలకు, నదీలోయల-రూపురేఖలకు మధ్య ప్రధాన భేదాలు తెలియచేయండి.

.....

.....

.....

.....

7.6.2 హిమానీనద రవాణా

హిమానీనదాలు తమ భారాన్ని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో రవాణాచేయవు. వివిధ రకాల శిలాఖండాలు శ్రేణీకరణ లేకుండా అన్నీ కలిసి రవాణా అవుతాయి. అందువల్ల హిమానీనదం తనభారాన్ని పార్శ్వాలలోను, ఉపరితలంమీద అడుగుభాగంలోను మోసుకొని పోతుంది. భారం ఎక్కువగా అడుగున, పక్కలలో పోగుఅవుతుంది. పీఠశిలఅడుగున, పక్కలన హిమానీనద క్రమక్రమానికి గురికావడంవల్ల

ఈ విధంగా జరుగుతుంది. హిమానీనదనం ఉపరితలంమీద పోగువడే శిథిలశిలాఖండాల చాలాభాగం భూపాతంవల్ల, నిట్రమైనలోయల పార్శ్వాలనుంచి విరిగిపడడంవల్ల రూపొందినదే. హిమానీనదం అడుగుభాగంలో ఉండేభారం చాలావరకు సన్న ఇసుక, స్టీల్ వంటి అతి సూక్ష్మరేణుయుత పదార్థంతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఈ శిలారేణువుల్లో చాలాభాగం అప్పుడే ఏర్పడినది కావడంవల్ల, విఘటనకు గురికాకుండా ఉంటుంది. ఇవి చాలా వరకు కోణీయంగాను గరుకైన ఉపరితలాలతో ఉండి విచ్ఛేదనకు, రాపిడికి గురిఅయినట్లు కన్పిస్తాయి. హిమానీనదంవల్ల రూపొందిన ఇసుక రేణువులు సిల్ట్ ను శిలాచూర్ణం అంటారు. విఘటన పొందిన శిలాచూర్ణం పీఠశిలలు హిమానీనద క్రమక్రమంగానికీ గురికావడంవల్ల రూపొందిన పదార్థమే.

7.6.3 హిమానీనద నిక్షేపణ

హిమానీనదాలు కరిగినప్పుడు, బాష్పీభవనానికి గురైనప్పుడు దానినుంచి శిలాఖండాలు బయటపడి నిక్షేపణ చెందుతాయి. ఇది చాలావరకు హిమానీనద ప్రవాహపు దిగువభాగాలలో జరుగుతుంది. సరాసరి హిమానీనదాల నుంచి లేదా హిమానీనద జలప్రవాహాలనుంచి నిక్షేపించబడిన అవక్షేపాలను హిమానీనద చలితద్రవ్యం (glacial drift) అంటారు. హిమానీనద నిక్షేపాలు సాధారణంగా రెండువర్గాలుకు చెందుతాయి.

1. హిమానీనదం నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఏర్పడిన హిమానీనదకృతనిక్షేపాలు. వీటిని గోళామ్మత్తిక (Till) అంటారు.
2. హిమానీనద జలప్రవాహాలవల్ల ఏర్పడిన నిక్షేపాలు. వీటిని హిమానీనద జలకృత నిక్షేపాలు (glaci-fluvial deposits) లేదా ఔట్ వాష్ (Outwash) అంటారు.

హిమానీనదం కరిగినప్పుడు దాని శిలాభారం పోగువడడంవల్ల గోళామ్మత్తిక ఏర్పడుతుంది. ఇది వివిధ పరిమాణాలుగల శిలాఖండాల మిశ్రమం. దీనిలో శ్రేణీకరణ ఉండదు. దీనిలో పెద్దపెద్ద శిలాఖండాలు ఉంటే వాటిని హిమానీనద అనియతశిలలు (glacial erratics) అంటారు. ఇవి ప్రస్తుతమున్న ప్రాంతంలోకాక వేరే ఎక్కడో ఏర్పడి ఇక్కడకు హిమానీనదాలవల్ల రవాణా అయినట్లుంటేవి.

ఔట్ వాష్ చాలా వరకు దానిలోని శిలాఖండాల పరిమాణం, బరువులకు అనుగుణంగా శ్రేణీకరణ చెంది ఉంటుంది. ఈ శ్రేణీకరణ హిమానీనదజలంవల్ల జరిగినవే. ఈ నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఇసుక, గ్రావెల్ తో కూడుకొని ఉంటాయి.

హిమానీనదనిక్షేపాలలో అత్యధికంగా కనిపించేవి మొరైన్లు (Moraines). ఇవి కేవలం గోళామ్మత్తికపొరలు లేదా రిడ్జ్ లే. హిమానీనదం క్రమేణా కరుగుతూ తిరోగమనం చెందేటప్పుడు దాని అడుగున నిక్షేపణ చెందిన విజాతీయ అశ్రేణీకృత శిథిలశిలాఖండాల పొరను భూతలమొరైన్ (Ground moraine) అంటారు. దీనిలో ప్రధానంగా సూక్ష్మరేణుపదార్థం ఉండి, దానిలో ఉపలాలు, గోళశిలలు ఉన్నప్పుడు దానిని గోళామ్మత్తిక అంటారు. పీఠశిలతో అపఘర్షణ పొందడంవల్ల నిమ్న భాగాలను నింపి పురాతన ప్రవాహ మార్గాలను పూడ్చివేసి ఆ విధంగా సమతలాలను రూపొందిస్తాయి.

అంతిమ మొరైన్లు (terminal moraines) హిమానీనదాల చివరలో ఏర్పడతాయి. శిథిలశిలాఖండాలు ఎక్కువ పరిమాణంలో పోగుబడడంవల్ల ఇవి పదులనుంచి వందల మీటర్ల ఎత్తు వరకు గుట్టులుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ అంతిమమొరైన్లు సాధారణంగా అర్ధచంద్రాకృతిలోగాని, గుర్రపునాడాలవలెగానీ ఉంటాయి. వీటి పుటాకార పార్శ్వాల లోయశీర్షం వైపు ఉంటాయి. లోయ హిమానీనదాలు లోయలకు అడ్డంగా అంతిమ మొరైన్లను ఏర్పరుస్తాయి.

ఆల్ ప్లేన్ హిమానీనదం లోయపార్శ్వాల నుంచి శిథిలశిలాఖండాలను ఎక్కువ మొత్తాలలో పోగు జేస్తుంది. హిమానీనదం కరిగినప్పుడు ఈ పదార్థాలు లోయ పార్శ్వాల వెంబడి పొడవైన గుట్టులుగా ఏర్పడతాయి. వీటిని పార్శ్వ మొరైన్ (lateral moraines) అంటారు. చాలా లోయలలో పార్శ్వ మొరైన్లు అంతిమ, భూతల మొరైన్లకంటే ప్రస్తుతంగా కన్పిస్తాయి. హిమానీనదం కొంత దూరం

తిరోగమనం చెందినప్పుడు దాని అంతిమభాగం కొంత కాలం అట్లాగే స్థిరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మరొక అంతిమమొరైన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా హిమానీనదం తిరోగమనం చెందేటప్పుడు కొంత కాలావధులలో తిరోగమనమొరైనులు (recessional moraines) ఏర్పడుతుంటాయి. మిచిగాన్, ఈరీ సరస్సులకు దక్షిణంగా ఉన్న పెద్ద గుట్టల వరుసలు తిరోగమన మొరైన్లకు మంచి ఉదాహరణలు.

డ్రమ్లిన్లు: అశ్రేణీకృత హిమానీనద నిక్షేపాలలో అసాధారణమైన రకాలను డ్రమ్లిన్ (drumlins) అంటారు. చాలా ప్రదేశాలలో హిమానీనదచలితద్రవ్యం సమాంతరంగా ఉన్నగుట్టల వరుసలుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ వరుసలు కొన్ని మైళ్ళ పొడవుండి పరుగెత్తే మోటారుకార్ల వరుసలను పోలి ఉంటాయి. ఇవి ఎత్తు తక్కువగాను, గుండ్రంగాను ఉండే దీర్ఘవృత్తాకారపు పీఠాలుగల దిబ్బలు. పీఠాలు దీర్ఘాక్షాలు హిమానీనదచలనదిశకు సమాంతరంగా ఉంటాయి. ఇవి హిమానీనద ప్రవాహానికి అధిముఖంగా ఏటవాలుగా ఉంటాయి. ఇవి పావుమైలు నుండి అరమైలు పొడవు వరకు ఉంటాయి. అమెరికాలోని ఒంటారియో రాష్ట్రంలో శిరాక్యూజ్, రోచెస్టర్ల మధ్య ప్రాంతంలో ఎత్తుగా ఉన్న దిబ్బలు డ్రమ్లిన్లులకు మంచి ఉదాహరణలు. విస్కాన్సిన్, ఇర్లాండ్లలో కూడా డ్రమ్లిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

అనియత శిలలు (erratics), గోళశిలా శ్రేణులు (Boulder trains):

ఇవి హిమానీనదం కరిగే సమయంలో ఆ ప్రదేశమంతటా విరజిమ్మబడిన గోళశిలలు. ఇవి గులకరాళ్ళ ప్రమాణం నుంచి ఇల్లంత పరిమాణంలో ఉన్న గోళశిల ప్రమాణం వరకు ఉండవచ్చు. ఇవి వాటికిందఉన్న ఆధారశిలకు సంబంధించినవి కావు. న్యూయార్క్లోను, న్యూ ఇంగ్లాండ్లోను, బ్రాన్స్విక్ హిమాలయా ప్రాంతంలోని టేబెల్, మల్లాజ్ బహర్లో కూడా అనియతశిలలు విస్తృతంగా ఉన్నవి. హిమపటలచర్య జరిగినచోట ఇటువంటి శిలలు అధిక సంఖ్యలో ఉండి విననకర్రవంటి ఆకృతులలో కనిపిస్తాయి. వీటిని గోళశిలాశ్రేణులు అంటారు.

హిమానీనద జలనిక్షేపాలు: హిమానీనదాలు కరిగే ప్రాంతాలలో హిమానీనదం ఉపరితలం మీద, అంచులలో, అడుగుభాగాన ఎన్నో ఝురులు ఏర్పడతాయి. వేసవికాలంలో మంచు గుహల నుంచి, సారంగాల నుంచి ఉధృతమైన ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి గోళశిలలను, గులకరాళ్లను, ఇనకను, శిలాచూర్ణాన్ని రవాణా చేస్తాయి. ఈప్రవాహాలు అంతిమమొరైన్ నిక్షేపించబడే చోట ఉద్భవిస్తాయి. కాబట్టి హిమానీనద-జలనిక్షేపాలు అంతిమమొరైన్ ను దాటి చాలాదూరం రవాణా అవుతాయి. హిమానీనదం లోయ కుడ్యాల వల్ల పరిమితమై ఉన్నప్పుడు హిమానీనదజలనిక్షేపాలు కూడా లోయ వెడల్పుకే పరిమితమై ఉంటాయి. వీటివల్ల లోయ శ్రేణులు (Valley trains) రూపొందుతాయి. ఇవి ఒక మోస్తరు స్తరిభవనాన్ని చూపుతాయి.

హిమక్షాలిత మైదానాలు (Outwash Plains): ఒక పెద్ద హిమానీనదం ముందు భాగం చదునైన ప్రాంతంలో లేదా విశాలమైదానంలో కొంతకాలం స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడు అది కరగడం వల్ల వచ్చే నీరు ఆ ప్రాంతమంతటా జాలాకృతిలో ఝురులుగా విస్తరిస్తుంది. ఈ ఝురులు వాటిలోని శిథిల శిలాఖండాలను ఆ ప్రాంతమంతటా నిక్షేపిస్తాయి. ఇటువంటి ప్రాంతాలను హిమక్షాలిత మైదానాలు అంటారు. ఇవి చాలావరకు స్తరితంగా ఉంటాయి. అంతిమమొరైన్ దగ్గరలో గ్రావెల్, గండ్ర ఇనక, దానికి దూరంగా సన్న ఇనక, సిల్ట్లతో కూడి వుంటాయి.

కెటిల్ రంధ్రాలు (Kettle Holes): హిమక్షాలిత మైదానాలలో పదినుంచి వందఅడుగుల వరకు బోతుఉన్న గుండాలు కనిపిస్తాయి. వీటి పార్శ్వాలు నిట్రంగా ఉంటాయి. వీటిని కెటిల్ రంధ్రాలు అంటారు. హిమానీనదంనుంచి విడిపోయి హిమక్షాలిత పదార్థాలతో కప్పబడిఉన్న హిమఖండాలు కరగడంవల్ల ఇవి ఏర్పడతాయి.

కెమ్బులు (Kames): ఇవి యాభై నుంచి నూట యాభై అడుగులవరకు ఎత్తు ఉన్న శంఖాకారపు కొండలు. ఇవి స్తరితరూపంలో ఉన్న హిమానీనద శిథిలశిలాఖండాలతో ఏర్పడివుంటాయి. ఇవి విడివిడిగా ఉండవచ్చు. సముదాయాలుగా ఉండవచ్చు. లేదా అస్తరితంగా ఉన్న అంతిమ మొరైన్లతోపాటు ఉండవచ్చు. ఇవి సముదాయాలుగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రదేశం ఎత్తువల్లాలతో ఉండి నాబ్ ఏండ్ కెటిల్ (Knob and Kettle) స్థలాకృతిని చూపుతాయి. ఇవి సాధారణంగా లోయల అడుగున ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు కొండల పార్శ్వాలలో కూడా ఉండవచ్చు. ఇవి పెద్ద హిమానీనదాల అంచులలో శిథిలశిలాపదార్థాలను మోసికొనిపోయే ఝరులవల్ల ఏర్పడతాయి. ఈ ఝరులు హిమానీనదం నుంచి బటయకు వచ్చేటప్పుడు తమభారాన్ని వదిలివేస్తాయి. ఈ భారం చాలావరకు గ్రావెల్, ఇసుకలతోకూడి ఉంటుంది.

ఎస్కర్లు (Eskers): ఇవి సాధారణంగా వంపులు చూపే పొడవైన చిన్న రాళ్ళ గుట్టలు. వీటిలో గ్రావెల్, ఇసుకలతో కూడిన స్తరిత శిథిలశిలాపదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి భూతల మొరైన్లు ఉండే ప్రాంతాలలో కనిపిస్తాయి. వీటి పొడవు ఒక మైలు కన్న తక్కువ ఉంటుంది. వీటి పైభాగాల వెడల్పు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రైలు కట్టల (Railway embankments) మాదిరి గా కనిపిస్తాయి. హిమానీనదంలో ఏర్పడే ఝరులు తమ భారాన్నినిక్షేపం చేయవడంవల్ల ఈ గుట్టలు ఏర్పడతాయి.

హిమజల సరస్సులు : ఖండంతర హిమానీనదాలు భూభాగమంతటినీ, దానిలోని వివిధ పరివాహ హరివాణాలను, వాటి మధ్యనున్న విభాజకక్షేత్రాలతో సహపూర్తిగా కప్పి వేస్తాయి. హిమానీనదానికి ముందు ఉన్న భూభాగం హిమానీనదంవైపుకు అవనతమై ఉన్నప్పుడు హిమానీనదం కరగడంవల్ల వచ్చే నీరు, అక్కడనే చేరుతుంది. హిమానీనదం అంచు ఆనకట్టవలెనుండి నీరు ప్రవహించకుండా చేస్తుంది. ఈ విధంగా విశాలప్రాంతాలు నీటితో నిండి హిమజలసరస్సులు ఏర్పడతాయి.

స్వీడ్లాండ్ హిమయుగంలో యూరప్, ఉత్తర అమెరికా ఖండాలను కప్పిఉన్న ఖండంతర హిమపటాల అంచుల వెంబడి ఏర్పడిన హిమజల సరస్సులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అగాసిజ్ సరస్సు, నార్త్ అమెరికాలోని గ్రేట్ లేక్ వీటికి మంచి ఉదాహరణలు.

హిమజల సరస్సుల అవక్షేపాలు : హిమజల సరస్సులలోని చల్లనినీటి సాంద్రత మామూలు ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండే నీటి సాంద్రత కన్నా ఎక్కువ. అందువల్ల సిల్ట్, క్లేల అవసాదనకు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల సూక్ష్మరేణు అవక్షేపాలు సరస్సు అంతటా విస్తరించి దాని అడుగు భాగమంతటా నిక్షేపితమవుతాయి. సూక్ష్మరేణు పదార్థాలు విడిగా సాంవత్సరికపత్రాలుగా నిక్షేపితమవుతాయి. వీటిని వార్మిలు (Varus) అంటారు. వీటిలో వేసవి, శీతాకాలాల్లో ఏర్పడిన పత్రాలు ఏకాంతంగా అమరి ఉంటాయి. వేసవికాలపు పొరలో లేతరంగు స్థూలరేణుయుత సిల్ట్ ఉంటుంది. శీతాకాలపు పొరలో ముదురు రంగుగల సూక్ష్మరేణుయుత పదార్థం ఉంటుంది. శీతాకాలపు పొర వేసవికాలపు పొరకంటే పల్లగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క వార్మిని జాగ్రత్తగా పరిశోధించి విశ్లేషణ చేసి ఖండంతర హిమపటాల తిరోగమన వేగాన్ని అంచనా కట్టవచ్చు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. వివిధ రీతుల హిమానీనదనిక్షేపాలను, నిక్షేపణాత్మకరూపురేఖలను తెలియజేయండి.

7.7 నిమ్మొన్నతాలపైన, పరివాహంపైన హిమానీనదనం ప్రభావం

లోయ హిమానీనదాలు తమ లోయలను సరళ రేఖీయంగాను, లోతుగాను, వెడల్పుగాను చేసి లోయ పార్శ్వాలను నిట్రంగా చేసి స్థలాకృతిలో ఎన్నో మార్పులను తీసుకొస్తాయి. విభాజక క్షేత్రాలలో హిమగర్భాలను, మేటర్ హార్న్ లను రూపొందిస్తాయి. అయితే మహాహిమయుగంనాటి ఖండాంతర హిమవటాలు అవి కదిలే ప్రదేశ స్థలాకృతిలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకొనిరాలేదు. కొన్ని కొండలు, నిమ్మపర్వతాలు క్రమక్రమానికి గురియై గుండ్రంగా అయినప్పటికీ, ఎన్నో లోయలు లోతుగాను వెడల్పుగాను అయినప్పటికీ, ప్రధానమైన హిమవటాల క్రమక్రయంవల్ల స్థలాకృతిలో ప్రధానమైన మార్పులు ఏవీ రాలేదు. విశాలమైన ఖండాంతర హిమానీనదాలు హిమానీనదానికి పూర్వం ఉన్న స్థలాకృతిని కొంత సునుపుగా చేసాయి. ఖండాంతర హిమవటాలలోని మంచుకరగడంవల్ల మృత్తికాప్రావారం అది ఏర్పడిన చోటునుంచి తరచుగా ఎంతో దూరం రవాణా అయింది. కేనడా, తూర్పు మధ్య ప్రాంతాలు హిమానీనద క్రమక్రమానికి ఎక్కువగురికాగా, దక్షిణ, నైరుతి భాగాలలో హిమానీనద నిక్షేపణ అధికంగా జరిగింది. దీనివల్లనే కేనడా తూర్పు భాగంలో నగ్నశిలా ప్రాంతాలు నన్నని మృత్తిక పొరలతో కన్పిస్తే, న్యూఇంగ్లాండు, అప్పర్ మిస్సిసిపిలోయ ప్రాంతాలలో హిమానీనద మృత్తికలు ఎక్కువ మందంగా కన్పిస్తాయి. పరివాహంపైన హిమానీనద ప్రభావం చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఉంటుంది. హిమానీనదనానికి పూర్వం ఉన్న లోయలు చాలవరకు హిమానీనద శిథిలశిలా ఖండాలతో దాదాపు పూర్తిగా నిండిపోతాయి. అందువల్ల కొత్త ఝరులు హిమానీనదనానికి పూర్వం ఉన్న నదుల మార్గాలకు భిన్నమైన మార్గాలలో ప్రవహించడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో హిమానీనదాలు నదులను వాటి మార్గాలలో ప్రవహించడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో హిమానీనదాలు నదులను వాటి లోయలనుంచి నెట్టివేయడం వల్ల అవి కొత్త మార్గాలను ఏర్పరచుకొంటాయి. హిమం కరిగిపోయిన తర్వాతకూడా కొత్త మార్గాల వెంటనే నదులు ప్రవహిస్తుంటాయి. మహాహిమయుగానికి ముందు అవి మెని, మోనోనగపాలనదులు కలసి ఉత్తర దిక్కుగా ఈరీ సరస్సుతోకి ప్రవహించేవి. అయితే హిమయుగం తర్వాత అవి ఓహియోలోయగుండా ప్రవహిస్తున్నాయి. పెన్సిల్వేనియా వాయవ్య ప్రాంతంలో హిమానీనద శిథిలఖండాలు అధికంగా పోగుబడడంవల్ల ఈ మార్పు వచ్చింది. ఈ విధంగా ఝరులు కొత్త మార్గాలను ఏర్పరచుకోవలసి వచ్చిన సందర్భాలలో అవి ఎంతో దృఢీయమైన జలపాతాలు ఉన్న గోర్ట్లను రుపొందించాయి. నయాగరా గోర్ట్ జలపాతాలు వీటికి మంచి ఉదాహరణ. ఉత్తర అమెరికాలోని ఉత్తరభాగంలో వేల సంఖ్యలో ఉన్న సరస్సులు స్టీప్టోసీన్ హిమయుగపు హిమానీనదనం వల్ల రూపొందినవే. గ్రేట్ సరస్సులు కూడా హిమయుగానికి పూర్వం లేవు. వీటిలో కొన్ని సరస్సులు హిమానీనద క్రమక్రయంవల్ల ఏర్పడిన హరివాణాలను ఆక్రమించి ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో ఎక్కువ భాగం హిమానీనదచరిత ద్రవ్య నిక్షేపాలు లోయలకడ్డుగా నిలిచి స్థానికంగా ఝరులను నిలిపివేయడంవల్ల రూపొందినవే.

7.8 ప్రస్తుతపు హిమానీనదాలు

ప్రస్తుతం ఉన్న హిమానీనదాలలో గొప్పవి, చెప్పుకోదగినవి గ్రీన్ లాండ్, ఐస్ లాండ్, అంటార్క్టికాలు. చాలావరకు ఆవరించిఉన్న హిమవటాలు లేదా ఖండాంతర హిమానీనదాలు, వీటికన్న చిన్నవాటిలో చెప్పుకోదగినవి స్పిట్ బెర్గెన్, స్కాండినేవియా, ఐస్ లాండ్ లలో ఉన్న హిమశిరోవేస్తాలు. లోయ హిమానీనదాలలో ఎక్కువ భాగం ఆల్పైన్ రీతికి చెందినవి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఆల్ప్స్ పర్వతాలలో దాదాపు రెండు వేల వరకు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో ఎక్కువ పొడవైనవి ఆల్ప్స్ మహాహిమానీనదం. ఇది పర్షియన్ కిలోమీటర్ల కన్న పొడవైనది. హిమాలయా పర్వతాలలో అద్భుతమైన లోయ హిమానీనదాలు చాలా పెద్దవి అధిక ఉన్నతులలో ఉన్నాయి. వీటిలో అతి పొడవైనది ఘోడ్ చెంకో హిమానీనదం. ఇది సుమారు ఎనభై కిలో మీటర్లు పొడవు ఉంది. కుమాయూన్, నేపాల్ హిమాలయాలలోని కేదార్ నాథ్, కాంచన గంగలలో ఎన్నో లోయహిమానీనదాలు ఉన్నాయి. దక్షిణ అమెరికాలోని ఆండ్స్ పర్వతాలలో కూడా చాలా లోయ హిమానీనదాలు ఉన్నాయి. వీటిలో

చాలా భాగం సముద్రాలలోకి ప్రవహించి పెద్దపెద్ద మంచు గడ్డలుగా విడిపోతాయి. U.S.A. లోని దక్షిణ అలస్కా ప్రాంతంలో ఉన్న తపస్వత శ్రేణుల విశాల హిమక్షేత్రాలు, లోయ హిమానీనదాలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.

మహాహిమ యుగం (The Great iceage) : ప్రస్తుతం ఉన్న హిమానీనదాలకు ఎంతో దూరంగా ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలలో హిమానీనదనానికి నిదర్శనాలుగా కనిపించే కొన్ని లక్షణాలను లూయిఅగాసిడ్ అనే యూరప్ దేశ శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రపథమంగా 1821 లో గుర్తించాడు. దీనిని బట్టి ప్రస్తుతం మంచులేని కొన్ని విశాల ప్రాంతాలను ఒకప్పుడు హిమానీనదాలు కప్పిఉండవచ్చునని ఆయన భావించాడు. శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనల ఫలితంగా పూర్వ హిమానీనదానికి సంబంధించిన సమాచారం దొరికింది. ఈ సమాచారాన్ని బట్టి భౌమకాలంలో హిమయుగాల విషయం విశదపడ్తోంది.

గతించిన భౌమకాలంలోని చివరి యుగం-సెనోజోయిక్ మహాయుగపు ప్లీస్టోసీన్ యుగంలో ఉత్తర అమెరికా, ఐరోపాలలో చాలా భాగం విశాలమైన, మందమైన హిమవలూతో కప్పబడి ఉంది. భౌమకాలంలో హిమచర్యకు సంబంధించి అత్యధిక ప్రాముఖ్యం కలది ఇదే. హిమరాశులు కప్పిఉన్న ప్రాంతం మొత్తం సీస్టర్ల 20 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. దీనిలో సగం ఉత్తర అమెరికాలో ఉంది. ఇక్కడ హిమం మూడు కేంద్రాల నుంచి విస్తరించింది. ఇది లాబ్రెడార్, హడ్సన్ అఖాతాన్ని అనుకొనిఉన్న కీహాటిన్, పశ్చిమ అమెరికాలోని కార్డిలెరా పర్వత శ్రేణి, యూరప్ ఖండంలో యూరల్ పర్వతాలను దాటికూడా మంచు కప్పిఉండటం కనిపిస్తుంది. అల్ప్స పర్వతాల నుంచి మరొక హిమశిరోవేష్టం వ్యాపించి ఉండేది. ఆ విధంగానే ఆసియాలోని హిమాలయాలు, ఇతర పర్వత శ్రేణులు కూడా హిమానీనదాలతో కప్పబడి ఉండేవి. దక్షిణార్ధ గోళంలో న్యూసోత్ వేల్స్, టాస్మేనియా ప్రాంతాలు కూడా హిమమయమై ఉండేవి. న్యూజిలేండు, పటగోనియా, చీలీ ప్రాంతాలు కూడా హిమవలూతో కప్పబడి ఉండేవి. అంటార్కిటికా హిమవలూ గ్రీన్ లాండ్ హిమవలూ మూదిరిగానే ఇప్పటికన్నా ఎక్కువ మందంగాను, విశాలంగాను ఉండి ఉండవచ్చు.

శీతోష్ణస్థితిలోని మార్పులవల్ల హిమరేఖచాలా ప్రాంతాలలో తక్కువ మట్టంలో ఉండేది. హిమానీనద చలితద్రవ్యాన్ని పరిశీలించినమీదట హిమానీనదనం కేవలం ఒక్క హిమపురోగమనం లేదా తిరోగమనంవల్లనే సంభవించి ఉండదని తెలియవచ్చింది. అల్ప్స పరిసరప్రాంతాలలో గోళశిలామృత్తికలు, మొరైన్ లు, హిమక్షులిత గ్రావెల్ లు, వరుస క్రమంలో ఉన్నవి. నాలుగు తరాలకు చెందినవి కనిపించి నాయి. దీనిని బట్టి ప్లీస్టోసీన్ యుగంలో హిమానీనదనం నాలుగుసార్లు సంభవించిందని తెలుస్తుంది. ప్రధాన హిమానీనద కాలాల మధ్యఉన్న అంతరాలను హిమానీనదాంతర కాల అవధులు (inter glacial epochs) అంటారు. పురాతన మృత్తికలు, స్థానికంగా సరస్సులు, నదులలో ఏర్పడి, వృద్ధ, తరుణ హిమానీనద లేదా హిమానీనద జలనిక్షేపాల మధ్యనున్న నిక్షేపాలు ఈకాల అవధులను సూచిస్తాయి. ఈ హిమానీనదాంతర సంస్థరలు కొన్నింటిలో వృక్షవశేషాలు కనిపిస్తాయి. వీటినిబట్టి ఆనాటిశీతోష్ణ పరిస్థితుల గురించి విలువైన సమాచారాన్ని పొందడం జరిగింది.

7.9 హిమానీనదనానికి కారణాలు

హిమానీనదనం జరిగిన కాలాలలో, వాటి మధ్య కాలాలలో ప్రపంచమంతటా శీతోష్ణస్థితిలో ఎన్నో గొప్ప మార్పులు వచ్చాయి. మధ్య అక్షాంశప్రాంతాలలో మామూలు శీతోష్ణస్థితి నుంచి హిమానీనద శీతోష్ణస్థితిగా మార్పురావడానికి ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా 6°C వరకు తగ్గవలసి వుంటుంది. ఈ మార్పుకు కారణాలను ఎన్నో విధాలుగా సిద్ధాంతీకరించినారు.

7.9.1 ఉష్ణవితరణ (Heat Distribution) సిద్ధాంతం

భూకక్ష్యలోను, భూమికి, క్రాంతి వృత్తానికి మధ్యనున్న కోణంలోను వచ్చే మార్పులు హిమానీనదనానికి కారణాలుగా భావించారు. వీటివల్ల శీతోష్ణస్థితిలో మార్పులు వస్తాయి. ప్లీస్టోసీన్ హిమానీనదనానికి

కావలసినంత మార్పులు ఈ విధంగా వచ్చవుంటే భౌమకాల మంతటా ఇటువంటి హిమ యుగాలు ఎన్నో సంభవించి ఉండాలి. నిజానికి ఇటువంటి హిమయుగం ఒకటి కార్బనిఫెరస్ యుగం చివరి భాగంలో సంభవించింది.

7.9.2 సౌరవికిరణ (Solar radiation) సిద్ధాంతం

ఇది ఖగోళశాస్త్ర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది సౌరస్థిరాంకం లేదా భూమి చుట్టు ఉన్న వాతావరణంలోకి చేరే సౌరశక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది 2 కాలరీలు/ చదరపు సెంటిమీటర్/నిమిషం ఉందని, 1916 నుంచి ఇప్పటి వరకు దీనిలో 3% మార్పు మాత్రమే వచ్చిందని U.S.A. వాషింగ్టన్ లోని స్మిత్సోనియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ వారు అంచనా కట్టారు. గతించిన భౌమకాలంలో సౌరస్థిరాంకంలో గొప్ప మార్పులు వచ్చాయని భావించి సర్జార్టి సింప్సన్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. సౌరవికిరణంలో పెరుగుదలవల్ల భూమిమీద ఉష్ణోగ్రత పెరిగి ఉంటుందని, దానివల్ల వాతావరణంలో సంచలనం సంభవించి వర్షపాతానికి, హిమపాతానికి దారితీసి ఉంటుందని ఆయన భావించాడు. అల్పఆక్షాంశప్రాంతాలలో ఎక్కువహిమపాతం జరుగుతుంది. దీని వల్ల ధ్రువప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరగడం వల్ల హిమానీనదాలు క్షీణించిపోయి హిమానీనదాంతర కాలావధి ప్రారంభమౌతుంది. సౌరవికిరణ తగ్గేకొద్దీ ఈ ప్రక్రియ పునఃప్రారంభమౌతుంది. హిమానీనదాలు మళ్ళీ ఏర్పడి రెండవ హిమానీనదనం ప్రారంభమౌతుంది.

7.9.3 సౌరశక్తిస్థలాకృతి (Solarenergy - topography) సిద్ధాంతం

ఆర్. ఎఫ్. ప్లీట్ అనే అమెరికన్ భూవిజ్ఞానశాస్త్రజ్ఞుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. సౌరశక్తి వికిరణంలోని మార్పులకు, ఖండాల స్థలాకృతికీ సంబంధముందని ఈయన భావించాడు. భూమి మీదకు చేరే సౌరశక్తి తక్కువఉన్నత పర్వతప్రదేశాలలో హిమానీనదాలు విస్తరిస్తాయి. దీనివల్లనే హిమయుగం ఆరంభమౌతుంది. సౌరశక్తివికిరణ అధికమైనప్పుడు హిమానీనదం క్షీణించి హిమానీనదనం అంతమౌతుంది. ప్రస్తుత కాలంలో మాదిరిగాకాక గతించిన భౌమకాలాలలో సౌరశక్తి ప్రమాణంలో అత్యధికమైన మార్పులు వచ్చియుంటాయన్న భావనపై ఈ సిద్ధాంతం ఆధారపడి ఉంది.

ఆధునిక భూవిజ్ఞానశాస్త్రంలో ఇంకా పరిష్కరింపబడని ప్రధాన సమస్యలలో హిమానీనదనం కూడా ఒకటి అని పేర్కొనవచ్చు.

7.10 సారాంశం

హిమానీనదాలకు వాటి చర్యకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను, హిమానీనదాలు ఏర్పడే విధానం గురించి చర్చించాం. హిమానీదాల వర్గీకరణ గురించి, చలనం గురించి వివరించాం. క్రమక్షయం, రవాణా, నిక్షేపణ ప్రక్రియల ద్వారా హిమానీనదాలు జరిపే భౌమచర్యను, సహస్థిత భూస్వరూపాలను గురించి వివరించాం. నిమోన్నతాలు, పరివాహంపై హిమానీనదన ప్రభావం, హిమానీనదనానికి కారణాలు ప్రస్తావించాం. చివరగా ప్రస్తుత కాలంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన హిమానీనదాలను గురించి చెప్పాం.

7.11 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి - మాదిరి సమాధానాలు

1. పునస్సృజకీకరణం చెందిన హిమం ఏర్పడి భూఉపరితలం మీద నెమ్మదిగా కదిలే మంచురాశిని హిమానీనదనం అంటారు.
2. ఉనికి, పరిమాణం ఆధారంగా హిమానీనదాలను స్థూలంగా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. అవి i) గర్తహిమానీనదాలు ii) లోయహిమానీనదాలు, iii) పీడ్ మాంట్ హిమానీనదాలు, iv) హిమపటాలు

గర్హిమాసీనదాలు : హిమగర్హాలను ఆక్రమించి ఉండే చిన్న హిమాసీనదాలు.

లోయహిమాసీనదాలు : పర్వత లోయ కుడ్యాల మధ్య ప్రవహించే హిమాసీనదాలు. ఇవి చాలావరకు నదుల మాదిరిగా క్రిందికి ప్రవహిస్తుంటాయి. ఇవి ఆల్పైన్ పర్వతాల ఆల్పైన్ హిమాసీనదాలు అనికూడా అంటారు.

పీడ్ మాంట్ హిమాసీనదాలు: పర్వత పీఠం వద్ద వల్లపు భూమిమీద ఒకటి లేదా ఎక్కువ లోయ హిమాసీనదాల వల్ల రూపొందుతాయి. ఉదా: అలాస్కాలోని మలాస్పిన్ హిమాసీనదం.

హిమవటాలు : విశాలమైన ప్రాంతాలను కప్పిఉండే అతి విస్తృతమైన హిమరాశులు. ఉదా: అంటార్క్టికా, గ్రీన్ లాండ్ హిమాసీనదాలు.

3. హిమదరాలు

4. అ) హిమాసీనదనం చెందిన లోయ వెడల్పైన భూతలంలో, నిట్రమైన పార్శ్వాలలో U - ఆకారంలో ఉంటుంది. నది లోయ V - ఆకారంలో ఉంటుంది.

ఆ) హిమాసీనదాలు నదులకంటే ఎక్కువగా రుజుమార్గంలో ప్రవహిస్తాయి. కాబట్టి హిమాసీనదనం చెందినలోయ రుజుమార్గంలో పొడువుగా ఉంటుంది.

ఇ) హిమాసీనదనం చెందిన లోయలలో కనిపించే సాధారణ రూపురేఖలు లంబమానదరులు. ఇవి మామూలునదులకు భిన్నంగా ప్రధానలోయ కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి.

ఈ) హిమాసీనదనం చెందిన లోయలలో కనిపించే మరొక ముఖ్యరూపురేఖ కందకాలు లేదా హిమగర్హాలు.

5. హిమాసీనదాల ద్వారా రవణా అయినప్పటి చర్యవల్ల నిక్షేపణ చెందే అవక్షేపాలను హిమాసీనద చలితద్రవ్యం అంటారు. ఉద్భవరీత్యా ఈ నిక్షేపాలు ఎన్నో రూపాలను, నిర్మితులను చూపిస్తాయి. హిమాసీనదకృత నిక్షేపాలు రూపొందే భూస్వరూపాలలో ముఖ్యమైనవి మొరైన్లు. లోయభూతలం మీద పోగువడే హిమాసీనద చలితద్రవ్యాన్ని భూతలమొరైన్ అంటారు. ఇది క్రమరహితమైన రూపంలో ఉంటుంది. హిమాసీనదాల చివరలలో ఏర్పడే గుట్టలవంటి నిక్షేపాలను అంతిమమొరైన్లు అంటారు. పార్శ్వమొరైన్లు: ఆల్పైన్ హిమాసీనదాలవల్ల రూపొందుతాయి. ఈ హిమాసీనదాలు లోయ పార్శ్వాల నుంచి శిథిలశిలా ఖండాలను ఎక్కువ మొత్తాలలో పోగుజేస్తాయి. హిమాసీనదాలు కరిగినప్పుడు ఈ శిథిలశిలాఖండాలు లోయపార్శ్వాల వెంబడి పోగుపడడంవల్ల పార్శ్వమొరైన్లు ఏర్పడతాయి.

హిమాసీనదాల వల్ల నిక్షేపణచెందే భూస్వరూపాలలో మొరైన్లేకాక ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో డ్రమ్లిన్ అనే ఒక ప్రత్యేక రూపం కనిపిస్తుంది. ఇవి ప్రధానంగా జంబూల పదార్థంతో ఏర్పడిన సమాంతరంగా ఉంటే పొడవైన, నున్నని కొండలు డ్రమ్లిన్ దీర్ఘక్షం హిమాసీనదం చలన దిశను సూచిస్తుంది. న్యూయార్క్లోని రోచెస్టర్లో డ్రమ్లిన్లు వేలకొద్దీఉన్నాయి.

హిమాసీనదం కరిగే సమయంలో అక్కడక్కడా విరజిమ్మబడే గోళశిలలను అనియత శిలలు అంటారు. ఇవి ఆధారశిలలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక మొరైన్ను దాటి అతి విశాల ప్రాంతమంతటా విస్తరించి ఉండే హిమక్షళిత పదార్థాలను హిమక్షళిత మైదానాలు అంటారు. హిమక్షళిత మైదానాలలో తరచుగా గోతులు, హరిహణాలు ఉంటాయి. వీటినే కేటిల్ డిప్రాలు అంటారు. హిమాసీనదం నుంచి విడిపోయి హిమక్షళిత పదార్థాలతోకప్పబడి ఉన్న హిమఖండాలు కరగడం వల్ల ఇవి ఏర్పడతాయి. స్తరిత రూపంలో ఉన్న హిమాసీనద శిథిలశిలాఖండాలతో ఏర్పడిన శంక్యాకారపు కొండలను కెమ్లు అంటారు. వంపులు చూపే పొడవైన నన్నని రాళ్లగుట్టలను ఎస్కర్లు అంటారు. నీటిలో గ్రావెల్, ఇసుకలతో కూడిన స్తరాలు ఉంటాయి.

7.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి?

1. హిమానీనద క్రమక్తయచర్యను, దానివల్ల రూపొందే స్వరూపాలను వర్ణించండి?
2. హిమానీనదాల చర్యవల్ల ఏర్పడే నిక్షేపాలను వర్ణించండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. హిమానీనదాలలోని రకాలను గురించి తెలియజేయండి?
2. హిమానీనదనం చెందిన లోయల ముఖ్యలక్షణాలు ఏవి?
3. మహాహిమ యుగం గురించి క్లుప్తంగా రాయండి?
4. హిమానీనదనానికి కారణాలు ఏవి?

BRAOU

భాగం-8 : సరస్సులు

పాఠ్యాంశాలు

- 8.0 అక్ష్యాలు
- 8.1 పరిచయం
- 8.2 సరస్సుల భౌమ కార్యకలాపాలు
 - 8.2.1 సరస్సుల ద్వారా క్రమక్షయం, నిక్షేపణ
- 8.3 తంపర భూములు
- 8.4 సరోవర హరివాణాల ఉద్భవం
 - 8.4.1 హిమానీనదనంవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.2 నదులవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.3 భూగర్భజలాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.4 సముద్రతరంగ తీరప్రవాహాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.5 పవనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.6 బృహత్ చలనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.7 భూపటలచలనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.8 అగ్నిపర్వతాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
 - 8.4.9 అసాధారణ కారణాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు
- 8.5 సరస్సులు ధ్వంసంకావడం
- 8.6 సరస్సులలోని ప్రత్యేక రకాలు
 - 8.6.1 లవణ సరస్సులు
 - 8.6.2 క్షౌర సరస్సులు
 - 8.6.3 ప్లాయూ సరస్సులు
- 8.7 భారతదేశపు సరస్సులు
 - 8.7.1 కొల్లేరు సరస్సు
 - 8.7.2 సాంబార్ సరస్సు
 - 8.7.3 లోనార్ సరస్సు
 - 8.7.4 నల్ సరస్సు
- 8.8 సారాంశం
- 8.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు
- 8.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

8.0 అక్ష్యాలు

సరస్సుల ముఖ్య కార్యకలాపాలు, ఉద్భవం, రీతులు, కొన్ని భారతదేశపు సరస్సులను గురించి చెప్పడం ఈ భాగం ఉద్దేశం.

ఈ భాగం అధ్యయనం పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు తెలుసుకొనే విషయాలు

- సరస్సుల భౌమ కార్యకలాపాలు
- సరస్సుల ఉద్భవం
- సరస్సులలోని ప్రత్యేక రకాలు

8.1 పరిచయం

సామాన్యంగా నిశ్చలమైననీటితో నిండిన ఖండాంతర హరివాణాలను సరస్సులంటారు. ఈరీ సరస్సులో మాదిరిగా కొన్నింటిలో జలప్రవాహాలు ఉండవచ్చు. ఇవి పరిమాణంలో చిన్న కుంటలుమొదలుకొని గ్రేట్ లేక్ వలె కొన్నివేల చదరపుమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించిఉన్న పెద్దజలరాసుల వరకు ఉండవచ్చు. సరస్సులలో ఎక్కువభాగం సముద్రమట్టానికి ఎగువన వివిధ ఉన్నతులలో కొన్నివందల మీటర్లవరకు ఉండవచ్చు. దక్షిణ అమెరికాలోని పెరూ, బొలివియా దేశాల సరిహద్దులలో ఉన్న టిటికాకా సరస్సు అన్నింటికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నది.

సరస్సుల నీటి రసాయనసంఘటనలో ఎంతో వైవిధ్యం ఉండవచ్చు. హిమానీనదాల నుంచి నీటినిపొందే వర్షత సరస్సులలో స్వచ్ఛమైన మృదుజలంఉంటుంది. అయితే, గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ లేదా డెడ్ సీలో గాఢమైన ఉప్పునీరు ఉంటుంది. సరస్సులలోని నీటిసంఘటన ప్రధానంగా వాటిలో చేరిననీరు, ప్రవహించిన ప్రదేశపు లక్షణం మీద, వాటిలో ఖనిజ లవణాలు సాంద్రీకరణ అంశంమీదా ఆధారపడి ఉంటుంది.

సరస్సులలోతు కొన్నిఅడుగులనుంచి సుమారు ఐదువేల అడుగుల లోతుకుమించి (సైబీరియాలోని బైకాల్ సరస్సు) ఉండవచ్చు. చాలాకొద్ది సరస్సులు మాత్రమే వెయ్యి అడుగుల లోతుకు మించి ఉన్నాయి. భూఉపరితలంమీద వర్షతప్రాంతాలలో, పీఠభూములమీద, మైదానాలలో, లోయలలో, సముద్రతీరాల వెంబడి సరస్సులు విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి. సరస్సులు చాలావరకు ఉపరితల ప్రవాహానికి అడ్డుఏర్పడినందువల్ల ఏర్పడినటువంటివే. ఇవి ఒకప్రదేశ క్రమక్రమచరిత్రలో తాత్కాలిక లక్షణాలు మాత్రమే. ప్రధాన భూజలతలఉపరితలంవద్ద లేదా దానికి దగ్గరగావున్న ప్రాంతాల సరస్సులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

సముద్రం, మహాసముద్రం అనే పదాలను భూఉపరితలం మీద విశాలమైన ప్రాంతాలను కప్పివున్న విశాలమైన, అవిచ్ఛిన్నమైన లవణజలరాసులకు వాడతారు. ఇవి భూఉపరితలాన్ని 71 శాతంమేర కప్పి ఉన్నాయి. విజ్ఞానశాస్త్ర పదజాలంలో మహాసముద్రం అనేపదాన్ని ఖండాలకు మధ్యనవున్న హరివాణాలనున్నాయి. ఆక్రమించి లోతైన, విస్తృత సముద్రజలరాసులకు వాడతారు. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ, ఆర్క్టిక్, అంటార్క్టిక్ మహాసముద్రాలు ఈకోషకు చెందినవి. వీటికన్న చిన్నవైన జలరాసులను సముద్రాలు అంటారు. ఉదాహరణకు అరేబియన్, నార్త్, ఎస్త్ సముద్రాలు. వీటిని ఎపికంటినెంట్ లో సముద్రాలు అంటారు. ఈ రకం సముద్రాలు ఖండాలను ఆనుకొనిఉన్న ఖండతీరపు అంచులను లేదా ఇరుకైన వేదికలను ఆక్రమించి ఉంటాయి. నిజానికి ఇవి ఖండాలవైపుకు విస్తరించిఉన్న విస్తృత, జావిశాలమహాసముద్రాల అగాధజలాలే అయితే సరస్సులు ఖండాంతరభాగాలలో వుంటాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. సరస్సు అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

8.2 నదుల భౌమ కార్యకలాపాలు

సరస్సులలో చాలా వాటికి నదులలోకి నీటినిచ్చే రేచు డెల్టాలేట్ రురులు ఉంటాయి. ఇటువంటి సరస్సులలో మంచి నీరు ఉంటుంది. ఇవి నదులకు రక్షకకవచాలుగా వుండి నది విస్తరణను నియంత్రించేస్తూ వరదలు రాకుండా కాపాడుతాయి. నదీజలాలను పరిరక్షణచేసి వరదనీటిని నియంత్రించేయడంలో నదులకు అడ్డంగాకట్టిన అనకట్టలు ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్తాయో ఇవికూడా అట్లాగే ఉపయోగపడ్తాయి. సరస్సులోకి ప్రవహించే రుచి లేదా నదిలోని వరదనీరు సరోవరహరివాణమంతటా క్రమేణా విస్తరించి నీటిమట్టాన్ని నెమ్మదిగా పైకిలేపుతుంది. కాబట్టి ప్రధానమైన డెల్టాలేట్ వల్ల లోయకు ఎటువంటి నష్టం కలుగదు. ఇదేవిధంగా ఎర్లడికాలంలో నీరు సరస్సునుంచి నెమ్మదిగా ప్రవహించడంవల్ల ప్రధాన రురులను పరిరక్షించడం జరుగుతుంది.

ఒకప్రాంతపు పరివాహవ్యవస్థలో సరస్సులు అవసాదన హరివాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి. రురులు సరస్సులలోకి మోసికొనివచ్చే అవక్షేపాలు సరస్సుల అడుగుకు చాలావరకు దిగిపోతాయి. డెల్టాలేట్ లేని సరస్సులు ఉత్తమమైన అవసాదన హరివాణాలుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు నాలుగు అప్పర్ గ్రేట్ సరస్సులలోకి నీటిని తీసుకొనివచ్చే నయాగరానది ఈ సరస్సునుంచి బయటకు ప్రవహించేటప్పటికి చాలావరకు స్వచ్ఛమైన నీటితో కూడి ఉంటున్నది. సరస్సులలోకి రురుల ద్వారా వచ్చే అవక్షేపభారం, ప్రవాహవేగం తగ్గిపోయి చివరకు పూర్తిగా ఆగిపోవడంవల్ల సరస్సు అడుగు భాగానికి శ్రేణీకరణచెంది క్రమేణా దిగిపోతుంది. ప్రపంచంలోని సరస్సులలో ప్రతినవతీరం చాలా పెద్దమొత్తాలలో వదార్థాలు పోగుపడ్డావుంటాయి. అయితే ఇది సముద్రతలంమీద పోగుబడి దానికంటే చాలా తక్కువే. డెల్టాలేట్ రురులలోని శిలారేణువులు సరస్సులలో ఆవక్షేపించబడతాయి. రురులు ఈవిధంగా తమకు క్రమక్షయ కార్యక్రమంలో పనికీవచ్చే శిలారేణువులను కోల్పోయినందువల్ల అవి క్రమక్షయం ఎక్కువగా జరుపలేకపోతాయి.

సరస్సులు వర్షపాతాన్ని అధికంచేసి, ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధంచేసి వాటి పరిసరప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితులపైన తమ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

చాలా సరస్సులలో ఎన్నోరకాల జలవృక్షాలు, కర్పరసహితజీవులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వుంటాయి. ఈ కర్పరాల అస్థివంజరాలు కొంతవరకు విఘటనచెందిన వృక్షశాస్త్రాలు సరస్సులలో పోగుబడి వాటిని నింపివేస్తాయి. పురాతన సరోవరనిక్షేపాలలో శిలాజస్థితిలో కనిపించే ఇటువంటి వదార్థాలు గతించిన భౌమయుగాలలోని జీవపరిణామ స్థాయిలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందజేస్తున్నాయి.

డెల్టాలేట్ లేని సరస్సులలోని నీరు ఉష్ణ, ఉపఉష్ణ మండలాలలో బాష్పీభవనం చెందిన పుడు వాటిలోని వివిధ లవణాలు సరస్సు నేలలపై పారలుగా, సంస్తరలుగా నిక్షేపణ చెందుతాయి. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో కొన్ని భౌమశిలావిన్యాసాలలో ఇటువంటి లవణ నిక్షేపాలు ఎన్నో వున్నాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

2. సరస్సుల భౌమ కార్యకలాపాలను గురించి తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

8.2.1 సరస్సుల ద్వారా క్రమక్షయం, నిక్షేపణ

సరస్సులవల్ల జరిగే క్రమక్షయం సముద్రాలవల్ల జరిగే క్రమక్షయాన్ని చాలావరకు పోలి ఉంటుంది. అయితే సరస్సులలో క్రమక్షయ ప్రభావం సముద్ర క్రమక్షయ ప్రభావం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

సరస్సులు సముద్రాలకంటే చిన్నవిగా వుండటం, సరస్సులలోని అలలశక్తి సముద్రపు అలలశక్తికన్నా తక్కువగా వుండడం దీనికి కారణాలు. అయితే పెద్ద సరస్సులలో క్రమక్షయం వల్ల రూపాందే అక్షణాలు సముద్ర క్రమక్షయం లక్షణాలను చాలావరకు పోలివుంటాయి. ఉదాహరణకు తరంగకృతవేదికలు, క్లిఫ్లు, గుహలు, కోవులు, స్టాక్లు, ఆర్ట్లను చెప్పకోవచ్చు.

ఇదేవిధంగా సరస్సులలో నిక్షేపణ సముద్రంలోని నిక్షేపణ మాదిరిగానే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా బీచ్లు, అవరోధకలు, బార్లు, డెల్టాలు, తరంగనిర్మితవేదికలు సముద్రంలో ఏర్పడినా, సరస్సులలో ఏర్పడినా అవి ఒకే విధంగా వుంటాయి. సముద్రాలలో ఏర్పడే అగాధనిక్షేపాలను పోలిన నిక్షేపాలు సరస్సులలో ఉండవు. సరస్సులలో చాలావాటిలో వాటి అడుగు భూభాగంనుంచి ఝరులు మోసికొనివచ్చిన అవక్షేపాలు పోగుబడివుంటాయి. సముద్రాలలో వున్నట్లు సరస్సులలో అటుపాట్లు ఉండవు. కాబట్టి సరస్సులలో డెల్టా వృద్ధి బాగా జరుగుతుంది. స్వచ్ఛజలసరస్సులలో కనిపించే ఒక లాక్షణికమైన నిక్షేపం, మార్ల్. ఇది శేతభూసరవర్షంలో వుండే క్లే, కాలియంకార్బోనేట్ల మిశ్రమం. ఇది తరచుగా ఐదునుంచి యిరవై అడుగుల వరకు మందం వున్న సంస్తరాలుగా కనిపిస్తుంది.

సరస్సులలో అవపాతనం చెందే రసాయన నిక్షేపాలు చాలా లాక్షణికంగా వుంటాయి. అవణ సరస్సులు ఉష్ణవాతావరణంలో బాష్పీభవనం చెందినప్పుడు ద్రావణస్థితిలో వున్న ఖనిజాలు బాగా సాంద్రీకృతమౌతాయి. బాష్పీభవనం అవిచ్ఛిన్నంగా జరిగినప్పుడు నీరుఇగిరిపోయి ద్రావణంలోవున్న ఖనిజాలన్నీ నిక్షేపణచెందుతాయి. అవణసరస్సులోని జలాల్లో ఎక్కువపరిమాణంలో వుండే ఖనిజాలు హైలైట్, జిప్సమ్, గ్లాంబర్ సాల్ట్, ఎప్పంలవణం, మెగ్నీషియమ్ క్లోరైడ్, కాలే సైట్ లవణాలు వుండే నీరు ఇగిరిపోయేటప్పుడు కరిగిన పదార్థాలు వాటి అద్రావణీయతాక్రమంలో నిక్షేపణ చెందుతాయి. వరాకాలంలో వరద నీరు చేరడంవల్ల ద్రావణాలు పల్చబడి ఖనిజ పదార్థాలు అవపాతం చెందడానికి వీలులేకుండా పోతుంది. అటువంటి పరిస్థితులలో లవణాలకు బదులుగా భూభాగం నుంచి వచ్చిన అవక్షేపాలు సరస్సుల అడుగుభాగాలలో పోగుపడ్తాయి. పురాతన సరోవరనిక్షేపాలలో క్లే లేదా ఇసుకపోరలు అవణసంస్తరలు ఏకాంతరంగా ఉండటానికి కారణం ఇదేనని భావిస్తున్నారు. పురాతన అవణసరస్సుల స్థలాలలో ప్రస్తుతం విస్తృతమైన సోడా, బొరాక్స్ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కాలిఫోర్నియాలోని డెత్ లోయ.

8.3 తంపర భూములు

తడిగాను, బురదగా సంతృప్తిలలతో వుండి సామాన్యంగా విఘటన చెందుతున్న వృక్ష సంబంధ పదార్థాలతో నిండి ఉన్న ప్రాంతాన్ని తంపర భూములు అంటారు. వీటి అభివృద్ధి భూగర్భజల తలమట్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇటువంటి ప్రదేశాలలో ఉపరితల జలప్రవాహం నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. లేదా పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. తంపర భూములు సరస్సులకు, పొడి నేలకు మధ్యస్థంగా ఉన్న స్థితిని సూచించే హరివాణాలను ఆక్రమించి ఉంటాయి. నిజానికి చాలా హరివాణాలు తంపర భూములకు సరస్సులకు మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. తంపర భూములు చాలావరకు సరస్సులు, మంద ప్రవాహాలనుంచి ఏర్పడినవే. కొన్ని తంపరభూములు చదునైన ప్రదేశాలను ఆక్రమించి ఉంటాయి. ఇటువంటి ప్రదేశాలలో కేవలం వృక్షాల పెరుగుదలవల్ల ఉపరితలజలాలు కాలువలుగా, ఝరులుగా ఏర్పడటానికి వీలులేకుండా పోతుంది. వేళ్ళు, కాడలు నీటిని విస్తరింపజేస్తాయి. సాషేక్షంగా చదునుగా వుండి, నీటిసరఫరా పుష్కలంగాను పరివాహం స్వల్పంగానున్న విశాలప్రాంతాలలో తంపర భూములు ఏర్పడటానికి వీలున్నది. ఇటీవలి హిమానీనదన నిక్షేపాలు గల మైదాన ప్రాంతాలలో, పరివాహం స్వల్పంగా వున్న చోట్ల, వరద మైదానాలలోను, ప్రధాననదుల డెల్టాప్రాంతాలలో, పరివాహం స్వల్పంగా వున్నచోట్ల, వరదమైదానాలలోను, ప్రధాన నదుల డెల్టాప్రాంతాలలో, విశాలంగా, లోతుతక్కువగా వున్న ఖండతీరపు అంచులకు ఆనుకొనివున్న తీరప్రాంతాల వెంబడి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. తంపరభూములకుమంచి ఉదాహరణలు- ఉత్తర మధ్య U.S.A.లోను, కెనడా దేశపు కొన్ని భాగాలలోను, రష్యా తూర్పుప్రాంతంలోను వున్నాయి. తంపర భూములలో పోగుపడే అవక్షేపాలలో పీట్ (పాక్షికంగా విఘటన చెందిన వృక్షపదార్థం) వంటి ఆర్గానిక్ పదార్థం ఎక్కువ మొత్తాలలో వుంటుంది.

పాండ్ విల్లోలు, వాటర్ పీడ్లు, రష్లు మొదలైన జలవృక్షాలు కూడా వుంటాయి. నీటి ఉపరితలం అడుగున సూక్ష్మజీవులు వృక్ష సంబంధ పదార్థాలపై పనిచేసి వాటిని విఘటనకు గురుచేస్తాయి. సూక్ష్మజీవులు విషపూరితమైన కొన్ని నిరుపయోగ పదార్థాలను విసర్జిస్తాయి. ఈ విషపూరిత పదార్థాలు కొంత సాంద్రీకరణను పొందినప్పుడు సూక్ష్మజీవాలు మరణిస్తాయి. పాక్షికంగా విఘటన చెందినవృక్షపదార్థం మిగిలిపోతుంది. దీనినే పీట్ అంటారు. ఎండిన పీట్ కు మండే లక్షణం వున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలలో దానిని ఇంధనంగా వాడతారు. నిజానికి వృక్షపదార్థాలు నేలబొగ్గుగా రూపాంతరం చెందటంలో పీట్ మొదటి దశ. తంపరభూములలో ఇనార్గానిక్ ప్రధాన అవక్షేపాలు క్లే, సిల్ట్ కూడా పోటీపడ్డాయి. ఖనిజ సంబంధ అవక్షేపాలకు పీట్ మధ్యశ్రేణీకరణ సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. పురాతన తంపరభూములలోకి ఝరులు మోసికొనివచ్చిన ఖనిజరేణువులతో కూడుకొని ఉండే మలినసహితమైన క్లే బొగ్గునుంచి ఈ విషయం విధితమౌతుంది. మానవజాతి ఉపయోగించే ఎన్నో ప్రకృతిసిద్ధమైన పదార్థాలను సరస్సుల నీటినుంచి, సరస్సులలోను, తంపర భూములలోను పోగుపడిన నిక్షేపాలనుంచి సేకరిస్తున్నారు. వుప్పునీటి సరస్సులలో తెల్లని సుద్దు మార్ల్ రూపంలో వుండే కాల్షియమ్ కార్బోనేట్ నిక్షేపాలు విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. ఇది వ్యవసాయానికి, కొంతమేరకు సిమెంట్ పుత్తుతిలోను పునయోగపడుతుంది. కొన్ని సరస్సులలో జీవించిన డయాటమ్లనుంచి ఏర్పడిన డయాటమేషియన్ ఎర్త్ నిక్షేపాలు అపమర్దక, ఉష్ణనిరోధక పరిశ్రమలలో ఉపయోగపడ్డాయి. యూరేన్ లోని ఎన్నో ప్రాంతాలలో పీట్ నిక్షేపాలను గృహోపయోగకరమైన ఇంధనంగా వాడుతున్నారు. సాగుబడి క్రిందకు తీసికొనివచ్చిన ఎన్నో తంపరభూమి ప్రదేశాలలో వ్యవసాయానికి పనికివచ్చే పుత్తమమైన హ్యూమస్ మృత్తికలు విస్తారంగా వున్నాయి. హోలెండ్ లోను, U.S.A. తూర్పుభాగంలోను ఇటువంటి ప్రదేశాలు కనిపిస్తాయి.

8.4 సరోవర హరివాణాల ఉద్భవం

సరస్సులు ఎన్నో విధాలుగా ఏర్పడతాయి. సరస్సులలో చాలాభాగం క్రమక్రమ నిక్షేపణ ప్రతి క్రియవల్ల రూపొందినవే. అయితే కొన్ని కొన్ని అగ్నివర్షత చర్యవల్ల కూడా ఏర్పడ్డాయి. సరోవర హరివాణాలలో కొన్ని ముఖ్య రీతులను కింద వర్ణించాం.

8.4.1 హిమానీనదనంవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

ఇటీవలి కాలంలో హిమానీనదాలవల్ల కప్పబడిన ప్రాంతాలలో సరస్సులు చాలా అధికసంఖ్యలో వున్నాయి. హిమానీనదకృత సరస్సులు క్రమక్రమంవల్ల లేదా నిక్షేపణవల్ల లేదా యీ రెండింటివల్ల ఏర్పడినటువంటివే. వీటిలో ఎక్కువ భాగం హిమానీనదకృత శిథిలశిలాఖండాలు లోయలకు, ప్రవాహ మార్గాలకు అడ్డుపడే విధంగా నిక్షేపణ చెందడం వల్ల రూపొందాయి. మిన్నెసోటా, విస్కాన్సిన్, న్యూయార్క్, న్యూఇంగ్లాండులలో వున్న వేలకొలది సరస్సులు ఈరకానికి చెందినవి. టెబెట్ లోని వివిధ పరిమాణాలుగల అసంఖ్యాకమైన సరస్సులు నదీలోయలలో మొరైన్లు అడ్డుపడటంవల్ల ఏర్పడినవే.

హిమానీనదాలు లోయలలో అడ్డంగా నిలిచి నీరుఒకచోట చేరడానికి దోహదించేస్తాయి. ఈరకం సరస్సులు ఆర్క్స్, గ్రీన్ లాండ్, అలాస్కాలో వున్నాయి. ఉత్తర అమెరికాలోని గ్రేట్ సరస్సులు ప్రపంచంలోని పెద్దసరస్సులలో అతి ముఖ్యమైనవి. ప్రపంచంలోని అతి పెద్దమంచినీటి సరస్సు అయిన సుపీరియర్ సరస్సు 1060 కి.మీ. లోతు వున్నది. గ్రేట్ సరస్సులు సుమారు 243 వేల చదరపు కి.మీ. విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి వున్నాయి. ఈ విశాలహరివాణాలు ప్రధానంగా హిమానీనదనానికి పూర్వం వున్న విశాల లోయప్రాంతాలలో హిమచర్యవల్ల రూపొందాయి. హిమానీనదకృత సరస్సులలో చాలాభాగం ప్రవహించేముందు జరిపిన ప్రత్యక్ష క్రమక్రమచర్య వల్లే ఏర్పడ్డాయి. ఉదాహరణకు సిరానవాడా, కాస్కేడ్, రాకీ, ఆల్ప్స్, హిమాలయ పర్వతాలలోని హిమజల సరస్సులను చెప్పవచ్చు. ఒక్క ఫిన్ లాండ్ లోనే 60వేలకు మించి హిమానీనదకృత సరస్సులు

వున్నాయి. హిమానీనదనావికి పూర్వం పున్న లోయకు హిమానీనదచరిత్రద్రవ్యం పాక్షికంగా అడ్డుపడటం వల్ల సరస్సులు ఒక వరుసలో ఏర్పడవచ్చు.

8.4.2 నదులవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

నదులవల్ల జరిగే క్రమక్షయం, నిక్షేపణం రెంటిల్లా సరోవరహరివాణాలు రూపొందవచ్చు. వరద మైదానాలలో చాలాచోట్ల వక్రతలను చూపే నదులవల్ల ఎన్నో గాఢసరస్సులు ఏర్పడ్డాయి. నదీవక్రతలు నదులనుంచి వేరు అయినప్పుడు ఆక్స్-బౌ సరస్సులు ఏర్పడతాయి. నదీలోయల చివరిభాగాలలో, డెల్టాతలాలమీద నదిపాయలుగా చీలిపోతుంది. ఈ పాయలవల్ల జరిగే భేదాత్మక నిక్షేపణ కారణంగా డెల్టా ప్రాంతాలలో నిక్షేపాలు చుట్టూ పోగుపడటంవల్ల కొన్ని గాఢహరివాణాలు ఏర్పడవచ్చు. ఇవి డెల్టా సరస్సులుగా రూపొందుతాయి. నైల్, డాన్యుబ్, మిసిసిసి నదుల డెల్టాలలో ఇటువంటి సరస్సులేర్పడ్డాయి.

8.4.3 భూగర్భజలాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

సున్నపు రాళ్ళు ఉన్న ప్రదేశాలలో గుహల, కందకాల వైకవ్వు భాగాలు కూలడంవల్ల ఏర్పడే నిమజ్జనకృత రంధ్రాలు నీటితో నిండినప్పుడు చిన్న సరస్సులు ఏర్పడతాయి. ఫ్లోరిడాలోను, కెంటకీ, టెన్సిసిలలో ఉన్న కార్స్ట్ (Karst) స్థలాకృతిలోని సరస్సులు ఈ విధంగా ఏర్పడినవే.

8.4.4 సముద్ర తరంగతీర ప్రవాహాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

సరస్సులు, సముద్రాలలోని తరంగాలవల్ల తీరస్థప్రవాహాల చర్యలవల్ల ఏర్పడే ఇనక, గ్రావెల్ రోధ కల కారణంగా కొన్ని సరస్సులు ఏర్పడతాయి. వీటిని లెగూన్లు అంటారు. ఇటువంటి సరస్సులు ఉత్తర అమెరికా అట్లాంటిక్ తీరంవెంబడి, న్యూయార్క్ నుంచి పనామా వరకు ఎన్నోఉన్నాయి. పనామాలవల్ల రవాణా అయిన ఇసుక కూడా చేరడంవల్ల క్రొత్తగా ఏర్పడిన సరస్సు సముద్రంనుంచి పూర్తిగా విడిపోతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన సరస్సులు మొదట ఉప్పునీటితో ఉంటాయి. తరవాత కాలక్రమేణా వాటిలో చేరే స్వచ్ఛజలం పరిమాణం అధికంకావడంవల్ల అవిక్రమంగా మంచినీటి సరస్సులుగా మారవచ్చు. భారతదేశంలో మద్రాసుకు ఉత్తరంగా ఉన్న పులికాట్ సరస్సు, ఒరిస్సా తీరంలోని చిల్కాసరస్సు ఈ రకానికి చెందినవి. పులికాట్ సరస్సు ఉప్పునీటితో ఉన్న గాఢ లెగూన్ సరస్సు. దీని పొడవు 60 కి.మీ. వెడల్పు 5 కి.మీ నుంచి 16 కి. మీ. వరకు ఉంది. దాని లోతు చాలా తక్కువ. సగటు లోతు 2 మీటర్లు. చిల్కా సరస్సుకూడా గాఢ లెగూన్ సరస్సే. ఇది సముద్రం నుంచి ఇనకరోధిక కారణంగా వేరుపడింది. ఇది 70 కి.మీ. పొడవు, 32కి.మీ. వెడల్పు, 3 మీటర్ల లోతు ఉంది.

8.4.5 పవనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

పవనాలు తరచుగా సముద్ర, సరోవరశాఖలకు అడ్డంగా ఇనకను నిక్షేపణ చేయడం వల్ల సరస్సులు ఏర్పడతాయి. పవనాలు రవాణా చేసిన ఇనకనదులను స్థానికంగా మూసివేసి నీటిగుండాలు ఏర్పడేటట్లు చేస్తుంది. ఇనకదిబ్బలలోని గోతులు నీటితోనిండి చిన్నసరస్సులుగా ఏర్పడతాయి.

8.4.6 బృహత్ పవనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

పంక ప్రవాహాలు, భూపాతాలవంటి బృహచ్ఛలనాలవల్ల శిథిలశిలాపదార్థాలు లోయలకు, అగాధాలకు అడ్డుగా నిలుస్తాయి. ఇది ఘుళ్ళంగా ఉన్నత ప్రాంతాలలో జరుగుతుంది. యూరప్, ఆసియా ఉత్తర అమెరికాలోని పర్వతప్రాంతాలలో ఈ విధంగా ఏర్పడిన సరస్సులు చాలా ఉన్నాయి. కొలారాడోలోని సాన్క్రిస్టోబల్ అనే సరస్సు మంచి ఉదాహరణ. భారతదేశంలో 1892లో ఒక గొప్ప భూపాతం ఎగువ గంగానదికి అడ్డం పడటంవల్ల 8కి.మీ. పొడవుగల సరస్సు తాత్కాలికంగా ఏర్పడి, తరువాత అనకట్టగా పడినశిలలు కొట్టుకొని పోవడంవల్ల 2 సంవత్సరాలలో అదృశ్యమయిపోయింది.

8.4.7 భూపటలచలనాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

భూపటలంలోని ఒక ఖండం మరొక ఖండానికి అనుకూలంగా భ్రంశికరణవల్ల వైకిగాని కిందికిగాని జరిగినప్పుడు ద్రోణి వంటి హరివాణం ఏర్పడుతుంది. U.S.A.లోని ఉటా, ధానికి అనుకూని వున్న ఇతర రాష్ట్రాలలో విరూపకారక హరివాణాలు చాలా వున్నాయి. గ్రేట్ సాల్ట్ సరస్సు భూపటలంలోని ఒక పెద్ద ఖండం భ్రంశంవల్ల క్రిందికి జారడం మూలంగా ఏర్పడింది.

ఆఫ్రికా, ఆసియాలలోని గొప్ప విదీర్ణదరులన్నీ విరూపకారక హరివాణాలకు మంచి ఉదాహరణలు. జోర్డాన్ నది, డెడ్ సీ, ఎర్రసముద్రం, ఎగువ నైల్, లాంగసీకా, లియోపాల్డ్, న్యాసా వంటి తూర్పు ఆఫ్రికా సరస్సులు విదీర్ణదరులలో ఏర్పడినవే. భూకంపాలవల్ల రూపొందిన గుండాలో కూడా సరస్సులు ఏర్పడవచ్చు. పశ్చిమ టెన్సెసీలోని రీల్ ఫుల్ సరస్సు 1911-1912లో సంభవించిన గొప్ప భూకంపంవల్ల ఏర్పడింది.

భేదాత్మక చలనం మూలంగా భూపటలం వంపులు తీరగటంవల్ల నదీలోయలలో ఒక భాగం వైకిలేవడం మూలంగా నదీప్రవాహం ఆగిపోయి సరస్సు ఏర్పడవచ్చు. స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవా సరస్సు, కెనడాలోని టెమిస్కావిన్ సరస్సు మంచి ఉదాహరణలు.

8.4.8 అగ్నిపర్వతాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

అగ్నిపర్వతచర్యవల్ల సరస్సులు ఏర్పడవచ్చు. లావా ప్రవాహాలు నదీలోయలకు అడ్డంగా ఆన కట్టలుగా ఏర్పడి తాత్కాలికంగా సరస్సు రూపొందడానికి దోహదం చేస్తాయి. కొన్ని సరస్సులు విలుప్త అగ్నిపర్వతాల ముఖద్వారాలలో కూడా ఏర్పడతాయి. ఇవి చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలకంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి. U.S.A. లోని అరిజోనా, కెనడా, కాలిఫోర్నియా, ఒరెగాన్ రాష్ట్రాలలో ఇటువంటి సరస్సులెన్నో వున్నాయి. వీటి అన్నింటిలోకి ముఖ్యమైనది ఒరెగాన్ లోని క్రేటర్ సరస్సు. పాలస్తీనాలోని గెలిలిసరస్సు జోర్డాన్ నదికి అడ్డంగా లావా ప్రవహించడంవల్ల ఏర్పడింది. ఇది సముద్ర మట్టానికి 210 మీటర్ల దిగువన ఉన్నది.

8.4.9 అసాధారణకారణాలవల్ల ఏర్పడే హరివాణాలు

పెద్ద ఉల్కలు భూమిమీద పడ్డప్పుడు పెద్ద గోతులేర్పడి సరస్సులుగా మారతాయి. కెనడాలోని ఉత్తర క్వీబెక్ లోపున్న క్రెబ్ సరస్సు ఈ విధంగానే ఏర్పడినదే.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

3. సరస్సులు ఎట్లా ఏర్పడతాయో తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 సరస్సులు ధ్వంసంకావడం

కాలక్రమేణా సరస్సులు కిందికారణాలవల్ల నెమ్మదిగా అదృశ్యంగావచ్చు.

1. అవక్షేపాలతో నిండిపోవడంవల్ల : సరస్సులలోకి ప్రవహించే నదులు, కాలవలు అవక్షేపాలను మోసుకొస్తాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం సరస్సుల భూతలం మీద పోగుపడతాయి. దీనివల్ల సరస్సులు పూర్తిగా నిండిపోయి అదృశ్యం కావచ్చు.

2. జీవుల అవశేషాలతో నిండిపోవడంవల్ల : ఆర్థికవృద్ధితోవృద్ధి అన్న ప్రాంతాలలో లోతు తక్కువగా ఉండే సరస్సుల తీర భాగాలలో వృక్షాలు సమృద్ధిగా వృద్ధి చెందుతాయి. వృక్షాలు నశించి నప్పుడు వాటి అవశేషాలు పోగుబడి తంపర భూములుగా మారి అన్నివైపులనుంచి సరస్సులు నిండి పోతాయి. ఈ విధంగా వృక్ష పదార్థాలు, జీవుల కర్పరాలు పోగుపడడంవల్ల సరస్సు నిండి పోతుంది. అదృశ్యమవుతుంది.

3. డైట్ లెట్ అధిక్షయంవల్ల : సరస్సుల ఆనకట్టలు, ముఖ్యంగా హిమానీనదకృత శిథిలశిలా ఖండాలలో ఏర్పడినవి నదులు పదార్థాలలో ఏర్పడి ఉంటాయి. వీటిని డైట్ లెట్ ఝరులు సులభంగా కొసి వేస్తాయి. దీనివల్ల సరస్సు ఉపరితలం క్రమంగా కోతకు గురై సరస్సు కనిష్ట మట్టాన్ని చేరడంవల్ల నీరుపోయి సరస్సు అదృశ్యంఅవుతుంది.

4. మంచు ఆనకట్టలు తొలగిపోవడంవల్ల : ఒక ఉపనది లోయకు హిమానీనదం అడ్డం పడటం వల్ల నీరుచేరి రూపొందిన సరస్సు, హిమానీనదం తొలగి పోవడంవల్ల నీటిని కోల్పోయి అదృశ్యమవుతుంది. అదేవిధంగా హిమానీనదం కరిగిపోవడంవల్లకూడా సరస్సు అదృశ్యంకావచ్చు.

5. బాష్పీభవనం వల్ల : శుష్కప్రాంతాలలో సరస్సుల లోనికి చేరేనీటి కంటే బాష్పీభవనంవల్ల పోయే నీటిమొత్తం ఎక్కువ కావడంవల్ల సరోవరహరివాణాలు ఎండిపోతాయి.

6. భూపటల చలనాలవల్ల : చిన్న సరస్సులు భూకంపాల వల్ల ఏర్పడ్డ పగుళ్ల ద్వారా నీటిని కోల్పోయి అదృశ్యంకావచ్చు. పెద్ద పెద్ద సరస్సులు వాటి డైట్ లెట్ ప్రాంతాలు అభిభ్రంశం చెందడం వల్ల నాశనం కావచ్చు.

8.6 సరస్సులలోని ప్రత్యేక రకాలు

8.6.1 లవణ సరస్సులు

లవణ సరస్సులు లేదా ఉప్పు నీటిసరస్సులు రెండు విధాలుగా ఏర్పడవచ్చు. 1. డైట్ లెట్ లు లేని సరస్సులలో లవణ పదార్థం పోగుపడటం వల్ల, 2. సముద్రశాఖలు భూపటల చలనాలవల్ల లేదా అవక్షేపాల నిక్షేపణ వల్ల సముద్రంనుంచి విడిపోవటంవల్ల. కాస్పియన్ సముద్రం వంటి లవణ సరస్సులు ఈ రెండవ రకానికి చెందినవి. లవణ సరస్సులు, మంచినీటి సరస్సుల కంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. వీటికి డైట్ లెట్ లు ఉండవు. ఇవి ప్రధానంగా ఉష్ణప్రాంతాలలో ఉంటాయి. ఇటువంటి ప్రాంతాలలో వర్షపాతం, సరస్సులలోకి చేరే నీరు తక్కువగా ఉండటంవల్ల నీరు బయటకు పొర్లదు. అందువల్ల ఈ సరస్సులకు డైట్ లెట్ లు ఏర్పడవు. బాష్పీభవనం జరిగేకొద్దీ లవణాల సాంద్రీకరణ పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా మంచినీటిసరస్సు క్రమంగా లవణజలసరస్సుగా మారిపోతుంది. డైట్ లెట్ లు లేకపోవడం ఖనిజ లవణాలు క్రమేణా పెరగడం దీనికి కారణాలు. ఉటాలోని గ్రేట్ లవణ సరస్సు దీనికి మంచి ఉదాహరణ.

8.6.2 క్షార సరస్సులు

క్షార కార్బోనేట్ లు అత్యధిక పరిమాణాలలో ఉన్న సరస్సులను క్షారసరస్సులు అంటారు. ఇవి ఈజిప్ట్, హంగేరీ, చెనిజాలా మొదలైన దేశాలలో చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. ఇవి లవణసరస్సులలో ఒక ప్రత్యేకమైన రీతికి చెందినవి.

8.6.3 ప్లామా సరస్సులు

ఎడారి ప్రాంతాలలో వననాల చర్యవల్ల చదునైన పీఠాలుగల గాడగుండాలు ఏర్పడతాయి. వర్షాకాలంలో వీటిలోకి నీరు చేరుతుంది. సరస్సులలో తరవాత నీరు ఇగిరిపోయి సరస్సులు కుంచించుకుపోతాయి. నీరు ఇగిరడంవల్ల ఏర్పడిన క్షౌరలవణాలు ఈ సందర్భంలో పొరలుపొరలుగా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఒక్కొక్కప్పుడు మంచువలె తెల్లగా ఉంటాయి. ఇటువంటి సరస్సులు గ్రేట్ బేసిన్, అరిజోనా, న్యూమెక్సికో ఎడారులలో కనిపిస్తాయి.

8.7 భారత దేశపు సరస్సులు

భారత దేశంలో సరస్సులు చాల తక్కువ సంఖ్యలోను, దూరదూరంగాను ఉన్నాయి. ద్వీపకల్ప భాగంలో ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి. సముద్రతీరం వెంబడి రోధికలు, డెల్టాల వల్ల కొన్ని సరస్సులు ఏర్పడ్డాయి. వశ్చిమ తీరం వెంబడి కేరళలో కొన్ని సరస్సులు ఉన్నాయి. వాటిని స్థానికంగా 'కాయల్లు' అంటారు. ఇవి అరేబియన్ సముద్రం నుంచి సన్ననిరోధికల కారణంగా ఏర్పడ్డాయి.

తూర్పు తీరంవెంబడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పులికాట్ సరస్సు. ఒరిస్సాలోని చిల్కా సరస్సు ముఖ్యమైన లవణసరస్సులు.

8.7.1 కొల్లేరు సరస్సు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న కొల్లేరు సరస్సు మంచినీటి సరస్సు. ఇది బహుశా కృష్ణా, గోదావరి నదుల డెల్టాలవృద్ధి వల్ల ఏర్పడి ఉండవచ్చు. దీని లోతుతక్కువ. సుమారు 260 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణముంది. బుడమేరు నది వల్ల దీనిలోకి ఒండలిచేరుతున్నది.

8.7.2 సాంబార్ సరస్సు

సాంబార్ సరస్సు జోధ్ పూర్, జయపూర్ సరిహద్దులో వుంది. ఇది సముద్ర మట్టానికి 360 మీటర్ల ఎత్తులో వుంది. విస్తీర్ణం సుమారు 230 చ.కి.మీ. ఇది ఎండాకాలంలో అనార్థంగా కచ్చవభూమిలావుంటుంది. దీనిలోని లవణపు బురదల నుంచి లవణాన్ని సేకరిస్తారు.

8.7.3 లోనార్ సరస్సు

లోనార్ సరస్సు దక్కను పీఠభూమి అయిన మహారాష్ట్రలోని బుల్ధానా జిల్లాలో ఉంది. దీని వ్యాసం సుమారు 1.5 కి.మీ. పరిసర ప్రదేశాల కంటే 90 మీటర్ల లోతున ఉంది. వర్షాకాలం దీనిలో నీరుచేరి ఎండాకాలంలో ఇగిరిపోవడం వల్ల దీనిలో సోడియమ్ కార్బోనేట్, సోడియమ్ క్లోరైడ్ పొరలు ఏర్పడతాయి.

8.7.4 నల్ సరస్సు

నల్ సరస్సు అహమ్మదాబాద్ కు దగ్గరగా ఉంది. ఇది ఒకలవణసరస్సు. విస్తీర్ణం సుమారు 130 చ.కి.మీ. ఇది సౌరాష్ట్ర, గుజరాత్ ల మధ్య సముద్ర శాఖ వేరుకావడంవల్ల ఏర్పడింది.

8.8 సారాంశం

ఈ భాగంలో సరస్సుల భౌమ కార్యకలాపాలు, భౌమ చర్యలను గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాం. వీటి భౌమచర్య క్రమక్రమ, నిక్షేపణ దశలలో జరుగుతుంది. సరోవర హరివాణాలు వివిధంగా ఉద్భవిస్తాయో వివరించాం. సరస్సులలోని రకాలను గురించి, కొన్ని భారతదేశపు సరస్సుల గురించి ప్రస్తావించాం.

8.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. తగినంత పరిమాణంలో భూఉపరితలంమీద ఉన్న ఖండాంతర హరివాణాన్ని ఆక్రమించి ఉన్న నిశ్చల జలరాశిని సరస్సు అంటారు. ఇవి పరిమాణంలో చిన్న గుంటల నుంచి వేల కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి ఉండే విశాల జలసముదాయాలవరకు ఉండవచ్చు. నీరు మంచినీరు కావచ్చు, ఉప్పు నీరు కావచ్చు.
2. సరస్సుల భౌమ కార్యకలాపాలు
 - i) వరదలను నివారిస్తాయి.
 - ii) ఎద్దడి కాలాలలో నదులకు నీటిని సరఫరా చేస్తాయి.
 - iii) పరివాహవ్యవస్థలో అవసాదన హరివాణాలుగా పనిచేస్తాయి.
 - iv) స్థానికశీతోష్ణస్థితిని నియంత్రిత చేస్తాయి.
 - v) పురాతనపు సరోవరనిక్షేపాలలో భద్రమై ఉన్న శిలాజకర్పరాలు ఆకాలపు జీవసంతతి గురించి తెలుసుకోవడంలో తోడ్పడతాయి.
 - vi) డాట్ లెట్లు లేనప్పుడు వాటిలో లవణాలు నిక్షేపణ చెందుతాయి.
3. సరోవర హరివాణాల ఉద్భవానికి కారణాలు
 - i) హిమానీనదనం
 - ii) నదులచర్య
 - iii) భూగర్భజలాల చర్య
 - iv) తరంగాలచర్య, తీరప్రవాహాల చర్య
 - v) పవనాల చర్య
 - vi) బుఫాల్ చలనం
 - vii) భూపటలచలనాలు
 - viii) అగ్నిపర్వతచర్య
 - ix) ఉల్కాపాతం వంటి అసాధారణ కారణాలు

8.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. సరోవర హరివాణాల ఉద్భవాన్ని వివరించండి?
2. సరస్సుల భౌమకార్యకలాపాలను చర్చించండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. సరోవర నిక్షేపాలను గురించి క్లుప్తంగా రాయండి?
2. సరస్సుల ఏవిధంగా అదృశ్యమౌతాయో వివరించండి?

భాగం-9 : సముద్రాలు, వాటి చర్య

పాఠ్యాంశాలు

- 9.0 అక్ష్యాలు
- 9.1 పరిచయం
- 9.2 సముద్రాలలోని రకాలు
- 9.3 సముద్రాల భౌమకార్యకలాపాలు, ప్రాధాన్యం
- 9.4 మహాసముద్ర హరివాణాలనిమోన్నతరూపురేఖలు
- 9.5 మహాసముద్రాల సాధారణ అక్షణాలు
 - 9.5.1 సముద్రజలస్వభావం
 - 9.5.2 ఉష్ణోగ్రత, సాంద్రత, పీడనం
 - 9.5.3 సముద్రంలోని జీవరాశులు
- 9.6 సముద్రజలచలనం
- 9.7 సముద్రాలభౌమచర్య
 - 9.7.1 క్రమక్షయం
 - 9.7.2 నిక్షేపణ
- 9.8 సారాంశం
- 9.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు
- 9.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

9.0 అక్ష్యాలు

మహాసముద్రాలు, నాటి భూతల స్వభావంగురించి, వాటి భౌమ చర్యను గురించి చెప్పడం ఈ భాగం ఉద్దేశం.

ఈ భాగం పూర్తి చేసేసరికి మీకు ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి.

- సముద్రాలలోని రకాలు
- సముద్రాల భౌమకార్యకలాపాలు, ప్రాధాన్యం
- మహాసముద్ర హరివాణాల నిమోన్నత, సాధారణ రూపురేఖలు
- సముద్రాల భౌమచర్య

9.1 పరిచయం

సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు భూఉపరితలాన్ని 71% మేర కప్పిఉన్నప్పటికీ వాటి గురించి మనకు తెలిసినది ఖండాలను గురించి తెలిసినదానికంటే చాలా తక్కువే. ఇటీవలి కాలంవరకూ మహాసముద్రభూతలాలను గురించి ఏమీ తెలియదు. మహాసముద్రం అనేది భూఉపరితలంమీద ఉన్న హరివాణాల వంటి విశాలగుండాలను ఆక్రమించిన మహాసముద్రాలు. ఇవి సుమారుగా 360 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాయి. సగటు లోతు 3600 మీటర్లకు పైగా

ఉంటుంది. ఇది ఖండాల సగటు ఉన్నతి-810 మీటర్ల కన్నా ఎంతో ఎక్కువ. డక్సిటార్లగోళాన్ని అప్పుడప్పుడు జలార్లగోళం అంటారు. డక్సిటార్లగోళంలో దాదాపు 80% విస్తీర్ణాన్ని సముద్రాలు కప్పిఉండడమే దీనికి కారణం. 35°-65° డక్సిట అక్షాంశాల మధ్య సుమారు 98% ఉపరితలాన్ని సముద్రాలు కప్పిఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు మహాసముద్రాలలో అంచనా కట్టిన గరిష్ఠమైన లోతు 10690 మీటర్లు. ఈ లోతు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో మెరియానా ట్రెంచిలో గువాం, యాప్ డీప్లకు మధ్యస్థంగా ఉన్నది. ఈ లోతు భూభాగం మీద ఉన్న అతి ఎత్తైన పర్వతశిఖరం ఎవరెస్ట్ శిఖరంవెత్తు 8740 మీటర్లకన్నా ఎంతోఎక్కువ. భూఉపరితలమీద మిట్టపల్లానన్నిటిని తొలగిస్తే సముద్రపు నీరు భూమిఉపరితలమంతటా సుమారు 2.4 కిలోమీటర్ల మందగల పొరగా ఏర్పడుతుంది. గతించిన భౌమకాలంలో ఇటువంటి పరిస్థితి బహుశావచ్చిఉండదు. భవిష్యత్తులో కూడా సంభవించడానికి అవకాశం లేదు. గతించిన భౌమకాలంలో కూడా నేటి సముద్రాలు మహాహరివాణాలనే ఆక్రమించి ఉన్నాయి.

9.2 సముద్రాలలోని రకాలు

సముద్రం, మహాసముద్రం అనే పదాలను సాధారణంగా సమానార్థంతో ఉపయోగిస్తారు. భూఉపరితలం మీద విశాలప్రాంతాలను కప్పిఉన్న అవిచ్ఛిన్న లవణజలరాశులను ఈ పదాలు సూచిస్తాయి. అయితే విజ్ఞానశాస్త్రపదజాలంలో మహాసముద్రం అనే పదాన్ని ఖండాల మధ్యనున్న విశాల హరివాణాలను ఆక్రమించిన స్థూలలవణ జలరాశులకు వాడతారు. ఉదా: పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూమహాసముద్రాలు, వార్ట్ సముద్రం, ఎల్స్ సముద్రం, అరేబియన్ సముద్రం మొదలైన చిన్న లవణజలరాశులకు సముద్రం అనే పదాన్ని వాడతారు. ఇది ఖండభాగాల సరిహద్దుల బెంబడి ఉన్న సన్నని నివేదికలను (ఖండతీరపు అంచులను) ఆక్రమించి ఉంటాయి. అందుచేత వీటిని అధిఖండంతర సముద్రాలు లేదా తీరపుఅంచు సముద్రాలు అంటారు. నిజానికి ఇవి ఖండాలవైపుకు ఉన్న వివృతమైన విశాలమైన మహాసముద్రాల భాగాలే. ఖండంతర ప్రాంతాలలో ఉండి మహాసముద్రాలతో అంతగా కలయిక లేని గాఢలవణజలరాశులను ఎఫైరిక్ సముద్రాలు అంటారు. బాల్టిక్ సముద్రం, హడ్సన్ బే వీటికి ఉదాహరణలు. కొన్ని వేలమీటర్లలోతు ఉన్న ఎఫైరిక్ సముద్రాలను మధ్యధరా సముద్రాలు అంటారు. మధ్యధరా సముద్రం, కారిబియన్ సముద్రం వీటికి ఉదాహరణలు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. సముద్రాలలోని రకాలను పేర్కొని ఒక్కొక్క దానిని గురించి మూడు పంక్తులు రాయండి.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9.3 సముద్రాల భౌమకార్యకలాపాలు, ప్రాధాన్యం

భూమి మీద పడే వర్షపాతానికి అవసరమైన వాతావరణంలోని తేమను సముద్రాలే సమకూరుస్తాయి. భూతలం మీద క్రమక్షయకారకాలుగా పనిచేసే వివిధ స్థలాకృతులను రూపొందించే ఖండంతర జలాలకు మూలం యీ సముద్రాలే. ఖండభాగాలనుంచి క్రమక్షయప్రక్రియ ద్వారా రూపొంది నదులు తదితర

భౌమకారకాల ద్వారా రవాణా అయ్యే శిథిలశిలాఖండాలకు గమ్యస్థానం సముద్రాలే. సముద్రాలు ఉష్ణాన్ని నెమ్మదిగా గ్రహించి నెమ్మదిగానే విడుదలచేస్తాయి. అందువల్ల అవి శీతోష్ణస్థితిని క్రమబద్ధం చేస్తాయి. ఆహారంగా వచ్చేచేపలు, తదితరజీవరాశులను సముద్రం సమకూరుస్తుంది. అయితే భూవిజ్ఞానశాస్త్రజ్ఞుని దృష్టిలోసముద్రం భౌమకాలమంతటా ఆవక్షేపణకు ప్రధానమైన ప్రదేశంగా ఉన్నదనే విషయం. భూఖండభాగాలలో చాలాచోట్ల గాఢ సముద్రనిక్షేపాలు అన్ని భౌమయుగాలకు చెందినవని బహిర్గతమైనాయి. ఇటువంటి స్తరాలు అక్కడక్కడ ఎనిమిది నుంచి యిరవైనాలు కిలోమీటర్ల మందం మేరకు నిక్షేపించబడినాయి. చాలా సందర్భాలలో ఇవి పశీభవనం, భ్రంశీభవనం చెంది పైకెత్తబడి భూఖండభాగాలుగా రూపొందినాయి. ఇవి కాలక్రమేణా క్రమక్రయానికి గురికావడంవల్ల వాటిలో పొందుపరచబడిన విశేషాంశాలు బయటపడ్డాయి. గతించిన భౌమకాలాలలో జీవించి ప్రస్తుతం విలువైత చెందిన పుక్త, జంతు జాలాల అవశేషాలైన శిలాజాలు ఎన్నో సముద్ర సంద్రాలలో కనిపిస్తాయి. ఈ శిలాజాల నుంచి ఆయా జీవజాలాల రకాలను, చరిత్రను, పరిణామాన్ని, భూమిపై వందలకోలది మిలియన్ల సంవత్సరాలలో వాటి ఉనికిని గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దీర్ఘమైన భౌమ యుగాలంతటా సముద్రాలు వాటికి సమీపంగా ఉన్న భూభాగాలపై చర్యజరిపి ఎన్నో మార్పులను తేగలిగాయి.

9.4 మహాసముద్ర హరివాణాల నిమోన్నత రూపురేఖలు

సముద్ర భూతలం కొన్ని తరాల క్రితం భావించినట్లు మృదువుగా కాక భూఖండ ఉపరితలం మాదిరిగానే ఎన్నో మిట్టవల్లాలతో ఉన్నది. పొడవైన వర్వతశ్రేణులు, విడివిడికొండలు, వర్వతాలు, అగ్నివర్వతాలు, విశాలమైన సమతల ప్రదేశాలు, ట్రెంచ్‌లు, అగాధదరులు ఎన్నో సముద్ర భూతలం మీద కనిపిస్తాయి.

సముద్రహరివాణాలు భూఉపరితలాన్ని మూడింట రెండువంతులమేరకు ఆక్రమించి ఉన్నప్పటికీ సీరు అత్యధిక పరిమాణంలో ఉండటంవల్ల అది ఈ హరివాణాలను నింపి వాటిని ఆనుకొని ఉన్న భూఖండ భాగాల నిమ్నప్రాంతాలను కూడా ఆక్రమించింది. ఈ విధంగా ఆక్రమించిన నీటిలోతు కొన్ని వందల మీటర్లవరకు ఉంటుంది. ఈ విధంగా నీటి కింద మునిగిపోయిన ఖండతీరపు భాగాలు సుమారు 160 కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉంటుంది. సముద్రపీఠస్థలాకృతి లక్షణాలలో ముఖ్యమైనవాటిని కింది వర్ణించడంచేశాం.

ఖండతీరపు అంచు : నీటి కింద మునిగిఉండి దాదాపు చదునుగానున్న ఖండాల అంచుభాగాలను ఖండతీరపుటంచులు అంటారు. సముద్రమట్టానికి సుమారు 180 మీటర్ల దిగువన ఉంటాయి. దీని వెడల్పు 64 నుంచి 160 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఇది సముద్రంద్రవైపునకు చిన్న వాలుతో ఉంటుంది. దీనిలోతు కిలోమీటరు దూరానికి రెండు కిలోమీటర్ల చొప్పున పెరుగుతూ పోయి సుమారు 125 మీటర్ల వరకు పెరుగుతుంది. ఆ తరువాత సముద్ర భూతలం వాలు హఠాత్తుగా అధికమవుతుంది. తీరపుటంచులలో చాలాచోట్ల అడుగుభాగాన ఉండే పదార్థాలలో శిలలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇనక, బురద, గ్రావెల్ కూడా ఉండవచ్చు. భూపటల విరూపణవల్ల లేదా క్రమక్రయ, నిక్షేపణ ప్రక్రియల వల్ల, తీరరేఖ కృంగడం లేదా పైకి లేవడం కారణంగా ఖండతీరపు అంచుమారుతూ ఉంటుంది.

ఖండతీరపు వాలు : 125 మీటర్ల లోతు తర్వాత సముద్రభూతలం వాలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. భూతలం చివరిఅంచు క్రమేణా అగాధసముద్రభూతలంలో కలసి పోతుంది. వాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ భాగాన్ని ఖండతీరపువాలు అంటారు. దీని వెడల్పు కొన్ని పదుల కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఇది నిజానికి సముద్ర హరివాణాల అంచుగా మాత్రమే పరిగణించబడుతుంది. దీని విస్తీర్ణం ఖండతీరపుటంచు విస్తీర్ణానికి సుమారుగా రెండు రెట్లు ఉంటుంది. ఖండతీరపు వాలులను ఒకే విధంగా భూఖండ భాగాల అంచులుగా పరిగణిస్తారు. దీనిలోని శిలల పొంద్రత ఎక్కువ. ఇవి సముద్ర హరివాణపీఠంలో అత్యధికసాంద్రతల శిలల్లోకి క్రమేణా చేరిపోతాయి.

అగాధ సముద్ర భూతలాలు : ఖండతీరపు వాలు అడుగునుంచి సముద్రంలోనికి విస్తరించే ఈ భాగం మృదువైన మైదాన ప్రాంతంగా కాక, రిడ్జలు-కొన్ని వెడల్పైనవి, కొన్ని సన్ననివి పర్వతశ్రేణులు, చదునైన శిర్షభాగాలు గలశిఖరాల స్వరూపాలతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఇటువంటి స్వరూపాలలో చెప్పకోతగ్గది మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్. ఇది ఐస్లాండ్ నుంచి దాదాపు అంటార్కిటికా వరకు విస్తరించి సముద్రమట్టానికి 2700 మీటర్ల లోతున ఉంది. దీని ఎత్తు సముద్ర భూతలం నుంచి 1800 మీటర్ల వరకు ఉన్నది. హవాయి ద్వీపాలు పసిఫిక్ సముద్ర మధ్యభాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప సముద్రాంతర్గత రిడ్జ్ పైభాగాలే. ఈ రిడ్జ్ పొడవు సుమారు 3200 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.

సముద్రాంతర్గత అగాధధరులు : ఖండతీరపు వాలులోను, ఖండతీరపు అంచుల చివరిభాగాలలోను 'V' ఆకారం కలిగి నిల్చుమైన పక్కలుగల లోతైన లోయలు ముఖ్య లక్షణంగా కనిపిస్తాయి. వీటిని సముద్రాంతర్గత అగాధధరులు అంటారు. వీటిలో కొన్నింటికి ఉపదరులు కూడా ఉంటాయి. ఇవి భూభాగంమీద కనిపించే సదుల క్రమక్రమం వల్ల రూపొందిన లోయల పద్ధతిలోనే ఉంటాయి. కాంగో, సింధు, డెల్టావర్, హడ్సన్, కొలంబియా మొదలైన వెద్దవెద్ద నదీముఖద్వారాలకు ఆవల సముద్రంలో ఇటువంటి అగాధధరులు ఏర్పడి ఉన్నాయి. కొన్నిచోట్ల ఇవి సముద్రమట్టానికి దిగువన 1800 నుంచి 2700 మీటర్ల వరకు లోతు ఉంటాయి. వీటి పార్శ్వాలు శిలామయమై ఉంటాయి.

సముద్రాంతర్గత పర్వతాలు-జీయోలు : సముద్ర భూతలం విశిష్ట లక్షణం దానిమీద ఉండే సముద్రాంతర్గత పర్వతశ్రేణులు. ఇవి సముద్ర భూతలం నుంచి సుమారు 900 మీటర్లకు మించి ఎత్తుంటాయి. వీటిలో చాలావాటికి శంక్వాకారశీర్షాలు ఉంటాయి. ఐతేకొన్నింటికి చదునైన శిర్షభాగాలు ఉంటాయి. వీటికి ప్రఖ్యాత భూగోళ శాస్త్రజ్ఞుడైన A.H. జీయో జ్ఞాపకార్థం జీయోలు అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పుడు సుమారు 1000 నుంచి 2000 మీటర్ల లోతు మేరకు నీటిలో మునిగిన శిఖరాలు గల ఈ జీయోలు అగ్నిపర్వతాలుగా భావిస్తున్నారు. ఈ అగ్నిపర్వతాలు సముద్ర తరంగాల క్రమక్రమచర్యవల్ల చదునై వాటిమీద ప్రవాళభిత్తులు ఏర్పడిన తరువాత సముద్ర భూతలం క్రుంగటం వల్ల లేదా నీటిమట్టం పైకి లేవడంవల్ల గాని నీటిలో మునిగి ఉన్నాయని అంటారు.

ట్రెంచ్లు-అగాధాలు : ఇవి సముద్రభూతలంమీద ఉన్న పొడవైన, లోతైన సన్నని హరివాణాలు. ఇవి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ప్రస్థుటంగా కనిపిస్తాయి. వీటిలో చాలా భాగం దానితీరానికి దగ్గరగా ఖండతీరపు వాలుల కిందిభాగాలలో ఉన్నాయి. దక్షిణఅమెరికా పశ్చిమతీరంలోను, ద్వీపవక్రతల ముందు భాగాలలోను (ఎలెన్సియన్ ట్రెంచ్) ఉన్నాయి. క్యురైల్ ట్రెంచ్, ఫిలిప్పైన్ ట్రెంచ్, జావా ట్రెంచ్లు చెప్పుకోదగినవి. ఫిలిప్పైన్ ట్రెంచ్ లోతు సుమారు 10300 మీటర్లు, మేరియానాస్ ట్రెంచ్ లోతు 10700 మీటర్లు ఉన్నట్లు తెలిసికొన్నారు. ఈ ట్రెంచ్ల ఉద్భవాన్ని గురించి అంతగా తెలియదు. అయితే ఇవి భూపటలంలోని క్రియాశీల, చలనశీల మేఖలల వెంబడి ఉన్నట్లు తెలుసుకొన్నారు. ఎన్నో భూకంపాలు ఈ ట్రెంచ్ల అడుగున లేదా దగ్గరప్రారంభమైనాయి.

సముద్ర మధ్యస్థ రిడ్జలు : ఇవి ప్రధానమైన మహాసముద్రాలన్నింటిలో ఉన్నాయి. ఇవి భూఉపరితలంలో 20 శాతాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాయి. సముద్రాలలోని స్థలాకృతి లక్షణాలలో ఇవి ప్రముఖమైనవి. ఇవి 500 నుంచి 5000 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో సుమారు 6400 కిలోమీటర్ల పొడవున అవిచ్ఛిన్నమైన పర్వతశ్రేణులుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ రిడ్జ్ అక్షులవెంబడి తరచుగా భూకంపాలు సంభవిస్తాయి. భూపటలంలో ఎక్కువ ఉష్ణప్రవాహం ఈ అక్షులవెంబడి జరుగుతుంది. ఈ రిడ్జ్ల మధ్యలో ఉన్న విదీర్ణాలలో కొత్త మాగ్మా బయటకువచ్చి నూతనసముద్ర భూపటలాన్ని రూపొందిస్తుంది.

9.5 మహా సముద్రాల సాధారణ లక్షణాలు

9.5.1 సముద్రజల స్వభావం

మానవునికి తెలిసిన రసాయన మూలకాలలో సుమారు సగం సముద్ర జలాలలో ఉన్నాయి. వీలన్నిటిలోకి క్లోరైడ్లు ఎక్కువగా ఉండటంవల్ల సముద్రజలం ఉప్పుగా ఉంటుంది. సముద్రజలంలో ఖనిజ సంబంధమైన పదార్థం భారాన్ని బట్టి 3.44% వరకు ఉంటుంది. మిలియన్ల కొలది సంవత్సరాలకాలంలో

నదుల లవణాలను ద్రావణీయస్థితిలో సముద్రంలోకి చెరుస్తున్నాయి. ఐరన్, సిలికా, కాల్షియమ్ మొదలైన లవణాలను సముద్రాలలోని జంతు, వృక్షజాతులు గ్రహిస్తున్నాయి. కరిగిఉన్న పదార్థంలో అత్యధిక పరిమాణంలో ఉన్న లవణం మాలియా ఉప్పు. ఇది సుమారు 75% ఉంటుంది. ఇతర ఘటకాలలో ముఖ్యమైనవి మెగ్నీషియమ్, క్లోరైడ్, సల్ఫేట్, కాల్షియమ్, పొటాషియమ్ సల్ఫేట్లు. ఈ లవణాలు కాక జీవరాసుల నుంచి, సముద్రాంతర్గత అగ్నివర్షతాల నుంచి విడుదలయ్యే నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువులు కూడా సముద్రపు సీటిలో కరిగి ఉంటాయి.

9.5.2 ఉష్ణోగ్రత, సాంద్రత, పీడనం

సముద్రాల ఉష్ణోగ్రత సౌరవికిరణం మీదనే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతం ధృవప్రాంతాలకు మధ్య సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలో ఎంతో తేడా ఉంటుంది. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతంలో దగ్గర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సుమారు 80°F, ధృవప్రాంతాలలో 28°F (సముద్ర జల ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత ఇదే) ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత ఉపరితలంనుంచి లోతుకుపోయేకొద్దీ మారుతుంది. సుమారు 1100 మీటర్ల లోతులో ఉష్ణోగ్రత 40°F ఉంటుంది. సముద్రజలంలో మూడింట రెండు వంతులు శీతలంగా ఉంటుంది. ధృవ, ఉపధృవ ప్రాంతాల నుంచి ప్రవహించే అతిశీతలజలాలు సముద్రాల ఉష్ణోగ్రతను మార్పుచేసి ఖండభాగాల ఉష్ణోగ్రతపై తమప్రభావాన్ని చూపుతాయి. సముద్ర జల విశిష్ట గురుత్వం సుమారుగా 1.025 ఉంటుంది. ధృవ ప్రాంతాలలో ఇది 1.028, సమశీతోష్ణ మండలాలలో 1.022 ఉంటుంది. పీడన లోతుతోపాటు పెరుగుతుంది. 300 మీటర్ల లోతున పీడన చదరపు అడుగుకు 64000 పౌండ్లు ఉంటుంది.

9.5.3 సముద్రంలోని జీవరాశులు

సముద్రంలో జంతు, వృక్షజాతులు రెండూ జీవిస్తాయి. జంతువులు అతి సూక్ష్మరూపం నుంచి అత్యధిక పరిమాణంగల తిమింగలాల వరకు ఉంటాయి. ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన జీవరాశుల కంటే నిమ్నశ్రేణికి చెందిన జీవరాశులే ఎక్కువ ఉంటాయి. వృక్షజాతులలో ముఖ్యమైనవి సముద్రపు కలుపు మొక్కలే. ఇవి డయాటమ్ల వంటి సూక్ష్మరూపం నుంచి దాదాపు 30 మీటర్లు పొడవుగల రూపాల వరకు ఉండవచ్చు. సముద్ర ఉపరిభాగంలో సూక్ష్మ రూపాలుగలవలలు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. ఇవి సముద్రజలంలోని ఇనార్గానిక్ పదార్థాలను సూర్యరశ్మి, క్లోరోఫిల్ ల సహాయంతో ఆర్గానిక్ పదార్థాలుగా మార్పుచేస్తాయి. ఈ పదార్థాలు సముద్ర జంతువులకు ఆహారంగా పనికివస్తాయి.

జీవజాల ఆధారంగా సముద్ర పరిసరాలనుకేంద వివరించిన మండలాలుగా విభజిస్తారు.

తీరస్థ మండలం : ఈ మండలం సముద్రంలో ఏర్పడే పోటుపాటుల మధ్య ఉంటుంది. ఇక్కడ పెద్దపెద్ద అలలు ఏర్పడతాయి. జీవన పరిస్థితులు కఠినంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడుండే జీవరాశులు నేలకు అతుక్కొని ఉండేవిగాగాని, బురదలో బొరియలు చేసికొని జీవించేవిగాగాని ఉండాలి. ఎకినోడర్మీలు గట్టి రాళ్ళలో రంధ్రాలు చేసికొని జీవిస్తాయి.

అగభీర మండలం : ఇది పోటుఏర్పడే చోటు నుంచి ఖండతీరపు అంచువరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఇక్కడ లోతు 120 మీటర్లకన్న తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సూర్యరశ్మి అడుగుకు చేరుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ నివసించే జీవరాశులకు తగినంత ఆహారం లభ్యమవుతుంది. ఈ మండలంలో ఉండే జీవరాశుల సాంద్రత భూమి మీద మరెక్కడా లేదని కనుగొన్నారు.

బఫైల్ మండలం : ఈ మండలం 120 మీటర్ల లోతు నుంచి 1800 మీటర్ల లోతువరకు ఉంటుంది. ఈ మండలంలో వైభాగానికి మాత్రమే సూర్యరశ్మి తగులుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ వృక్షజాతులు చాలా పరిమితంగా ఉంటాయి. అయితే అనేక రకాల జంతువులు అసంఖ్యాకంగా జీవిస్తాయి. ఇక్కడ నిక్షేపణ రేటు తక్కువ. ఇక్కడ సున్నపు రాతి నిక్షేపాలు ప్రధానంగా కర్పరపు జాతికి చెందిన జంతువుల అవశేషాలతో కూడి ఉంటాయి. సిలికా సంబంధ నిక్షేపాలు డయాటమ్లతోను స్పండ్ కణాలతోనూ ఏర్పడి ఉంటాయి.

సెలెజిక్ మండలం : తీరస్థ మండలానికి అవల ఉండే విశాల సముద్ర ప్రాంతమంతా ఈ మండలం కిందికి వస్తుంది. నీటిపై తేలుతూ జీవించే వైకకజంతువులు, స్వేచ్ఛగా ఈదుతూ తిరిగే జంతువులూ ఈ మండలంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వృక్షజాతులలో ముఖ్యమైనవి శైవలాలు, డయాటమ్లు. ఈ జంతు వృక్ష జాలాల కఠినభాగాలు ఎన్నోరకాల అవక్షేపశిలలు ఉద్భవానికి దోహదం చేస్తాయి.

అగాధ మండలం : 1800 మీటర్ల లోతుకు మించిన సముద్ర ప్రాంతమంతటినీ అగాధ మండలం అంటారు. ఇక్కడకు సూర్యరశ్మి చేరదు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత నీరు గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతకు దగ్గరగా ఉంటుంది. పీడన చదరపు అంగుళానికి ఒక టన్నుకు మించి ఉంటుంది. ఇక్కడ వృక్షాలు అసలు ఉండవు. అందుచేత వృక్షాలపైన ఆధారపడే జంతువులు ఇక్కడ కనిపించవు. ఇక్కడ జీవించే జంతువులు ప్రత్యేక రీతికి చెందినవిగా కన్పిస్తాయి.

భూమి మీద జీవవదార్థం మొట్టమొదట సముద్రగర్భంలోనే ఉద్భవించిందని భావిస్తారు. జీవుల ఉద్భవంవల్ల సముద్ర పరిసరాలలో పరిణామాలు వచ్చినాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనది జీవరసాయన క్రియాశీలత. సముద్రంలో జీవించే వివిధ జీవరాశులకు కార్బియమ్ కార్బోనేట్, సిలికాలతో ఏర్పడిన కఠినభాగాలు ఉంటాయి. ఈ కఠినభాగాల నుంచి తరువాతి కాలంలో ఎన్నో సున్నపురాళ్లు, సిలికా సంబంధ నిక్షేపాలు ఏర్పడ్డాయి. అంతేకాక ఈ జీవజాలాలు కార్బియమ్ కార్బోనేట్ను, సిలికాను అవపాతన చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండడంవల్ల అవక్షేపాలకు కావలసిన మేళనపదార్థం కూడా వీటి నుంచి లభించింది. అందువల్ల సముద్రంలోని జీవరాశులకు శిలానిర్మాణ కార్యక్రమంలో ప్రధాన పాత్ర ఉంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

2. సముద్ర పరిసరాలలోని జీవమండలాలను పేర్కొనండి.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9.6 సముద్రజలచలనం

సముద్రజలాలు అవిచ్ఛిన్నంగా చలిస్తూ ఉంటాయి. సముద్రపు నీటి క్రియాశీలతను తీరరేఖ వెంబడి బాగా గమనించవచ్చు. పవనాలవల్ల రూపొందిన తరంగాలు తీరరేఖలలో వచ్చే మార్పుకు కావలసిన శక్తిని సమకూరుస్తాయి. సముద్రచలనం - తరంగాలు, అండర్ బోలు, కోతప్రవాహాలు, దీర్ఘతీరప్రవాహాలు, పోటుపాటులు, సముద్ర ఉపరితల ప్రవాహాలు మొదలైన రూపాలలో ఉండవచ్చు. ఈ ప్రవాహాలకు ప్రధాన కారణం సౌరశక్తి. భూభ్రమణం, భూమ్యాకర్షణలవల్ల లభించే శక్తులు కూడా వీటికి కొంత కారణం. సముద్రజలచలనం వివిధరకాల ప్రవాహాలు, తరంగాల రూపంలో ఉంటుంది. వీటిని కింది విధంగా విభజించవచ్చు.

1. తరంగాలు, దీర్ఘతీర ప్రవాహాలు
2. వేలా ప్రవాహాలు
3. సముద్ర ప్రవాహాలు
4. సాంద్రత ప్రవాహాలు

1. తరంగాలు, దీర్ఘతీర ప్రవాహాలు : సముద్ర చలనాలన్నింటిలోకి బాగా కన్పించేవి, సముద్ర క్రమక్షయం, నిక్షేపణలకు కారకాలైనవి ఇవే. పవనాలు తదితర కారకాలవల్ల సముద్రజలంలో తరంగాలు ఏర్పడతాయి. తరంగాలు తీరరేఖను ఒక కోణంలో తాకినప్పుడు తీరరేఖకు సమాంతరంగా దీర్ఘతీర ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రవాహం తీరాగ్రంనుంచి అవక్షేపాన్ని రవాణా చేస్తుంది.

2. వేలా ప్రవాహాలు : ప్రతిరోజు సముద్రంలో వచ్చే పోటుపాటులవల్ల ఈ ప్రవాహాలు ఉద్భవిస్తాయి. భూమికి - సూర్యుడికి, భూమికి - చంద్రుడికి మధ్య ఉండే ఆకర్షణలోని తేడాల కారణంగా ఇవి ఏర్పడతాయి. భూమికి చంద్రుడు దగ్గరగా ఉండటంవల్ల చంద్రుని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పార్లమెంటు లేదా అమావాస్యలనాడు ఉండే మాదిరిగా సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకేరేఖమీద ఉన్నప్పుడు అసాధారణమైన పోటుపాట్లు ఏర్పడతాయి. వీటిని వర్షవేలాతరంగాలు అంటారు. సూర్యుడు, చంద్రుడు భూమికి సాష్టాంగంగా లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు వీటి ప్రభావం తక్కువగా ఉండటంవల్ల పోటుపాటులు కూడా తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. వీటిని లఘువేలా తరంగాలు అంటారు. సముద్రంలో ఈ పోటుపాట్లు వ్యత్యాసం కొద్ది మీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది. కాని లోతు తక్కువ సముద్రాలలో అంటే అఖాతాలలో, సింధు శాఖలలో వీటి వ్యత్యాసం 6 నుంచి 15 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది.

3. సముద్ర ప్రవాహాలు : పవనాలు ఒకే దిశలో వీచే ప్రాంతాలలో అంటే వ్యాపార పవనాలు వీచే ప్రదేశాల వంటి వాటిలో సముద్ర ఉపరితలజలాలు పవనదిశలో పవనవేగం కంటే తక్కువ వేగంతో అక్కర్లేస్తాయి. ఈ వ్యాపారపవనాలు ఉత్తర, దక్షిణ దిశలనుంచి భూమధ్యరేఖ వైపుకు వీస్తూవుంటాయి. కాబట్టి సముద్రజలం కూడా రెండు వైపుల నుంచి భూమధ్యరేఖవైపుకు ఆకర్షణతో అక్కడ పశ్చిమ దిశలోకి ఒక ప్రవాహంగా మార్పు చెందుతుంది.

4. సాంద్రత ప్రవాహాలు : సముద్రంలో కొన్ని చోట్ల నీరు బురదగా ఉంటుంది. ఇట్లా బురదగా ఉన్న నీరు తేటనీరుఉండే సముద్రభాగాల వైపుకు ప్రవహిస్తుంది.

సముద్రంలోని ప్రవాహాలు కేవలం పవనాల వల్లనే కాక ఇతర అంశాలవల్ల కూడా రూపొందుతాయి. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతంలో ఉన్న జలాలు ఉపరితలంవద్ద బాగా వేడెక్కి వ్యాకోచం చెందటంవల్ల, ధ్రువప్రాంతాలలో నీరు చల్లబడటంవల్ల అంటే వివిధ ప్రాంతాలలోని ఉష్ణోగ్రతా భేదాల వల్ల కూడా సముద్రంలో ప్రసరణ జరుగుతుంది. ఖండతీరపుటంచు ఆకృతి, తీరరేఖ ఆకృతి, భూభ్రమణం కూడా ఈ ప్రవాహాలను నియంత్రిత చేస్తాయి.

9.7 సముద్రాల భౌమచర్య

9.7.1 క్రమక్షయం

సముద్రంవల్ల జరిగే భౌమ కార్యకలాపాలలో ఎక్కువ భాగం తరంగాలవల్లనే జరుగుతుంది. సముద్రతీరాన ఉన్న శిలారాసులను తరంగాలు తాకినప్పుడు ఆ శిలల్లోని పగుళ్ళలోకి నీరు ప్రవేశించి జలోత్పీడక చర్యవల్ల వాటిని పగులకొట్టుంది. శిలలలోని పగుళ్ళలో నీరు చొరబడినప్పుడు అక్కడ ఉండే గాలి అధికపీడనకు గురిఅవుతుంది. నీరు తిరిగిబయటకు వచ్చినప్పుడు పగుళ్ళలోని గాలిఒత్తిడి అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోవడం వల్ల గాలివేలుడు సంభవించి శిలలు ముక్కలైపోతాయి. వదులుగా ఉన్న శిలాఖండాలుగల తీరాన్ని తరంగాలు తాకినప్పుడు ఆశిలాఖండాలు శిలారాశి నుండి విడిపోతాయి. ఈ

విధంగా అలల తాకిడివల్ల శిలాఖండాలు ఊడిపోవడంవల్ల సంభవించే క్రమక్షయ్యాన్ని హైడ్రాలికింగ్ అంటారు.

తరంగాల చర్యవల్ల ఏర్పడిన శిలారేణువులు లేదా సీటిలోకి జారిపడిన శిలారేణువులు అలలతో పాటు కదిలి తీరంవెంట ఉన్న శిలలను తాకిపోతే అవస్థరణ చర్య జరుపుతాయి. ఈ విధంగా తరంగాల చర్యలో అవస్థరణ కూడా ఒక భాగం. తీరరేఖను కోయడంలోను, సముద్రంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చిన భూభాగాలను తొలచడంలోను ఈ శిలారేణువులు మంచి పనిముట్లుగా పనిచేస్తాయి. ఈ శిలారేణువులు కూడా ఒకదాని నొకటి తాకటంవల్ల, ముందుకు వెనుకకు దొర్లడంవల్ల క్రమేణా చిన్నవైపోతాయి. సముద్రజలం ఇరిపే ద్రావణీకరణచర్య తరంగక్రమక్షయంలో ఒక స్వల్ప భాగం. ఈ ద్రావణీకరణ చర్య ప్రధానంగా సున్నపు శిలలలో జరుగుతుంది. సముద్రజీవులు జలచర్యను అధికంచేసి అధికద్రావణీకరణకు దోహదం చేస్తాయి.

తరంగ క్రమక్షయ ఫలితాలు : ఒక మోస్తరుగా ఎత్తైన భూభాగంగల తీరం వెంబడి తరంగాల చర్య అవిచ్ఛిన్నంగా జరిగినప్పుడు సముద్రానికి అభిముఖంగా నిల్చున్న ముఖంగల సముద్ర శిఖరం ఏర్పడుతుంది. మొదట్లో తరంగాలు సముద్రశిఖరం ముఖాన్ని అంతటినీ తాకి చర్య జరుపుతాయి. అయితే కొంతకాలం తర్వాత సముద్రశిఖరం బాగా ఎత్తుగా ఉండడంవల్ల అలలు దాని కింది భాగాన్నే తాకుతాయి. అప్పుడు ఈ శిఖరం అడుగుభాగాన క్షీణింపసమాంతరంగా కోతపడుతుంది.

శిలామయ తీరాల వెంబడి సముద్ర భూభాగాన్ని కోసి ఆక్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చర్యవల్ల తీరం వెంబడి చదునైన బేంచ్ వంటి రూపం ఏర్పడుతుంది. దీనిని తరంగకృత వేదిక అంటారు. దీనిమీద కనిపించే గుంటలు, గాళ్ళు అలల క్రమక్షయచర్యను సూచిస్తాయి. బాగా కఠినంగా ఉన్న శిలలు కోతబడకుండా గోడలవలె నిలిచిఉంటాయి. తుఫాను సమయాలలో అలలు తీరాన్ని తాకి వెనుకకు పోయేటప్పుడు సుళ్ళు తిరుగుతాయి. ఈ సుళ్ళలో చిక్కుకున్న శిలాఖండాలచర్యవల్ల అడుగున పెద్ద గుంటలు ఏర్పడతాయి. వీటిని వేలా గుంటలు అంటారు. ఇవి సముద్ర తీరాల వెంబడి తరచుగా కన్పిస్తాయి. సంధులు ఎక్కువగా ఉన్న శిలలలో తరంగక్రమక్షయం వల్ల సముద్ర గుహలు ఏర్పడతాయి. క్రమక్షయచర్యవల్ల ఈ గుహలపై కప్పులు విరిగి పోయినప్పుడు నీరుగొట్టంలో మాదిరిగా పైకి చిమ్ముతుంది. వీటిని స్పాటింగ్ హోర్స్ అంటారు. అన్ని రకాలశిలలలోను సంధులు ఉంటాయి. కాబట్టి తరంగచర్య ఉధృతంగా జరిగేతీరాలవెంబడి గుహలు కన్పించడానికి వీలున్నది. పక్కపక్కగా ఉన్న రెండు గుహలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసినప్పుడు సహజ వంతెనలు లేదా ఆర్చ్ లు ఏర్పడతాయి. తరంగాల అవిచ్ఛిన్నచర్యవల్ల ఆర్చ్ లు కూడా పడిపోయి మధ్యనున్న శిలాభాగాలు నిలుచున్న రాతి స్తంభాలవలె నిలిచిపోతాయి. వీటిని సీస్టాక్ లు లేదా చిమ్మిశిలలు అంటారు. ఓర్కే ద్వీపాలలోని ఓర్ట్ మాన్ ఆఫ్ హోయ్ ఇటువంటి సీస్టాక్ లకు మంచి ఉదాహరణ. ఇది సంధులవల్ల విడిపోయి స్తంభం మాదిరిగా ఉంటుంది. ఇది సుమారు 180 మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది. రంగు ఇసుకరాయి నుంచి ఏర్పడింది. సముద్రతీరం వెంబడి శిలల నిర్దోధకశక్తిలోని తేడాలవల్ల అవి భేదాత్మక క్రమక్షయ్యానికి గురి అవుతాయి. సంధులవల్ల బలహీనంగా ఉన్న శిలలు సులభంగా క్రమక్షయ్యానికి గురికావడంవల్ల కోవలు ఏర్పడతాయి. అయితే కఠినశిలలు మాత్రం శిర్షభూములుగానే ఉండిపోతాయి. వీటివల్ల తీరరేఖ పంకరలతో ఉంటుంది. తీరంవెంబడి వదులైన ఇసుక, గ్రావెల్, క్లేవంటి శిలలు ఉన్నప్పుడు తీరరేఖ తిన్నగా ఉంటుంది.

తరంగకృతవేదికపైకి లేచినప్పుడు అది క్రమక్షయమైదానం అవుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన సముద్రక్రమక్షయమైదానం నదీక్రమక్షయమైదానంకంటే మృదువుగా వుంటుంది. అయితే సముద్ర క్రమక్షయం తర్వాత మిగిలిపోయిన పరిశిష్టరూపాలు నదీ క్రమక్షయం తర్వాత మిగిలిపోయిన వాటికంటే బాగా నిల్చుండా ఉంటాయి. దక్షిణ కాలిఫోర్నియా తీరంవెంబడి సగటున 30 మీటర్ల ఎత్తుగల సముద్రకృతవేదిక ప్రస్తుతంగా కన్పిస్తున్నది. నిల్చున్న వాలుతో విడివిడి శిలారాశులు బాగా పైకి కన్పిస్తున్న తరంగకృత మైదానం ఒకటి భారతదేశపు తూర్పుతీరం వెంబడి ఉన్నది.

9.7.2 నిక్షేపణ

సముద్రనిక్షేపాలు : సముద్ర నిక్షేపాలు స్థూలంగా రెండు రకాలకు చెంది ఉంటాయి. 1. గాఢజలాలలో భూఖండ భాగాలకు దగ్గరగా ఖండతీరపు అంచు, ఖండతీరపు వాలుమీద నిక్షేపితమైనవి. 2. అగాఢ సముద్రపు భూతలంమీద నిక్షేపితమైనవి.

తీరనిక్షేపాలు : సముద్ర తరంగాలవల్ల తుఫాను సమయంలో ఏర్పడి పెద్దపెద్ద అలలవల్ల, దీర్ఘతీర ప్రవాహాలవల్ల ఈ నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి.

బీచ్ నిక్షేపాలు : సముద్రతీరంలో పోటు సమయంలో అలలు తాకేరేఖకు, పాలు సమయంలో అలలుతాకే రేఖకు మధ్యన ఉన్న ప్రాంతాన్ని బీచ్ అంటారు. సూక్ష్మశిలారేణువులు మొదలు కొని పెద్దపెద్ద శిలాఖండాల వరకు ఉన్న వదులైన శిలాపదార్థాలు బీచ్ అంతటా ఒక కట్టవలె ఏర్పడి ఉంటాయి. దీనిని చెలియలికట్ట అంటారు. ఇది తరంగాల అండర్ బోలీ తీరప్రవాహాల చర్యవల్ల రూపొందుతుంది. ఉన్నతశిలామయతీరాలవెంబడి నిక్షేపాలు ఎక్కువగా కన్పించకపోవచ్చు. అయితే ఇసక తీరాల వెంబడి బీచ్ అంతటా ఇసక పొరలు ఉంటాయి. దీనిని ఇసకబీచ్ అంటారు. కొన్నిచోట్ల బీచ్ లోని గులకరాళ్ళు చదునుగాఅయి ఇసకతోపాటు కలసి ఉంటాయి. ఇటువంటి గులకరాళ్ళు ఉండే బీచ్ ని షింగిల్ బీచ్ అంటారు. గ్రావెల్ లేదా ఇసక స్థానికంగా పోగుబడినప్పుడు వాటిని వాడ్ బీచ్ అంటారు. బీచ్ నిక్షేపాలలో ఎక్కువ భాగం క్వార్ట్జ్ ఇసకతో ఏర్పడి ఉంటాయి. వాటిలో స్థానికంగా బంగారం, మాగ్నటైట్, జిర్కాన్, రుటైల్, కాసిటరైట్, మోనజైట్ సాంద్రీకరణ చెంది ఉండవచ్చు. వీటిని బీచ్ ప్లేనర్లు అంటారు. బీచ్ లనుంచి పవనాల చర్యవల్ల రవాణాఅయి ఇసక సముద్రతీరంలో ఇసక దిబ్బలుగా ఏర్పడుతుంది.

అవరోధపుబీచ్లు : వాలు తక్కువగా ఉన్న ఇసకతీరాల వెంబడి తరంగాలు, తీరప్రవాహాల వల్ల తీరానికి కొద్ది దూరంలో సముద్రం నేలపై పొడవైన ఇసకదిబ్బలు ఏర్పడతాయి. వీటిని అవరోధపు బీచ్లు లేదా తీరద్వీపాలు లేదా ద్వీపరోధికలు అంటారు. వీటికి, తీరానికి మధ్య భాగం విశాలసముద్రం నుంచి దాదాపు పూర్తిగా విడిపోయి ఉంటుంది. ఇటువంటి జలాశయాన్ని లెగూన్ అంటారు. అట్లాంటిక్ తీరం వెంబడి న్యూజెర్సీ నుంచి డక్షిణంగాను, టెక్సాస్ గల్ఫ్ తీరం వెంబడి ఇటువంటి అవరోధపు బీచ్లు ఉన్నాయి.

స్పిట్లు, రోధికలు : దీర్ఘతీర ప్రవాహాలు అవక్షేపాలను తీరరేఖకు సమాతరంగా తరలిస్తూ ఉంటాయి. తీరప్రవాహపు చలనం సాధారణంగా సరళరేఖామార్గంలో ఉంటుంది. కాబట్టి తీరంలో వంకరలుగాని, అఖాతాలుగాని ఉన్నప్పుడు ప్రవాహం యీ వంకరల వెంబడి ప్రవహించదు. అప్పుడు తీర ప్రవాహం ఈ అఖాతాలవద్ద లోతు తక్కువ నీటినుంచి లోతు ఎక్కువ నీటిలోకి ప్రయాణించి, తాను తరలించి తీసికొనిపోతున్న పదార్థాలను అక్కడ నిక్షేపిస్తుంది. ఈ నిక్షేపం ఒక పొడవైన గుట్టమాదిరిగా, భూభాగం పొడిగించబడినట్లుగా ఏర్పడుతుంది. దీనిని స్పిట్ అంటారు. ఈ గుట్ట అఖాతానికి అడ్డంగా దీనిని చాలా వరకు మూసివేస్తున్నట్లు ఏర్పడితే దీనిని అఖాతముఖరోధిక అంటారు. రోధికలు తీరరేఖ ఆకారాన్ని సరళం చేస్తాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ రోధికలవల్ల ద్వీపాలు ప్రవాహ భూభాగంతో కలపబడతాయి. ఇటువంటి ద్వీపాలను సందిత ద్వీపాలు అంటారు. రెండింటిని కలిపే రోధికలను టాంబోలోలు అంటారు. ఇటువంటివి U.S.A., న్యూఇంగ్లాండు తీరంవెంబడి అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి.

స్పిట్ కొన తుఫానుఅలలకు గురైనప్పుడు ఆ కొన అఖాతం వైపుకు వంగటంవల్ల స్పిట్ వంకర తిరుగుతుంది. ఇటువంటి వాటిని హాక్లు అంటారు. ఇట్లా వంకర తిరిగిన కొననిక్షేపణవల్ల పెరుగుతూ పోయి చివరకు ప్రధాన భూభాగాన్నిచేరి ఒక లూప్ వలె ఏర్పడుతుంది.

అవక్షేపాలను మోసికొనిపోయే తీరప్రవాహాలు ఒక భూభాగాన్నికొని రెండువైపులా ఉన్న సముద్రం లోకి తరలింపబడినప్పుడు అక్కడ వంపులున్న పార్శ్వాల గల స్పిట్లను నిర్మిస్తాయి. వీటిని కస్పేట్ స్పిట్లు అంటారు. U.S.A.లోని ఫ్లారిడా రాష్ట్రంలో ఉన్న కేప్ కెనవరాల్, నార్త్ కెరోలినా లోని కేఫియర్ ఇటువంటి కస్పేట్ అగ్రభూములకు మంచి ఉదాహరణలు.

తరంగ నిర్మితవేదిక : సముద్ర తీరాన ఉన్న శిఖరం తరంగక్రమక్షయచర్యకు గురిరై తరంగకృత వేదిక ఏర్పడే సమయంలో క్రమక్షయంవల్ల రూపొందిన శిథిలశిలాపదార్థాలు బీచ్ నుంచి కదలి లోతుగా ఉన్న నీటిలో తరంగకృత వేదిక అంచువెంబడి నిక్షేపితవుతాయి. దీనివలన ఒక వేదిక రూపపు నిక్షేపం ఏర్పడుతుంది. దీనిని తరంగనిర్మిత వేదిక అంటారు. ఇటువంటి సందర్భాలలో ఖండతీరపు అంచు తరంగకృతవేదికలు, తరంగనిర్మిత వేదికలతో కూడుకొని ఉంటుంది. సముద్రతీరశిఖరాలు తరంగకృత వేదికలు, బీచ్లు, అవరోధపు బీచ్లు, స్పిట్ల వంటి గాఢజలరూపురేఖలు గాఢసముద్ర భూతలం పైకిలేచి భూభాగంగా మారిన తరువాత కొంతకాలం వరకు ఆవిధంగానే భద్రమై ఉండవచ్చు. కాని తరంగాలవల్ల, ప్రవాహాలవల్ల రూపొందిన రూపురేఖలు, రుతువు రుతువుకు, సంవత్సర సంవత్సరానికి మార్పు చెందుతుంటాయి. అందువల్ల ఒక దశాబ్దం వంటి కొద్దికాలంలోనే బీచ్, స్పిట్ లేదా రోధికమార్పుచెంది కొత్త ఆవరణరేఖలను చూపవచ్చు. ఈ విధంగా తీరరేఖలు భౌమయుగాలలో ఎన్నో మార్పులుపొంది ఉండటానికి అవకాశం ఉంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

3. స్పిట్లు, రోధికలు అంటే ఏమిటో తెలిపి, ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

సముద్రనిక్షేపాలు : సముద్ర పరిసరాలలో నిక్షేపణ ఖండతీరపు అంచు, ఖండతీరపువాలు, అగాధ సముద్ర భూతలం మీద జరుగుతుంది. ఒకప్పుడు సముద్రపరిసరాలలో ఏర్పడిన నిక్షేపాలు ప్రస్తుతం భూఖండభాగాలను చాలా వైశాల్యం మేరకు అవక్షేపణ శిలల రూపంలో కప్పి ఉన్నాయి. ఇటువంటి అవక్షేప శిలలు ఆధునిక సముద్రపరివాణాలలో ప్రస్తుతం కూడా రూపొందుతూ ఉన్నాయి. సముద్ర నిక్షేపాలను సముద్ర భూతలంపై అవి వున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి కింది విధంగా వర్గీకరిస్తారు. 1. లిట్టోరల్ నిక్షేపాలు-ఇవిపోటుపాటుల మధ్య ప్రదేశాలలో ఏర్పడతాయి. 2. అగభీర నిక్షేపాలు: లేదా గాఢ జలనిక్షేపాలు-ఇవి ఖండ తీరపు అంచులను ఆక్రమించి ఉంటాయి. నిక్షేపాలు సముద్రతీరం నుంచి సుమారు 180 మీటర్ల లోతువరకు ఉన్న సముద్ర భూతలంపైన ఏర్పడతాయి. 3. అగాధ సముద్ర నిక్షేపాలు-ఇవి ప్రధానంగా పంకాలతోను, ఊజ్లతోను కూడుకొని ఉంటాయి. పంకాలు సాధారణంగా ఖండతీరపు వాలుల వెంబడి నిక్షేపణచెందుతాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని బఫైల్ మండలం అంటారు. ఊజ్లు సముద్రభూతలంపై అతిలోతైన ప్రాంతాలలో ఏర్పడతాయి. దీనిని అగాధ మండలం అంటారు.

లిట్టోరల్ నిక్షేపాలు : భూఖండ భాగాలు, సముద్రాలు కలిసేచోట ఖండ భాగాలనుంచి, సముద్రం నుంచి అవక్షేపాలు రెండూ కలిసి నిక్షేపణ చెందుతాయి. ఈ అవక్షేపాలు తీర మండలంలోను, లెగూన్లలోను ఎన్నువరీలలోను పోగుపడ్డాయి. లిట్టోరల్ మండలంలో నిక్షేపణ పరిస్థితులు అన్నిచోట్లా ఒకేవిధంగా ఉండవు. మరికొన్ని నగ్నశిలా వేదికలా ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల నిటారుగా ఉండే సముద్ర శిబిరాలు ఉంటాయి. మరికొన్ని చోట్ల గ్రావెల్, ఇసక, పంకం, కర్పరాలు, కర్పరఖండాలు ఉంటాయి. లిట్టోరల్ లేదా తీర మండల నిక్షేపాలు ప్రధానంగా తీరం నుంచి రూపొందుతాయి. తరంగాల చర్యకు తుషారక్రియ, పవనాల చర్య తోడౌతాయి. అవక్షేపాలను బీచ్లోనికి మోసికొనిపోయే తరంగాలను,

ప్రవాహాలను రూపొందించడంలో పవనాలు తోడ్పడతాయి. బీచ్ నిక్షేపాలు మూలశిలలపైన, తరంగచర్య తీవ్రతపైనా ఆధారపడి ఉంటాయి. తరంగాల చర్యకు గురైన తీరంలో శిలాపదార్థాలు గోళశిలలతోను, గులకరాళ్ళతోను కూడుకొని ఉండవచ్చు. సూక్ష్మ రేణువులు ఏర్పడిన చోట ఇసుక కూడా రూపొందించవచ్చు. గోళశిలలు ఒకదాని మీద ఒకటిగా, కింద ఉన్న పీఠశిలమీద ముందుకు, వెనుకకు దొర్లడంవల్ల అపమర్దనకు గురి అవుతాయి. చివరకు అవక్షేపాలు నిక్షేపణ చెందినపుడు తీరంనుంచి సముద్రంవైపునకు రేణుపరిమాణానికి అనుగుణంగా శ్రేణీకరణ చెందుతాయి.

నెరిటిక్ లేదా గాఢజల నిక్షేపాలు : పాలు మట్టం నుంచి 126-180 మీటర్ల లోతు వరకు ఉన్న సముద్ర హరివాణ భాగాన్ని నెరిటిక్ మండలం అంటారు. ఖండతీరపుటంచులోని ఎక్కువ భాగం, అధిఖండంతర సముద్రాలతో సహానెరిటిక్ మండలంలోకే వస్తాయి. గాఢ సముద్ర భూతలపు తీరంవైపు భాగం తరంగ, ప్రవాహ చర్యలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రవాహం రూపొందినప్పుడు తీరానికి దగ్గరగా స్థూలరేణు పదార్థాలు సముద్రం లోపలి వైపుకు సూక్ష్మరేణు పదార్థాలు నిక్షేపణ చెందే విధంగా ఈ అవక్షేపాలు ఏర్పాటు చెందుతాయి. ఇసుక తీరాలనుంచి సముద్రంలోనికి లేదా ఒక మోస్తరు ప్రవాహాలున్న ప్రదేశాలలో ఖండతీరపుటంచుమీద ఇసుకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తీరానికి దగ్గరగా, పెద్ద పెద్ద నదుల ముఖ ద్వారాలవద్ద, ఖండతీరపుటంచుమీద ఉన్న గుండాలలోనూ, పంకాలు సాధారణంగా నిక్షేపితమవుతాయి.

గాఢజలనిక్షేపాలలోని పదార్థాలు చాలా వరకు నదుల హిమాశీనదాల చర్యలు- ధూళి, ఇసుక తుఫానులు; తీర క్రమక్షయం; ఇసుక తుఫానులు అగ్ని వర్షత ప్రస్ఫోటనం మొదలైన ప్రక్రియలవల్ల భూభాగంనుంచి రూపొందించిన శిథిలశిలా ఖండాలతో కూడుకొని ఉంటాయి. వీటిలో కొంత భాగం ప్రవాహాలు, సున్నపు శైవలాలు, షేల్ చేపలు, రసాయన అవపాతనాలు మొదలైన వాటినుంచి లభిస్తుంది. భూభాగంనుంచి ఏర్పడిన శిథిలశిలాఖండాలు తక్కువగా ఉన్నచోట అవక్షేపాలు ప్రధానంగా జీవుల అవశేషాలతోను, రసాయన అవపాతనాలతోను ఏర్పడి ఉంటాయి. తీరసముద్ర నిక్షేపాల నిర్మితియ లక్షణాలలో చాలా వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. తీరానికి దగ్గరగా ఉన్న నిక్షేపాలు సాధారణంగా ద్వికుంభకాకృతిలో ఉండి తిర్యక్ సంస్తరణ చూపుతాయి. వీటి రేణుపరిమాణంలో చాలా భేదాలు ఉంటాయి.

తరగ గుర్తులు, తిర్యక్ సంస్తరణ, గాఢజల నిక్షేపణను సూచిస్తాయి. సముద్ర భూతలం నిటమైన వాలులతో ఉన్నప్పుడు అవక్షేపాలు కిందకు జారటంవల్ల వాటి సంస్తరణ తలాలు పంపులు తిరిగి క్రమరహితంగా అవుతాయి. రసాయన అవక్షేపాలలో పత్రీకరణ లక్షణం స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.

సముద్ర నిక్షేపాలను వాటికి మూలమైన పదార్థాలు ఆధారంగా రెండు వర్గాలుగా విభజిస్తారు. 1) భౌమజనిత నిక్షేపాలు. ఇవి భూభాగంనుంచి నదీ క్రమక్షయం, రవాణా తీరక్రమక్షయం వల్ల రూపొందినటువంటివి. 2) జీవ సంబంధ నిక్షేపాలు. ఇవి సున్నం, సిలికా సంబంధ పదార్థాలతో నిర్మితమైన జంతువుల కర్పరాలతోను, ఇతర కఠిన భాగాలతోను కూడుకొని ఉంటాయి.

అగాఢజల నిక్షేపాలు : ఖండతీరపుటంచును దాటిన తర్వాత సముద్ర భూతలం దాదాపు అక సౌష్ఠ్యంగా అగాఢసముద్రభూతలంవైపు దిగిపోతుంది. ఇదే ఖండతీరపు వాలు. ఇది తీరంనుంచి సుమారు 64 కిలోమీటర్ల దూరంలో మొదలవుతుంది. ఈ భాగం సాధారణంగా చాలా కాలం విలంబిత స్థితిలో ఉన్న భౌమజనిత, సూక్ష్మరేణుయుత పదార్థాలతో కప్పబడి ఉంటుంది. దీనిని నీలి పంకం అంటారు. దీని రంగుకు కారణం ఆర్గానిక్ పదార్థం, ఆక్సిహైడ్రజన్ చెందిన ఇనుము ఉండటమే. ఇవి భూమివైపుకు ఉన్న గాఢజల నిక్షేపాలతోను, సముద్రంవైపుకు ఉన్న ఆగాఢాలలో ఊజ్జీలు, ఎర్ర పంకాలతోను శ్రేణీకృతంగా ఉంటాయి. నీలిపంకాలు సముద్ర భూతలం మీద దాదాపు 3కి మీలీయన్న చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాయి. దూరంలో అమెజాన్ వంటి గొప్ప నదుల ముఖద్వారాలనుంచి 1600 కిలో మీటర్ల దూరం వరకు సముద్రంలోకి విస్తరించాయి. అగ్నివర్షతపంకం, స్క్వెరియా, ప్యూమిన్ ఖండాలు భూమినుంచి కొన్ని వందల కి.మీ. దూరంలో సముద్ర భూతలంమీద అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది.

పెలాజిక్ నిక్షేపాలు : ఇవి అగాధ మండలంలోని ఆర్గానిక్ ఊజ్లు. ఎర్ర క్షేత్రో ఏర్పడి ఉంటాయి. ఊజ్లు ప్రధానంగా ప్లవక సముదాయానికి చెందిన సముద్రజీవులు అవశేషాలతో కూడుకొని ఉంటాయి. డయాటమ్ అనే ఏక కణ సముద్రపు మొక్కలు, ఫోరమినిఫెర్లు, రేడియోలేరియన్లు, టెరోఫాడ్లు అనే సిటిలో ఈదే మొలస్కలు ఈ సముదాయంలో చేరతాయి.

ఈ జీవులు సముద్రజలం పైభాగంలో అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. వాటి కర్పర భాగాలు సముద్ర భూతలం మీదికి నెమ్మదిగా చేరతాయి. అగాధమండలంలోని సున్నపు నిక్షేపాలైన సిలి, ఆకువచ్చు పంకాలు ప్రధానంగా సిటిలోనే రూపొందుతాయి. అగాధమండలంలో ప్లవకజీవులు కర్పరాలు ఏ ఇతర పదార్థాలతో కలవకుండా అగాధసముద్ర జీవులుగా రూపొందుతాయి. ఇవి, ఎర్ర క్షేత్ర ఈ రెండూ పెలాజిక్ నిక్షేపాల కిందకి వస్తాయి. ఈ నిక్షేపాలకు వాటిలో అత్యధికంగా ఉన్న ఆర్గానిక్ అవశేషాలు ఆధారంగా పేర్లు పెడతారు. ఉదా: గ్లోబిజెరినా ఊజ్లు, టెరోఫాడ్ ఊజ్లు, డయాటమ్ ఊజ్లు, రేడియోలేరియన్ ఊజ్లు.

అగాధ సముద్రపు ఊజ్ల సంఘటన, విస్తరణ ఉపరితలజలాలు ఉష్ణోగ్రత, సముద్ర భూతలంలోను మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. డయాటమ్లు శీతలంగా ఉండే ఆర్కిటిక్ సముద్రాలలో జీవిస్తాయి. ఇక్కడ ఇతర జీవులు వృద్ధి పొందలేవు. అయితే రేడియోలేరియన్లు కవోష్ట, అయనరేఖాప్రాంతపు జలాల్లో అధికంగా ఉంటాయి. ఫోరమినిఫెర్లు సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలలో జీవిస్తాయి.

సముద్రజలపు ద్రావణీకరణ శక్తి లోతుతోపాటు పెరుగుతుంది. గ్లోబిజెరినా, తదితర ఫోరమినిఫెర్ న్ల సున్నపు కర్పరాలు, అవి కిందకి దిగేటప్పుడు రేడియోలేరియంవంటి సిలికేయ రూపాలకంటే త్వరగా సిటిలో కరిగిపోతాయి. 5400 మీ లోతుకి కేవలం కొన్ని పెద్ద జీవులు మాత్రమే చేరకలుగుతాయి. సిలికేయ అవశేషాలు మాత్రం ఎక్కువ లోతులలో అంటే, కొన్ని 9000 మీటర్ల లోతులలో కూడా ఉంటాయి. సముద్రభూతలం చాలా లోతుగా ఉన్నచోట్ల చాక్లేట్ బ్రౌన్ రంగు ఉన్న అతి సూక్ష్మ రేణుయుతమైన ఎర్రక్షేత్ర భూతలాన్ని కప్పి ఉంటుంది. దీనిలో భౌమజనిత క్షేత్ర ప్లవకజీవుల కర్పరాలతో అద్రావణీయ భాగాలు ఇతర ఆర్గానిక్ పదార్థం ఉంటాయి. అగ్నిపర్వత భస్మం, మీటియారిక్ ధూళి కూడా దీనిలో ఉండవచ్చు. మాంగనీస్-డై-ఆక్సైడ్ నల్లని పర్చికలు, సిలికేట్లు తదితర ఖనిజాల స్ఫటికాలు ద్వితీయ పదార్థాలుగా ఉండవచ్చు. ఎర్ర క్షేత్ర సముద్రభూతలాన్ని సుమారు 100 చ.కి.మీ. మేరకు ఆక్రమించి ఉంది. దీనిలో ఎక్కువ భాగం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోనే ఉంది.

రేడియోలేరియన్ ఊజ్లు కూడా ఎర్ర క్షేత్రో ఒకరకమే. అయితే దీనిలో రేడియోలేరియన్ల అవశేషాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. డయాటమ్లు, స్పంజ్ల కంటకాలు కూడా సాధారణంగా ఉంటాయి. హిందూ, పసిఫిక్ మహాసముద్రాలు అయనరేఖా మండలాలలో ఈ ఊజ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

9.8 సారాంశం

ఈ భాగంలో సముద్రాలలోని రకాలు, సముద్రం భూతలాల రూపురేఖలను, సముద్రజల చలనాన్ని వివరించాం. సముద్రాలు జరిపేక్రమక్షయం, రవాణా, నిక్షేపణ చర్యలను వివరించి వివిధ రకాల నిక్షేపాలను సర్దుచూర్చాం.

9.9 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి- మాదిరి సమాధానాలు

1. సముద్రాలలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి.

అ) అధిఖండాంతర సముద్రాలు, ఆ) ఎపైరిక్ సముద్రాలు. ఖండభాగాల సరిహద్దుల వెంబడి ఉన్న సన్నని వేదికలను ఆక్రమించి ఉండే సముద్రాలను అధిఖండాంతర సముద్రాలు లేదా తీరపు అంచుసముద్రాలతో అంతగా కలయికలేని గాఢలవణ జలరాశులను ఎపైరిక్ సముద్రాలు అంటారు.

2. సముద్ర పరిసరాలలోని జీవమండలాలు

- అ) తీరస్థమండలం
- ఆ) అగభీరమండలం
- ఇ) బధైల్ మండలం
- ఈ) పెలాజిక్ మండలం
- ఉ) అగాధమండలం

3. సముద్రజలచలనంలో పాత్రవహించే తరంగాలు, ప్రవాహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి

- అ) తరంగాలు
- ఆ) దీర్ఘతీర ప్రవాహాలు
- ఇ) వేలా ప్రవాహాలు
- ఈ) సముద్రప్రవాహాలు
- ఉ) సాంద్రత ప్రవాహాలు

4. భూభాగంనుంచి సముద్రంలోకి చొచ్చుకొనిపోయిన పొడవైన ఇసుక లేదా గ్రావెల్ గుట్టను స్పిట్ అంటారు. అఖాతానికి అడ్డంగా దానిని మూసివేస్తున్నట్లు ఏర్పడే ఇసుక లేదా గ్రావెల్ గుట్టను రోధక అంటారు.

9.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింద ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- 1. సముద్ర భూతలంస్థలాకృతిని గురించి తెలియజేయండి?
- 2. సముద్ర పరిసరాలలోని జీవమండలాలను పేర్కొని, వాటి జంతు, వృక్షజాలాలను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి?
- 3. సముద్రాల భౌమచర్యను వర్ణించండి?
- 4. సముద్ర నిక్షేపాలను గురించి వివరంగా తెలియజేయండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- 1. సముద్రాల భౌమ కార్యకలాపాలు ఏవి?
- 2. పెలాజిక్ నిక్షేపాలు అంటే ఏమిటి?

భాగం-10 : పవనాల చర్య

పాఠ్యాంశాలు

10.0 అక్ష్యాలు

10.1 పరిచయం

10.2 పవనాల భౌమచర్య

10.2.1 పవనాల వల్ల క్రమక్షయం

10.2.2 పవనాల వల్ల రవాణా

10.2.3 పవనాల వల్ల నిక్షేపణ

10.3 ఎడారులు

10.4 ఎడారులలో భౌమ ప్రక్రియలు

10.5 సారాంశం

10.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

10.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

10.0 అక్ష్యాలు

పవనాల భౌమ చర్య, తద్వారా ఏర్పడే భూస్వరూపాలను లేదా ఉత్పాదితాలను, ఎడారులలో భౌమప్రక్రియలను పరిచయం చేయడం ఈ భాగం ఉద్దేశం.

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీకు కింది విషయాలు తెలుస్తాయి.

- పవనాల చలనం
- పవనాల ద్వారా క్రమక్షయం
- పవనాల ద్వారా రవాణా
- పవనాల వల్ల నిక్షేపణ
- ఎడారులలో భౌమప్రక్రియలు

10.1 పరిచయం

భూమిని ఆవరించి ఉన్న వాతావరణంలో అతి ముఖ్యమైనది గాలి. పవనం అంటే ప్రసరించే గాలి. ప్రసరించే వాయువులు లేదా పవనాలు భూతలానికి సమాంతరంగా వీస్తుంటాయి. అయితే కొన్ని వైకి, కిందికి సుల్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వాతావరణంలోనే జరుగుతాయి. వాతావరణంలోని పీడనలో వ్యత్యాసాలు సాధారణంగా సౌరశక్తి వికిరణ భేదంవల్ల ఏర్పడతాయి. అందువల్ల కొన్ని చోట్ల అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, కొన్ని చోట్ల అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి. ఈ మార్పులవల్ల వాయు ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ వేడి ఉన్నచోట్ల గాలి వ్యాకోచించేది వైకి లేస్తుంది, చల్లటి గాలి ఆ ప్రదేశంలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

నీటి ఆవిరి, ధూళితో కూడిఉన్న వాయుప్రవాహాలే పవనాలు. ఇవి పీడన అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి అల్ప పీడన ప్రాంతాలకు ప్రసరిస్తాయి. ఈ పవనాల వల్ల నీటిఆవిరి వివిధ ప్రాంతాలకు

తీసుకొని పోబడుతుంది. అనువైన ప్రాంతాలలో వర్షంగా కురుస్తుంది. అంతేకాక చాలా సూక్ష్మమైన శిలాకణాలు ధూళిరూపంలో ప్రసారమవుతాయి. భూనైసర్గికస్వరూపాన్ని మార్చే భౌమకారకాలలో పవనాలు ఎంతో విశిష్టమైనవి. భూమి మీద ఉండే సూక్ష్మశిలాపదార్థరేణువులను వైకి ఎగరవేసి చాలా దూరమైనప్రాంతాలకు చేరవేయడం వల్ల పవనాలప్రభావం భూభాగం మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది.

10.2 పవనాల భౌమ చర్య

అయితే జలప్రవాహానికి (నది) ఉన్న శక్తిసామర్థ్యాలు వాయుప్రవాహానికి లేకపోవడం వల్ల నదుల కంటే పవనాలకు తక్కువ ప్రాముఖ్యం ఉంది. కాని శుష్క ఎడారి ప్రాంతాలలో వర్షం చాలా తక్కువ. కొన్నిచోట్ల అసలే లేకుండా ఉంటుంది. అక్కడ జలప్రవాహాల భౌమచర్యలు తక్కువ స్థాయిలో జరుగుతాయి. అటువంటి శుష్క (arid) ప్రదేశాలలో చెట్టుచేమలు చాలా సక్ష్మత్తుగా ఉంటాయి. దానివల్ల భూఉపరితలం అక్కడ అనాచ్ఛాదితంగా ఉంటుంది. శిథిలశిలలు విరివిగా కనిపిస్తాయి. ఆ ప్రదేశాలలో పవనాల భౌమచర్య చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది. బహుశా ఎక్కువనదులులేని కొరతను పవనాలుతీరుస్తుంటాయని అనుకోవచ్చు.

కొన్నిచోట్ల ప్రవహించేజలాల కన్నా ప్రసరించే పవనాలే భూతలాన్ని ఎక్కువ క్రమక్షయంచేసి తత్ఫలితంగా ఏర్పడే శిథిలశిలాపదార్థాలను రవాణాచేయడంలో ప్రముఖ పాత్రను సంతరించుకుంటాయి. జలప్రవాహంలో ఉపరితల వేగం అధోభాగంలో ఉన్నవేగం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగానే వాయుప్రసారంలో కూడా నేలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతంలోకంటే వైకిపోతున్నకొద్దీ వాయువేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నేలకు కొద్ది అడుగుల ఎత్తున ఏర్పడే సుడుల (eddies) లో వాయు ఉర్జ్యగతి వేగం చాలా ఎక్కువగా వుంటుంది. దీనివల్ల పవనాలు సూక్ష్మధూళికణాలను ఎగిరేలాచేసి వైకి తీసుకొని పోగలుతాయి. పవనాలు రవాణాచేసే కణాలలో సన్నటి ఇసుక రేణువులు, ధూళికణాలు చేరిఉంటాయి. అవి అతिसూక్ష్మంగా 0.15-0.30 మిల్లీ మీటర్ల వ్యాసంతో ఉంటాయి.




10.2.1 పవనాల వల్ల క్రమక్షయం

పవనాల క్రమక్షయప్రక్రియలో రెండు క్రియలు ఉంటాయి. అవి 1. అవఘర్షణ 2. ఎగ రవేత (deflation). ఈ రెండింటిలోను పదార్థాలను పవనాలు ఒక ప్రదేశాలన్నుంచి హరించి కొత్తప్రదేశాలకు తీసుకొనిపోవడం జరుగుతుంది. ఎగరవేత స్వాభావికంగా ఇతర సహాయం ఏమీ లేకుండానే జరుగుతుంది. కాని అవఘర్షణక్రియ జరగడానికి ఇతరపదార్థాల సహాయం చాలాఅవసరం. ఒక ప్రదేశంలో ఉపరితలంమీద ఉన్న సన్నటి ఇసుక, మట్టి మొదలైన సూక్ష్మకణపదార్థాలను హరించి ఎగిరేలాచేసి రవాణాచేయడమేకాక పవనాలు వాటి ప్రసార వేగం తగ్గినప్పుడు తమ భారాన్ని అనువైన ప్రాంతాలలో నిక్షేపాలుగా రూపొందిస్తాయి. అంతేకాక సరస్సులు సముద్రాలు మొదలైన పెద్ద జలాశయాలలో తరంగాలను సృష్టించి వాటిద్వారా తీరప్రాంతాలలో భౌమక్రియ జరగడానికి దోహదకారులుగా పనిచేస్తాయి.

కొన్ని ప్రదేశాలలో పవనాల భౌమక్రియ ఎంతో శక్తివంతంగా జరుగుతుంది. వదులుగా ఉన్న సూక్ష్మశిలా పదార్థకణాలను ముఖ్యంగా ఇసుక, ధూళి మొదలైన వాటిని పెకలించుకొని దూరప్రదేశాలకు తీసుకొనిపోతాయి. పెనుగాలులు, తుఫానులు వీస్తుంటాయి. కాబట్టి పవనాల క్రమక్షయ ప్రక్రియ ఎడారి ప్రాంతాలలో చాలా తీవ్రస్థాయిలో జరుగుతుంది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో చిన్నరాళ్లు బరువుగా వుండడంవల్ల గాలిలోకి ఎగరలేవు. అవి ఉపరితలంమీదనే కొంతదూరం దొర్లిపోవచ్చు.

ప్రచండ పవనాలు సన్నటి ఇసుకరేణువుల ధూళితో కూడుకొని ఉంటాయి. అవి తమ మార్గంలో అడ్డంగా నిలిచిన వర్షతాగ్రభాగాలమీద ఉన్న రాళ్ళను అవఘర్షణవల్ల క్రమక్షయం చేస్తాయి. తమ లోపున్న ఇసుక రేణువులను రంపంపలే కోతకోసే సాధనంగాను, ధూళిని మెరుగుపరిచే సాధనంగాను ఉపయోగించుకొంటాయి. దానివల్ల శిలలపైన గాడులు (grooves) ఏర్పడతాయి. శుష్కప్రదేశాలలో ఇటువంటివి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ గీతలు (streaks) పవనాల ప్రసార దిశల్ని సూచిస్తాయి.

పవనాల ప్రసారమార్గంలో కలిగే మార్పులనుకూడా ఈ గీతలు సూచిస్తాయి. వాయు క్రమక్షయంవల్ల కొన్ని వికృత శిలారూపాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి పీఠాకృతి శిలలు (table rocks) కుక్కగొడుగుల్లా కనబడే (mushroom shaped) రాళ్లు, చిన్నచిన్న గుహలతో కూడిన కొండగుట్టలు (hillocks) మొదలైనవి.



పటం 14 పవనక్రమక్షయంవల్ల ఏర్పడే శిలారూపం - పీఠాకృతి శిల

పవనాలు మోసుకుపోయే ఇసుకరేణువులు చాలా శక్తివంతంగా క్రమక్షయాన్ని కొనసాగిస్తాయి. క్రమక్షయం ఉపరితలంమీదా, దీనికి కొద్దిగా ఎత్తులో ఉండే ప్రదేశాలలోను చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎడారులలో వేసిన టెలిగ్రాఫ్ స్తంభాలు ఇటువంటి అపమర్షణవల్ల త్వరగా క్షీణించి పడిపోవడంకూడా మనం చూస్తుంటాం. ఎడారులలో చిందరవందరగా పడివుండేరాళ్ళు కోసుదేరిన కోణీయముఖాలతో ఉంటాయి. వీటిని ఏకముఖి (Einkanter) త్రిముఖి (Dreikanter) లేదా సూక్ష్మంగా వెంటిఫాక్ట్‌లు (Ventifacts) అంటారు. వెంటిఫాక్ట్ అంటే పవనాల చర్య వల్ల పాలిష్ అయి, ఒక ఆకృతిని పొందిన రాతిముక్క అని అర్థం. వీటికి ఒక కోణంవద్ద కలిసేసున్నటి ముఖాలు ఎన్నో ఉంటాయి. వీటి పరిమాణం కొన్నిమిల్లిమీటర్ల నుంచి 3 మీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. అన్ని వెంటిఫాక్ట్‌లపైన పవనదిశకు సమాంతరంగా ఉండే గుంటలు, గీతలు ఉంటాయి. సంవత్సరం పొడువునా గాలి వీచే మార్గం మారకుండా ఒకేదిక్కుగా ఉంటే ఏకముఖి శిలలు ఏర్పడతాయి. అట్లాకాక పవనాలు

వీచేమార్గంలో మార్పులున్నట్లయితే బండరాళ్ళు తిరగబడిపోవడంవల్ల వాటి రెండు లేదా మూడు ముఖాలు ఏర్పడతాయి. అప్పుడు త్రిముఖశిలలు ఏర్పడతాయి.

ఎంత ఎడారిప్రాంతంలోనైనా అప్పుడప్పుడు చాలా కొద్దిపాటి వర్షాలు పడుతుంటాయి. అవి కురిసినప్పుడుమాత్రం చాలా ఉధృతంగా, ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. అందువల్ల పర్వతప్రాంతాలనుంచి ఏరులు, వాగులు చాలా భీభత్సంగా ప్రవహించి ఎక్కువగా రాళ్ళను మట్టిని కిందికి లాగుకొని వస్తాయి. ఎందుకంటే అటువంటి శీతోష్ణపరిస్థితులలో శిలలు బాగా శిథిలమవుతాయి. త్వరగా క్రమక్షయం చెందుతాయి. ఎడారిప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఎక్కువగా చెట్లూ చేమలూ కూడా వుండవు. పవనాలు సాధించే ప్రముఖ భౌమక్రియ చిన్న చిన్న రేణువులను ఎగరగొట్టి వాటిని పెద్దమొత్తాలలో ఇతర ప్రాంతాలకు మోసుకొనిపోవడం.

మీ ఆవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. పవనాల వల్లజరిగే క్రమక్షయంలో ప్రక్రియలు ఏవి? వాటిని గురించి వ్రాయండి.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. పవనాల చర్యవల్ల పాలిష్ అయి నున్నని ఉపరితలాలు పొందిన రాయి.

(అ)వెంటిఫాక్ట్ (ఆ) బార్కాన్ (ఇ)స్నేప్

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.2.2 పవనాల వల్ల రవాణా

పవనాలు రవాణా చేసేపద్ధతి, అవి మోసుకుపోయే పదార్థాల ఆకారం, సాంద్రత, పరిమాణాల పైన, పవనవేగంపైన ఆధారపడి వుంటుంది. చిన్నచిన్న ఇసుకరేణువులు దుమ్ము, ధూళి కణాలు గాలిలో తేలుతూ రవాణా అవుతాయి. కొంచెం పెద్ద ఇసుకరేణువులు గులకరాళ్ళు నేలపైన దొర్లుతూ పోతాయి. మెల్లగా వీచే మలయమారుతంకూడా సూక్ష్మమైన ధూళిని రవాణాచేస్తుంది. జోరుగా వీచే గాలి సుమారు 40 కి.మీ. వేగంతో 1 మి.మీ. వ్యాసమున్న ఇసుకను మోసుకొనిపోతుంది. పెనుతుపానుగాలులు, హరికేన్లు (Hurricanes) 6 నుంచి 10 మి.మీ. వ్యాసం గల పెద్దగులకరాళ్ళను, గుండ్రాళ్ళను దొర్లించివేస్తాయి.

భీభత్సమైన సుడిగాలి లేదా “దెయ్యంగాలి”దుమ్మును, ధూళికణాలను ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుకు తీసికొని పోగలుతాయి. మరీ భయానకమైన సుడిగాలులను బార్నాడ్ (Tornado)లు అంటారు. ఇవి ఎంతో శక్తివంతంగా పెద్దపెద్ద చెట్లను సైతం వెకళించివేసి గాలిలోకి ఎగరగొట్టి వేస్తాయి. తుఫానులు వచ్చేకాలంలో ఇటువంటి బార్నాడ్‌లు అప్పుడప్పుడు ఏర్పడి పరిమిత ప్రాంతాలలో విపరీతమైన నష్టాల్ని కలిగించి భయోత్పాతాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఇవి బరువుగా వుండే వాహనాల్ని సైతం ఎగరగొట్టి కొంతదూరం మోసుకొని పోయి కిందపడవేసిన సందర్భాలు చాలాఉన్నాయి.

ప్రబలంగా వీచే పవనాలు వదులుగా విడివిడిగా ఉన్న ఇసుకరేణువులను ఎగరగొట్టి మోసుకొని పోతాయి. కొంచెం పెద్దవాటిని గంతులువేసేటట్లు చేస్తాయి. ఈ పద్ధతిని సాల్టేషన్ (Saltation) అంటారు. గండ్రఇసుక, గులకరాళ్లు నేలపైన దొర్లుతూ పోతుంటాయి. ఇసుక ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో ఈ చర్యను చూడవచ్చు.

పవనాలు మోసుకొనిపోయే భారం అనేక విధాలుగా వుంటుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి శిథిల శిలలనుంచి అపఘర్షణవల్ల వేరైన శిలాపదార్థాలు. ఆ విధంగానే నదీగర్భంలో ముఖ్యంగా వరద మైదానాలలో కనిపించే ఇసుకదిబ్బలు, సముద్రతీరాలలో ఉండే ఇసుక తిన్నెలు, శీతలమండలాలలో అక్కడక్కడ కనిపించే మొరేన్‌లు ఈ బరువును సమకూరుస్తాయి. అగ్నిపర్వతప్రాంతాలలో భీభత్సకర, వినాశకర (వేలుళ్ళు) సంభవించినప్పుడు చాలా పెద్దమొత్తాలలో తేలికపాటి అగ్నిశిలాధూళి గాలిలో కలిసిపోతుంది. ఈ ధూళి వాతావరణపు పైపొరలలో ప్రవేశించడంవల్ల కొన్ని సమయాల్లో సూర్యాస్తమయాలు వింతవింత కాంతులతో కనిపిస్తాయి. పవనాలు ఈ అగ్నిశిలాధూళిని కొన్ని పరిస్థితులలో వందలమైళ్ళకొద్దీ దూరం మోసుకొనిపోతాయి. భౌమకాల చరిత్రలో ఈ విధంగా అగ్ని పర్వతాల ప్రేలుళ్ళవల్ల ఏర్పడినధూళి క్రమంగా పవనాలవల్ల దూరప్రాంతాలకు రవాణాఅయి అక్కడే నిక్షేపం చెందినట్లు దాఖలాలు కనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతకాలంలో అక్కడక్కడ ఇటువంటి అగ్నిశిలా భస్మ నిక్షేపాలు కనిపిస్తాయి. వాటివల్ల నిక్షేపాల చరిత్రను తెలుసుకోగలుగతాం.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

3. ‘బార్నాడ్’ అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


10.2.3 పవనాలవల్ల నిక్షేపణ

జల ప్రవాహాలైన నదులవలెనే పవనాలు తమవేగం తగ్గిపోయినప్పుడు అవి మోసుకొనిపోతున్న బరువును వదిలివేసి నిక్షేపాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సాల్టేషన్ క్రియలో దొర్లుతూ, గంతులువేస్తూపోయే పెద్దశిలాపదార్థాలు పవనవేగం తగ్గుతూంటే మొట్టమొదట నిక్షేపిత మవుతాయి. ధూళికణాలు, ఇసుకరేణువులు కొంతదూరం గాలిలో తేలియాడుతూ తర్వాత క్రమంగా నిక్షేపితమవుతాయి. మూలస్థావరాల

నుంచి దూరంగా పోయేకొద్దీ ఇటువంటి నిక్షేపాలతో క్రమంగా కణాల ఆకారస్వరూప స్వభావాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఇసుకమేటవేసినచోట్ల నేలదిబ్బలుగా కనిపిస్తుంది. సన్నటి ధూళినిక్షేపాలున్నచోట్ల నేలవైన దుప్పటికప్పినట్లుంటుంది.

ఇసుక నిక్షేపాలు: ఇసుక నిక్షేపాలు (Sand deposits) విశిష్టమైన లక్షణాలతో రూపొందిఉంటాయి. వీటిలో అణువులు (particles) కొంచెం పెద్దవిగావుండి వాటి రూప భేదాలనుబట్టి శ్రేణీకృతమై నట్లుంటాయి. పవనాలవల్ల నిక్షేపణ ఇసుకదిబ్బలుగా ఏర్పడుతుంది. వీటిని ఇసుకదిబ్బలు (sand dunes) అంటారు. ఇవి సాధారణంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలలోను, వరదమైదానాలలోను ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఏ ప్రదేశంలోనైనా వదులుగానున్న ఇసుక విస్తారంగా లభిస్తే నిరంతరం వీచే పవనాలవల్ల, వాటి ప్రభావం వల్ల ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడతాయి. అవరోధాలు పవనాల వేగాన్ని తగ్గించివేయడంవల్ల వాటి వేగం తగ్గుతుంటే, అవి మోసుకొని వచ్చే బరువు (load) నిక్షేపితమవుతుంది. అందువల్ల పవన ప్రవాహ మార్గంలో ఏవైనా పెద్ద పెద్ద బండలు మొదలైన అవరోధాలుంటే అక్కడ ఇసుక దిబ్బ ఏర్పడడం ప్రారంభమవుతుంది. అది క్రమంగా పెరిగి పెద్దదిఅవుతుంది. ప్రాథమిక దశలో దీనిఆకారం కోడిగుడ్డు (oval shaped)లా ఉంటుంది. కాని వెరిగే కొద్దీ దీని వెనుక భాగంలో పవన వేగం మందగించి సుల్లు తిరుగుతుంది. అందువల్ల శృంగభంగం (crest) వెనుకకు విరిగిపడుతుంది. వృద్ధిపొందుతున్న ఇసుక దిబ్బ పార్శ్వభాగాలు ముందుకు సాగిరెక్కలు లేదా కొమ్మలవలె కనిపిస్తాయి.


క్రమబద్ధ రీతిలో ఏర్పడిన ఇసుక దిబ్బ పార్శ్వ రేఖాకృతి (Profile) లో గాలి వీచే దిక్కున ఉపరితలం 10° నుంచి 15° వరకు వాలి ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో ఈ వాలు 20° నుంచి 30° వరకు ఉంటుంది. నిరంతరం వీచే పవనాల ప్రభావం వల్ల ఇసుకదిబ్బల వెనుక భాగంలో ఇసుక క్రమంగా జారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇసుక కొంతకాలానికి ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకు జరిగి వలస (migrate) వెళ్ళినట్లుగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల వీటిని వలసపోయే ఇసుక దిబ్బలు అంటారు. ఇటువంటి స్థానచలనం ఒక సంవత్సరంలో సుమారు 100 అడుగుల వరకు ఉండవచ్చు. ఇట్లా చలించే ఇసుకదిబ్బలు క్రమంగా తమలోని పదార్థాలను కోల్పోయి పరిమాణంలో క్షీణించిపోతాయి. ఈ కదిలే స్వభావం గల ఇసుకదిబ్బలు అప్పుడప్పుడు సాగుచేసుకొనే పొలాలను కూడా కబళించి వేస్తూ వ్యవసాయానికి చాలా హానికరంగా పరిణమిస్తాయి. ఈ ఇసుకదిబ్బలు సాధారణంగా 200 లేదా 300 అడుగుల ఎత్తునుమించి ఉండవు. కాని ఆఫ్రికాలోని సహారావిడారిలో ఉండే ఇసుక దిబ్బలు 1000 అడుగుల ఎత్తు దాకా ఉంటాయి (చూటూ 15).



పటం 15 వలసపోయే ఇసుకదిబ్బ.

వైన పేర్కొన్నట్లు పవనాలు చాలా కాలం ఒకే దిక్కుగా వీస్తుంటే ఇసుక దిబ్బల ఆకార స్వభావాలు ఒకే మోస్తరుగా ఉంటాయి. కాని పవనాల ప్రవాహమార్గాలు రుతువులను బట్టి ఉంటుంటే వల్ల ఇసుక దిబ్బల ఆకారాలు ఒక దానికొకటి చిక్కువడి చిందరవందరగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. పెద్ద ఎడారి ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా రెండురకాల ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడతాయి. అవి

అ) అడ్డంగా ఉండే (transverse) ఇసుక దిబ్బలు. వీటినే బార్ఖాన్లు (Barchan) అంటారు. ఆ) నిలువుగా ఉండే ఇసుక దిబ్బలు, వీటిని సైఫ్లు (Seifs) అని పిలుస్తారు.



పటం 16 బార్ఖాన్-అడ్డంగా ఉండే ఇసుకదిబ్బలు.

బార్ఖాన్: బార్ఖాన్ అంటే చంద్రవంక ఆకారంలో ముందు భాగం కొద్దివాలుతో వెనుకభాగం బాగా ఏటవాలుగా ఉండే ఇసుకదిబ్బ. దీనికి రెండు పక్కలా రెండు రెక్కలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ బార్ఖాన్లు చాలా కాలం పవనాలు ఒకే దిశగా వీస్తున్నప్పుడు ఏర్పడతాయి. పవన ప్రవాహమార్గంలో ఏదైనా మార్పువస్తే ఈ విధంగా సావ్యవమైన ఇసుకదిబ్బలు ఏర్పడలేవు. ఇసుక పరిమాణం తక్కువగా ఉండి, భూకపరితలం చదునుగాను, కఠినంగాను, వృక్షరహితంగాను ఉన్న చోట్ల ఈ ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడతాయి (పటం 16).

ఇసుక దిబ్బ అరబ్బుల కత్తిని పోలి ఉంటుంది. ఒకే వైపు నుంచి రెండు లేదా మూడు పవనాలు వీస్తే ఇవి ఏర్పడతాయి. సైఫ్లు ప్రముఖంగా అరేబియా, ఫ్రెంచి, సహారా, ఆస్ట్రేలియాలోని ఎడారులలో కనిపిస్తాయి.

సైఫ్ (Seif): లేదా దీర్ఘిక్వత ఇసుకదిబ్బలు. ఇసుక దిబ్బ నిడివిగా అరబ్బుల కత్తిని పోలి ఉంటుంది. ఒకే వైపు నుంచి రెండు లేదా మూడు పవనాలు వీస్తే ఇవి ఏర్పడతాయి. సైఫ్లు ప్రముఖంగా అరేబియా ఫ్రెంచి, సహారా, ఆస్ట్రేలియాలోని ఎడారులలో కనిపిస్తాయి (పటం 17).



పటం 17 సైఫ్-నిలువుగా ఉండే ఇసుకదిబ్బలు.

తిర్యక్ ఇసుక దిబ్బలు (transverse dunes) వృక్షాలు తక్కువగా ఉండి లేదా అసలు లేని చోట, ఇసుక ఎక్కువగా ఉన్నచోట ఇసుక దిబ్బలు పవన దిశకు లంబకోణంలో ఉండి మధ్యమధ్యన

ద్రోణులు గల పాడువైన గుట్టలుగా ఏర్పడతాయి. పవన దిశకు లంబంగా ఉన్నదువల్ల వీటిని తిర్యక్ ఇసుకదిబ్బలు అంటారు. సముద్ర తీరపు ఇసుక దిబ్బలు సాధారణంగా ఈ రీతికి చెంది ఉంటాయి. శుష్కప్రాంతాలలో కూడా ఇవి తరచుగా కనిపిస్తాయి.

ఇసుక దిబ్బల నిర్మాణం : ఇసుక దిబ్బను వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే కొన్ని విశిష్ట లక్షణాలు కనబడతాయి. గాలి వీచే మార్గం వైపున ఎక్కువ వాలు ఉంటుంది. కదిలే స్వభావంగల ఇసుక దిబ్బలలో ఎప్పటికప్పుడు శృంగం (crest) వద్ద ఇసుక జారుతూ ఉంటుంది. కొంత కాలానికి పొరలు అడ్డదిడ్డంగా ఏర్పడతాయి. వీటిపై భాగంలో చిన్నతరగ గుర్తులు (ripple marks) ఏర్పడతాయి. వీటి అలల శిఖరభాగంలో కొంచెం పెద్ద ఇసుక రేణువులు కనిపిస్తాయి. సన్నటి రేణువులు మధ్యన ఉన్న గుంటలలో పోగవుతాయి. ఇట్లా అలలవలే ఏర్పడే స్వభావం పవనాల వృథక్కరణ క్రియ (Sorting action)లోని భాగం.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

4. బార్ఖాన్ అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. సైఫ్ అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

.....

6. దీర్ఘిక్రత ఇసుకదిబ్బలకు మరొక పేరు?

(అ) బార్ఖాన్లు (ఆ) సైఫ్లు (ఇ) డ్రిఫ్ట్లు (ఈ) ఇసుక దిబ్బలు

.....

.....

.....

.....

ధూళి, జంబాల నిక్షేపాలు : పవనాల ప్రసార వేగం తగ్గిన కొద్దీ అవి మోసుకొనిపోయే బరువులో చాలా భాగం నెమ్మదిగా కిందికి దిగిపోయి నేలపై నిక్షేపితమవుతుంది. వర్షాలు కురిస్తే ఈ ధూళి చాలా త్వరగా విడివడి గాలి శుభ్రపడుతుంది. రంగు రంగుల బురదతో కూడిన వర్షాల గురించి, హిమపాతాల గురించి మనం అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. ధూళికప్పి ఉన్న ప్రాంతాలు చాలా విస్తారంగా ఉంటాయి. వాటికి ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండకపోవడంతో వాటిని గురించి తెలుసుకొనే అవకాశం తక్కువ. కాని, చారిత్రకదృష్ట్యా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎన్నో ప్రాచీన నగరాలు, పటణాలు కాలగర్భంలో మరుగున పడిపోవడానికి ముఖ్యకారణం అవి మట్టి దిబ్బలుగా మారిపోవడమే. పవనాలచేత రవాణాఅయి, నిక్షేపితమైన వాటిని వాయునిక్షేపాలు (aeolin deposits) అంటారు. వీటికి కొన్ని విశిష్ట లక్షణాలుండడం వల్ల ప్రత్యేకమైన ఫేర్లతో పిలుస్తారు. అగ్నిపర్వతమయ ప్రదేశాలలో సాధారణంగా సంభవించే పెద్ద (పేలుళ్ళు) వల్ల బహిర్గతమైన అగ్ని శిలాధూళి కోణాలున్న చిన్న చిన్న గాజు ముక్కలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. దీనిని అగ్ని పర్వతశిలాభస్మం (Volcanic ash) అంటారు. ఆ విధంగానే కొన్ని చోట్ల పెద్ద పెద్ద మట్టి దిబ్బలు కనిపిస్తాయి. ఇవి కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఎడారుల నుంచి లేదా హిమానీనదనం చెందిన ప్రాంతాల నుంచి వీచిన పవనాలవల్ల రవాణా అయి ధూళితో కలిసి ఉంటాయి. వీటినే లోయెస్ (Loess) అంటారు.

లోయెస్: ఇది కొంచెం పసుపు పచ్చ వర్ణంలో ఉంటూ మెత్తని మట్టితో స్తరితంగా నిర్మితమై ఉంటుంది. కొద్దో గొప్పో శైలిక్రియకు లోబడి ఖనిజాలువులతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఈ ఖనిజాలు సాధారణంగా క్వార్ట్జ్, ఫెల్డ్స్పార్, హార్నబ్లెండ్, కెల్సైట్ మొదలైనవి. ఈ పచ్చటి మట్టి దిబ్బలు 10 లేదా 12 మీటర్ల ఎత్తున పేరుకొని ఉంటాయి. వీటిని అమెరికా మధ్య ప్రాంతాలలో చూడవచ్చు. చైనాలో ఈ లోయెస్ నిక్షేపాలు ఇంకా ఎత్తుగా (100 మీటర్లవరకు) ఉంటాయి. ఇంత ఎత్తుగా ఉన్నప్పటికీ ఇవి త్వరగా శిథిలంకావు. ఈ దిబ్బలమధ్య ప్రవహించే చిన్నచిన్న ఏరులు, వాగులు ఏర్పరచిన లోయల మధ్యచ్ఛేదాల (cross section) వల్ల వీటి నిర్మాణరీతులను గ్రహించడానికి వీలుంది. వీటిలోపుండే ఖనిజాల అణువులు కోణాకారంగా వుండడంవలన త్వరగా దొర్లిపోవడానికి వీలుండదు. ఆ కారణంగా ఈ లోయెస్దిబ్బలు త్వరగా క్రమక్షయం చెందవు.

వీటి ఖనిజసంయోగంవల్ల విలువైన వృత్తికలు ఏర్పడతాయి. అందువల్ల ఈ లోయెస్ ఉన్న ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా అమెరికాలోని అయోవా, ఇల్లినాయ్, మిస్సోరీ రాష్ట్రాలలో అతి సారవంత విశాల వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నిక్షేపాలు పవననిర్మితమని చెప్పడానికి ఆధారాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాటిలోని ఖనిజాల ఆకారాన్ని, పరిమాణాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా లోయెస్ధూళి కొండ కోనలన్నిటి మీద ఒక తెరలా ఆవరించి ఉండవల్ల అది పవనాలవల్ల ఏర్పడిందని నిర్ధారణచేయవచ్చు. దీనిలో అక్కడక్కడ కనిపించే కర్పరాలు (Shells) లోయెస్ ప్రధానంగా పవనాలవల్లనే నిర్మితమైనదని చెప్పడానికి తగినసాక్ష్యం. ఈ లోయెస్నిక్షేపాలలో చాలాభాగం హిమానీనదనం చెందిన ప్రాంతాలనుంచి పవనాలవల్ల రవాణాఅయి ఇక్కడ నిక్షేపణచెందాయని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. నిశితంగా పరిశీలిస్తే లోయెస్ హిమానీనద గోళాశ్మమృత్తిక (glacial fill)తో గాని తదితర హిమజలనిక్షేపాలతోగాని నిర్మితమైనదని గ్రహిస్తాం. హిమానీనదాలు కరిగి క్షీణించిన ప్రదేశాలలో మెత్తటి మట్టి బాగా పేరుకొనిపోయి ఉంటుంది. అది క్రమంగా క్రమక్షయం చెంది ధూళివలె తయారవుతుంది. కాలక్రమాన పవనాలవల్ల ఎగిరి కొంతదూరం వెళ్లి పరిసర ప్రాంతాలలో నిక్షేపణ చెందవచ్చు. బహుశా అటువంటి నిక్షేపమే నేడు లోయెస్గా మారి వుంటుంది.

చైనాలోని షెన్సిప్రాంతంలో ఈ లోయెస్ నిక్షేపాలు విస్తారంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి. అవి చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి. మధ్య ఆసియాలో ఉన్న శుష్కప్రాంతాలనుంచి నిరంతరం వీచే పశ్చిమపవనాలు తీసుకువచ్చిన ధూళివల్ల ఈ లోయెస్దిబ్బలు నిర్మితమై వుండవచ్చు. అయితే ఈ లోయెస్ చాలా త్వరగా వర్షాలవల్ల, పవనాలవల్ల క్షీణించడం ఒక విశిష్ట లక్షణం. అందువల్ల చారిత్రక కాలంలో నిర్మితమైన రహదారులు మొదలైనవి నేడు మరుగునపడి ఉంటాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

7. లోయన్ అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

.....

10.3 ఎడారులు

శుష్కమైన ఎడారులలో పవనాల భౌమచర్య, వాటి ప్రభావం చాలా హెచ్చుగా వుంటాయి. అక్కడ పవనాలు రుతువునుబట్టి మారుతూ వుంటాయి. అవి నెలలతరబడి ఒకేదిగా వీస్తుంటాయి. అటువంటి ప్రాంతాలలో ఆకాశం ఎప్పుడూ మేఘాలులేకుండా నిర్మలంగా వుంటుంది. వాతావరణం చాలా పొడిగా వుంటుంది. రేయింబవళ్ల ఉష్ణోగ్రతలలోని వ్యత్యాసం చాలా హెచ్చుగా వుంటుంది. సాలుసరి వర్షపాతం చాలా సకృత్తుగా ఉండడంవల్ల పెద్దపెద్దచెట్లు పెరగవు. వృక్షసంతతి చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది. మృత్తికాపరిమితి చాలా తక్కువ. వర్షపాతం 10-12 సెం.మీ. వరకు ఉంటుంది. అయితే ఆ కొద్దిపాటి వర్షంకురిసినప్పుడు మాత్రంచాలా ఉధృతంగా వుంటుంది. అందువల్ల వాగులు వంకలు ఏకమై వరదలు పెద్దపెట్టున వస్తాయి. అందువల్ల మృత్తికాక్షయం చాలా హెచ్చుస్థాయిలో సాగుతుంది. ఎడారిప్రాంతంలో సాధారణంగా చిన్నచిన్న నదులు ఏర్పడి అవన్నీ మధ్యలో ఒక హరివాణం (Basin)లో చేరతాయి. ఏరులు, వాగులు ఎక్కువగా తీసికొనిపోయిన మట్టి, ఇసుక, తదితర పదార్థాలు ఈ హరివాణాలలో విస్తారంగా నిక్షేపితమవుతాయి. వరదలు ఒక్కసారిగా రావడంవల్ల ఏరులు పెద్ద కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తాయి. అయితే అంత త్వరగానే ప్లాయా (playa) సరస్సులోకి ప్రవహించి అంతమవుతాయి. అందువలన ఆ నదులు ప్రవహించే మార్గాలు సంవత్సరంలో చాలా భాగం ఎండిపోయి వుంటాయి. వాటిని వశ్చిమాసియా, ఆఫ్రికాలలో వాడిలు (wadis) అని పిలుస్తారు. వీటిలో పవనాలు ఎక్కువగా వీస్తుంటాయి. కాబట్టి వాటి పార్శ్వాలు అక్కడక్కడ మెరుగులు దిద్దినట్లు మారిపోతాయి. కాలక్రమేణా ఈ ప్లాయా సరస్సులు ఎండిపోయి, వాటిలో మట్టి ధూళిపవనాలవల్ల రవాణాఅవుతాయి. అప్పుడు సహజంగా ఈ ప్లాయసరస్సులు అడుగుభాగంలో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు, గులకరాళ్లు తప్ప మెత్తటి మట్టిగాని, ఇసుకగాని కనిపించదు. వీటిని వెనకబడ్డ రాళ్లు (lag stones) అంటారు. నల్లగా బూడిదరంగులో నిగనిగలాడుతూ వుంటాయి. దీనికారణంగానే వీటిని ఎడారివార్నిష్ (desert varnish)గా పేర్కొంటారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

8. ఎడారి వార్నిష్ అంటే ఏమిటి?

.....

.....

.....

.....

.....

10.4 ఎడారులలో భౌమప్రక్రియలు

తక్కువ తేమగల భూమధ్యరేఖాప్రాంతంలో జరిగే భౌమప్రక్రియలకు శుష్క ఎడారులలో జరిగేవాటికి ఎంతో వ్యత్యాసముందని మనం సులువుగా గ్రహించవచ్చు. ఎడారులలో శైథిల్యప్రక్రియ ముఖ్యంగా యాంత్రికంగాను భౌతికంగాను వుంటుంది. దానివల్ల నేలమీద ఉన్న వైపరమందం చాలా తక్కువగావుండి పెద్దపెద్ద అణువులతో నిర్మితమై ఉంటుంది. అది ఒక్కొక్కప్పుడు అసలు కనిపించదు. ఈ ప్రాంతాలలో కనిపించే శిలల సంధులు (Joints) చాలాసన్నిహితంగా దగ్గరగా వుంటాయి. అందువల్ల శైథిల్యప్రక్రియలో శిలలు సంధులవద్ద విరిగి బద్దలైపోతాయి. దానిఫలితంగా రాళ్లు కోసులుతేరి నిలారుగా నిలబడినట్లుగా వుంటాయి. నేలబారున విస్తరించే రాళ్లున్న కొండలు పైన బల్లవరుపుగా ఉండి వాటి పార్శ్వాలు మాత్రం చాలా నిలారుగా కనబడతాయి. వీటినే మెసాలు, బ్యూట్లు అని అంటారు. ఇటువంటివి శుష్క ఎడారిప్రాంతాలలో విశేషంగా కనిపిస్తాయి.

ఎడారులలో వుండే ఏర్లు, వాగులు మొదలైనవాటి లోయలు సాధారణంగా నిలారుగా వుండే పార్శ్వాలతోను బల్లవరుపుగా ఉండే అడుగుభాగాలతోను వుంటాయి. కాబట్టి వీటిని వేటికలగాధదరులు (Box Canyons) అంటారు. వీటిలో నదులు వరదలతో ఉధృతంగా ప్రవహించేటప్పుడు వాటి పార్శ్వాలు క్రమక్రమంచెంది ఒడ్డులు విరిగి పడిపోవటం తటస్థిస్తుంది. వరదలు తగ్గుతున్నప్పుడు ఒడ్డులు విరిగి పడిపోవడంవల్ల ఏర్పడిన మట్టి వదార్దాలు ప్రవాహమార్గమధ్యంలో మేటవేసిపరచినట్లుంటాయి. నదులకు వరదలు వచ్చినప్పుడు వాగులు బాగాలోతుఅవుతాయి. ఇక్కడ క్రమక్రమం ఎక్కువకనుక విలక్షణ స్థలాకృతి ఏర్పడుతుంది. దీనినే బాడ్ ల్యాండ్ స్థలాకృతి (badland topography) అంటారు. భారత దేశంలో ఈ స్థలాకృతులు ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ లోని చాంబల్ నదీలోయ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ లోయలు చాలా లోతుగా వుంటాయి. ఇవి సంకీర్ణంగానూ, సంక్లిష్టంగానూ వుండడంవల్ల బందిపోటు దొంగల ముఠాలకు నెలవులుగా ప్రసిద్ధిచెందాయి.

10.5 సారాంశం

ఈ భాగంలో పవనాల భౌమ చర్యను- పవన క్రమక్రమం, రవాణా, నిక్షేపణలను వివరించాం. పవనాలవల్ల రూపొందే ఇసుక దిబ్బలవంటి స్వరూపాలను వివరించాం. ఎడారులలో భౌమ ప్రక్రియలను, వాటి ఉత్పాదితాలను ప్రస్తావించాం.

10.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. పవన క్రమక్రమం ముఖ్యంగా రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది. i) ఎగరవేత, ii) అపమర్దణ
i) ఎగరవేత: ధూళి, గార్నెట్ ఉంటే, ఇసుక, గులకరాళ్ల వంటి వదులు శిలారేణువులను పవనాలు ఎగరగొట్టి రవాణా చేయడం.
ii) అపమర్దణ: పవనాలు తాము రవాణాచేసే ఇసుకను కోత పరికరాలుగా వాడుకొని శిలలను అరగదీయడం.
2. వెంటిఫాక్ట్లు.
3. దుమ్మును, ధూళికణాలను ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుకు తీసుకొనిపోయే భయానకమైన సుడిగాలులు. ఇవి ఎంతో శక్తివంతంగా పెద్దపెద్ద చెట్లను కూడా వెకిలించి గాలిలోకి ఎగరవేస్తాయి. తుఫానులు వచ్చే కాలంలో ఇవి విపరీతమైన నష్టాన్ని కలిగించి భయోత్పాతాన్ని సృష్టిస్తాయి.
4. చంద్రవంక ఆకాశంలో ముందు భాగం కొద్దివాలుతో వెనుకభాగం బాగా ఏటవాలుగా ఉండే ఇసుక దిబ్బ. రెండు ప్రక్కలా రెండు రెక్కలు ఏర్పడి ఉంటాయి.

5. విడివిడిగా ఉండి అరబ్బుల కత్తిని పోలిఉండే ఇనకదిబ్బ.
6. సైఫలు.
7. పవనాల వల్ల నిక్షేపితమైన మెత్తని మట్టిని లోయెస్ అంటారు. దీనిలో క్వార్ట్జ్, ఫెల్స్పార్, హార్న్ బ్లెండ్, కేల్సైట్ మొదలైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇది స్తరితనిర్మితిని చూపుతుంది.
8. ఎడారి ప్రాంతాలలో గులకరాళ్ళు, గోళశిలలు తదితరశిలాఖండాల ఉపరితలంపై మెరుస్తూ కనిపించే నల్లని లేదా కపిలవర్ణపు పొర.

10.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. పవన క్రమక్షయంలోని ప్రక్రియలను వివరించండి. ఎగరవేత వల్ల ఏ భూస్వరూపాలు ఏర్పడతాయి?
2. పవనాలచర్య వల్ల ఏర్పడే నిక్షేపాలను వర్ణించండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. లోయెస్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది?
2. సైఫలు, బార్ఘాన్లు అంటే ఏమిటి? అవి ఎలా వలస చెందుతాయి?

ఖండం 3 : అంతర్ భామ ప్రక్రియలు

భాగం-11 : అగ్నిపర్వతాలు

పాఠ్యాంశాలు

11.0 అక్ష్యాలు

11.1 అగ్నిపర్వతాల స్వభావం

11.2 అగ్నిపర్వత ఉత్పాదితాలు

11.3 అగ్నిపర్వత ఉద్బేధనలు

11.4 అగ్నిపర్వత రీతులు

11.4.1 పీల్డ్ అగ్నిపర్వతాలు

11.4.2 సిండర్ శంకువులు

11.4.3 సంయుక్త శంకువులు లేదా స్తరిత అగ్నిపర్వతాలు

11.5 అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత

11.5.1 హావాయి రీతి

11.5.2 స్ట్రాంబోలియన్ రీతి

11.5.3 వుల్కానియన్ రీతి

11.5.4 వెసూవియన్ రీతి

11.5.5 ప్లీనియన్ రీతి

11.5.6 పిలియన్ రీతి

11.6 సారాంశం

11.7 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

11.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

11.0 అక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో మీరు అగ్నిపర్వతాల స్వభావం, ఉత్పాదితాలు, క్రియాశీలత, రీతుల గురించి తెలుసుకొంటారు. ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు-

- అగ్నిపర్వతాల సాధారణ స్వభావాన్ని చర్చించగలుగుతారు
- అగ్నిపర్వత ఉత్పాదితాలను వర్ణించగలుగుతారు
- ఉద్బేధనం, అగ్నిపర్వత శంకువులను వర్ణించగలుగుతారు
- అగ్నిపర్వతాల క్రియాశీలత దశలను చర్చించగలుగుతారు
- అగ్ని పర్వతాలలోని రీతులను వర్ణించగలుగుతారు

11.1 అగ్నిపర్వతాల స్వభావం

ఆంగ్లభాషలో 'Volcano' అనే పదాన్ని రోమన్ల అగ్నిదేవుడైన 'Vulcan' నుంచి వచ్చింది. ఇతడు అగ్నిపర్వతంలో ఉంటాడనే ఊహ ఆధారంగా ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది. సిసిలీలోని మౌంట్ ఎట్నాకు, సిసిలీకి ఉత్తరంగా ఉన్నవిపారి ద్వీపాలలోని కొన్ని అగ్నిపర్వతాలకు ఈ పేరును ప్రప్రథమంగా వాడారు. Volcanism అనే పదాన్ని అగ్నిమయ క్రియాశీలతకు సంబంధించిన అంశాలన్నింటికీ కలిపి వాడతారు.

భూపటలంలోని ఒక పైప్ లేదా విదరముఖద్వారం చుట్టూ ఏర్పడి వేడిగాను, జ్వలిస్తూ ఉన్న మాగ్మా సంబంధ పదార్థాలను అవిచ్ఛిన్నంగా, లేదా అప్పుడప్పుడు విరజిమ్మే ఉపరితల రూపానికి అగ్ని పర్వతం అనే పదాన్ని వాడతారు. ఇది సాధారణంగా సౌష్ఠవ ఆకృతిలో ఉంటుంది. అగ్నిపర్వతం ఇతర పర్వతాలనుంచి నిర్మితమయినాను, ఉద్భవరీత్యా ఎంతో భిన్నంగా ఉంటుంది. భూపటలంలోని రంధ్రం లేదా కాండ్యూట్ చుట్టూ ఘనపదార్థాలు పోగుపడి కొద్ది ఒక శంకువు వంటి రూపం ఏర్పడి అది క్రమేణ పెరిగి పెద్దఅగ్నిపర్వతంగా రూపొందుతుంది.

అగ్నిపర్వతాలు పరిమాణంలో చిన్న శంక్వాకారపు కొండలు మొదలుకొని ఎంతో పెద్ద పర్వతాల వరకు ఉండవచ్చు. ఆండీస్ పర్వతాలలోని అత్యున్నత శిఖరాలలో కొన్ని అగ్నిపర్వతాలే. ఈ క్వెడార్లోని కొటాపక్సి అగ్నిపర్వతం ప్రపంచంలో కెల్లా ఎత్తైన అగ్నిపర్వతం (5880మీ.). మౌంట్ కిలిమంజారో, మౌంట్ పీజీ, మౌంట్ మేయాన్ పర్వతాలకు ఉత్తమమైన శంక్వాకృతి ఉంది. హవాయి ద్వీపాలు సముద్రమట్టానికి 4200 మీ. ఎత్తున ఉన్న అగ్నిపర్వతాలు. ఇవి వసిఫిక్ సముద్రంలో సుమారు 4200-5400మీ. మధ్య లోతు ఉన్నచోట సముద్రభూతలం మీద ఏర్పడిఉన్నాయి. అన్ని అగ్నిపర్వతాలు ప్రస్తుతకాలంలో క్రియాశీలంగా లేవు. వీటిలో కొన్ని మౌంట్ షస్తా, మౌంట్ రేయినర్, మౌంట్ హడ్, మౌంట్ బేకర్ వంటివి ఇటీవలి కాలంలో విలుప్తత చెందాయి. సిసిలీలోని మౌంట్ ఎట్నా ఇప్పటికీ క్రియాశీలంగా ఉంది.

బాగా రూపొందిన ప్రతి అగ్నిపర్వతశంకువుకు శీర్షభాగంలో గరాటును పోలిన గుండం ఉంటుంది. దీనినే అగ్నిపర్వత ముఖం అంటారు. ఉద్బేదన సమతలంలో దీని ద్వారానే శిలాఖండాలు బయటకు విరజిమ్మబడతాయి. కొన్ని అగ్నిపర్వతాలలో లావా ముఖం ద్వారా బయటకు వస్తుంది. కొన్నింటిలో శంకువు పార్శ్వాలను చీల్చుకొనిగాని, దాని పీఠానికి దూరంగా భూమిలోని పగుళ్లద్వారా గాని బయటకు వస్తుంది. మాగ్మా అనేది కేవలం ద్రవరూపపు శిల అనుకోకూడదు. ఈ ద్రవంలో వాయువులు, ఇతర బాష్పశీల ఘటకాలు కూడా ఉంటాయి. మాగ్మా భాగాలలో అధికపీడన కేంద్ర ఉన్నప్పుడు వాయుపదార్థాలు దానిలో కరిగి ఉంటాయి. అది భూఉపరితలం మీద ఉద్బేదనం చెందిన ద్రవ్యపదార్థంలో వాయువులు, బాష్పశీల ఘటకాలు సాపేక్షంగా తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ద్రవాన్ని లావా అంటారు. అంటే మాగ్మాలో కంటే లావాలో వాయువులు, బాష్పశీలఘటకాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయన్నమాట.

అగ్ని పర్వత ఉద్బేదనంలో వేడి వాయువులు, ద్రవరూపపు లావాలే కాక అధికంగా విడుదల అవుతున్న వాయువుల వ్రేలుడు వల్ల శిలలువగిరి, శిలాఖండాలు కూడా ఎక్కువ మొత్తాలలో బయటకు విరజిమ్మబడతాయి. ఇటువంటి శిలాఖండాలను అన్నింటిని కలిపి పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు అంటారు. వీటిలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మరేణువుల నుంచి పెద్ద పెద్ద శిలాఖండాల వరకు ఉండవచ్చు. అగ్నిపర్వతాల నుంచి బయటకు వచ్చే వాయువులు పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు, లావా మండుతూ ఎర్రగా కనిస్తాయి. కాబట్టి అగ్నిపర్వతాలను 'మండే పర్వతాలు' అంటారు.

11.2 అగ్నిపర్వత ఉత్పాదితాలు

అగ్నిపర్వతాల నుంచి వెలువడేపదార్థాలు : అగ్నిపర్వతాల నుంచి బయటకు వచ్చే పదార్థాలలో వాయువులు, వివిధ పరిమాణాల శిలాఖండాలు, విభిన్న సంఘటనలు గల లావాలు ఉంటాయి.

అగ్నిపర్వత వాయువులలో నీటి ఆవిరి ముఖ్యమైనది. క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాల నుంచి నీటి ఆవిరి అత్యధిక పరిమాణంలో బయటకు వస్తుంది. అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనల తర్వాత ఎంతో ఎత్తులో ఏర్పడి దట్టమైన, అతి పెద్దవైన మేఘాలను బట్టి ఈ విషయం విధితమవుతుంది. ఈ మేఘాలు వైకి లేచే నీటి ఆవిరి, ఇతర వాయువులు మోసుకొని వచ్చిన ధూళితోను, భస్మంతోను ఏర్పడి ఉంటాయి. అగ్నిపర్వతాల నుంచి వచ్చే వాయువులలో చెప్పకోతగ్గవి CO_2, N, SO_2 . కొంతతక్కువ మొత్తాలలో H, CO, S, Cl కూడా బయటకు వస్తాయి. అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనవల్ల వైకిచిమ్మబడి శంకువు నుంచి వేర్వేరు దూరాలలో పోగుబడి ఫైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు సూక్ష్మరేణువుల నుంచి చాలా పెద్దవైన అగ్నిపర్వత బాంబుల వరకు ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలను కింది విధంగా వర్గీకరిస్తారు.

1. 32 మిల్లిమీటర్ల కన్న ఎక్కువ వ్యాసంగల శకలాలను ఖండాలు అంటారు. ఇవి ఘనరూపంలో కోణీయరేణువులుగా బయటకు చిమ్మబడతాయి.
2. గట్టిపడిన లావా ముద్దలను బాంబులు అంటారు. ఇవి గుండ్రంగా ఉంటాయి.
3. 32 మిల్లిమీటర్లకు 4 మిల్లిమీటర్లకు మధ్యనున్న వాటిని లాపిలి అంటారు.
4. బటానీగింజ నైజులో ఉన్నవాటిని సిండర్లు అంటారు.
5. 4 మిల్లిమీటర్లకు $1/4$ మిల్లిమీటరుకు మధ్య ఉన్నవాటిని భస్మం అంటారు. దీని కన్న సూక్ష్మరేణుయుతమైన దానిని ధూళి అంటారు.

అగ్నిపర్వత పదార్థాలలో కొంత భాగం ఘనరూపపు శిలలతోను, కొంతభాగం స్పాంజిని పోలిన కణయుత పదార్థాలతోను ఉంటాయి. ఈ కణయుతనిర్మితి లావానుంచివాయువులు తప్పించుకొని పోవడంవల్ల ఏర్పడుతుంది.

బాంబులు, లాపిలి, సిండర్లు, భస్మం-వీటిలో ఎక్కువ భాగం అగ్నిపర్వత రంధ్రం చుట్టుపడి అగ్ని పర్వత శంకువును రూపొందిస్తాయి. ధూళి ఎక్కువ దూరం రవాణా అయి అతి విశాల ప్రాంతాన్ని కప్పిస్తుంది. 1883లో క్రాకటోవా ఉద్బేదన చెందినప్పుడు అతి సూక్ష్మరేణువులతో ఏర్పడిన ధూళి భూమిచుట్టూకమ్మి కిందికి దిగటానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది. అగ్నిపర్వతాల ఉత్తిక్ష్వత సామర్థ్యం అత్యద్భుతం. 1930లో స్ట్రాంబోలీ అగ్నిపర్వతం వ్రేలినప్పుడు 30 టన్నుల బరువున్న శిలాఖండాలు సుమారు రెండుమైళ్ల దూరం విసిరి వేయబడినాయి. 1929లో హౌంట్ పీటీ ఉద్బేదనం చెందినప్పుడు ధూళి మేఘాలు మైళ్ల దూరం మోసుకొనిపోయిన కొన్ని వందల టన్నుల బరువు గల శిలాఖండాలు ఇంకావిచిత్రమైనవి.

లావాలు : అగ్నిపర్వతాల నుంచి బయటకు వచ్చే ద్రవరూప శిలాపదార్థాన్ని లావా అంటారు. లావా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉపరితలం మీద చల్లబడి ఘనీభవిస్తుంది. లావా ప్రవాహంపై భాగం గట్టిపడి ఒక పటలంగా రూపొందినప్పటికీ కింది భాగం ఇంకా ద్రవంగానే ఉండి కదులుతూ ఉండవచ్చు. అప్పుడు గట్టిపడిన వైపార పగిలిపోయి కోణీయఖండాలుగా విడిపోయి క్రిందనున్న లావాతో పాలు కదిలిపోతాయి. ఈ లావా ఉపరితలం పడునైన కొనలుగల ఖండాలతో ఏర్పడి ఉంటుంది. హవాయి దీవులలో ఈ రకం లావాను బ్లాక్ లావా అంటారు.

కొన్ని లావాలు బ్లాక్ లావాలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటి ఉపరితలాలు నునువుగా ఉండి తాళ్ళ చుట్టలను పోలిన రూపాలతో ఉంటాయి. వీటిని రోపీలావాలు అంటారు. హవాయి దీవులలో శాటిన్ వలే మెరిసే వీటి ఉపరితలాలనుబట్టి వీటిని పహోహో లావాలు అంటారు. రోపీ లావాలు అధిక ఉష్ణోగ్రతవద్ద ఘనీభవించడం ప్రారంభిస్తాయి. చిన్నచిన్న వాయువుల బుడగలు నెమ్మదిగా తప్పించుకొని పోతుండగా ఈ లావాలు తాళ్ళ చుట్టల మాదిరిగా ముడతలు పడినట్లున్న ఉపరిభాగాలలో ఘనీభవిస్తాయి. వీటి ఉపరితలం ప్రవహించే తీరు ఉపరితలాన్ని పోలి ఉంటుంది.

రోపీలావాలు సముద్ర భూతలం మీద లేదా నీటి అడుగున హఠాత్తుగా శీతలీకరణకు గురి అయినప్పుడు అవి దిండ్లను పోలిన పెద్దపెద్ద ముద్దల రాశులుగా ఘనీభవిస్తాయి. వీటిని ఉప ధాన లావాలు అంటారు. ఇటువంటి లావాలు సాధారణంగా గతించిన భౌమయుగానికి చెందిన భూఅధినత అవశేషాలతోపాటు కనిపిస్తాయి. ఈ లావాలు సముద్రాంతర్గత అగ్నివర్షతాల నుంచి వెలువడినటువంటివి.

లావాల చలనశక్తి వాటి సంఘటన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సెలికా అధికంగా ఉన్న లావాలు సాధారణంగా గట్టిగాను, అధిక స్నిగ్ధతను ఉండి ఎక్కువ దూరం ప్రవహించ కుండానే మందమైన జిప్సం మాదిరిగా గట్టిపడతాయి. లావా ప్రవాహాల రూపం, లక్షణం ఎన్నో అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి

1. అగ్నివర్షతాల నుంచి విరజిమ్మబడే పదార్థాలను ఏమని అంటారు.

.....

.....

.....

.....

2. పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలను వర్గీకరించండి.

.....

.....

.....

.....

11.3 అగ్నివర్షత ఉద్భేదనలు

అగ్నివర్షత ఉద్భేదనానికి ముందు తరచు చిన్న భూకంపాలు, ఉరుముల వంటి కర్కశ ధ్వనులు వస్తాయి. ఇవి ఉద్భేదన సమయంలో ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో సంభవించవచ్చు. ధ్వనులు బహుశా తోపలి అధికపీడన కింద ఉన్న వాయువుల శిలాద్రవ చలనంవల్ల పుట్టవచ్చు. ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా దీవిలో ఉన్న టంబోరా అగ్నివర్షతం 1815లో ప్రేరినప్పుడు భూకంప ధ్వనులు 1600 కి.మీ. వ్యాసార్థంగల ప్రాంతమంతటా వినిపించాయంటారు.

అగ్నివర్షత ఉద్భేదనస్వభావం చాలా వరకు అగ్నివర్షత ముఖద్వారం నుంచి బయటకు విరజి మ్మబడే పదార్థాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పదార్థాలు వాయువులు, శిలాద్రవం లేదా శిలా ఖండాలు కావచ్చు. అగ్ని వర్షతాల నుంచి ఈ మూడు రకాల పదార్థాలు బయటకు చిమ్మబడవచ్చు. అయితే చాలా వాటిలో ఏదో ఒక రకపు పదార్థమే ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు హవాయి అగ్ని వర్షతాల నుంచి చాలా వేడిగాను, ప్రవాహత ఎక్కువగాను ఉన్న లావాలు అధికంగా బయటకు వస్తాయి. వీటిలో, ఉన్న వాయువులు త్వరితంగా బయటకు పోతాయి. ఇటువంటి ఉద్భేదనలు ప్రస్ఫోటనరహితమైనవి. అయితే కొన్ని అగ్నివర్షతాలు అతి తీవ్రమైన ప్రస్ఫోటనతో వేలుతాయి. మౌంట్ పీలీ ఈ రీతికి చెందినది. ఈ రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఉండేది మధ్యధరాసముద్రంలోని స్ట్రోంబోలీ అగ్ని వర్షతం. ఇది ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి గడ్డకట్టిన చిన్న లావా ముద్దలను గాలిలోకి విసురుతూ ఉంటుంది. కొంత నీటిఅవిరి కూడా రంధ్రాల ద్వారా బయటకువచ్చి మేఘంలాగా

ఏర్పడి లావా జ్వలనకాంతిని పరావర్తన చేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్లనే పూర్వకాలంలో నావికులు స్ట్రోబోలీని మధ్యధరా ప్రాంతపు కాంతిగా వర్ణించేవారు.

అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనలను ప్రధానంగా రెండు రీతులుగా వర్గీకరిస్తారు. - 1. కేంద్ర ఉద్బేదనం, 2. విదర ఉద్బేదనం.

ప్రస్తుత కాలంలోని అగ్ని పర్వతాలలో చాలా భాగం కేంద్రరీతికి చెందినవి. అయితే గతించిన కొన్ని భౌమ యుగాలలో విదరరీతి ఉద్బేదన వల్ల భూపటలం నుంచి లావా బయటకు వచ్చి కేంద్రరీతి ఉద్బేదనల వల్ల వచ్చిన లావా ఆక్రమించిన దాని కంటే ఎంతో ఎక్కువ భూభాగాన్ని ఆక్రమించాయి.

ఉద్బేదన నిలుపుగాఉన్న గొట్టం ద్వారా సంభవించినప్పుడు దాని ముఖరంధ్రం పక్కభాగాలు పేలడంవల్ల, కేంద్రీకి కూలి పోవడంవల్ల బాగా విశాలమైన అగ్ని పర్వత ముఖద్వారంగా రూపొందుతుంది. ఈ రంధ్రం చుట్టూ అగ్ని పర్వత పదార్థాలు పోగుపడటం వల్ల క్రమేణా శంకువు లేదా డోమ్ ఆకారంగల పర్వతం నిర్మితమౌతుంది. శంకువు ముఖద్వారం కల అగ్నిపర్వతాలను కేంద్రరీతి అగ్నిపర్వతాలు అంటారు. దీనిలో అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత గొట్టం వంటి కాండ్యూట్ చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కేంద్రరీతి అన్నారు. అగ్నిపర్వత శీర్షం వద్ద ఒక గొయ్యిలేదా అగ్నిపర్వతబిలం ఉంటుంది. ఉద్బేదన ఎక్కువ సార్లు జరగడంవల్ల అగ్నిపర్వతబిలం వెడల్పు అవుతూ వుంటుంది.

11.4 అగ్ని పర్వత రీతులు

ఒకే రంధ్రం ద్వారా ఎన్నోసార్లు ఉద్బేదన జరిగినప్పుడు అగ్నిపర్వత పదార్థాలు గుట్టల మాదిరిగా పోగుపడటంవల్ల అగ్ని పర్వతాలు రూపొందుతాయి. సాధారణంగా మూడు రకాల అగ్ని పర్వతాలను గుర్తిస్తారు.

1. షీల్డ్ అగ్నిపర్వతాలు
2. సిండర్ శంకువులు
3. సంయుక్త శంకువులు లేదా స్తరిత అగ్నిపర్వతాలు. వీటిలో ప్రతి రకానికి విలక్షణమైన ఉద్బేదనరీతి, అకృతి ఉంటాయి.

11.4.1 షీల్డ్ అగ్నిపర్వతాలు

అధిక ప్రవాహతగల లావా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏర్పడే అగ్ని పర్వతాలు విశాలంగాను, ఎత్తు తక్కువగాను ఉన్న కలశాలుగా ఏర్పడతాయి. వీటిని షీల్డ్ అగ్నిపర్వతాలు అంటారు. ఈ అగ్ని పర్వతాలు ప్రధానంగా బసాల్ట్ లావా ప్రవాహాలతో ఏర్పడి ఉంటాయి. వీటిలో పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వీటి పార్శ్వాల వాలు కొద్ది డిగ్రీలు మాత్రమే ఉండి శీఖరం వద్ద మాత్రం 10° వరకు ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద అగ్నిపర్వతాలలో ఒకటైన మౌనలోవా అగ్నిపర్వతం ఈ రీతికి చెందినది.

11.4.2 సిండర్ శంకువులు

ఇవి బయటకు విరజిమ్మబడిన లావా శకలాలు, శిలాఖండాలతో నిర్మితమై ఉంటాయి. అధ్యుడీభూత పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాల పార్శ్వాల ఎక్కువ వాలులో (30° నుంచి 40°) ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అగ్నిపర్వత పార్శ్వాల నిటంగా ఉంటాయి. సిండర్ శంకువులు ప్రధానంగా సిండర్లతోను, భస్మంతోను నిర్మితమై పుల్తాకారపు ప్లాన్లో ఉంటాయి. శీర్షం వద్ద బలంతో సమఖండన చెందిన శంకువులు మాదిరిగా ఉంటాయి. సాధారణంగా ఇవి చిన్నవిగా, వెయ్యి అడుగుల కన్న తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి. హవామి ద్వీపాలలో ఈ రీతి అగ్నిపర్వతాలు చాలా ఉన్నాయి.

11.4.3 సంయుక్త శంకువులు లేదా స్తరిత అగ్నిపర్వతాలు

ఈ అగ్ని పర్వతాలలో లావా ప్రవాహాల పొరలు, పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాల పొరలు ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. వీటి నిర్మితి నిట్రంగా ఉండే సిండర్ శంకువులకు, దాదాపు చదునుగా ఉండే షీల్డ్ అగ్నిపర్వతాలకు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి సంయుక్త నిర్మితినిబట్టి ఈ అగ్నిపర్వతాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఉద్రిక్తంగాను, ఒక్కొక్కప్పుడు నెమ్మదిగాను ఉద్భవించిన చెందుతాయని తెలుస్తుంది. వేర్వేరు ఉద్భవనలవల్ల ఏర్పడిన నిక్షేపాలు వేరువేరు పొరలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ పొరలలో కొన్ని స్థూలరేణువులతోను, కొన్ని సూక్ష్మరేణుపదార్థాలతోను ఏర్పడిఉంటాయి. ఈ విధంగా ఒక మోస్తరు పొరల నిర్మితి లేదా స్తరితవనం రూపొందుతుంది. ఈ పొరలు కాండ్రూట్ వైపు నుంచి బయటకు వాలుతూ ఉంటాయి. ప్రస్తోటిత శకల పదార్థాల పొరల మధ్య లావా పొరలు ఏర్పడటంవల్ల ఈ పొరల నిర్మితి ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. ఫిలిప్పైన్ దీవులలోని మౌంట్ మేయన్ ఈ రీతికి చెందిన క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం. జపాన్ లోని 2700 మీటర్ల ఎత్తున అత్యద్భుతమైన పవిత్రపర్వతం ప్యుజియామా కూడా ఈ రీతికి చెందినదే.

కాల్డేరా : కొన్ని అగ్నిపర్వతాలకు అసాధారణమైన పెద్ద అగ్నిపర్వత ముఖాలు ఉంటాయి. వీటికి గుండ్రని పెద్దగుంట ఉంటుంది. ఇవి ఉద్రిక్తమైన ప్రస్తోటనవల్ల గాని, పూర్వపు అగ్నిపర్వత శంకువు కూలడంవల్ల గాని ఏర్పడుతుంది. వీటిని కాల్డేరాలు అంటారు. కాసరి దీవులలోని కాల్డేరాను అనుసరించిన దీనికి ఈ పేరుపెట్టారు. కాల్డేరాలలో ఎక్కువ భాగం చాలా పెద్దది. వీటి వెడల్పు లోతుకన్న చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. హవాయి దీవులలోని కిలోనియా, మౌనలోవా శిఖరాల వద్ద ఉన్న కాల్డేరాలు అత్యద్భుతమైన ఉదాహరణలు. ఈ రెండూ షీల్డ్ అగ్నిపర్వతాల శిఖరాలు కూలడంవల్ల ఏర్పడినాయి. కాల్డేరాలలో ఎక్కువ భాగం అగ్నిపర్వతాల శిఖరభాగాలు అడుగున ఖాళీగా ఉన్న మాగ్మా కోష్ఠికలోనికి కూలడంవల్ల ఏర్పడ్డాయి. కాల్డేరాల నిట్రమైన పార్పాలలో ఏక కేంద్రీయ విదరాలు ఏర్పడతాయి. ఈ విదరాల గుండా చొచ్చుకొని వచ్చినప్పుడు రింగ్ డైక్ లు ఏర్పడతాయి.

విదర ఉద్భవనలు : కేంద్ర రంధ్రం ద్వారా సంభవించే అగ్నిపర్వత ఉద్భవనలు అతి సాధారణమైనవే అయినప్పటికీ అగ్ని పర్వత పదార్థాలు అత్యధిక పరిమాణాలలో ఉద్భవన చెందేవి భూపటలంలోని పగుళ్ళ ద్వారా వచ్చే పదార్థాలు విశాల ప్రాంతాలను కప్పివేస్తాయి. భారతదేశపు పశ్చిమ ప్రాంతంలోని చాలా భాగం అసంఖ్యాకమైన విదరాల ద్వారా బసాల్ట్ లావా బయటకు వచ్చి ప్రవహించడంవల్ల ఏర్పడినదే. దీనిని ప్రస్తుతం దక్కన్ ట్రాప్ లు అంటున్నారు. U.S.A. లోని వాయువ్యప్రాంతంలో ఉన్న కొలంబియా నదీ పీఠభూమి ఇటువంటి విదరఉద్భవనలవల్ల ఏర్పడిన రూపానికి మరొక ఉదాహరణ. బసాల్ట్ లావాల ప్రవాహత చాలా అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లావా ప్రవాహత విశాల ప్రాంతాలను ముంచివేయడం వల్ల ఈ బసాల్ట్ లావా ప్రవాహాలను వరద బసాల్ట్ లు అనడం ఎంతో సముచితంగా ఉంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

3. లావాప్రవాహాలు, పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాల పొరలు ఏకాంతరంగా ఉండి అగ్నిపర్వత చిలం నుంచి బయటకు వారి ఉండే అగ్ని పర్వతాలను ఏమని పిలుస్తారు.

.....

11.5 అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత

అగ్నిపర్వత ఉద్బేదన రీతులు: అగ్నిపర్వత ఉద్బేదన స్వభావం ప్రధానంగా అగ్ని పర్వత రంధ్రం నుంచి వేలువడే పదార్థాల వాయువులు, వైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు, లావా రీతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత దశనుబట్టి, అది ప్రస్ఫోటకరీతిదా, నెమ్మదిగా పేలేదా, మధ్యస్థంగా ఉన్నదా అనేదాన్ని బట్టి ఉత్క్లిష్ట ద్రవ్యాల పరిమాణం, స్వభావం మారుతూ ఉంటుంది. అగ్నిపర్వత శాస్త్రజ్ఞులు అగ్నిపర్వతాల క్రియాశీలత దశలను 1) హవాయి, 2) స్ట్రోంబోలియన్, 3) పుల్కానియన్, 4) వెనూవియన్, 5) ప్లీనియన్, 6) పేవియన్ అనే ఆరు దశలుగా గుర్తించినారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్న కొన్ని అగ్నిపర్వతాల క్రియాశీలత లక్షణాలను బట్టి ఈ దశలను గుర్తించడం జరిగింది. మాగ్మా ప్రస్ఫోటనం దాని స్నిగ్ధత మీద, వాయు పరిమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మాగ్మాలో వాయువు లేకపోతే దానికి ప్రస్ఫోటన సామర్థ్యముండదు. స్నిగ్ధత రసాయన సంఘటనల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరగటం వల్ల అధిక వాయుపరిమాణం వల్ల స్నిగ్ధత తగ్గుతుంది. ఉష్ణోగ్రత వాయుపరిమాణాలు మాగ్మా ప్రస్ఫోటన స్వభావాన్ని మారుస్తాయి. కాబట్టి ఈ రెండు అంశాలలోని మార్పుల వల్ల ఒకే అగ్నిపర్వతం భిన్న కాలాలలో వివిధ ప్రస్ఫోటన దశలను చూపవచ్చు. అండినైట్, రయోలైట్ లావాలు బసాల్ట్ లావాలకంటే ఎక్కువ స్నిగ్ధంగా ఉంటాయి. ఈ లావాలు ప్రస్ఫోటన రీతికి చెందుతాయి.

11.5.1 హవాయి రీతి

ఇది అగ్నిపర్వత ఉద్రిక్తత దశలలో చాలా మందకొడి దశ. ఈ అగ్నిపర్వతాల నుంచి చాలా వేడిగాను, ఉజ్వలంగాను, పల్చగాను ఉన్న శిలాద్రవం నెమ్మదిగా బయటకు ప్రవహిస్తుంది. వాయువుల ప్రస్ఫోటనం దాదాపు ఉండదు. ఈ రీతికి చెందిన అగ్నిపర్వతాలలో మౌనలోవా చాలా ముఖ్యమైనది. దీనినుంచి బసాల్ట్ లావాలు అధిక పరిమాణాలలో బయటకు వచ్చాయి.

11.5.2 స్ట్రోంబోలియన్ రీతి

అల్ప చలనశీలత గల లావా అగ్నిపర్వత ముఖంలో ఉన్నప్పుడు దానిలోని వాయువులు ఒక మోస్తరు తీవ్రతతో ప్రస్ఫోటనమౌతాయి. తరచు కొంతవంతంగా ఉన్న లావా ముద్దలు బయటకు విసిరివేయబడతాయి. అవి బాంబులు గాను, స్కొరియా ముద్దలు గాను ఏర్పడతాయి. క్రియాశీలత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రస్ఫోటన వల్ల కొంత విరజిమ్మే మేఘాలు ఏర్పడవచ్చు.

స్ట్రోంబోలి అగ్నిపర్వతం మధ్యధరా సముద్రంలోని విపారి దీవులలోనున్న సెసిలీకి ఉత్తరంగా ఉంది. చరిత్రకు అందినంత కాలం ఇది అవిచ్ఛిన్నంగా క్రియాశీలంగానే ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. దీని ఉద్బేదనలు లయబద్ధంగా ఉండి ప్రస్ఫోటనలు మందకొడిగా ఉంటాయి. కొంత వంతమైన లావా ముద్దలు బయటకు చిమ్మబడుతూ ఉంటాయి. వివిధ ప్రస్ఫోటనల మధ్య కాలంలో అగ్నిపర్వత ముఖద్వారం వద్ద ఉన్న మాగ్మా ఒక పటలంగా ఘనీభవించకుండా ఉండేదానిని స్ట్రోంబోలియన్ దశలంటారు.

11.5.3 పుల్కానియన్ దశ

విపారి దీవులలోని 'వల్కాన్' అనే మరొక అగ్నిపర్వతం ఈ దశకు చెందినది. దీని లావా చాలా స్నిగ్ధంగాను, జిగురుగాను ఉండి ఉద్బేదనల మధ్య కాలంలో త్వరగా గట్టి పడుతుంది. గట్టి పడిన వైపోరకు అడుగున వాయువులు కేంద్రీకరించి క్రమేణా తగిన శక్తిని పొంది ఎక్కువ కాలాంతరాలలో పైకి పేలతాయి. ఈ పేలుడు సమయంలో పైన ఏర్పడిన పటలం విచ్ఛిన్నమై కోణీయ శిలాఖండాలు అత్యధిక ఉద్రిక్తతలతో ప్రస్ఫోటనచెందుతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన అగ్నిపర్వత మేఘాలు నల్లగాను, దట్టంగాను ఉండి వాయువులు, ధూళి పైకి లేచి వ్యాకోచం చెందేకొద్దీ అవి కాలీఫ్లవర్ ఆకృతిని పొందుతాయి. అయితే ఇవి రాత్రి సమయాలలో కూడా వెలుతురును ఇవ్వవు. అగ్నిపర్వతాల ఉద్బేదన చాలా వరకు పుల్కానియన్ దశతో ప్రారంభమౌతుంది.

11.5.4 వెనూవియన్ రీతి

ఈ దశకు చెందిన అగ్ని పర్వతాలలో స్ట్రోనిబోలియన్, వుల్కానియన్ దశల గుణాలు రెండూ ఉంటాయి. ఈ అగ్ని పర్వతాల నుంచి మాగ్మా అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ప్రస్తోటన చెందుతుంది. అగ్నిపర్వతం పేలని కాలంలోను లేదా చర్య ముందకొడిగా ఉన్నప్పుడు వాయువులు మాగ్మాలో అధికంగా కేంద్రీకృతం కావడంవల్ల ఇటువంటి ప్రస్తోటన సంభవిస్తుంది. అగ్నిపర్వత పార్శ్వాలలో ఉన్న విదరాల ద్వారా, రంధ్రాల ద్వారా లావా బయటకు ప్రవహించినప్పుడు అగ్నిపర్వత పైవోలో తగినంత లోతువరకు ఖాళీ ఏర్పడడంవల్ల అడుగున ఉన్న మాగ్మాపైన పీడన తగ్గుతుంది. అందువల్ల మాగ్మా కాలీఫ్లవర్ ఆకృతిగల దేదీప్యమానమైన, విశాలమైన మేఘాలుగా ప్రస్తోటన చెందుతుంది. ఈ మేఘాలు చాలా ఎత్తుకు చేరతాయి. వాటినుంచి భస్మం విశాల ప్రాంతమంతటా వెదజల్లబడుతుంది.

11.5.5 ప్లినయన్ రీతి

అతి ఉద్రిక్తమైన వెనూవియన్ రీతి ఉద్బేదనల అంత్యదశలో ఒక్కొక్కప్పుడు నీటి ఆవిరి, ఇతర వాయువులు అత్యధిక పరిమాణంలో, అత్యధికశక్తితో బయటకు వచ్చి కొన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తువరకు పైకి లేచి గోళాకారపు రాశులతో కూడిన మేఘంగా ఏర్పడి క్రమేణా వ్యాకోచం చెందవచ్చు. ఈ దశను క్రీ. శ. 79 లో సంభవించిన వెనూవియన్ అగ్నిపర్వతపు సంక్షోభపూరితమైన ఉద్బేదనలో గుర్తించారు.

11.5.6 పిలియన్ రీతి

పిలియన్ దశ అన్ని ప్రస్తోటనలలోకి అతి ఉద్రిక్తమైన, సంక్షోభపూరితమైన దశ. ఈ రకపు ఉద్బేదనలవల్ల ఏర్పడే మేఘాలు వుల్కానియన్ రీతి మేఘాల కంటే చాలా దట్టంగా ఉంటాయి. ఈ రీతిలో స్పృగత, ప్రస్తోటనలు గరిష్ఠస్థాయిని చేరడం జరుగుతుంది. కాండ్యూట్ వైన అడ్డుగా ఒక డోమ్ ఏర్పడడంవల్ల పదార్థాలు పైకి ఎగరటానికి అటంకం కలుగుతుంది. బాగా సంపీడన చెందిన మాగ్మా అప్పుడప్పుడు పార్శ్వాలలో ఉన్న సగుళ్యద్వారా బయటకు వచ్చి కిందికి పాకవచ్చు. పిలియన్ మేఘపు ముఖ్య లక్షణమేమిటంటే అగ్నిపర్వత శిఖరం వద్ద ఉన్న లావా ఫ్లోను పైకి పేల్చడానికి బదులుగా ఫ్లోకు దిగువన క్షీణింపు సమాంతరంగా వాయుపదార్థం, దూళి బయటకు చిమ్ముబడతాయి. ఈ మేఘాలు చాలా పేడిగా ఉండి ఎంతో మేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి శిలాఖండాలను, కొన్ని మీటర్ల వ్యాసం ఉన్న పెద్దపెద్ద శిలాఖండాలతో సహా, ఎక్కువ మొత్తాలలో మోసుకొనిపోతాయి. వెస్ట్ ఇండిస్ లోని మార్టినిక్ ద్వీపంలో ఉన్న మౌంట్ పిలీని అనుసరించి ఈ దశకు పిలియన్ దశ అని పేరు పెట్టారు.

సముద్రాంతర్గత అగ్నిపర్వతాలు: అలేషియన్ దీవులలోను, ధక్షిణ మధ్య పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతంలోను తీవ్రమైన సముద్రాంతర్గత అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనలను గమనించడం జరిగింది. సముద్ర మట్టానికి పైగా కొన్ని వందల మీటర్ల ఎత్తువరకు అగ్నిపర్వత శంకువులు నిర్మితమై ఉండవచ్చు. కాని అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత క్షీణించినప్పుడు ఈ చిన్న అగ్నిపర్వతదీవులు తరంగాల చర్యవల్ల విచ్ఛిన్నమై పోతాయి. సిసిలీ సమీపంలో ఉన్న పాంటెరిలిస్ ద్వీపం ఇటువంటి సముద్రాంతర్గత అగ్ని పర్వతద్వీపమే.

పంకాగ్ని పర్వతాలు: ఉపరితలం వద్ద బయటకు వచ్చే వాయువులు ఇనక, “క్లే” రేణువులను పైకి తీసికొని వచ్చి ముఖద్వారం చుట్టు నిక్షేపిస్తాయి. ఈ విధంగా క్రమేణా చిన్న శంకువు ఏర్పడుతుంది. నీరు కూడా ఉన్నట్లయితే ఇనక, క్లేపంకంగా మారతాయి. ఈ పంకం దిబ్బ ఉపరిభాగంలో ఎండి గట్టిపడుతుంది. వాయువులు గట్టిపడిన ఉపరిభాగం దిగువన సాంద్రీకృతమై పీడన బాగా పెరిగినప్పుడు శంకువు పైభాగాన్ని చిన్న అగ్నిపర్వతాలలో మారిగా పేల్చివేస్తాయి. అందువల్ల ఏటస పంకాగ్నిపర్వతాలు అంటారు. సాధారణంగా పెట్రోలియమ్, సహజ వాయువులు ఉన్న స్తరితశిలలు అడుగున ఉన్న ప్రాంతాలలో పంకాగ్నిపర్వతాలు ఉంటాయి. రష్యాలోని బాకూ ప్రాంతంలోను, బర్మాలోను ఈ రకం పర్వతాలు ఉన్నాయి.

అగ్నిపర్వత చర్య క్షీణదశను సూచించే ఇక్షణాలు:

చాలా అగ్ని పర్వతాలు ఉద్బేదనల మధ్య కాలంలో నీటి ఆవిరిని, ఇతర వాయువులను బయటకు విడుదల చేస్తాయి. అగ్ని పర్వతాలు తమ క్రియాశీలతను కోల్పోయిన తర్వాత కూడా ఈ వాయు నిర్గమాలు అగ్నిపర్వత ముఖం గుండా, పార్శ్వాల వెంబడి కూడా బయటకు వస్తూ ఉండవచ్చు. భూపటలంలో చాలా పైకి వచ్చి ఉపరితలాన్ని ఇంకా చేరనటువంటి మూగ్గా రాశులు లోపల ఘనీభవించిన తర్వాత వాటిలో ద్రావణీయమైన ఉన్న వాయువులు విదరాల ద్వారా ఉపరితలానికి వస్తాయి. నిర్గమాలు ఉపరితలం వద్ద వాయువుల రూపంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు వాటిని ధూమ రంగులు అంటారు. నిర్గమాలు వేడిగా ఉన్న ద్రవాల రూపంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు వాటిని వేడి నీటిబుగ్గలు లేదా ఉష్ణద్రవ నిర్వరాలు అంటారు.

11.6 సారాంశం

ఈ భాగంలో అగ్ని పర్వతాల స్వభావం, వాటి ఉత్పాదితాలను గురించి క్లుప్తంగా చర్చింతాం. అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనలు, రీతులను గురించి ప్రస్తావించాం. అగ్నిపర్వత క్రియాశీలతలోని దశలను గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నించేశాం.

11.7 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలు

2. పైరోక్లాస్టిక్ పదార్థాలను వాటి రేణువుల పరిమాణం ఆధారంగా వర్గీకరిస్తారు.

- ఖండాలు - 32 మి.మీ. కన్న పెద్దవి
- బాంబ్లు - గుండ్రని గట్టిపడిన లావా ముద్దలు
- లాపిలి - 32 మి.మీ. కు 4 మి.మీ.కు మధ్య
- సిండర్లు - బటానీ గింజ పరిమాణం
- భిన్నం - 4 మి.మీ.-1/4 మి.మీ.కు మధ్య
- ధూళి - 1/4 మి.మీ. కన్న చిన్నవి.

3. స్ట్రోబో

11.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- అగ్నిపర్వత శంకువులలోని రీతులను వర్ణించి, అవి ఏ విధంగా నిర్మితమవుతాయో వివరించండి.
- అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనల ఉత్పాదితాలను గురించి తెలియజేయండి.
- అగ్నిపర్వత క్రియాశీలతలోని వివిధ దశలను తెలియజేయండి.

II. కింది ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

- అగ్ని పర్వత ఉద్బేదనరీతులను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.

భాగం-12 : భూకంపాలు

పాఠ్యాంశాలు

- 12.0 అక్ష్యాలు
- 12.1 పరిచయం
- 12.2 భూకంపాల స్వభావం
- 12.3 భూకంపాల ప్రభావాలు
- 12.4 భూకంపాలను గుర్తించి, రికార్డ్ చేసే విధానాలు
- 12.5 భూకంపతరంగాలు
- 12.6 భూకంపాల తీవ్రత
- 12.7 భూకంపాల వర్గీకరణ
- 12.8 భూకంప మేఖలలు
- 12.9 భూకంపాలకు కారణాలు
- 12.10 సారాంశం
- 12.11 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి- మాదిరి సమాధానాలు
- 12.12 మాదిరి పరీక్ష ప్రశ్నలు

12.0 అక్ష్యాలు

భూకంపాలు, వాటి ప్రభావాలు, కారణాలకు సంబంధించి పరిజ్ఞానాన్ని మీకు అందించడం ఈ భాగం ఉద్దేశం.

ఈ భాగం పూర్తి చేసేసరికి మీకు కింది విషయాలు అవగాహనలోకి వస్తాయి .

- భూకంపాల స్వభావం
- భూకంపాల ప్రభావం
- భూకంపాలను గుర్తించే విధానాలు
- భూకంపతరంగాల రకాలు
- భూకంప తీవ్రత
- భూకంపాల వర్గీకరణ
- భూకంప మేఖలలు
- భూకంపాలకు కారణాలు

12.1 పరిచయం

భూమి లోపల ఎన్నో భౌతిక బలాలు అనుక్షణం పనిచేస్తున్నాయి. భూమి మీద పనిచేస్తూ భూస్వరూపాల పరిమాణాన్ని, ఆకృతులను మారుస్తున్న భౌమకారకాల మాదిరిగానే ఈ భౌతిక బలాలు కూడా భూఉపరితలం దిగువన మౌలికాలను కదిలించజేస్తూ, శిలలు నిర్మితులను మారుస్తూ, శిలా పదార్థాలను కొత్త రీతిలో అమరుస్తున్నాయి. ఉపరితలం దిగువన ఇటువంటి అమరికలలో భూపటల చలనాలు సంభవిస్తాయి. ఈ చలనాలలో కొన్ని నెమ్మదిగాను, వికీరణంగాను, కొన్ని చలనాలు హఠాత్తుగాను, స్పర్శరేఖీయంగాను సంభవిస్తాయి.

12.2 భూకంపాల స్వభావం

హఠాత్తుగాను, స్వర్ణ రేఖీయంగాను సంభవించే చలనాలు శిలలలో ప్రకంపనలను కలగజేస్తాయి. భూఉపరితలం కింద సంభవించే ఇటువంటి హఠాత్ చలనాలను భూకంపాలు అంటారు.

భూమి లోపల పనిచేసే బలీయమైన బలాలకు భూకంపాలే నిదర్శనం. ఇవి అకస్మాత్తుగా, వేగంగా సంభవించి విశాల ప్రదేశాలలో నష్టభంకరగచేస్తాయి. భూమిలోని శిలల మీద పనిచేసే అత్యధిక బలాలకు మరొక నిదర్శన స్వర్ణతోద్భవం. పర్వతాలు చాలా నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి పర్వతోద్భవంలో సంభవించే చలనాలను గుర్తించడానికి మానవుని జీవన ప్రమాణం చాలదు. భూకంపాల విషయం దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. భూమి కంపిస్తుంది. భూమి మీదనున్న వస్తువులు కొన్ని సెకండ్ల కాలంలో నాశనమైపోతాయి. భూకంపాలు ముందు ఏ హెచ్చరికా లేకుండా వస్తాయి. విజ్ఞానశాస్త్రం ఎంత పురోగమించినప్పటికీ భూకంపాలను ముందుగా గుర్తించే విధానాలను రూపొందించి వాటి సహాయంతో మనిషిని రక్షించడం సాధ్యపడటం లేదు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. “భూకంపాలంటే భూపటలంలో సంభవించే కంపనాలు లేదా శీఘ్రచలనాలు” వివరించండి.

.....

.....

.....

.....

12.3 భూకంపాల ప్రభావాలు

ప్రాణులకు, ఆస్తులకు జరిగే అత్యధిక నష్టమే కాకుండా, భూకంపాలవల్ల ఎన్నో భౌమఫలితాలు సంభవిస్తాయి. భూకంప తరంగాల చలనం వల్ల విదరాలు, పగుళ్ళు ఏర్పడి, వాటి ద్వారా నీరు బయటకువచ్చి ఆ ప్రదేశం నీటిలో మునిగి పోతుంది. రోడ్లలో పగుళ్ళు వస్తాయి. రైలువట్టాలు మెలికలు తిరుగుతాయి. పారేసీటిబుగ్గలు అదృశ్యమౌతాయి. కొత్తనీటి బుగ్గలు ఏర్పడతాయి. నేలలో నాలు వస్తుంది. భూపాతాలు సంభవిస్తాయి. గ్యాస్ గొట్టాలు విరిగిపోతాయి. అగ్నిప్రమాదాలను ఎదుర్కొనడం కష్టమౌతుంది.

12.4 భూకంపాలను గుర్తించి, రికార్డ్ చేసే పద్ధతులు

భూకంపాల స్థాయిని, స్వభావాన్ని గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని భూకంప శాస్త్రం (Seismology) అంటారు. భూకంపాన్ని భూకంపగ్రాహకం (Seismograph) అనే పరికరం సహాయంతో రికార్డు చేస్తారు. ఈ పరికరాన్ని ఇటలీలో 1841 లో కనుగొని ప్రప్రథమంగా వాడారు. భూకంపనం రికార్డును సీస్మోగ్రామ్ అంటారు. మొదట్లో కనుగొన్న పరికరాలు భూకంపం సంభవించినట్లు మాత్రమే సూచించగలిగేవి. కాని ఆ భూకంపపు తీవ్రతను, వేగాన్ని గురించి ఎటువంటి సమాచారం లభించేది కాదు. ఇటువంటి పరికరాలను సీస్మోస్కోప్స్ అంటారు. ఇటువంటి పరికరాన్ని ప్రప్రథమంగా క్రీ.శ. 136 లోనే చైనా దేశస్థులు కనుగొన్నారు.

భూకంపగ్రాహకంలో క్రితిజ సమాంతర లోలకం మాదిరిగా అమర్చబడిన ఒక బరువు ఉంటుంది. దీనిని భూమిలోని ప్రకంపనలను గ్రహించే విధంగా నేలకు గట్టిగా బిగించబడిన ఒక దిమ్మకు తగిలిస్తారు.

దాని స్పష్టత కారణంగా బరువు నిశ్చలంగా ఉంటుంది. బరువుకు పరికరంలోని మిగిలిన భాగానికి మధ్య ఉండే సాపేక్షచలనాన్ని తగిన విధంగా వివర్ధనం చేసి పరికరం రికార్డు చేస్తుంది. బరువుకు తగిలించబడిన ఒక అద్దం కాంతికిరణాన్ని ఒక పొడవాటి స్క్రూపైని భ్రమణం చేసే స్థూపాకార డ్రమ్ కు చుట్టబడిన ఫోటోగ్రాఫిక్ పేపర్ మీదికి పరావర్తనం చేస్తుంది. డ్రమ్ భ్రమణం చెందేటప్పుడు దానితోపాటు పేపర్ కాంతికిరణాలకు లంబంగా కదులుతుంది. ఈ విధంగా ప్రకంపనాలు అవిచ్ఛిన్నంగా రికార్డ్ అవుతాయి.

భూకంప గ్రాహకం రికార్డ్ ను సీస్మోగ్రామ్ (Seismogram) అంటారు. ఈ రికార్డ్ నుంచి భూకంపం ప్రారంభం, అంత్యకాలాలను భూకంపతీవ్రతను కచ్చితంగా అంచనాకట్టవచ్చు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

2. భూకంపాలకు సంబంధించిన విజ్ఞాన శాస్త్రం.

.....

.....

.....

.....

12.5 భూకంప తరంగాలు

భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు తరంగాల రూపంలో శక్తివిడుదల అవుతుంది. భూ ఉపరితలానికి దిగువన అకస్మాత్తుగా సంభవించే భూపటల సంక్షోభాలవల్ల ఉద్భవించే ఈ తరంగాలను భూకంప తరంగాలు అంటారు. తరంగలచలనాలను బట్టి వీటిని మూడురీతులుగా వర్గీకరించినారు.

1. దీర్ఘతరంగాలు.
2. విరూపణ తరంగాలు.
3. తరంగాలు - పీటిలో రాతీ తరంగాలు, తా-తరంగాలు అనే రెండు రకాలు ఉన్నాయి.

దీర్ఘతరంగాలు అవి ప్రయాణించే దిశలో వనిచేసే సంపీడన, వక్రీభవన తరంగాల ఏకాంతరత వల్ల రూపొందుతాయి. ఇవి శబ్దతరంగాలను పోలి ఉంటాయి. పీటిని సాధారణంగా P తరంగాలు అని కూడా అంటారు.

విరూపణ తరంగాలు అవి ప్రయాణించే దిశకు లంబంగా కంపనాలు కలిగిస్తాయి. ఇవి కాంతి తరంగాలను పోలి ఉంటాయి. పీటిని S తరంగాలు అని కూడా అంటారు.

రాతీతరంగాల వల్ల కణాలు క్షితిజలంబ తలాలలో ఉన్న వృత్తాలలో చలిస్తాయి. తా-తరంగాలవల్ల కణాలు ఆ తరంగాల ప్రయాణదిశకు లంబకోణంలో ఉన్న క్షితిజ సమాంతర తలంలోని రేఖల వెంబడి చలిస్తాయి. ఈ రెండురకాల తరంగాలను కలిపి ఉపరితల తరంగాలు (Surface waves) లేదా L-తరంగాలు అంటారు.

P తరంగాలు S తరంగాల కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. ఈ రెండింటిని స్వరూప తరంగాలు అంటారు. L తరంగాలను ఉపరితలతరంగాలు అంటారు. ఈ మూడింటిలోనూ P తరంగాలు అతివేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. పీటి తర్వాత S తరంగాలు వస్తాయి. L తరంగాలు చివరకు వస్తాయి. P తరంగాలు ఘన, ద్రవ పదార్థాలు రెండింటిలోను ప్రయాణించగలవు. కాని S తరంగాలు ఘన పదార్థాలలో మాత్రమే ప్రయాణించగలవు. భూమి అంతర్భాగాన్ని గురించి తెలుసుకోవడంలో L తరంగాలు ఉపయోగపడ్తాయని భావిస్తారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

3. భూకంపతరంగాలను వేర్కొనండి.

.....
.....
.....

12.6 భూకంపాల తీవ్రత

భూకంపాల బలాన్ని, తీవ్రతను తెలుసుకోవడానికి ఒక స్కేలు అవసరమవుతుంది. సాధారణంగా భూకంప తీవ్రతను భూకంప గ్రాహకం మీద దాని ప్రభావాన్ని, గుర్తించగలగడాన్ని బట్టి ప్రాణానికి, అస్తులకు కలిగే నష్టాన్ని అంచనా వేస్తారు. దీనికి ఉపయోగించే స్కేలును రోసీ, ఫోరల్ అనే ఇటాలియన్ శాస్త్రజ్ఞులు ప్రప్రథమంగా రూపొందించారు. దీనిని రోసీ-ఫోరల్ స్కేల్ అంటారు. దీనిలో పది విభాగాలు ఉన్నాయి. స్కేలులో సంఖ్య ఎక్కువయ్యే కొద్దీ భూకంప తీవ్రత కూడా ఎక్కువవుతుంది. మెర్కాల్లి అనే మరొక ఇటాలియన్ శాస్త్రజ్ఞుడు పన్నెండు విభాగాల స్కేలు నొకదానిని రూపొందించాడు. దీనిలో భూకంప తీవ్రతను భూకంపతరంగావల్ల రూపొందిన త్వరణం ఆధారంగా కొలుస్తారు. ఇటీవలి కాలంలో భూకంప తీవ్రతను రిక్టర్ స్కేలు ఆధారంగా కొలుస్తున్నారు.

ఒకే భూకంప తీవ్రత ఉన్న ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీసిన రేఖను 'సమ కంపనరేఖ' (Isoseismal line) అంటారు. సమకంపన రేఖ వెంబడి అధికేంద్రాలవద్ద భూకంపతీవ్రతలను పోల్చడం ద్వారా భూకంప నాభిలోతును అంచనా కట్టవచ్చు.

12.7 భూకంపాల వర్గీకరణ

భూకంపాలను నాభిలోతు ఆధారంగా వర్గీకరిస్తారు. భూఉపరితలం దిగువన భూకంపానికి కారణమైన సంక్షోభ ఉద్భవ స్థలాన్ని భూకంపనాభి అంటారు. నాభి బిందువునకు క్షితిజ లంబంగా భూమి ఉపరితలం మీద ఉన్న స్థలాన్ని అధికేంద్రం అంటారు. నాభి 700 కి. మీ.కు మించిన లోతులో ఉన్న భూకంపాన్ని ఇంతవరకు రికార్డ్ చేయడం జరగలేదు. 300 కి. మీ.కు మించిన లోతులో ఉద్భవించిన భూకంపాలను అంటే నాభి లోతు 300 కి.మీ. మించి ఉన్నవాటిని అగాధ నాభి భూకంపాలు అంటారు. రికార్డ్ అయిన భూకంపాలలో 3 శాతం మేరకు మాత్రమే ఈ రకానికి చెందినవి. నాభిలోతు 70 కి.మీ. 300 కి.మీ. మధ్యనున్న వాటిని మధ్యస్థనాభి భూకంపాలు అంటారు. ఈ రకానికి చెందిన భూకంపాలను ఆసియా నైరుతిభాగంలోను, మధ్యధరా ప్రాంతాలలోను రికార్డ్ చేశారు. నాభిలోతు 70 కి.మీ. కన్నా తక్కువ ఉన్న భూకంపాలను గాఢనాభి భూకంపాలు అంటారు. భూకంపాలలో ఎక్కువ భాగం ఈ రకానికి చెందినవే.

భారతదేశానికి, దానికి చుట్టు ప్రక్కలా ఉన్న దేశాలకు చెందిన భూకంపాలలో చెప్పుకోదగ్గవి 1897, 1950 లో సంభవించిన అస్సాం భూకంపాలు, 1934లో సంభవించిన బీహార్ భూకంపం, 1967 లో సంభవించిన కొయ్ నా భూకంపం, 1935లో సంభవించిన క్వెట్టా భూకంపం.

ఈ భూకంపాలను అధ్యయనం చేసిన మీదట హిమాలయా ప్రాంతంలో తరుణ శిలలు వృద్ధ శిలలతో స్పర్శలోనికి వచ్చినచోట భూకంపాలు తరుచుగా సంభవిస్తున్నట్లు తెలియవస్తున్నది. ఈ ప్రాంతాలు చాలా అస్థిరమైనవి. ప్రతిబలం ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇక్కడ స్థానభ్రంశం జరిగి ప్రతిబలం విడుదల అవుతుంది.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

4. భూకంపాల వర్గీకరణకు ఆధారమేమిటో తెలియజేయండి. వర్గీకరణను ప్రస్తావించండి.

12.8 భూకంప మేఖలలు

భూకంపాలు ఎక్కడయినా రికార్డ్ చేయబడవచ్చు. అయితే ఎక్కువగా ఇవి ఉద్భవించే ప్రదేశాలు భౌమ చలనాలు, అగ్నిపర్వతాలు ఎక్కువగా సంభవించే ప్రాంతాలకే పరిమితమై ఉన్నాయి. భూకంపాలు తరుచుగా సంభవించే ప్రాంతాలను భూకంప మేఖలలు అంటారు. ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా రెండు భూకంప మేఖలలు ఉన్నాయి. అవి - 1) సర్క్లర్ పసిఫిక్ మేఖల, 2) బ్రాన్స్ ఆసియాటిక్ - అట్లాంటిక్ మేఖల. భూకంపాలలో సుమారు 68% సర్క్లర్ పసిఫిక్ మేఖలలోను, 21% బ్రాన్స్ ఆసియాటిక్ - అట్లాంటిక్ మేఖలలోను, 11% ఇతర ప్రదేశాలలో సంభవిస్తున్నాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

5. ప్రపంచంలోని ముఖ్యమైన భూకంప మేఖలలను పేర్కొనండి.

12.9 భూకంపాలకు కారణాలు

భూకంపాలు ఎన్నో కారణాల వల్ల సంభవిస్తాయి. వీటికి ప్రధాన కారణం భ్రంశిభవనం. అగ్ని పర్వత ఉద్వేగనం, భూపాతాలు, గుహలు, కందరాల పైకప్పులు కూలడం వల్ల కూడా భూకంపాలు సంభవిస్తాయి. భూపాతాలు, గుహల పైకప్పులు కూలడం వంటి కారణాలు కేవలం స్థానికమైనవి. ఆప్రధానమైనవి. నిజానికి ఈ రెండూ భూకంపాలకు కారణాలు కాకపోవచ్చు. అవి భూకంపాల ఫలితాలు కావచ్చు. కొన్ని అంతకన్నా ఎక్కువ లోతులలో వనిచేసే బలాల వల్ల కావచ్చు. భ్రంశాల వెంబడి ఈ చలనాలే భూకంపాన్ని కలగచేసే స్థితిస్థాపక తరంగాలను రూపొందిస్తాయి.

భ్రంశం వెంబడి చలనానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి. సాధారణంగా శిలలలో సాంద్రీకరణ చెందిన ప్రతిబలం పరిమాణం ప్రధాన కారణం. ఇది కొంతవరకు భ్రంశం ఆక్షణంపైన అంటే అది పురాతన భ్రంశమా, నూతన భ్రంశమా అనే అంశంపైన కూడా అధారపడి ఉంటుంది.

1906లో శాన్ అండ్రెస్ భ్రంశం వెంబడి సంభవించిన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో భూకంపాన్ని పరిశోధించిన తరువాత ప్రాఫెసర్ హెచ్. ఎస్. రీడ్ భూకంపాల కారణాలకు సంబంధించి ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. దానిని స్థితిస్థాపక నిరోధక సిద్ధాంతం (Elastic rebound theory) అంటారు.

సాధారణంగా భూకంపాలు భ్రంశాల వెంబడి హఠాత్తుగా సంభవించే స్థానభ్రంశం వల్ల వస్తాయి. పై సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ హఠాత్ స్థానభ్రంశానికి కారణం వికృతి బలాన్ని (Strain) తట్టుకోలేనంత వరకు భూపటలంలో పక్కపక్క భాగాలు వ్యతిరేక దిశలలో మెల్లగా జరిగడం వల్ల కేంద్రీకృతమైన స్థితి స్థాపన వికృతి బలం హఠాత్తుగా విడుదల కావడమే. దీనిని బట్టి భూకంపాలలో ఎక్కువ భాగం

పరిస్థితియ సందర్భాలవల్ల సంభవిస్తాయని తెలుస్తున్నది. వీటిని విరూపకారక భూకంపాలు (Tectonic earthquakes) అంటారు. ఈ భూకంపాలు భూపటలవిరూపణవల్ల సంభవిస్తాయి.

భూకంపాలు అగ్ని పర్వత చర్యవల్ల కూడా సంభవించవచ్చు. భూపటలం లోపల మ్యాగ్మాల, నాయువుల చలనాల వల్ల భూప్రకంపాలు సంభవించవచ్చు. అగ్ని పర్వత ఉద్బేదనల తరువాత భూకంపాలు రావడం చాలా కాలంగా గమనించారు. ఉద్బేదనానికి ముందు భూకంపపు షాక్లు రావచ్చు. ఇవి అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనానికి సూచనలు. ఉద్బేదనం తరువాత షాక్లు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో, ఎక్కువ తీవ్రతతో సంభవించవచ్చు. భూమి లోపల మ్యాగ్మాలలోను, వాటికి చుట్టు ఉన్న శిలలలోను జరుగుతున్న పునర్వ్యవస్థీకరణను ఈ షాక్లు సూచిస్తాయి. అగ్నిపర్వత ఉద్బేదనం తరువాత వచ్చే భూకంపాల తీవ్రత భ్రంశిభవనం వల్ల వచ్చే భూకంపాల తీవ్రత కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటివల్ల కలిగే నష్టం కూడా తక్కువే.

సముద్రాంతర్గత భూకంపాలు : సముద్రపునీటికి దిగువన సంభవించే భూకంపాలను సముద్రాందర్గత భూకంపాలు అంటారు. ఇవి సముద్రజలంలో ఎక్కువ మేరకు విస్తరించలేవు. వీటిని భూకంప గ్రాహకాలు రికార్డ్ చేస్తాయి. ప్రయాణం చేస్తున్న ఓడలు గమనించగలుగుతాయి. సముద్రతరంగాలపైన ఈ రకపు భూకంపాలు ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. సముద్ర భూతలంపైన క్షితిజ లంబంగా స్థానభ్రంశం జరగడం వల్ల చాలా పెద్ద తరంగాలు ఏర్పడతాయి. వీటిని చునామీలు (Tsunamis) అంటారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

6. భూకంపాలకు ముఖ్యకారణాలను తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

12.10 సారాంశం

భూకంపాలు, వాటికి సంబంధించిన అంశాలను గురించి చర్చించాం. భూకంపాల స్వభావం, ప్రభావాలు, వాటిని గుర్తించి రికార్డ్ చేసే విధానాలను గురించి ప్రస్తావించాం. భూకంపతరంగాలు, తీవ్రత, భూకంపాల పరీకరణ, భూకంపాలకు కారణాలను గురించి కూడా చెప్పాం.

12.11 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

1. భూమిలోపల బలాలు హఠాత్తుగా, వేగంగా విడుదలకావడంవల్ల ప్రకంపనాలు వస్తాయి. ఈ ప్రకంపనాలు మూలస్థానం లేదా నాభి నుంచి అన్ని దిశలలో తరంగాల రూపంలో వికీరణం చెందడంవల్ల భూకంపాలు వస్తాయి.
2. భూకంప శాస్త్రం
3. భూకంపతరంగాలలో నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి.
 - i దీర్ఘ తరంగాలు లేదా P-తరంగాలు
 - ii విరూపణ తరంగాలు లేదా S-తరంగాలు
 - iii రాశీతరంగాలు
 - iv లౌ-తరంగాలు.

4. నాభిలోతు ఆధారంగా భూకంపాలను i అగాధనాభి భూకంపాలు, ii మధ్యస్థనాభి భూకంపాలు, iii గాఢనాభి భూకంపాలుగా వర్గీకరిస్తారు.
5. i సర్క్స్ వసిఫిక్ మేఖల, ii ట్రాన్స్ ఆసియాటిక్ - అట్లాంటిక్ మేఖల
6. భ్రంశీభవనం, అగ్నివర్షతచర్య, భూపాతాలు, గుహలు పైభాగాలు కూలడం.

12.12 మాదిరి పరీక్షాప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. భూకంపాలకు కారణాలు, వాటి ప్రభావాలు ఏవి?
2. భూకంపాల వర్గీకరణ గురించి తెలియజేయండి.
3. భూకంపాలను గుర్తించి, రికార్డ్ చేయడానికి వాడే విధానాలు ఏవి?

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

1. అధికేంద్రం, నాభి గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.
2. భూకంప మేఖలల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి.

భాగం-13 : పర్వతాలు

పాఠ్యాంశాలు

13.0 అక్ష్యాలు

13.1 పరిచయం

13.2 పర్వతాల వర్గీకరణ

13.3 మన దేశంలోని పర్వత శ్రేణులు

13.4 పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమం

13.5 సారాంశం

13.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

13.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

13.0 అక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో పర్వతాలకు సంబంధించిన పదజాలాన్ని, పర్వతాల వర్గీకరణ, భారతదేశంలోని పర్వత శ్రేణులు, పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమాలను గురించి ప్రస్తావించాం.

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు కింది విషయాలను వివరించగలుగుతారు.

- పర్వతాలకు సంబంధించిన పదజాలం
- పర్వతాల వర్గీకరణ
- భారతదేశంలోని పర్వత పంక్తులు
- పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమాలు.

13.1 పరిచయం

చిన్న శిఖరాగ్ర ప్రదేశాలుగల ప్రస్తుతమైన ఉన్నత భూములను పర్వతాలు అంటారు. పర్వతాల అధ్యయనంలో పర్వత శ్రేణి, సముదాయం, మాలవ్యవస్థ, కార్టిల్లెరా మొదలైన పదాలు వస్తాయి.

ఒక పొడవైన సన్నని మేఖలలో అమరికన్న పర్వతాలను పర్వతశ్రేణి అంటారు. వయస్సు, ఉద్భవంత్యా వీటికి దగ్గర సంబంధముంటుంది.

ఎన్నో పర్వతాలు నిర్దిష్టమైన అమరికలేకుండా ఉన్నప్పుడు వాటిని పర్వత సముదాయం అంటారు.

వయస్సులోను, ఉద్భవంలోను అంతగా సంబంధంలేని పర్వతాలు సాపేక్షంగా సన్నని పొడవైన మేఖలలో ఉన్నప్పుడు వాటిని పర్వతమాల అంటారు.

వయస్సులోను, ఉద్భవంత్యా సంబంధమున్న పర్వత శ్రేణులను, సముదాయాలను కలిపి పర్వత వ్యవస్థ అంటారు.

వశిభవనం చెందగా పర్వతాలు ఏర్పడటం, ఆ సమయంలో పురాతన శిలారాశులు తరుణ శిలాస్తరలపై అతిక్రిస్తుం చెందడం జరుగుతాయి. పర్వతోద్భవ ప్రక్రియను ఉష్ణసంవహన ప్రవాహాలు, ఫలకవిరూపణ మొదలైన సిద్ధాంతాలు ఆధారంగా వివరించవచ్చు.

విరూపణ నల్ల లేదా భూపటల చలనంవల్ల సంక్లిష్టమైన వశిపర్వతాలు రూపొందేటప్పుడు సాధారణంగా ముగ్గా అంతర్గమం కూడా సంభవిస్తుంది. ఇది పీడనపెరగడంవల్ల కావచ్చు లేదా అవక్షేపాలు పైకితేవడంవల్ల కావచ్చు. సాధారణంగా సంక్లిష్టమైన వశిపర్వతల కేంద్ర భాగాలలో ముగ్గా అంతర్గమం చెందడం వల్ల గ్రానైట్ బాథోలిత్ లు ఏర్పడతాయి.

13.5 సారాంశం

ఈ భాగంలో కింది అంశాలను వివరించాం

- పర్వతాలు, పర్వతాల రకాలు
- భారతదేశంలోని పర్వతశ్రేణులు
- పర్వతోద్భవ ప్రక్రియ, ముగ్గా అంతర్గమం.

13.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

- పర్వతాలను వాటి ఉద్భవం ఆధారంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. అవి i) పరిశిష్ట పర్వతాలు ii) విరూపణాత్మక పర్వతాలు iii) సాంద్రీకృత పర్వతాలు
- భారత భూభాగంలోని 3 భాగాలు
 - ద్వీపకల్ప ప్రాంతం
 - ద్వీపకల్ప బాహ్యప్రాంతం
 - గంగాసింధూమైదానం

13.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- పర్వతాలలోని ప్రధాన రకాలు ఏవి? వాటిని క్లుప్తంగా వివరించండి.
- భారత దేశంలోని పర్వతశ్రేణులను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

- వశిపర్వతాలు ఎట్లా ఏర్పడతాయో వర్ణించండి.

భాగం-13 : పర్వతాలు

పాఠ్యాంశాలు

13.0 అక్ష్యాలు

13.1 పరిచయం

13.2 పర్వతాల వర్గీకరణ

13.3 మన దేశంలోని పర్వత శ్రేణులు

13.4 పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమం

13.5 సారాంశం

13.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

13.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

13.0 అక్ష్యాలు

ఈ భాగంలో పర్వతాలకు సంబంధించిన పదజాలాన్ని, పర్వతాల వర్గీకరణ, భారతదేశంలోని పర్వత శ్రేణులు, పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమాలను గురించి ప్రస్తావించాం.

ఈ భాగం పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు కింది విషయాలను వివరించగలుగుతారు.

- పర్వతాలకు సంబంధించిన పదజాలం
- పర్వతాల వర్గీకరణ
- భారతదేశంలోని పర్వత పంక్తులు
- పర్వతోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమాలు.

13.1 పరిచయం

చిన్న శిఖరాగ్ర ప్రదేశాలుగల ప్రస్తుతమైన ఉన్నత భూములను పర్వతాలు అంటారు. పర్వతాల అధ్యయనంలో పర్వత శ్రేణి, సముదాయం, మాలవ్యవస్థ, కార్టిల్లెరా మొదలైన పదాలు వస్తాయి.

ఒక పొడవైన సన్నని మేఖలలో అమరికన్న పర్వతాలను పర్వతశ్రేణి అంటారు. వయస్సు, ఉద్భవరిత్యా వీటికి దగ్గర సంబంధముంటుంది.

ఎన్నో పర్వతాలు నిర్దిష్టమైన అమరికలేకుండా ఉన్నప్పుడు వాటిని పర్వత సముదాయం అంటారు.

వయస్సులోను, ఉద్భవంలోను అంతగా సంబంధంలేని పర్వతాలు సాపేక్షంగా సన్నని పొడవైన మేఖలలో ఉన్నప్పుడు వాటిని పర్వతమాల అంటారు.

వయస్సులోను, ఉద్భవరిత్యా సంబంధమున్న పర్వత శ్రేణులను, సముదాయాలను కలిపి పర్వత వ్యవస్థ అంటారు.

వయస్సు, ఉద్యమం విషయంలో ఎంతో వైవిధ్యం చూపే పలు పర్వత వ్యవస్థలున్న ఉన్నత భూప్రాంతాన్ని కార్తికైరా అంటారు.

కొన్ని సందర్భాలలో పర్వతాలు విడిగా ఒక్కటొక్కటిగా మాత్రమే ఉండవచ్చు. సాధారణంగా ఇవి ఒక ప్రాంతం విస్తృతంగా క్రమక్రమానికి గురికావడం వల్ల లేదా అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత వల్ల రూపొందుతాయి.

ప్రపంచంలో చాలా పర్వతపంక్తులు ఉన్నాయి. ఏ రెండు పర్వతాలు ఒకే రకంగా ఉండవు. పర్వతాల ఉద్భవచరిత్రను అధ్యయనం చేయటం నిజానికి ఒక విశిష్టమైన అంశమే.

ప్రతి భౌమమహాయుగంలోను, బహుశా ప్రతి యుగంలోను పర్వతాలు ఏర్పడినట్లు చారిత్రక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం నుంచి తెలియవస్తుంది. విరూపణాత్మక పర్వతపంక్తులు వాటి అధిక ఉన్నతిని కాలక్రమేణా, నెమ్మదిగా పొందగలిగాయి. పర్వతాలు రూపొందే ప్రక్రియను పర్వతోద్భవం అంటారు. ఈ ప్రక్రియ ప్రపంచంలో కొన్ని భాగాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంది. ఈ ప్రక్రియ జరిగే ప్రాంతాలను పర్వతోద్భవ మేఖలలు అంటారు. పర్వతోద్భవ చలనాలు భూపటలానికి స్పర్శరేఖీయంగా ఉంటాయి. పూర్వం భూఅభినతి ఉన్న ప్రాంతాలలో పర్వతోద్భవ ప్రక్రియ అధికస్థాయిలో సంభవిస్తుంది. భూఅభినతులు పదార్థాల నిక్షేపణకు అనువైన స్థలాలుగా ఉంటాయి. నిక్షేపణ చెందిన పదార్థాలు స్పర్శరేఖీయ చలనాల వల్ల నెమ్మదిగా వైకి లేస్తాయి. భారతదేశంలోని అత్యున్నత హిమాలయా పర్వతాలు పూర్వపు టెతీస్ సముద్రంలో నిక్షేపితమైన అవక్షేపాలు వైకి లేవడం వల్ల రూపొందినటువంటివి.

13.2 పర్వతాల వర్గీకరణ

పర్వతాలను వాటి ఉద్భవరిత్యా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు. అవి 1. పరిశిష్టపర్వతాలు. 2. విరూపకారక లేదా విరూపణాత్మక పర్వతాలు. 3. సాంద్రీకృత పర్వతాలు. ఈ పర్వతాలు ఏర్పడడానికి కారణమైన ప్రక్రియలు వరుసగా భేదాత్మక క్రమక్రయం, భూపటల చలనాలు, అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత.

పరిశిష్టపర్వతాలు: భేదాత్మక క్రమక్రయం వల్ల రూపొందుతాయి. ఒక ప్రాంతం వివిధ స్థాయిలలో క్రమక్రయం చెందినప్పుడు ఈ పర్వతాలు ఏర్పడతాయి. చుట్టూ ఉన్న భాగాలు ఎక్కువగా క్రమక్రయం చెంది, మధ్య భాగం అట్లానే ఎత్తుగా ఉండిపోతుంది. భారతదేశద్వీపకల్ప భాగంలో ఉన్న తూర్పు కనుమలు, పడమటికనుమలు మొదలైన పర్వతాలన్నీ పరిశిష్ట పర్వతాలే.

విరూపకారక లేదా విరూపణాత్మక పర్వతాలు: భ్రంశరీతి, వశిరీతి పర్వతాలుగా విభజించవచ్చు. భ్రంశరీతి పర్వతాలు ఒక దుర్బలతలం వెంబడి శిలలు స్థానభ్రంశం లేదా స్థానచలనం పొందడంవల్ల రూపొందుతాయి. వీటిని ఖండ పర్వతాలు అని కూడా అంటారు. ఒక ఉన్నత భూమి నుంచిగాని, నిమ్న భూమినుంచిగాని శిలాఖండాలు స్థానభ్రంశం పొందటంవల్ల ఇవి ఏర్పడతాయి. ఒక ఉన్నత భూమిలో వైకి లేచిన భాగాన్ని హోర్స్ట్ అని, క్రిందికి దిగిన భాగాన్ని గ్రాబెన్ అని అంటారు.

వశిరీతి పర్వతాలు ఏర్పడటంలో ఎన్నో దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశలో క్రుంగుతూ ఉన్న ఒక భూఅభినతిలో అవక్షేపాలు పోగుపడుతుంటాయి. రెండవ దశలో ఈ అవక్షేపాలు స్పర్శరేఖీయ చలనం కారణంగా పార్శ్వపీడనకు గురి అవుతాయి. మూడవ దశలో ఈ అవక్షేపాలు లావా వైకి లేచి వశి పర్వతాలుగా రూపొందుతాయి.

అగ్నిపర్వతాలు పేలినప్పుడు ఘనపదార్థాలు ద్రవరూపంలో ఉన్నంత మేర బయటకు వస్తాయి. ఈ పదార్థాలు పోగుపడటం వల్ల అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడతాయి. వీటినే సాంద్రీకృత పర్వతాలు అని కూడా అంటారు.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

1. పర్యటాల వర్గీకరణకు ఆధారాన్ని పేర్కొని వివిధ రకాలను గురించి తెలియజేయండి.

.....

.....

.....

.....

13.3 మనదేశంలో పర్యటశ్రేణులు

భారతభూభాగాన్ని ద్వీపకల్ప ప్రాంతం, ద్వీపకల్ప బాహ్య ప్రాంతం, గంగాసింధుమైదానం అనే మూడు భాగాలుగా పరిగణిస్తారు. ద్వీపకల్ప ప్రాంతంలోని పర్యటాలు ద్వీపకల్పబాహ్య ప్రాంతంలోని పర్యటాలకు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి.

ద్వీపకల్ప ప్రాంతంలో అతి పురాతన పర్యట శ్రేణి అయిన ఆరావళి పర్యటాలు ఉన్నాయి. ఇవి రాజస్థాన్‌ను రెండు భాగాలుగా విభజిస్తున్నాయి. ఈ పర్యటాల ప్రస్తుత రూపురేఖలు పూర్వకాలంలో ఉన్న అత్యున్నత ఆరావళి పర్వతమాల వికోషీకరణకు గురికాగా మిగిలి ఉన్న లక్షణాలే.

మధ్య భారతదేశంలో సాత్పురా, వింధ్య పర్వతాలు; తూర్పు ఊరం వెంబడి తూర్పు కనుమలు; పశ్చిమతీరం వెంబడి పడమటి కనుమలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పరిశిష్ట పర్వతాలే.

ద్వీపకల్ప బాహ్య ప్రాంతంలో ప్రపంచంలో కెల్లా అత్యున్నతమైన హిమాలయా పర్వతమాలలు ఉన్నాయి. హిమాలయపర్వతాలు వాయువ్యంగా సింధునదివక్రతనుంచి ఈశాన్యంగా బ్రహ్మపుత్ర వక్రత వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. హిమాలయ పర్వతమాలలు విరూపణాత్మక లేదా విరూపకార్థక రీతికి చెందినవి. వీటిలో భ్రంశాలకు, పళులకు సంబంధించిన నిర్మితులు కనిపిస్తాయి.

మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి.

2. భారత భూభాగంలోని మూడు భాగాలను పేర్కొనండి.

.....

.....

.....

.....

.....

13.4 పర్యటోద్భవం, మాగ్మా అంతర్గమం

కొన్ని భౌమ సంఘటనలు ఒక సాధారణ క్రమంలో సంభవించడం వల్ల పర్యటాలు రూపొందుతాయి. భూప్రావారానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రక్రియల కారణంగా భూఅభినతులు, భూఅవసతులు ఏర్పడతాయి. భూఅవసతులు క్రమక్రమంగా గురికావడం వల్ల రూపొందే అవక్షేపాలు భూఅభినతులలో పోగునడటం వల్ల భూఅభినతులు కుంగటం, భూఅవసతులు పైకి లేవడం జరుగుతాయి. భూఅభినతులు కుంగినప్పుడు రూపాంతరప్రాప్తి, గ్రానైట్ అంతర్గమనం సంభవిస్తాయి. భూఅభినతి,

వశిభవనం చెందగా పర్వతాలు ఏర్పడటం, ఆ సమయంలో పురాతన శిలారాశులు తరుణ శిలాస్తరలపై అతిక్రిష్టం చెందడం జరుగుతాయి. పర్వతోద్భవ ప్రక్రియను ఉష్ణసంవహన ప్రవాహాలు, ఫలకవిరూపణ మొదలైన సిద్ధాంతాలు ఆధారంగా వివరించవచ్చు.

విరూపణ వల్ల లేదా భూపటల చలనంవల్ల సంక్లిష్టమైన వశిపర్వతాలు రూపొందేటప్పుడు సాధారణంగా మ్యాగ్మా అంతర్గమం కూడా సంభవిస్తుంది. ఇది పీడనపెరగడంవల్ల కావచ్చు లేదా అవక్షేపాలుపైకితేవడంవల్ల కావచ్చు. సాధారణంగా సంక్లిష్టమైన వశిపర్వతాల కేంద్ర భాగాలలో మ్యాగ్మా అంతర్గమం చెందడం వల్ల గ్రానైట్ బాథోలిత్ లు ఏర్పడతాయి.

13.5 సారాంశం

ఈ భాగంలో కింది అంశాలను వివరించాం

- పర్వతాలు, పర్వతాల రకాలు
- భారతదేశంలోని పర్వతశ్రేణులు
- పర్వతోద్భవ ప్రక్రియ, మ్యాగ్మా అంతర్గమం.

13.6 మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి-మాదిరి సమాధానాలు

- పర్వతాలను వాటి ఉద్భవం ఆధారంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. అవి i) పరిశిష్ట పర్వతాలు ii) విరూపణాత్మక పర్వతాలు iii) సాంద్రీకృత పర్వతాలు
- భారత భూభాగంలోని 3 భాగాలు
 - ద్వీపకల్ప ప్రాంతం
 - ద్వీపకల్ప బాహ్యప్రాంతం
 - గంగాసింధూమైదానం

13.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. కింది ప్రశ్నలకు 30 పంక్తులలో సమాధానాలు రాయండి.

- పర్వతాలలోని ప్రధాన రకాలు ఏవి? వాటిని క్లుప్తంగా వివరించండి.
- భారత దేశంలోని పర్వతశ్రేణులను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి.

II. కింది ప్రశ్నలకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

- వశిపర్వతాలు ఎట్లా ఏర్పడతాయో వర్ణించండి.

డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

హైదరాబాదు

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

పాఠ్యప్రణాళిక

ఖండం 1 భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం

భాగం 1 భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం పరిధి, అక్షయలు

భాగం 2 భూమి ఆకృతి, పరిమాణం, అంతర్నిర్మితి ప్రక్రియలు

ఖండం 2 బహిర్ భౌమ ప్రక్రియలు

భాగం 3 శిలాశైథిల్యం

భాగం 4 నదుల చర్య

భాగం 5 నదీ వ్యవస్థల, సహస్థిత భూదృశ్యాల అభివృద్ధి

భాగం 6 భూగర్భజలం

భాగం 7 హిమానీనదాలు, హిమానీనదనం

భాగం 8 సరస్సులు

భాగం 9 సముద్రాలు

భాగం 10 పవనాల చర్య

ఖండం 3 అంతర్ భౌమ ప్రక్రియలు

భాగం 11 అగ్ని పర్వతాలు

భాగం 12 భూకంపాలు

భాగం 13 పర్వతాలు

Faculty of Science
Second year (3 Year Degree Course) Examination

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం-కొర్రు - 1

భౌతిక భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం, స్థితి శాస్త్రం, ఖనిజశాస్త్రం

Time: 3hrs.

Max.Marks: 75

సెక్షన్ - A

ఏవైనా మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

ప్రతి ప్రశ్నకు 15 మార్కులు.

1. “స్థితికం” అంటే ఏమిటి? స్థితిశాస్త్ర అభివృద్ధిని వివరించండి?
2. స్థితిక సౌష్ఠ్యంలోని ప్రధాన మూలకాలను వర్ణించండి?
3. ఫెల్ స్పార్ సముదాయపు ఖనిజాలను వర్ణించండి?
4. ఖనిజాలను ఏ భౌతికధర్మాల ఆధారంగా గుర్తించవచ్చు?
5. పవనాలుజరిపే భౌమచర్యను గురించి తెలియజేయండి?
6. పర్వతాలలోని రకాలు, ప్రధాన రూపురేఖలను వర్ణించండి?

సెక్షన్ - B

ఏవైనా ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

ప్రతి ప్రశ్నకు 6 మార్కులు.

7. స్థితికరేఖీయ విధానాన్ని వివరించండి?
8. అంతర్ముఖకోణాల స్థిరతనియమాన్ని వివరించండి?
9. ఖనిజాల ప్రకాశ ధర్మాలను క్లుప్తంగా వివరించండి?
10. గార్నెట్ సముదాయపు ఖనిజాలను గురించి తెలియజేయండి?
11. పైరాక్సిన్ సముదాయపు ఖనిజాలను గురించి తెలియజేయండి?
12. డెల్టా ఏ విధంగా నిర్మితమవుతుంది? డెల్టాలో ఏయే రకాల సంస్తరాలు ఉంటాయి?
13. భూగర్భజలాల భౌమచర్య గురించి రాయండి?
14. ప్లాయాసరస్సులు ఎట్లా ఏర్పడతాయి?
15. యుగ్మసమతలం, యుగ్మఅక్షం గురించి మీకు తెలిసింది రాయండి?
16. నికాల్ పట్టుక నిర్మాణం గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి? దాని ఉపయోగం ప్రస్తావించండి?



Faculty of Science
Second year (3 Year Degree Course)
Assignment - 1

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం-కోర్సు -- 1

I. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. “స్వటిక సావ్యవం” గురించి వివరంగా తెలియజేయండి?
2. “భూకంపాలు” అంటే ఏమిటి? వాటికి కారణాలను, వాటి ప్రభావాలను వివరించండి?
3. “స్పర్శకోణమాపకాన్ని” వర్ణించండి. దాని పటాన్ని గీసి, ఉపయోగాలను తెలియజేయండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

4. “భూకంపతరంగాల”ను వివరించండి.
5. “అంతర్ముఖ కోణాల స్థిరతనియమాన్ని” తెలిపి, దాన్ని వివరించండి.
6. “నిలువైత” అంటే ఏమిటి?

BRAOU



ఇక్కడ కత్తిరించవలెను

Faculty of Science
Second year (3 Year Degree Course)

Assignment - 2

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం-కోర్సు --1

I. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. భూగర్భజలాల మూలం, విస్తరణ గురించి ఒక వ్యాసం రాయండి?
2. "అక్షమూలకాలు" అంటే ఏమిటి? వివిధ స్థితికవ్యవస్థల అక్షమూలకాలను గురించి క్లుప్తంగా తెలియజేయండి?
3. ఆంఫీబోల్ సముదాయానికి చెందిన ముఖ్య ఖనిజధర్మాలను వర్ణించండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

4. "రసాయన శైథిల్యాన్ని" నిర్వచిస్తూ ప్రభావాలను వివరించండి?
5. అగ్నిపర్వత ఉత్పాదితాలు అంటే ఏమిటి?
6. ఖనిజాల విభిన్న రూపాలను గురించి క్లుప్తంగా రాయండి?

BRAOU



ఇక్కడ కత్తిరించు

Faculty of Science
Second year (3 Year Degree Course)
Assignment - 3

భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం-కోర్సు -- 1

I. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. "స్టటికరేఫీయ విధానాలను" వివరించండి?
2. "నికాల్ పట్టకం" గురించి రాయండి?
3. "శిలాశైథిల్యం"పై వ్యాసం రాయండి?

II. కింది ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్కదానికి 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

4. "స్టాలక్ టైట్లు", "స్టాలక్ మైట్లు" అంటే ఏమిటి?
5. "సమగతీయతను" వివరించండి?
6. "వైస్ పరామితుల విధానాన్ని" వివరించండి?

BRAOU