


జంతు శాస్త్రం మత్స్య శాస్త్రం



DR. B.R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY
UNIVERSITY - LIBRARY



CM0570

డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
హైదరాబాద్
1995

CM-0570

31-3-99

కోర్కెటిము

సహపాదకుడు

డా. సి. వి. రెడ్డి

రచయితలు

డా. ఎమ్ బాబారావు

డా. కె. గోపాలరావు

డా. జి. పాయిప్రసాద్

శ్రీ. ఎ. టి. ఎన్. జనక్

సహ సలహాదకులు

డా. (శ్రీమతి). గిరిజ నేతి

ముఖచిత్రం

ఎమ్. రమేష్

గ్రాఫిక్స్

ఎమ్. రమేష్

Dr. B.R.A.O.U. LIBRARY

Rec. No. CM-0570

Date. 31.03.99

Call No. 591

డా. బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్.

ప్రథమ ప్రచురణ 1985

రెవీండ్ - 1995

కాపీరైట్ © 1992 డా. బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం.

అన్ని హక్కులూ విశ్వవిద్యాలయానికి. ఈ పుస్తకంలోని ఏ భాగమైనా ఉపయోగించ దలుచు కొంటే విశ్వవిద్యాలయం అనుమతి పొందాలి.

ఈ పాఠాలు సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్యప్రణాళికలో ఒక భాగం. పాఠ్యప్రణాళిక మొత్తం వివరాలు ఈ పుస్తకం చివర ఉన్నాయి.

ఇతర వివరాలకు : డైరెక్టర్ (అకాడమిక్), డా. బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్.

ముద్రణ : సాయిశ్రీ పబ్లికేషన్స్, గోల్కొండ పోస్ట్, హైదరాబాద్. ఫోన్: 7640183

డా. బి. ఆర్. డి. యు. కోసం.

డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం బి.యస్.సి. డిగ్రీస్థాయి మూడవ సంవత్సర పాఠ్య ప్రణాళికకు అనుగుణంగా చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలను ఈ పుస్తకంలో పొందు పరచడం జరిగింది. ఇందులో చేర్చిన భాగాలన్నింటిని జంతుశాస్త్రానికి చెందిన ప్రత్యేక విషయంగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక అంతయూ ఒకే ఖండంగా ఉంది, దీనిలో 20 భాగాలను చేర్చడం జరిగింది. ఈ భాగాలన్నికూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన మత్స్య శాస్త్ర నిపుణులు రచించినారు. విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శిష్ట వ్యావహారిక తెలుగు భాషలో విషయాలను నిపుణులు అనువదించినారు. ప్రతి భాగం ఉద్యేశ్యంతో ప్రారంభమై సంగ్రహంగా విషయాలను ప్రస్తావించిన తరువాత విపులంగా సామగ్రిని సమకూర్చుతుంది. విద్యార్థి విషయ గ్రాహ్యతను పరీక్షించుకోవడానికి ప్రతి భాగం చివర అభ్యాసాన్ని చేర్చడం జరిగింది. ఇంతేకాక వాడిన సాంకేతిక పరిభాషా పదాలను శబ్దకోశం అర్థాలను విడమర్చి చెబుతుంది.

పాఠ్యప్రణాళికలో 20 భాగాలు రూపొందించినాము. మొదటి భాగం భారతదేశంలోని మత్స్య శిక్షణా సంస్థలు ఎక్కడ ఉన్నవో, అవి చేయు పనులను సమగ్రంగా తెలుపుతుంది. రెండవ భాగంలో చేపల పలస గురించి తెలుసుకొంటారు. భాగం మూడులో నకశేరుక చేప అంతర్భాగ మండలం గురించి విద్యార్థులకు బోధనా విధంగా క్లుప్తంగా తెలుపడమైనది. ఇక తదితర భాగాలలో చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన చరిత్ర, ప్రస్తుతదశ, పెంపకం వనరులు, జాతుల ఎంపిక, వర్గీకరణ, సంవర్ధిత చేపల, రొయ్యల గుర్తింపు మొదలైన అంశాలు వివరించబడ్డాయి.

సంవర్ధిత చేపల జీవశాస్త్రాన్ని వివరించే విషయాలు ముఖ్యమైన చేపల, రొయ్యల జీవిత చరిత్ర వాటి ఆహారపు అలవాట్లు, వయస్సు, పెరుగుదల, గుడ్లు పెట్టే అలవాట్లు మొదలైనవి.

చేపనారు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అంశాలకు ప్రాకృతిక వనరుల ద్వారా చేపనారు సేకరణ, బండాలలో ప్రజననం, ప్రేరేపిత ప్రజననం, హాచరి వ్యవస్థలు, చేపనారు రవాణా వగైరా.

చేపకుంటుల నిర్మాణాన్ని వివరించే భాగాలు చేపల కుంటకొరకు స్థలం ఎంపికను, ధూపకల్పనను, నిర్మాణవిధానాన్ని, నీరు, నేల లక్షణాలను, ఆహారపు గొలుసును, ఉత్పాదకతను నిర్వాహణ పద్ధతులను విర్దిష్టంగా తెలుపుతాయి.

వివిధ సంవర్ధన వ్యవస్థలలో మంచి నీటి జలజంతు సంవర్ధనం, తీరజల జంతు సంవర్ధనం, నముద్రజల జంతుసంవర్ధనం మొదలైన విషయాలు చర్చనీయాంశాలు.

అవసరమైన పోషక ఆహారాలతోబాటు అదనపు ఆహారానికి సంబంధించిన అంశాలు, చేపల రోగాలు, కారణాలు, వ్యాధి ఇక్షణాలు, నియంత్రణ మొదలైన వాటిని విపులీకరించబడ్డాయి.

ఇక సాంకేతిక పరిజ్ఞానము కింద చేపలను భద్రపరచడం, కమామిషు చేయడం, రవాణా, చేప ఉప ఉత్పత్తులు, చేపలు వట్టే ఓడలు, ఉపకరణాలు వగైరాలన్నీ చెప్పడం జరిగింది.

చేపల పెంపకాన్ని బెస్తరించే కార్యకలాపాలల్లో చేపల పెంపకానికిచ్చే ప్రోత్సాహక పథకాలు, విస్తరణ విధానాలు, విస్తృత కార్యక్రమాలు వివరింపబడ్డాయి.

ఈ గ్రంథంలో విషయాలను వివరించడం కొన్ని పరిధులలో జరిగినా, సతితలగు విద్యార్థులకు చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన వివిధ కోణాలతో పరిచయం చేసి ముఖ్యంగా లోనాటి, తీర ప్రాంతాల చేపల సంవర్ధన విధానాలు వృత్తిపరంగా, వాణిజ్య పరంగా ఎంతో లాభదాయకమనే స్పృహ కలిగించడమే ప్రధాన ఆశయం.

ఇది అనువాదమైనా తెలుగు భాషలో చేపల పెంపకం పైన వెలువడిన మొదటి శాస్త్రీయ గ్రంథం కాబట్టి ఎటువంటి లోపాలైనా గుర్తించి సూచించినట్లయితే వాటిని కృతజ్ఞతతో స్వీకరిస్తాము. వాటిని తప్పక పరిశీలించి పునర్ముద్రణలో చేర్చి సుందరంగా తీర్చి దిద్దుతాము. ఈ పుస్తకాన్ని ఇంతకుండు సమగ్రంగాను, ఉపయుక్తంగాను చేయడానికి సహృదయులనుండి సలహాలను ఆహ్వానిస్తున్నాము.

BRAOU

విషయసూచిక

భాగం-1	: భారత దేశములోని మత్స్య శిక్షణా సంస్థలు	...	1
భాగం-2	: చేపలు వలస	...	4
భాగం-3	: నకశేరుక చేప - అంతర్జాగ మండలము	...	6
భాగం-4	: చేపల పెంపకం - పరిచయం చరిత్ర, ప్రస్తుతస్థితి, వృత్తి వనరులు.	...	12
భాగం-5	: పెంపకానికి చేపల, రొయ్యల జాతుల ఎంపిక, వాటి వర్గీకరణ, గుర్తింపు లక్షణాలు.	...	21
భాగం-6	: ఆహార సేకరణ పెరుగుదల, నిడివి - బరువుల సంబంధం, ముఖ్యమైన చేపల, రొయ్యల ప్రజననం అలవాట్లు	...	37
భాగం-7	: స్థావరీయ చేపల, రొయ్యల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభక దశలు	...	43
భాగం-8	: సహజ వనరుల నుండి చేపనారు సేకరణ, బండాలలో ప్రజననము	...	55
భాగం-9	: ప్రేరేపిత ప్రజననము, పోచరీవ్యవస్థ, చేపనారు రవాణా	...	64
భాగం-10	: చేపకుంట స్థలి ఎంపిక, రూపకల్పన, కుంటల నిర్మాణం	...	76
భాగం-11	: నీటికుంట నీరు, నీలి లక్షణాలు, ఆహారపు గొలుసు, ఉత్పాదకత	...	85
భాగం-12	: కుంట నిర్వహణ	...	99
భాగం-13	: మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు	...	116
భాగం-14	: తీరప్రాంత జల సంవర్ధన, సముద్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు	...	132
భాగం-15	: మత్స్య పోషణ, ఆరోగ్యస్థితి, పరిశీలన పోషణ అవసరాలు, అదనపు ఆహార సదుపాయాలు	...	151
భాగం-16	: చేపల రోగాలు, కారణాలు అదనపు చర్యలు	...	158
భాగం-17	: సాంకేతిక మత్స్య విజ్ఞానము పరిరక్షించడం, (సిజిర్వేషన్) ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్వేషన్ (చేరవేత).	...	170
భాగం-18	: సహవదార్థాల ఉత్పత్తి	...	183
భాగం-19	: నావలు, గియర్	...	197
భాగం-20	: చేపల పరిశ్రమ విస్తరణ, చేపల సంవర్ధన, ప్రోత్సాహం, విస్తరణ పద్ధతులు, విస్తరణ పథకాలు.	...	225

BRAOOU

భాగం-1 భారత దేశములోని మత్స్య శిక్షణా సంస్థలు

చేపమంచి బలవద్దక, మాంసకృత్తులు గల పోషక ఆహారము. దీనిలో విటమిను వై, డీ ఎక్కువగా వుండును. భారతదేశములో సముద్రములు, నదులు, మంచి నీటి సరస్సులు, చేపల పెంపకమునకు చాల అనువుగా వున్నవి. భారతదేశపు సముద్రతీరము సుమారు 4,667 కి. మైల్లు. అందువల్ల మన దేశములో చేపల అభివృద్ధికై విశేష అవకాశములున్నవి.

చేపల అభివృద్ధి, వానిపోషణ, వాటిసేకరణ, మొదలైన అనేక అంశములను గురించి పరిశోధనలు జరుపుటకై మనదేశములో ఈ క్రింది మత్స్య శిక్షణా మరియు, పరిశోధనా సంస్థలు నెలకొల్పబడినవి.

1. కేంద్ర సముద్ర చేపల పరిశోధనాసంస్థ (C.M.F.R.I) యెర్నాకుళం - కేరళ.
2. కేంద్ర, చేపల పరిశోధనా సంస్థ (C.I.F.T.) - కొచ్చిన్ - కేరళ
3. కేంద్ర సముద్ర జల, జీవ పరిశోధనా సంస్థ (N.I.O.) పానాజీ, గోవా.
4. కేంద్ర, మంచినీటి మత్స్య పరిశోధనాసంస్థ, (C.I.F.R.I) బారక్ పూర్, పశ్చిమబెంగాల్.
5. కేంద్ర మత్స్య శిక్షణా సంస్థ (C.I.F.E.) : బొంబాయి.
6. జరితు పరిశీలనాసంస్థ (Z.S.I.) కలకత్తా.

1. కేంద్ర సముద్రచేపల పరిశోధనాసంస్థ (C.M.F.R.I) యెర్నాకుళం. కేరళ

ఈ సంస్థ చేపలు, రొయ్యలు, నల్లగుల్లలు, ముత్యపుచిప్పలు మొదలైన వానిపై అనేక అంశాలను గురించి పరిశోధన జరుపుచున్నది. ఈ సంస్థ యొక్క శాఖలు, మదరాసు, మండవము, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, బొంబాయి, వీరావల్ మొదలగు పట్టణములయందు కలవు.

2. కేంద్ర చేపల పరిశోధనా సంస్థ (C.I.F.T) కొచ్చిన్, కేరళ.

ఈ సంస్థను 1957లో కొచ్చిన్ లో (కేరళలో) ప్రారంభించినారు. ఈ సంస్థలో చేపలను పట్టుటకు సుపయోగించు, వివిధ రకముల పడవలు, వలలు వాటి నాణ్యతను మెరుగుపరచుటకై పరిశోధనలు జరుపుట ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. 1958లో చేపల పరిశుభ్రము చేయుట వానినుంచి అనేక పదార్థములను తయారుచేయుట కూడ ప్రారంభించిరి. తరువాత జీవరసాయనశాస్త్ర, సూక్ష్మజీవశాస్త్ర, సాంకేతిక శాస్త్ర, గణాంకశాస్త్ర మొదలగు విభాగములను గూడ ప్రారంభించిరి.

ముఖ్యకార్యాలయము - కొచ్చిన్ :-

కేంద్ర చేపల పరిశోధన సంస్థ (C.I.F.T.) ముఖ్య కార్యాలయమునకు కొచ్చిన్ లో నెలకొల్పిరి. ఇక్కడ ముఖ్యముగా, తక్కువ వ్యయముతో నాణ్యమైన నావలను తయారుచేయుటకై విస్తృతముగా ప్రయోగములు చేయుచున్నారు. అలాగే సముద్రపుటుప్పు తేమనుంచి, సముద్రహీనికర జంతువులనుంచి కాపాడుట కవసరమైన విషయములను రూపకల్పన చేయుటకై ప్రయోగముల నిచ్చట చేయుచున్నారు.

అలాగే వలల యుత్పత్తి శాఖలో, అనేకరకములైన, వలల అల్లికలకై సుపయోగించే, దారమునార, నైలాన్ దారము, మొదలైన వాని నాణ్యతపై అనేక రకముల ప్రయోగములు చేయుచున్నారు. ఈ వలల మన్నికకై సుపయోగించు ద్రావకముల గురించి కూడ వీరు అనేక ప్రయోగములు చేయుచున్నారు. ఇక్కడ చేపల పరిశుభ్రవిభాగము, చేపలను, పరిశుభ్రము చేయుట కనేక విధానముల గురించి, చేపల

నుంచి తయారగు అనేక విధముల పదార్థములపై కూడ ప్రయోగములు చేయుచున్నారు. వీనిలో ముఖ్యమైన పదార్థములు చేపనూనె, చేపిండి, చేప ఆహారము మొదలైనవి.

ఇతర ప్రయోగశాలలు:

వీరవల్ ప్రయోగశాల (గుజరాత్) :

దీనిని 1962లో ప్రారంభించినారు.

కాకినాడ ప్రయోగశాల (ఆంధ్రప్రదేశ్):

దీనినికూడ 1962లో ప్రారంభించినారు. ఈ సంస్థ ముఖ్యోద్దేశము బ్రాల్ పడవల సువయోగించి చేపలను యెక్కువ సంఖ్యలో పట్టుట. దీని కవనరమైన వలల సుత్పత్తివగైరా.

బుర్లా ప్రయోగశాల (ఓరిస్సా):

తటాకములు, నరస్సులలో చేపలను పట్టుటకై అవసరమగు, నావలు, వలలపై ప్రయోగములు చేయుటకై 1963లో దీనిని ప్రారంభించినారు.

పానాజీ ప్రయోగశాల (గోవా):

రొయ్యల వేటకై మేలురకపు బ్రాల్ పడవలను ఉత్పత్తి చేయుటకై 1964లో, ఈ ప్రయోగశాలను ప్రారంభించినారు.

బొంబాయి ప్రయోగశాల (మహారాష్ట్ర):

చేపల సీతలీకరణ, వానిగిడ్డంగులను తయారుచేయుట చేపల నిలువ చేయుట మొదలగు అంశములపై ప్రయోగములను చేయుటకై 1958లో ఈ ప్రయోగశాలను నెలకొల్పిరి.

కాలిక్ట్ ప్రయోగశాల (కేరళ):

చేపలను నిలువ చేయు విధానములపై ప్రయోగములను చేయుటకై ఈ సంస్థను 1962లో ప్రారంభించిరి.

కేంద్ర సముద్రజల, జీవ పరిశోధనాసంస్థ (N.I.O) పానాజీ, గోవా.

ఈ సంస్థలో సముద్ర జీవ, భౌతిక, రసాయనక, భూగర్భ విషయాలపై కూశంకష ప్రయోగములు జరుగుచున్నవి. వీరు సముద్రములో అనేక శాస్త్రీయ విహారయాత్రలు కూడా సలుపుచున్నారు. వీటిలో ముఖ్యమైనవి అంటార్కికిటికా యాత్రలు.

4. కేంద్ర, మంచినీటి మత్స్య పరిశోధనాసంస్థ (C.I.F.R.I) బారక్ పూర్. పశ్చిమబెంగాల్.

మంచినీటి చేపల సుత్పత్తికి సంబంధించిన అనేక విషయములపై ఈ సంస్థలో ప్రయోగములు జరుగుచున్నవి.

5. కేంద్ర మత్స్య శిక్షణాసంస్థ (C.I.F.E) బొంబాయి:

చేపల గురించి బోధించు అగ్రశ్రేణికి చెందిన సంస్థలలో ఇది ఒకటి. దీనిని 1961లో బొంబాయిలో ప్రారంభించినారు. దీని శిక్షణాశాఖలు బారక్ పూర్ (పశ్చిమబెంగాల్), కాకినాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్); చిన్ హిట్ (ఉత్తరప్రదేశ్)ల యందు కలవు.

భాగం-2 చేపలు వలస

పక్షులు మొదలగు కొన్ని జంతువుల వలనే చేపలు కూడ ఒక ప్రాంతమునుండి మరొక ప్రాంతమునకు వలసపోవును. కాని చేపల వలస మూడు విధములుగా ఉండును.

1. గ్రుడ్లు పెట్టుటకై వలస (Spawning Migration):-
2. ఆహార సేకరణకై వలస (Feeding Migration)
3. శీతం ప్రాంతములనుండి ఉష్ణప్రాంతములకు వలస: (overwintering Migration)

సాలమన్ (Salmon) వంటి కొన్ని జాతుల చేపలలో వృద్ధ చేపలే వలసవెళ్ళును. ఆహార సేకరణకూడ చిన్న చేపలు యొక్కడికీపోవు. కొన్ని జాతుల చేపలలో చిన్న, పెద్ద చేపలు అన్నీ కలిసి వలసపోవు చుండును.

చేపల వలస, వాటి శరీర వాతావరణ పరిస్థితులు రెంటిపై ఆధారపడి వుండును. పై మూడు రకముల వలసలు, ఒక దానికొకటి సంబంధము కలిగి యుండును. మంచిసిటి చేపల నదులనుండి ఆహారకొరతవల్ల సముద్రములలోనికి ఆహారసేకరణకై వలసపోవును. అదే విధముగ సముద్రచేపలు, గ్రుడ్లు పెట్టుటకు, మంచిసిటి నదులలో వాతావరణము చాల అనుకూలముగా వుండుటచేత అవి గ్రుడ్లు పెట్టుటకై నదులలోనికి వలసవచ్చును. వలస యొక్క ముఖ్యోద్దేశము, చేపలు వాటి సైతం నివసించేయుట. వలసపోవు దూరము, వలస విధానము, చేపలయొక్క శరీర సామర్థ్యము, పరిస్థితులపై ఆధారపడియుండును. చేప పెద్దదిగా ఆరోగ్యముగా యున్నయెడల వలసపోగలుగును. ఉదాహరణకు కాస్పియలోసా కెస్లెరి (Caspialosa kessleri) వలస యొక్క వ దూరము వలసపోవును.

చేపలు సాధారణముగా, గుంపులు గుంపులుగా వలసపోవును. చేపలు గత సంవత్సరము ఏ ప్రదేశములో గ్రుడ్లు పెట్టినవో మళ్ళీ అదే ప్రదేశములో వలసపోవును.

చేపల నుత్పత్తికి సంబంధించిన అనేక విషయములపై ఇక్కడ శిక్షణ ఇచ్చుచున్నారు. అన్ని రాష్ట్రముల మత్స్యశాఖాధికారులు చాలనుంది ఈ సంస్థలో ప్రత్యేక శిక్షణను పొందుదురు. వీరు రెండు సంవత్సరముల యమ్.యన్.సి (ఫిషరీ మేనేజ్ మెంట్) కోర్సును ప్రారంభించినారు.

6. జంతు పరిశీలనాసంస్థ (Z.S.I.) కలకత్తా

దీని ముఖ్య కార్యాలయము కలకత్తా యందు కలదు. దీని శాఖలు అన్ని రాష్ట్రములలోను కలవు. వీరు అన్ని రకముల జంతువులను సేకరించుట, వర్గీకరించుట మొదలగు అంశములపై విస్తృతముగా ప్రయోగములు చేయుచున్నారు.

జంతు పరిశీలనాసంస్థ 1916లో భారత ప్రభుత్వము చేత స్థాపింపబడినది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ భారతప్రభుత్వ శాస్త్రీయ, సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖవారి ఆధీనములో యున్నది. దీనిక్రింద 10 (పది) కేంద్రీయ శాఖలు కలవు. అవి

1. ఉత్తర కేంద్రీయశాఖ - డెహ్రాడూన్ (ఉత్తరప్రదేశ్)
2. తూర్పు కేంద్రీయశాఖ - షిల్లాంగ్ (మేఘాలయ)
3. పశ్చిమ కేంద్రీయశాఖ - పూనా (మహారాష్ట్ర)
4. మధ్య భారత కేంద్రీయశాఖ - జబ్బల్ పూర్ (మధ్యప్రదేశ్)
5. యెడారి కేంద్రీయశాఖ - జోధ్ పూర్ (రాజస్థాన్)
6. దక్షిణ కేంద్రీయశాఖ - మద్రాసు - (తమిళనాడు)

గంగాతీర కేంద్రీయశాఖ - పాట్నా (బీహార్)

శాస్త్ర కేంద్రీయశాఖ - సోలాన్ (హిమాచలప్రదేశ్)

కేంద్రీయశాఖ - బెరహంపూర్ (ఒరిస్సా)

శుశాఖ - వైదరాబాద్ (ఆంధ్రప్రదేశ్)

ఈ సేకరణశాలలకు, ఈ జంతుపరిశీలనాసంస్థ మూలస్థంభము. శిశువిద్యాలయములవారుగాని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వముల వారు

అస్కోరెగ్యులేషన్ లో చాల మార్పులు వచ్చును. వాటి ఆహారపు అలవాట్లలో చాలమార్పులు వచ్చును. వాటి ఆహారనాళము కురచవడును. ఈ మార్పులు ముఖ్యముగా పొల్ మన్ చేపలలో బాగా కనబడును.

కొన్ని చేపలు గుడ్డు పెట్టుటకై సముద్రపు అగాధపు లోతుల నుండి ఉపరితలనునకు వచ్చును ఈ వలసను వర్టికల్ స్పానింగ్ మైగ్రేషన్ అని అందురు. ఉదా: స్కా పెల్లిఫార్మిన్ జాతి చేపలు.

2. ఆహార సేకరణకై వలస:

ఈ విధమైన వలసలో చేపలు అవిభున్న ప్రాంతములలో ఆహారపు కొరత యేర్పడినచో, ఆహారమును వెతుకుతూ కొత్త ప్రాంతములకు వలసపోవును. ఇట్టి వలస, మంచినీటి, సముద్రపు చేపలు రెంటిలోను కనబడును.

ఉదా: షాడ్ (Shad) చేప, కాడ్ చేప (Cod) హెర్రింగ్ (Herring) చేప. మేకరల్ (Mackerel).

3. శీతల ప్రాంతములనుండి ఉష్ణప్రాంతములకు వలస:

ఈ రకపు వలసలలో శీతల ప్రాంతములలో (Polar regions) వుండు చేపలు, శీతాకాలములో నీరు అక్కడ గడ్డకట్టుటచేత, అవి ఆప్రాంతములను వదిలి, ఉష్ణప్రాంతములకు (మధ్యధరా ప్రాంతములకు (Tropical equatorial regions) వలసపోవును. ఉదా: స్టెరియస్ (Sturgeous); అరల్ సీ చా (Aral Sea Barbel), పైక్-పెర్చ్ (Pike-perch) వగైరా.

భాగం-3 సరళేరుక చేప-అంతర్భాగ మండలములు

విషయసూచిక

- 3.1 ఉద్దేశ్యం
- 3.2 ఉపోద్ఘాతం
- 3.3 జీర్ణమండలము
- 3.4 శ్వాసకోసమండలము
- 3.5 నాడీమండలము
- 3.6 మూత్ర-జననేంద్రియ మండలము
- 3.7 సారాంశము
- 3.8 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 3.9 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

3.1 ఉద్దేశ్యం

భాగం యొక్క ముఖ్యోద్దేశమేమనగా చేపయొక్క అంతర్భాగములు, మండలములను గురించి తెలుసుకోవడం. ముఖ్యముగా జీర్ణ, శ్వాసకోస, నాడీ, మూత్ర-జననేంద్రియ మండలములను గురించి

caeca) వుండును. ఇవి కేవలం సకశేరుక చేపల జీర్ణమండలములో మాత్రమే
(Duodenum) వెనుక చిన్న ప్రేగులు (ileum) వుండును. దీని వెనుక
వుండును. ఇది గుడము (Anus) ద్వారా వెలుపలికి తెరుచుకొనును.
భాగములగా అసంపూర్ణముగా విభజింపబడివుండును. పిత్తాశయము
రభాగములోయుండును. దీనినుండి పిత్తాశయపు నాళము బయలుదేరి
కి తెరుచుకొనును.

చగా ప్రేగులమధ్య భాగమున యుండును. స్ప్లీన్ (Spleen)

BRAOU

శ్వాసక్రియ విధానము : నోటిద్వారా నీరు అస్యకుహరమును చేరును. మూయును. దీనివల్ల అస్యకుహరములో ఆమ్లజనిలోపున్న నీరు మొప్పలను వెలుపలికి పోవును. ఈ సమయములో మొప్పల ఫిలమెంట్స్ (filaments) కార్బన్ డిక్సైడ్ ఆమ్లజనికము (CO_2) వెలుపలికివచ్చి, నీటిలోపున్న ఆమ్లజని ప్రవేశించును. ఈ విధముగా డిఫ్యూషన్ (Diffusion) శ్వాసక్రియ జరక్తము శరీరములోనికి అన్ని భాగములకు ప్రసరించును.

3.5 నాడీమండలము


సకశేరుకములలో నాడీమండలము మూడు భాగములగా

1. కేంద్రనాడీమండలము (Central nervous system)
2. ...

BRAOU

పైకి వచ్చే వాహిక (Analic)
పుండుము. ద్వయోడినం
కాలేయము (Rectum),
(Gallbladder) కాలేయపు కుడి ప
ద్వయోడినం (Duodenum) లోని భాగము. దీనిలో మెదడు చివరి భాగమైన

ప్యాన్క్రియాస్ (Pancreas) పల
జీర్ణాశయపు చివరి భాగమునయుండును. ఇది చివరి భాగమైన మెదడుల్లా ఆల్బాంగేటానుండి,
కోపల దొడ్లగా వుండును. దీనినుండి, జతల,
వివిధ అవయవములకు వెళ్ళును.



చిత్రము 3.1. జీర్ణమండలము

1. నోరు. 2. అన్యకుహరము. 3. మొవ్వలు. 4. అన్నవాహిక. 5. కార్డియక్ స్టమక్. 6. పీకం.
8. కాలేయము. 9. గాల్ బ్లాడర్. 10. పైల్ నాళము. 11. చిన్న పేగులు. 12. గుడము. 13. పెద్ద పేగు.
14. గాలితిత్తి. 15. వైరల్ స్టమక్.

3.4 శ్వాసకోశ మండలము

చేపలలో శ్వాసక్రియ మొవ్వల ద్వారా (Gills) జరుగును. పక్కనేరుక చేపలలో పులా నాలుగు జతల మొవ్వలుండును. ఈ మొవ్వల మధ్య భాగపు గోడలు అందుచేత మొవ్వల ఫిలమెంట్స్ (filaments) అన్యకుహరములోనికి వాక్కు పున్న జిగురుపొర (Mucous Membrane) అనేక అడ్డమడకల రక్తనాళములు ధారాళముగా, వ్యాపించియుండును.

అటోనామిక్ నాడీమండలము : దీనిలో సింపతిటిక్ మరియు, పారాసింపతిటిక్ నాడులుండును. ఇవి నైసర్ నాడులతోకలిసి శరీరకుహరములోని అన్ని అవయవములకు పోవును.

3.6 మూత్ర జననేంద్రియ మండలము

శ్రీ జననేంద్రియమండలము :

ఆడ చేపలో ఒక జత అండకోశములు ఉదరకోశములోని పరభాగమున నుండును. వీని నుంచి దీజవాహికలు, జననేంద్రియ రంధ్రములోనికి తేరుచుకొనును. అండములు నీటిలోనికి విస్తరింపబడును. ఫలదీకరణ నీటిలో జరుగును. వీనిగ్రుడ్లలో పచ్చిసాన యొక్కవ పుండును. పురుష జననేంద్రియమండలము :

మగ చేపలో ఒక జత పురుషబీజకోశములు, ఉదరకోశములోని పరభాగమున నుండును. వీని నుంచి, దీజవాహికలు, పరభాగముగాని రెండు కలిసి పురుషజననేంద్రియ రంధ్రములోనికి తేరుచు అల చేప మూత్ర పిండములు, రెండు మూత్రపిండిములు ఇవి గాలితిత్తికి పుష్టభాగమున, వెన్నెముకకు గమున నుండును. మూత్రవిస్తరణలో తోడ్పడును. కాని పరభాగమున కలిసియుండును. మూత్ర రెండు మూత్రపిండములనుండి బయలుదేరిన తేరుచుకొనును. మూత్రాశయము

పుష్కలాగము

ఉదరభాగము

పటము 3.4. మెడడు

సెరిబెల్ అర్థగోళములు 3. పీనియల్ గ్రంథి. 4. వేతగోళములు. 5. సెరిబెల్లం. 6. 8. ఇన్ ఫండిబ్యులం. 9. పియూషగ్రంథి. 10. పాకస్ వ్యామ్నోస్.

4.

నక్షత్రముల మరియు చేపలలో పరిచయము గా జరుగును.

నేత్రగోళములు మరియు కండరములకు పోవును.

5. ట్రైజెమినల్ నాడులు : ఇవి పెద్ద నాడులు. వే మండలములన్నీ సరిగా పరుసగా (ఎ) అప్టాలిమికన్ సూపర్ ఫిషియాలిన్ (బి) & (డి) మాండెబ్యులారిన్ మొదటి రెండు నాసికాపుట చుట్టూ వైదవడకు, మాండెబ్యులారిన్ క్రింది దవడకు పోవును.

6. అబ్జు వెంస్ నాడులు : ఇవి మెడల్లా అబ్జాంగేలా నుండి కండరములకు పోవును.

2. అబ్జు వెంస్



ట్రాజెయిల్ ఆఫ్ 1



ట్రాజెయిల్ ఆఫ్ 2



ట్రాజెయిల్ ఆఫ్ 3



ట్రాజెయిల్ ఆఫ్ 4



ట్రాజెయిల్ ఆఫ్ 5



పటము 3.2. మొవ్వల అర్చిల నిర్మాణము బాంధవ్యము

వైసల నాడులు మరియు అవయవములకు పోవును.

మొవ్వలు



అవయవము

పటము 3.3. మొవ్వలకు శ్వాసకుమార్గమునకుగల

భాగం-4 చేపల పెంపకం-పరిచయం చరిత్ర, ప్రస్తుతస్థితి, వృత్తి వనరులు

విషయసూచిక

- 4.1 ఉద్దేశ్యం
- 4.2 ఉపోద్ఘాతం
- 4.3 చేపల పెంపకం - ప్రాముఖ్యత
- 4.4 పుట్టు పూర్వోత్తరాలు
- 4.5 బంధీకృత సంవర్ధిత చేపల పెంపకము
- 4.6 జల జంతు సంవర్ధనము
- 4.7 ప్రస్తుత పరిస్థితి
- 4.8 చేపల పెంపకానికి భారతదేశం వనరులు
- 4.9 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేపల పెంపకానికి వనరులు
- 4.10 చేపల ఉత్పత్తి
- 4.11 భారతదేశంలో జలజంతు సంవర్ధనంలో సాంకేతిక ప్రగతి
- 4.12 జలజంతు సంవర్ధనాభివృద్ధికి అవశ్యకాలు
- 4.13 సారాంశము
- 4.14 స్వపరిశీలన జవాబులు
- 4.15 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

4.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగం చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన పుట్టుపూర్వోత్తరాలను, చేపల పెంపకం నిర్వహించే ముఖ్యమైన పాత్రను దాని వికాసాన్ని తెలుపుతుంది. జలజంతు సంవర్ధనాన్ని నిర్వచిస్తూ, దాని రకాలను, ప్రస్తుత స్థితిని వివరిస్తుంది. ఇంతేగాక చేపలు లభించే వనరులు, వాటి అభివృద్ధితోపాటు కొన్ని ముఖ్యమైన భారతీయ సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా జలజంతు సంవర్ధన ప్రక్రియలను కూడా తెలుపుతుంది.

4.2 ఉపోద్ఘాతం

చేపల పెంపకం, పోషక పదార్థాలు ప్రజలకు అందించడమే గాక ఆదాయాన్ని ఉద్యోగావకాశాలను కల్పిస్తుంది. భారతీయ పురాణాలలోను, చరిత్రలోను, సాంప్రదాయాలలోను చేపలది ప్రముఖస్థానం. చేపల పెంపకం భారత దేశంలో అనాదిగా వస్తున్న వృత్తి. చేపల పెంపకాన్ని ఇటీవల “జల జంతు సంవర్ధనం” అని పిలుస్తూ చేపలతోబాటు, వివిధ రకాల జల జీవులను అంటే, రొయ్యలు, మలస్కాజీవులు, సముద్రం మొక్కలు, మొదలైన వాటిని కూడా పెంచడం జరుగుతున్నది. జలజంతు సంవర్ధనం భారతదేశ గ్రామాభివృద్ధిలో సమగ్ర భాగమయింది. భారత దేశంలోను, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను మంచి నీటి, ఉష్ణకయ్య, సముద్రనీటి వనరులు విభిన్నం, అపారం.

భారతదేశం రొయ్యల పెంపకంలో అన్ని దేశాలకంటే అగ్రగామిగా లోనాటి చేపల పెంపకంలో రెండవ స్థానాన్ని పొందింది. సముద్రవనరుల ద్వారా జరిగే మొత్తం చేపల ఉత్పత్తి దృష్ట్యా మనదేశం ప్రపంచంలో 8వ స్థానంలో ఉంది. 1980లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపల మొత్తం ఉత్పత్తి 0.237 మిలియన్ టన్నులు. భారతదేశంలో సాంకేతికంగా వృద్ధి పరచిన జలజంతు సంవర్ధనంతో గణనీయమైనవి; సంవర్ధిత కార్ప్లలో ప్రేరేపిత ప్రజననం ద్వారా విశిష్టమైన దీజాన్ని పెంపొందించడం; చేపల మిశ్రమ పెంపకం; ఉష్ణకయ్య రొయ్యల, చేపల పెంపకం; రొయ్యల గుడ్లు పెట్టే కాలాన్ని నియంత్రించడం; మలస్కా జీవుల సంవర్ధన పద్ధతులతోపాటు సంవర్ధిత ముత్యాలకు సంబంధించిన సాంకేతిక జ్ఞానం. దేశంలో జలజంతు సంవర్ధనం త్వరిత గతి వృద్ధి చెందటానికి ముందు చర్యలు: వ్యవస్థాపూర్వక పరిశోధన, సుశిక్షిత సిబ్బంది, విస్తృత కార్యక్రమాలు, ఔత్సాహికులకు తగు ధన సహాయం, మాలికావసరాలకు ఆసరా కల్పించడం వంటివి.

4.3 చేపల పెంపకం ప్రాముఖ్యత

చేపలలో జంతు ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కాబట్టి చేపల పెంపకంవల్ల జల ఆవరణం నుండి ప్రోటీన్ ఆహార ఉత్పాదన సమృద్ధిగా జరుగుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ప్రజల పోషకాహార ప్రమాణాలను పెంచడం చేపల పెంపకం నిర్వహించే తీరుపై ఆధారితమై ఉంది. అదాయానికి, ఉద్యోగావకాశాలకు దోహదం చేస్తుంది కూడా.

పడవా భూములలో చేపల పెంపకంవల్ల నీటి నేల వనరులను సద్వినియోగం చేయవచ్చు. చేపల పెంపకంవల్ల న్యాయం ఉపాధి కల్పనతోపాటు కాలం దాటిన తరవాత విర్బడే గ్రామీణ ప్రజల నిరుద్యోగ సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయంగా పని దొరుకుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఇతర ఉప పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం కలిగిస్తుంది. అందుచేత ఇది భారతదేశ జల సంపదోత్పాదనగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటున్నది.

4.4 పుట్టుపూర్వోత్తరాలు

భారతీయ పురాణాలలోను, చరిత్రలోను సాంప్రదాయాలలోను చేపలది ప్రముఖ స్థానం. “మత్స్యా వతారంగా” చేప రూపాన్ని భగవంతుడు ధరించినట్లు పురాణ గాథ కావ్యాలలో చాలా చోట్ల చేపలను గూర్చి ప్రస్తావించడం జరిగింది. సింధులోయ నాగరికత (2500-1500 క్రీ.పూ) విస్తరించిన మొహెంజోదారో, తవ్వకాలలోని చేపల అవశేషాలు అప్పటి ప్రజలు చేపలను ఆహారంగా తీసుకొనే వారని నిరూపిస్తున్నాయి. సంగమయుగం (1-4 శతాబ్దం క్రీ.అ.) నాటి పాటలలో చేపలు, వాటి వాణిజ్యం, జాలరి సమాజాన్ని గూర్చి ప్రసక్తి ఉంది. సాంప్రదాయకంగా భారతదేశ జనాభాలోని ఒక సమూహం ‘జాలరులుగా’ తమ జీవనోపాధికి చేపలు పట్టడాన్ని ప్రధాన వృత్తిగా చేపట్టి నదుల, తీరప్రాంతాల, సరస్సుల ఒడ్డున నివసిస్తుంది.

ప్రపంచంలో ఈజిప్ట్ వాసులు చేపల సంవర్ధనాన్ని మొదట చేపట్టిన (2500 క్రీ.పూ.) వారు కావచ్చు. 2000 క్రీ.పూ. నుండి చైనా కూడా చేపల పెంపకాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టింది. భారతదేశంలో ఇది అనాదిగా వస్తున్న వృత్తి. జలాశయాల్లో చేపల సంవర్ధనాన్ని గూర్చి కౌటిల్యుడి ‘అర్థశాస్త్రం’ (300 క్రీ.పూ.)లో వివరించి ఉంది. “మానసోల్తార్” (1127 క్రీ.అ.) లో సోమేశ్వరుడనే రాజు కుంటల్లో చేపలను లావుగా చేసే పద్ధతులను విధించినాడు. బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా మొదలైన తూర్పు రాష్ట్రాలలో సాంప్రదాయకంగా వస్తున్నట్టి కుంటల్లో చేపల పెంపకం, 19వ శతాబ్దంతానికి, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు క్రమంగా విస్తరించింది.

ప్రముఖ వృత్తిరీత్యా చేపల పెంపకం భారత్ లో జరిగినా దీనిపట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ కొరవడింది. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తరవాతనే మొదటిసారిగా ఈ దిశలో పట్టుదలతో శ్రద్ధ వహించి, వ్యవస్థాపూ

ర్యక పరిశోధన ద్వారా చేపల పెంపకం పద్ధతులను, విస్తరణ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. తదుపరి వంచవర్ష ప్రణాళికలు చేపల సంవర్ధనానికి తగు సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి.

భారత్ లో చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన చారిత్రక ఖుట్టాలలో రెండు ముఖ్యంగా పేర్కొనదగినవి. పార్లమెంటు ద్వారా 1976లో చట్టబద్ధం చేయబడ్డ నిర్ణయాలు మొదటిది ఇండియన్ ఫిషరీస్ ఆక్ట్ 1897, రెండవది రెండు వందల నాటికల్ మైళ్ళ వరకు సముద్ర తలాన్ని ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలం (ఇ.ఇ.జిడ్)గా ఉద్ఘాటించడం. మొదటి చట్టం ప్రకారం, రాష్ట్రాలకు చేపల వనరులు, పెంపకం, నిర్వహణ, అభివృద్ధి మొదలైన బాధ్యతలను అప్పగించినారు. రెండవ చట్టంవల్ల భారతదేశ జలాలలో నజీవ (చేపలు) నిర్జీవ (ఖనిజ, తైలాలు) వనరుల అన్వేషణకు, ఉపయోగానికి, సంరక్షణకు, నిర్వహణకు అవకాశం కల్పిస్తున్నది. అందువల్ల చేపల పెంపకానికి అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున చేపట్టే పరిస్థితులు మెరుగయినాయి. విభిన్న సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులవల్ల చేపల పెంపకం మొదలయినట్లు దాని చరిత్ర చెబుతుంది. ముఖ్యమైన భాగంగా ప్రజల ఆహారానికి గాను చేపలను కుంటల్లో పెంచడంవల్ల భారత్, చైనా శ్రద్ధ వహించాయి. భారత దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో భూమిని సేద్య యోగ్యంగా చేయడానికి నేలమట్టాన్ని పెంచడంవల్ల ఉప్పుకయ్యలేర్పడి, వాటిలో చేపల పెంపకం ప్రారంభమయింది.

థాయిలెండ్ లో ఉప్పు గుంటల ఉపయోగంలో భాగంగా ఉప్పుకయ్య చేపల సంవర్ధనం మొదలుకాగా, ఇండోనేషియాలో ఇతర వృత్తులను నిషేధించిన నిందితులతో ప్రధానంగా చేపల పెంపకం ప్రారంభమయినది. యూరప్ లో ముఖ్యంగా మతాచార్యుల ఆసక్తివల్ల, ఆఫ్రికా జాతీయుల పోషకాహారాభివృద్ధికి అక్కడి పలస ప్రభుత్వం చేపలు పెంచడంవల్ల ఆయా దేశాలలో చేపల పెంపకం మొదలయింది. ఈ శతాబ్దారంభంలో కేవలం నేటాడడానికి ఉత్తర అమెరికాలో చేపల పెంపకం ఆరంభమయింది.

సామాజిక ఆర్థిక విభేదాలు ఏమైనప్పటికీ వివిధ దేశాలలో ఏ విధంగా వృద్ధి చెందినప్పటికీ, ప్రస్తుత కాలంలో చేపల పెంపకం సాహసంతో కూడిన లాభసాటి వ్యవస్థగా రూపొందుతున్నది. భారతీయ సమాజంలోని విభిన్న వర్గాలనుండి చేపల పెంపకాన్ని ప్రధాన వృత్తిగానో లేదా ఉపవృత్తిగానో స్వీకరించే ఒక కొత్త 'చేపలకారి' సమాజం వెలువడుతున్నది. పల్లపు ప్రాంతాలు చేపకుంటలుగాను, ఎందుకూ వనికిరాని తీరప్రాంతాల బీళ్ళు రొయ్యల పెంపకం కేంద్రకాలుగాను, అతివేగంగా మార్పు చెందుతున్నాయి.

4.5 బంధీకృత, సంవర్ధిత చేపల పెంపకము

చేపల పెంపకం రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది-బంధీకృత పెంపకం, సంవర్ధిత పెంపకం.

సముద్రాలలో, నదులలో, నదీ ముఖాలలో, పెద్ద సరస్సులలో, చెరువులలో చేపల లేదా జల జంతువుల బంధీకృత పెంపకం జరుగుతుంది. వీటి బీజాన్ని నిలువ చేయరు. సహజంగా వీటి జాతులు కొత్తగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. పెరిగినవి పెరిగినట్టుగా పూర్తి వినియోగం జరుగుతుంది.

సంవర్ధిత పెంపకంలో బీజం నిలువ ఉంటుంది. బంధితమైన నీళ్ళలో దీని పోషణ, పెంపకం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వృద్ధిచెందిన చేప పంట నేకరణ జరుగుతుంది. ఒక నీటి వైశాల్య ప్రమాణంలో సంవర్ధిత పెంపకం ద్వారా తగినంత దిగుబడిని రాబట్టడమే ఈ పెంపకం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. సంవర్ధిత పెంపకం కుంటల్లో, చిన్న చెరువుల్లో లేదా వేరే బంధిత నీటిలో జరుపవచ్చు. సంవర్ధనం చెందే నీటిలో ఎరువులు, అదనంగా ఆహారం సరఫరా చేయాలి.

బంధీకృత పెంపకంవల్ల దిగుబడి వడిపోతుంది. కారణం మాటిమాటికి చేపలను పట్టడమే. అతిగా చేపలు పట్టడంవల్ల వాటి నిలువలు తగ్గుతాయి. వివిధ ఆవరణ కారకాలవల్ల, కాలుష్యంవల్ల పంట పొచ్చు తగ్గులను సూచిస్తుంది. ఈ పెంపకానికి పెట్టుబడి ఎక్కువ, కృషి విపరీతం, ఖర్చు ఎక్కువ.

ఈ ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి, ఉత్పత్తిని పెంచడానికి సంవర్ధిత పెంపకానికి గణనీయమైన శ్రద్ధ ఇవ్వడమవుతున్నది. ఈ విధంగా పెంచడానికి పెట్టుబడి ధనం తక్కువ, సులభమైన సంవర్ధన పద్ధతులవల్ల దీన్ని కులీర పరిశ్రమగా పెట్టి విస్తరించే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

సంవర్ధిత చేపల పెంపకాన్ని, మంచి నీటిలోను, ఉష్ణకయ్యలోను, సముద్రజలాలలోను చేపడతారు. ఈ విధానంలో పెరిగే జంతువులలో అత్యధికంగా చేపలు ఉంటాయి. నవీన సంవర్ధన పద్ధతులవల్ల, దాని విస్తరణ, అభివృద్ధిపల్ల తీరప్రాంతాల సముద్రజలాలలో ఎన్నో రకాల జలజంతువులైన రొయ్యలు, మలస్కాజీవులు, సముద్రం మొక్కలు, ఇతర శైవలాలు ఇవన్నీ కూడా సంవర్ధిత పెంపకం పరిధిలోనికి చేరినాయి. ఈ విధంగా రకరకాల జలజంతువులను పెంచడానికి గుర్తింపుగా సంవర్ధిత పెంపకం అని పిలువడానికి బదులుగా ఇటీవల ఇంకా విస్తృతపరచిన పేరు “జలజంతు సంవర్ధనం” అని పెట్టినారు.

4.6 జల జంతు సంవర్ధనము

నీటిలో నివసించే జంతువుల పెంపకాన్ని జలజంతు సంవర్ధనం అంటారు. జలజంతువుల పంటను సేకరించడానికి ముందు కనీసం ఒక దశలో వాటి ఉత్పత్తిని నియంత్రించడం జరుగుతుంది. అందువల్ల దిగుబడి అధికమవుతుంది.

జలజంతు సంవర్ధనం ఆయా మాధ్యమాన్ని అనుసరించి మంచి నీటి జలజంతు సంవర్ధనం అనీ, ‘తీరజలజంతు సంవర్ధనం’ అనీ, ‘సముద్ర జలజంతు సంవర్ధనం’ మనీ పిలుస్తారు. జలజంతు సంవర్ధనం బహుముఖంగా జరుగుతుంది. అహారోత్పాదనకు జలజంతువుల పెంపకం, సహజమైన జాతులను మెరుగుపరచి పెంపొందించడం, వేటాడే చేపల సంవర్ధనం, అందమైన చేపల పెంపకం, పరిశ్రమకు సంబంధించిన ముత్యపు ఆల్బిప్పల, ఇతర జంతువుల సంవర్ధనంతోపాటు సేంద్రియ విసర్జక పదార్థాల పరిశ్రమణ, వ్యవస్థల నిర్వహణ మొదలైన అంశాలన్నీ జలజంతు సంవర్ధనంలో చేరినట్టివి.

జలజంతు సంవర్ధనం సామాన్యంగా నాలుగు విధాలుగా జరుగుతుంది. మొదటివిధం: పోచరీలలో చేపబీజాన్ని పెంచి సముద్రాలలో, సరస్సులలో, జలాశయాలలో వదలడం ఇందువల్ల సహజ నిలువలకు అదనంగా చేర్చడం వాణిజ్యపరంగా వృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రాలలోను కెనడాలోను సాల్మన్, కాడ్, ఫింగర్ లింగ్ లను అత్యధికంగా పెంచి సముద్రంలోకి వదులుతారు. కార్ప్, ఫింగర్ లింగ్ చేపల నిలువలను సరస్సులలో నియంత్రించడం వల్ల చేపల పంట వృద్ధి చెందింది. ఈ పద్ధతి భారత, రష్యా దేశాలలో ఆచరణలో ఉంది.

సహజ వనరుల నుండి యుక్తమైన జలజంతువులను సేకరించి బంధిత జలాలలో సంవర్ధనం చేయడం రెండో పద్ధతి. ఎరువులు ప్లవక జీవులకు, ఆహారం వీటికి సరఫరా చేస్తారు. ఉష్ణకయ్య చేపలు, రొయ్యలు, ఆల్బిప్పలు, మలస్కా జీవులు ఈ విధంగా భారతదేశంలో ప్రస్తుతం పెరుగుతున్నాయి. మూడవ పద్ధతి ప్రకారం ఆటవిక జనకాలనుండి సేకరించిన గుడ్లలో నుండి పుట్టిన పిల్ల జంతువులను పోషించి, వాణిజ్యపరంగా కావలసిన పరిమాణాన్ని చేరే వరకు పెంచుతారు. జపాన్ దేశీయులు జరిపే పిల్లరొయ్యల (షింప్) సంవర్ధనం దీనికి మంచి ఉదాహరణ.

చివరది అతిక్లిష్టమైన జలజంతు సంవర్ధనం పద్ధతి. నియంత్రిత పరిస్థితులలో జనకాల, గుడ్ల నిల్వల నిర్వహణ, పిల్లజీవుల ఉత్పాదన, సేకరించే పరిమాణాన్ని చేరేవరకు పిల్లజీవుల పోషణ, సంరక్షణ వగైరా జరుగుతాయి. ఇదే పద్ధతిలో మంచి నీటి కుంటల్లో పెద్ద కార్ప్ చేపల సంవర్ధనం భారతదేశంలో విస్తృతంగా జరుగుతుంది.

4.7 ప్రస్తుత పరిస్థితి

ఆహార అవసరాలకు తగినంత జాంతవ ప్రోటీన్ పదార్థాలు చేపలలో, రొయ్యలలో లభ్యమవుతాయి. చేపలో ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలతో ఉండే ప్రోటీన్ 15-25%, ఖనిజాలు 1-2% ఉంటాయి. విటమిన్లు ఎ, డి, బి సంక్లిష్టం కూడా చేప మాంసంలో ఉంటాయి. అత్యధికంగా క్షీర్ణమయ్యే గుణం కలిగి, పెరుగుదలకు తోడ్పడేవిగా, జీవనంబంధ రీతిగా విలువైనవి చేప ప్రోటీన్లు కాబట్టి మానవ పోషక ఆహారంలో వాటిని అగ్రస్థానం. రొయ్యలలో 17.8%, మలస్కా జీవులలో 14 %

ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. సుమారు 56% భారతీయులు చేపలను తింటారు. కాని చేపల తలసరి వినియోగం చాలా తక్కువ. సంవత్సరానికి తలసరి అవసరం దాదాపు 11 కి.గ్రా అంచనా కాగా అది కేవలం 4.13 కి.గ్రాములే అవుతున్నది.

ఇటీవల ఒక అంచనా ప్రకారం జలజంతు సంవర్ధనంవల్ల ప్రపంచంలో మొత్తం 5 మిలియన్ టన్నుల ఆహారోత్పత్తిని సూచిస్తే అందులో 3.7 మిలియన్ టన్నులు చేపల ఉత్పత్తి ఉంది. ప్రస్తుత జలజంతు సంవర్ధనం చాలా దేశాల ఆహారం, పోషక పదార్థాల ఉత్పత్తిలో ప్రధానపాత్ర వహిస్తున్నది. ఉదాహరణకు చైనాలో 40% ఆహారం చేపలు, రొయ్యలు సంవర్ధితమైనవి కాగా భారత దేశంలో 38% మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో ఇండోనేషియాలో దీని శాతం 22. ప్రపంచంలో జలజంతు సంవర్ధనానికి లభ్యమయ్యే విస్తీర్ణాన్ని దృష్టిలో నుంచుకొని అభివృద్ధి చేసినట్లయితే ఈ ప్రక్రియలో ఉత్పత్తిని 20-25 మిలియన్ టన్నులు సంవత్సరానికి పెంచవచ్చునని సూచితమయింది.

ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం 2000 క్రీ. అ. సంవత్సరం నాటికి, పెరిగే ప్రపంచ జనాభాకు, ప్రస్తుత వినియోగం రేటు ప్రకారం చూసినా, 100 మిలియన్ టన్నుల చేపలు అవసరమవుతాయి. ఏ కారణం చేతనో ప్రపంచంలో చేపల ఉత్పత్తి మాత్రం దాదాపు 75 మిలియన్ టన్నులమేరకు స్థిరంగా నిలిచి ఉంది. ఆటవిక నిలువలను బంధింపుతంగా తెచ్చి పెంచినా అవి అవసరాన్ని ఆదుకోలేవని విశ్వసిస్తున్నారు. అందువల్ల వాణిజ్యపరంగా లభించే బంధింపుత సంవర్ధిత చేపలకు సంపూర్ణంగా ఉండడానికి జలజంతు సంవర్ధనం తప్పనిసరి అనే భావం చోటుచేసుకొంటున్నది.

జలజంతు సంవర్ధనానికి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. ఈ ప్రక్రియను జాతీయావసరాలు తీరడానికి, స్థానిక వినియోగానికి, విగుమతికి అభివృద్ధిచేసి నిర్వహించుకోవచ్చు. జాతీయ సరిహద్దులలోని మంచి నీటిలో, నదీ ముఖాలలో, తీరప్రాంతాలలో పెంచవచ్చు. సంవర్ధిత చేపల పెంపకంలో పొక్కులు, యాజమాన్యం గురించి జరిగే అంతర్జాతీయ తగాదాలు అతితక్కువ.

కాలానికి కట్టుబడకుండా, గిరాకీనిబట్టి తగుపరిమాణంలో పెంచి, మార్కెట్ ధరలను స్థిరస్థాయిలో నుంచడానికి జలజంతు సంవర్ధన కార్యక్రమం నిర్ణీత పద్ధతిలో ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది.

జలజంతు సంవర్ధనం వేగంగా సాంకేతికంగా వృద్ధి చెందుతున్నది. సాంకేతికంగా కొత్తప్రక్రియలు చోటు చేసుకొన్నందువల్ల దీన్ని "మూడు ప్రమాణాల సంవర్ధనం" అని వివరిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఉత్పాదన కొరకు పూర్తి జలరాశిని వినియోగించడమే.

జలజంతు సంవర్ధనం గ్రామీణాభివృద్ధిలో సమగ్రభామమయింది. భారతదేశ గ్రామీణ సమాజ వికాస ప్రణాళికలో పోషకాహార కార్యక్రమాలలో చేపల పెంపకానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చినారు. గ్రామీణులకు, తీరవాసులకు ప్రముఖంగా డౌత్సాహికులకు ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు సహాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. జలజంతు సంవర్ధనం, వ్యవసాయం, పశువుల, పండుల, కోళ్ల, బాతుల పెంపకం వ్యవస్థలతో కలిసి జలధల సేద్యానికి మార్గాన్ని సుగమం చేయవచ్చు. సమగ్రమైన జలజంతు సంవర్ధనం-వ్యవసాయం-పశుసంవర్ధనం- ఈ మూడు వ్యవస్థలు వ్యవసాయదారుడికి సరళంగాను అర్థంచేసుకోవడానికి సులభంగాను ఉండి, రైతు ఆదాయాన్ని తగినంతగా పెంచడానికి దోహదం చేస్తాయి.

జలజంతు సంవర్ధనం చిన్నతరహా మొదలుకొని వాణిజ్య స్థాయివరకు చేపట్టి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించవచ్చు. సంవర్ధన పద్ధతినిబట్టి మానవశక్తి అవసరాలు మారుతూ ఉంటాయి. చేపల మిశ్రమ పెంపకం పద్ధతిగా 0.6 మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో కార్ప్ చేపలను మంచినీటిలో పెంచినట్లయితే సంవత్సరానికి పూర్తి కాలానికి పాక్షిక కాలానికి 0.43 మిలియన్ మనుషులను నియమించవచ్చు.

4.8 చేపల పెంపకానికి భారతదేశం వనరులు

మంచినీరు, ఉప్పుకయ్యలు రెండూ లోనాటి వనరులు. భారతదేశం చుట్టూ ఉండే సాగర సముద్రాలు ఉప్పునీటి వనరులు. మంచినీటి వనరులు వివిధ రకాలైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి. నదులు, ఉపనదులు, చిన్ననదులు, ఏర్లు, జలాశయాలు, నరస్సులు, కాలువలు, చెరువులు, కుంటలు వగైరా.

స్థూలంగా భారతదేశం నదులను, గంగా వ్యవస్థ, బ్రహ్మపుత్ర వ్యవస్థ, సింధు వ్యవస్థ, తూర్పుతీర ద్వీపకల్ప వ్యవస్థ, పశ్చిమ తీరవ్యవస్థ అనే పేర్లతో వర్గీకరించినారు. గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, సింధు హిమాలయ నదీ వ్యవస్థలు మంచినీటితో శాశ్వతంగా ప్రవహించేవి. మహానది, కృష్ణ, గోదావరి, కావేరి తూర్పు తీరద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థలు. నర్మద, తపతి, ఇతర చిన్న నదులతో పశ్చిమ తీరవ్యవస్థ ఏర్పడింది. తూర్పు, పశ్చిమ వ్యవస్థల నదులు పర్వాధారం. గంగానది వ్యవస్థ అన్నిటికంటే పెద్దది. మైదానాల నదీ వ్యవస్థ అక్షణంవల్ల అక్కడ వెచ్చని నీటి చేపల పెంపకం జరుగుతుంది. ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలో చల్లని నీటి చేపల పెంపకం జరుగుతుంది. మహానదులు వాటి ఉపనదులు కలుపుకొని 29,000 కి.మీ. విడివి అవుతుంది.

నదులకు ఆనకట్టలు వేసిన జలాశయాలువల్ల సుమారు 3 మిలియన్ హెక్టార్ల నీటి వైశాల్యం లభ్యమవుతున్నది.

దాదాపు 1.6 మిలియన్ హెక్టార్ల మంచినీరు చెరువులవల్ల కుంటులవల్ల చేపల సంపదనానికి దొరుకుతుంది. ఇందులో 0.6 మిలియన్ హెక్టార్లు ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉండగా 0.4 మిలియన్ హెక్టార్లు ఉపయోగానికి సిద్ధంగా ఉంది. పోగా తక్కిన నీటి విస్తీర్ణాన్ని ఉద్ధరించవలసిన అవసరం ఉంది.

భారతదేశంలోని ఉప్పుకయ్య వనరులు: నదీముఖాలు, పిల్లకాలువలు, ఉప్పుటేర్లు, భేరిలు, ఉప్పునీటి చిత్తడి నేలల, సరస్సులు. ఈ దేశంలో నీటి మొత్తం వైశాల్యం 2 మిలియన్ హెక్టార్లు. భారత్ కు చెందిన గొప్ప నదీ ముఖ్య వ్యవస్థలలో హుగ్లీ-మాత్లా పశ్చిమ బెంగాల్ లో గంగానది ముఖద్వారం, ఓరిస్సాలో మహానది ముఖం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందినవి గోదావరి, కృష్ణానదీ ముఖాలు, తమిళనాడులో కావేరి నదీ ముఖం, గుజరాత్ లో నర్మద, తపతి నదీ ముఖాలు, ఓరిస్సాలోని చిల్కా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడులో పులికట్ సరస్సులు ఉప్పుకయ్యలు.

6100 కి. మీటర్ల సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం భారతదేశానికి. 200 మీటర్లవరకు ఉండే ఖండ-షెల్ఫ్ వైశాల్యం 4,14,868 చదరపు కి. మీటర్లు ఉంటుంది. సముద్ర ఉపరితలమీది ప్రత్యేక ఆర్థిక మండల వైశాల్యం 2 మిలియన్ చదరపు కి. మీటర్లు.

4.9 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేపల పెంపకానికి వనరులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్రతీర రాష్ట్రం. ఇది దక్షిణ భారత తూర్పు తీరాన్ని తాకుతూ బంగాళా ఖాతం తూర్పు సరిహద్దుగా ఉంది. గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నానదులు పెద్దవి. ఇవి బంగాళా ఖాతంలోకి ప్రవహిస్తాయి. భారత దేశంలోని అతి పెద్ద నదులలో గోదావరి రెండవది. ఇది దక్షిణ-పూర్వ దిశలో దాదాపు 1500 కి. మీటర్లు ప్రవహిస్తుంది. పెద్దవి చిన్నవి కలిపి 114 జలాశయాలు, సరస్సులు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రముఖ జలాశయాలు: నాగార్జునసాగర్, తుంగభద్ర, శ్రీశైలం, శ్రీరామసాగర్, కోయిలసాగర్, కిన్నెరసాని, కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాలలో ఉండే కొల్లేరు సరస్సు దేశంలోని అతి పెద్దవాటిలో ఒకటి, సహజమైనది, మంచినీటిది. నదీలోయ ప్రాజెక్టులు కట్టడంవల్ల రాష్ట్రంలో నీటి సరఫరా నాణ్యత, కాలవల వ్యవస్థ మెరుగయింది.

రాష్ట్రంలో శాశ్వత, వరాధార చెరువుల సంఖ్య 45,528. వీటివల్ల రాష్ట్రానికి లభ్యమవుతున్న మంచి నీటి వైశాల్యం 0.3772 మిలియన్ హెక్టార్లవి ఒక అంచనా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉప్పుకయ్య వనరులు: నదీముఖాలు, పిల్లకాలువలు, కాలువలు, చదునుగా ఉప్పు నీళ్ళు నిలచిన ప్రాంతాలు, ఉప్పునీటి చిత్తడి నేలలు. వీటి వైశాల్యం దాదాపు 0.2 మిలియన్ హెక్టార్లు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మత్స్య శాఖ జరిపిన సర్వేక్షణ ప్రకారం 64,000 హెక్టార్ల సారవంతమైన ఉప్పుకయ్య ప్రాంతం ఉంది. ఇందులో 17,000 హెక్టార్లు తీరప్రాంత జలజంతు సంపదనానికి సత్వరంగా వృద్ధి పొందించే పరిస్థితిలో ఉంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్రతీరం పొడవు 942 కి.మీ. 200 మీటర్ల లోతు గలిగిన ఖండ షెల్ఫ్ వైశాల్యం 31,094 చదరపు కి.మీ.లకు.

4.10 చేపల ఉత్పత్తి

ప్రపంచంలో 1950-76 కాలపు చేపల ఉత్పత్తి సంవత్సరానికి 21.1 మిలియన్ టన్నుల నుండి 73.5 మిలియన్ టన్నులకు చేరింది. గడచిన కొద్ది సంవత్సరాలలో దాదాపు 75 మిలియన్ టన్నుల (1982) వద్ద ప్రపంచ ఉత్పత్తి స్థిరపడింది. చేపల ఉత్పత్తి విషయంలో ప్రపంచం మీద జపాన్ ది ప్రథమ స్థానం.

1950లో భారత దేశంలో చేపల ఉత్పత్తి 0.817 మిలియన్ టన్నులుండగా ఇది 1976లో 2.4 మిలియన్ టన్నులకు పెరిగింది. చేపల పెంపకం చేసే ఇతర ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చినట్లయితే, భారతదేశం 7వ, 9వ శ్రేణికి అటుఇటుగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 8వ స్థానం. దేశం మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలోను 0.75 మిలియన్ టన్నుల భాగంలో నాటి చేపల ఉత్పత్తిదే. లోనాటి చేపల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ దేశాల్లో భారత్ ది రెండవశ్రేణి. భారతదేశంలో రొయ్యల ఉత్పత్తి 1977లో 0.232 మిలియన్ టన్నులుండేది. అయితే ఇప్పుడు అగ్రగామిగా ఉంది.

1982-83లో భారతదేశం 361.36 కోట్ల రూపాయల విలువ జేసే 78,175 టన్నుల సముద్రోత్పత్తులను ఎగుమతి చేసింది. ఈ ఉత్పత్తుల్లో శీతలీకరించిన రొయ్యలు, కప్పకాళ్ళు, లోబ్స్టర్స్ (Lobsters) తోకలు, కటల్ చేపలు, ఎండిన చేపలు చేరినాయి. ఎగుమతులన్నిటాకీ ప్రాబల్యం వహించినవి శీతలీకరించిన రొయ్యలే. 1982-83లో 55,000 టన్నుల రొయ్యల ఎగుమతి జరిగింది. మన సముద్రోత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకునే దేశాలు ప్రధానంగా జపాన్, యు.యస్.ఎ., ఫ్రాన్స్, నెదర్లాండ్, సింగపూర్, హాంగ్ కాంగ్, ఆస్ట్రేలియా, కువైట్, శ్రీలంక, మారిషస్.

1980లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం చేపల ఉత్పత్తి 0.237 మిలియన్ టన్నులు. ఇందులో సుమారు 0.116 మిలియన్ టన్నులు (48.7%) సముద్రోత్పత్తి కాగా దాదాపు 0.121 మిలియన్ టన్నులు లోనాటి ఉత్పత్తి. గడచిన అయిదు సంవత్సరాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్పత్తి దేశం మొత్తం ఉత్పత్తిలో 6.9 నుండి 10.8% వరకు ఉంది. 1977లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రొయ్యల ఉత్పత్తి 12,100 టన్నులు అయితే 1980లో మాత్రం ఇది తగ్గి 11,300 టన్నులయింది.

4.11 భారతదేశంలో జలజంతు సంవర్ధనంలో సాంకేతిక ప్రగతి

బారక్ పూర్ లోని కేంద్ర లోనాటి చేపల పెంపకం పరిశోధనా సంస్థ, కొచ్చిన్ కేంద్ర సముద్రం చేపల పెంపకం పరిశోధనా సంస్థ, బొంబాయిలోని కేంద్ర చేపల పెంపకం శిక్షణా సంస్థ (భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి), వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మత్స్య విభాగాలు - ఈ సంస్థలన్నిటిలో పరిశోధనల ఫలితంగా జలజంతు సంవర్ధన క్షేత్రంలో ఎంతగానో శాస్త్రీయాభివృద్ధి జరిగింది.

మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన ప్రక్రియలో భారతదేశం సాధించిన విజయాలు: చేప పీయూష గ్రంథి పోర్మోన్ ద్వారా పెంపుడు కార్ప్ చేపలలో ప్రేరేపిత ప్రజననం కలిగించి విశిష్టమైన చేప బీజాన్ని ఉత్పాదించడం, ఇన్ఫోర్ పోచరీ వ్యవస్థల రూపకల్పన, నిర్మాణం; పోషణ, పాలన కుంటల నిర్వహణ వద్దతులను ప్రమాణీకరించడం; ఆక్సిజన్ బంగీలో చేప బీజాన్ని సుదూరంగా రవాణా చేయడం; సాంకేతికంగా చేపల మిశ్రమ సంవర్ధనాభివృద్ధి-ఈ ప్రక్రియవల్ల భారతీయ పెద్ద కార్ప్ లు విదేశీయ కార్ప్ చేపల ఉత్పత్తి కుంటలలో సాలీనా హెక్టార్లకుంటే 10,000 కి.గ్రాములకు పెరిగింది. చేపలసంవర్ధనంతో

వ్యవసాయం, పండుల, బాతుల సమగ్రమైన పెంపకం; గాలి పీల్చే చేపల సంవర్ధనం; పరిభ్రమణ, బండికృత సంవర్ధన పద్ధతులు, మంచినీటి రొయ్యల ప్రజననం.

తీర జలజంతు సంవర్ధనం పరిశోధనలు ఇటీవలవి; ముఖ్యంగా పేర్కొనదగిన అభివృద్ధి ఉష్ణకయ్య రొయ్యల, చేపల సంవర్ధనం, సహజవనరుల నుండి రొయ్యల, చేపబీజ సంవర్ధనం; వాణిజ్య రీత్యా ముఖ్యమైన రొయ్యల గుడ్ల నియంత్రణ; రొయ్యల ఇన్సోర్ హోచరీవ్యవస్థ, ఆహార జంతువుల సంవర్ధనం రొయ్య డింభకాల పెంపకానికి మిశ్రమ ఆహారాన్ని వృద్ధిచేయడం.

సముద్ర జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలలో జరిగిన పురోభివృద్ధి; తినదగిన అయిస్టర్ల సంవర్ధనం; ఆల్పిప్పల పెంపకం; క్లామ్ల పెంపకం; ముత్యం అల్పిప్పల సంవర్ధనం; సంవర్ధిత ముత్యంల ఉత్పత్తిలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం; ఆగర్, ఆల్జీన్ ఉత్పన్నం చేసే సముద్రం మొక్కల పెంపకం.

జలజంతు సంవర్ధనానికి వివిధ జీవావరణ వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకునే రకరకాల సాంకేతిక పద్ధతులను అవలంబించడం జరుగుతున్నది. విస్తృతంగా పరిక్షించిన ఇట్టి వ్యవస్థలను దేశంలో పలుచోట్ల చేపల పెంపకం చేసే వాళ్ళు అమలులో పెడుతున్నారు.

4.12 జలజంతు సంవర్ధనాభివృద్ధికి అవశ్యకాలు

భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతీయ పరిస్థితులను అనుసరించి సంవర్ధన కార్యక్రమాలను తీవ్రతరం జేయడానికి జలజంతు సంవర్ధన పరిశోధనలు చేయవలసిన తక్షణ అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతోకూడిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వృద్ధిచేయడం, కొత్తజాతులను ప్రవేశపెట్టడం, సంవర్ధిత జీవుల నియంత్రణ ప్రజననం ద్వారా నమ్మకంగా బీజం సరఫరా, పోషకాహారం, సంకరీకరణం; రోగాల నియంత్రణ; జలజంతు సంవర్ధనానికి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ విద్య, మొదలైనవి తక్షణం శ్రద్ధ వహించవలసిన ముఖ్యఅంశాలు.

అప్యసౌకర్యాలు, ధన సహాయం తగినంతగా ఈ వృత్తిని చేపట్టిన వారికి లభించకపోవడం పెద్ద అడ్డంకి. ప్రస్తుత యాజమాన్యం పద్ధతి, సీట్ ఆధారాలను అదుపుచేసే బహుళ ప్రాతినిధ్యం, స్వల్పకాలిక లీన్ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి కొరకు కృషిచేసే ఔత్సాహికుల దారికి అడ్డుపడుతున్నాయి.

దేశంలో జలజంతు సంవర్ధనాన్ని ఫలప్రదంగా చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన విస్తరణ కార్యక్రమాల మౌలికావసరాలను తీర్చడానికి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పరచాలి. అందుకని ఈ రంగంలో సుశిక్షితులైన శాస్త్రవేత్తలను, సాంకేతిక నిపుణులను, విస్తృతపరచే బృందాన్ని నియమించడం తక్షణ కర్తవ్యం. దీనికి సంబంధించిన విద్యకు, క్షేత్ర శిక్షణకు సౌకర్యాలను వెంపొందించాలి. ఉత్పత్తిదారుకు, వినియోగదారుకు లాభదాయకంగా ఉండే రేట్లను నిర్ణయించి, స్థిరీకరించడంతోబాటు ఉత్పత్తులను నిలువజేసే మార్కెట్ సౌకర్యాలను కూడా కల్పించాలి.

ప్రస్తుత భారతదేశ జనబాహుళ్యంలో సగానికి తినడానికి అవసరమయ్యే చేపల దాదాపు 8.5 మిలియన్ టన్నులు అని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కాగా లభ్యమవుతున్న ఉత్పత్తి సుమారు 24 మిలియన్ టన్నులు మాత్రమే. అంటే చేపల కొరత తీవ్రంగా ఉందన్నమాట. అయినప్పటికీ, జల జంతు సంవర్ధనం ద్వారా, సీటివనరులను విజ్ఞతతో ఉపయోగించడం ద్వారా భారతదేశ అవసరాలను సంపూర్ణంగా ఆదుకోవచ్చు.

స్వపరిశీలన

1. చేపలలో _____, _____, విరివిగా కలవు.
2. "అక్వా కల్చర్" అనగానేమి?
3. చేపల వనరులాభివృద్ధికి తోడ్పడే అంశాలు ఏవి?

4.13 సారాంశం

చేపలలో యొక్క మూంసకృత్తులు (ప్రోటీన్లు) ఉన్నందున, చేపల యుత్పత్తి యొక్క ప్రాముఖ్యము ఈ భాగంలో వివరించబడినది. చేపల పుట్టుపూర్వోత్పరాలు కూడ ఇందు విశదీకరింపబడినవి. బంధీకృత చేపల వివరములు రకములను గూర్చి కూడా ఇక్కడ వివరించబడినది. భారతదేశములోను, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనుగల చేపల వివరములను గురించి విశదీకరించబడినది. ప్రపంచములోను, భారతదేశములోను, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను సాలువాత చేపల యుత్పత్తిని గురించి కూడ ఇందు పొందుపరచబడినది.

4.14 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. విటమినులు, మూంసకృత్తులు
2. "అక్వాకల్చర్" అనగా పీటిలో పెరుగు వివిధ రకముల జంతు జాలములను గురించి తెలుసుకొనుట.
3. చేపల వనరులభివృద్ధికి, చాకదారు సామగ్రి, కొత్త, మేలురకపు, చేపవంగడాలు, వాటి ఆహారపదార్థముల లభి, కొత్త సంకర జాతి చేప పిల్లలు మొదలైనవి చాలా అవసరము.

4.15 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయుము.

1. చేపల పెంపకంలో అనాదిగా భారతీయులపాత్ర
2. జలజంతు సంవర్ధనం ప్రస్తుతస్థితి
3. భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో చేపల వనరులు

II. 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయుము.

1. చేపల పెంపకం నిర్వహించే పాత్ర
2. బంధీకృత, సంవర్ధిత చేపల పెంపకం.
3. భారతదేశంలో చేపల ఉత్పత్తి
4. మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
5. జలజంతు సంవర్ధనాభివృద్ధి ఆవశ్యకాలు

భాగం-5 పెంపకానికి చేపల, రొయ్యల జాతుల ఎంపిక, వాటి వర్గీకరణ, గుర్తింపు లక్షణాలు

విషయసూచిక

- 5.1 ఉద్దేశ్యం
- 5.2 ఉపోద్ఘాతం
- 5.3 పెంపకానికి జాతుల ఎంపిక
- 5.4 జీవశాస్త్ర ప్రమాణాలు
- 5.5 ఆర్థిక ప్రమాణాలు
- 5.6 పెంచదగిన చేపల వర్గీకరణ
- 5.7 పెంచదగిన రొయ్యల వర్గీకరణ
- 5.8 పెంపకానికి తగిన ముఖ్యమైన రొయ్యల లక్షణాలు
- 5.9 సారాంశం
- 5.10 వ్యవస్థీకరణ - జవాబులు
- 5.11 మూడిరి పరీక్షాప్రశ్నలు

5.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగం పెంచడానికి తగినట్టి చేపలకు, రొయ్యలకు ఉండవలసిన మౌలిక లక్షణాలను గూర్చి, వాటి వర్గీకరణ, గుర్తించే లక్షణాలను గూర్చి వివరించడం జరిగింది.

5.2 ఉపోద్ఘాతం

జాతులను పెంపొందించే ఎంపికకు స్థూలంగా రెండు ప్రమాణాలు : జీవశాస్త్రానికి అర్థశాస్త్రానికి చెందినట్టివి.

పెంపకానికి తగిన జాతుల ఎంపికకు జీవశాస్త్ర ప్రమాణం

పెంపకానికి తగిన జాతుల ఎంపికకు అర్థశాస్త్ర ప్రమాణం

పెంపకానికి తగిన చేపల, రొయ్యల వర్గీకరణ

ఆహారానికి పెంపుదల చేసే ముఖ్యమైన 24 రకాల చేపలు.

పెంపకానికి తగినవిగా గుర్తించిన రొయ్యల 8 జాతులు

పెంపకానికి తగిన చేపలను రొయ్యలను ఆనవాలు పట్టే లక్షణాలు.

5.3 పెంపకానికి జాతుల ఎంపిక

చేపల పెంపకంలో ముఖ్య ఉద్దేశ్యం చేపలను, రొయ్యలను గరిష్ట స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడమే. చేపలవి, రొయ్యలవి ఎన్నో జాతులు ఉన్నా, కొద్ది జాతులు మాత్రమే మంచి నీటిలోను, ఉష్ణోగ్రతలోను

సంవర్ధనం చెందుతాయి. పెంచడానికి తొందరగా వృద్ధిచెందే వరభక్షకులు కాకుండా, నీటిలో దొరికే సహజ వనరులను ఆహారంగా మార్చుకునే సామర్థ్యం ఉండే, జాతులను ఎంపిక చేసుకుంటారు. అటు ఉత్పత్తిరీత్యా ఇటు అర్థికపరంగా ఇవి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అందుచేత అన్ని విధాలా తగిన జాతులకు ఎంపిక చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. బంధిత జలాశయంలో పెంచేటప్పుడు జాతుల ఎంపిక మరి ముఖ్యం. జాతుల ఎంపికలో రెండు ముఖ్యమైన ప్రమాణాలున్నాయి. అవి జీవశాస్త్రీయమైనవి, అర్థికపరమైనవి.

5.4 జీవశాస్త్ర ప్రమాణాలు

1. ఎంపిక చేసుకొన్న జాతులు సమర్థవంతంగా ఆహారాన్ని వినియోగించి వేగంగా పెరిగి నిర్ణీత కాలంలో అమ్మకానికి అనువైన పరిమాణానికి చేరుకోవాలి. అందుచేత తొందరగా పెరిగే రకాలను ఎన్నుకోవలసి ఉంటుంది.

2. ఒకే తటాకంలో పెరిగే ఎంపిక చేసిన వివిధ జాతుల మధ్య పొందిక ఉండవలె. అందుచేత భిన్నమైన ఆహారపు అలవాట్లతో ప్రవర్తనలతో ఉండే జాతులను ఎంపిక చేసుకోవడం వల్ల వివిధ జాతుల మధ్య ఏర్పడే తీవ్రమైన పోటీని నివారించవచ్చు.

3. ఎంపిక చేసుకొన్న జాతులు అస్థిర వాతావరణ పరిస్థితులను - అంటే ఆక్సిజన్ పరిమాణాలు, పి. హెచ్, ఉష్ణోగ్రత, బురద మొదలైన వాటి హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని దృఢంగా ఉండవలె. తాత్కాలికంగా సంభవించే మురికినీటి పరిస్థితులను, రవాణాలో కలిగే కష్టాలను అవి ఎదుర్కొని జీవించే యోగ్యంగా ఉండవలె.

4. వివిధ రకాల వ్యాధులకు ప్రతిరోధకాలుగా ఉండేవి.

5. వరభక్షకాలు కానివి.

6. గరిష్ఠ జీవన స్థాయి ఎక్కువ శాతంలో ఉండేవి.

7. ఆహారాన్ని ఉన్నతంగా మార్చుకునే శక్తి కలిగినవి.

8. ఎంపిక చేసుకొన్న జాతుల బీజాలు సమృద్ధిగా లభించేవిగా ఉండాలి,

9. అదనంగా లేదా కృత్రిమంగా ఇచ్చే ఆహారాన్ని స్వీకరించేవి.

10. ఇవి ప్రేరేపిత ప్రజననం ద్వారా సంతానోత్పత్తి చేసే సామర్థ్యంతో ఉండాలి.

5.5 అర్థిక ప్రమాణాలు

1. ఎంపిక చేసిన జాతులకు అంగడిలో మంచి గిరాకీ ఉండవలె.

2. వినియోగదారుకు నచ్చేవిగా ఉండవలె.

3. కాలానుగుణ్యంగా, ప్రాంతీయ అభిరుచులకు అనువుగా ఉండవలె.

5.6 పెంచదగిన చేపల వర్గీకరణ

విభాగము : ఆస్టిక్స్
ఉపవిభాగము : ఎక్టినోప్టెరిజై

క్రమము : గోనోరిస్కీ ఫార్మిన్
ఉపక్రమము : చానాయిడియా
కుటుంబము : చానైడి

1. చానాన్ చానాన్ (ఫోర్స్ కాల్)
(పాపచేప)
సముద్ర, నదీ ముఖ నివాసి

క్రమం : నైప్రివి ఫార్మిన్
ఉపక్రమం : నైప్రినాయిడియా
కుటుంబం : నైప్రినైడి

మంచి నీటి చేపలు

2. సిరినా మిగాలా (హోమిల్టన్) (మిగాల్)
3. కట్ల కట్ల (హోమిల్టన్) (కట్ల)
4. టినోఫారింగోడాన్ బడెలన్ (వెల్స్పి వెనన్) (గడ్డి కాల్)
5. నైప్రిన్ క్యాయో (వార్ కమ్యునిన్) (సామాన్య కాల్)
6. వైపావైల్మిక్సిన్ మొల్టిక్స్ (వెల్స్పియెనన్) (వెండి కాల్)
7. లేబియా కాల్ బసు (హోమిల్టన్) (కాలాబన్ లేదా కల్లవ)
8. లేబియా రోహిట (హోమిల్టన్) (రోహి)
9. అయాక్స్ టాక్స్ (హోమిల్టన్) (మహాసీర్)

క్రమం : నైల్బ్యరిఫార్మిన్
కుటుంబం : నైల్బ్యరైడి

10. వాలాగో అట్టు (షీడర్) (మంచి నీటి సార చేప)

కుటుంబం : సాక్సోబ్రాన్కెడ్
(హిటెరాన్యూస్టైడి)

మంచి నీటి చేపలు

11. హిటెరాన్యూస్టైన్ ఫాసిలిన్ (బ్లాక్) (పిల్లి చేప లేదా సింఘి)

కుటుంబం : క్లారైడి

మంచి నీటి చేపలు

12. క్లారియన్ బ్రాకన్ (లినియన్) (పిల్లి చేప లేదా మాగుర్)

క్రమం : చన్సిఫార్మిన్
కుటుంబం : చన్సైడి

మంచి నీటి చేపలు

13. చన్న మారులియా (హోమిట్టన్) (వెర్బుడైన పాముతల మరెల్)
14. చన్న వన్నేటా (బ్లాచ్) (వచ్చు పాము తల మరెల్)
15. చన్న స్త్రయాట (బ్లాచ్) (చారల పాముతల మరెల్)

క్రమం : ముగిలిఫార్మిన్
కుటుంబం : ముగిలైడి

ఉష్ణకయ్య చేపలు

16. ఎట్రోప్లన్ సురెస్సిన్ (బ్లాచ్) (ముత్యం మరక)
17. ముగిల్ సిఫాన్ (లినియన్) (బూడిద ముల్లెట్) సముద్రం చేప; ఉష్ణకయ్యలోకి నదులలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
18. ముగిల్ కోర్బల్స్ (హోమిట్టన్) (మంచి నీటి బూడిద ముల్లెట్) మంచి నీటి చేప; నదీముఖాలలోకి, ఉష్ణకయ్య లలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
19. ముగిల్ దుస్సుమియరి (వెలస్పియెనస్) (బూడిద ముల్లెట్ లేదా పార్సే) సముద్రం చేప, నదీముఖ ద్వారాల నీటి నుండి మంచి నీటికి ప్రవాసము.
20. ముగిల్ టుడ్ (ఫోర్స్కాల్) (పచ్చనలుపు ముల్లెట్) సముద్రం చేప; నదీ ముఖాలలోకి ఉష్ణకయ్య లలోకి ప్రవేశం.

క్రమం : వెర్బుఫార్మిన్
కుటుంబం : నెట్ట్రోహోమైడి

21. లాటెన్కాల్కా థెర్ (బ్లాచ్). (కాకన్ లేదా భట్టి) సముద్రం చేప; మంచి నీటిలో ప్రవేశం

కుటుంబం : సిక్టైయిడి


22. టేలేషియా మొస్పాంబికా (పీటర్స్) (టేలే పియా, అమెరికా కోటు) మంచి నీటి చేప; నదీ ముఖాలలో తటస్థప డుతుంది.

కుటుంబం : అనబాన్టైయిడి

23. అనాబన్ టెస్టుడినియన్ (బ్లాచ్) (ఎక్కి వెర్బ్ లేదా కోయి)


కుటుంబం : ఆన్ఫ్రోనెమైడి

24. ఆన్ఫ్రోనెమన్ గొరామి (లానెపెడ్) (గొరామి)




పటం 5.1. పాలచేప [వానాన్ వానాన్]

1. వానాన్ వానాన్ (పాలచేప) : ప్రాక్ దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతపు ఉష్ణకయ్యలలో సామాన్యంగా నివసించే జాతులకు చెందినది పాలచేప. కుదించిన దేహం, సుందర ఆకృతి, చిన్నచిన్న పొలుసులు, దంతాలులేని చిన్ననోరు, శ్రోణీవాజాలమందు ఉండే ఏకైక పుష్పవాజం, అసమాన లంబికలతో ఉండే ఎత్తైన పుచ్చవాజం దీని లక్షణాలు. వెండి తళతో మెరిసే దేహకాంతి, వెనుకగా సచ్చనిరంగు, తలమీద పచ్చ, నీలవర్ణాల మిశ్రమం.



పటం 5.2. మిగాల్ [సిరినా మిగాల్]


2. సిరినా మిగాల్ [మిగాల్] : ఈ కార్ప్ చేప మామూలు ఆకృతి లేదయో రోహిటా తో పోలి ఉంటుంది. అయితే ఇది కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది. దీని నోరు వెడల్పాటిది, పెదవులు పలుచనవి. దీని చిన్నతల మొండిగాఉండే ముట్టెతో, కిందుగా తెరచుకొనే నోటితో, అంచులేని పెదవులతో ఉంటుంది. పుష్పపార్శ్వాలు ఉదర పార్శ్వాలు కంటే కొంచెం ఎక్కువ కుంభాకారంగా ఉంటాయి. త్రోటికి చిన్న బార్బెల్స్ జత ఒకటుంటుంది. పుచ్చియవాజం వాడిగా చీలి ఉంటుంది. పుష్పవాజం ముట్టెకు దగ్గరగా ఉంటుంది. పుష్పభాగం రంగు ముదురు వర్ణంగాను, ఒక్కొక్కప్పుడు రాగిరంగు మిశ్రమంగాను దేహకాంతి వెండి మెరుపుగాను ఉంటుంది. ఉరో, ఉదర, పాయువాజాల రంగు నారింజతో కొద్దిగా నలుపు మిశ్రితం, నడులలో తటాకాలలో ఇవి ఉంటాయి.



పటం 5.3. కల్ల [కల్ల కల్ల]


3. కల్ల కల్ల [కల్ల] : వెడల్పాటి శరీరం, లోతుముట్టె, కొద్దిగా అణగిన దేహం, వెడల్పుగా ఉండే పెదవులకు అంచు, బార్బెల్స్ ఉండవు. పలుచని చర్మం కింది పెదవిని కప్పజూ అవిచ్ఛిన్నంగా అడ్డంగా మడతలాగా విస్తరించడంవల్ల రెండు పెదవులున్నట్లుగా బయటకే కనిపిస్తుంది. పుష్ప పార్శ్వాలు ఉదర పార్శ్వాలు కంటే ఎక్కువ కుంభాకారంగా ఉంటాయి. పుష్పవాజానికి అస్థిరేఖలుండవు. వాజాలన్నీ పాడవాటివి. పుష్ప శరీరం బూడిదరంగుతో, పార్శ్వాల్లో వెండితళతో ఉంటాయి. వాజాలు అప్పడవు.

నేల్లగాను పొలసుల మధ్యభాగం గులాబి లేదా రాగిరంగుగాను, ఉదర ప్రాంతం పొలుసులు తెల్లగాను ఉంటాయి. ఇవి నదులలో ఉంటాయి.




పటం 5.4. గడ్డికార్ప్ [ట్రోఫారింగోడాన్ ఐడెల్స్]

4. ట్రోఫారింగోడాన్ ఐడెల్స్ [గడ్డికార్ప్] : కొద్దిగా కుదించిన శరీరంసాగి ఉంటుంది. చిన్నగా గుండ్రంగా ఉండే ముట్టెతో దీని తల వెడల్పాటిది పైదవడ, కింది దవడకంటే కొంచెం పొడవుగా, బార్బెల్లు లేకుండా ఉంటుంది. పదిరేఖలతో కూడిన చిన్న పుష్పవాజం, ఉదరవాజం, ఉదరవాజాని కంటే కొంచెంముందుగానో లేదా వ్యతిరేకంగానో ఉంటుంది. పొలుసులది ఒక మోతాదుగా ఉండే పరిమాణం. నోరు కిందుగా ఉంటుంది. ముదురు బూడిదరంగు పుష్పభాగానిది కాగా ఉదర భాగానిది వెండితెలుపు. ఈ విదేశీయ మంచినీటి చేపను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.




పటం 5.5. సామాన్య కార్ప్ [ఫ్రెస్చిస్ కార్ప్యొ]

5. ఫ్రెస్చిస్ కార్ప్యొ [సామాన్య కార్ప్] : చిన్నతలకు కిందివైపుగా బహిష్కారి గుణంతో ఉండేనోరు ఉంటుంది. రెండు జతల బార్బెల్లు ఉంటాయి. పుష్పవాజానికి మూడు అస్టీయ కంటకాలు పరాంతంలో రంపంవలె ఉంటాయి. శరీరాకారం దీర్ఘ చతురస్రము, తగుమాత్రంగా కుదించి ఉంటుంది. కీల్ లేని ఉదరము. పొలుసులకు బంగారు లేతవాయు ఉండడంవల్ల చేపది బంగారురంగు. వాజాలది గులాబివర్ణం ఎన్నోరకాల సామాన్యకార్ప్లతో మూడు రకాలు భారతదేశానికి సుపరిచితం. అవి, పొలసులకార్ప్, అద్దంకార్ప్, తోలుకార్ప్. వీటిలో పొలసుల కార్ప్ విస్తారంగా లభ్యమవగా తోలుకార్ప్ బహు అరుదు. ఇది మంచినీటి జీవి. విదేశాలనుండి మనదేశానికి తీసుకురాబడినది.




పటం 5.6. వెండికార్ప్ [ఫ్రెషాఫ్టెల్లిక్స్ మెలిట్రిక్స్]

6. హైపాథైర్మిక్స్ మొలిక్రిస్ [వెండి కార్ప్] : అకృతి దీర్ఘచతురస్రం, కొద్దిగా కుదించిన శరీరం, వెడల్పాటి ముట్టె ముందు మొండిగా, గుండ్రంగా ఉంటుంది. తల కోనుగా కొంచెం పొడుచుకుని వచ్చే కింది దవడతో, చిన్నకళ్ళతో, ఉంటుంది. పొలసులు అతిచిన్నవి. పుష్పవాజం, ముట్టెమొనకు పుచ్చీయవాజం ఆధారానికి మధ్యలో, ఉదరవాజానికంటే వెనకగా ఉంటుంది. నోరు ఉన్నతం. పాయువునుండి ఉదరమువరకు వ్యాపించిన కీల్ ఉదర భాగంవైపు ఉంటుంది. మంటిసీటిలో ఉండే ఈ చేపకూడా భారతదేశానికి విదేశాలనుండి తెచ్చినట్టిది.




పటం. 5.7. రోహా [శిబియా రోహా]

7. లేబియో రోహా (రోహా) : పొడవుగా, ఎక్కువ గుండ్రంగా ఉండే శరీరానికి చిన్నతల, చివర నోరు ఉంటుంది. వెదపులు అంచుతో లావుగా ఉంటాయి. పుష్పపార్శ్వాలు బాగా వంగి ఉంటాయి. సన్నగా, చిన్నగా ఉండే బార్బెల్స్ ఒక జత జంటి జంటికలకు ఉంటుంది. అరుదుగా త్రోటి జత ఉంటుంది. ముట్టె పుచ్చీయ ఆధారానికి మధ్యలో పుష్పవాజం ఉంటుంది. పొలసులు నల్లటి అంచుతో మధ్యన లేత పసుపు, నారింజ లేదా ఎరుపు వన్నెలతో ఉంటాయి. నీలి లేదా గోధుమ రంగు వైభాగం వాజాలు బూడిద ఎరుపు లేదా నలుపు రంగు చారలతో ఉంటాయి. మంచి నీటిలో ఉండేవి.




పటం. 5.8. మంచినీటి సొరచేప [వాలాగ్ అట్టు]

8. వాలాగ్ అట్టు (మంచి నీటి సొరచేప) : వెద్దగా ఉండే నోరు, దంతాలతో కూడిన దవడలు, పరభక్షకత్వం మొదలైన గుణాలవల్ల దీనికి “మంచినీటి సొరచేప” అనే పేరు వచ్చింది. పార్శ్వుంగా అణిగి ఉండే శరీరం, నేరుగా ఉండే వెన్ను, చాలా వెద్దతల, చిన్న మొండెం, పొడవుగా అనమతగా కోనుగా ఉండే తోక దీని ప్రముఖ లక్షణాలు. ఇది నదులలో సరస్సులలో నివసిస్తుంది.




పటం 5.9. సింఘి [హిటెరాన్యూస్ట్రస్ ఫాసిలిస్]

9. హిటెరాన్యూస్ట్రస్ ఫాసిలిస్ (పిల్లిచేప లేదా సింఘి) : వెడల్పాటి తల, పొడవాటి శరీరం, పార్శ్వాలలో అణగి ఉండడం, కంటక రహితమైన చిన్న పుష్పవాజం, నాలుగు జతల పొడవాటి బార్బెల్స్ ఉండడం దీన్ని గుర్తించే లక్షణాలు. ఇది అనుబంధ శ్వాసావయవాలకు పేరొందిన చేప. ఈ అవయవాలు మొప్పల అర నుండి తయారయి, శరీర కండరాలలో కూరుకొని, ఊపిరితిత్తుల వలె పనిచేస్తాయి. ఇది మంచినీటిలోను, నదీముఖాలలోను వుంటాయి.



పటం 5.10. మాగుర్ [క్లారియస్ బ్రాకస్]

10. క్లారియస్ బ్రాకస్ [పిల్లిచేప లేదా మాగుర్] : శరీరం మొత్తం నిడివిలో దీని తల 5.5 అంతల పరిమాణంతో ఉంటుంది. తలపైన ఉండే రెండు గుంటలలో ఒకటి కళ్ళకు వెనకగాను, మరొకటి మూపు వైపుగాను ఉంటుంది. నాలుగు జతల బార్బెల్స్ లోని జంభికలకు చెందిన జత ఉరోవాజం అధారంవరకు లేదా మధ్యవరకు సాగి ఉంటుంది. కంటకా రహితమైన పుష్పవాజం పొయువాజానికంటే పొడవుగా ఉంటుంది. పుచ్చీయవాజం స్వేచ్ఛగా గుండ్రంగా ఉంటుంది. ఎడిపోస్ వాజం లేదు. శరీరమంతటా సమానంగా గోధుమ లేదా బూడిద నలుపు రంగు విస్తరించి ఉంటుంది. ఇది ఉష్ణకయ్యలోను, మంచినీటిలోను ఉంటుంది.




పటం 5.11. పెద్ద పాముతల మర్రెల్ [చన్నమారులియా]

11. చన్న మారులియా [పెద్ద పాము తల మర్రెల్] : మర్రెల్ జాతులన్నిటి కంటే ఇది పెద్దది. శరీరం స్తూపాకారంతో ఉంటుంది. పరాంతం అణగి ఉంటుంది. ఎత్తుకు ఏడంతలు శరీరం నిడివి. కంటి అంచు వెనక వరకు దీని నోటి చిలిక విస్తరించి ఉంటుంది. దవడలపైన బహు సన్నని దంతాలుండడమే గాక సీరికా, తాలవ్య దంతాలు ఎన్నో వరసలలో అమరి ఉంటాయి. పుష్ప భాగం బూడిద వర్ణంతో ఉదర భాగం నారింజ రంగుతో ఉంటుంది. ఫార్వరేఖవై నల్లటి పట్టీలు, శరీర పరాంత భాగం మీద, పుష్ప, పొయు, పుచ్చీయ వాజాలపైన తెల్లటి మచ్చలుంటాయి. దీని నివాసము నదులు, ఏరులు జలాశయాలు, తలాకాలు మొదలైనవి.




పటం 5.12. పచ్చపాము తల మర్రెల్ [చన్న పట్టేటా]

12. చన్న పట్టేటా [పచ్చపాము తల మర్రెల్] : శరీరం స్తూపాకారం తల అణిగి వుంటుంది. తోతుకంటే 5 నుండి 7 అంతలు నిడివి. కింది దవడ పొడవెక్కువ జంభిక కంటి అంటు వెనక వరకు విస్తరిస్తుంది. శంకువు ఆకారంతో ఉండే పళ్ళు దవడలపైన తాలవ్యాప్తిపైన ఉంటాయి. ఇవి రంగుల తేడాతో ఉంటాయి. సామాన్యంగా నలుపు గోధుమ రంగువైన, పసుపు కింద, ధూమ్రవర్ణంతో కూడా ఉండవచ్చు. నలుపు మచ్చలతో కూడా ఒక రకం వుంది. నిలకడగా వుండే మంచినీటి తటాకాలలో వుంటుంది.




పటం 5.13. చారల పాము తల మర్రెల్ [చన్న స్త్రీయాట]

13. చన్నస్త్రీయాట [చారల పాము తల మర్రెల్] : శరీరం స్తూపాకారంతో పరాంతాన అణిగి ఉంటుంది. కుదించిన తల పెద్దగా ఉండే కింది దవడ, కంటి అంచు వెనక వరకు అవనమంగా విస్తరించిన నోటి చీలిక దీని ప్రముఖ లక్షణాలు. దవడలమీద తాలవ్యాప్తి మీద దంతాలుంటాయి. ఎత్తుకంటే 6-8 అంతలు ఎక్కువ పొడవుగా ఉంటుంది. పార్శ్వరేఖ వైన ముదురు బూడిద రంగు పచ్చని చాయతో లేదా లేత ఆకుపచ్చ రంగుతో ఉంటుంది. పార్శ్వరేఖ కింద నిలువుగా ఉండే నల్లని చారలు సమాంతరంగా అమరి నలుపు రంగుకు హద్దును ఏర్పరుస్తాయి. చారల మధ్యన తెల్లటి రంగు ఉంటుంది. పుష్ప, పాయు వాజాల రంగు శరీరానికంటే కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది. వాజరేఖల మధ్య నల్లని మచ్చలు, ఉరో ఉదర వాజాలు పాలిపోయిన రంగుతో ఉంటాయి. పుచ్చీయవాజం నల్లగా, రెండు స్పష్టమైన పాలిపోయిన రంగుతో ఉండే నిలువు చారలతో ఉంటుంది. ఇది మంచినీటి మత్స్యము, నిలకడగా ఉండే మురికి నీరు మరి ఇష్టము.



పటం 5.14. బూడిద ముల్లెట్ [ముగిల్ సిఫాలిస్]


14. ముగిల్ సిఫాలిస్ (బూడిద ముల్లెట్) : తల, శరీరం పెద్ద పాలసులతో కప్పి ఉంటుంది. రెండు పుష్ట వాజాలుంటాయి. ముట్టె గుండ్రంగా, ఉరోవాజం ఎత్తుగా ఉంటాయి. నోటిలోని పళ్ళకు గుంటలు లేవు. పాయువు, రెండవ పుష్టవాజాల వెనక చిరువాజాలుండవు. సముద్రతీర జలాలలో నివసిస్తూ నదీముఖాల ద్వారా నదులలోకి ప్రవాసిస్తాయి.



పటం 5.15. టిలేపియా [టిలేపియా మొస్పాండికా]

15. టిలేపియా మొస్పాండికా (టిలేపియా లేదా అమెరికా కోయి) కుందించిన శరీరము. పుష్ప వాజపరాంతం దగ్గర నల్లని మచ్చ ఒకటి యువజీవిలో కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రౌఢ జీవులలో అదృశ్యం కావచ్చు. ఈ చేపలో సంతానపాలన పద్ధతి ప్రత్యేక రకంగా ఉంటుంది. తన గుడ్లను, పిల్లలను నోటిలో ఉంచుకొని పెంచుతుంది. అందుచేత దీనిని నోట్లో ప్రజననం చేసే సిక్లీడ్ అని కూడా అంటారు. మాములుగా దీని రంగు నలుపు గోధుమ, ముదురుగా వచ్చి లేదా నలుపు పుష్ప భాగం మీద అయితే పుచ్చియ వాజం అంచు మాత్రం పసుపు. ఇది భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టబడిన విదేశీ చేప.


16. ఎట్రోష్టస్ సురటెన్సిస్ [ముత్యం మరక] : శరీర పార్శ్వాలలో అణిగి, చిన్నతల, పొడవాటి పుష్పవాజం, నున్నగా ఉండే ఉపరితలం, 12-16 పాయుకంటకాలు, దీని ప్రముఖ లక్షణాలు. అనుబంధ జలశ్వాసాంగాలు ఉండవు. సముద్రజాతుల రంగు ముదురు ఊదా మీద కొంచెం నలుపు రంగుతో ఉండే ఎనిమిది నిలుపు చారలు, కొంచెం తెల్లగా ఉండే మచ్చలు. కుంటలలో ఉండే వాటి రంగు



పటం 5.16. ముత్యం మరక [ఎట్రోష్టస్ సురటెన్సిస్]


లేత ఆకుపచ్చ మీద ముదురు రంగులో ఎనిమిది అడ్డ గీతలు. పార్శ్వ రేఖకు పైభాగంలో ఉండే చాల పొలుసులు మధ్యలో ముత్యం తెలుపు మచ్చ ఉంటుంది. ఉదర భాగం మీద క్రమరహితంగా ఉండేవి నల్లమచ్చలు. ఉరోవాజ మూలం కారునలుపు, తక్కిన భాగం పసుపు. ఇతర వాజాలన్నిటిది సీసవర్ణం. ఇవి ఉష్ణకయ్యకు బాగా అనుకూలనం చెందినవైనా మంచి నీటికి మచ్చిక పడతాయి.

17. అనాబస్ టెస్టుడినియస్ [ఎక్స్ పెర్స్ లేదా కోయి] : దీనికి అనుబంధ శ్వాసాంగాలు ఉంటాయి. అందుచేత వాతావరణంలోని గాలి నుండి ఆక్సిజన్ను గ్రహించి వినియోగించు కొంటుంది. వెడల్పాటి నోటితో ఉండే త్రికోణాకారం తలతో ఉండే శరీరం పక్క భాగాలలో అణిగి ఉంటుంది. దీని ఉపరికులం బయటి అంచుకు ఉండే కంటకాల సాయంతో ఇది నేల మీద గమనం చేయగలుగుతుంది. వాజాలు బాగా పెరిగినాయి. పుష్పవాజ పూర్వభాగం పెద్దగా దిరుసైన కంటకాలవలె ఉండే వాజ రేఖలతో, పరాంత భాగం మృదువాజ రేఖలతో ఉంటాయి. అచ్చం పుష్పవాజం మాదిరిగా ఉదర వాజం కూడా రెండు భాగాలుగా విభక్తమవుతుంది. గుండ్రని పుచ్చియ వాజానికి ఎన్నో వాజరేఖలు ఊతనిస్తాయి. ఉపరికుల రంధ్రాల దగ్గర ఉరోవాజాలు ఉంటాయి. దీని ఆధారం ఇరుకుగా, అగ్రం



పటం 5.17. ఎక్వెపెర్స్ [అనాబస్ టెస్టుడినియస్]

వెడల్పుగా ఉండి అర్ధవలయంగా ఉంటుంది. శ్రోణీవాజాలు ఉరోవాజాలకు దగ్గరలో మధ్యోదరంగా ఉంటాయి. కింది దవడ కొంచెం ఎక్కువ పొడవు. శరీరం మీది రంగు లేత మొదలు ముదురు ఆకుపచ్చ కాగా కిందివైపు ఆకుపచ్చ పసుపు మొదలుకొని నారింజ వరకు ఉంటుంది. పుచ్చీయవాజ వ్యంతం మీద సాధారణంగా ఒక నల్లటి మచ్చ ఉంటుంది. దీన్ని చుట్టుతూ ముదురు పసుపు వలయాలుంటాయి. ఇది మంచి నీటిలో ఉష్ణకయ్యలో నివసించే చేప.



పటం 5.18. గారామి [ఆన్ ఫ్రోనెమన్ గారామి]

18. ఆన్ ఫ్రోనెమన్ గారామి [గారామి] : దీని నిడవి ఎత్తుకంటే మూడంతలు ఎక్కువ. తలమీద నాలుగు కళ్ళు ఉంటాయి. దవడలపైన సన్నని శంకుఆకారంతో ఉండే పళ్ళ వరసలు ఎన్నో ఉంటాయి. తాలవ్య దంతాలుండవు. పుష్పవాజం పొయువాజాని కంటే చిన్నది. కంటకాయుతమైన పుష్పవాజ భాగం దాని మృదు భాగంకంటే పొడవాటిది. శ్రోణీవాజం బయటి రేఖ పొడవుగా పెరిగి పుచ్చీయవాజం వెనకకు చేరుతుంది. పై భాగం పచ్చని గోధుమ వర్ణం క్రమంగా కిందివైపు పలుచబడుతుంది. విదేశాల నుండి తెచ్చిన పెంపుడు చేప. ఇది మంచినీటిలో ఉష్ణకయ్యలో ఉంటుంది.

5.7 పెంచదగిన రొయ్యల వర్గీకరణ


వర్గము	:	ఆర్థ్రోపాడ
విభాగము	:	క్రస్టేషియా
ఉపవిభాగం	:	మలకోస్ట్రాకా
క్రమం	:	డెకాపాడ
కుటుంబం	:	పేరియమొనైడి

కుటుంబం :


పెన్నెడి

1. మాక్రో బ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గి [డిమాన్]
2. మా. మాల్కమ్సోని [మిల్నె ఎడ్యర్డ్స్]
3. నెనియన్ మొనోడాన్ [ఫ్రెబ్రిషియన్]
4. పె. ఇబ్టికన్ [మిల్నె ఎడ్యర్డ్స్]
5. పె. నెమిస్కులేటన్ [డిహాన్]
6. మెటాపెనియన్ మానోసెరాన్ [ఫ్రెబ్రిషియన్]
7. మె. బ్రెవికార్నిన్ [మిల్నె ఎడ్యర్డ్స్]
8. మె. డాబ్సోని [మయర్స్]

5.8 పెంపకానికి తగిన ముఖ్యమైన రొయ్యల లక్షణాలు




పటం. 5.19. రొయ్య-శరీర భాగాలు. 1. స్పర్శ శృంగము. 2. స్పర్శ శృంగిక. 3. ఉదర త్రోటి కంటకాలు 4. త్రోటి. 5. కమ్ము 6. పుష్పత్రోటి కంటకం. 7. స్పర్శ శృంగ కంటకం. 8. కాలేయకంటకం. 9. పుష్పకవచము 10. ఉదర ఖండితాలు 11. వాలఖండము. 12. యురోపోడ్ 13. ప్లయోపోడ్ 14. పెరియోపోడ్లు [1-3 పెరియోపోడ్ల కీలేట్లు].




పటం 5.20. పెద్ద మంచి నీటి రొయ్య [మాక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గి]

1. మాక్రాబ్రాకియమ్ రోషెన్బర్గి [పెద్ద మంచి నీటి రొయ్య]; బుధిత జలాశయంలో పెంచడానికి ఇది యోగ్యమైన జాతి. దీని త్రోటి పొడవుగా, కత్తి ఆకారంతో పైకి తిరిగి, 13-14 పువ్వు త్రోటి కంటకాలతోను, 11 ఉదర త్రోటి కంటకాలతో ఉంటుంది. మగజీవి రెండవ క్లాళ్ల జత అసాధారణంగా కీలా అనే భాగాన్ని పెంచుకొని లైంగిక ద్వితీయకతను ప్రదర్శిస్తుంది. కాళ్ళలావుగా ఉంటాయి. ఈ రొయ్య నివాసం నదులు, సరస్సులు, నదీముఖాలు, తీరప్రాంతాలు, సంతానోత్పత్తి కాలంలో ఇది నదీ ముఖాలకు ప్రవాసం పోతుంది.



పటం 5.21. మంచి నీటి రొయ్య [మాక్రాబ్రాకియమ్ మాల్కమ్సోని]


2. మాక్రాబ్రాకియమ్ మాల్కమ్సోని [మంచి నీటి రొయ్య] : త్రోటి చిన్నది. చక్కగా ఉంటుంది. దానిపై 11-12 పువ్వు కంటకాలు, 4-5 ఉదరకంటకాలుంటాయి. మగజీవి రెండోకాలు జత కీలా పెంచుకొని లైంగిక ద్వితీయకతను వ్యక్తం చేస్తుంది. క్లాళ్ల రెండో జత శరీరానికంటే పొడవైనది లావాటిది. సంతానోత్పత్తి కాలంలో ఇది నివసించే నదులనుండి నదీముఖాల వైపు ప్రవాసం చేస్తుంది.



పటం 5.22. పులి రొయ్య [పెరియస్ మొనోడాన్]


3. పెరియస్ మొనోడాన్ [పులి రొయ్య] : మృదువైన పువ్వుకవచం, బలంగా సిగ్మాయిడ్ గా వంగిన త్రోటి సూత్రము 7-8 బై 2-3. ఎబ్ రోస్ట్రల్ కారినా, గాడి ఇరుక్కుగా ఉండి, పువ్వుకవచం మీద ఉండే అది జతరకంబకం (మొదటిరకం) వెనకవరకు చేరుకోదు. పువ్వుకవచం మీద స్పష్టంగా గుర్తించగలిగే స్పర్శశృంగ, కాలేయ కంటకాలు ఉంటాయి. కాలేయ కారినా నేలబారుగా చక్కగా ఉంటుంది. కాలేయకంటకాలకు పువ్వుకవచ పరనేత్ర కోటరానికి మధ్యన ఉండే 1/3 పరాంత దూరంలో జతర నేత్ర కోటరకారినా ఉంటుంది. బాహ్యపాదాంగం 5వ పెరియా పోడ్ మీద ఉండదు. శరీరం మీద అడ్డంగా పట్టికలుంటాయి. సజీవరొయ్య రంగు సేకరించే ప్రాంతం మీద ఆధారితం. సాధారణంగా నలుపు ఎక్కువగా ఉండే ముదురు గోధుమ వర్ణం (నదీ ముఖాలు, ఉప్పునీటివి) లేదా

ఎరుపు (స్వచ్ఛమైన లోతునీటివి). స్పర్శశృంగాలు ముదురు, లేత రంగుతో ఉంటాయి. ఫ్లయోపోడ్ల రంగు-మూలభాగం మీద పసుపు పట్టికలు, స్పృటంగాను, తక్కిన భాగం గోధువర్ణం నుండి నీలివర్ణం వరకు. త్రోటిపైన పట్టికలు, ఎరుపు చాయతో ఉండే పసుపు వర్ణంతో పరాంతవాల ఖండ భాగం ఉంటుంది. మధ్య రేఖపై కలిసిన రెండు పార్శ్వ తమ్మలతోకూడి థైలైకమ్(Thelycum) ఉంటుంది.




పటం 5.23. తెల్లరొయ్య [పెనియస్ ఇన్డికస్]

4. పెనియస్ ఇన్డికస్ [తెల్ల రొయ్య]: ఈ జాతి త్రోటి పొడవులో చాలా భేదాలు ఉంటాయి. పిల్ల జీవులలో అది మృదువుగా పొడవుగా ఉండి, స్పర్శశృంగ పొలుసు అగ్రాన్ని దాటుతుంది. ప్రాథమీపులలో పొడవు తగ్గి ఆధారం లావెక్కుతుంది. దీనికి రెండు మెరికలు, 7-9/ 4-6 పళ్లు. పరత్రోటి శిఖరం అంతగా ఎదిగి ఉండక, పార్శ్వంగా ముక్కోణంగా మనకగా కనిపించే నాలికలతో ఉంటుంది. ఎడ్రోస్ట్రోల్ ఖనితం బోలుగా ఉండి మొదటి త్రోటి పంటికే (అధిజరర) చేరువగా ఉంటుంది. జరరనేత్ర కోటరకారినా సుస్పష్టంగా ఉంటుంది. శరీరంమీద పట్టికలుండవు. చెదిరిన లేత వర్ణదంతో, తెలుపు కలిసిన లేత పసుపురంగుతో శరీరం ఉంటుంది.



పటం. 5.24. కట్లరొయ్య [పెనియస్ పెమిసుల్కేటస్]

5. పెనియస్ పెమిసుల్కేటస్ [కట్లరొయ్య] : వృష్ణకవచం ఉదరం ఒకటే తీరుగా సున్నంగా ఉంటాయి. వె. మొనోడాన్తో పోల్చినట్లయితే దీని త్రోటి పొట్టిగా, తిన్నగా ఉంటుంది. త్రోటిసూత్రం 6-8 బై 1-3 మొదటి (అధిజరర) త్రోటిపన్ను వృష్ణకవచం తలంమీద మధ్య స్పష్టంగా ఉంటుంది ఎడ్రోస్ట్రోల్ కారినా అధిజరరపంటి కంటే కొంచెం ముందుకు విస్తరిస్తుంది. పరత్రోటికారినా స్పష్టమైన గాడితో ఉంటుంది. వృష్ణకవచ పూర్వ ఉపాంతానికి గ్రీవాఖనితానికి మధ్యన ఉండే 2/3 దూరంలో జరరనేత్ర కోటర కారినా ఉంటుంది. కాలేయకారినా పూర్వోదరంగా గణనీయంగా వంగి ఉంటుంది. బాహ్యపాదాంగం 5వ పెరియూపోడ్ మీద ఉంటుంది. పటాస్మా పార్శ్వతమ్మే మీద నూక్కు కంటకాలుండవు. నివాస ప్రాంతాన్ని బట్టి రంగులు వివిధాలు. కాని పచ్చ రంగు బలీయం. కట్లరంగు ఎరుపు తెలుపు లేదా లేత గోధుమ. ఇవి నలుపు కట్లతో ఏకాంతంగా ఉంటాయి. కాళ్ళ ఉదర భాగంపైపు ఎరుపు, లేదా పసుపు లేదా లేత నీలి రంగు ఉంటుంది.



పటం 5.25. మెటాపెనియన్ మానోనెరాస్

6. మెటాపెనియన్ మానోనెరాస్ : చిన్న బార్మెంటుమ్తో కప్పిన శరీరం. స్పర్శ శృంగికా వృంతాగ్రాని కంటే కొంచెం ముందుకు లేదా దానితో సమానంగా, ఇంచు మించు తిన్నగా కత్తి మాదిరిగా కనిపించే త్రోటితో ఉంటుంది. త్రోటి సూత్రం 9-12 పరత్రోటి శిఖరం పుష్ప కవచ పరాంతపు అంచువరకు అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. 2వ నుండి 6వ ఉదర భాగం పుష్ప ఫలకాలు సాధారణంగా చివరది కూడా కారినాతో ఉంటాయి. ఇవి చివరి మూడు ఫలకాలపై బలీమంగా ఉంటాయి. కారినా మధ్య పుష్పంగా ఉంటుంది. ప్రాథమిక జీవుల 5వ వెరియాపోడ్ మెరస్ సమీప భాగం బయటివైపు గంటుబడి కంటకంతో ఉంటుంది. 5వ వెరియాపోడ్ కు బూహ్యపాదాంగం లేదు. పటాస్మాకు పెద్దగా ఉండే దూరస్థలంబీకలు, వీటికి దూరస్థంగా పార్శ్వ ప్రోత్తాలు ఉండవు. లేత వర్ణదంవల్ల శరీరం గాఢమైన మచ్చలతో ఉంటుంది. శరీరం రంగులో బూడిద లేదా ఆకువచ్చ ప్రాధాన్యం వహిస్తాయి.

స్వపరిశీలన

1. _____ అను చేపను సాధారణముగా పాలబొంత అని అందురు. ఇది ఉప్పునీటికయ్యలతో బాగా పెరుగును.
2. మంచినీటి సారచేప శాస్త్రీయ నామము _____
3. మంచినీటిలో పెరుగు అతి పెద్ద రొయ్యను _____
4. ఇండియాలో పెరుగు పెద్ద నముద్ర రొయ్యను ట్రైగర్ ప్రాన్ అందురు. దీని శాస్త్రీయ నామము _____

5.9. సారాంశము

గుంటలలో పెంపకానికి ఉపయోగపడే చేపల రొయ్యల రకములను, గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. వాటి జీవ, ఆర్థిక ప్రమాణాలను గురించి ఇక్కడ విపులముగా విశదీకరించ బడినది.

పెంపకానికి ఉపయుక్తమైన చేపల, రొయ్యల వర్గీకరణ చాల వివరముగా ఇక్కడ చెప్పబడినది.

5.10. స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. ఛానస్ ఛానస్
2. వల్లాగో అట్టు

3. మాక్రో బ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గ్
4. పెనియన్ మొనోడాన్

5.11. మాదిరి పరీక్ష ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది వాటికి 30 వంతులలో సమాధానం వ్రాయుము.

1. పెంచడానికి తగిన చేపల రొయ్యల ఎంపికకు పరిగణలోకి తీసుకోవలసిన ప్రధానాంశాలు.
2. బందితజలంలో సంవర్తన యోగ్యమైన ముఖ్యమైన చేపల, రొయ్యల పేర్లజాబితా.
3. పెంపకపు చేపల రొయ్యల వర్గీకరణ వ్రాయుము.
4. క్లౌడ్, రోహ, మ్రెగాల్, పామాన్య కార్ప్, గడ్డికార్ప్, వెండికార్ప్ వీటన్నిటి గుర్తింపు లక్షణాలు.
5. పెనియన్ మొనోడాన్, పి. ఇన్డికన్, మాక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్బర్గ్. మా. మాల్కమ్సోని ముఖ్య లక్షణాలు.

II. ఈ కింది వాటికి 10 వంతులలో సమాధానం వ్రాయుము.

1. పాల చేప
2. మంచి నీటి పారచేప
3. సింఘి
4. మాగుర్
5. పెద్దపాము తల మరైల్
6. టెలేపియా
7. ముత్యం మరక
8. బూడిద ముల్లెట్
9. ఎక్స్ పెర్స్
10. గౌరామి

జంతు శాస్త్రం
మత్స్య శాస్త్రం

BRAOOU

భాగం-6 ఆహార సేకరణ పెరుగుదల, నిడివి-బరువుల సంబంధం, ముఖ్యమైన చేపల, రొయ్యల ప్రజననం అలవాట్లు

విషయసూచిక

- 6.1 ఉద్దేశ్యం
- 6.2 ఉపోద్ఘాతము
- 6.3 రోహ జీవశాస్త్రము - విస్తరణ
 - 6.3.1 ఆహార సేకరణ
 - 6.3.2 పెరుగుదల
 - 6.3.3 నిడివి - బరువుల సంబంధము
 - 6.3.4 ప్రజననం అలవాట్లు
- 6.4 ఇతర సంవర్ధిత చేపల జీవశాస్త్రం
 - 6.4.1 చనాన్ చనాన్
 - 6.4.2 చనాన్ మారులియన్
- 6.5 పులి రొయ్య - పీనియన్ మొనోడాన్
 - 6.5.1 తదితర సంవర్ధిత రొయ్యలు
 - 6.5.2 మెటాపీనియన్ మానోసెరాన్
 - 6.5.3 మాక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గి
- 6.6 సారాంశము
- 6.7 స్వపరిశీలన - నమూనా జవాబులు
- 6.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

6.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగంలో ఉండే విషయాలు ముఖ్యమైన సంవర్ధిత చేపల, రొయ్యల జీవశాస్త్ర అంశాలైన ఆహారం, ఆహార సేకరణ, నిడివి-బరువుల సంబంధం, ఇంకా ప్రజననం అలవాట్లు.

6.2 ఉపోద్ఘాతం

- రోహ (లేదయో రోహిట) చేప వయసు, పెరుగుదల, నిడివి బరువుల సంబంధం, ప్రజననం అలవాట్లు, విస్తరణ.
- ఇతర సంవర్ధిత చేప జాతుల జీవశాస్త్రం
- పులి రొయ్య (పెనియన్ మొనోడాన్) జీవశాస్త్రం.
- సంవర్ధిత రొయ్యల జీవశాస్త్రము మెటాపీనియన్ మానోసెరాన్, మాక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గి మొదలైనవి.

6.3 రోహ జీవశాస్త్రము - విస్తరణ

ఈచేప ఉత్తర భారత మైదాన ప్రాంత జలాలలో సాధారణంగా లభిస్తుంది. కాని ఇరవయ్యో శతాబ్దారంభం నుంచి విజయవంతంగా సాగిన స్థానాంతరీకరణం (Transplantation) వల్ల విస్తృతమైన కాలువల వ్యవస్థ ద్వారా ఇది ఇతర ప్రాంతాలకు సులభంగా తరలిపోయే అవకాశం ఏర్పడడంవల్ల ఇప్పుడు భారత ద్వీపకల్పమంతటా వ్యాపించింది.

6.3.1 ఆహార సేకరణ

పొదిగిన రోహచేప 5వ రోజునుండి ప్లవకాలను ఆహారంగా తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. అన్ని రకాల జంతుప్లవకాలను, డెస్మీడ్లు, కాస్మీరియమ్, క్లాస్మీరియమ్ వంటి వృక్షప్లవకాలను, ఫైటోప్లాజిలేల్లైన యూగ్లినా, వాల్యాక్సీలను, శైవలాల ప్రజాతులు వాటి సంయుక్త బీజాలను ఇవి నిర్దుష్టంగా ఎంపిక చేసుకొంటాయని పరిశీలించడం జరుగింది. 20 మి.మీ. పిల్ల రోహ ఆహారం నీటిలోని చెత్తచెదారం, నూక్కు జంతువులు, నీటి పురుగులు, బురద లేక ఇసుక. 20 మి.మీ.కన్న పెద్దవైన పిల్లరోహ ఏకకణజీవులను, తంతురూప శైవలాలను కూడా ఆహారంగా తీసుకొంటాయి. ఇవి ఆహారంకా తీసుకొనే జంతుప్లవకాలు, క్లాడ్ నెరాలు, కోపిపోడ్ జీవుల కీటకడింభకాలు. రోటిఫరలు, నాప్లియన్ డింభకాలు. క్రస్టేషియాలో స్టెక్టస్ జీవులు, రోటిఫరాలో కెరటెల్లాను ఇష్టపడి ఎక్కువగా స్వీకరిస్తాయి. ప్రాథమిక జీవులమూత్రం వృక్షప్లవకాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి.

రోహ ఉపరితల మధ్య జలాలలో ఆహారాన్ని తీసుకొన్నా తక్కిన నీటి మండలాలలో కూడా ఆహారాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది. దీని ఆస్యగ్రహణ భాగం దంతరహితమవడం వల్ల రవడ అంచులు, పెదవులు మెత్తగాను పదునుగాను ఉండడం చేత మెత్తని అంచులతో నోరు కొద్దికొద్దిగా కొరికే రకానికి చెందనదిగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మెత్తని నీటి మొక్కలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దానికి కారణం నీటిని పళ్ళతో పట్టుకోకుండా, నమలకుండా మింగవచ్చు.

యువ చేప (Juvenile) ఆహార సేకరణ అతితీవ్రంగా ఉంటుంది. ప్రాథమిక చేప ఆహార సేకరణ తీవ్రత పరిపక్వదశలోను, గుడ్లు పెట్టే సమయంలోను, తక్కువగా పరిపక్వదశకు చేరుకున్న చేపలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. గుడ్లు పెట్టిన చేపలు ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకొంటాయి. ఆహార సేకరణలోని ఈ ఎక్కువ తక్కువలు మగవాటికంటే అడవాటిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. మగ చేపలు అడచేప లకన్నా గుడ్లు పెట్టేకాలంలో ఆహార సేకరణ ఎక్కువగా చేస్తాయి. మగ చేపలు అడచేపలకన్నా, సంవత్సరం మొత్తంమీద ఆహార సేకరణ ఎక్కువగా చేస్తాయి. అయితే అడచేపలు గుడ్లు పెట్టిన తరువాత మగవాటికన్నా ఎక్కువగా చైతన్యవంతంగా ఆహారాన్ని సేవిస్తాయి.

6.3.2 పెరుగుదల

చేప వయస్సును దాని పొలుసుల ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. రోహ చేప పొలుసులపై పెరుగుదల వలయాలు, గాడుల మాదిరిగా సంవత్సరానికొకసారి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఇవి వయస్సును నిర్ధారించ దానికి పనికి వస్తాయి. సాధారణంగా రోహ చేప జీవితం మొదటి పది సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రతి సంవత్సరం 310, 500, 650, 800, 850, 890, 920, 940, 960 మి.మీ సరాసరి నిడివిని పొందుతుంది. అంటే సరాసరి పెరుగుదల రేటు వరగా 310, 220, 150, 90, 60, 50, 40, 30, 20, మి.మీ 10. సంవత్సరాలకు ఉంటుంది.

లేయోహోటా కాలానుగుణ పెరుగుదలపైన దాని ఆహార సేకరణ తీవ్రత, గుడ్లు పెట్టే చక్రం ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంతేగాక నీటి జీవావరణ లక్షణాలైన ఔరత, ఉష్ణోగ్రత మొదలైన వాటి ప్రభావం కూడా చేప పెరుగుదలపై ఉంటుంది.

6.3.3 నిడివి - బరువుల సంబంధం

ఈ చేప నిడివి బరువు సంబంధాన్ని సమీకరణంలో చూపవచ్చు:

$$\text{బరువు} = C \text{ పొడవు}^n$$

ఇందులో 'C' అనేది స్థిరాంకము, 'n' అనేది పెరుగుదల రేటు యొక్క గుణకము.

నిడివితో పోల్చినట్లయితే బరువులోని పెరుగుదల 150 మి.మీ. పొడవు వరకు అంత ఎక్కువగా వుండదు. 150-200 మి.మీ. మధ్య పెరుగుదల స్పష్టంగాను, 200 మి. మీ పైన ఇంకాబాగా పెరుగుదల చూపిస్తుంది. అడచేపలు మగవాటికన్నా 50 మి.మీ. పొడవు వరకు ఎక్కువ బరువుగా ఆ తరువాత మగచేపలు ఎక్కువ బరువుగా ఉంటాయి.

కుంట నీటిలో ఉండే జంతుప్లవకాలు, శైవలాలరకాలను బట్టి అంటే ఆహార సరఫరా నాణ్యత నుబట్టి రోహిగుడ్ల పెరుగుదల ప్రభావితమవుతుంది. నర్సరీలలోగుడ్లను నిలువవుంచినప్పుడు అవి బతికి వుండడానికి, పెరగడానికి ఎరువుల రకాన్నిబట్టి, వాటిమోతాదును బట్టి, అదనపు ఆహారాన్నిబట్టి, సాంద్రతమీద ఆధారపడి వుంటుంది. అకార్బనిక ఎరువులైన అమోనియా సల్ఫేట్, యూరియా మొదలైనవి, గుడ్లు బతకడానికి పెరగడానికి తోడ్పడతాయని తెలుసుకున్నారు.

6.3.4 ప్రజననం అలవాట్లు

లేదయో రోహిటా, ఇతర పెద్ద కార్పిల మాదిరిగా నదులలో, జలాశయాల్లో, కృత్రిమ నిర్మితాలైన బంధాల మాదిరి చెరువులలో ప్రజననం జరుపుతుంది. నైరుతి రుతుపవనాల (మాన్ సూన్) వల్ల భారీ వర్షాలు పడి నదులు పొంగి ప్రవహించే సమయంలో గుడ్లు వెట్టే నిర్ణీత నదీ ఉపాంత స్థావరంలో రోహి ఎక్కువ సంఖ్యలో గుడ్లు పెడుతుంది.

రోహిలో గుడ్లు వెట్టడం ఉదయం ప్రారంభమవుతుంది. సంయోగ సమయంలో అడమగ చేపలు చుట్టచుట్టుకొని ఉన్నందువల్ల ఒత్తిడి కలిగి గుడ్లు మిల్చే విధుదలవుతాయి. గుడ్లన్నీ ఒకే ప్రదేశంలో వెట్టదు. చేపలు ఈదుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పలుచోట్ల అండాలు విడుదలవుతాయి.

రోహిలో బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. ఫలదీకృత అండాలు జనకాల నుండి విడిపోతాయి. గుడ్లు వెట్టిన ప్రదేశంలో అసంఖ్యాకమైన అండాలు దట్టంగా కనిపిస్తాయి. తరువాత జనకాలు గమ్యం లేకుండా కొద్దికాలం ఈది తగ్గుతున్న నీటితోబాటు గృహోన్ముఖులవుతాయి. రుతు పవనాలవల్ల ఏర్పడిన వరద నీరు వల్లపు ప్రాంతాలను ముంచి చేపలకు లోతు తక్కువగా ఉండే గుడ్లు వెట్టే ప్రదేశాలను ఏర్పరుస్తుంది. గుడ్లు వెట్టడానికి చేపలను ఉత్తేజ పరచడానికి కూడా మాన్ సూన్ రుతు పవనాలవల్ల ఏర్పడే వరదలు కారణం అని, అదే ప్రాథమిక కారణం అంటారు. గుడ్లు వెట్టే ప్రదేశాలలోని నీటిఉష్ణోగ్రత 22°C నుండి 33°C శ్రేణిలో ఉంటుంది.

6.4 ఇతర సంవర్ధిత చేపల జీవ శాస్త్రం

పెద్ద కార్పిలతో బాటు సంవర్ధనానికి ఇతర జాతుల చేపలున్నాయి. కొన్ని మంచి

జలాల్లో ప్రజననం చేయదు. తీరానికి దగ్గరలో ఉండే సముద్రప్రాంతంలో గుడ్డు పెడుతుంది. 12 మి.మీ. వ్యాసంతో ఉండే గుడ్డు సీట్ వై తేలుతాయి. 2-4 గంటల్లో గుడ్డు పొదిగి పిండాలు బయటికి వస్తాయి. దింభకాల పొడవు 12-15 మి.మీ. అప్పడప్పుడు చాలా సంఖ్యలో ఇసుక తీరం పొడవునా లేదా నదీముఖాలలోన కనిపిస్తాయి. భారతదేశంలో మార్చి నుండి ఆగస్ట్, అక్టోబర్ నుండి డిశంబర్ వరకు లభిస్తాయి. దక్షిణ భారత నదీముఖాలలో చిరుచేపలు దొరుకుతాయి.

పసి చిరుచేపలను కుంటల్లో, జలాశయాలలో నిలువచేస్తారు. 50-70 మి. మీ పొడవుతో పసిచేప మొదటి నెల నిండగానే, 120-150 మి.మీ. పొడవుకు రెండో నెల నిండగానే చేరుతుంది. సగటుగా దీని నిడివి 40 సెం.మీ. సరాసరి బరువు 450 గ్రాములు ఒక సంవత్సరంలో.

పసి, చిరుచేపలు, వృక్షప్లవకాలను (బాసిల్లేరియాపైసి, మిక్రోపైసి, క్లోరోపైసి), ప్రాథమిక చేపలు డయాటంలను, కోపిపాడ్లను, ద్వికవాల దింభకాలను, చేపగుడ్డను మొదలైన వాటిని తింటాయి. పోషకాకుంటల్లో, "లాబ్ లాబ్" అనే పేరుతో ఉండే అడుగున ఆకువచ్చగా పెరిగేదాన్ని తింటాయి. ఈ పదార్థం ఒక జీవసంబంధ సంక్లిష్టానికి సంబంధించినది. ఇందులో కుచ్చిన ఆకువచ్చ నీలిఆకువచ్చ శైవలాలు, డయాటంలు, ప్రోటోజోవా, బాక్టీరియంలు, డ్రిఫ్టెటన్, మొదలైనవి చేరిఉంటాయి. కుచ్చినవి, తాజావి ఆకువచ్చ శైవలాలు పరిమాణం పెరుగుదలతోబాటు పొచ్చుతుంది. 450 గ్రాముల బరువు ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు పోగులతో ఉండే తాజాశైవలాలను ఉన్నత వృక్ష భాగాలను తింటుంది. మంచినీటి కుంటల్లో, చెరువుల్లో చనాన్ వృక్షప్లవకాలను, అధివృక్షజీవులను, కుచ్చుతున్న స్థూలవృక్షసంపదను తింటుంది.

6.4.2 చనాన్ మారులియన్

1200 మి.మీ. పొడవు పెరిగేచేప. నదులలో బంధిత జలాల్లో ప్రజననం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ నుండి జూన్ గుడ్డు పెట్టేకాలం. సంతానపాలన, ప్రజననం అలవాటు చన్న స్త్రీయేటావలే ఉంటుంది. ఫలదీకరణచెందిన గుడ్డు 1.5 మి.మీ. వ్యాసంతో గోధుమ వర్ణంతో ఉంటాయి. ఆరువారాల పసిచేపలు స్వేచ్ఛాజీవనం చేస్తాయి. ప్రాథమిక చేపలను, కప్పలను చిరుకప్పలను, కీటకాలను, తింటాయి. తొందరగా ఎదిగేజాతి. 2 నెలల పసి చేప నిడివి 12 మి.మీ.

జలాల్లో ప్రజననం చేస్తుంది. సాధారణంగా భారతదేశ ఉత్తర పూర్వ ప్రాంతాలలో ఉంటుంది. పొడవు 1200 మి.మీ. వ్యాసంతో గోధుమ వర్ణంతో ఉంటాయి. ఆరువారాల పసిచేపలు స్వేచ్ఛాజీవనం చేస్తాయి. ప్రాథమిక చేపలను, కప్పలను చిరుకప్పలను, కీటకాలను, తింటాయి. తొందరగా ఎదిగేజాతి. 2 నెలల పసి చేప నిడివి 12 మి.మీ.

సంఖ్యగా, వృక్షపదార్థశైవలాలు [లింబియా], స్పెర్మేటా, కీటోమార్గా, తొలిగా 'ఇల్లూబామ్' [కోసినాడిస్కన్, బిడుల్లియా, గైరోపిగ్మా, చాస్టోనెరాన్, అస్టరియెపెల్లా, టెట్రాగోనోమోత్రిక్స్], కోపిపాడ్లు [అకార్టియా, కాలానస్, సూడోడయాప్టోమన్, లాబిడోనెరా], లు, ఆంఫిపాడ్లు, డికాపోడ్లు, గాస్ట్రోపోడ్లు, పైరిక్యులినా పగిలిన కర్పరాలు, ఇసుక, రాయి నిర్మించిన తునకలు, చేపగుడ్డు, చేపపాలును.

కుంట పరిస్థితులనుబట్టి జాతులు పరివర్తన చెందవు. ఇతర వదిముఖ రొయ్యలవలె ఇది కూడా మంచి నీటి వైపు వలస చెబుతున్నది. డింభకానంతర దశ నదిముఖాలలోకి ప్రవేశించి, కొంతకాలం తరువాత తిరిగి సముద్రంలో ప్రవేశిస్తాయి. అక్కడ గుడ్లు పెడతాయి. ఇది ఎక్కువగా సపంబర్-జనవరి, ఏప్రిల్-జూన్ నెలల్లో నది ముఖాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అధిక ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణ, కరిగిన ఆక్సిజన్, ఆహారం, ఇవన్నీ ముఖ్యకారకాలు. వీటివైననే పరివర్తనను ప్రేరేపించడం, గుడ్లు పెట్టడం ఆధారపడి ఉంది.

6.5.1 తదితర సంవర్ధిత రొయ్యలు

6.5.2 మెటాపెనియన్ మానోసెరాస్

దక్షిణ పశ్చిమ తీరం, పశ్చిమ తీరం వైపు ఉండే నది ముఖాలలో ఈ జాతి రొయ్యలుంటాయి. దీని పొడవు గరిష్ఠంగా 180 మి.మీ.

దీని ఆహారం క్రస్టేషియన్లు, చిన్న మలస్కజీపులు, ఫిరామిని ఫెరా, కార్పానిక చెత్తవదార్థాలు.

పెరుగుదల రేటు 5 మి.మీ. నుండి 15 మి.మీ. మధ్యన నెలకు ఉంటుంది.

ఇది పరివర్తన చెందిన తరువాత సముద్రంలో గుడ్లు పెడుతుంది. గుడ్లు పెట్టడానికి ఉద్రుత సమయం నవంబరు, డిసెంబరు. పెరిగిన మైసిన్, పెరిగిన డింభకం ఉప్పుటిర్లలోకి, నదిముఖాలలోకి వలసపోతాయి.

6.5.3 మాక్రోబ్రేకియమ్ రోసెన్బర్గి

ఈ జాతి రొయ్యలు మంచి నీటిలోను, ఉష్ణకయ్యలలోను ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తూర్పు పడమర తీరప్రాంతాలలోని నది మండలాలలో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మంచి నీటి రొయ్యలైనై ప్రజననానికి 5-20% ఉష్ణదనం ఉండేచోట్లకు వలసపోతాయి. డింభకాలు యవ్వనదశకు రాగానే 2-3 సెం.మీ. పెరిగి తిరిగి మంచి నీటి వైపు ప్రయాణిస్తాయి. వీటి నిడివి 320 మి.మీ.

పెరుగుదలరేటు నెలకు 20-30 మి.మీ. మధ్యన వివిధ వృద్ధి దశలలో ఉంటుంది.

ఇది సర్వభక్షకీ, చెత్త చెదారం మొదలుకొని జంతువృక్ష పదార్థాలను తింటుంది.

సంవర్ధిత పరిస్థితులలో ఇది పరివర్తన చెంది, మామూలుగా నదిముఖాలలో గుడ్లు పెడుతుంది. దీన్ని కుంటలలో చెరువులలో పెంచవచ్చు.

స్వపరిశీలన

1. _____ నదులలోను, జలాశయాలలోను ప్రజననం జరుపుకొనును.
2. "లాబ్ లాబ్"

6.6 సారాంశము

రోహా, చానాస్ చేపలూ పీనియన్, మెటాఫీనియన్, రొయ్యలు జీవితశాస్త్రములను గురించి ఇందు వివరింపబడినది. చేపల వయస్సు - పెరుగుదల, పొడవు - బరువు సంబంధము మొదలగు వానిని గురించి కూడ ఈ భాగములో చెప్పబడినది.

6.7 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. లేబియో రోహిత
2. “లాబ్ లాబ్” పోషణ కుంటల్లో అడుగున పెరిగే ఆకువచ్చని పదార్థము. ఈ పదార్థం ఒక జీవసంబంధ సంక్లిష్టానికి సంబంధించినది. ఇందులో కుళ్ళిన ఆకువచ్చ నీలి ఆకువచ్చ శైవలాలు, డయాటమ్లు, ప్రోటోజోవా, క్టోరియమ్లు, డిప్టెటన్ మొదలైనవి చేరి ఉంటాయి.

6.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

- I. ఈ కింది వాటికి 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయుము.
 1. రోహ జీవశాస్త్రం
 2. పులిరొయ్య జీవశాస్త్రం
- II. ఈ కింది వాటికి 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయుము.
 1. పాలచేప జీవశాస్త్రం
 2. మాక్రోబ్రేకియమ్ రోసెన్ బర్గ్ జీవశాస్త్రం

భాగం-7 సంవర్దిత చేపల, రొయ్యల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభకదశలు

విషయసూచిక

- 7.1 ఉద్దేశ్యం
- 7.2 ఉపోద్ఘాతం
- 7.3 రోహా - జీవిత చరిత్ర - గుడ్లు, డింభకదశలు
- 7.4 విదేశీయ సంవర్దిత చేపల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభకదశలు.
 - 7.4.1 సామాన్య కార్ప్
 - 7.4.2 వెండి కార్ప్
 - 7.4.3 గడ్డి కార్ప్
- 7.5 మరెల్-జీవిత చరిత్ర - గుడ్లు, డింభకదశలు
- 7.6 సంవర్దిత రొయ్యల జీవిత చరిత్రలు, గుడ్లు - డింభకదశలు
 - 7.6.1 వెనియన్ ఇండికస్
 - 7.6.2 మెటా వెనియన్ మానో సెరాన్ 7
 - 7.6.3 మెటా వెనియన్ బ్రెవికార్నిన్
- 7.7 సారాంశము
- 7.8 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 7.9 నమూనా పరీక్షా ప్రశ్నలు

7.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగం కొన్ని ముఖ్యమైన సంవర్దిత చేపల రొయ్యల జీవిత చరిత్రలో సంభవించే గుడ్లు, డింభక దశలు, వాటి ప్రత్యేక లక్షణాలు గుర్తించడానికి ఉపకరించేవి వర్ణితమైనవి.

7.2 ఉపోద్ఘాతం

రోహా (లేబియో రోహిట) జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభక దశలు,
విదేశీయ సంవర్దిత చేపల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభక దశలు
మరెల్ చన్నవన్నే లేట జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు డింభక దశలు
సంవర్దిత రొయ్యల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభక దశలు

7.3 రోహా (లేబియో రోహిట) జీవిత చరిత్ర గుడ్లు డింభకదశలు

రోహా రెండు సంవత్సరాల వయస్సుకే పరిపక్వం చెందుతుంది. విడాదికొకసారి తక్కువ వ్యవధిలో ఇది గుడ్లు పెట్టుతుంది. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ఇది గుడ్లు పెట్టుతుంది.

ఫలదీకరణం చెందిన రోహ అండాలు గుండ్రంగా, పారదర్శకంగా ఎరువుగా అంటి పెట్టుకోకుండా ఉంటాయి. వీటి పీతకంలో నూనె బిందువులుండవు. అప్పుడే పొదిగిన డింభకం 3.5-4.6. మి.మీటర్లు పొడవు ఉంటుంది. దాని శరీరం పార్శ్వాలలో అణిగి, పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దానికి మొప్ప చీలికలు, ఉరోవాజం, మధ్యవాజం మడత ఇవన్నీ ఉంటాయి. పీతక పదార్థం పూర్వభాగం లకునాకారంలో పరభాగం పొడవుగా మొండిగా అంతమవుతుంది. దీని పుష్ట భాగం గులాబిరంగులో ఉంటుంది. పొదిగిన 2 కంటి రంగు తేలిక పసుపు గోధుమ రంగు మిశ్రమంతో క్రమరహితంగా ఈదుతూ ఒక్కొక్కప్పుడు వైకి తేలుతూ తక్కిన సమయాలలో అడుగున పార్శ్వంగా పడి ఉంటుంది.

పీతక శోషణం తరవాత డింభకం కొలత .5 నుండి 7.5 మి.మీ. ఉంటుంది. పొదిగిన తరవాత 8వ, 12వ, 18వ రోజు వరకూ పుష్ట, పాయు, శ్రోణివాజాల అధ్యాలు కనిపిస్తాయి. పొలసులు 30 వ రోజున, బర్సెల్లు 21 వ రోజున, కాలేయం, పొదిగిన మర్నాడు కనిపిస్తాయి. పొదిగిన 2½ రోజుల తరవాత వాయుకోశం పెరుగుతుంది.

పొదిగిన తరవాత ఏర్పడే వివిధ వృద్ధి దశలు వాలు లక్షణాలు రోహ డింభకంలో ఈ విధంగా ఉంటాయి.

పొదిగిన 6 గంటల తరవాత

ఉరోవాజం ఆద్యం; క్రమరహిత పిండ చలనాలు; సాధారణంగా అడుగున నివసించేది, అప్పుడప్పుడు వైకి వస్తూ ఉంటుంది.

పొదిగిన 12 గంటల తరవాత

కళ్లలో మాత్రమే క్రొమాటోఫోర్లు కనిపిస్తాయి. పిండ చలనాలు నిలువుగా జరుగుతాయి.

పొదిగిన 24 గంటల తరవాత





డింభకం సరాసరి పరిమాణం 5.5. మి. మీటర్లు. కొన్ని నల్ల క్రొమాటోఫోర్లు కంటి పైభాగంలో అగవడతాయి. పిండం రంగు పాలిపోయిన పసుపు; పాయువాజం సుస్పష్టం, చెవిగర్తలు స్పష్టం. సానసంచటి పరాంతంలోకూచిగా అంతమవుతుంది. పుచ్చీయ వాజం రేఖితంగాను, ఉరోవాజం పక్షరేఖ రహితంగాను, పుష్టవంశం చిట్ట చివరి భాగం వైకి తిరిగి ఉంటుంది.

పొదిగిన 36 గంటల తరవాత

సరాసరి పరిమాణం దాదాపు 5.9 మి.మీ. కింది వెదవి స్పష్టంగా, ఉరోవాజం ఉన్నంతగా ఉంటాయి. సానసంచి పూర్వ భాగం నుండి వెనక వరకు ఇంచుమించు తిన్నగా ఉంటుంది. దానిపై పుష్టభాగం అంచులో నిలుపునా, కొన్ని తలమీద, మరికొన్ని పుష్టవాజం మీద నల్ల క్రొమాటోఫోర్లుంటాయి. పుచ్చీయ ప్రాంతంలో ఇవి ఉండవు. పిండం పుష్ట. పార్శ్వభాగాల రంగు పాలిపోయిన తెలుపు కాగా పాయువరాంత భాగం రంగు ముదురు పసుపు. పుష్టవంశం చిట్టచివర వైకి తిరిగి ఉంటుంది. నోటి చీలిక ఏర్పడుతుంది.

పొదిగిన 48 గంటల తరవాత

సగటు పరిమాణం 6.2 మి.మీ. సానసంచి పూర్వభాగం కుంభాకారంగాను, పిండం రంగు పసుపుగానువుంటాయి, వాయుకోశంస్పష్టం, ఉరోవాజం ఉన్నతం. కన్ను వెనుక చెవి ప్రాంతంలో కొన్ని నల్ల క్రొమాటోఫోర్లు. వాయుకోశ ఉదరభాగంలో క్రొమాటోఫోర్లుండవు. చెవి వెనుక పుచ్చీయవాజం మూలం వరకు ఒక వరసలో నల్ల క్రొమాటో ఫోర్లు తలమీద స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఉదర పిండవాజం, పుష్టవాజం, పుష్టవాజానికంటే ముందుగా వుడుతుంది. మొప్పలు స్పష్టంగాను, వాయుకోశం కోడిగుడ్డు ఆకారంగాను, తలనలుపు రంగుగా, శరీరం తేలిక పసుపురంగుతో ఉంటాయి.



7.1. తేలియో రోహిట-డింభకారివృద్ధి: 1. పొదిగిన చేప. 2. 12 గంటల డింభకం 3. 24 గంటల డింభకం 4. 36 గంటల డింభకం. 5. 48 గంటల డింభకం. 6. 72 గంటల డింభకం.

పొదిగిన 72 గంటల తరువాత

సగటు పరిమాణం 70 మి.మీ. తేలిక పసుపు వర్ణం. తలమీద కళ్ళమధ్య కొన్ని క్రొమాటోఫోర్లు, పుష్పపార్శ్వాలలో తోకవరకు పిండం తళతళలాడే పసుపు రంగుతో, పుష్పవంశంపైన ఉండే తోకభాగం పసుపురంగుతో ఉంటాయి.

పొదిగిన నాలుగు రోజుల తరువాత

7.6 మి.మీ పొడవు సానసంచి పూర్తిగా శోషితమవుతుంది. పెదవుల అంచులు శైలికాయుతంగా కళ్ళ వెనక నల్ల క్రొమాటోఫోర్లతో, ఉపరికులం పెరిగే సూచనలతో ఉంటుంది. పుష్పవంశం చివర వంగి, పుచ్చియ భాగం కింద అర్ధచంద్రాకృతిలో అమరిన నల్ల క్రొమాటోఫోర్ వరసలతో ఉంటుంది. శాశ్వతమైన పుష్ప ఉదరవాజ మడతలతో ఉంటుంది.

పొదిగిన 6 రోజుల తరువాత

10-10.5 మి.మీ. నిడివి. కిందివి పెద్దగాను పైకి తిరిగి, తెరచిన నోటి నిడివి 1.7 మి.మీ. కన్ను 1 మి.మీ. నాసికా రంధ్రాలు స్పష్టం. 9 రేఖలతో పుష్పవాజం; పాయువాజం తేలిక రేఖలతో శ్రోణివాజం మొగ్గతో ఉంటాయి. వాయుకోశం, రెండుగా చీలి గోళాకార పూర్వ భాగంతో సాగిన త్రిభుజాకార పరాంత భాగంతో ఉంటుంది. పుష్పపార్శ్వాల పసుపుగా, రంగులేని ప్రాంట్ విడదీసే రెండు అర్ధచంద్రాకృతిలో అమరిన క్రొమాటోఫోర్లు పుచ్చియ వాజం రెండు తమ్మెల మీద ఉంటాయి. పుచ్చియ రేఖలు 22.

1. మి.మి. నిడివి. వాటి పెదవులు, వృష్ణవంశం వాడిగా పైకి వంపు తిరిగి, ఉంటుంది. ఉదర ప్రాంతంలో విస్తరించిన పిండ ఉదరవాణం మడత పాయువు వరకు ఉంటుంది. రెండు నల్ల క్రొమాటోఫోర్ సమూహాలు పుచ్చవాణ వృంతం మీద ఉండగా మరో రెండు మచ్చలు అర్థచంద్రాకృతిలో పుచ్చియవాణం మీద, 22 శాఖీయ రేఖలు పుచ్చియ వాణం మీద ఉంటాయి. పుచ్చియవాణం ద్వితీయంగా ఉంటుంది. శ్రోణీవాణానికి 2-3 వృష్ణ వాణానికి 2-11 షక్త రేఖలుంటాయి.

పొదిగిన తరవాత 8వ రోజు

నిడివి 12.5 మి.మి. 14 షక్తరేఖలతో ఉండే వృష్ణవాణం. మూలభాగం దగ్గర పసుపు రంగు అక్కడక్కడా విస్తరించి ఉంటుంది. పాయువాణం 7 షక్త రేఖలతో, పుచ్చియ వాణం 22 రేఖలతో ఉంటాయి. పిండ ఉదరవాణం మడత పాయు ప్రాంతం వద్ద అంతమవుతుంది. రెండు అర్థచంద్రాకృతిలో ఉండే నల్లని మచ్చలు పుచ్చియవాణం మూల భాగంలో ఉంటాయి. కొన్ని నల్ల క్రొమాటోఫోర్లు పాయువాణాన్ని పుచ్చియ వాణంతో కలిపే పిండం మడత మీద ఉంటాయి.



1




2



3



4



5



6

పటం 7.2 లేబీయో రోహిటాడింథకానంతర వృద్ధి: 1. నాల్గవరోజు, 2. 5వ రోజు. 3. 6వ రోజు 4. 7వ రోజు 5. 10వ రోజు. 6. 15వ రోజు.

శ్రోణివాణానికి రేఖలుంటాయి. బంగారు వసువు శరీర భాయ ముంగా వై నగం భాగం. నల్ల క్రొమాటోఫోర్లు తలమీద స్పష్టంగా ఉండగా శరీరం మీద చెదురు ముదురుగా ప్రత్యేక సమూహ విధి ఏర్పడకుండా ఉంటాయి.

పొదిగిన తరవాత 12 వ రోజు

19 మి.మీ. పొడవు, జంభికా బార్యెల్లు ఉంటాయి. శరీరం రంగు పుష్క భాగంలో బంగారు వసువు. ఉదర భాగంలో మాసిన వసువు, 3-13 రేఖలతో ఉండే పుష్కవాజం, 7 రేఖలతో పాయువాజం ఉంటుంది. దీని పక్ష రేఖలు ముందుగా ఉండేది ఒకటి తప్ప అన్ని శాఖీయంగా ఉంటాయి. ఉదర వాణానికి 7 పక్ష రేఖలు, ఇందులో మొదటి రెండు తప్ప తక్కినవన్నీ శాఖీయం. పుచ్చీయ వాణానికి పక్షరేఖలు 34, పుచ్చీయవృంతంపై అడ్డంగా వెడల్పాటి త్రికోణాకారం నల్లపట్టి చుట్టి ఉంటుంది. ఈ పట్టి అగ్రం తల వై వుంటుంది.

పొదిగిన తరవాత 15 వ రోజు

23 మి.మీ. నీడివి పాయువాజంలో 2-5 రేఖలు, పుచ్చీయ వాజంలో 36 రేఖలు ఉంటాయి. పుష్కవాజం ఆధార భాగం 2/3 వంతులు వర్ణకాలతో ఉంటుంది. పుచ్చీయ ప్రాంతం మీద ఉండే నల్ల క్రొమాటోఫోర్ల పట్టి ఉంటుంది. ఇది వెనకకుసాగి పుచ్చీయవాజ రేఖల మొదలుకు చేరుతుంది.

పొదిగిన తరవాత 18వ రోజు

25 మి.మీ. పొడవుంటుంది. శరీరం మాసిన వసువు రంగువైన, వసువు తెలుపు కింద ఉంటుంది. పొలుసులు ఉదర భాగంలోను, పుచ్చీయ వృంతం వర్ణ స్పష్టంగా ఉండవు. పుష్కవాజం పూర్వ ఉపాంతం మీద నల్ల క్రొమాటోఫోర్లు చుక్కల వరసగా ఉంటాయి. ఉదరవాజంలో 9 రేఖలుంటే పుచ్చీయవాజంలో 32 రేఖలుంటాయి. పుచ్చీయవృంతం మీద నల్ల త్రికోణాకార ప్రాంతం ఉంటుంది. దీని వెనకగా ప్రతి పుచ్చీయవాజం లంబికల అర్థ భాగంలో రెండు బూడిద వర్ణంతో ఉండే చంద్రవంకలుంటాయి.

పొదిగిన తరవాత 20వ రోజు

పొడవు 26 మి.మీ. శరీరానిది బంగారు వర్ణం. స్పష్టమైన పొలుసులు శరీరాన్ని కప్పతాయి. పూర్వరేఖపైన ఒకటి కింద ఒకటి నల్లని చార. ఇది పుచ్చీయ ప్రాంతం వరకు నిలువుగా విస్తరిస్తుంది. పుష్క వాణానికి 3-13, పుచ్చీయ వాణానికి 34 రేఖలు. ఇవి నారింజ వర్ణకం మచ్చలతో కప్పి ఉంటాయి. పుచ్చీయ వృంతం చుట్టూ నల్లటి పట్టి చుట్టి ఉంటుంది. దీని పరాంతం కుంభాకారంగా పూర్వ ఉపాంతం క్రమ రహిత అకారంగా ఉంటుంది. దీని వెనక రెండు తేలికపాటి చంద్ర ప్రాంతాలు రెండు వర్ణరహిత చారలవల్ల వేరువుతాయి.

పొదిగిన తరవాత 25వ రోజు

30 మి.మీ.టర్లు పొడవుంటుంది. శరీరం బంగారు వర్ణం అయితే ఉపరికులనుండి రాగి తళ కొడుతుంది. బార్యెల్లు ఉన్నతంగా గోచరిస్తాయి. కంటపై అంచు తేలికపాటి నారింజ రంగుతో ఉంటుంది. పుచ్చీయ వృంతం మీద నల్ల పట్టి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పుచ్చీయ వాజంపై లంబిక పెద్దగా కూచిగాను, కింది లంబిక చిన్నగా గుండ్రని అంచుతో ఉంటుంది.

రోహ గుడ్డు చేప ఆహార నాళ నిర్మాణం, దీని మాంసాహార లక్షణాన్ని సూచిస్తుంది. రోహ గుడ్డు చేప పొదిగిన 5వ రోజు వ్లవక జీవులను తినడం ఆరంభించినప్పుడు, ఆహార నాళం నగలు నిడివి 3.3. మి.మీ ఉంటే శరీరం పొడవు 6.9 మి.మీ. సరాసరిగా ఉంటుంది. పొదిగిన 15వ రోజు రోహ చేప ఆహారనాళం శరీరం పొడవుకంటే చిన్నగా ఉంటుంది. అటు తరవాత అది

శరీరానికంటే ఎక్కువ వేగంతో పాడవుగా పెరుగుతుంది. ప్రాథమిక ఆహారనాశం విస్తృత మొత్తం నిడవికి ఇంచుమించు 12 ఉంటుంది.

7.4 విదేశీయ సంవర్ధిత చేపల జీవిత చరిత్ర గుడ్డు, డింభకదశలు

ఆహారానికి ఉపయోగించే విదేశీయ చేపలలో అతి ముఖ్యమైనవి, చేపల సంవర్ధనానికి పనికి వచ్చేవి. సామాన్య కార్ప్, వెండి కార్ప్, గడ్డికార్ప్, టిలేపియా, గొర్రామి, ఇచ్చట సాధారణ కార్ప్, వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ల గూర్చి మాత్రమే వివరించ బడింది.

7.4.1. సామాన్య కార్ప్ (నైప్రిన్ కార్ప్)

ఫలదీకరణం చెందిన కార్ప్ అండాలు చిన్నగా, గుండ్రంగా డెమర్సల్ (Demersal) గా, అంటు కొనేవిగా ఉంటాయి. వీటి వ్యాసం 1.0 నుండి 2.0 మి.మీ. పరిపీతక అవకాశం చాలా సన్నగా ఉంటుంది. పీతకం వసుపు లేదా తేలిక గోధుమ వర్ణం. 2-7 రోజులలో పిండం పొదిగి బయటకు వస్తుంది. ఇది నీటి ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారితం. కొత్త డింభకం, 4.0, 5.6 మి.మీ. పొడవుతో, సొన పదార్థంతో ఉంటుంది. తన సీమెంటు గ్రంథులతో ఈ డింభకం నీటి మొక్కలకు అంటి పెట్టుకొని ఉంటుంది. ఈ దశ దాదాపు పీతక పదార్థం శోషితమయ్యే వరకు ఉంటుంది. 2-6 రోజుల వరకు నీటి ఉష్ణోగ్రత నమనరించి ఈ దశ ఉండవచ్చు. పెరిగిన డింభకం నిడివి 6-7 మి.మీ. ఇది చలించటం మామూలుగా మొదలవగానే ఆవరణం నుండి ఆహార సేకరణ చేస్తుంది. సరియైన ఆహారం దొరికినట్లయితే పెరుగుదల వేగం పెచ్చి వాచాలు విభేదనం చెందుతాయి. పీతక శోషణం తరువాత 12-15 రోజులలో అన్ని వాచాలు రేకలతో పెరిగి స్వతంత్రంగా జీవిస్తుంది.

7.4.2. వెండికార్ప్ (ప్రాపోథాల్మిక్స్ మోరిట్రెక్స్)

స్వేచ్ఛగా స్రవిస్తూ ఉండే వెండి కార్ప్ గుడ్డు పాలిపోయిన నీలిరంగులో ఉంటాయి. ఫలదీకరణం చెందిన అండాలు డెమర్సల్, గుండ్రంగా, బూడిద రంగులో ఉంటాయి. ఫలదీకరణం జరిగిన 5 నిమిషాల తరువాత అండాలు ఉబ్బుతాయి. తరువాత అరగంటలో అండంలో నీరు గట్టిబడే చర్య పూర్తి అవుతుంది. బాగా ఉబ్బిన ఫలదీకృత అండవ్యాసం 4.2-4.76 మి.మీ.లర్లు.

నూతనంగా పొదిగిన డింభకం పొడవు 5.0-5.5 మి.మీ. సొన సంచి నిడివి 3.33 మి.మీ. శరీరం ఎత్తు 1.25 మి.మీ. సొన సంచి ఎత్తు 1.09 మి.మీ. 42 నుండి 44 కండర ఖండితాల సంఖ్యకాగా, 14 నుండి 16 ఖండితాలు, పొయుపు వెనక భాగంలో ఉంటాయి. సొనసంచి శోషణం రెండో రోజుతో అయి పోతుంది. డింభకానంతర దశమధ్యమం నుండి ఆహారం సేకరించుకొంటుంది. దాని కొలత 7.42-7.53 మి.మీ. నిడివి 4.21 మి.మీ. ఎత్తు.

7.4.3. గడ్డికార్ప్ (టెనోపారింగోడాన్ అయిడెల్లా)

ఈ చేప కొన్ని దఫాలుగా గుడ్డు ఎడుతుంది. నీటిపై తేలే ఈ గుడ్డు కింది ప్రవాహంలో తేలుతూనే వుద్ది చెందుతాయి. స్త్రీ బీజకోశం గుడ్డు వసుపు, గాఢ బంగారు గోధుమ వన్నెతో ఉంటాయి. ఫలదీకరణం చెందిన అండాలు బాగా ఉబ్బి అరగంటలో దాదాపు వాటి వ్యాసం 4.58 మి.మీ.లర్లు అవుతుంది. అప్పుడే పొదిగిన డింభకం నిడివి 4.5-6.00 మి.మీ. సొన సంచి నిడివి 2.82 మి.మీ. శరీరం గరిష్ఠ ఎత్తు 2.90 మి.మీ. సొన సంచి గరిష్ఠ ఎత్తు 0.76 మి.మీ. పీతక పదార్థం పాలి పోయిన గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. 45 కండర ఖండితాలలో 14 పొయుపరాంత దశలో ఉంటాయి. రెండు రోజులు ఎదిగిన డింభకం, పీతక శోషణం తరువాత 6.98 మి.మీ. పొడవు 0.99 మి.మీ. గరిష్ఠ ఎత్తుంటుంది.


7.5 మరెల్ [చన్నావన్స్ టేటా] జీవిత చరిత్ర గుడ్డు డింభకదశలు

ఫలదీకరణం చెందిన అండం, గుండ్రంగా, అంటుకోనిదిగా, గడ్డి వసువుగా, స్వేచ్ఛగా తేలి ఉంటుంది. పీతకంపై బ్లాస్టోరిస్ట్ ఉంటుంది. పీతకంలో ఒక మానె బిందువు లేదా అది విచ్చిత్తి చెందినందువల్ల ఏర్పడిన 5-6 చిన్న అసమాన మానె బిందువులతో ఉంటుంది. పరిపీతకావకాశం వెడల్పు మధ్యమంగా ఉంటుంది. అండ వ్యాసం 1.2 మి.మీ కాగా పీతక వ్యాసం 0.9 మి.మీ.

అంతర్బంజిత విదళనం చెందిన రెండు గంటల తరువాత పిండం బ్లాస్టులా దశకు చేరుతుంది. ఫలదీకరణం చెందిన 9 గంటల తరువాత గాస్ట్రోలేషన్ జరిగి అది అంత్రరంధ్రం ఏర్పడుతుంది. ఈ దశలో పీతకాన్ని చుట్టుతూ పిండం సన్నని పట్టివలె ఉంటుంది. దాని బహిష్కరణం ముగియడం జరుగుతుంది. సోన బిరడా భాగం తప్ప తక్కిన పీతకాన్ని పిండం ఉపయోగించుకొంటుంది.

ఫలదీకరణం చెందిన తరువాత జరిగే అభివృద్ధిని గంటల వారిగా కిందవివరించడం జరిగింది.

పదిగంటలు: పిండ పూర్వసహంత అక్షం శిరోభాగం, పూర్వ మస్తిష్కరం. ఈ రెండు భాగాలతో గుర్తించవచ్చు. పీతకం చుట్టూ సోనసంచి వృద్ధి పూర్తి అవుతుంది.



పటం 7.3. మరెల్ పిండాభివృద్ధి: 1. 2-కణాల దశ. 2. 4-కణాల దశ 3. 8-కణాలదశ 4. మూర్తలదశ. 5. 3 గంటల దశ 6. 5 గంటల దశ 7. 5 గంటల దశ 8. 8 గంటల దశ 9. 10 గంటల దశ 10. 14 గంటల దశ 11. 16 గంటల దశ 12. 18 గంటల దశ 13. 20 గంటల దశ 14. 22 గంటల దశ.

11½ గంటలు: మధ్యత్రవ ఖండే భవనంవల్ల ఏర్పడే రెండు సోమైట్లు, నేత్రద్రోణి కనిపిస్తాయి.

14 గంటలు: 1.0 మి.మీ ఎత్తుతో పిండం ఆరు సోమైట్లతో, పీతకాన్ని పూర్తిగా ఆవరించి, నేత్రద్రోణులతో ఉంటుంది.

16 గంటలు: 9 సోమెట్లు, పూర్వ, మధ్య, పరాంత మస్తిష్కాలు, పుష్క వంశం సృష్టంగా కనిపిస్తాయి. తల భాగం వెడల్పువుతుంది.

17 గంటలకు: 13-15 సోమెట్లు; బహిష్కారం మందమయి నేత్రద్రోణిలో కటకాన్ని తయారు చేస్తుంది. చివరి సోమెట్ వద్ద ఉండే తోక చివర పీతకం నుండి వేరువుతుంది. పిండవాణం మడత కుప్పర్ ఆశయంతో ఉండే ఈ పిండం ఎత్తు 1.0 మి.మీ.


18 గంటలు: తోక భాగం ఎంకా స్ఫేచ్ఛపొంది, పిండంలో కదలికలు కనిపిస్తాయి.

20 గంటలు: సోమెట్ల సంఖ్య 22. వదో సోమెట్ వరకు పిండవాణం మడత ఉదర భాగంలో విస్తరిస్తుంది. కంటి కటకపుద్ది సంపూర్ణం, శ్రవణేంద్రియ ఆద్యాలు కనిపిస్తాయి. కుప్పర్ కోశం తగ్గిపోతుంది. సానసించి ముందు తయారైన వృదయ అద్య వైపు పీతక ప్రసరణ కనిపిస్తుంది. వృదయం వేగంగా స్పందిస్తుంది. కొన్ని శాఖీయ మెలనోఫోర్లు పీతకం పైన ఉంటాయి.

22 గంటలు: 24 సోమెట్లు. శ్రవణ కోశాలు, పూర్ణ గర్తలు విస్తృతం, నాడి నాతంపైన, మొండెం, పుచ్చీయ ప్రాంతం పైన కొన్ని మెలనోఫోర్లు కనిపిస్తాయి. కుప్పర్ కోశం అదృశ్యమయి వృదయ స్పందన అతివేగంగా జరుగుతుంది.

24 గంటలు: ప్రచోదన చలనాలు ఏర్పడి తోక విసురుడువల్ల తల పైకి ఎగిసినందున అండంపై పీతక పార పగిలి నీటిలో పిండం విడుదలవుతుంది.

కొత్తగా పొదిగిన పిండం మాసిన గోధుమ రంగుతో, 2.7 మి.మీ. పొడవు 1.1 మి.మీ. ఎత్తులో ఉంటుంది. వాణం మడత పుష్క భాగంలో రెండో కండర ఖండితం వద్ద పుట్టి, ఉదర భాగంలో పాయువు వరకు విస్తరించి, సానసించిని చేరుకొంటుంది. 3, 4 మస్తిష్క కోష్టాలు గోచరిస్తాయి. ఎనమిది మెలనోఫోర్లు పుచ్చీయ ప్రాంతంలో, వరసలుగా అమరిన మెలనోఫోర్లు శరీర పార్శ్వాలలో ఉంటాయి.



పటం 7.4. మరో పొదిగిన చేప

డింభకాభివృద్ధి పొదిగిన తరువాత గంటల వారీగా కింద వివరించినట్లుగా ఉంటుంది.

3 గంటలు: పొడవు 3.1 మి.మీ. ఎత్తు 1.4 మి.మీ. 2 అరల వృదయం మస్తిష్కంలో, పీతకంలో పుష్క వంశం చుట్టూ ప్రసరణ, హిమోగ్లోబిన్ తో ఉండే రక్తకణాల రంగు ఎరుపు పసుపు పాయు రంధ్రం గుంట మొదలైన లక్షణాలుంటాయి.

8 గంటలు: నిడివి 3.5 మి.మీ. 31 కండర ఖండితాలు, మెలనోఫోర్లు కొన్ని పుష్కవంశ ఉదర భాగంలో కొన్ని శరీర పుష్క భాగంలో కనిపించడం, నేత్ర ప్రాంత ప్రసరణ కనుపాపలో వర్ణకాలు. పుచ్చీయ రక్తనాళాలు కండర ఖండితాంతర విభాజకాలపైన పరస్పరంగా కలుసుకోవడం మొదలైన లక్షణాలన్నీ ఈ దశలో ఉంటాయి.

15 గంటలు: 4.2 మి.మీ నిడివి 1.00 మి.మీ ఎత్తు. శ్రవణ గుళిక కంటి దగ్గరగా చేరడం, కనుపాప వర్ణకాలు గాఢమవడం, వృక్క వాహిక ఏర్పడడం, ఉరోవాజ సూచనగా దళనరిగా ఉండే మచ్చ ఏర్పడడం జరుగుతుంది.

24 గంటలు: నిడివి 4.3. మి.మీ. ఎత్తు 10 మి.మీ. 32 కండర ఖండితాలు. అస్యఅంతర్వర్తనం, ఉరోవాజం మొగ్గలు, పీటి కిందుగా వాయుకోశనాళం ఇవన్నీ స్పష్టంగా గోచరిస్తాయి.

36 గంటలు: 4.4. మి.మీ నిడివి బాగా పెరిగిన ఉరోవాజం చలనాలకు చురుకుగా ఉపయోగపడుతుంది. నోరు, పొయ్యపు, మొప్పల ఆద్యాలు నాసికాగర్తలు వృద్ధి చెందుతాయి. నేత్రపరాంత ప్రాంతం నుండి ఉరోవాజ మూలంవరకు మెలనోఫోరల్ దశసరి పట్టి ఏర్పడుతుంది.


మరెల్ పొదిగిన తరవాతి వృద్ధి రోజులవారీగా దిగువ వర్ణితమయింది.

2 రోజులు: నిడివి 4.6 మి.మీ. ముఖ్యలక్షణాలు; తెడ్డు అకారంతో ఉరోవాజం. సమూహాలుగా డింభకాల కదలిక శయాసగా ఉంటుంది. కింద దవడ బాగా వృద్ధిచెందింది. పీతకం బాగా క్షీణించింది ఉంటాయి.

3 రోజులు: 5.0 మి.మీ పొడవు ఉరోవాజాలలో అరవలయంగా ప్రసరించే రక్తనాళం అడ్డంగా ఏర్పడుతుంది. పొరల మాదిరి ఉపరికులాలుంటాయి. పీతకం పూర్తిగా శోషితమవుతుంది.

6 రోజులు: నిడివి 5.2 మి.మీ. పుష్కభాగంమీద పసుపువర్ణకాలు ఒక పట్టిలాగ ఉంటాయి. పార్శ్వాలలో గూడ ఇదే మాదిరి పసుపుపట్టి కనిపిస్తుంది.

8 రోజులు: నిడివి 5.3 మి.మీ. పుష్కరేఖ మీద పసుపు పట్టి ఉంటుంది. ఇది ముట్టెవైపు డైమండ్ అకారంగా వెడల్పువుతుంది. పార్శ్వాలలో ఉండే రెండు నల్లని గీతల మధ్య ఇంకో పసుపు పట్టి ఉంటుంది. పుచ్చ ఉదర భాగంలో ఒక వెడల్పాటి నిమ్మపసుపు మచ్చ ఉంటుంది. రెండు రేఖల ఆద్యాలను పుచ్చియ భాగంలో కనిపిస్తాయి.



పటం 7.5. మరెల్ డింభకం : 1. 8 గంటలకు, 2. 24 గంటలకు, 3. 36 గంటలకు 4. రెండు గంటలకు.

చేపనారు అన్వేషణ, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయినాయి.

ఈ పరిశోధనలు చేపనారు సేకరణ కేంద్రాలను గుర్తించడానికి, గుడ్డును సేకరించేవల ఉపయోగానికి సహాయపడతాయి.

బందాలు ప్రాకృతికంగా లేదా కృత్రిమంగా తయారైన చెరువులు. వీటిలో చేపలు ప్రజననం చేయడానికి కావలసిన నదుల పరిస్థితులను అనుకరించడం లేదా కల్పించడం జరుగుతుంది.

8.3 నదులలో గుడ్డు చేప సేకరణ

భారతదేశంలో చేపల పెంపకాన్ని వృద్ధి చేయటానికి అత్యధికంగా చేపనారు లభించటం ప్రాథమికంగా ముఖ్యం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్ కట్ల (కట్ల కట్ల), రోహా (లేబియో రోహిట), మ్రిగాల్ (సిరినా మ్రిగాల) మొదలైన చేపలను దేశమంతటా మంచి నీటి కుంటల్లో చెరువుల్లో పెంచడానికి ఇష్టపడతారు. ప్రకృతి సేదంగా ఈ భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలు నదులలో నివసిస్తాయి. కాని గుడ్డు చేపలు ఉండే మూల స్థానం వరదవచ్చేది. చాలాకాలం నుండి ఈ ప్రాకృతిక వనరులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపలను పసి చేపలను సాంప్రదాయక పద్ధతులతో సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ పద్ధతులు ముఖ్యంగా బెంగాల్ లో పుట్టి తూర్పు భారత రాష్ట్రాలకు విస్తరించినాయి. చేపనారు వాణిజ్యం ఇప్పటికీ ఈ వనరులపైననే ఆధారితమై ఉంది.

నదులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపల సేకరణ ముమ్మరంగా జరిగినప్పటికీ, సేకరణ పద్ధతులు గుడ్డు చేప సేకరణ వలలకు రవాణాకు సంబంధిత శాస్త్రజ్ఞానం తగినంతగాలేక పోవడంవల్ల విలువైన చేపనారు వివరీత నష్టానికి గురి అవుతుండేది.

ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి చేపనారు అన్వేషణకు, పరిశోధనకు శాస్త్రీయ ఆధారం కల్పించడం వివిధ భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయింది. గుడ్డు చేప సేకరణ వలలను ప్రమాణీకరించడం, సేకరణ పద్ధతులను క్రమంగా మెరుగుపరచడం, చేపనారు లభ్యత నిలకడగా ఉండని పరిస్థితులకు, కాలానికి, స్థలానికి ఉండే సంబంధము, వీటికి బాధ్యతవహించే కారకాల ధ్రువీకరణ మొదలైన అంశాలు పరిశీలనకు నాందిపలికారు.

మొత్తం దాదాపు 3660 మిలియన్ల చేపనారులో నది వనరుల నుండి సేకరించినది 91.6% అని భారతదేశ చేపనారు సేకరణ అంచనాలవల్ల తెలుస్తున్నది. ఇంతేగాక మంచి నీటిలో చేపల పెంపకం చేసే వారి అవసరాలను అదుకోవడానికి సుమారు 6000 మిలియన్ల చేపనారు అవసరమవుతుందని కూడా అంచనాలవల్ల తెలుతున్నది. ఈ తీవ్రకొరతను ఎదుర్కోవడానికి, స్వయం సమృద్ధి సాధనకు, నది వనరుల తక్షణ అన్వేషణ చేసి, చేపనారు అదనంగా లభించే కేంద్రాలను తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది.

8.4 నదులలో చేపనారు వనరులు

భారతదేశంలో అయిదు పెద్ద నదీ వ్యవస్థలున్నాయి. అవి గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధు నదీ వ్యవస్థలు ఉత్తరంగా, తూర్పు తీర, పశ్చిమ తీర ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థలు దక్షిణంగా ఉన్నాయి. గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధుహిమాలయనదీ వ్యవస్థలలో మంచునీరు ప్రవహిస్తుంది. అందులో జీవరాశులు, మత్స్య సంపద సమృద్ధిగా ఉంది. మహానది, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి నదుల తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థ, నర్మద, తపతి నదులతో పశ్చిమ తీర నదీ వ్యవస్థ, ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండు వ్యవస్థలు వర్షాధారం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్లు మొదట గంగానదీ వ్యవస్థలకు సంబంధించినవి. వీటి స్థానాంతరీకరణం (Transplantation) జరగడంవల్ల ఇప్పుడు తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థలలో స్థిరపడ్డాయి.

గంగానదీ వ్యవస్థకు చెందిన చేపనారును అండాలు, గుడ్డు చేపలు, పసిచేపలు, చిరుచేపలు మొదలైన రూపాలలో పెద్ద పరిమాణంలో సేకరిస్తారు. దేశం మొత్తం మీద ఉత్పత్తి అయ్యే చేపనారులో 89 శాతం కేవలం గంగానదీ వ్యవస్థ. మే జూన్ నెలలలో కోపివదిలో వచ్చే మంచునీటి వరదవల్ల భారతదేశంలో గుడ్డు చేప ముందుగా అక్కడ కనిపిస్తుంది. గంగానది దాని ఉపనదులైన గోమతి, వద్వా, భాగీరథి వంటి నదుల నుండి భారీ ఎత్తున గుడ్డు చేపలను సేకరిస్తారు. పరిశీలించగా గంగాలోని చేప నారు ఉత్పత్తి కేంద్రాలు ఎప్పుడూ ఒకటే మాదిరిగా పరితాలివ్వడంలేదు. సంవత్సరాలు గడచిన కొద్దీ వయసు వచ్చిన చేపలవల్ల, విచక్షణా రహితంగా చేపనారు సేకరించడంవల్ల సమృద్ధిగా ఉండేవాటి సంఖ్య బాగా క్షీణించింది. వినరీలాగే వలల ద్వారా పసిచేపలను, చిరు చేపలను యమున, గంగ, సోన్ నదులలో పట్టుకొంటారు.

బ్రహ్మపుత్ర దాని ఉపనదుల నుండి కార్ప్ గుడ్డను, గుడ్డు చేపలను పెద్ద ఎత్తున సేకరిస్తారు. సింధు నది వ్యవస్థకు చెందిన సల్వేజ్ నదిలో గుడ్డు చేపలను సేకరించే మంచి కేంద్రాలను కనుగొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్ లోని నర్మదా నదిలో పట్టుబడ్డ గుడ్డు చేపల పరిమాణం మొత్తం భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపల నారులో 20-25% ఉంటుంది. చేపనారు కోసం మహానది కూడా ఒక పెద్దవనరు కాని సంవత్సరం పొడవునా చాలావరకు దాని దుర్వినియోగ మవుతున్నది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహిస్తున్న గోదావరి, కృష్ణా నదులు వాటి ఉపనదుల యుక్తంగా కార్ప్ చేపల పంటకు తగు సమృద్ధితో ఉన్నాయి. రాజమండ్రివద్ద గోదావరి నదిలో దొరికే గుడ్డు చేప పెద్ద కార్ప్ ల పరిమాణంలో దాదాపు 20% ఉంటుంది. కృష్ణ, గోదావరి, డెల్టా ప్రాంతాలలోని పంట పొలాలు, కాలువలలో పసిచేపలు, చిరుచేపలు పెద్ద కార్ప్ లకు చెందినవాటి నెన్నిటిన్ వర్షాకాలం దాటగానే సేకరిస్తారు. పెద్దకార్ప్ పసి చేపలకు, చిరుచేపలకు, కొల్లేరు సరస్సు పెన్నిధి. ఈ వనరుల ద్వారా లభ్యమైన పసి చేపలను, చిరు చేపలను కుంటలలో నిలువలకు ఉపయోగిస్తారు.

8.5 నదిలో గుడ్డు చేపలను సేకరించే విధానము

స్థలం ఎంపిక

వర్షాకాలానికి ముందే ఒక నది భాగంలో కొంత విస్తీర్ణం సర్వేక్షణ (Survey) చేయాలి. స్థలం చుట్టు పక్కల ఉండే భూమి ఎల్లలను, గట్టు ఇక్షణాలను ద్రువపరచుకోవడానికి ఈ సర్వేక్షణ జరుపుతారు. దీనివల్ల కార్యక్షేత్ర (Operational area) పరిధి నిర్ణయానికి, వలలు వేసే పనికి సౌకర్యం కలుగుతుంది. దీనివల్ల నదిలో వరదలు వచ్చే దశలను అప్పుడు ఏర్పడే అలల ఇక్షణాలను తెలుసుకోవచ్చు. వర్షాకాలంలో చేప సముదాయం అంచనా, పెద్ద కార్ప్ చేపల సమృద్ధిని కనిపెట్టవచ్చు. ఉపనదుల, పిల్లనదుల, కాలువల స్థానాలను గమనించవచ్చు ఎందుచేతనంటే ఇవే గుడ్డు పెట్టే స్థలాలను నదులలో కలుపుతాయి.

నది మైదానాలలో వంకర టింకరగా ప్రవహించడంవల్ల మెలికలు తిరిగి ఉంటుంది. ఈ మలుపులు, మెలికలు ఎన్నో రకాలుగా ఉండడం చేత సాధారణంగా గట్టు ఒకవైపు వేగంగా కోసుకుపోతుంటుంది. దీన్ని విలయ మండలం (Erosion zone) అని పిలుస్తారు. దీనికి సరిగ్గా ఎదురుగా చదునుగా ఏటవాలుగా ఉండే గట్టును స్వల్పజల మండలం అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ రెండు మండలాలు గుడ్డు చేపల సేకరణకు అనువైనవికావు. ఏటవాలుగా ఉండే గట్టు రెండు వైపులా ఉండే ప్రాంతాలలో గుడ్డు చేపల సేకరణ సాధారణంగా బాగుంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో నది ప్రవాహం అమాంతంగా మలగడంవల్ల గుడ్డు చేపలను పక్కలకు విసిరి వేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రవాహం ఒక కేంద్రావసర శక్తిగా పని చేస్తుంది. ఈ స్థానాలలో గుడ్డు చేపలను సేకరించే వలలను పాళి, పట్టుకుంటారు.

నదిలో మొదట వచ్చే వరదల్లో అవాంఛనీయమైన అనర్థదాయకమైన చేవనారు వస్తుంది. తరువాత వచ్చే వరదల్లో పెద్ద కాళ్ళ గుడ్డు చేపలోస్తాయి. రోజులో ఎప్పుడైనా గుడ్డు చేపలను సేకరించవచ్చు. కాని రాత్రివేళ దిగుబడి బాగుంటుంది. వరదల్లో నీటిమట్టం బాగా పెరిగినా తగ్గినా గుడ్డు చేపలు పెట్టడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. నీటిమట్టం పెరగడంవల్ల గుడ్డు పెట్టిన ప్రాంతాలనుండి గుడ్డు చేపలు కొట్టుకొని వస్తాయి.

ప్రవాహవేగం గుడ్డు చేపల ఎదురీతను ఉత్తేజపరుస్తుంది. ప్రవాహవేగం ఎక్కువయితే గుడ్డు చేపలు ప్రవాహానికి అడ్డంగా ప్రవాహం పోతాయి లేదా ఆశ్రయిస్తాయి. గంటకు 0.36-0.42 కి. మీటర్లకంటే వేగం హెచ్చిపోతే ఇవి కొట్టుకొని పోతాయి. గంటకు 1-3 కి.మీటర్ల తక్కువ ప్రవాహ వేగమున్నప్పుడు నదిలో రువ్వేపల అమర్చినట్లయితే వీటి సేకరణ అత్యధిక సంఖ్యలో జరుగుతుంది. మిగతా జలజీవకారకాలు, బురద, పి.హెచ్, ఉష్ణోగ్రత, గాలి, వ్లవకాలు, కరిగిన అక్సిజన్ మొదలైన వాటి ప్రభావం గుడ్డుచేప సేకరణపై ఉండదు.

8.9 బందాలలో ప్రజననము

అవసరమైన చేవనారు బందాలవంటి ప్రాకృతిక వనరుల నుండి కూడా సమీకరించవచ్చు. బందాలు అనేవి ప్రత్యేకరకమైన చెరువులు. వీటిలో నదులస్థితులను అనుకరిస్తారు. ఇవి సహజనిర్మితాలు లేదా కృత్రిమ కట్టడాలు. వీటిలో సంవత్సరమంతా నీళ్లు నింపుతుంటారు కాబట్టి ఇవి శాశ్వతమయినవి. కొన్ని చెరువులు వర్షాధారాలు కాబట్టి కాలానుగుణ్యమైనవి. బందాలకు నీళ్లు ఎత్తైన పరివాహక ప్రాంతాల నుండి కొట్టుకొస్తాయి. బందాల అంచులలో విస్తారంగా తక్కువలోతుగా ఉండే నీటి ప్రాంతాలు తయారవుతాయి. ఇవి చేప గుడ్డు పెట్టడానికి ఎంతో అనువైనవి.

బందాలు రెండు రకాలు : (1) శాశ్వత బందాలను తడిబందాలంటారు (2) వర్షాధార బందాలను పొడి బందాలంటారు.

బందాలలో ప్రజననంచేసే పెద్దకార్ప్లపై దిగువరకాలు ప్రభావితం చేస్తాయి:

1. ఎగువగా ఉండే విశాల ప్రాంతంనుండి వాననీళ్ళతో కొట్టుకొచ్చే ఒండ్రుబందాలలో చేరుతుంది.
2. బందాల అంచులలో విశాలమైన తక్కువ లోతుతో ఉండే ప్రాంతాలుంటాయి. ఇవి గుడ్డు చేపల వృద్ధికి ఆదర్శప్రాయమైనవి.
3. ఇసుకతో కలిసిన నేల చేపల ప్రజనన క్రియకు యోగ్యం.
4. లోతు తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలోని నీళ్ళలో అక్సిజన్ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తడి బందాలలో వర్షాలమూలంగా పాత నీరు కొట్టుకొనిపోయి, కొత్తవాననీరొస్తుంది.
5. వేర్వేరు పరిసరాలలో గుడ్డుపెట్టే ప్రాంతం ఉష్ణోగ్రత 22° సి నుండి 33° సి వరకు ఉంటుంది.

8.10 గుడ్డు పెట్టడం

పెద్దవర్షాలు కురిసి బందాలలోకి నీరుబాగా వచ్చిన తరువాత తడి, పొడి బందాలలో గుడ్డు పెట్టడం సామాన్యంగా జరుగుతుంది.

తడి బందాలలో ఎక్కువలోతుగా ఉండే ప్రాంతంలో గుడ్డుపెట్టే పెద్దకార్ప్లుంటాయి. ఎంతాకాలంలో కూడా భారీవర్షాలు పడినతరువాత పరివాహక ప్రాంతం నీరు వాగులలో ప్రవహించి బందాలలో చేరుతుంది. బందాలలోని చాలా భాగం నీళ్ళలో ముణిగి పోతుంది. ఎక్కువగా పడిన నీళ్లు బయటి మార్గం నుండి పోతాయి. ఈ మార్గం బొంగు కంచెతోను గడ్డి బురదతోను సురక్షితంగా ఉంటుంది.

బందాలలోని లోతు తక్కువ ప్రాంతాలలో అనువైన పరిసరాలుండడంవల్ల కార్ప్ ప్రజననం చేస్తుంది. ఎటువంటి పరిస్థితులుంటే అవి ఈ బందాలలో సహజంగా ప్రజననం చేయగలవో ఖచ్చితంగా తెలియవు.

పొడి బందాలలో ఒక జట్టు పెద్ద కార్ప్లను 2 మగవాటికి 1 ఆడచేప నిష్పత్తిలో ప్రవేశపెడతారు. చిన్న చేపలు ముందుగా ఉత్తేజితమై ప్రజననం చేస్తాయి. వీటి వెనువెంటనే పెద్ద చేపలు ప్రజననం చేస్తాయి ఈ చేపల బందాలలోని లోతు తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాన్ని గుడ్లు పెట్టడానికి వెతుకుతూ ఉంటాయి.

కొద్దిమార్పులు చేయడంవల్ల బందాలలో ప్రజననం చేసే పరిస్థితి మెరుగుపడింది. ఎత్తైనచోట జలాశయం ఏర్పాటుచేసి నీళ్ళు నిలువ ఉంచుతారు ఈ జలాశయం దిగువుగా వరుసగా చిన్న చిన్న బందాలు వాటికి ప్రవేశ నిర్గమ మార్గాలు ఉండేట్లుగా కడతారు. దీని వల్ల వర్షాకాలంలో వాననీటితో తదితర కాలాలలో జలాశయం నీటితో ఈ బందాలు నిండి ఉంటాయి. పొడి బందాలలో జలాశయ వినియోగం అత్యంత ముఖ్యం.

వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ చేపల అత్యధిక సంఖ్యలో గుడ్లు పెట్టాలంటే పొడి బందాలు నమ్మదగినవిగా పరిగణిస్తారు. రాత్రిళ్ళు లేక బాగా వెలుతురుండే ఉదయం ఇవి గుడ్లు పెట్టవచ్చు. మ్రెగాల్, రోహ ఉదయం ఉపాంత (Marginal) ప్రాంతాలలో గుడ్లు పెడతాయి. కాగా కట్ల పెద్ద పరిమాణంతో ఉండేది కాబట్టి లోతు నీళ్ళలో మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు గుడ్లు పెట్టుతుంది.

పెద్దకార్ప్లలో బాప్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. ఫలదీకరణం చెందిన అండాలును జనకాలు (Parents) వదిలి వేస్తాయి. అండాలు బందాల అంచులకు కొట్టు వస్తాయి లేదా కిందికి పోతాయి. బందాలలో గుడ్లు చాలా మట్టుకు లోతు తక్కువగా ఉండే నీటిలోకి చేరతాయి. అక్కడ అవి పారిపోయిన తెలుపు రంగును నీటికి కల్పిస్తాయి. ప్రాథమిక లోతైన ప్రాంతాలకు కదలి పోతాయి.

8.11 గుడ్ల సేకరణ

బందాలలోని గుడ్లను జాలీ గుడ్డతో తయారైన వలలతో సేకరిస్తారు. వీటిని అభివృద్ధి పరచిన గంటలలో లేదా జోడు కుడ్డాలతో ఉండే పొదిగే హోవాలలో లేదా సిమెంటు తొట్టెలలో పడవేస్తారు. పొదగ వేసే గంటల పరిమాణం 448 సెం.మీ. x 244x46 సెం.మీ. వీటిని కట్టమీద తవ్వతారు. నీరు సరఫరా చేస్తారు. ప్రతి ఒక గంటలో 9,00,000 నుండి 22,00,000 గుడ్లు వేయవచ్చు. వీటిలో 2.5-25.0% వరకు నమ్మకంగా పొదుగుతాయి.

జోడుకుడ్డాల హోపా తయారీలో బయటి హోపా 182x91x91 మి.మీటర్ల పరిమాణంతో మామూలు గుడ్డతో కుట్టినది, కాగా లోపలి హోపా గుండ్రని కన్నాల దోమ తెరగుడ్డతో తయారై 152x76x46 సెం. మీటర్ల కొలతలతో ఉంటుంది. ఈ హోపాను బందాలలో పాతుతారు. దీనిని పరిపూర్ణ శయానగా (Horizontal) 23-30 సెం.మీటర్ల లోతునీటిలో పాతుతారు. పొదగిన చేపలు లోపలి హోపానుండి బయటిహోపాలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అందులో వీటిని మూడు రోజులుంచి, అలవాటు చేసి, తరవాత నిలువచేస్తారు. వీటిలో 32-50 శాతం వరకు బతికి ఉంటాయి.

బందాల దగ్గర సిమెంటు హోవరీలు వెట్టి పొదిగిన చేపలను వేయవచ్చు. వీటి పరిమాణం 2.40x1.20x0.30మీటర్లు. ఇవి అర్ధికంగాని, 97 % చేపలు జీవించడానికి ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

నదుల నుండి, బందాల నుండి సేకరించిన గుడ్లు చేపలు వివిధ జాతుల మిశ్రమంగా ఉంటాయి. వీటిని గుండ్రని కన్నాల దోమతెర గుడ్డతో వడపోసి, నీళ్ళలో వేలాడే మల్లుగుడ్డ మీద పోస్తారు. నీళ్ళలో కరిగిన ఆక్సీజన్ వినియోగం ఆధారంగా గుడ్లుచేపల జాతులను విడదీసే ప్రయత్నం జరిగింది. నీటిలోని ఆక్సీజన్ ను పూర్తిగా ఉపయోగించిన తరవాత గుడ్లుచేపలు ఉపరి తలానికి కదిలి గుమిగూడతాయి.

మిగిల్ గుడ్డు చేపలు ముందుగా ఉపరితలంపైపు కదలగా, పరస్పర వాటిని కట్ట, రోహ గుడ్డు చేపలు అనుసరిస్తాయి.

జలజీవశాస్త్ర అక్షణాలైన పి.పాచ్. కరిగిన అక్సీజన్, క్షారత, క్లోరైడ్లు, ఖనిజ లవణాలు మొదలైన వాటి ప్రత్యేక పాత్ర బందాలలో కార్ప్ చేపల ప్రజననంలో లేదు. వర్షాకాలంలో వచ్చే భారీ వరదలు, గుడ్డు పెట్టే ప్రాంతాలపై హఠాత్తుగా వాన నీరు కొట్టుకొనిరావడం వంటివి గుడ్డు పెట్టడానికి దోహద పడతాయి.

8.12 గ్రామీణ చెరువుల వృద్ధి

దగ్గరలోని కాలువను మామూలు చెరువులోకి మళ్ళించి అందులో చేపలు పెంచి లాభం పొందవచ్చు. దీని స్థితిని శాశ్వత బందాల మాదిరిగా మార్చాలి. చెరువులో నీరు నింపాలి. చేపలు గుడ్డు పెట్టే ప్రాంతంలో దాదాపు 1 అడుగు నీటి లోతు ఉండేట్లు చూడాలి. ఇక్కడ ఎక్కువ నీరు నిలవకుండా నిర్లమ మార్గాన్ని క్రమబద్ధం చేయాలి. ఇటువంటి చెరువులలో చేపలు గుడ్డు పెడతాయి. ఇంతేగాక వీటిలో బీజకోశాల వృద్ధిని, లైంగిక పరివర్తనను పరిశీలించవచ్చు. చేపలను పెంపకం చేసే స్థలాన్నిబట్టి, పెన వర్ణితమైన ఆర్థికపరమైన విషయాలను, నిలువ జేయటానికి సంబంధించిన అంశాలను దృష్టిలోనుంచుకొని చేప నారును సంపాదించడం అత్యుత్తమమైన మార్గము.

స్వపరిశీలన

1. గుడ్డు చేపలను సేకరించడానికి ఉపయోగించే వలను _____ అని పిలుస్తారు.
2. బందాలలో ప్రజననము _____ కాలము రాగానే మొదలగును.

8.13 సారాంశము

నదులలో గుడ్డు చేప సేకరణ వర్తకులను గురించి ఈ పాఠములో చెప్పబడినది. నదులలో యేదో ప్రాంతములలో గుడ్డు చేపలు విరివిగా లభించునో కూడ ఇక్కడ వివరించబడినది. గుడ్డు చేప సేకరణ కుపకరించే వలలను గురించి, వాటి సేకరణా విధానమును గురించి విపులీకరించబడినది. బందాలలో ప్రజననమును గురించి కూడ ఈ పాఠ్యాంశములో చెప్పబడినది.

8.14 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. రువ్వేవల
2. వర్షా

8.15 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

1. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.
 1. భారతీయ నదులలో లభించే వివిధ చేప నారు వనరులు ఏవి?
 2. గుడ్డు చేప సేకరణ కోసం నదులలో అవలంబించే విధానాలను వివరింపుము.

3. బందము అంటే ఏమిటి? బందాలు ఏ విధంగా కార్పిల ప్రజననానికి దోహదం చేస్తాయో వివరింపుము.

II. ఈ క్రింది ప్రతిప్రశ్నకు 15 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. పొడి బందాలలో ప్రజననం.
2. తడి బందాలలో ప్రజననం.
3. గుడ్డు చేప. నేకరించే వల
4. నదుల దొంగ తిరుగుళ్ళు.

భాగం-9 ప్రేరేపిత ప్రజననము, హాచరీవ్యవస్థ, చేపనారు రవాణా

విషయక్రమం

- 9.1 ఉద్దేశ్యం
- 9.2 ఉపోద్ఘాతం
- 9.3 పియూషగ్రంథి
- 9.4 పియూష గ్రంథి నేకరణ, సంరక్షణ
- 9.5 గుడ్లు పెట్టే చేపల నిర్వహణ
- 9.6 ప్రేరేపిత ప్రజనన ప్రక్రియ
- 9.7 గుడ్లు పెట్టే చేపల ఎంపిక
 - 9.6.1 గుడ్లు పెట్టే చేపల ఎంపిక
 - 9.6.2 పియూషగ్రంథి సారం మౌతాదు.
 - 9.6.3 పియూషగ్రంథి సారాన్ని తయారుచేయడం, ఇంజక్షన్
- 9.7 గుడ్లు పెట్టడం
- 9.8 గుడ్ల అంచనా
- 9.9 చైనా వెండికార్ప్, గడ్డి కార్ప్-చేపలలో ప్రేరేపిత ప్రజననము
- 9.10 సామాన్య కార్ప్ ప్రజననం
- 9.11 హాచరీ వ్యవస్థలు
- 9.12 ఆధునిక భారతీయ హాచరీవ్యవస్థ
- 9.13 చేపనారు రవాణా
- 9.14 సారాంశము
- 9.15 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 9.16 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

9.1 ఉద్దేశ్యం

బంధిత జలాల్లో ఆధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతులలో సంవర్ధిత చేపల పెంపకాన్ని ఈ భాగంలో వివరించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున వాటి గుడ్లను పొదిగించి సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు రవాణా చేసే రీతులను ఈ భాగం చర్చిస్తుంది. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వల్ల భారతదేశంలో శ్రేష్ఠమైన చేప నారు లభ్యమయ్యే స్వస్థియ వనరులతో బాటు చేపల పెంపకాన్ని తీవ్రంగా విస్తరించే అవకాశం కలుగుతుంది.

9.2 ఉపోద్ఘాతం

భారతదేశంలో ప్రాచుర్యమయిన పెద్దకార్ప్ కట్ల (కట్ల కట్ల), రోహా (లేబియోరోహిట), మిగాలో (సిరినా మిగాలా), చైనా కార్ప్ మొదలైన చేపలు, వెండికార్ప్ (వైపోఫ్టార్క్టిన్ మెలిట్రిక్స్),

గడ్డికార్ప్ (టెస్టోస్టెరాన్ బడెల్) వగైరా చేపల బీజకోశాలు పరిపక్వ దశకు చేరినా, మంచిసీటి కుంబల్లో ఎంత విస్తృతంగా పెంపొందుతాయో అంతగా బంధిత జీవాలలో సంతానోత్పత్తి చేయవు.

భారతీయ పెద్ద కార్ప్లు, చైనా కార్ప్లు వర్షాకాలంలో నదులలో గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను పొదుగుతాయి. భారతీయ కార్ప్లను తడిపాడి బండ్లలో వర్షాకాలం నదుల మాదిరి పరిస్థితులను కల్పించి సంతానోత్పత్తికి తగు ప్రత్యేక పరిసరాలను తయారు చేయవచ్చును.

అందుచేత చేపల పెంపకదార్లు నదీ వ్యవస్థల నుండి చేపనారును సమీకరించుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా సేకరించిన కార్ప్ చేపనారు శ్రేష్టమయినదిగా ఉండక నష్టదాయకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పరిమితంగా, అవసరమయ్యే లభ్యమయ్యే ఇట్టి చేపనారుకు ఒదులు సంవర్ధిత భారత, చైనా దేశాల కార్ప్ల స్వచ్ఛమైన నారును యోగ్యమైన పద్ధతులను అవలంబించి వృద్ధి చేసుకోవాలనే భావనకు వృష్టి కలిగింది.

ఈ దశలో జరిగిన పరిశోధనల ఫలితంగా 1957లో హెచ్. ఎల్. చౌధురి, కె. హెచ్. అలికుష్టి ప్రభువులు సెంట్రల్ ఇంలాన్డ్ ఫిషరీస్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసిన కృషివల్ల, భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలైన రోహా, మ్రెగాల్లలో పీయూషగ్రంథి ప్రాపాలతో మొట్టమొదట నారిగా చేపనారు ఉత్పత్తి జరిగింది.

అప్పటినుండి అనేక భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రాముఖ్యతను ఇంకా మెరుగు పరిచారు. చైనా కార్ప్లో కూడా 1962లో ఈ ప్రేరేపిత ప్రజననం విజయవంతమయింది. భారతదేశమంతటా కార్ప్ మంచి చేపనారును సంవర్ధించటానికి ఈ పద్ధతి నమ్మదగినదిగా పేరొందింది. ప్రేరేపిత ప్రజననంవల్ల సంకర జాతులను ఎంపికచేసి పెంపొందించే అవకాశం కూడా కలిగింది.

నియంత్రిత పరిస్థితులలో, పీయూషగ్రంథి హార్మోన్లను ఇంజక్షన్ ద్వారా చేపకు ఎక్కించి గుడ్లు పెట్టించే సాంకేతిక విధానాన్ని "ప్రేరేపిత ప్రజననం" లేదా హైపోఫైసేషన్ అని పిలుస్తారు.

9.3 పీయూషగ్రంథి

చేపలలో పీయూషగ్రంథి ఒక ముఖ్యమైన అంతస్స్రావిగ్రంథి. ఇది చిన్నగా, గుండ్రంగా, పియర్ ఆకారంతో మెడడు ఉపరితలంమీద దృష్టి స్పష్టికం వెనకగా, సెల్లాటర్పికా అనేకపాలం నేల మీది గుంబలో ఉంటుంది.

ఉన్నత సకళేరుకాలలో వలెనే చేప పీయూషగ్రంథి కూడా ఎన్నో హార్మోన్లను స్రవిస్తుంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి: గోనాడ్ట్రాఫిన్- బీజకోశాలను ఉత్తేజపరచే హార్మోన్, సామాటోట్రాఫిన్- పెరుగుదలనుత్తేజపరచే హార్మోన్, థైరోట్రాఫిన్- అవటుగ్రంథి సుత్తేజపరచే హార్మోన్, పైరాక్సిన్. టిరియోస్ట్ చేపల పీయూషగ్రంథిలో FSH, LH వంటి గోనాడ్ ట్రాఫిన్లున్నా అని నమ్ముతున్నారు. గోనాడ్ ట్రాఫిన్లు వాతావరణ కారకాలైన మాన్యున్ వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రత, కాంతిపరిమాణ (Photoperiod) మొదలైన వాటివల్ల ప్రభావితమవుతాయి. ఇవి చేపల ప్రత్యుత్పత్తి చక్రాన్ని క్రమబద్ధం చేస్తాయి.

9.4 పీయూషగ్రంథి సేకరణ, సంరక్షణ (Preservation)

పీయూషగ్రంథిని అప్పుడే చంపిన పరిపక్వ చేప (దాత) నుండి లేదా మంచులో సురక్షితమైన చేపల నుండి సేకరించటం అత్యుత్తమం. అదే జాతికి లేదా సన్నిహిత సంబంధంగా జాతులకు చెందిన మగ, ఆడ చేపలనుండి గ్రంథులను సేకరించవచ్చు.

మార్కెట్లలో లభ్యమయ్యే గాయపడిన చేపల తలను శుభ్రపరచి, తల వెనుక కనిపించే మహారంధ్రం (Foramen magnum) నుండి పీయూషగ్రంథిని సేకరించవచ్చు.


గాడతను తగ్గించుకోవాలి. ఈ స్రావం అతి పలుచగా లేదా గాఢంగా ఉండకూడదు. 20-30 మి. గ్రాంల గ్రంథివి 1 మి.లీ. మార్భమంతో పలుచగా చేస్తారు. 1 మి.లీ గరిష్ఠస్థాయిలోను, 0.1 మి.లీ. కనిష్ఠస్థాయిలో గుడ్లు పెట్టే చేప పరిమాణానికి అనుగుణ్యంగా గ్రంథిసారం ఉండే అవలంబనాన్ని (Suspension) ఇంజక్షన్ చేయాలి.

పీయూషగ్రంథి అవలంబనాన్ని విద్యుత్ యంత్రం ద్వారా లేదా చేతితో నడిపే యంత్రం ద్వారా కేంద్రావసరణం (Centrifuge) చేయాలి. ఇందువల్ల కణజాలం తునకలు కేంద్రావసారక నాళిక అడుగున నిలకడ చెందిన అవసాదనం (Sediment) గా ఉండిపోతాయి. హార్మోన్ తో ఉండే తేలిక వైద్రవాన్ని పిరంజిలోకి ఎక్కిస్తారు.

అంతర కండర ఇంజక్షన్ సులభము. ఎక్కువ ప్రభావితం. ఉరో లేదా శ్లోణి వాజ మూలంలో అంతర అంత్రవేష్టన ఇంజక్షన్ వల్ల అంతరంగాలు దెబ్బతినవచ్చు. ఈ ఇంజక్షన్ ను పుచ్చియ వృంత ప్రాంతంలో ఉండే పాలును కింద ఇస్తారు. ముందు సూదిని చేప శరీరానికి సమాంతరంగా ఉంచి గుచ్చాలి. తరువాత ఒక కోణంలో కండరాలలోకి చొప్పించాలి. దీనికి ఉపయోగించే అధశ్చర్మ (Hypodermic) సిరెంజి 2 సీసీ పరిమాణం 0.1 సీసీ విభాజకాలతో ఉంటే చాలా సానుకూలము. సిరెంజ్ సూది పరిమాణం ఇంజక్షన్ ఇచ్చే చేప పరిమాణంపై ఆధారితమయింది. (BDH) సూది నెం. 22 ను. 1 నుండి 3 కి.గ్రాంల బరువుండే గుడ్లు పెట్టే కార్ప్ చేపకు వాడతారు. సూది నెం. 19 అంతకంటే పెద్దదానికి, 24 కంటే చిన్నదానికి వాడతారు.

రెండు మగ ఒక ఆడ గుడ్లు పెట్టే చేపల జట్టును వాటి పరిమాణం, బరువు ప్రజనన హాపా (Breeding hapa) లోకి ప్రవేశపెడతారు. మగ చేప బరువు ఆడదాని కంటే కొంచెం ఎక్కువగానో లేదా సమానంగానో ఉండాలి.

ప్రజననహాపా ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార పెట్టె. దీని నాలుగుమూలల్లో బొంగుగడలకు కట్టబానికి తాళ్ళు ఉంటాయి. వైన శయన (Horizontal) గా ఉండే ఒక భాగంతప్ప హాపా అన్ని పక్కలా కుట్టివున్నందువల్ల మూసి ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి చేపను ఈ రంధ్రం ద్వారా హాపా లోపలికి పంపడమో లేదా బయటకి తీయడమో జరుగుతుంది. చేపను ప్రవేశపెట్టిన తరువాత హాపా రంధ్రాన్ని నాడాతో గట్టిగా మూస్తారు కాబట్టి తప్పించుకోలేదు. ప్రజననహాపాను దోమతెర గుడ్లతో (నైలాన్ గుడ్ల శ్రేష్ఠం) తయారు చేస్తారు ఈ రకమైన గుడ్లవల్ల హాపాలో నీటి భ్రమణానికి ఆటంకం ఉండదు. వేర్వేరు బరువులతో ఉండే భారతీయ కార్ప్ సమూహాలకు నాలుగు పరిమాణాల హాపాలను వాడవచ్చును.



పటం 9.2 ప్రజనన హాపా - వైన అడ్డంగా ఉండే మడతను తెరిచి చూపించడం జరిగింది. నాలుగు బొంగులతో పాటిన దృశ్యం. 1. గుండీ 2. వైన అడ్డంగా ఉండే మడత (పొర) 3. తెరిచిన చివర 4. గుండీ రంధ్రం 5. నిలుపు మడత (పొర).

1. 3.5x1.5x1.0 మీ	చేపల	బరువు	5.0	కి.గ్రా.
2. 3.0x1.5x1.0 మీ	"	"	3.5	"
3. 2.5x1.2x1.0 మీ	"	"	1.3	"
4. 1.8x0.9x0.9 మీ	"	"	1.0	"

హాపాను 15 నుండి 20 సెం.మీ. నీటి మట్టానికంటే ఎగువగా పుండేటట్టు కట్టాలి. ఇందులో కీటకాలు, పీతలు, మిన్నో చేపలు ప్రవేశించకుండా చూడాలి. హాపా పరిమాణంతో సమానంగా ఉండే సిమెంటు తొట్టెలో 30-35 సెం.మీ. మట్టం వరకు నీళ్ళు నింపికూడా వాడవచ్చు. కుళాయినిళ్ళు లేదా బావినిళ్ళు క్లారిన్ కలవనటువంటివి వాడవచ్చు.

9.7 గుడ్లు పెట్టడం

కార్ప్లు 24-35° C ఉష్ణోగ్రతలో గుడ్లు పెడతాయి. 30°C కంటే తక్కువ చాలా అనుకూలం. రెండో ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తరువాత 3-6 గంటలకు గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎంతశాతం గుడ్లు ఫలదీకరణం చెందినాయో అంచనా వేస్తారు. ఫలదీకరణం చెందిన గుడ్లు పారదర్శకంగా ఉండి, ఉబ్బినందువల్ల ముత్యాల మాదిరిగా ఉంటాయి. ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లు కొంత నిరోధకంగా, తెల్లగా ఉంటాయి. కార్ప్ గుడ్లు గుండ్రనివి, నీటిపై తేలనివి, దేనికీ అతుక్కోనివి. వీటి పరిమాణం 4-6.5 మి.మీ. వ్యాసం.

9.8 గుడ్ల అంచనా

హాపానుండి గుడ్లను కప్పు, ట్రే, బేకరుల ద్వారా బకెట్ లోకి మార్చుతారు. గుడ్లు పెట్టే చేపలను హాపానుండి తీసి తూచి గుర్తిస్తారు. బరువులోని తేడానుబట్టి పెట్టిన గుడ్లను అంచనా కడతారు. ఈ గుడ్లను దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉండే చిక్కని దోమతెర వలలోవేసి నీరు ప్రవహిస్తు ఉండేటట్టు చూస్తారు. ముందుగానే ఘనపరిమాణం తెలిసినట్టి కప్పలేదా మగ్తో ఈ గుడ్లను కొలిచి హాపాలోకి బదిలీ చేస్తారు. ఈ విధంగా గుడ్లమొత్తం పరిమాణాన్ని కొల్చిన మొత్తం ఘనపరిమాణం అధారంతో అంచనా కడతారు. 1 మి.లీ. కొలతలోని ఫలదీకృత గుడ్ల శాంపిల్ ల సంఖ్యను బట్టి ఫలదీకరణ శాతాన్ని నిర్ణయిస్తారు.

9.9 చైనా వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ చేపలలో వ్రేరేపిత ప్రజననము

భారతీయ పెద్దకార్ప్ లో జరిపే మాదిరిగానే వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ చేపలలో కూడా ఇంచుమించుగా హైపోఫైనేషన్ చేస్తారు. పెద్దకార్ప్ లు హాపాలో ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తరువాత సహజంగానే గుడ్లు పెడతాయి. కాని వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ లను బీజ రాహిత్యం (Scripping) చేసి, గుడ్లను కృత్రిమంగా ఫలదీకరిస్తారు.

పరిపక్వ చేపల జట్టుకు ఒక ఆడది రెండు మగవి-గుడ్లు పెట్టడానికి ఎంపిక చేసుకొని పీయూష సారాన్ని ఇంజక్షన్ ద్వారా ఎక్కిస్తారు. ఆడ చేపకు రెండు ఇంజక్షన్లు, మగ చేపకు ఒకే ఒక ఇంజక్షన్ ను, ఆడ చేపకు రెండోది ఇచ్చే సమయంలో, ఇస్తారు. 9-12 మి.గ్రాంలు పీయూష గ్రంథిని రెండు మోతాదుల్లో ప్రతి ఆడచేప కిలో శరీరం బరువు చొప్పున ఇవ్వాలి. మగ చేపకు కిలోగ్రాం శరీరం బరువుకు 3-4 మి.గ్రాంల చొప్పున గ్రంథిని ఒకే మోతాదుగా ఇవ్వాలి. రెండో మోతాదు ఇచ్చిన తరువాత నియమితంగా ప్రతిగంటకొకసారి ఆడచేపను గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే దాని

ఉదరభాగాన్ని నాజాకుగా తాకగానే గుడ్డు వెలువడే స్థితికి చేరుతుందో, అప్పుడు దాన్ని గుడ్డు పెట్టే హాపానుండి బయటకు బీజరాహిత్యానికి, ఫలదీకరణానికి తీయాలి.

ఆడ చేపల బీజరాహిత్యం, గుడ్ల ఫలదీకరణం రెండు పద్ధతులలో జరుగుతుంది. మొదటి పద్ధతి నిర్జల బీజరాహిత్యం, రెండవది సజల బీజరాహిత్యం.

నిర్జల బీజరాహిత్యాన్ని మామూలుగా పొడి పద్ధతి అని వ్యవహరించవచ్చు. ఈ విధానంలో చేప శరీరం మీది తేమను పొడి గుడ్లతో తుడిచి వేస్తారు. ఆడచేప ఉదర భాగాన్ని తాకుతూ బీజరాహిత్యం చేయడంవల్ల వెలువడే అండాలును ఒక పొడి గిన్నెలో ప్రోగుచేస్తారు. వెన్యెంటనే మగ చేపను బీజరాహిత్యం చేయడంవల్ల వెలువడే మిల్క్స్ను ఆ అండాలపై పడునట్లు చేస్తారు. గిన్నెను కదిపి లేదా ఈకతో నెమ్మదిగా కలిపి మిల్క్స్తో అన్ని అండాలును తాకిస్తారు. అటు తరువాత మంచి నీటితో కొన్ని తడవలు ఫలదీకరణ చేసిన గుడ్లను కడుగుతారు.


సజల బీజరాహిత్యాన్ని తడి పద్ధతి అని వ్యవహరించవచ్చు. ఈ విధానంలో గిన్నెలో నీళ్లు నింపి ఆడ, మగ చేపల బీజరాహిత్యం ఒకేసారిగా చేసి అండాలును, మిల్క్స్ను నీళ్లలో పడవేస్తారు. ఈ విధంగా ఫలదీకరణం చేసిన అండాలు గట్టిపడిన తరువాత వాటిని హాపాలు లేదా గాజు హాచరీలలోకి పొదగడానికి మార్చుతారు.

9.10 సామాన్య కార్ప్ ప్రజననం

సామాన్య కార్ప్ (సిప్రినస్ కాఫ్రియో) బంధిత జలాలలో సాధారణంగా గుడ్డు పెట్టుతుంది. జనవరి నుండి మార్చి, జులై నుండి ఆగస్ట్ వరకు రెండు దఫాలుగా నీటి మొక్కలు పెరిగే లోతు తక్కువగా ఉండి, అంచులలో ఏర్పడే గుంటలలో ఇది గుడ్డు పెట్టుతుంది. ఏడాది పొడుగునా కూడా ఇది గుడ్డు పెడుతుందని పరిశీలనలో తేలింది. పీటిని నియంత్రిత పరిస్థితులలో గుడ్డు పెట్టించడంవల్ల మేలురకమైన గుడ్డు తయారవడమేగాకుండా బాగా పొడుగుతాయి కూడా. ఎంపిక చేసిన ఒక ఆడ, రెండు మగకార్ప్ చేపలను గుడ్డు పెట్టే హాపాలో వేసి ఫలవంతం చేయడానికి ఆడ చేపకు కిలో శరీరం బరువుకు 2-3 మి.గ్రాంల పీయూష సారాన్ని తక్కువ మోతాదులో ఇస్తారు. హాపాలో తాజా నీటి మొక్కలను (ప్రాడ్రిల్లా నాజాన్, ఇకోర్నియా మొ.) ఒకటే తీరుగా అంతటా విస్తరిస్తారు. ఈ మొక్కలు గుడ్లను జమచేయడానికి వనికి వస్తాయి. ఈ మొక్కల పరిమాణం ఆడచేప బరువుకు దాదాపు రెండింతలుంటుంది. ప్రతి మొక్కకు 40,000 నుండి 1,00,000 వరకు గుడ్డు అంటుకొని, హాపా అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి. 4,5 రోజుల తరువాత ఈ మొక్కలను జాగ్రత్తగా బయటికి తీస్తారు.


9.11 హాచరీ వ్యవస్థలు

పొదిగే హాపాలో సాధారణంగా గుడ్లను పొదిగిస్తారు. ఇది నిర్మాణంలో గుడ్డు పెట్టే హాపాను పోలి ఉంటుంది. ఇక్కడ దీర్ఘచతురస్రాకారంతో ఉండే రెండు హాపాలు ఒకదానిలో ఇంకొకటి అమరి ఉంటాయి. బయటి హాపా సన్నని కంఠలతో ఉండే మల్లుగుడ్లతో, 2x1x1 మీ. పరిమాణంలో నిర్మిత మవుతుంది. లోపలి హాపా గుండ్రటి కంఠలతో ఉండే దోమతెర గుడ్లతో 1.75x0.75x0.5 మీ. పరిమాణంలో తయారవుతుంది. పీటి పై అంచులు తెరచుకొని ఉంటాయి. పొదిగే హాపా పై అంచు నీటి మట్టానికంటే 25 నుండి 30 సెం.మీ. ఎగువగా ఉండేటట్లు కుంటలో హాపాను అమర్చుతారు.



పటం 9.3 సామాన్య కార్ప్ అండాలు-ఇకోర్నియా జాతికి అతికి వున్న దృశ్యం.

రమారమి 75,000 నుండి 1,00,000 గుడ్లను విస్తరించిన లోపలి హోపాఅడుగున అంతటా సమానంగా పరుస్తారు. వీటి ఉష్ణోగ్రతను బట్టి గుడ్లు పొదగడంలో మార్పులు ఉంటాయి. సామాన్యంగా 27 నుండి 31°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలో ఈ గుడ్లు 15-18 గంటలలో పొదుగుతాయి. తరవాత డింభకాలు లోపలి హోపా కన్నాలనుండి బయటి హోపాలో ప్రవేశిస్తాయి. గుడ్లు కర్పరాలు, చెడిన గుడ్లు లోపలి హోపాలో ఉండిపోతాయి. అన్నీ పొదిగిన తర్వాత లోపలి హోపాను తీసివేస్తారు. బయటి హోపాలోని పొదిగిన చేపలను కదవకుండా మూడు రోజుల వరకు ఉంచుతారు. మూడోరోజు బయటి హోపాలోని పొదిగిన చేపలను నేకరించుతారు. వీటి సానసంచి చాలా మట్టుకు శోషణం చెందుతుంది. గుడ్లు చేపలు జంతు ప్లవకాలను తినటానికి సిద్ధమవుతాయి. వీటిని నేకరించి, లెక్కించి, కొలిచిన తరవాత నర్సరీలలో బాగా పెరగటానికి నిలువచేస్తారు. ఈ పొదిగిన చేపలను సన్నని రంధ్రాలతో ఉండే ఘనపరిమాణం తెలిసిన అల్యుమినియమ్ కొలత కప్పుతో కొలుస్తారు. దీనివల్ల బతికి బాగుండే చేపలు దాదాపు 60 శాతం అని తేలుతున్నది.




పటం 9.4 తేలి వుండే పొదిగే హోపా 1. లోపలి దోమతెర హోపా 2. బయటిహోపా 3. నిలుపు బాహువు (ఆధారం) 4. దీర్ఘ చతురస్ర చట్రం.

9.12 ఆధునిక భారతీయ హోచరీ వ్యవస్థ

గుడ్డతో తయారయ్యే హోస్టోల్ చేప పిండాల అభివృద్ధి కొన్ని సందర్భాలలో నిలకడ లేని వాతావరణ పరిస్థితులవల్ల, ప్రాకృతిక ప్రమాదాలవల్ల-బారీ ఎత్తున దెబ్బ తింటాయి. ఈ పద్ధతి ప్రకారం ఎక్కువ పరిమాణంలో గుడ్డు చేపలను వృద్ధిచేయటం ఎన్నో సమస్యలతో కూడినది. వీటిని అధిగమించడానికి, నమ్మకంగా గుడ్డు పెట్టడానికి, పొదగడానికి బాహ్య వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా అత్యంత సమర్థవంతమైన హోచరీ వ్యవస్థను రూపొందించడానికి కృషి జరిగింది. గాజు జాడీ హోచరీలు, మట్టికుండ హోచరీలు, అల్యూమినియం లేదా పాలిఇథైలీన్ హోచరీ తొట్లు మొదలైన వివిధరకాల హోచరీలను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించి వృద్ధి పరచినారు.

గాజు జాడీ హోచరీ సంక్లిష్టం ఒక సర్వ సమృద్ధి ప్రమాణము. ఇది నీటి సరఫరా వ్యవస్థ, ప్రజనన కుంటలు, పొదిగే జాడీలు, స్పానరీ [Spawners] వగైరా వస్తువులతో ఏర్పడిన వ్యవస్థ. 4 మీటర్ల ఎత్తులో కట్టే జలాశయం ద్వారా నీటి సరఫరా వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. పంపు ద్వారా ఇందులో నీరు నింపవలసి ఉంటుంది. ప్రజనన కుంటల్లో గుడ్డుచేపలు వెంచుతారు. వీటికి జలాశయం నుండి జల్లుల రూపంలో నీటి సరఫరా జరుగుతుంది. దీనివల్ల పారేసిటికి గాలి బాగా తగులుతుంది. 50,000 కు ఒకటి చొప్పున 20 లక్షల గుడ్డును పట్టడానికి 40 పొదిగే జాడీలను అమర్చుతారు. 6.35 మీటర్ల పరిమాణంతో ఉండే పొదిగే జాడీ గాజు నిర్మితము. దీని పైభాగం స్తూపాకారం కాగా కింది భాగం గరాటు ఆకృతిలో ఉంటుంది. దీనిలో 50,000 గుడ్డు పట్టుతాయి. గుడ్డును నెమ్మదిగా దీనిలో వేస్తారు. ఈ జాడీలకు క్రమబద్ధంగా నీటి ప్రవాహం సరఫరా జరుగుతుంది. ఈ ప్రవాహం నిమిషానికి 600-800 మి.లీ. భారతీయ కాక్స్కు అయితే, 800-1000 మి.లీ. వెండి, గడ్డికాక్స్కు అవసరం. దీనివల్ల గుడ్డు అన్నివైపులా తిరుగులుగుతాయి. గుడ్డుకు ఈ విధంగా తగినంత ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది. దానివల్ల పొదిగే రేటు కూడా ఎక్కువవుతుంది. పొదిగిన తరువాత నీటి ప్రవాహం గతని వెంచవచ్చు. ప్రవాహ వేగం వెంచడం వల్ల పొదిగిన చేపలు సునాయాసంగా జాడీలనుండి బయటికి పోయే రంధ్రాల ద్వారా స్పానరీలోకి ప్రవేశించ గలుగుతాయి. అండ కర్పరాలు, చచ్చిన, కుళ్ళిన అండాలు జాడీలలో మిగిలిన వన్నిటిని నీటి నుండి విడదీసి జాడీలనుండి తీసిపారేయవచ్చు.



పటం 9.5 గాజు జాడీ సంక్లిష్ట హోచరీ 1. ఓవర్ హెడ్ జలాశయం 2. నీటి సరఫరా మార్గము 3. పంప్ 4. గాజు జాడీలు 5. ఫలదీకరణం చెందిన అండాలు 6. తెరిచిన కాండ్యూల్ 7. హోపా (స్పానరీ) 8. పిమ్మెంటు తొట్ట.

స్పానరీ నైలాన్తో తయారైన హాపా. ఇది ఒక సిమెంటు తొట్టిలో ఉంటుంది. దీనిలో నీటిని చల్లగా ఉంచడానికి, ఉష్ణోగ్రతను కాపాడటానికి, గాలి సరఫరా చేయడానికి దీని పైన నీటి షవర్ (Shower) అమర్చుతారు. ప్రతి స్పానరీలో పది ఇంక్చుల గుడ్డకు చోటు ఉంటుంది. షవర్ నుండి మూడు రోజుల వరకు నీటి జల్లులను, పొదిగిన చేపలు వెరిగి పనిచేప (Fry) లయ్యేంత వరకు విరంతరంగా కురిపిస్తుంటారు.

సంవర్ధిత కార్ప్ వంటి శ్రేష్ఠమైన చేప నారును ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రేరేపిత ప్రజనన పద్ధతిని దేశమంతటా అమలు చేస్తున్నారు. అందువల్ల పీయూష గ్రంథికి గిరాకి పెరిగింది. అత్యధిక సంఖ్యలో గ్రంథులను సమకూర్చడం కష్ట సాధ్యమైనందున, ఇటీవలి కాలంలో వీటికి ప్రత్యామ్నాయం చేపల పెంపకందార్లకు అవసరం ఏర్పడింది. సముద్ర పిల్లి చేపల పీయూషగ్రంథిని కార్ప్ ప్రజననం కొరకు విజయవంతంగా ఉపయోగించినాడు. ఈ మధ్య క్షీరదాల వరాయు గొనాడ్ బ్రాపిన్, సైనాహోరిన్ (వరాయు గొనాడ్ బ్రాపిన్, క్షీరద పీయూషసార మిశ్రమం) ఏకంగా లేదా చేప పీయూషగ్రంథితో కలిపి పరీక్షించినారు. సైనాహోరిన్ చేప పీయూష గ్రంథి కలిపి ఇచ్చిన ఫలితాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. గొనాడ్ బ్రాపిన్ హార్మోన్ ను విడతీసే చర్యలు ప్రారంభమయినాయి.

సాంకేతికంగా ప్రేరేపిత ప్రజననం ఎంతో విలువైనది. కారణం, ఇది స్వచ్ఛమైన చేపనారు లభించడానికి నమ్మదగిన మార్గము, సంకరణానికి ప్రాయోగిక సాధనం కావడమే. అధికోత్పత్తిని కలిగించే అంతర ప్రజాతి, అంతరజాతి సంకరాలను భారతీయ పెద్దకార్ప్, విదేశీయ కార్ప్ చేపలకు సంబంధించినవి. ఫ్లాఫోవై సేషన్ ప్రక్రియనుపయోగించి ఉత్పాదించడం అప్పుడే జరిగింది.

9.13 చేపనారు రవాణా

భారతదేశ తూర్పు రాష్ట్రాలలో చేపనారును మట్టి ప్రాంతాలలో ఉత్పత్తి కేంద్రం నుండి మార్కెట్ కు చేరవేయడం పురాతన సాంప్రదాయక పద్ధతి. ఫలితంగా చేపలు చాలా వరకు చచ్చిపోయేవి.

పరిశోధనల ద్వారా చేపనారు రవాణాకు విశ్వసనీయమైన పద్ధతులు కనుగొన్నారు. చేపనారు చావడానికి ముఖ్య కారణాలు ఈ విధంగా ఉంటాయని పరిశీలనలో తేలింది. ఆక్సీజన్ కొరత; కార్బన్ డయాక్సైడ్ అధిక తన్యత; మాధ్యమంలో అమోనియా, విసర్జక పదార్థాల ఉనికి వల్ల ఏర్పడే విషప్రభావం. అతి వైతన్యం, అలనట, గాయాలు మొదలైనవి.

చేపనారు బంగిలు తయారు చేయటానికి, రవాణాకు, రెండు పద్ధతులున్నాయి.

(i) అబంధిత పద్ధతి — మూతలేకుండా, మోసుకొని పోయేవి. కృత్రిమంగా గాలి, నీరు సరఫరా చేయకపోవచ్చు.

(ii) గాలి చొరబడకుండా సీలుచేసి ఆక్సీజన్ తో ఉండే నారును మోసుకొనిపోయేవి.

పైన తెలిపిన పద్ధతులలో దూర ప్రాంతాల రవాణాకు గుడ్డుచేపలను, పసిచేపలను పరిమిత ప్రాంతంలో నివసించే అలవాటు చేస్తారు. దీనికి తగిన సాధనాలతో అలవాటు చేస్తారు. వలతో తాత్కాలిక ఆవరణము, గుడ్డు హాపా మొదలగు అతి సామాన్యమైన అలవాటు చేసే పద్ధతి, కుంటలలో గుడ్డు హాపా దిగించి నారును ఉంచడం. అలవాటు పరచే కాలం చేపనారు పరిమాణాన్ని బట్టి, ఆరోగ్యాన్ని బట్టి, గుడ్డుచేపకు, పసిచేపకు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. పెద్దకార్ప్ పసిచేపకు, చిరు చేపకు దాదాపు 1 నుండి 6 గంటలు అలవాటు పరచి దూరప్రయాణానికి సిద్ధం చేయాలి. పరిమిత ఘనపరిమాణం (1.8-2.0 మి.లీల నీళ్ళు పసిచేప ఒక్కంటికి) నీటిలో కనిష్ఠ ఆక్సీజన్ 0.8 పి.పి.యమ్ ఉన్నప్పుడు అలవాటు పరచిన పసిచేపల రవాణా మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. పసి చేపలను, చిరుచేపలను అలవాటు పరచేటప్పుడు, రవాణా చేసేటప్పుడు వట్టి చేతులతో కదపకూడదు.

దీనివల్ల వాటి శరీరం, మీది జిగురు పదార్థం పాలునులు తొలగి పోయినట్లయితే, అవి శీలించ్రాలు, బాక్టీరియా సంక్రమణానికి గురి అవుతాయి.

రవాణా కొరకు "హండీ" అనే అల్కామినియం పాత్రలను వివిధ పరిమాణాలలో ఉండేవి వాడతారు. చిన్న హండ్ 20 సెం.మీ. వ్యాసంతో 23 లీటర్ల మనపరిమాణంతో ఉండి 50,000 పసిచేపలకు సరిపోను. శీదాన్ని తలమోపు బరువుగా పరిగణిస్తారు. అంతకంటే పెద్ద హండీ 23 సెం.మీ. వ్యాసంతో ౨౨ లీటర్ల స్తోమతతో ఉంటుంది. అందుదలో 75,000 చిరుచేపలు పట్టుతాయి. కాబట్టి రైలులో రవాణా చేయవచ్చు. రవాణా జరిగేటప్పుడు మధ్య మధ్య హండీని బాగా కదుపుతూ గాలిని తగలనిమ్మా ఉండాలి. కొన్ని సమయాలలో నీటిలో తేలాడే సేంద్రియ కాలుష్యాన్ని స్కందనానికి ఎర్రమన్ను కలుపుతారు. అడుగులో పేరుకునే అవసాదనాన్ని అప్పుడప్పుడు తీసివేయాలి. అవసరమనిపిస్తే పాక్షికంగా నీటిని మార్చాలి. ఈ రీకేమైన (మూతలేనిది) పసిచేపలను 30 గంటలు వట్టే దూరానికి రవాణా చేయవచ్చు.

38 సెం.మీ. ఎత్తు అడుగువ్యాసం 53 సెం.మీ. మూతివ్యాసం 20 సెంటీమీటర్ల కోలతలతో ఉండే అభివృద్ధి పరచిన లోహపు పాత్రలను ప్రస్తుతం రవాణాకు ఉపయోగిస్తున్నారు. కారణం, వెడల్పాటి పాత్ర మూతిని నన్నని రంధ్రాల మూతతో మూయవచ్చు. పాత్రలో నీటి తలంపైన గాలి ఆడటానికి కొంతచోటు వదలుతారు. ఇది చాలా చవక పద్ధతి అయినా దూర ప్రయాణం చేసేటప్పుడు నిరంతర జాగరూకత, తరచుగా నీటి మార్పిడి అవసరం. నీటిలో పెద్దగా పెరిగిన చిరుచేపల రవాణా కష్టం.

బంధిత చేపనారు బంగీ వ్యవస్థలో ఆక్సిజన్ సరఫరా గాలి నుండి జరగదు. బంగీలోని నీటిపైన ఉండే ఖాళీ స్థలంలో ఆక్సిజన్ నిండి ఉంటుంది.

ఇటీవల చిరుచేపల, పసిచేపల రవాణాకోసం పాలిథీన్ సంచులను ప్రవేశపెట్టినారు. 33 లీటర్ల స్తోమతతో 74x46 సెం.మీ. పరిమాణంతో ఉండే పాలిథీన్ సంచులలో చేపనారుతోబాటు ఆక్సిజన్ నింపి విస్తారంగా ఇప్పుడు రవాణా చేస్తున్నారు.

మరమ్మత్తుచేసి, తెరచే మూతతో ఉండే వాడుకలోని కిరసనాయిలు టిన్నులను లేదా తుప్పపట్టుని టిన్ రేకుతో అదే మూదిరి తయారుచేసిన డబ్బాలను చేపనారు రవాణాకు ఉపయోగించడం సరికొత్త పద్ధతి. ఈ డబ్బాలలో 45x65 సెం.మీ.ల పరిమాణం, 250-300 గేజ్ మందంగా ఉండే ప్లాస్టిక్ సంచులను పెడతారు. నీటి అడుగు భాగం మూసి ఉంటుంది. 6-9 లీటర్ల స్తోమతగల ఈ ప్లాస్టిక్ సంచిలో సగం లేదా 1/3 భాగం నీళ్ళతో నింపి చేపనారును అందులో వేస్తారు. తరవాత సంచిలోని గాలిని తీసివేసి ఆక్సిజన్ నింపుతారు. ఆక్సిజన్ ఎగిరి పోకుండా ఈ సంచిని జాగ్రత్తగా కట్టుతారు.

ఈ విధంగా నవీన హైపోవైసేషన్ ప్రక్రియనుపయోగించి మేలురకం చేపనారును ఉత్పత్తిచేసి చేపల పెంపకాన్ని చేయవచ్చు. భారీ ఎత్తున చేపనారు ఉత్పత్తి చేపట్టినట్లయితే అవసరాలు తీరడ మేగాకుండా లాభదాయకం కూడా. చేపనారు గిరాకీని పరిష్కరించాలంటే ఉదారంగా బ్యాంకులు అప్పులిచ్చి వైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించి పెద్ద తరహాగా చేపనారు ఉత్పత్తిని చేపట్టేందుకు సహాయమందించడమే ఏకైక మార్గం.

స్వపరిశీలన

1. ప్రేరేపిత ప్రజన ప్రక్రియకు _____ గ్రంథి చాలా ముఖ్యము.
2. ప్రజనన హోపా

9.14 సారాంశం

పీయూషగ్రంథి దాని వివరములు —

ప్రేరేపిత ప్రజనన ప్రక్రియలో పీయూషగ్రంథిని వాడే విధానము ఇక్కడ వివరించబడినది.

గుడ్డు పెట్టే చేపల ఎంపిక, చైనీస్ సిల్వర్ కార్ప్, గ్రాస్ కార్ప్లలో ప్రేరేపిత ప్రజనన ప్రక్రియ విధానములు ఇక్కడ వివరించబడినవి.

చేప రవాణా పద్ధతులకూడ ఇక్కడ వివరించబడినవి.

9.15 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. పీయూష
2. ప్రజనన హాపా ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార పెట్టె. దీని నాలుగుమూలల్లో బొంగుగడలకు కట్టటానికి తాళ్ళు ఉంటాయి. పైన శయన (Horizontal) గా ఉంటే ఒక భాగం తప్ప హాపా అన్ని పక్కలా కుట్టి ఉన్నందువల్ల మూసి ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి చేపను ఈ రంధ్రం ద్వారా హాపా లోపలికి పంపడమో లేదా బయటికి తీయడమో జరుగుతుంది. చేపను ప్రవేశ పెట్టిన తరువాత హాపా రంధ్రాన్ని నాడాతో గట్టిగా మూస్తారు. కాబట్టి తప్పించుకోలేదు. ప్రజనన హాపాను దోమతెర గుడ్డతో (నైలాన్ గుడ్డ శ్రేష్ఠం) తయారు చేస్తారు. ఈ రకమైన గుడ్డవల్ల హాపాలో నీటి భ్రమణానికి అటంకం ఉండదు.

9.16 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

- I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.
 1. ప్రేరేపిత ప్రజననం అంటే ఏమిటి? భారతీయ పెద్ద కార్ప్లలో ప్రేరేపిత ప్రజననం చేసే పద్ధతి తెలుపుము.
 2. కార్ప్ గుడ్డను పొదగడానికి విజయవంతమయ్యే హాచరి వ్యవస్థ ఏది?
 3. చేపనారు బంగీల తయారీ, రవాణా పద్ధతులను వర్ణింపుము.
- II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.
 1. పీయూషగ్రంథి సేకరణ, సంరక్షణ
 2. గుడ్డు పెట్టే చేపల నిలువ నిర్వహణ.
 3. చైనా కార్ప్లలో బీజరాహిత్య పద్ధతి.
 4. ఆధునిక కాలంలో ప్రేరేపిత ప్రజనన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం.
 5. గుడ్డు పెట్టటం, గుడ్డ అంచనా.

ప్రత్యేకమైన వాసన ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలలో ఆ నేలను గుర్తించవచ్చు. ఎండిన రేగడి నేల గట్టి పెళ్ళలుగా తయారవుతుంది. వీటిని వేళ్ళతో నలిపి పొడిగా చేయలేము. ఇది స్వేచ్ఛా జలాన్ని పీల్చుకొని నిలిపి ఉంచుకొంటుంది. రేగడి రంగు నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు లేదా పసుపు. దీనికి విరుద్ధంగా పొడి ఇసుక నేలను చేతిలో తీసుకొని పిసికినట్లయితే పోత పోసుకొని ముట్టుకోగానే పొడిపొడిగా రాలిపోతుంది. కుంటలను ఇసుక నేలపై నిర్మించరాదు. కారణం సూక్ష్మరంధ్రాలు ఈ నేలలో ఉండడంవల్ల నీరు నిలవదు. ఎంపిక చేసిన స్థలం ఇసుక నేల అయినట్లయితే వేరేచోటునుండి రేగడి మన్ను తెచ్చి, పరచి, పూతపూసి కుంటలో నీరు నిలువ ఉండునట్లు చేయాలి. క్షుద్రభూములలో పశువుల పేడ, ఎండుగడ్డి ఎక్కువ పరిమాణంలో వేసి నీరు నిలిపి ఉంచుకునే సామర్థ్యం వాటిలో పెంచవచ్చు. సారవంతమైన నేల ముఖ్యమయినదేకాని దాన్ని చేపకుంటకోసం ఎంపిక చేసుకొన్నట్లయితే, నిస్సార, క్షుద్ర భూములను సేద్యయోగ్యం చేసే లక్ష్యం దెబ్బ తింటుంది.

10.5 ఎల్లలు

ఎల్లలు: ఎంపిక చేసిన స్థలం ఉపరితల లక్షణాలు నిర్మాణంలో ఆదా చేయడానికి చాలా ముఖ్యం. క్రమంగా ఏటవాలపుతూ ఉండే విశాలలోయ భూభాగం చేపకుంటకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది. మూడువైపులా ఎత్తైన భూమితో ఆవుతమై, నాలుగోవైపు సన్నని నిర్లమ మార్గం, వీటి మధ్యన గుండ్రని చిప్ప ఆకారంతో ఉండే నేల కూడా చేపకుంటకు తగినది. వీటివల్ల నేలను తవ్వించడానికయే ఖర్చులు కనీస స్థాయిలో ఉంటాయి. తగిన నేల రకం, నీటి వసతి ఉండాలి. నిర్లమ మార్గాన్ని మూయడానికి నిర్మించే గట్టు వల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని పెద్ద కుంటగా మార్చే సౌలభ్యం ఉండాలి. కుంట అంతటా లోతు సమానంగా చేయడం నీరు కారిపోకుండా అడుగును గట్టి పరచడం అవసరం కావచ్చు. ఒక భూభాగంలో నిర్మితమయ్యే కుంటరకం ఆ భూలక్షణాలపై ఆధారితమై ఉంటుంది. ఆ స్థలంలో తవ్వి తీసిన మట్టిని నింపడానికి లేదా ఆగడ్డలు, అడ్డుకట్టలు వేయడానికి వీలైనంతవరకు సరితూగేటట్లుగా ఉండాలి. ఈ విధంగా రూపకల్పనకు, నిర్మాణానికి ముందుగా స్థలం లక్షణాలను, ఆకారాన్ని క్షుణ్ణంగా సర్వేక్షణ జరిపి నిర్ధారించుకోవాలి.

10.6 నీటి సరఫరా

నీటి సరఫరా: స్థలం ఎంపికకు సమృద్ధిగా నీరు లభించడం ముఖ్యం. చేపకుంటలలో నీరు తగినంతగా నిండి 60 సెం.మీ కు మించి ఒడుదొడుకులు లేకుండా నీటిమట్టాన్ని కాపాడుతుండాలి. అతిగా నీరు సరఫరా జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. సరస్సులు, జలాశయాలు, చెలమలు, నదులు, వాగులు, కాలువలు, వాన నీటి ప్రవాహాలు, బావులు మొదలైనవి సమృద్ధిగా నీటి సరఫరా వనరులు. సరఫరాను అదుపుచేసే యంత్రాంగం ఉండి, నీరు కలుషితం కాకుండా ఉంటే వైన పేర్కొన్న వాటిలో ఏ వనరునైనా వాడుకోవచ్చు. ఇంకే పోవడంవల్ల లేదా ఇగిరి పోవడంవల్ల ఏర్పడే నీటి కొరతను పూర్తిగానికి కావలసిన నీటి వనరు చేప కుంటకు తప్పకుండా అందుబాటులో ఉండాలి. చాలినంత వర్షపాతం ప్రాంతాలకు, భారీవర్షాలుండే చోట్లకు, నీరు నిలుపుకునే నేలలకు వేరే నీటివనర్లు అక్కరలేదు. ఏమైనా సరాసరి సాలీనా ఇగిరిపోయే రేటు మాత్రం 2 మీటర్లుంటుందని గుర్తించుకోవాలి. భారీ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఆకాశ కుంటలు (Sky ponds) ఏమైనప్పటికీ పొంగిపొర్లి పారకుండా రక్షించాలి.

పెద్ద చెరువులు, జలాశయాలు, సరస్సులు బహుశా అత్యుత్తమమైన వనరులు. దామలు చేపకుంటకు అతి చవకగా నీళ్ళందిస్తాయి. కాలువల ద్వారా సరఫరా అయ్యే నది వనరులు కూడా సంతృప్తికరంగాను, సమృద్ధిగాను ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాలలో చిన్న చిన్న చేపకుంటలకు వాగులు కూడా సంతృప్తికరంగా నీరు సరఫరా చేస్తాయి. అటువంటి వాగులకు దిగువ లక్షణాలుండాలి;

1. వాగు నీటి ప్రవాహం చేపకుంటు నిండడానికి సరిపడునంతగా ఉండడమేగాక కుంటలో నీటి మట్టం కాపాడేదిగా ఉండాలి.
2. వాగులో వరదలు అతిగా రాకూడదు.
3. వాగు వల్ల ప్రాంతంలో వృక్ష సంపద బాగా ఉండాలి. వాగులో ఒండు తక్కువగా ఉండి, వర్షాలు పడ్డా నీరు శుభ్రంగా ఉండాలి.

పరీవాహక ప్రాంతాలలో నీటి ప్రవాహం ఎన్నో కారకాలపై ఆధారితమయి ఉంటుంది. అవి: వర్షాలు తీవ్రత, వర్షంపడే కాలము, వర్షపాతమయ్యే ప్రాంతపు రూపురేఖలు, మొదట ఏర్పడిన తేమ తడువరి జరిగే నష్టం ఇగరడంవల్ల, వృక్షాల భాష్పోత్సేకంవల్ల మొదలైన అంశాలు. అందువల్ల అన్ని పరీవాహ ప్రాంతాలలో ఎంతసేరూ నిలిచి ఉంటుంది. అని లెక్కలు కట్టడం అంతతేలికకాదు. అయినప్పటికీ రేగడి భూమిలో నిర్మితమయిన ఒక ఎకరం చేపకుంటు నీటి మట్టాన్ని ఎల్లప్పుడూ సరిగ్గా కాపాడడానికి కావలసిన పారేసీటి వైశాల్యం మొత్తం ఈ విధంగా ఉండాలి: 1.6 నుండి 3.2 హెక్టార్లు పచ్చికతో ఉండే నేల, 2.4 నుండి 6.4 హెక్టార్లు అడవి నేల. ఇక్కడి చేపకుంటలో నీటిమట్టం 1.25 నుండి 1.75 మీటర్లు.

10.7 రూపకల్పన

చేపకుంట రూపకల్పనకు ముందు, భూలక్షణాలు, నేల లక్షణాలు, నీటి సరఫరా మొదలైన వాటిని గూర్చి సర్వేక్షణ నివేదికలను పరిశీలించాలి. ఈ సర్వేక్షణ నివేదికలను, మ్యాప్లను ఆధారం చేసుకొని కుంటల అగడ్తల రూపకల్పనలే అవులు తయారుచేస్తారు. అగడ్తల లేదా అనకట్టల ఎత్తు, ఏటవాలు, పై వైశాల్యంతో బాటు నీటి నిర్గమ మార్గం, చాలా పెద్ద కుంటలైతే మత్తడి ఏర్పాట్లు వగైరా రూపకల్పనలో భాగాలు. ఎంపిక చేసిన స్థలం రేగడి నేల కానట్లయితే అగడ్త మధ్యలో సీరు చొరసీయని బంకమన్ను నింపి రూపొందించ వలసి ఉంటుంది.

సర్వేక్షణ నివేదికలు, మ్యాప్లతో బాటు కార్ప్ చేపల పెంపకానికి కావలసిన నర్సరీ, పోషణ, నిలుపు కుంటలను రూపకల్పన జేసేటప్పుడు దిగువ వివరించిన అంశాలను అదనంగా గమనించవలసి ఉంటుంది.




i) చేపకుంట లక్ష్యాన్ని అనుసరించి నర్సరీ, పోషణ, నిలువ కుంటల్లో ఉండవలసిన నీటి విస్తీర్ణం నిష్పత్తిని నిర్ణయిస్తారు. చేపనారు ఉత్పత్తి లక్ష్యమయితే, నిలువకుంటకు తక్కువ నీటి విస్తీర్ణం వదలి నర్సరీ, పోషణ కుంటలకు ఎక్కువ వదలాలి. నిలువకుంటలో పరిపక్వం చెందిన చేపలు వేయటానికి నామమాత్ర వేశాల్యం సరిపోతుంది.

ఆహారాని కోసం నిర్మించే చేపల కుంట అయితే చిరుచేపల పెంపకానికి నిలువకుంటలను కట్టాలి. ఒక వేళ చేపనారు, ఆహారం చేపల మిశ్రమాన్ని పెంచే ఉద్దేశ్యమయితే నర్సరీ, పోషణ నిలువ కుంటల నిష్పత్తి వాటిని నిలువ జేసే సాంద్రతపై ఆధారపడుతుంది. మిశ్రమ కుంటలలో ఉత్పాదితమయ్యే చేపనారును విక్రయించడమే లాభదాయకం.

ii) ఈ పాఠంలో ముందు తెల్పిన విధంగా నర్సరీ, పోషణ, నిలువ కుంటల పరిమాణం, లోతు రూపకల్పన చేయాలి. ఇవి దీర్ఘ చతురస్రాకారంతో, 40 మీటర్లకు మించని వెడల్పుతో ఉండాలి.

iii) నేప రకాన్ని బట్టి, ఎత్తును బట్టి అగడ్త ఏటవాలు ఉంటుంది. మామూలుగా నర్సరీ, పోషణ, నిలువకుంటల అగడ్తల ఏటవాళ్ళు వరసగా 1:1, 1:1.5-2.0, 1:2.0-2.5 ఉంటాయి. అంటే, ప్రతి ఒక మీటరు అగడ్త ఎత్తుకు 1 నుండి 2.5 మీటర్లు పునాది అవసరం. నేల ఒండు-ఇనక లేదా లోమ్ (Loam) అయినట్లయితే ఏటవాలు ఎక్కువ చేయాలి. నర్సరీ, పోషణకుంట అగడ్తల పై వెడల్పు 1 మీటరు కాగా నిలువ కుంటలకు 2-3 మీటర్లు. దీనివల్ల పొద్దే వరదల వల్ల అగడ్తకు

కలిగే నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. 20-30 సెం.మీటర్ల వ్యాసంతో ఉండే హ్యూమ్ పైప్‌లను ఆగడ్లలో అడ్డంగా కావలసిన ఎత్తులో అమర్చినట్లయితే వరద నీటి బెడద ఉండదు. కుంటల అడుగును నీటి నిర్గమ మార్గంపైపు నెమ్మదిగా ఏటవాలు చేయాలి.



పటం. 10.1. A. వర్షం కుంట నిలుపు కోత. B. పోషకకుంట నిలుపుకోత. C. నిలువకుంట నిలుపుకోత.
1. భూమి, 2. స్వేచ్ఛా పలక 3. నీటిమట్టం 4. కుంట అడుగు. 5. ఏటవాలు.

iv) వర్షాధారం కుంటలో నీళ్ళు రాగానే, నీటి మట్టాన్ని (లోతును) స్థిరంగా ఉంచడానికి, ఆ నీళ్ళు తాకే వైపు ఉండే అనకట్టు భాగం నీళ్ళను నిలుపుకునేదిగా ఉండాలి. ఈ భాగం నీటి ఒత్తిడిని తట్టుకునేదిగాను, నీళ్ళను ఏ విధంగా కూడా కారిపోనివ్వకుండా ఉండేదిగా రూపకల్పన చేయాలి.

v) అనకట్టు పక్కల ఏటవాలు నిర్మాణంలో వాడే వస్తువులపై ఆధార పడుతుంది. రిపోజ్ కోణం [Angle of repose] కంటే ఏటవాలు ఎక్కువ వెడల్పుగా ఉండాలి.

vi) అనకట్టు కుంట అడుగు నుండి వైరకు 2.7-3.65 మీటర్ల ఎత్తు ఉండాలి. నీటి ఉపరి తలానికి, కట్ట డిఫరాన్సికి మధ్య 0.6 మీటర్ల పలక ఎత్తు స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. అసాధారణ వర్షాలవల్ల వచ్చే వరద నీటి నుండి కుంటను రక్షించడానికి ఇది అత్యవసరం.

vii) అనకట్టుపై వెడల్పు చాలా ఇరుక్కుగా ఉండగూడదు. అత్యవసర పరిస్థితులలో పై వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటే ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి. కట్ట ఎత్తును పెంచవచ్చు. చిల్లులు పడినా, గండ్లు పడినా, గండ్లు పడినా పై మట్టితో పూడ్చవచ్చు. సేకరించిన చేపలను బ్రాకెట్ లో లేదా తోపుడు బండిలో వేసి సునాయాసముగా కట్టమీద నడవవచ్చు. 1.5 నుండి 3.0 మీటర్ల లోతుండే కుంట కట్ట వెడల్పు 1.2 మీటర్లు వెడల్పుగా ఉంచవచ్చు. జీప్‌లవంటి తేలిక వాహనాలు పోవడానికి ఆగడ్ల వెడల్పు కనీసం 3.0 మీటర్లుండాలి.

viii) కుంటలకుండే ప్రవేశ, నిర్గమ మార్గాలు నియంత్రితమై ఉండాలి. అందువల్ల నింపడానికి, తీసి వేయడానికి సులువవుతుంది. కాలువలు, కుంటలకు దేని కవి స్వతంత్రంగా ఉండవచ్చు లేదా ఒకే రకమైన కుంటల వరసను కాలువలతో పరస్పరం కలిపి వేయవచ్చు.

ix) నాలుగు పాక్షికములకు మించిన ప్రవాహ నీటితో ఉండే నిలువ కుంటలకు యాంత్రికమైన వత్తిడి అవసరం. దాని రూప కల్పనలో మామూలునీటి ప్రవాహాన్ని యధావిధిగా జరగనిస్తూ భారీ వర్షాలప్పుడు, కుంటలు పొంగి ప్రవహించకుండా, రక్షిత నిర్వహణమార్గంగా అది పనిచేయాలి.

x) అనకట్టనుండి కొద్ది కొద్దిగా నీరు కారడం చేత నీలువనీటి పరిమాణం తగ్గడమేగాక కట్ట గట్టిదనాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ విధంగా నీటి నష్టాన్ని నివారించడానికి బంకమట్టి ఇసుకతో కలిపిన, పడల్ క్లేతో కట్టమధ్యభాగం కట్టాలి. దీనివల్ల బొరియలు చేసే జంతువులకు కూడా అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది. పడల్ క్లే గోటకట్ట మధ్యలో సాధారణంగా కట్టినా నీరుండే కట్టవైపు కూడా కట్టవచ్చు.

xi) పడల్ క్లే గోడ వై వెడల్పు సామాన్యంగా 1.25 నుండి 2.5 మీటర్లుంటుంది. రెండు వైపులలో బయటివైపు దాదాపు 12 లో 1 లేదా 10 లో 1 భూమిట్టానికి పడల్ గోడను బంధించడానికి తగినగాడి లేదా కుటకం రూపకల్పన చేయాలి.

xii) కుంటల లే అవుట్ భూమి అకారాన్ని అనుసరించి వుండాలి. లోతైన కుంటలను భూమి పల్లాలలో రూపొందించి నల్లయితే మట్టి తవ్వే పని తగ్గుతుంది.

10.8 నిర్మాణము

చేపకుంట రూపకల్పన జరిగిన తరువాత బుగ్గిప్రింటు ప్రకారం ప్రతిపని అంచనా వివరాలను తయారు చేయాలి. నిర్మాణం చేపట్టటప్పుడు ఈ విషయాలను దృష్టిలోనుంచుకోవాలి.

i) చేపకుంట నిర్వహణ దృష్టిలో నిర్మాణ సమయం చాలా ముఖ్యమైన కారకం. ఎండాకాలం చివరకు దీని నిర్మాణం పూర్తిచేసే, వర్షాకాలం నీటితో తక్షణం నిండిపోతుంది. చలికాలంలోనో లేక ఎండలు మొదలయినప్పుడో కుంట కట్టిస్తే తక్షణం నీళ్ళురాక కుంట అడుగున కలుపు మొక్కలు అంతలా పెరుగుతాయి.

ii) చెట్లు, పొదలు, విపరీతంగా వృద్ధిచెందే వృక్షాలు మొదలైన వాటిని తీసివేయాలి. ఇవి కుళ్ళి నీరు కారి పోయే స్థలాలలో ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తాయి. వై నేలనంతా గీకి కుప్పవేయాలి. తరువాత నేలను సరితేయడానికి ఇది పనికి వస్తుంది. చెట్ల వేళ్ళను కూడా తొలగించాలి. వృక్షపదార్థాన్ని ఏ రూపంలోనూ ఉండనివ్వకూడదు. అది ముందుముందు కుళ్ళి నీరు కారిపోవడానికి దోహదం చేస్తుంది. కుంట నీటి నుండి 5 మీటర్ల దూరం వరకున్న చెట్లను, పొదలను నిర్మూలించాలి. ఇందువల్ల సూర్యరశ్మి నీటి ప్రాంతం మీద బాగాపడడమేగాక చెట్ల ఆకులు కూడా నీటి మీదరాలకుండా ఉంటాయి.

iii) అగడ్త పునాదులను గుర్తించి, నీరు చొరలేని భూమి అయినట్లయితే పునాదిని సరియైన విధంగా నింపాలి. నేల అతిరేగడిగా ఉంటే దానికి ఇసుక కలిపే పగుళ్ళు రాకుండా నివారించాలి. నేల సూక్ష్మ రంధ్రాలయితే, అగడ్త మధ్యలో నిలుపునా గాడి తవ్వి నీరు చొరనిపారను చేరుకోవాలి. తరువాత ఉన్న రేగడితో నింపాలి. రేగడి నింపే మట్టం కుంటలో నీటి మట్టంతో సమానంగా ఉండాలి. 1 మీటరు వెడల్పాటి బీమ్ (దూలం వల్ల అనకట్ట పటిష్ఠమవుతుంది.).

iv) నేలను కాయకష్టంతోనో లేదా బుల్ డోజర్ తోనో తవ్వించవచ్చు. బుల్ డోజర్ ఉపయోగించినా శ్రామికులతో చివరి మెరుగులు దిద్దించాలి. రూపకల్పన పటం ప్రకారం కుంట పక్కభాగాలు, అడుగు నేలను సరిగ్గా నవరించి దిమ్మినకొట్టే పదునుచేయాలి.

v) అగడ్తను నక్షాప్రకారం నేలమీద గుర్తించి, 30 సెం.మీ. నేలమీది మట్టిని తొలగించి 15 సెం.మీటర్ల మందంగా ఉండే మట్టి పొరలను క్రమంగా నిలువుగా పోస్తూ ఎత్తు పెంచాలి. ప్రతి 15 సెం. మీటర్ల ఎత్తు పొరకు నీళ్ళు చల్లి దిమ్మినచేసి నేలను దట్టించాలి. ఈ విధంగానే ఎత్తును పెంచాలి. కట్ట ఎత్తులో ప్రతి మీటరుకు 20 సెం.మీ. తరుగును గట్టబడడానికి వదలాలి. కట్ట

10.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. కార్బ్ చేపల పెంపకానికి తగిన కుంటల వేర్వేరు రకాలను తెలుపుము.
2. స్థానం ఎంపికకు గమనించదగిన అతిముఖ్యమైన అంశాలు ఏవి? కుంటనిర్మాణానికి యోగ్యమైన నేలను గూర్చి వివరింపుము.
3. చేప కుంటలకు నీటి సరఫరాను గూర్చి వివరంగా వ్రాయుము.
4. కుంటల రూపకల్పనలో ముఖ్య అంశాలేవి? విశదపరచుము.
5. చేప కుంట నిర్మాణంలో వివిధ దశలను వర్ణింపుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేప కుంట నిర్మాణానికి ఎంపిక చేసిన స్థలం లక్షణాలు
2. కుంట నిర్మాణం

భాగం-11 నీటి కుంట నీరు, నేల లక్షణాలు, ఆహారపు గొలుసు, ఉత్పాదకత

విషయక్రమం

- 11.1 ఉద్దేశ్యం
- 11.2 ఉపోద్ఘాతం
- 11.3 నీటి లక్షణము
- 11.4 కార్బానిక్ పదార్థములు
- 11.5 నేల లక్షణం
- 11.6 నేల రసాయనిక పరిస్థితి
- 11.7 ఉత్పాదకత
- 11.8 ఉత్పాదకత భావన
- 11.9 నీటి రకాల వర్గీకరణ వాటి ఉత్పాదకతాశక్తి
- 11.10 సారాంశం
- 11.11 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 11.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

11.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగంలో చేప కుంటకు అవసరమయిన నీరు, నేలకు సంబంధించిన భౌతిక రసాయనిక లక్షణాలు, కుంట ఆవరణలో సంభవించే మార్పులు, అంటే ఆహారపు గొలుసులు, ఉత్పాదకత వీనితో చేపల ఉత్పత్తికి నేరుగా సంబంధించినాయో, వాటన్నిటిని చర్చించడం జరిగింది.

11.2 ఉపోద్ఘాతం

నీటి భౌతిక లక్షణాలు లోతు, ఉష్ణోగ్రత, అస్పృశ్యత, వెలుతురు మొదలైన విషయాలపై చర్చ. నీటి రసాయనిక లక్షణాలు కరిగిన ఆక్సిజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, మొత్తం క్షారత, పిహెచ్, మొత్తం నీటి ఉష్ణతనం, కరిగిన ఘనపదార్థాలు ఆకార్బనిక సమ్మేళనాలు (నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఇనుము, కాల్షియమ్, మెగ్నీషియమ్, సోడియమ్, పొటాషియమ్, సల్ఫేట్లు, సిలికా, ట్రేస్ మూలకాలు), కార్బానిక పదార్థాలను వివరించడం జరిగింది. కుంటలో ఉండవలసిన జీవసంబంధ పరిస్థితులైన జలవృక్ష సంపద, ప్లవకాలు, అంతస్థల జీవులు లేదా అడుగున నివసించే జీవులు. వివిధ రకాల కుంట నేలలు: ఎలువియల్ నేల, నల్లరేగడి, ఎర్రనేల, లాటెరిటిక్ నేల, అడవి నేల, ఎడారి నేల, లవణ నేల, క్షార నేల, శిఖర నేలలు. నేల రసాయనిక లక్షణాలు: హైడ్రోజన్ అయాన్ల గాఢత, ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, కార్బానిక కార్బన్, పొటాషియమ్, కాల్షియమ్. జల వ్యవస్థలో ఆహారపు గొలుసులు, పిరమిడ్లు: ఉత్పత్తిరేటు, జీవరాశి, సంఖ్య మొదలైన పిరమిడ్లు. ఉత్పాదకతకు చెందిన వివిధ భావనలు చేప పంట, ఉత్పత్తిరేటు, నేకరణ రేటు తెలుపడం జరిగింది. నీరు ఉండే స్థలాలను వాటి ఉత్పాదకతనుబట్టి వర్గీకరణ

ఉదయాత్కార్యం : 6.5 నుండి 9.0 శ్రేణి పిపాచ్ వరకు ఉండే కుంట నీటిలో చేపల పెంపకం చాలా యోగ్యమైనది. 9.5 పిపాచ్ విలువకంటే మించినది అయోగ్యము. కారణం ఈ మించిన విలువ నీటిలో CO₂ లభ్యంకాదు. దాదాపు 11 పిపాచ్ వద్ద చేపలు చనిపోతాయి. అప్పుయ్యత జలం చేపల అకలిని తగ్గించి, పెరుగుదలను, విషపదార్థాలను నిరోధించే శక్తిని అరికడుతుంది. H₂ S, రాగి, భారీలోహాలు మొదలైనవాటి విష ప్రభావం నీటి పిపాచ్ తగ్గినందువల్ల, పాచ్చుతుంది. ఈ నీటి ప్రభావం అప్రత్యక్షంగా కుంటలోని ఇతర జీవ సంబంధ సముదాయాలపై కూడ చూపి వాటిని నిర్వీర్యపరుస్తుంది. ఈ వాతావరణంలో చేపలు వరాన్న జీవులు, వ్యాధులకు గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది.

పూర్తి ఉప్పుదనము

Ca, Mg లవణాలు నీటిలో ఉండి, దానికి ఉప్పుదనాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇందులో వాటి సల్ఫేట్లు, క్లోరైడ్లుంటాయి.

పూర్తి ఉప్పుదనం లక్షణం వల్ల నీరుని రెండు వర్గాలుగా విభజించినారు. “కఠిన” జలం, “మృదు” జలం. మృదుజలంలో కఠిన Ca, Mg చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటూ, వాటిలో బంధిత CO₂ లీటర్ ఒక్కంటికి 5 మి.లీ మించకుండా ఉంటుంది. మధ్యగా ఉండే నీటిలో 5-22 మి.లీ మధ్యలో బంధిత CO₂, కఠిన జలంలో బంధిత CO₂ 22 మి.లీ. కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంతకంటే కూడా అంటే 50 మి. లీటర్లకు మించి కూడా ఉండవచ్చు.

స్వేచ్ఛా CO₂ 15 పిపియమ్ కంటే ఎక్కువ గాఢంగా ఉంటే కుంట చేపలకు హాని జరుగుతుంది. గాలి పీల్చే చేపలు మట్టుకు 100 పిపియమ్ CO₂ గాఢతలో జీవించగలుగుతాయి.

కఠిన ఘనపదార్థములు

నీటిలో కార్బనిక, అకార్బనిక ఘనపదార్థాలు కఠిగి ఉంటాయి. అకార్బనిక ఘనపదార్థాలు ద్రావణంలో ఉన్నప్పుడు ఎనయాన్ల రూపంలో ఉంటాయి. ఉదా. కార్బోనేట్లు, సల్ఫేట్లు, క్లోరైడ్లు, ఫాస్ఫేట్లు, నైట్రేట్లు మొదలైనవి. పీటితోపాటు Ca, Na, Mg, Fe, K మొదలైన లోహాల కేటయాన్లు కూడా సమ్మిళితంగా ఉంటాయి. కార్బనిక సమ్మేళనాలలో ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, చక్కెరలు, ఆమ్లాలు, విటమిన్లు నీటిలో కఠిగి ఉంటాయి.

నీటిలో కఠిన ఘనపదార్థాల మొత్తం గాఢత ఆ నీటిలోని రసాయనిక సాంద్రతను తెలిపే ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఈ సాంద్రత నీటిలో జీవసంబంధాలను పెంపొందించే యుక్తమైన కారకంగా పనిచేసి ఉత్పాదకతకు దోహదం చేస్తుంది.

అకార్బనిక సమ్మేళనాలు

నైట్రోజన్, దాని సమ్మేళనాలు : నీటిలో నైట్రోజన్ స్వేచ్ఛాగా లేదా కార్బనిక, అకార్బనిక సమ్మేళనాలుగా ఉంటుంది. స్వేచ్ఛా నైట్రోజన్ మూలకంగా, వాతావరణం నుండి అధికంగాను, లేదా నైట్రేట్, నైట్రేట్, అమ్మోనియా వగైరా సమ్మేళనాలు బాక్టీరియంల చర్యవల్ల విశ్లేషణ చెందినందువల్ల నీటికి లభిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత, పీడనం ఈ రెండింటి ప్రభావం మంచి నీటిలో నైట్రోజన్ కరగడంపై ఉంటుంది. కొన్ని పీడన పరిస్థితులలో నైట్రోజన్ అత్యధిక సంతృప్త దశకు చేరుతుంది. ఈ దశ ఏర్పడే స్థానంగా, గాలి నీటి సంగమస్థలం. ఈ పరిస్థితివల్ల కొన్ని సమయాలలో “గ్యాస్ బబుల్” లేదా వాయుబుద్బుద్వ్యాధి చేపలకు సోకుతుంది. ఈ శరీరదర్మ పరిస్థితి ఆక్సీజన్ అత్యధిక సంతృప్తదశలో కూడా ఏర్పడుతుంది.

నైట్రోజన్ కుంట సారవంతంగా ఉండడానికి ముఖ్యమూలకం ఫాస్ఫరస్, ప్రాకృతిక జలాలలో ఫాస్ఫరస్ పరిమాణం అతితక్కువగా ఉంటుంది కాని కుంటను సారవంతం చేయడానికి ఇది ఒక అమోఘమైన మూలకంగా పరిగణితమవుతుంది. ఇది ఫాస్ఫేట్ల రూపంలో నీటిలో కఠిగి ఉంటుంది.

ఫాస్ఫరస్

ఫాస్ఫరస్ పరిమాణం కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి కుంటలో మారుతుంది. కొన్ని చేపలను నేకరించడంవల్ల లేదా నీటి మొక్కలను విరివేయడంవల్ల తగ్గిపోతుంది. ఫాస్ఫరస్ లేమివల్ల నీటి ఉత్పాదక శక్తి నష్టమవుతుంది. నీటిలో సహజంగా 0.2 పిపియమ్ ఫాస్ఫేట్ పరిమాణం ఉండడం ఫలదాయకం. ఇది అతిగా ఉండడంవల్ల కార్బానిక కాలుష్యానికి మార్గం చూపుతుంది.

ఇనుము

ఇది బైవాలెంట్ లేదా ట్రైవాలెంట్ ఫెర్రస్ రూపంలో నీటిలో సహజంగా ఉంటుంది.

కార్బియమ్, మెగ్నీషియమ్

మంచి నీటిలో ఈ రెండు మూలకాలు కలిసి అయాన్లను సమృద్ధిగా తయారు చేస్తాయి. లీటరుకు 10 మి.గ్రాంల కంటే తక్కువ కార్బియమ్ ఉండే కుంటలను జీవశాస్త్ర రీత్యా దీనమైనవిగా (మృదు)ను, 10-25 మి.గ్రాంలతో ఉండేవి మధ్యమంగా, 25 మి.గ్రాంలకు మించినట్లైతే సంపన్నంగా (కఠిన) పరిగణిస్తారు.

కార్బియమ్, కార్బియమ్ కార్బోనేట్ గా నేల భౌతిక రసాయనిక లక్షణాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని పరిస్థితులవల్ల నేలలోని కొల్లాయిడ్ కణికలను కూర్చుతుంది. నేలను మెరుగుపరుస్తుంది. నేలలోని ఫాస్ఫరస్ ను నీటి పై పొరలలోకి పంపిస్తుంది. ఈ విధంగా జరగకపోతే అది నేతలోనే ఉండిపోతుంది, మొక్కలకు లభించదు. కొన్ని లోహాల అయాన్ల విషాలను కూడా కార్బియమ్ ఎదుర్కొంటుంది.

పత్రపారితం ఉండే శైవలాలకు మెగ్నీషియమ్ అత్యంతావశ్యకం. ఇది నీళ్లలో బైకార్బోనేట్ గా ఉండి, నీళ్లతో, కార్బియమ్ బైకార్బోనేట్ మాదిరిగా చర్యలు జరుపుతుంది.

సోడియం, పొటాషియం

తటస్థజలంలో సోడియమ్ హైడ్రైడ్ (NaCl), సోడియం టెట్రాబోరేట్ ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) లేదా బోరాక్స్, సోడియం సల్ఫేట్ రూపాలలో కలిగి ఉంటుంది. నీలి ఆకువచ్చు శైవలాలలో మాత్రమే సోడియం జీవక్రియకు లోనవుతుంది. పొటాషియం అన్ని శైవలాలకు అవశ్యకం. పొటాషియం అల్ప పరిస్థితి నల్ల, శైవలాల వృద్ధి, కిరణజన్యసంయోగ క్రియ విపరీతంగా తగ్గి, శ్వాసక్రియ హెచ్చుతుంది.

సల్ఫేట్లు

సల్ఫర్, సల్ఫేట్ ఎనయాన్ (SO_4) లుగా, Ca, K, Fe మొదలైన లోహాల కెటయాన్లతో సమ్మిళితమై మంచినీటిలో కలిగి ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ (H_2S)గా కొంత సల్ఫర్ నీటిలో ఉంటుంది.

మొక్కలు పెరగడానికి జీవావరణ రీత్యా సల్ఫర్ ముఖ్యం. దీని లోపంవల్ల నీటిలో ప్లవకాలు పెరగవు. ప్రోటీన్ జీవక్రియకు కూడా సల్ఫర్ ముఖ్యం.

సిలికా

సిలికా ఆర్థోసిలికేట్ గా ప్రకృతి సిద్ధ జలాలలో సహజంగా ఉండే పిహెచ్ విలువ పరిస్థితిలో ఉంటుంది. అవక్షేప శిలలలో సాధారణంగా ఇది ఎక్కువ, అందు చేత ఆ ప్రాంతంలోని జలాలలో దీని గాఢత ఎక్కువ. బట్టబయలుకుంటు ఉపరి జలాలలో లీటరుకు 79.5 మి.గ్రాంలు దాదాపుగా ఉంటుంది.

నల్లరేగడి

నల్లరేగడి రెండు రకాల శిలల నుండి తయారైన నేల a) దక్కన్, రాజమహల్ బ్రాప్ (trap) నుండి b) పెరుజిన్ నెస్సెస్, పిన్టెల్ (Ferruginous gneisses) నుండి. ఇది తమిళనాడులోను అర్ధ శుష్క [Semiarid] ప్రాంతాలలో ఉంటాయి. ఈ నేల అర్బిలేషియస్ [Argillaceous]. ఇది అతి సన్నని నల్ల కణికలతో కార్నియమ్ - మెగ్నీషియమ్, కార్బనేట్లతో, ఇసుము, పొటాషియమ్, మెగ్నీషియమ్, అల్యూమినియం తగినంత నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. కాని పాస్టరన్, నైట్రోజన్, కార్బానిక్ పదార్థాలు అతి తక్కువ. ఉంటాయి. నీటిని నిలుపుకునే శక్తి ఈ నేలకు అధికం. ఈ నేలలో మాన్టమోరిలియన్ [Montmorillonitic], బిడెలిటిక్ [Beidellitic] ఖనిజ సమూహాలు అధిక పరిమాణంలో ఉంటాయి.

ఎర్రనేల

ఈ నేల ప్రాచీన, మెటామార్ఫిక్ శిలలు శిథిలం కావటంవల్ల ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా అతి తక్కువ నైట్రోజన్, పాస్టరన్, సున్నం, ఇసుము ఆక్సైడ్, ఆకుపంట మొదలైనవి ఉండే ఈ నేలలో ఖనిజ కవోలిన్ (Kaolinite) ప్రబలంగా ఉంటుంది. వీటికి నీటిని శోషించే స్త్రోమతగాని, క్షారాలను (K, Ca, Mg) మార్పిడిచేసే నిలుపుకునే శక్తిగానిలేదు. ఉన్నా అది బహుపరిమితం. పాస్టరన్ అతి తొందరగా ఇటువంటి నేలలో స్థిరీకరణం చెందుతుంది.

లాటెరైట్ లేదా లాటెరిక్ నేలలు

ఈనేల నిర్మాణంలో హైడ్రాక్సైడ్లు ముఖ్యంగా అల్యూమినియమ్, ఇసుముకు సంబంధించినవి. కొద్ది పరిమాణంలో మేంగనీస్ ఆక్సైడ్, టిటానియమ్ మొదలైనవి వాటి మిశ్రమం ఉంటుంది. ఈ పదార్థాలన్నీ వెసిక్యులార్ (Vesicular) శిలలువలె వుండి, నేలను దట్టంగా తయారుచేస్తాయి. ఈ నేలలో పాస్టరన్, పొటాషియమ్, కార్నియమ్, నైట్రోజన్ తక్కువ. పిపాచ్ శ్రేణి 4.8 నుండి 5.5, బేస్ మార్పిడి సామర్థ్యం కూడా తక్కువ.

అడవినేల

వన్య వృద్ధివల్ల ఏర్పడే నేల కార్బానిక్ పదార్థం సమృద్ధిగా ఉంటుంది.

ఎడారి నేల

ఈనేల గోధుమవర్ణం ఇసుకతో తయారవుతుంది. కొన్ని ఇసుక నేలల్లో కరిగిన లవణాలు ఎక్కువ శాతంలో ఉంటాయి. కాబట్టి క్షారయుతంగా, తక్కువ కార్బానిక్ పదార్థంతో ఉంటాయి.

పీట్

పీట్ నేల ప్రాంతంలో పీట్లో కలిగే క్షారలవణాల నిలువలు ఉంటాయి. అలూవియల్, తీరప్రాంతాల నరస్సులు, వదులుపారే ప్రాంతాలు ఎండినట్లయితే సాధారణంగా నీలం లేదా నలుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. దానికి కారణం ఇసుము ఫెర్రస్ కార్బానిక్ పదార్థాలు.

ఉప్పునేల క్షారనేల

సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం సల్ఫేట్ లవణాలు బాగా ఉండేది ఉప్పునేల. క్షారనేలలో సోడియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఈ నేలలు క్షార లక్షణాలతో ఉంటాయి. కార్బోనేట్ ఉండడంవల్ల ఇది అవిటి నేలగా మారుతుంది.

నేలలో ఉండే వివిధ వృక్ష పోషక పదార్థాలలో తరచుగా నైట్రోజన్, పాస్టరన్, పొటాషియమ్ మూలకాలు లోపిస్తాయి. అప్పుడు బయటి నుండి నీటిని నరఫరా చేయాలి.

కుంట బురద

కుంట అడుగు నేలకు, గాలి తగులుతుండే నేలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. i) ఏ మాత్రం గాలి లేని చోట్లలో, వివిధ రకాల చోట్ల నుండి వచ్చి ఒకచోట కూడిన మట్టితో అడునేల తయారవుతుంది.

ii) పరివాహక ప్రాంతం విస్తారంగా ఉండే కుంటలు కరిగిన పోషక పదార్థాలను, నేల కణికలను తాజాగా లోనికి ప్రవహించే నీటి నుండి ఎప్పటికప్పుడు సమకూర్చుకుంటాయి. iii) కార్బనిక పదార్థం అవసాదనం, కుంట అడుగు ఇక్షణాలను మార్చుతుంది.

కుంట బురద వాస్తవమైనదైతే కుంట ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది. ఈ బురదలో అతి సూక్ష్మమైన నేల కణికలు, మృతజంతు వృక్షపదార్థాలపై బాక్టీరియంల చర్యతో తయారైన కార్బనిక పదార్థ నిలువలు ఉంటాయి. ఈ పదార్థం ఎక్కువ ఆకు పెంటగా ఉంటుంది. ఇది ఉన్నత అణుభారంతో ఉండే కార్బనిక సమ్మేళనంవలె వ్యవహరిస్తుంది.

11.6 నేల రసాయనిక పరిస్థితి

ఉత్పాదకత ఉండే కుంటకు ముఖ్యమైన రసాయనిక కారకాలు: పిహెచ్, మొత్తం నైట్రోజన్, మొత్తం ఫాస్ఫరస్, కార్బనిక కార్బన్, C/N నిష్పత్తి, నైట్రోజన్ లభ్యత, పొటాషియం, మార్పిడి చేసే కార్బియమ్.

నైట్రోజన్ అయాన్ల గాఢత: ఆక్సీజన్ తక్కువ సరఫరా జరిగినట్లయితే కుంట బురదలో కార్బనిక పదార్థాల విచ్ఛిత్తి మందంగా జరుగుతుంది. విచ్ఛిత్తి పర్యవసానంగా వెలువడే పదార్థాలు, నైట్రోజన్ సల్ఫర్, మిథేన్, కొవ్వు ఆమ్లాలు (చిన్న గొలుసువి) వగైరా కూడి నేలను ఆమ్లమయం చేస్తాయి. ఈ నేల తటస్థీకరించక పోయినట్లయితే సహజంగా బాక్టీరియా చర్య సన్నగిల్లి ఉత్పాదకత దెబ్బతింటుంది. కరిగిన ఫాస్ఫేట్ల రూపాంతరణంపైన అవశ్యక పోషకపదార్థ అయాన్ల అధిశోషణ (Adsorption), విడుదలపైన ముఖ్యంగా నేల నీరు కలిసేచోట పిహెచ్ ప్రభావం ఉంటుంది.

ఫాస్ఫరస్

సరఫరా అయే ప్రమాణానికంటే ఫాస్ఫరస్ లభ్యత కుంట ఉత్పాదకతకు ముఖ్యం. ఇనుము, అల్యూమినియంలతో ఆమ్లయుత పరిస్థితిలో ఎన్నో సమ్మేళనాలుగా, క్షారయుత పరిస్థితిలో కార్బియమ్ సమ్మేళనాలుగా ఫాస్ఫరస్ నేలలో లభిస్తుంది. ఈ రెండు స్థితులలో దాని అయాన్లు నీటికి లభ్యంకావు. బురద నీటి కొలాయిడ్ సంక్లిష్టంలో ఫాస్ఫేట్ అయాన్లు అధిశోషణం చెంది ఉంటాయి.

ఫాస్ఫరస్ నేలలో అకార్బనిక, కార్బనికస్థితిలో ఫాస్ఫేట్లుగా ఉంటుంది.

నైట్రోజన్

అనేక సూక్ష్మజీవులు కుంట అడుగున చేరే కార్బనిక పదార్థాలను విచ్ఛేదిస్తాయి. పర్యవసానంగా CO₂ నీరు, అమోనియా, అమోనియం లవణాలతోబాటు బాక్టీరియా చర్యవల్ల అమోనియాలోని నైట్రోజన్ నైట్రేట్లుగా మారుతుంది.

నైట్రేట్లు, అమోనియా లవణాలు విసత్రికరణ బాక్టీరియావల్ల క్షయికరణం చెంది, స్వేచ్ఛా నైట్రోజన్ విడుదలవుతుంది.

కార్బనిక కార్బన్

C/N నిష్పత్తి: కార్బనిక ఎరువులు కుంటలో వేసినప్పుడు దాని పోషణవలయం (Trophic cycle) లో రెండు మార్గాల ద్వారా ఇవి శోషణం చెందుతాయి. మొదటిది, సూక్ష్మజీవుల ద్వారా ఈ ఎరువులు విచ్ఛిత్తి చెంది సరళ అకార్బనిక సమ్మేళనాలుగా రూపొంది స్వయంపోషిత బాక్టీరియాను, పచ్చని మొక్కలను చేరుకొంటాయి. రెండవది ఈ ఎరువులను ఉన్నత జీవులు (ప్రోటోజోవా, జంతువులకాలు) నేరుగా భుజించి చేవలకు తిరిగి అందిస్తాయి. ఈ విధంగా ఎరువుల నుండి నైట్రోజన్ తగు పరిమాణంలో చేవలకు అందుతుంది.

పాటాషియం


నీటిలో మునిగిన మొక్కలు వృద్ధి చెందడానికి పాటాషియంను గ్రహిస్తాయి. వీటి కణజాలంలో నీరు, నేల నుండి సంగ్రహించిన పాటాషియం నిలువలు బాగా పెరిగే దశలో ఉంటాయి. ఇనుక నేలతోను అధిశోషణం చేయలేని కుంటలలో ఎరువుల పాటాషియం ప్రభావంవల్ల ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది.

కార్బియం

కార్బియం నాలుగు ముఖ్య పాత్రలను నిర్వహిస్తుంది: [i] కార్బోప్లాడ్రేట్ల స్థానాంతరణంతో దీని సంబంధం, [ii] వృక్షకణజాలం యొక్క సమగ్రఅంశం, [iii] ఇతర అయాన్ల లభ్యతను పెంచడం, [iv] ఇతర మూలకాల లవణద్రావాల విషయ ప్రభావాన్ని తగ్గించడం, కుంటనేలలో కార్బియం సాధారణంగా కార్బినేట్గా ఉంటుంది.

11.7 ఉత్పాదకత

సహజ వాతావరణంలోని పదార్థాల పరస్పర చర్యల ద్వారా సజీవపదార్థ నిర్మాణమే, ఒక నీటి ప్రాంతంలోని ఉత్పాదకతకు చిహ్నం. కొన్ని జీవావరణ వ్యవస్థలు కుంటవంటివి స్వయం సమృద్ధులు. ఇటువంటి వ్యవస్థలో [i] శక్తి గ్రహించడం, [ii] ఉత్పత్తిదారుల కార్బనిక పదార్థాల ఉత్పత్తి [iii] వినియోగదారులు ఈ పదార్థాలను వినియోగించి విస్తరించడం, [iv] కార్బనిక పదార్థాలు అకార్బనికాలుగా విచ్ఛిత్తి చెందడం, [v] ఇవి మార్పుచెంది ఉత్పత్తిదారుకు సరిపడు పోషక పదార్థాలు కావడం. ఇవన్నీ స్వయంసమృద్ధిగల జీవావరణ వ్యవస్థలో ఉంటాయి.



పటం 11.1 కుంట జీవావరణ వ్యవస్థ 1. ఉత్పత్తిదారు-వృక్షాలు 2. నిర్జీవ పదార్థాలు- అకార్బనిక, కార్బనిక పదార్థాలు 3. ప్రాథమిక వినియోగదారు (శాఖాహారులు) అడుగున ఉండేవి 4. ప్రాథమిక వినియోగదారు (శాఖాహారులు) జంతుప్రకారాలు 5. ద్వితీయ వినియోగదారు (మాంసాహారులు) 6. తృతీయ వినియోగదారు (ద్వితీయ మాంసాహారులు) 7. పూతికాహారు-బాక్టీరియా, ఫంజీ 8. సూర్యకిరణాలు 9. సౌరశక్తి 10. ఉత్పత్తిదారు-వృక్షప్రకారాలు.

ఫెలుతురు, అకార్బనిక పోషక పదార్థాలు నిర్జీవ అంశాలు. ఇవి మొక్కల కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు, వృద్ధికి అవసరం.

జీవావరణ వ్యవస్థలో సజీవ అంశాలు ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు. ఉత్పత్తి దారులు-వృక్షహరితముండే ప్రకారాలు, పెద్ద వచ్చని చెట్లు, కిరణ జన్య సంయోగక్రియ జరిగి బాక్టీరియా, ఇవన్నీ శక్తిని సంక్లేషిస్తాయి. వీటికి అకార్బనిక పదార్థాలను, సౌరశక్తిని ఉపయోగించి కార్బనిక పదార్థాలుగా

సంశ్లేషించే సామర్థ్యం ఉంది. తదితర జీవ సముదాయం వినియోగదారులు. ఇవి ఉత్పత్తిదారులపై ఆధారపడతాయి తప్ప నేరుగా ఆహారాన్ని సంశ్లేషించుకోలేవు. ఈ సమూహంలో శాకాహారులు, నేరుగా మొక్కలను భక్షించేవి. మాంసాహారులు చేరినాయి. విచ్ఛిన్నకారులు పరపోషిత బాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు. ఇవి కార్బానిక పదార్థాలను వాటి మూలకాల స్థితికి దిగజార్చుతాయి. ఈ మూలకాలను ఉత్పత్తి దారు వినియోగిస్తాయి. వృక్షాలు, జంతువులు వరసగా ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉండడంవల్ల ఆహారపు గొలుసు ఏర్పడుతున్నది. ఈ రెండు గొలుసుల మధ్యనున్న పోషణకు సంబంధించిన భేదాన్ని పోషణ స్థాయి అని పిలుస్తారు.

ఆహారపు గొలుసు

ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో మొక్కలు ఉత్పత్తిదారులుగా పోషణ స్థాయిలను ఏర్పరుస్తాయి. (1) మేనే శాకాహారులు (2) చిన్న పరిమాణంతో ఉండే మాంసాహారులు (3) మధ్యమ, పెద్ద మాంసాహారులు. (4) ఆహారపు గొలుసులో అదనపు సంబంధాలు దీని పక్కల్లో, పరాన్నజీవులు వేరే పోషణ స్థాయిని ఏర్పరచుతాయి. వివిధ పోషణ స్థాయిలలో మూడు రకాల ఆహార పిరమిడ్లు తయారవుతాయి. i) ఉత్పత్తి రేటుకు చెందిన పిరమిడ్ ii) జీవరాశి పిరమిడ్ iii) సంఖ్యల పిరమిడ్.

i) ఉత్పత్తి రేటుకు చెందిన పిరమిడ్

ప్రతి పోషణస్థాయిలో కొంత శక్తి, పదార్థం వృధా అవుతుంది. కారణం శోషణ ప్రక్రియలు, వృద్ధి సంపూర్ణ సామర్థ్యంతో నిర్వహించబడవు. ఒక సమయంలో కొంతశక్తితో ఉత్పాదించిన కార్బానిక పదార్థం ప్రతి పోషణ స్థాయిలో కొంత తగ్గుతుంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఉత్పత్తిదారుల స్థాయిలో అధిక శక్తి, శాకాహార ప్రాథమిక వినియోగదారు స్థాయిలో అంతకంటే తక్కువ శక్తి. ఈ విధంగా ప్రతి పోషణ స్థాయిలో వరసగా శక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఆహారంలోని ఈ శక్తికి జంతు జీవ ద్రవ్యంగా మార్చుకొనే సామర్థ్యం పోషణ స్థాయిని బట్టి పెరుగుతుంది. అంటే మాంసాహారులలో ఇది గరిష్ట స్థాయి ఉంటుంది. స్వయం సమృద్ధితో ఉండే జీవావరణంలో అంశాల ఉత్పత్తి రేటును ఒక పిరమిడ్ తో పోల్చవచ్చు. దీన్ని శక్తి పిరమిడ్ అంటారు. ఇందులో పచ్చని మొక్కలు సంశ్లేషించే శక్తి పిరమిడ్ ఆధార భాగంలో, ఆపైన ప్రాథమిక వినియోగదారు [శాకాహారులు], ఆపైన ద్వితీయ వినియోగదారు [మాంసాహారులు] ఉంటారు.

ii) జీవరాశి పిరమిడ్

ఇది ఆహారపు గొలుసులో బంధితమైన జీవరాసులతో నిర్మితమవుతుంది. దీన్ని నిలుపు పంట అని కూడా అంటారు. దీనివల్ల జీవపదార్థం ఒక స్థాయికంటే మరోస్థాయిలో తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇది వై పిరమిడ్ మాదిరిగానే సూచిస్తుంది. వృద్ధిరేటు, వివిధ జనాభాల సాంద్రత ఈ రెండూ ముఖ్య కారకాలని ఈ పిరమిడ్ సూచిస్తుంది.

iii) సంఖ్యల పిరమిడ్

ఇది జీవుల సంఖ్యనుబట్టి నిర్మితమవుతుంది. కింది నుండి వైవరకు ఉండే పోషణ స్థాయిలలో సంఖ్యాపరంగా జీవులు తగ్గుతూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం జీవుల జనాభా వృద్ధిరేటులో విభేదాలుండడంవల్ల పెద్దవి, చిన్న జీవులను భక్షించడంవల్ల, పరాన్నజీవుల విషయంలో ఈ సంఖ్యల పిరమిడ్ తలకిందులవుతుంది. ఇది స్వేచ్ఛా జీవుల పరిస్థితికి పూర్తిగా విరుద్ధం.

ఒక సముదాయం ఆహారపు గొలుసులో కిరణజన్యసంయోగక్రియ జరగడం జీవావరణ వ్యవస్థకు మూల స్తంభం.

11.8 ఉత్పాదకత భావన

ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో ఉత్పాదకతకు చెందిన ఈ మూడు కొలతలను ఈ భావనకు కేంద్రంగా పరిగణిస్తారు: i) నిలువ పంట ii) తొలగివేత రేటు iii) ఉత్పాదక రేటు.

నిలువ పంట

ఒక పరిశీలన సమయంలో ఉండే మొత్తం జీవరాసిని నిలువ పంట అని వ్యవహరిస్తారు. దీన్ని సంఖ్యాపరంగా, జీవరాసిగా, లోపలి శక్తి అంశంగా వివరిస్తారు. ఈ విధంగా నిలువ పంట జీవుల తత్వక్షణ ప్రమాణాన్ని తెలుపుతుంది. ఇది పంట తయారీకి వినియోగమైన సమయాన్ని లేదా రేటును లెక్క కట్టదు. అందువల్ల నిలువ పంట ఒక సమయంతో ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో ఆయా జీవుల జనాభా సాంద్రతను లెక్క కడుతుంది. నిలువ పంట అధికం అంటే ఆ జీవావరణ వ్యవస్థలో ఉత్పాదకత రేటు [వేగం] ఎక్కువ అని అర్థం కాదు. ఎందువల్లనంటే ఇది జీవుల సంఖ్యను తెలుపుతున్నదే కాని ఎంత ఎక్కువ లేదా తక్కువ సమయంలో ఈ జీవరాసి ఉత్పాదితమయిందనే విషయం తెలుపదు. కాబట్టి ఉత్పాదక రేటు గమనించడం కూడా అవశ్యకం. ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో జనాభా వివరీతంగా పెరగడానికి ఎన్నో రకాల కారకాలున్నాయి.

వాస్తవ ఉత్పాదక రేటు నిర్ణయించడానికి జీవుల మొదటి వైయక్తిక సంఖ్యలో అటు తరవాత చేరే [ఉత్పన్నం చెందే] వాటి సంఖ్యను కూడ, పోయిన [మృతుల] వాటి సంఖ్యను తీసివేసిన కాలప్రమాణాన్ని పరిగణిస్తారు.

తొలగివేత రేటు

వివిధ రకాలుగా తొలగించిన లేదా నేకరించిన జీవ సముదాయాన్ని కాలప్రమాణంతో లెక్కగట్టి ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో జరిగే నష్టాన్ని తెలుసుకొంటారు. ఇది ఉత్పాదకతకు చెందిన రెండవ కొలత.

వృక్ష, జంతు జీవుల ప్రవాసం, భూచర జీవుల పరభక్షకత్వం, జీవుల ప్రవాహగమనం, అవక్షేపాల నుండి జరిగిపోయే పోషకాహార నష్టం. వాణిజ్యపరంగా చేపల నేకరణ మొదలైనవి కొన్ని జీవుల తొలగివేతకు కారణాలు. ఒక జీవ సముదాయం తన వ్యవస్థను సజావుగా ఉంచుకోవడానికి నష్టం జరిగిన దానికి సరిపడునంతగా తిరిగి పూరించుకోవాలి. దిగుబడికి, తిరిగి పూరించుకోవడానికి మధ్య ఉండే నిష్పత్తి ఉత్పాదకతకు చెందిన అతిముఖ్యమైన ప్రమాణం. దీనితో మానవుడు లేదా పరభక్షక - భక్షిత సంబంధాలు, తదితర జీవావరణ విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇంతేగాక ఆ జీవ సముదాయాన్ని వైన వివరించిన జీవులు ఏ విధంగా అతి తక్కువగా లేదా అతి ఎక్కువగా వినియోగించుకున్నారనే విషయానికి అర్థం పడుతుంది.

ఉత్పాదక రేటు

విస్తారమైన పారశక్తి కుంటకు లభిస్తుంది. కాని కుంట మొత్తం మీది పారశక్తిలో చాలా కొద్ది భాగం పచ్చని మొక్కలలో జరిగే కిరణజన్య సంయోగక్రియకు, వినియోగపడే వాటి శరీరంలో కార్బానిక పదార్థాలు [కార్బోహైడ్రేట్లు]గా నిలిచిపోతుంది. కార్బోహైడ్రేట్లొని ఈ శక్తి మొక్కల నికర ఉత్పాదనను లేదా ప్రాథమిక ఉత్పాదనను తెలుపుతుంది. కిరణజన్య సంయోగంవల్ల ఉత్పన్నమైన మొత్తం శక్తిని మొక్కలు నూటికి నూరుపాళ్ళు తమ పెరుగుదలకు ఉపయోగించవు. జీవక్రియకు వినియోగించే కార్బోహైడ్రేట్ మొత్తంతో సమానమైన శక్తి నుండి శ్వాసక్రియ వినియోగాన్ని తీసివేసి ఖచ్చితంగా మొక్కలో జరిగిన వృద్ధిని తెలుసుకొంటారు. దీన్ని నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదనం అని పిలుస్తారు. ఒక కాలప్రమాణంలో పెరిగిన మొక్క పదార్థ పరిమాణాన్ని స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదనం అంటారు. నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదనం కార్బానిక పదార్థం ఏ రేటులో నిలువ అయిందనే విషయం తెలుపుతుంది. ప్రాథమిక ఉత్పాదనానికి చెందిన ఈ రెండు రేట్లను [అంటే - నికర, స్థూల] కుంట వైశాల్య ప్రమాణంగా లేదా ఘనప్రమాణంగా కుంట ఉపరి తలాన్ని అనుసరించి ప్రమాణాలుగా వ్రేళ్ళాల ప్రమాణంగా లేదా సెంటీమీటర్లకు చిహ్నం, 'day' తలం నీళ్ళలో స్థూలంగా లేదా నికరంగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు ఉపయోగపడే పగటి వెలుతురు గంటలు.

పరపోషిత జీవులు గ్రహించే శక్తిదాయకమైన ఆహార వినియోగాన్ని ద్వితీయ ఉత్పాదనం అని పిలుస్తారు. ఈ జీవులు ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి వినియోగదారులు, విచ్చేదకారులు. వీటిలో

శక్తి నిలువ అయ్యే రేటును ద్వితీయ ఉత్పాదన రేటు అంటారు. ఈ రేటు ప్రతి వైస్తాయిలో, అంటే కింది శాకాహారుల నుండి వై మాంసాహారుల వరకు తగ్గుతూపోతూ ఉంటుంది.

11.9 నీటి రకాల వర్గీకరణ - వాటి ఉత్పాదకతాశక్తి

ప్రత్యేకంగా చేపల దిగుబడికి నీటి ప్రాంతాలను వర్గీకరించడానికి ఉత్పాదకతకు కొలతబద్ధగా తీసుకొంటారు. నీటి లక్షణం దీనికి మూలాధారం. ఆమ్లయుతజలం [5.5-6.5 పిహెచ్], అతి క్షారయుతజలం [8.5 పిహెచ్ కుమించిన] అనుత్పాదకాలు. 7.5 నుండి 8.5 పిహెచ్ తో ఉండే నీరు సగటు ఉత్పాదనకు అనుకూలంగా పరిగణిస్తారు. 20 పిపియమ్ కంటే ఎక్కువ క్షారత, అతి తక్కువ ఉత్పాదకతకు చిహ్నమైతే, ఇంతకంటే ఎక్కువ పిపియమ్ క్షారత ప్రభావం ఉత్పాదకపై ఉండదు. 5 పిపియమ్ కంటే తక్కువ కరిగిన ఆక్సీజన్ చేపకుంటుకు అననుకూలం. మామూలు పరిస్థితులలో కరిగిన ఆక్సీజన్ గాఢత 7 పిపియమ్ కంటే పాచ్చుగా ఉండడం ఉత్పాదకతకు శ్రేయస్కరం, 0.1 పిపియమ్ కంటే తక్కువ కరిగిన అకార్బనిక్ నైట్రోజన్ అతి తక్కువ ఉత్పాదకతను సూచించగా, 0.1 నుండి 0.2 శ్రేణి పిపియం N_2 ఉండే కుంటలు ఉత్పాదకతకు అనుకూలిస్తాయి. 0.05 పిపియమ్ కరిగిన ఫాస్ఫేట్ $[P_2O_5]$ అనుత్పాదక చేపకుంటు లక్షణమైతే 0.05 నుండి అతి ఉత్పాదకత 0.20 పిపియమ్ మధ్యమనుండి అతి ఉత్పాదకత, 0.20 పిపియమ్ మించినవి అత్యంత ఉత్పాదక కుంటల లక్షణాలు. అయితే నీటిలో కరిగిన ఫాస్ఫరస్ బహు తొందరగా మార్పుచెందుతుంది. కాబట్టి చేపకుంటుల ఉత్పాదకతకు సమ్మదగిన సూచిక కాజాలదు.

స్వపరిశీలన

1. బెంథాన్
2. పీట్

11.10 సారాంశం

నీటి గుణము, తీరు, దాని భౌతిక లక్షణములు, అనగా ఉష్ణోగ్రత, సాంద్రత, వెలుతురు, చేపకుంటులలో పెరుగు చేపలపై నీటి ప్రభావము ఇక్కడ వివరించబడినది.

అలాగే నీటి ముఖ్యమైన రసాయన లక్షణములు, అనగా నీటిలోని ఆమ్లజని, కార్బన్ ద్వితీయజనికము, pH, నీటిలోగల ఘనపదార్థములు, నిర్జీవ పదార్థములు అనగా నత్రజని, భాస్వరము, ఇనుము మొదలైన వాటిని గురించి కూడ ఈ భాగములో చెప్పబడినది. వై పదార్థములన్నీ చేపల సరియైన పెరుగుదలకు తోడ్పడును. అలాగే నీటిలోని మొక్కలు, ప్లాంక్టాన్ కూడ చేపల పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడును. నీటిలో జీవ పదార్థముల ఉత్పాదకతను గురించి కూడ ఇక్కడ వవరించబడినది.

11.11 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. బెంథాన్: నీటి అడుగుమీద నివసించే జీవ సముదాయాన్ని బెంథాన్ అని పిలుస్తారు. నీటిలో ఫైట్ బెంథాన్, జాబెంథాన్ అని రెండు రకాలు.
2. పీట్: పీట్ నేల ప్రాంతంలో నీటిలో కరిగే క్షార లవణాల నిలువలుంటాయి. అలూవియల్, తీరప్రాంతాల సరస్సులు, నదులుపారే ప్రాంతాలు ఎండినట్లయితే సాధారణంగా నీలం లేదా నీలం నలుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. దానికి కారణం ఇనుము, కెర్రన్ కార్బానిక్ పదార్థాలు.

11.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. నీటి భౌతిక లక్షణాలను ప్రభావితం చేసే కారకాలను వివరింపుము.
2. నీటి లక్షణాలను ఉపయోగించి కింది ఏదేని మూడింటి పాత్రను తెలుపుము
a) ఆక్సిజన్ b) కార్బన్ డయాక్సైడ్ c) సంపూర్ణ క్షారత d) పిహెచ్ e) పూర్తి ఉష్ణతనం
f) కరిగిన ఘన పదార్థాలు.
3. ఒకనీటి ప్రాంతం జీవ సంబంధ అంశాలను వేర్కొనుము.
4. భారతదేశంలోని వివిధ రకాల నేలలను తెలుపుము.
5. నేల రసాయనిక స్థితిని వివరింపుము.
6. నీటి ప్రాంతాల ఉత్పాదకతను కొలిచే వివిధ పద్ధతులను వర్ణింపుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. నీటి లక్షణంలో నైట్రోజన్, దాని సమ్మేళనాల పాత్ర.
2. నీటి లక్షణంలో ఫాస్ఫరస్ పాత్ర.
3. నీటి లక్షణంలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం పాత్ర.
4. నూక్లు మూలకాలు.
5. నీటి ప్రాంతంలో ఉత్పాదకత.
6. నీటి ప్రాంతంలో ఆహారపు గొలుసు.

భాగం-12 కుంట నిర్వహణ

విషయక్రమం

- 12.1 ఉద్దేశ్యం
- 12.2 ఉపోద్ఘాతం
- 12.3 చేప కుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు
- 12.4 సర్పరీ కుంటల నిర్వహణ
 - 12.4.1 కలుపు మొక్కల నిర్మూలన
 - 12.4.2 భిక్షక చేపల, నిరుపయుక్త చేపల నిర్మూలన
 - 12.4.3 జలకీటకాల నిర్మూలన
 - 12.4.4 గుడ్డు చేపలను విడవడం
 - 12.4.5 అదనపు ఆహారం
- 12.5 నేకరణ
 - 12.5.1 పోషణకుంటల నిర్వహణ
 - 12.5.2 వసి చేపలను విడుదల
 - 12.5.3 అదనపు ఆహారం
 - 12.5.4 నేకరణ
- 12.6 నిలువకుంట నిర్వహణ
- 12.7 నిలువ కుంట ఎన్నిక నిర్వహణ
 - 12.7.1 నీటి కలుపు మొక్కల నియంత్రణ
 - 12.7.2 ఉపయుక్తం కాని చేపల నిర్మూలన
 - 12.7.3 సున్నం చల్లడం
 - 12.7.4 చిరు చేపలను నిలువకుంటలో విడవటం
 - 12.7.5 అదనపు ఆహారం
 - 12.7.6 ఆరోగ్యపరిరక్షణ
 - 12.7.7 నేకరణ
- 12.8 సారాంశము
- 12.9 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 12.10 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు
- 12.11 పదకోశము

12.1 ఉద్దేశ్యం

మంచినీటి చేపల పెంపకంలో నవీన సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా చేపల దిగుబడిని అధికంగా సాధించడానికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ విషయాలు ఈ భాగంలో చర్చించబడినాయి. కుంటల్లో

చేపపిల్లలను విడువడానికి ముందు, అటుతరవాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను, మెలకువలను గూర్చి తెలియజేయడమయింది.

12.2 ఉపోద్ఘాతం

గరిష్ఠ ఉత్పాదకతకు అలంబించిన చేపకుంటుల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు. కార్ప్ చేపల త్రిదశాత్మక సంస్కార వ్యవస్థ-నర్సరీ, పోషణ నిలువ కుంటలు వాటి నిర్వహణ. నిర్వహణ పద్ధతులు ఆచరణకు స్థూలంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చేపలను కుంటల్లో విడిచేముందు, తరవాత నిలువజేసేటప్పుడు గమనించవలసిన విషయాలు. విడిచేముందు కుంటల పరిశుభ్రత, నీటి నేల స్థారాలను పెంచడంవంటి చర్యలు. విడిచేటప్పుడు చేప కుంటలోని చేపల సాంద్రత, వాటి జాతి సమ్మేళనాలు గమనించడం. విడిచిన అనంతరం సరఫరా చేయబడిన అదనపు ఆహారం, చూడవలసిన ఆరోగ్య లక్షణాలు. నర్సరీ కుంట ఉద్దేశ్యం 5-6 మి.మీ. గుడ్డు చేపలను, పసిచేపలుగా 25-30 మి.మీ. పరిమాణం వచ్చేవరకు పెంచడం [15 రోజులు]. పోషణ కుంటలలో పసిచేపలు, 100-150 మి.మీ. పొడవు పెరిగి చిరుచేపలుగా మారడం [దాదాపు 3 నెలలు]. నిలువ కుంటలో చిరుచేపలను మార్కెట్ సైజుకు గరిష్ఠ పరిమాణంలో పెంచడానికి అవలంబించే నిర్వహణ పద్ధతి. పాతుబద్ధ నిర్వహణ పద్ధతులతో చేపల పెంపకంపై అధికలాభాలు రాబట్టే చర్యలు.

12.3 చేపకుంటుల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు

మన దేశంలోని పలుప్రాంతాల్లో అనాది నుండి చేపల పెంపకం ఒక వృత్తి. అయితే అనేకరకాల చేపలను ఒకే చెరువులోగాని, కుంటలోగాని సక్రమ పద్ధతులేవీ పాటించకుండా అశాస్త్రీయంగా పెంచు తున్నారు. ఈ నీటి కుంటల్లో పెరిగే చేపలకు తగిన ఆహారం దొరకవందువల్ల, ఒక దాన్ని మరొకటి తినటంవల్ల లేదా వేరే నీటి జీవులు చేపలకు హానికలిగించడంవల్ల దిగుబడి చాలా తగ్గిపోతుంది. ఇటువంటి మరెన్నో ఆవరణ సంబంధమైన కారకాలు వాటి మనుగడకు, పెరుగుదలకు హానికరంగా పరిణమిస్తాయి. ఈ విధమైన కారకాలను తొలగించి సరైన పరిస్థితులు కల్పించి చేపల దిగుబడిని అధికం చేయడమే నీటి కుంటుల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతుల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

భారత దేశంలో కార్ప్ చేపల లాభసాటిదని రుజువయింది. బొచ్చెరకానికి చెందిన చేపలను కార్ప్లు అంటారు. వీటికి తల మీద పాలునులుండవు. వీటికి ఒకే వృష్టవాజం, వెబేరియన్ అస్థిభండాలు, వాయుకోశం ఉంటుంది. కట్ల [కట్ల కట్ల], రోహా [లేబియో రోహా], మ్రెగాల్ [స్పెరినా మ్రెగాల్], విదేశీయ వెండికార్ప్ [ప్లాటోఫెక్టిక్స్ మోలిత్రిక్స్], గడ్డికార్ప్ [టెనోఫారింగోడాన్ అయిడెల్లా], సామాన్యకార్ప్ [స్పిషిస్ కార్పియో] మొదలైన భారత దేశానికి చెందిన పెద్ద కార్ప్ చేపలు.

శాస్త్రీయంగా చేపల పెంపకాన్ని మూడు దశల్లో నిర్వహించవలసి ఉంటుంది.

మొదటి దశలో అప్పుడే పుట్టిన గుడ్డు చేపలను నర్సరీ కుంటలలో పదహారు రోజుల వరకు పెంచుతారు. ఆ తరువాత రెండవ దశలో పోషణ కుంటల్లో [Rearing pond] ఎదిగిన పసి చేపలను

7.6.2. మెటాపెనియన్ మాన్ సెరాన్

దీని వివిధ డింభక దశలను గుర్తించే లక్షణాలు ఇవి:

నాప్లియన్ I	- ఒక జత శూకాలు.
నాప్లియన్ II	- ఒక జత పిచ్చాకార శూకాలు.
నాప్లియన్ III	- 3 జతల శూకాలు
నాప్లియన్ IV	- 6 జతల శూకాలు: మాక్సిల్లిపీడ్ ఆద్యాలు
నాప్లియన్ V	- 7 జతల శూకాలు, మాక్సిల్లిపీడ్ ఆద్యాలు, జంభికలు
ప్రోటాజూయూ I	- ఉదరం, పుష్ప కవచ నిర్మాణం కనిపిస్తుంది.
ప్రోటాజూయూ II	- నేత్రవృంతం పెరియోపోడ్ ఆద్యాలు కనిపిస్తాయి
ప్రోటాజూయూ III	- పుచ్చపాదం, ఉదర కంటకం పార్శ్వ కంటకం గోచరిస్తాయి.
మైసిన్ I	- ప్లియోపోడ్ మొగ్గలు ఉంటాయి.
మైసిన్ II	- ప్లియోపోడ్ మొగ్గలు ఒక ఖండితంతో
మైసిన్ III	- ప్లియోపోడ్ మొగ్గలు రెండు ఖండితాలతో

బాగా పెరిగిన మైసిన్ 3-3.5 మి.మీ పొడవుంటుంది. డింభకానంతర దశలు 3.75-4.0 మి.మీ పొడవుతో, త్రోటి చాలా చిన్నగా చివర కోసుగా, దీని మూలంలో రెండు కంటకాలతో, దీని మొదటిలో కంటకం ముందు మరో చిన్న కంటకంతో ఉంటుంది. ఆరవ ఉదర ఖండితం మీద పుష్ప కంటకం ఉంటుంది. వీటిది గోధుమ వర్ణం, స్పర్శశృంగికల వృంతాలది ఎర్ర వర్ణం, వాల ఖండం మీద పూర్తిగా ఉదర భాగంలో ఎరుపు క్రొమాటోఫోర్లు చాలా ఉంటాయి. డింభకం ఇంకా పెరిగిన తరువాత పుష్పకవచం వక్రాలలో వీలి గోధుమ మచ్చలు పట్టిగా అమరుతాయి. ఇదే సమయంలో ఉదర పుష్పభాగం మీద M ఆకారంతో ఉండే నీలం నలుపు మచ్చ ఏర్పడుతుంది.

7.6.3. మెటాపెనియన్ బ్రెవికార్నిస్

దీని డింభకానంతర దశలో పరిమాణం 3.0-3.5 మి.మీ. అతి చిన్న త్రోటితో గోధుమ వర్ణంతో ఉంటుంది. యవన రొయ్య త్రోటి పొడవు కొద్దిగా పెరుగుతుంది. దీని మూలభాగం ఎత్తుగా ఉంటుంది. పుష్ప భాగంలో తోటిక 7 పళ్ళు ఉంటాయి. త్రోటి పొడవు 2.2. మి.మీ. పుష్ప కవచం గాఢ పసుపు రంగుతో ఉదర పార్శ్వాలు ఇటుక ఎరుపు పట్టీలతో పుచ్చపాదాలు, వాలఖండం ఎర్రని మచ్చలతో ఉంటాయి.

వ్యవస్థీకరణ

1. పొదిగిన నాలుగు రోజుల తరువాత రోహిత డింభకం
2. చన్నా చేప 2 రోజుల డింభకము

7.7 సారాంశం

రోహా, సిప్రిన్, హైపాథాల్మిక్టిన్, టీనోపారింగ్ డాన్ చన్నా, చేపల జీవిత చరిత్రలను ఈ భాగంలో వివరించబడినది.

పెంపకాని కువయుక్త మైన రొయ్యల జీవిత చరిత్రలను గురించి కూడా ఇక్కడ విశదీకరింప బడినది.

చేపనారు అన్వేషణ, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయినాయి.

ఈ పరిశోధనలు చేపనారు సేకరణ కేంద్రాలను గుర్తించడానికి, గుడ్లను సేకరించేవల ఉపయోగానికి సహాయపడతాయి.

బందాలు ప్రాకృతికంగా లేదా కృత్రిమంగా తయారైన చెరువులు. వీటిలో చేపలు ప్రజననం చేయడానికి కావలసిన నదుల పరిస్థితులను అనుకరించడం లేదా కల్పించడం జరుగుతుంది.

8.3 నదులలో గుడ్డు చేప సేకరణ

భారతదేశంలో చేపల పెంపకాన్ని వృద్ధి చేయటానికి అత్యధికంగా చేపనారు లభించటం ప్రాథమికంగా ముఖ్యం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్ కట్ల (కట్ల కట్ల), రోహ (లేబియో రోహిట), మ్రిగాల్ (సిరైనా మ్రిగాల) మొదలైన చేపలను దేశమంతటా మంచి నీటి కుంటల్లో చెరువుల్లో పెంచడానికి ఇష్టపడతారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఈ భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలు నదులలో నివసిస్తాయి. కాని గుడ్డు చేపలు ఉండే మూల స్థానం వరదవచ్చేది. చాలాకాలం నుండి ఈ ప్రాకృతిక వనరులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపలను పసి చేపలను సాంప్రదాయక పద్ధతులతో సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ పద్ధతులు ముఖ్యంగా బెంగాల్‌లో పుట్టి తూర్పు భారత రాష్ట్రాలకు విస్తరించినాయి. చేపనారు వాణిజ్యం ఇప్పటికీ ఈ వనరులపైననే ఆధారితమై ఉంది.

నదులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపల సేకరణ ముమ్మరంగా జరిగినప్పటికీ, సేకరణ పద్ధతులు గుడ్డు చేప సేకరణ వలలకు రవాణాకు సంబంధిత శాస్త్రజ్ఞానం తగినంతగాలేక పోవడంవల్ల విలువైన చేపనారు విపరీత నష్టానికి గురి అవుతుండేది.

ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి చేపనారు అన్వేషణకు, పరిశోధనకు శాస్త్రీయ ఆధారం కల్పించడం వివిధ భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయింది. గుడ్డు చేప సేకరణ వలలను ప్రమాణీకరించడం, సేకరణ పద్ధతులను క్రమంగా మెరుగుపరచడం, చేపనారు లభ్యత నిలకడగా ఉండని పరిస్థితులకు, కాలానికి, స్థలానికి ఉండే సంబంధము, వీటికి బాధ్యతవహించే కారకాల ధ్రువీకరణ మొదలైన అంశాలు పరిశీలనకు నాందిపలికారు.

మొత్తం దాదాపు 3660 మిలియన్ల చేపనారులో నది వనరుల నుండి సేకరించినది 91.6% అని భారతదేశ చేపనారు సేకరణ అంచనాలవల్ల తెలుస్తున్నది. ఇంతేగాక మంచి నీటిలో చేపల పెంపకం చేసే వారి అవసరాలను అదుకోవడానికి సుమారు 6000 మిలియన్ల చేపనారు అవసరమవుతుందని కూడా అంచనాలవల్ల తెలుతున్నది. ఈ తీవ్రకొరతను ఎదుర్కోవడానికి, స్వయం సమృద్ధి సాధనకు, నది వనరుల తక్షణ అన్వేషణ చేసి, చేపనారు అదనంగా లభించే కేంద్రాలను తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది.

8.4 నదులలో చేపనారు వనరులు

భారతదేశంలో అయిదు పెద్ద నదీ వ్యవస్థలున్నాయి. అవి గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధు నదీ వ్యవస్థలు ఉత్తరంగా, తూర్పు తీర, పశ్చిమ తీర ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థలు దక్షిణంగా ఉన్నాయి. గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధుహిమాలయనదీ వ్యవస్థలలో మంచునీరు ప్రవహిస్తుంది. అందులో జీవరాశులు, మత్స్య సంపద సమృద్ధిగా ఉంది. మహానది, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి నదుల తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థ, నర్మద, తపతి నదులతో పశ్చిమ తీర నదీ వ్యవస్థ, ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండు వ్యవస్థలు వర్షాధారం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్లు మొదట గంగానదీ వ్యవస్థలకు సంబంధించినవి. వీటి స్థానాంతరీకరణం (Transplantation) జరగడంవల్ల ఇప్పుడు తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థలలో స్థిరపడ్డాయి.

ఈ చేపల ఆరోగ్యాన్ని, పరిపక్వతను నియమబద్ధంగా పరీక్షిస్తూ ఉండాలి. వలవేసి పట్టినప్పుడు పరిపక్వ చేపలను మొరటుగా కదవగూడదు. వీటికి రోగాలు రానియకుండా కాపాడటానికి 1 పీపీయమ్ పొటాసియమ్ పర్మాంగనేట్ లో ముంచుతూ ఉండాలి. మగ, ఆడ చేపలను వేర్వేరు కుంటల్లో వేయడం ఎంతో మేలు.

9.6 ప్రేరేపిత ప్రజనన ప్రక్రియ

9.6.1 గుడ్లు పెట్టే చేపల ఎంపిక

చేపలలో లింగ భేదం ఉంది, సంపర్దిత కార్ప్ చేపలలో త్రైంగిక పరిపక్వత వర్ణాకాలంలో ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఏర్పడే స్వరూప లక్షణాలు-ఉరోవాజం గరుకెక్కిడం మొదలైనవి- లింగభేదాన్ని సూచిస్తాయి.

పరిపక్వం చెందిన మగచేప ఉరోవాజ పుష్పతలం గరుకు గరుకుగా ఉంటుంది. ఉదర భాగం పెడల్పుగా ఉండి, కొద్దిగా నొప్పినట్లయితే పాల తెలుపుతో ఉండే 'మిల్క్' అనే ప్రావం వెలువడుతుంది.

గుడ్లు పెట్టే చేప ఉరోవాజం నునుపుగా ఉంటుంది. పూర్ణపరిపక్వం చెందిన ఆడచేప ఉదర భాగం ఉబికి రంధ్రం ఉండేచోటు ఉబ్బుగా ఎరుపెక్కి ఉంటుంది.

ఆరోగ్యంగా ఉండే కార్ప్ చేపల 2-4 సంవత్సరాల వయస్సువి, 1-5 కి.గ్రా. బరువు తూగే ప్రజనన యోగ్యంగా పరిగణిస్తారు. గుడ్లు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వాడ్య పరిమాణంతో ఉండేదయితే పనికి సునాయాసంగా ఉంటాయి. ఎంపిక చేసిన చేపలను చేతివల (Hand net) లో వాటికి ప్రమాదం లేకుండా వేస్తారు. గుడ్లు పెట్టే చేపల బరువు వివరాల మరొక చోట తెలుపబడినవి.

9.6.2 పీయూష గ్రంథిసారం మోతాదు

చేపను ప్రేరేపించడానికి కావలసిన పీయూష గ్రంథి మోతాదును నిర్ణయించడం చాలా ముఖ్యం. వాన, ఉష్ణోగ్రత మొదలైన వాతావరణ స్థితిగతులు అనుకూలంగా ఉండి, చేపలు, పూర్తి పరిపక్వ దశకు చేరి ఉంటే కనిష్ఠ మోతాదు సరిపోతుంది. లేకపోయినట్లయితే కొంచెం ఎక్కువ మోతాదు అవసరమవుతుంది. మొదటగా చిన్న మోతాదులో ఇచ్చిన చేపకు 4-6 గంటల తరవాత ప్రభావం చూపే పెద్ద మోతాదులో ఇవ్వడం ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది.

భారతీయ పెద్దకార్ప్ లలో ఆడచేపలకు పె.గ్రం. పీయూష గ్రంథి మోతాదులో 2-3 మి. గ్రాంల పీయూష గ్రంథిని ఇవ్వాలి ఉంటుంది. 10 గంటల తరవాత చేపకు 5-8 మి. గ్రాంల గ్రంథిని రెండవ మోతాదుగా ఇవ్వాలి. ఆడ చేపకు పి.గ్రం. మోతాదు ఇచ్చేటప్పుడు మగ చేపకు కూడా కిలోగ్రాం శరీరం బరువుకు 2-3 మి.గ్రాంల చొప్పున మోతాదుగా ఇవ్వాలి.

ఈ ఇంజక్షన్ లను వగలు లేదా రాత్రి ఎప్పుడైనా ఇవ్వవచ్చు. కానీ ఉష్ణ చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే సాయంత్రం లేదా రాత్రి ఇస్తే ఎక్కువ ఫలితం.

9.6.3 పీయూష గ్రంథి సారాన్ని తయారుచేయడం, ఇంజక్షన్

ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ముందుగా పీయూష గ్రంథి సారాన్ని తయారు చేస్తారు. గుడ్లు పెట్టే చేప బరువును బట్టి ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి కావలసిన పీయూష గ్రంథుల పరిమాణాన్ని లెక్కకడతారు. పొయిల్ ల నుండి తీసిన పీయూష గ్రంథులను ఆల్కహాల్ ఎరిరిపోవడానికి ఒక వడత కాగితంపై ఒక నిమిషం పాటు ఉంచుతారు. తరవాత కొంచెం స్వీగ్నజలంతో కలిపి హోమోనైజర్ లో చివుకు (macerate) తారు. చివరికి పీయూష గ్రంథి స్రావంలో కావలసినంత స్వీగ్నజలం పరిమాణాన్ని కలిపి


గాడతను తగ్గించుకోవాలి. ఈ ప్రావం అతి పలుచగా లేదా గాఢంగా ఉండకూడదు. 20-30మి. గ్రాంల గ్రంథిని 1 మి.లీ. మాద్యమంతో పలుచగా చేస్తారు. 1 మి.లీ గరిష్ఠస్థాయిలోను, 0.1 మి.లీ. కనిష్ఠస్థాయిలో గుడ్లు పెట్టే చేప పరిమాణానికి అనుగుణ్యంగా గ్రంథిసారం ఉండే అవలంబనాస్థి (Suspension) ఇంజక్షన్ చేయాలి.

పీయూషగ్రంథి అవలంబనాస్థి విద్యుత్ యంత్రం ద్వారా లేదా చేతితో నడిపే యంత్రం ద్వారా కేంద్రాపసరణం (Centrifuge) చేయాలి. ఇందువల్ల కణజాలం తునకలు కేంద్రాపసారక నాళిక అడుగున నిలకడ చెందిన అవసాదనం (Sedimentation) గా ఉండిపోతాయి. హార్మోన్ తో ఉండే తేలిక పైద్రవాన్ని సేరంజిలోకి ఎక్కిస్తారు.

అంతర కండర ఇంజక్షన్ సులభము. ఎక్కువ ప్రభావితం. ఉరో లేదా శ్రోణి వాజ మూలంలో అంతర అంత్రవేష్టన ఇంజక్షన్ వల్ల అంతరంగాలు దెబ్బతినవచ్చు. ఈ ఇంజక్షన్ ను పుచ్చియ వృంత ప్రాంతంలో ఉండే పొలుసు కింద ఇస్తారు. ముందు సూదిని చేప శరీరానికి సమాంతరంగా ఉంచి గుచ్చాలి. తరువాత ఒక కోణంలో కండరాలలోకి చొప్పించాలి. దీనికి ఉపయోగించే అధశ్చర్మ (Hypodermic) సేరంజి 2 సీస పరిమాణం 0.1 సీస విభాజకాలతో ఉంటే చాలా సానుకూలము. సేరంజి సూది పరిమాణం ఇంజక్షన్ ఇచ్చే చేప పరిమాణంపై ఆధారితమయింది. (BDH) సూది నెం. 22 ను. 1 నుండి 3 కి.గ్రాంల బరువుండే గుడ్లు పెట్టే కార్ప్ చేపకు వాడతారు. సూది నెం. 19 అంతకంటే పెద్దదానికి, 24 కంటే చిన్నదానికి వాడతారు.

రెండు మగ ఒక ఆడ గుడ్లు పెట్టే చేపల జట్టును వాటి పరిమాణం, బరువు ప్రజనన హాపా (Breeding hapa) లోకి ప్రవేశపెడతారు. మగ చేప బరువు ఆడదాని కంటే కొంచెం ఎక్కువగానో లేదా సమానంగానో ఉండాలి.

ప్రజననహాపా ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార పెట్టె. దీని నాలుగుమూలల్లో బొంగుగడలకు కట్టటానికి తాళ్ళు ఉంటాయి. పైన శయన (Horizontal) గా ఉండే ఒక భాగంతప్ప హాపా అన్ని పక్కలా కుట్టివున్నందువల్ల మూసి ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి చేపను ఈ రంధ్రం ద్వారా హాపా లోపలికి పంపడమో లేదా బయటకి తీయడమో జరుగుతుంది. చేపను ప్రవేశపెట్టిన తరువాత హాపా రంధ్రాన్ని నాదాతో గట్టిగా మూస్తారు కాబట్టి తప్పించుకోలేదు. ప్రజననహాపాను దోమతెర గుడ్లతో (నైలాన్ గుడ్ల శ్రేష్ఠం) తయారు చేస్తారు ఈ రకమైన గుడ్లవల్ల హాపాలో నీటి భ్రమణానికి ఆటంకం ఉండదు. వేర్వేరు బరువులతో ఉండే భారతీయ కార్ప్ సమూహాలకు నాలుగు పరిమాణాల హాపాలను వాడవచ్చును.



పటం 9.2 ప్రజనన హాపా - పైన అడ్డంగా ఉండే మడతను తెరిచి చూపించడం జరిగింది. నాలుగు బొంగులతో పాతిన దృశ్యం. 1. గుండీ 2. పైన అడ్డంగా ఉండే మడత (పొర) 3. తెరిచిన చివర 4. గుండీ రంధ్రం 5. నిలువు మడత (పొర).

చిన్నగా, లోతు తక్కువగా ఉండే సర్పరీ కుంటల పరిమాణం 0.02-0.08 హెక్టార్లు (20x10-40x20 మీటర్లు) విస్తీర్ణం, 1.2 నుండి 1.5 మీ. ఈ కుంటలలో, గుడ్డు చేపలను పసి చేపలయ్యేంత వరకు (5.6-25.30 మీ.మీ.) పెంచుతారు. ఇవి సహజ సిద్ధంగా వర్షాధారంగా ఉండాలి.

పోషణ కుంటలు, సర్పరీ కుంటల కంటే పరిమాణంలో కొద్దిగా పెద్దవి. ఇవి 0.08 నుండి 0.10 హెక్టార్లు (40x20-50x20 మీటర్లు). వీటిలో పసి చేపలను వేసి, చిరు చేపలుగా పెంచుతారు. (25-30 నుండి 100 మీ. మీటర్ల వైన). ఇవి శాశ్వతమైన లేదా వర్షాధారమైన కుంటలు.

నిలువ కుంటలు అనేవి మూడో రకం. ఇవి పోషణ కుంటలకంటే పెద్దవి. వీటి పరిమాణం 0.2 నుండి 2.0 హెక్టార్లు, లోతు 2 నుండి 2.5 మీటర్లు. 0.5 హెక్టార్లకంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉండే నిలువ కుంటలు వాంఛనీయం. వీటిలో చిరు చేపలను నిలువ ఉంచుతారు. ఆహారానికి ఉపయుక్తమయ్యే పరిమాణం వచ్చేవరకు వీటిలో పెంచుతారు. ఈ కుంటలు శాశ్వతంగా నీటితో ఉండాలి.

ఈ కుంటలు దీర్ఘచతురస్రాకారంతో ఉండాలి. వెడల్పు 40 మీటర్లకంటే మించగూడదు. ఈ విధంగా ఉండడంవల్ల చేపలు చాలా కాలం నిలువ ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. వాటిని పట్టుకోవటానికి చిన్న వలలు, కొద్దిమంది సరిపోతారు కూడా అతి పెద్దగా ఉండే కుంటల నిర్వహణ, ముఖ్యంగా అందులోని నీటి మొక్కలను అదుపులో ఉంచడం కష్టం.

ప్రస్తుతం వైన పేర్కొన్న గుణగణాలతో ఉండే కుంటలను కార్ప్ చేపల పెంపకానికి ఉపయోగించ వచ్చు. చేపల పెంపకానికి ప్రత్యేకంగా కుంటలను నిర్మించినట్లయితే ఇష్టానుసారంగా నీళ్ళు నింపడానికి లేదా తీసి వేయడానికి సౌకర్యంగా ఉండేవి అత్యుత్తమం. కాని ప్రస్తుతం మన పరిస్థితులకు అటువంటి కుంటల నిర్మాణం ఖర్చుతో కూడినది, కష్టసాధ్యమైనట్టిది.

10.3 స్థలం ఎంపిక

చేప కుంట నిర్మాణంలో ఆదా, దాని ఉత్పాదక శక్తి ఈ రెండూ యోగ్యమైన స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడం మీద ఆధారితమవుతున్నాయి. అందుచేత కుంట నిర్మాణానికి అత్యుత్తమంగా ఉండే స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కార్ప్ చేపల కుంట నిర్మితి కోసం ఎంపిక చేసే స్థలానికి మూడు అతిముఖ్యమైన షరతులు ఉండి తీరాలి. అవి నేల రకం, ఎల్లలు, నీటి సరఫరా.

10.4 నేలరకం

నేలరకం: చేపకుంట అట్టడుగు నేల నీటిని పట్టిఉంచే స్వభావంతో ఉండాలి. వ్యవసాయం చేసే పొలాలు చేపకుంటలకు పనికిరావు. సది మార్గాలలో ఉండే స్థలాలు లేదా ఎండిన సది తలాలు లేదా జలాశయాల చిట్ట చివరి ప్రాంతాలు చేప కుంటలకు అయోగ్యం. ఏ విధంగాను పనికి రానటువంటి కొద్దిపాటి ఇసుకతో ఉండే చిత్తడి నేలలు లేదా నీరు నిలిచే ప్రాంతాలు వ్యవసాయ యోగ్యం కానట్టివి. చేపకుంట నిర్మాణానికి సరిపడతాయి. ఇసుక ప్రబలంగా ఉండే భూములలో నిర్మాణం తీవ్రమైన ఖర్చుతోను, నిర్వహణ వ్యయంతోను కూడినట్టిది, కాబట్టి వర్జనీయం. చేపకుంట నిర్మాణాన్ని చేపల పెంపకానికి పనికి వచ్చేటట్లు వ్యవసాయ యోగ్యంకాని భూములను తగు విధంగా మార్చి ఉపయోగించడమన్న మాట. మరో విధంగా చెప్పాలంటే భవిష్యత్ వ్యవసాయ పంటల సాగుకోసం మధ్యే మార్గంగా బీడు భూమిని అభివృద్ధి పరచడమే చేప కుంటల నిర్మాణం.

స్థూలంగా నేలను మూడు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. ఇసుకనేల, ఒండ్రునేల, రేగడి (బంకమున్ను) అని నేలలో ఉండే కణికల పరిమాణం ప్రకారం అంటారు. సాధారణంగా జిగురు పొరగమ్మత చాలా తక్కువ. ఇసుక నేలలో నీళ్ళు వెంటనే ఇంకిపోతాయి. కాని ఒండు, రేగడి నేలల్లో నీళ్ళు అంత తొందరగా ఇంకిపోవు. రేగడి నీళ్ళను నిలిపి ఉంచుకునే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల చేపకుంటలకు అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. జిగురుగా, సాగే గుణంతో ఉండే రేగడి నేలకు

ప్రత్యేకమైన వాసన ఉంటుంది. ఈ అక్షణాలలో ఆ నేలను గుర్తించవచ్చు. ఎండిన రేగడి నేల గట్టి పెళ్ళలుగా తయారవుతుంది. వీటిని వేళ్ళతో నలిపి పొడిగా చేయలేము. ఇది స్వేచ్ఛా జలాన్ని పీల్చుకొని నిలిపి ఉంచుకొంటుంది. రేగడి రంగు నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు లేదా పసుపు. దీనికి విరుద్ధంగా పొడి ఇసుక నేలను చేతిలో తీసుకొని పిసికినట్లయితే పోత పోసుకొని ముట్టుకోగానే విరుద్ధంగా పొడి ఇసుక నేలను చేతిలో తీసుకొని పిసికినట్లయితే పోత పోసుకొని ముట్టుకోగానే పొడిపొడిగా రాలిపోతుంది. కుంటలను ఇసుక నేలపై నిర్మించరాదు. కారణం సూక్ష్మరంధ్రాలు ఈ నేలలో ఉండడంవల్ల నీరు నిలవదు. ఎంపిక చేసిన స్థలం ఇసుక నేల అయినట్లయితే వేరేచోటునుండి రేగడి మన్ను తెచ్చి, పరచి, పూతపూసి కుంటలో నీరు నిలువ ఉండునట్లు చేయాలి. క్షుద్రభూములలో పశువుల పేడ, ఎండుగడ్డి ఎక్కువ పరిమాణంలో వేసి నీరు నిలిపి ఉంచుకునే సామర్థ్యం వాటిలో పెంచవచ్చు. సారవంతమైన నేల ముఖ్యమయినదేకాని దాన్ని చేపకుంటకోసం ఎంపిక చేసుకొన్నట్లయితే, నిస్సార, క్షుద్ర భూములను సేద్యయోగ్యం చేసే అక్ష్యం రెబ్బ తింటుంది.

10.5 ఎల్లలు

ఎల్లలు: ఎంపిక చేసిన స్థలం ఉపరితల అక్షణాలు నిర్మాణంలో ఆదా చేయడానికి చాలా ముఖ్యం. క్రమంగా ఏటవాలపుతూ ఉండే విశాలలోయ భూభాగం చేపకుంటకు అదర్శంగా ఉంటుంది. మూడువైపులా ఎత్తైన భూమితో ఆవుతమై, నాలుగోవైపు సన్నని నిర్గమ మార్గం, వీటి మధ్యన గుండ్రని చిప్ప ఆకారంతో ఉండే నేల కూడా చేపకుంటకు తగినది. వీటివల్ల నేలను తవ్వించడానికయే ఖర్చులు కనీస స్థాయిలో ఉంటాయి. తగిన నేల రకం, నీటి వనతి ఉండాలి. నిర్గమ మార్గాన్ని మూయడానికి నిర్మించే గట్టు వల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని పెద్ద కుంటగా మార్చే సౌలభ్యం ఉండాలి. కుంట అంతటా లోతు సమానంగా చేయడం నీరు కారిపోకుండా అడుగును గట్టి పరచడం అవసరం కావచ్చు. ఒక భూభాగంలో నిర్మితమయ్యే కుంటరకం ఆ భూఅక్షణాలపై ఆధారితమై ఉంటుంది. ఆ స్థలంలో తవ్వి తీసిన మట్టిని నింపడానికి లేదా అగడ్తలు, అడ్డుకట్టలు వేయడానికి వీలైనంతవరకు సరితూగేటట్లుగా ఉండాలి. ఈ విధంగా రూపకల్పనకు, నిర్మాణానికి ముందుగా స్థలం అక్షణాలను, ఆకారాన్ని క్షుణ్ణంగా సర్వేక్షణ జరిపి నిర్ధారించుకోవాలి.

10.6 నీటి సరఫరా

నీటి సరఫరా: స్థలం ఎంపికకు సమృద్ధిగా నీరు లభించడం ముఖ్యం. చేపకుంటలలో నీరు తగినంతగా నిండి 60 సెం.మీ కు మించి ఒడుదొడుకులు లేకుండా నీటిమట్టాన్ని కాపాడుతుండాలి. అతిగా నీరు సరఫరా జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. సరస్సులు, జలాశయాలు, చెలమలు, నదులు, వాగులు, కాలువలు, వాన నీటి ప్రవాహాలు, బావులు మొదలైనవి నమ్మక దగిన నీటి సరఫరా వనరులు. సరఫరాను అదుపుచేసే యంత్రాంగం ఉండి, నీరు కలుషితం కాకుండా ఉంటే వైన పేర్కొన్న వాటిలో ఏ వనరునైనా వాడుకోవచ్చు. ఇంకే పోవడంవల్ల లేదా ఇగిరి పోవడంవల్ల ఏర్పడే నీటి కొరతను పూడ్చడానికి కావలసిన నీటి వనరు చేప కుంటకు తప్పకుండా అందుబాటులో ఉండాలి. చాలినంత వర్షపాతం ప్రాంతాలకు, భారీవర్షాలుండే చోట్లకు, నీరు నిలుపుకునే నేలలకు వేరే నీటివనర్లు అక్కరలేదు. ఏమైనా సరాసరి సాలీనా ఇగిరిపోయే రేటు మాత్రం 2 మీటర్లుంటుందని గుర్తించుకోవాలి. భారీ వర్షాలు వర్షపుడు ఆకాశ కుంటలు (Sky ponds) ఏమైనప్పటికీ పొంగిపొర్లి పారకుండా రక్షించాలి.

పెద్ద చెరువులు, జలాశయాలు, సరస్సులు బహుశా అత్యుత్తమమైన వనరులు. దామలు చేపకుంటకు అతి చవకగా సీళ్ళుందిస్తాయి. కాలువల ద్వారా సరఫరా అయ్యే నది వనరులు కూడా సంతృప్తికరంగాను, నమ్మకదగినవిగాను ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాలలో చిన్న చిన్న చేపకుంటలకు వాగులు కూడా సంతృప్తికరంగా నీరు సరఫరా చేస్తాయి. అటువంటి వాగులకు దిగువ అక్షణాలుండాలి;

కొట్టుకొని పోతున్నాయని గమనించాలి. తక్షణం శ్రద్ధవహించాలి. గట్టుకు రెండువైపులా నిర్బంధ రంధ్రాల ఆరాతీయాలి. ఈ రెండు ఎప్పుడూ గట్టుతో సమకోణంలో ఉండవు. రంధ్రం చిన్నదయితే దట్టంగా పచ్చిగడ్డి ముక్కలను నీటి ఉపరితలం మీద విసిరేస్తారు. అవి రంధ్రాల వైపు అ నీటి ద్వారా ప్రవహించి బయటపడతాయి. నీరుకారే రంధ్రం పెద్దదైతే దాని వైన నీరు గిరిగిరా తిరుగుతుంది.

నీళ్లుకారే రంధ్రాలను, రంపపు పొడి లేదా తవుడు మొదలైనవి వడవేసి మూయవచ్చు. ఈ పదార్థాలను నీళ్లు రంధ్రాల్లోకి మోసుకొని పోతాయి. అక్కడ అవి ఉబ్బి నీరు కారడం ఆపేస్తాయి.

కొన్ని సమయాలలో పెద్ద పెద్ద గండ్లుపడి కుంటకట్టలు తెగిపోతాయి. గండి పూడ్చడానికి కావలసిన సామగ్రిని, శ్రామికులను సరిపడునంతగా కుంటవద్దకు చేర్చాలి. ముందు గట్టు చివరలను రక్షించాలి. లేనిచో గండి ఇంకా వెడల్పుతుంది. నీటివైపు అర్ధవలయాకారంగా చిన్న పొదలతో, బొంగు తడకలతో, ఇసుక బస్తాలతో కట్టవేయాలి. అటు తరవాత క్రమంగా గండివడ్డ భాగంలో మట్టి నింపాలి. వాటిలో ఇసుక బస్తాలను కూడా వేయాలి. ఇవి గట్టు మధ్య భాగాన్ని ఆక్రమించి పటిష్ఠం చేస్తాయి.

కుంట అడుగులో క్రమంగా ఒండు పేరుకొంటుంది. దీనివల్ల సాధారణంగా చేపల ప్రాణానికి చాలా ప్రమాదం వాటిల్లుతుంది. ఇటువంటి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, నీటి లోతును సరిగ్గా ఉంచడానికి మూడు లేదా ఐదు సంవత్సరాల కొకసారి, కుంటలోని నీటిసంతా తీసివేసి, ఒండును తొలగించాలి. కుంట అడుగు నుండి తీసిన ఒండును గట్టిగా ఉండదు. కాబట్టి అగడ్తల మరమ్మత్తుకు ఏమాత్రం వాడకూడదు. దీన్ని లోటలలో నాణ్యమైన ఎరువుగా వాడుకోవచ్చు. ఒండు మట్టిని అగడ్తల మీద ఎత్తు పెంచడానికి పోయవద్దు. ఇది ఏదో విధంగా తిరిగి కుంటలో చేరుతుంది. అగడ్తలను సరిచేసే కార్యక్రమాన్ని ఉపేక్షించరాదు. జలహీనపడిన నేలను పూర్తిగా తొలగించి దానిచోట తాజాపొడి మట్టి పొరలు పొరలుగా నింపాలి. అతుకుల పనివల్ల ప్రయోజనం లేని ఫలితంగా గండ్లు పడతాయి.

స్వపరిశీలన

1. నిలువ కుంటలు
2. చేపకుంట నిర్మాణానికి స్థూలంగా మూడు అంశాలను పరిగణించవలసి ఉంటుంది.

10.10 సారాంశం

చేప కుంటల నిర్మాణమునకు స్థల సేకరణ, వాటిని కట్టవలసి విధానములను గురించి ఈ భాగములో వివరించబడినది. ఈ చేపకుంటల నిర్మాణమునకు సరి అయిన స్థల సేకరణ చాల అవసరము. సరి అయిన నేల, సరిఅయిన pH మోతాదులో వుండుట కూడ చాల అవసరము. ఈ కుంటలకు సరియైన నీటి పారుదల కూడ ముఖ్యము. నీరు ఈ కుంటలలో సరిగా లేనిచో చేపలు సరిగా పెరగవు. ఈ చేపల నిర్మాణపటములు వాని రకములను గురించి కూడ ఇక్కడ వివరించబడినది.

10.11 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. నిలువ కుంటలు: ఇవిపోషణ కుంటలకంటే పెద్దవి. వీటి పరిమాణం 0.2 నుండి 2.0 హెక్టార్లు, లోతు 2 నుండి 2.5 మీటర్లు. 0.5 హెక్టార్లకంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉండే నిలువ కుంటలు వాంఛనీయం. వీటిలో చిరు చేపలను, నిలువ ఉంచుతారు. ఆహారానికి ఉపయుక్తమయ్యే పరిమాణం వచ్చేవరకు వీటిలో పెంచుతారు. ఈ కుంటలు శాశ్వతంగా నీటితో ఉండాలి.

10.12 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. కార్బ్ చేపల పెంపకానికి తగిన కుంటల వేర్వేరు రకాలను తెలుపుము.
2. స్థానం ఎంపికకు గమనించదగిన అతిముఖ్యమైన అంశాలు ఏవి? కుంటనిర్మాణానికి యోగ్యమైన నేలను గూర్చి వివరింపుము.
3. చేప కుంటలకు నీటి నరఫరాను గూర్చి వివరంగా వ్రాయుము.
4. కుంటల రూపకల్పనలో ముఖ్య అంశాలేవి? విశదపరచుము.
5. చేప కుంట నిర్మాణంలో వివిధ దశలను వర్ణింపుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేప కుంట నిర్మాణానికి ఎంపిక చేసిన స్థలం లక్షణాలు
2. కుంట నిర్మాణం

నీటి రసాయనిక లక్షణాలు

వాయువులు, ఘన పదార్థాలు, పోషక పదార్థాలు ఇవన్నీ నీటిలో కరిగి ఉండి, పిహెచ్‌తోపాటు కుంట రసాయనిక లక్షణాలను ఏర్పరుస్తాయి.

కరిగిన ఆక్సిజన్

చేపల జీవనానికి ప్రాకృతికమైన నీటిలో కరిగిన వాయువు లన్నింటికంటే ఆక్సిజన్ అత్యంత ముఖ్యమైనది. రెండు వనరుల ద్వారా దీని సరఫరా కుంటకు జరుగుతుంది: (i) కుంట నీటి ఉపరితలం వాతావరణం నుంచి గ్రహించడంవల్ల, (ii) కుంటలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిపే క్లోరోఫిల్ గల జీవులందడంవల్ల సూర్యరశ్మిలో మొక్కలు కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌ను గ్రహించుతాయి. ఆక్సిజన్‌ను వదులుతాయి. రాత్రిళ్లు ఆక్సిజన్‌ను వినియోగించి కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌ను వదులుతాయి. ఇది మామూలు శ్వాసక్రియ. కుంట నీళ్లలో ఉండే జంతుసముదాయం రాత్రొంబవళ్లు శ్వాసక్రియకు నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్‌ను గ్రహించి కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌ను వదులుతాయి. ఈ విధంగా నీటిలోని ఆక్సిజన్ వినియోగం జంతువులవల్ల, నీటి మొక్కలవల్ల, కార్బనిక పదార్థాలు కుళ్లిపోవడం వల్ల జరుగుతుంది. అందుచేత ఒకానొక సమయంలో నీటిలో ఆక్సిజన్ లభ్యత అంటే పైన తెలిపిన వినియోగం జరగగా మిగిలిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం అన్నమాట. నీటిలోని అన్ని జీవులకు సరిపడు కరిగిన ఆక్సిజన్ లభించాలంటే దాని ఉత్పత్తికి వినియోగానికి సమతుల్యత ఏర్పడి ఒక శ్రేణిలో ఆక్సిజన్ గాఢత కాపాడబడుతూ ఉండాలి.

కార్బన్‌డయాక్సైడ్

ప్రకృతి సిద్ధంగా కార్బన్‌డయాక్సైడ్ ఈ మార్గాల ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది: i) వాతావరణం, (ii) జంతువుల శ్వాసక్రియ, (iii) బాక్టీరియంల చర్యవల్ల కార్బనిక పదార్థాలు కుళ్లి పోవడం, iv) కుంటలలోకి వచ్చే భూగర్భజలాల ఉబు, CO₂ పరిమాణంపై నేలలో కుళ్లిన పదార్థాల మీద, కింద ఉండే శిలల రసాయనిక లక్షణాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, v) కాల్షియమ్, మెగ్నీషియమ్, వంటి ఇతర సమ్మేళనాలలో గర్భితమై నీటిలోనే ఉంటుంది. వాతావరణం నుండి నేరుగా కొంత కార్బన్‌డయాక్సైడ్ నీటితో కలుస్తుంది. వర్షం పడేటప్పుడు వాతావరణం నుండి కొద్దిగా కార్బన్‌డయాక్సైడ్ అందులో కరిగి సరఫరా అవుతుంది. వాన నీళ్లలో CO₂ సుమారు 0.3 మి. లీ. లేదా 0.6 మి. గ్రాంలు ఉంటుంది.

సంపూర్ణ క్షారత

కాల్షియమ్, Mg, Na, K, NH₄, Fe మొదలైన మూలకాల కేటయాన్‌లు, సమ్మేళనం చెంది కార్బోనేట్‌లు గానో లేదా బైకార్బోనేట్‌లుగానో లేదా అప్పుడప్పుడు హైడ్రాక్సైడ్‌లుగానో రూపొంది నీటిలో ఉండడం చేత నీటికి సంపూర్ణ క్షారత సిద్ధిస్తుంది. కలుషిత జలాలలో హైడ్రాక్సైడ్ క్షారత సాధారణం. ఇతర జలాలలో తీవ్రంగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిగేటప్పుడు ఉపరితల మధ్యాహ్నం అప్పుడప్పుడు హైడ్రాక్సైడ్ క్షారత సంభవిస్తుంది. 8.4 నుండి 10.5 శ్రేణిలో పిహెచ్ ఉండే నీటిలో బైకార్బోనేట్, కార్బోనేట్ మిశ్రమ క్షారత సాధారణంగా ఉంటుంది. పిహెచ్ ఉన్నత విలువలో బైకార్బోనేట్‌లు తగ్గిపోతాయి. 8.3 కంటే తక్కువ 4.5 కంటే ఎక్కువ పిహెచ్ విలువతో ఉండే నీటిలో నిజానికి కార్బోనేట్‌లుండవు. కాని స్వేచ్ఛా CO₂ బైకార్బోనేట్‌లు ఉండవచ్చు. సంపూర్ణ క్షారత ఉత్పాదకతకు కొలబద్ధ. ఉత్పాదన బాగా జరిగే నీటిలో క్షారత 100 పిపియంలకుమించి తప్పకుండా ఉండాలి. నదులు, చేపకుంటలు ఈ సంపూర్ణ క్షారత విలువకు లోపుగా అంటే 10-50 పిపియం CaCO₃కు సమానంగా ఉంటాయి.

పిహెచ్

హైడ్రోజన్ అయాన్‌లగాఢత లేదా పిహెచ్ సహజ నీటి వాతావరణంలో ఒక ముఖ్యమైన కారకం. దీని భిన్నత్వంతో ఆ నీటిలో జాతుల సమ్మేళనం, జంతువుక్త సముదాయాల జీవక్రియలు ముడిపడి ఉన్నాయి.

ఉదయాత్కార్యం : 6.5 నుండి 9.0 క్రేణి పిపాచ్ వరకు ఉండే కుంట నీటిలో చేపల పెంపకం చాలా యోగ్యమైనది. 9.5 పిపాచ్ విలువకుంటే మించినది అయోగ్యము. కారణం ఈ మించిన విలువ నీటిలో CO_2 లభ్యంకాదు. దాదాపు 11 పిపాచ్ వద్ద చేపలు చనిపోతాయి. అప్పుయంత జలం చేపల అకలిని తగ్గించి, పెరుగుదలను, విషవదార్థాలను నిరోధించే శక్తిని అరికడుతుంది. H_2S , రాగి, భారీలోహాలు మొదలైనవాటి విష ప్రభావం నీటి పిపాచ్ తగ్గినందువల్ల, హెచ్చుతుంది. ఈ నీటి ప్రభావం అప్రత్యక్షంగా కుంటలోని ఇతర జీవ సంబంధ సముదాయాలపై కూడా చూపి వాటిని నిర్వీర్యపరుస్తుంది. ఈ వాతావరణంలో చేపలు వరాన్న జీవులు, వ్యాధులకు గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది.

పూర్తి ఉప్పుదనము

Ca, Mg లవణాలు నీటిలో ఉండి, దానికి ఉప్పుదనాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇందులో వాటి సల్ఫేట్లు, క్లోరైడ్లుంటాయి.

పూర్తి ఉప్పుదనం లక్షణం వల్ల నీరుని రెండు వర్గాలుగా విభజించినారు. “కఠిన” జలం, “మృదు” జలం. మృదుజలంలో కఠిన Ca, Mg చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటూ, వాటిలో బంధిత CO_2 లీటర్ ఒక్కంటికి 5 మి.లీ మించకుండా ఉంటుంది. మధ్యగా ఉండే నీటిలో 5-22 మి.లీ మధ్యలో బంధిత CO_2 , కఠిన జలంలో బంధిత CO_2 22 మి.లీ. కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంతకంటే కూడా అంటే 50 మి. లీటర్లకు మించి కూడా ఉండవచ్చు.

స్వేచ్ఛా CO_2 15 పిపియమ్ కంటే ఎక్కువ గాఢంగా ఉంటే కుంట చేపలకు హాని జరుగుతుంది. గాలి పీల్చే చేపలు మట్టుకు 100 పిపియమ్ CO_2 గాఢతలో జీవించగలుగుతాయి.

కఠిన ఘనపదార్థములు

నీటిలో కార్బనిక్, అకార్బనిక్ ఘనపదార్థాలు కఠిగి ఉంటాయి. అకార్బనిక్ ఘనపదార్థాలు ద్రావణంలో ఉన్నప్పుడు ఎనయాన్ల రూపంలో ఉంటాయి. ఉదా. కార్బోనేట్లు, సల్ఫేట్లు, క్లోరైడ్లు, ఫాస్ఫేట్లు, నైట్రేట్లు మొదలైనవి. ప్లితోహాలు Ca, Na, Mg, Fe, K మొదలైన లోహాల క్లయూన్లు కూడా సమ్మిళితంగా ఉంటాయి. కార్బనిక్ సమ్మేళనాలలో ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, చక్రైరలు, అమ్లాలు, విటమిన్లు నీటిలో కఠిగి ఉంటాయి.

నీటిలో కఠిన ఘనపదార్థాల మొత్తం గాఢత ఆ నీటిలోని రసాయనిక సాంద్రతను తెలిపే ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఈ సాంద్రత నీటిలో జీవసంబంధాలను పెంపొందించే యుక్తమైన కారకంగా పనిచేసి ఉత్పాదకతకు దోహదం చేస్తుంది.

అకార్బనిక్ సమ్మేళనాలు

నైట్రోజన్, దాని సమ్మేళనాలు : నీటిలో నైట్రోజన్ స్వేచ్ఛాగా లేదా కార్బనిక్, అకార్బనిక్ సమ్మేళనాలుగా ఉంటుంది. స్వేచ్ఛా నైట్రోజన్ మూలకంగా, వాతావరణం నుండి అధికంగాను, లేదా నైట్రేట్, నైట్రైట్, అమ్మోనియా వగైరా సమ్మేళనాలు బాక్టీరియంల చర్యవల్ల విశ్లేషణ చెందినందువల్ల నీటికి లభిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత, పీడనం ఈ రెండింటి ప్రభావం మంచి నీటిలో నైట్రోజన్ కరగడంపై ఉంటుంది. కొన్ని పీడన పరిస్థితులలో నైట్రోజన్ అత్యధిక సంతృప్త దశకు చేరుతుంది. ఈ దశ ఏర్పడే స్థానంగా, గాలి నీటి సంగమస్థలం. ఈ పరిస్థితివల్ల కొన్ని సమయాలలో “గ్యాస్ బబుల్” లేదా వాయుబుద్బుధవ్యాధి చేపలకు సోకుతుంది. ఈ శరీరధర్మ పరిస్థితి అక్సీజన్ అత్యధిక సంతృప్తదశలో కూడా ఏర్పడుతుంది.

నైట్రోజన్ కుంట సారవంతంగా ఉండడానికి ముఖ్యమూలకం ఫాస్ఫరస్, ప్రాకృతిక జలాలలో ఫాస్ఫరస్ పరిమాణం అతితక్కువగా ఉంటుంది కాని కుంటను సారవంతం చేయడానికి ఇది ఒక అమోఘమైన మూలకంగా పరిగణితమవుతుంది. ఇది ఫాస్ఫేట్ల రూపంలో నీళ్లలో కఠిగి ఉంటుంది.

స్థవకాలు

నీటిమీద స్వేచ్ఛగా తేలుతూ ఉంటే జీవులవి రెండుసమూహాలు: స్థవకాలు, న్యూప్లాన్. స్థవకాలలో వృక్ష, జంతు జీవులు నీటి ప్రవాహం లేదా అలలతోపాటు చలించేవన్నీ చేరినాయి. న్యూప్లాన్ జీవులు నీటి ఉపరిస్తరానికి చెందినవి. i) కొన్ని ఉపరిస్తరం కిందుగా వేలాడుతూ తేదా తేలుతూ ఉంటాయి, (ఉ. బాక్టీరియా, ప్రోటోజోవా, శైవలాలు, ఎప్టమోస్ట్యాకా, కీటక డింభకాలు వగైరా) లేదా ii) నీటి ఉపరిస్తరం వైన తేలి ఉంటాయి. (ఉదా: జ్వేరిడి, వైలెడి, గైరినెడి)

అక్షణాలను బట్టి స్థవకాలను i) వృక్ష స్థవకాలని, ii) జంతు స్థవకాలని వర్గీకరించవచ్చు. వృక్ష స్థవకాలలో పత్రహరితముండే జీవులను, ఉదా: మైక్రోసిస్టిన్, వాల్యాక్స్, కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరపని మొక్కలను లేదా పూతికాస్థవకాలైన బాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలను చేర్చినారు. జంతు స్థవకాలలో జంతు రాజ్యానికి సంబంధించిన స్థవకాలుంటాయి.

నీటిలో గుచ్చాల వల్ల రంగుల విన్యాసంతోబాటు అసహ్యమైన వాసన, రుచి కులుగుతుంది. శైవల గుచ్చాల వల్ల తరచుగా చేపలు భారీ ఎత్తున మృత్యువు పాలవుతాయి. దీనికి కారణాలు ఎన్నో, ముఖ్యులు పట్టుడం వల్ల, కిరణజన్య సంయోగక్రియ శైవలాలలో జరగక ఆక్సిజన్ లోపం ఏర్పడటం, విచ్ఛిత్తివల్ల చేపల మొప్పులు భౌతికంగా శైవలాలతో మూసుకొని పోవడంవల్ల లేదా శైవలాల జీవక్రియ పర్యవసానంగా విడుదలైన విషవదార్థాల వల్ల జరగవచ్చు.

జంతు స్థవకాలలో కొన్ని జీవులు తగినన్ని సంఖ్యలో కూడి ఒక 'దండు'గా తయారవుతాయి. ఇటువంటి దండ్లు తయారవడంవల్ల అసంఖ్యాకంగా స్థవకాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఉదా: క్లాడోసేరా, ప్రోటోజోవా మొదలగునవి. మంచి నీటి కుంటల్లో ఈ దండ్లు, పెద్ద పట్టీలుగా, చారలుగా, మందంగా లేగా పల్చగా ఉండే కేంద్రీకృత ప్రాంతాలుగా చిన్న ముచ్చు తునకల మాదిరిగా విస్తరిస్తాయి.

బెంథాన్

నీటి అడుగున మీద నివసించే జీవ సముదాయాన్ని బెంథాన్ అని పిలుస్తారు. నీటివి ఫ్లోట్ బెంథాన్, జా బెంథాన్, అని రెండు సమూహాలు.

నీటి మొక్కలు చాలా రకాల జంతు సముదాయాల ఆవాసానికి యాంత్రిక ఆధారంగా ఒక జాలకం వలె ఏర్పడి, సహాయకారులుగా ఉంటాయి.

11.5 నేల అక్షణం

చేప కుంటలు ఫలవంతంగా ఉండడానికి నేల ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది. చేపకుంట నిర్మాణానికి ఎంపిక చేసే స్థలం చిద్రితంగా (సూక్ష్మ రంధ్రాలతో) ఉండగూడదనే విషయం ముఖ్యంగా గమనించదగిన అంశం.

భారత దేశంలో స్థూలంగా నేలను ఎనిమిది ముఖ్య రకాలుగా వర్గీకరించినారు. i) అలూవియల్ ii) నల్లరేగడి iii) ఎర్రమొరం iv) లాటరైట్ v) అడవి vi) ఎడారి vii) లవణక్షౌర viii) పీట్.

అలూవియల్ నేల

ఎన్నో నదీ వ్యవస్థల నుండి ప్రవహించిన ఒండ్రు గూడినందువల్ల అలూవియల్ నేల రూపొందుతుంది. ఈ నేల నిర్మితిలో కొన్ని రకాలున్నాయి. ఉదా. కొట్టుకొచ్చిన ఇసుక, లోమ్, అతి నన్నని ఒండ్రు, గట్టి బంకమన్న మొదలైనవి. ఈ నేల రంగు బూడిద లేదా నలుపు. ఈ నేలలో నైట్రోజన్ లోపించినా, క్షారాలు Na, K ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం తగినంతగా ఉంటాయి. ఈ నేల చిద్రత, నిర్మితి, నీటి పారుదలకు సుకరంగా ఉంటుంది.

నల్లరేగడి

నల్లరేగడి రెండు రకాల శిలల నుండి తయారైన నేల a) దక్కన్, రాజమహల్ బ్రాప్ (trap) నుండి b) పెరుజిన్ నెస్సెస్, ఫిస్ట్ల [Ferruginous gneisses] నుండి. ఇది తమిళనాడులోను అర్ధ శుష్క [Semiarid] ప్రాంతాలలో ఉంటాయి. ఈ నేల ఆర్టిలేషియస్ [Argillaceous]. ఇది అతి సన్నని నల్ల కణికలతో కార్బియమ్ - మెగ్నీషియమ్, కార్బనేట్లతో, ఇనుము, పొటాషియమ్, మెగ్నీషియమ్, అల్యూమినియం తగినంత నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. కాని ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, కార్బానిక పదార్థాలు అతి తక్కువ ఉంటాయి. నీటిని నిలుపుకునే శక్తి ఈ నేలకు అధికం. ఈ నేలలో మాన్టమోరిల్లిటిక్ [Montmorillonitic], బిడెలిటిక్ [Beidellitic] ఖనిజ సమూహాలు అధిక పరిమాణంలో ఉంటాయి.

ఎర్రనేల

ఈ నేల ప్రాచీన, మెటామార్ఫిక్ శిలలు శిథిలం కావటంవల్ల ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా అతి తక్కువ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సున్నం, ఇనుము ఆక్సైడ్, ఆకుపెంట మొదలైనవి ఉండే ఈ నేలలో ఖనిజ కవోలిన్ (Kaolinite) ప్రబలంగా ఉంటుంది. వీటికి నీటిని శోషించే స్త్రోమతగాని, క్షారాలను (K, Ca, Mg) మార్పిడిచేసే నిలుపుకునే శక్తిగానిలేదు. ఉన్నా అది బహుపరిమితం. ఫాస్ఫరస్ అతి తొందరగా ఇటువంటి నేలలో స్థిరీకరణం చెందుతుంది.

లాటెరైట్ లేదా లాటెరిక్ నేలలు

ఈనేల నిర్మాణంలో హైడ్రాక్సైడ్లు ముఖ్యంగా అల్యూమినియమ్, ఇనుముకు సంబంధించినవి. కొద్ది పరిమాణంలో మేంగనీస్ ఆక్సైడ్, టీటానియమ్ మొదలైనవి వాటి మిశ్రమం ఉంటుంది. ఈ పదార్థాలన్నీ వెసిక్యులార్ (Vesicular) శిలలువలె వుండి, నేలను దట్టంగా తయారుచేస్తాయి. ఈ నేలలో ఫాస్ఫరస్, పొటాషియమ్, కార్బియమ్, నైట్రోజన్ తక్కువ. పిహెచ్ శ్రేణి 4.8 నుండి 5.5, దీని మార్పిడి సామర్థ్యం కూడా తక్కువ.

అడవినేల

నవ్య వృద్ధివల్ల ఏర్పడే నేల కార్బానిక పదార్థం సమృద్ధిగా ఉంటుంది.

పడారి నేల

ఈనేల గోధుమవర్ణం ఇసుకతో తయారవుతుంది. కొన్ని ఇసుక నేలల్లో కరిగిన లవణాలు ఎక్కువ శాతంలో ఉంటాయి. కాబట్టి క్షారయుతంగా, తక్కువ కార్బానిక పదార్థంతో ఉంటాయి.

పీట్

పీట్ నేల ప్రాంతంలో నీటితో కలిగే క్షారలవణాల నిలువలు ఉంటాయి. ఆలూవియల్, తీరప్రాంతాల సరస్సులు, నదులుపారే ప్రాంతాలు ఎండినట్లయితే సాధారణంగా నీలం లేదా నలుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. దానికి కారణం ఇనుము ఫెర్రస్ కార్బానిక పదార్థాలు.

ఉప్పునేల క్షారనేల

సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం సల్ఫేట్ లవణాలు బాగా ఉండేది ఉప్పునేల. క్షారనేలలో సోడియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఈ నేలలు క్షార లక్షణాలతో ఉంటాయి. కార్బోనేట్ ఉండడంవల్ల ఇది అవిటి నేలగా మారుతుంది.

నేలలో ఉండే వివిధ వృక్ష పోషక పదార్థాలతో తరచుగా నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియమ్ మూలకాలు లోపిస్తాయి. అప్పుడు బయటి నుండి నీటిని సరఫరా చేయాలి.

కుంట బురద

కుంట అడుగు నేలకు, గాలి తగులుతుండే నేలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. i) ఏ మాత్రం గాలి లేని చోట్లలో, వివిధ రకాల చోట్ల నుండి వచ్చి ఒకచోట కూడిన మట్టితో అడునేల తయారవుతుంది.

భాగం-8 సహజవనరుల నుండి చేపనారు సేకరణ. బండాలలో ప్రజననము

విషయసూచిక

- 8.1 ఉద్దేశ్యం
- 8.2 ఉపోద్ఘాతం
- 8.3 నదులలో గుడ్డు చేప సేకరణ
- 8.4 నదులలో చేప నారు వనరులు
- 8.5 నదిలో గుడ్డు చేపలను సేకరించే విధానము
- 8.6 గుడ్డు చేపల సేకరణ కువకరించే పలులు
- 8.7 గుడ్డు చేపల సేకరణ విధానము
- 8.8 గుడ్డు చేపల లభ్యతకు సంబంధిత జలజీవశాస్త్ర అక్షణాలు
- 8.9 బండాలలో ప్రజననము
- 8.10 గుడ్డు పెట్టడం
- 8.11 గుడ్ల సేకరణ
- 8.12 గ్రామీణ చెరువులవృద్ధి
- 8.13 సారాంశము
- 8.14 స్వపరిశీలన జవాబులు
- 8.15 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

8.1 ఉద్దేశ్యం

ఈ భాగం నది, కట్ట చెరువు (బండా) మొదలైన సహజ వనరుల నుండి సాంప్రదాయక పద్ధతులలో చేపనారు సేకరణను వివరిస్తుంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా భారతీయ కార్ప్ ఉనికి నదికాని సహజంగా గుడ్డు పెట్టే ప్రాంతం వరద వచ్చేనది. ఇంతేగాక శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా చేపనారు సేకరణ, పరిశోధనలను గూర్చి చర్చిస్తుంది.

8.2 ఉపోద్ఘాతం

కార్ప్ చేపలు సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ప్రకృతి సిద్ధంగా నదులలో గుడ్డు పెడతాయి. ఆర్థికపరంగా లాభదాయకమైన చేపనారుతోబాటు ఈ నదులలో నిరర్థకమైన జాతులు కూడా కలుస్తాయి.

ఇప్పటికీ కూడా కార్ప్ గుడ్ల సముదాయాన్ని, పసి చేపలను ప్రకృతి సిద్ధ వనరులైన నదులనుండి, కట్ట చెరువుల నుండి సాంప్రదాయక పద్ధతులలోనే సేకరిస్తున్నారు.

శాస్త్రీయ పరిజ్ఞాన లోపంవల్ల చేపనారు, గుడ్డు సేకరించి రవాణా చేయడంలో విలువైన చేపనారు విపరీత నష్టానికి గురి అవుతున్నది.

చేపనారు అన్వేషణ, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయినాయి.

ఈ పరిశోధనలు చేపనారు సేకరణ కేంద్రాలను గుర్తించడానికి, గుడ్డును సేకరించేవల ఉపయోగానికి సహాయపడతాయి.

బందాలు ప్రాకృతికంగా లేదా కృత్రిమంగా తయారైన చెరువులు. వీటిలో చేపలు ప్రజననం చేయడానికి కావలసిన నదుల పరిస్థితులను అనుకరించడం లేదా కల్పించడం జరుగుతుంది.

8.3 నదులలో గుడ్డు చేప సేకరణ

భారతదేశంలో చేపల పెంపకాన్ని వృద్ధి చేయటానికి అత్యధికంగా చేపనారు లభించటం ప్రాథమికంగా ముఖ్యం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్ కట్ల (కట్ల కట్ల), రోహా (లేబియో రోహా), మ్రిగాల్ (సిరినా మ్రిగాల) మొదలైన చేపలను దేశమంతటా మంచి నీటి కుంటల్లో చెరువుల్లో పెంచడానికి ఇష్టపడతారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఈ భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలు నదులలో నివసిస్తాయి. కాని గుడ్డు చేపలు ఉండే మూల స్థానం వరదవచ్చేది. చాలాకాలం నుండి ఈ ప్రాకృతిక వనరులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపలను పసి చేపలను సాంప్రదాయక పద్ధతులతో సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ పద్ధతులు ముఖ్యంగా బెంగాల్ లో పుట్టి తూర్పు భారత రాష్ట్రాలకు విస్తరించినాయి. చేపనారు వాణిజ్యం ఇప్పటికీ ఈ వనరులపైననే ఆధారితమై ఉంది.

నదులలో కార్ప్ గుడ్డు చేపల సేకరణ ముమ్మరంగా జరిగినప్పటికీ, సేకరణ పద్ధతులు గుడ్డు చేప సేకరణ వలలకు రవాణాకు సంబంధిత శాస్త్రజ్ఞానం తగినంతగాలేక పోవడంవల్ల విలువైన చేపనారు విపరీత నష్టానికి గురి అవుతుండేది.

ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి చేపనారు అన్వేషణకు, పరిశోధనకు శాస్త్రీయ ఆధారం కల్పించడం వివిధ భారతీయ నదీ వ్యవస్థలలో ప్రారంభమయింది. గుడ్డు చేప సేకరణ వలలను ప్రమాణీకరించడం, సేకరణ పద్ధతులను క్రమంగా మెరుగుపరచడం, చేపనారు లభ్యత నిలకడగా ఉండని పరిస్థితులకు, కాలానికి, స్థలానికి ఉండే సంబంధము, వీటికి బాధ్యతవహించే కారకాల ధ్రువీకరణ మొదలైన అంశాలు పరిశీలనకు నాందిపలికారు.

మొత్తం దాదాపు 3660 మిలియన్ల చేపనారులో నది వనరుల నుండి సేకరించినది 91.6% అని భారతదేశ చేపనారు సేకరణ అంచనాలవల్ల తెలుస్తున్నది. ఇంతేగాక మంచి నీటిలో చేపల పెంపకం చేసే వారి అవసరాలను ఆదుకోవడానికి సుమారు 6000 మిలియన్ల చేపనారు అవసరమవుతుందని కూడా అంచనాలవల్ల తెలుతున్నది. ఈ తీవ్రకొరతను ఎదుర్కోవడానికి, స్వయం సమృద్ధి సాధనకు, నది వనరుల తక్షణ అన్వేషణ చేసి, చేపనారు అదనంగా లభించే కేంద్రాలను తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది.

8.4 నదులలో చేపనారు వనరులు

భారతదేశంలో అయిదు పెద్ద నదీ వ్యవస్థలున్నాయి. అవి గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధు నదీ వ్యవస్థలు ఉత్తరంగా, తూర్పు తీర, పశ్చిమ తీర ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థలు దక్షిణంగా ఉన్నాయి. గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, సింధుహిమాలయనదీ వ్యవస్థలలో మంచునీరు ప్రవహిస్తుంది. అందులో జీవరాశులు, మత్స్య సంపద సమృద్ధిగా ఉంది. మహానది, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి నదుల తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థ, నర్మద, తపతి నదులతో పశ్చిమ తీర నదీ వ్యవస్థ, ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండు వ్యవస్థలు వర్షాధారం. భారతీయ పెద్ద కార్ప్ లు మొదట గంగానదీ వ్యవస్థలకు సంబంధించినవి. వీటి స్థానాంతరీకరణం (Transplantation) జరగడంవల్ల ఇప్పుడు తూర్పు తీర నదీ వ్యవస్థలలో స్థిరపడ్డాయి.

పెంచుతారు. చివరకు అంటే మూడవ దశలో వీటిని నిలువ కుంటల్లో [Stock pond] అమ్మకానికి తయారయ్యే దశవరకు పోషిస్తారు. ఈ విధంగా మూడు దశలలో పెంచేటప్పుడు చేప పిల్లలను నీటి కుంటల్లో విడిచేముందు [Prestocking], విడిచేటప్పుడు [stocking] విడిచిన అనంతరం [Post stocking] తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఉంటుంది. అధికత్వద్వి దృష్ట్యా తీసుకొనే ఈ చర్యలన్నీంటిని స్థూలంగా చేపకుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు అని వ్యవహరిస్తారు.

చేప పిల్లలను నీటి కుంటల్లో, విడిచే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చర్యల్లో నీటి కలుపు మొక్కలను తొలగించడం, అనవసరమైన భక్షక జీవులను నిర్మూలించడం, నేల నీటి పరిస్థితిని మెరుగు పరచడం, ఎరువులు వేయడం మొదలైనవి.

చేప పిల్లలను విడిచేటప్పుడు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన విషయాలు - చేపకుంట భారశక్తి (Carrying capacity)ని, చేపపిల్లల సాపేక్ష సాంద్రతను [Relative density], ఎంపిక చేసుకొన్న వలు చేప జాతుల నమ్మకన పరిస్థితి మొదలైనవి.

చేప పిల్లలను విడిచిన అనంతరం తీసుకొనే ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో అదనంగా ఆహార సరఫరా, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, సేకరణ విధానాలు చేరి ఉంటాయి.

12.4 నర్సరీ కుంటల నిర్వహణ

ఫలదీకరణం చెందిన కార్ప్ చేప గుడ్లనుండి 3,4 రోజుల్లో గుడ్లు చేపలు సుమారు 5 మి.మీ. పొడవుండేవి. పొదిగి బయటకు వస్తాయి. వీటిని 20-30 మి.మీ. పొడవు పెరిగే వరకు నర్సరీ కుంటలల్లో పెంచుతారు. ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. కాబట్టి తగు జాగ్రత్త అవసరం. నర్సరీ కుంటలల్లో విడవడానికి నదులనుండి లేదా ఇతర వనరులనుండి గుడ్లు చేపలను సేకరించవచ్చు. అత్యుత్తమైన నిర్వహణకు ప్రరేపిత ప్రజననం వల్ల కలిగిన గుడ్లు చేపలు శ్రేష్ఠం. కారణం ఇవి స్వచ్ఛమైనవి, ఒకే పరిమాణంలో ఉండేవి.

నర్సరీ కుంటలు 0.02-0.08 హెక్టార్ల వైశాల్యంతో (200-800 చ.మీ) దీర్ఘ చతురస్రాకారంతో దాదాపు 1.2 నుండి 1.5 మీటర్ల లోతు నీరు నిలువ ఉండే విధంగా ఉంటాయి. 0.04 హెక్టార్ల వైశాల్యంతో (400 చ.మీ) ఏర్పాటు చేస్తే చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

శాశ్వతంగా నీరు ఉండే కుంటల కంటే ఋతువుపై ఆధారితమైన కుంటలు చేపల పెంపకానికి మంచివి. కారణం ఈ కుంటలు వేసవి కాలంలో ఇంకిపోతాయి. అందువల్ల చేపల పెంపకానికి నష్టదాయకమైన భక్షక జీవులు, కలుపు మొక్కలు, హానికారక చేపలు నశిస్తాయి. నేలకు ఖనిజ సంపద సమకూరుతుంది. వర్షాధార లేదా ఋతు ఆధార కుంటలు వీలుకానట్లయితే సక్రమంగా కట్టిన శాశ్వతకుంటల్లో చేపలను పెంచవచ్చు. కాని ఇవి చేపల అధికదిగుబడికి అనుకూలంగా ఉండవు.

అధికంగా నీటిని నిలుపుకునే నేలలు, పోషక విలువలున్న నేలలు చేపల పెంపకానికి చాలా అనువుగా ఉంటాయి. నర్సరీ కుంటలు ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు సమీపంలో అధిక నీటి లభ్యత, ప్రసార సౌకర్యాలు ఉండాలి. తరచుగా వరదలకు గురి అయ్యే ప్రాంతాలు చేపల పెంపకానికి తగినవికావు.

నర్సరీ కుంటలను బాగా వెలుతురు సోకే విధంగా నిర్మించాలి. ఒరిపిడికి గురికాకుండా గట్ట వైన గడ్డిని పెంచడం మంచిది. కుంటలోకి నీరు ప్రవేశించే మార్గాన్ని వైలాన్ వడపోత వలతో నిరోధించినట్లయితే హానికారక చేపలు, ఇతర జీవులు వాటి డింభకాలు ప్రవేశించవు.

కుంటలో విడిచిన	1 నుండి 5 రోజులు	-	1 మిలియన్ గుడ్లు చేపలకు ప్రతిరోజు 5.6 కి.గ్రాంలు.
	6 నుండి 12 రోజులు	-	1 మిలియన్ గుడ్లు చేపలకు ప్రతిరోజు 11.2 కి.గ్రాంలు.
	13వ రోజు	-	అహారం అవసరం లేదు.
	14వ రోజు	-	గుడ్లు చేపల సేకరణ.

పెరుగుదలను వృద్ధిచేసే కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ ను ప్రతి చేపపిల్లలకు 0.01 మి.గ్రాం చొప్పున పోషక ఆహారంతోపాటు నిత్యం ఇవ్వాలి. ఇది గరిష్ఠ పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ప్రతి రోజు ఉదయం అదనపు ఆహారాన్ని నీటిపైన అంతటా సమానంగా వడేటట్లుగా చల్లడం మంచిది.

12.4.6 సేకరణ

నర్సరీ కుంటల్లో 15 రోజులుగా దాదాపు 60% గుడ్లు చేపలు 25-30 మి.మీ. పొడవుతో ఉండే పసి చేపలుగా పెరుగుతాయి. ఈ కుంటలోనే పెంచినట్లయితే వీటిలో చాలా వరకు చచ్చిపోతాయి. కాబట్టి వీటిని నర్సరీల నుండి తీసి పోషణకుంటలో వేయవలసి ఉంటుంది.

అదనపు ఆహారం వేగు నిండా ఉండడంవల్ల వీటిని నర్సరీకుంట నుండి సేకరించేటప్పుడు చాలా వరకు చనిపోతాయి. కాబట్టి సేకరించడానికి ఒక రోజు ముందుగా వీటికి ఆహారాన్ని ఇవ్వగూడదు. వీటి సేకరణ కూడా ఉదయమే జరగాలి.

ఒక నర్సరీ కుంటలో మూడు నెలలు కాలంలో కార్ప్ పసి చేపల పంటలు మూడు నాలుగు సేకరించవచ్చు.

12.5 పోషణకుంటల నిర్వహణ

కార్ప్ పసిచేపలను (25-30 మి.మీ.) చిరుచేపల దశ [100-150 మి.మీ] వరకు అభివృద్ధి చెందించడమే పోషణ కుంటల ముఖ్యద్దేశం. నిర్వహణ పద్ధతులు సరియైనవి అవలంబించి మూడు నెలల్లో వీటిని పెంచవచ్చు.

నర్సరీ కుంటలో ఎదిగిన కార్ప్ పసి చేపలు నిలువ కుంటలో పెంచడానికి తగినట్లుగా ఉండవు. నిలువ కుంటల్లో పెద్ద భక్షక చేపలు వీటిని తింటాయి. అందువల్ల పసిచేపలకు రక్షణ కల్పిస్తూ చిరు చేపలుగా పెరిగే వరకు పోషణకుంటలో ఉంచాలి. చిరుచేపలు తమను తాము రక్షించుకొంటాయి. ఇంతేగాక ఇవి ప్రత్యేకమైన పోషణ పద్ధతులతో, అననుకూల పరిసరకారకాల నుండి రక్షించుకొనే శక్తిని పొంది ఉంటాయి. ఈ రకంగా మంచి నీటి చేపల పెంపకం వ్యవస్థతో పోషణ కుంటలది అవశ్యకమైన మాధ్యమిక దశ.

పోషణ కుంటలను 0.08-0.1 హెక్టారు [200-1000 చదరపు మీటర్లు] నీటి వైశాల్యంలో 1.5-2.0 మీటర్ల లోతు నీరు నిలువ ఉండేటట్లుగా దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా తవ్వుతారు.

నీటి మొక్కల తొలగింపు, అనవసరమైనట్టి చేపలను, భక్షక చేపల నిర్మూలన, మొదలైన కుంట నిర్వహణ కార్యక్రమం నర్సరీ కుంటల మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ పసిచేపలు, గుడ్లు చేపల కంటే అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. కాబట్టి జలకీటకాలవల్ల అంతగా ప్రమాదముండదు.

12.5.1 కుంటలో ఎరువుల వాడకం

ఎరువులు వాడడానికి ముందుగా కుంటలో హెక్టారుకు 200 కి. గ్రాంల పొడిసున్నం వేయాలి. తరువాత వృక్ష జంతు ప్లవకాల అభివృద్ధికి గాను కార్బనిక్, అకార్బనిక్ ఎరువులను వాడాలి.

కార్బానిక్ ఎరువుగా పశువుల వేడను హెక్టారుకు 1000 కి.గ్రా చొప్పున నాలుగు సమవాయిదాలలో ప్రతి నెలా వేయాలి. పసి చేపలను విడవటానికి 15 రోజుల ముందు మొదటి వాయిదా ఎరువు వేయాలి. రసాయనిక ఎరువులు, హెక్టారుకు - యూరియా 140 కి.గ్రా. బ్రెపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ 60 కి.గ్రా. 3 లేదా 4 సమవాయిదాల్లో ప్రతినెలా వేయాలి. ప్లవకాల ప్లిరోత్పత్తికి గాను కార్బానిక్, రసాయనిక ఎరువులను పదిహేను రోజుల విరామంలో ఏకాంతంగా వేయాలి.

12.5.2 పసిచేపలను విడువడం

పోషణ కుంటలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జాతుల పసిచేపలను పెంచుతారు. కారణం పేరుపేరు పోషణ పద్ధతులవల్ల కుంటలోని సహజ సిద్ధమైన పోషకాహారాన్ని ఇవి పూర్తిగా వినియోగించుకొంటాయి.

పసిచేపల, మనుగడ, వుద్ది దృష్ట్యా వాటి మొత్తం సాంద్రత హెక్టారుకు 0.2 నుండి 0.3 మిలియన్ లుండాలి. భారతీయ పెద్ద కార్ప్ లైన కల్ల, రోహ, మిగాల్ విదేశీయ కార్ప్ లైన పెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్, సామాన్య కార్ప్ లను కలగలుపుగా పెంచుతారు. నాలుగు జాతుల మిశ్రమం చాలా ఆదర్శవంతంగా గుర్తింపు పొందింది. ఎక్కువ జాతుల మిశ్రమంవల్ల, సేకరించే సమయంలో ఎక్కువ తాకిడికి గురిఅయి చిరుచేపలు చనిపోతాయి.

పసి చేపలను విడిచే ముందు నీటి పరిస్థితిని పరీక్షించాలి. పోషణకుంటలో 'హాఫ్' ఏర్పాటుచేసి దాన్లో కొన్ని పసిచేపలను 24 గంటలు ఉంచి చనిపోయినట్లయితే నీరు విషపూరితం కాదని తెలుస్తుంది. ఉదయంగాని సాయంత్రంగాని పసిచేపలను పోషణకుంటలోకి క్రమంగా విడువాలి.

12.5.3 అదనపు ఆహారం

బియ్యపు తవుడు పేరుశనగ లేదా ఆవనూనె పిట్టును 1:1 చేప బరువు నిష్పత్తిలో రోజూ ఉదయం నీటిపై చల్లాలి.

చేపల బరువులను బట్టి అదనపు ఆహార పరిమితిని నిర్ణయించాలి. మొదటి నెలలో పసిచేప బరువంత ప్రమాణంలో రోజూ అదనపు ఆహారం ఇవ్వాలి. రెండవ మూడవ నెలలో దీన్ని క్రమంగా రెండు మూడింతలు చేయాలి. గడ్డికార్ప్ లున్నట్లయితే లెమా, పుల్లియా, పాడిలా వంటి నీటి మొక్కలను చిన్న ముక్కలుగా చేసి వేయాలి.

12.5.4 సేకరణ

సాధారణంగా పసిచేపలను పోషణకుంటలో 3 నెలలు పెంచుతారు. అప్పటికి ఇవి 100-150 మి.మీల చిరుచేపలుగా ఎదుగుతాయి. మనకు కావలసిన చిరుచేప పరిమాణాన్ని బట్టి, పెంపకం కాలాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. చిరుచేప ఎదుగుదలనుబట్టి, మార్కెట్ లో గిరాకీనిబట్టి, నిల్వకుంటల అందుబాటును బట్టి అవసరమేతే పెంపకం కాలాన్ని ఆరునెలల వరకు పొడిగించవచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ పెంచడం లాభదాయకంగాదు.

100 మి.మీ.టర్గుకు పెరిగిన చిరుచేపలు నిల్వకుంటలో వేయడానికి అనువుగా ఉంటాయి. అందువల్ల చిరుచేపలను మూడు నెలలు పెంచిన తరువాత తీసివేయాలి. చేప పిల్లలను సేకరించడానికొక రోజు ముందు అదనపు ఆహారం ఇవ్వకూడదు. ఉదయం వేళలో చేప పిల్లలను తీయడం మంచిది.

12.6 నిలువకుంట నిర్వహణ

కార్ప్ చిరుచేపలను అమ్మకానికి వచ్చే దశ వరకు నిలువ కుంటలోనే పెంచుతారు. లాభసాటి నిర్వహణ పద్ధతుల ద్వారా చేపల అధికోత్పత్తిని సాధించటం నిలువ కుంటల ముఖ్య ఉద్దేశ్యము.

తొందరగా ఎదిగే చేపజాతుల ఎంపిక, అదనపు ఆహారం; ఎరువుల వాడకం వల్ల కుంటుల భారశక్తిని అధికం చేయడం, సంపూర్ణ ఆహార అలవాట్లు ఉండి బాగా పొదిగే గీచేప జాతుల వృద్ధి సీరు, నేల లక్షణం మొదలైన జీవావరణ పరిస్థితులను తగు విధంగా ఉపయోగించుకోవడం, చేపల పరిరక్షణ మొదలైనవి నిలువ కుంటుల నిర్వహణలో మార్గదర్శక సూత్రాలు.

12.7 నిలువ కుంటు నిర్మాణ, నిర్వహణ

నిలువకుంటలు నీటి ప్రాంతాల పెద్ద ప్రమాణము. నీటి పరిమాణం, ఆకారం వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. 0.5 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంతో దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉంటే మంచిది. దీని అడుగు సమంగా, క్రమేపి ఏటవాలుగా ఉండాలి. 2.25 మీ (కనీసం 1.5 మీ) లోతుగా నీరుండాలి. నేలకు నీటిని నిలుపుకొనే స్తోమత, నమ్మకంగా నీటి సరఫరా కుంటకు ఉండాలి.

కుంట గట్ల పరిరక్షణ, పగుళ్ళుబాసినప్పుడు తక్షణ మరమ్మత్తు జరగాలి. గట్టు పొడవునా నీటి మొక్కలు పెరగకుండా జాగ్రత్త వడడం, గట్టు మీది చెట్ల వల్ల గాలి వెలుతురుకు అవరోధం కలగకుండా చూడాలి. కుంటలో నీటి సరఫరాకుండే ప్రవేశ, నిర్గమ మార్గాలు శుభ్రంగా సురక్షితంగా ఉండాలి.

కుంట అడుగున భౌతిక, రసాయనిక, జీవ సంబంధమైన పరిసరాలను, పరిస్థితులను మెరుగు పరచాలి. కుంటను ఎండగట్టి నట్లయితే దాని ఖనిజ సంపద పెరుగుతుంది, దుర్గంధ పూరిత వాయువులు, నీటి మొక్కల నిర్మూలన, అవాంఛనీయ జీవుల వినాశనం జరిగి కుంటలో ఆరోగ్యకర పరిస్థితులు కలుగుతాయి.

సాధారణంగా వేసవిలో (ఏప్రిల్-మే) ఉపరితల పగుళ్ళు బయటపడే వరకు కుంటను ఎండబెడితే చాలు. ఇది సాధ్యపడకపోతే కనీసం మూడు లేదా ఐదు సంవత్సరాల కొకసారి నా ఎండబెట్టాలి. దీనివల్ల చేపల పెంచే కాలం వృధాకాకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

కుంట అడుగు 180 కదిలేవరకు దున్ని కలుపు మొక్కలను తీసేవేయాలి. వైన ఉండే సారవంతమైన నేల అడుగుకు, అడుగున ఉండే నిస్సారమైన నేల పైకి వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కువలోతుగా దున్నకూడదు. కుండ అడుగున పేరుకొనే ఒండును తొలగించి వేయాలి. ఉత్పాదకతను కాపాడడానికి ఈ చర్య అత్యవశ్యకం.

12.7.1 నీటి కలుపు మొక్కల నియంత్రణ

నిలువ కుంటలో అధికంగా వృద్ధి చెంది, ఎదిగే చేపలకు ప్రమాదకరమైన మొక్కలను నీటి కలుపు మొక్కలంటారు.

చేనులలో కలుపు మొక్కలవలె నీటి కలుపు మొక్కలు, చేపల దిగుబడిని తగ్గిస్తాయి. ఇవి అధికంగా పెరగడంవల్ల గాలి, సూర్యరశ్మి తగిలే నీటి వైశాల్యం తగ్గినీటి ఆక్సిజనరణం, కేరణజన్యసంయోగక్రియ మందగించుతాయి. దీనివల్ల నీటి జీవక్రియ చక్రంలో అవాంతరం ఏర్పడుతుంది. కరిగిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం తగ్గుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు ఏర్పడుతుంది. కరిగిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం తగ్గుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెచ్చుతుంది. ఈ మొక్కలు స్లవక జీవులకు అవసరమయ్యే పోషక పదార్థాలను గ్రహిస్తాయి. కాబట్టి వాటి ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. ఈ మొక్కల బాష్పోత్పేకంవల్ల కుంట నీటి పరిమాణం తగ్గుతుంది. వలల ద్వారా ఇతర భక్షక చేపల నిర్మూలన దుస్సాధ్యమవుతుంది. ఎదుగుతున్న చేపల స్వేచ్ఛా గమనానికి అంతరాయం కలుగుతుంది. ఇంతేగాక ఇవి నిరర్థకమైన చేపలకు మంచి ఆశ్రయం కల్పిస్తాయి.

తీరం వెంటడి ఉండే కలుపుమొక్కలు మాత్రం కుంట గట్టును అలలతోకిడి నుండి రక్షిస్తాయి. కొన్ని కలుపు మొక్కలు కొన్ని రకాల చేపలకు ఆహారం కూడా.


సాధారణంగా కనిపించే నీటి మొక్కలను ఈ క్రింది రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు:

తేలియూడే మొక్కలు: నీటి ఆకులు నీటి తలంపైన ఉండి వేళ్లు కింద నీళ్లలో స్వేచ్ఛగా వేలిండ్లుంటాయి, సామాన్యంగా కనిపించే ఉదాహరణలు: అయికోర్నియా, పిస్టియా, సాల్వినియా, లెమా, పైథోడెలా, ఎడోలా, పుల్వియా.

పొడుచుకొని వచ్చే మొక్కలు: నీటి వేళ్లు కుంట అడుగున ఉండి కాండం నీటి పైకి లేస్తుంది. ఆకులు నీటి తలంపైన ఉంటాయి. ఉదా. నింఫియా, నెలుంబో, నింఫాయిడిస్.

మునిగి ఉండే మొక్కలు: ఇవి నీటిలో ఉండేవి. పైడిల్లా, నాజాస్, ఓసిరియా, వాలిస్నేరియా, పొటామొగెటాన్ వేళ్లతో ఉండేవయితే, సీరటోఫిలమ్, యుట్రీకులేరియా వేళ్లులేనివి.

ఉపాంతంలో ఉండే మొక్కలు: నీటికి వేళ్లుంటాయి. తీరప్రాంత పూర్వ భాగంలో ఉంటాయి. టైఫా, నై వెరెస్, కొలకేషియా, ఐపోమియా మొదలైనవి.



పటం 12.2. నీటి కలుపు మొక్కలు A. అయికోర్నియా B. పిస్టియా C. లెమా D. ఓసిరియా E. వాలిస్నేరియా F. మార్సిరియా G. పైడిల్లా H. నాజాస్ I. సెరటోఫిలమ్

స్పైరోగైరా, ఫిథోఫోరా, మైక్రోస్పిస్, అసిలేటోరియా, అనాబెనా యూగ్లీనా మొదలైన శైవలాలు గుచ్చాటుగా ఉంటాయి. ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి. చేపలను అకస్మాత్తుగా చంపేస్తాయి. పగలు నీటిలో ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని పెంచుతాయి. ఉదయం రాత్రి సమయాలలో ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఇందువల్ల చాలా చేపలు చచ్చిపోతాయి. శైవలాల గుచ్చాటు విష పదార్థాలను కూడా నీటిలోకి విడుదల చేస్తాయి.

నీటి కలుపు మొక్కలను మానవ శ్రమతో, యంత్రాలతో, రసాయనాలతో, జీవ సంబంధ పద్ధతులతో అదుపు చేయవచ్చు.

పెంచవచ్చు. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహార వనరులను బాగా వినియోగించుకోవచ్చు. ఉపయోగం కాకుండా మిగిలిన ఆహారం కుంటలో ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. అదనపు ఆహారం చిరు చేపలకు ఇవ్వగా, తేలికగా జీర్ణమయ్యేదిగా అధికశక్తినిచ్చేదిగా, చౌకలో ఎక్కువ పరిమాణంలో లభించేదిగా ఉండాలి.

పుక్త సంబంధమైన ఆహారం, తవుడు, గోధుమతవుడు, సోయాచిక్కుడు, మొక్కజొన్న, నూనె పిట్టలు, ఓట్లు, చెట్ల వేళ్ళు, ఆకులు, గడ్డిమొక్కలు, కందమూలాలు ఇవన్నీ అదనపు ఆహారంగా పనికి వస్తాయి. ఇంతు సంబంధమయినవి ఎండిన చేపలు, తాజా నముద్రపు చేపలు, చేపఆహారం, చిన్న మాంసపు ముక్కలు, రక్తం, పట్టు పురుగుల పూపాలు, పీతలు, నత్తలు మొదలైన వాటిని ఇవ్వవచ్చు. విటమిన్లను కూడా అదనపు ఆహారంలో చేర్చాలి.

పుక్తసంబంధమయిన అదనపు ఆహారాన్ని నూరి, నానబెట్టి లేదా ఉడికించి తయారు చేయాలి.

అదనపు ఆహారాన్ని ఉదయం వేళలో ఇవ్వాలి. ఆహారాన్ని కుంట అంతటా చల్లకుండా నిర్దేశిత స్థలాల్లోనే, ట్రేలోగాని, చిల్లల సంచులలోగాని ఉంచాలి. ఆహారాన్ని అవసరమైనంత మేరకే ఇవ్వాలి. తరువాత రోజుకు ఆహారం ఇచ్చేలోపుగా క్రితం రోజు ఇచ్చిన ఆహారం వినియోగం అయ్యేటంత మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఆహారం ట్రేలను, సంచులను అప్పుడప్పుడు పరిశీలించి అందులోని ఆహారం పాడవకుండావాటిని ఇతర స్థలాలకు మార్చాలి. శైవల గుచ్చాలున్నపుడు ఆహారాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలి. గడ్డి కార్బల్ కిచ్చే నీటి కలుపు మొక్కలను ఇతర ఆహారపు గడ్డి మొక్కలను పెదురు బొంగులనుపయోగించి నీటిలో తేలియాడేటట్లు చేయాలి.

12.7.6 ఆరోగ్య పరిరక్షణ

నిలువ కుంటలలో ఎక్కువ చిరుచేపలను పెంచేటపుడు అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కార్ప్ చేపల పెంపకంలో వ్యాధులవల్ల చనిపోయే వాటి సంఖ్య చాలా తక్కువ. వత్తిడి వల్ల, వాటిని మొరటుగా కదపటంవల్ల అవి వ్యాధులకు గురికావచ్చు. ఈ వ్యాధులను పెన్సిలిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్ వంటి జీవనాశక మందులను ఉపయోగించి నయం చేయాలి.

సున్నం ఉపయోగించి కుంటలను శుభ్రంగా ఉంచడమే కాకుండా వ్యాధినిరోధక పద్ధతులను అవలంబించాలి. పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ (20 పి.పి.యమ్) లేక పార్మలిన్ (250 పి.పి.యమ్) ద్రావణంలో చేపలను ముంచి తీయటంవల్ల వ్యాధికారక జీవులు చచ్చిపోతాయి. తరుచుగా చేపల ఆరోగ్య పరిస్థితి కనిపెట్టి తక్షణ నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

12.7.7 సేకరణ

నిలువ కుంటలలో చిరుచేపల దిగుబడి తగ్గుముఖం పట్టకముందే ఎదిగిన చిరుచేపలను కుంట నుండి తీయాలి. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొనే శక్తి కుంటలకు కొంతవరకు ఉంటుంది. చేప వయస్సు మీరుతున్న కొద్దీ పెరుగుదల రేటు తగ్గిపోతుంది. వివిధ రకాల చేపలకు వేరువేరు పెరుగుదల రేటు ఉంటుంది. ఇంతేకాకుండా ఒకేజాతి చేపలు వేరువేరు పెరుగుదలలను చూపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా విచక్షణతో వ్యవహరించి కుంటనుండి చేపలను తీసి అమ్మివేయాలి.

బహుళ జాతి చేపల సంబంధ బాంధవ్యాలను దృష్టిలో నుంచుకొని చేపలను తీయాలి. ఉదాహరణకు కుంట అడుగున జీపించే సామాన్య కార్ప్లు, మ్రెగాల్లు, గడ్డికార్బల్ మలవిసర్జనాల మీద కొంతవరకు ఆధారపడతాయి. గడ్డికార్బల్లను ముందుగానే తీసేసల్లయితే అడుగున జీపించే చేపలకు ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది.

చేపల పరిమాణానికి వినియోగదారులు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యం ఆర్థిక అంశాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక కిలోగ్రాం లోపుగా ఉండే చేపల అమ్మకం ధర ఒక కిలోగ్రాంవైన, రెండు కిలోగ్రాములన్న చేపల ధరకంటే ఎక్కువ రావచ్చు. ఈ అంశం కుంటలలో నిలువ ఉండే కాలంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

సంవత్సరానికి కొకసారి మొత్తం చేపలను తీయడం యోగ్యంగా ఉంటుంది. నిలువ కుంటలనుండి పాక్షికంగా కొన్ని చేపలను తీయవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడంవల్ల సంవత్సరంలో అమ్మకానికి వచ్చే రెండు పంటలు తీయవచ్చు. పెట్టుబడి మీద తొందరగా లాభం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాని దీనికి సంవత్సరం పాడవునా చిరుచేపల లభ్యతాకావాలి.

లాగుడు వలల వల్లగాని, నీటిని తీసివేసిగాని పెద్ద జలాశయాల్లోనయితే మొప్పవలలను, విసురు వలలను ఉపయోగించి చేపలను పడతారు. చాలా లోతైన పెద్ద కుంటల్లో నీటిని తీయరాదు. ఉపరితలంలో జీవించే చేపలను లాగుడు వలల ద్వారా పట్టవచ్చు. అడుగున నివసించే చేపలు వీటితోరావు. సాంప్రదాయిక లాగుడువలలతో 20-40% అడుగున జీవించే చేపలు మాత్రమే వస్తాయి. ఈ వలలకు సంచులు నిర్మించి మొత్తం చేపలను పట్టవచ్చు.

మార్కెట్లో గిరాకీనిబట్టి చేపల దిగుబడిని సాందించితే మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది.

కార్ప్ చిరుచేపలు ఒక సంవత్సరంలో కిలోగ్రాంపైగా పెరిగి వినియోగానికి సిద్ధమవుతాయి. శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు ద్వారా సంవత్సరానికి హెక్టారుకు 4000 కి.గ్రాంలు భారతీయ పెద్ద కార్ప్లను, 200 కి.గ్రా. విదేశీయ కార్ప్లను, 10,000 కి.గ్రాంపైగా ముఖ్యమైన భారతీయ పెద్ద కార్ప్ల, విదేశీయ కార్ప్ల మిశ్రమ పంట దిగుబడి సాధించడం జరిగింది. ఈ వెంపకంలో 80% పైగా చిరుచేపలు జీవించి ఉన్నాయి.

ఆధునిక నిర్వహణ పద్ధతులలో విశ్చణాత్మకంగా చేపల వెంపకాన్ని చేపట్టి మంచి లాభాలను పొంది దీన్ని ఒక ఆకర్షణీయమైన వృత్తిగా నిరూపించవచ్చు.

స్వసరిశీలన

1. కార్పుచేపలకు, హానికలిగించు శత్రుచేపలు _____, _____ మొదలైనవి.
2. _____, _____, _____ మొదలైన శైవలాలు చాలా ప్రమాద కరమైనవి. చేపలను ఆకస్మాత్తుగా చంపేస్తాయి.

12.8 సారాంశము

చేపకుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులను గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. శాస్త్రీయ పద్ధతులలో చేపకుంటల నిర్వహణ విధానము చేపలు ఆరోగ్యముగా పెరుగుటకు చాలా అవసరము అలాగే చేపపిల్లల నిలువ విధానమును గూడ ఇక్కడ వివరించబడినది. మన కువయుక్తమైన చేపలను వెంపక ప్రకుంటలలో, వానికి హానికరమైన ఇతర చేపల, నీటి పురుగుల, నీటి మొక్కల నిర్మూలనా విధానములను గురించి కూడ ఇక్కడ వివరించబడినది.

12.9 స్వసరిశీలన-జవాబులు

1. చన్నా, అనబాస్, వల్లగో, క్లేరియస్
2. స్పైరోగైరా, పిథోఫోరా, మైక్రోసిస్టెస్

I. ఈ కేంది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. నర్పరీ కుంటల్లో గుడ్డు చేపలను విడిచే ముందు తీసుకోవలసిన నిర్వహణ పద్ధతులు తెలుపుము.
2. నర్పరీ కుంటలో అదనపు ఆహార ప్రాముఖ్యం.

3. నర్సరీ కుంటలో గుడ్డు చేపలు విడిచిన తరువాత నిర్వహణ పద్ధతి.
4. నిలువ కుంటలో నీటి కలుపు మొక్కల నివారణ తెలుపుము.
5. నిలువ కుంటలో ఎరువుల వాడకంపై చర్చించుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేపల పెంపకం కుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతుల స్థూల అంశాలేవి?
2. పోషణ కుంటలో వసి చేపల విడవడం గుర్చి వ్రాయుము.
3. నిలువ కుంటల నిర్వహణ
4. కుంటలో సున్నం వేయటం.
5. కుంటల భావశక్తి అంటే ఏమిటి?

12.11 పదకోశం

ఆక్రిడ్	:	చేరు
ఎరోబిక్	:	జీవక్రియలకు స్వేచ్ఛా ఆక్సిజన్ గ్రహించడం
ఆల్గల్ బ్లూమ్	:	శైవలాలను గుచ్చం - తేలియాడే (ప్లవక) శైవలాలు సమృద్ధిగా నీటి తలంమీద ఏర్పడి పచ్చగా కనిపించడం
ఆర్థినైడ్	:	శైవల సంహారక పదార్థము
ఆల్కలైనిటి	:	క్షారత - 7 కంటే హెచ్చు పి.హెచ్ కలగడం.
అనేరోబిక్	:	వాయురహిత శ్వాసక్రియ
ఎనయాన్	:	రుణ విద్యుత్ కలిగిన అయాన్లు
అప్టిబాడీస్	:	ప్రతి రక్షకాలు - ప్రోటీన్ అణువులు రక్తంలో ఉండి బాక్టీరియాని ఎదుర్కొంటాయి.
ఎపథీ	:	నిర్లక్ష్యము
ఆటోక్టోసన్	:	లోపలి కారకాల కారణం.
బాక్ వాటర్స్	:	ఉప్పటేరు, సముద్రం నుండి లోతట్టు తీర ప్రాంతాలకు అలలవల్ల చేరే ఉప్పనీటి ప్రాంతం.
బెర్మ్	:	కుంటగట్టు మీది భాగం. పునాది మధ్యన ఉండే సన్నని మార్గం.
బయోమాస్	:	జీవరాశి ఒక నీటి ప్రాంతంలో గుణాత్మకంగా ఉండే జంతు వృక్షసమూహం.
బ్రాకిష్వెహార్	:	ఉప్పకయ్య, మంచినీరు, ఉప్పనీరు మిశ్రమం 30/1000 కంటే తక్కువ ఉప్పుదనం
బ్రూడ్ షిప్	:	లైంగిక పరిపక్వతకు చేరిన చేప (చేపల ఫాలమ్లలో)
కారాపెన్	:	పుష్ప ఫలకం - శిరోవృక్షం మీది బాహ్య అస్థిపంజరం

కారీయింగ్	:	భారశక్తి - ఒక స్థితి పరిమాణం చేపలను (గరిష్ఠ) ఆడుకునే నీటి ప్రాంతం శక్తి.
కేటయాన్	:	ధన విద్యుత్ అయాన్లు
డెలిలిటి	:	బలహీనత
డికార్బోఫికేషన్	:	కార్బియమ్ కార్బోనేట్ అవక్షేపం, CaCO_3 నీటిలోని CO_2 పీడనం మధ్య మొక్కలు CO_2 పీల్చుకొన్నందువల్ల కలిగే చర్య
డికార్బాక్సిలేషన్	:	కార్బాక్సిల్ అమ్లం క్షయం చెందడం. ఇందువల్ల CO_2 తో కొత్త సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి.
డిమెర్సల్	:	అడుగు మీద-చేప గుడ్డు అడుగుకు మునిగి పొదగడం
డయూర్నల్	:	దివాచరి - రాత్రింబవళ్ళకు సంబంధించిన
డ్రాట్	:	1. చేపలు పట్టుపడినవి- అట్టి వలను లాగడం 2. పడవను తేల్చడానికి తగిన నీటి లోతు
డ్రైప్	:	చేపలను శీతలీకరించేటప్పుడు కారే కణజాల ద్రవ్యం.
డైక్	:	పొడవాటి ఆనకట్టు
ఇకలాజికల్ నిచ్	:	ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో జీవి నిర్వహించే పాత్ర. అందులో ఎన్నో ఇతర జాతుల జీవులుంటాయి. ఇండియాలో కట్టుకట్లు- జంతు ప్లవకాహారి, అరిస్టిక్టేన్ నోబిలిస్ చైనాలో
ఇచ్చువరి	:	నదిముఖం - నది, సముద్రాన్ని కలిసేచోటు - అలలు ఉప్పదనం పొప్పుతగ్గులు.
యూట్రాఫికేషన్	:	ఎక్కువలోతు, స్వచ్ఛమైన నీటి ప్రాంతం, తక్కువ ఉత్పాదకత ఉండి క్రమంగా తక్కువ లోతయి ఎక్కువ ఉత్పాదకత పొంది చివరకు శుష్క భూమిగా మారడం.
ఎక్స్పోజైట్	:	బహిష్కృతపాదాంగం (రొయ్య ఉపాంగం)
ఎక్స్పోటిక్	:	విదేశీయ - చేపలను ప్రవేశ పెట్టడం
ఫాకుల్టేటివ్ పారసైట్	:	కొన్ని కారణాలవల్ల పరాన్న జీవనం జరపడం
ఫెకిండిటి	:	ఒక కాలంలో చేపలలో, రొయ్యలలో గుడ్డు పెట్టే సామర్థ్యం (పరివక్య అండాలు చాలా ఉండడం)
ఫెరుజిన్	:	ఇనుమువల్ల కలుషితమయేది.
ఫిల్లేట్	:	చేప వెన్నెముకకు సమాంతరంగా ఉండే కండర చారలు.
ఫిష్కిల్	:	చేప చావు ఆక్సీజన్ లోటు, విషపానం, సాంక్రామిక వ్యాధులవల్ల చేపల రాశి చావడం
ఫిష్ సిడ్	:	చేప నారు - పొదిగిన పసితనంలో ఉండే పసి చేపలు, చిరుచేపలు,
ఫ్రే	:	పసి చేప - లార్వాడింభక దశ దాటిన చేప.
గ్లసెరైడ్లు	:	కొవ్వు ఆమ్లాల ఎస్టర్లు, గ్లిసెరాల్
గున్వాలె	:	పడవ వక్క భాగంలోని వై అంచు
హచ్ లింగ్	:	పొదిగిన చేప - ఫలదీకరణం చెందిన అండం నుండి అప్పుడే వెలువడిన డింభకం.

భాగం-13 మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు.

విషయక్రమం

- 13.1 ఉద్దేశ్యం
- 13.2 ఉపోద్ఘాతం
- 13.3 మిశ్రమతుత్పన్న సంవర్ధనవనావస్థ
- 13.4 సమగ్ర చేపసంవర్ధనం - జంతుసంవర్ధనం - వ్యవస్థలు
- 13.5 చేప-బాతుల సంవర్ధనం
- 13.6 చేప-కోళ్ళ సంవర్ధనం
- 13.7 చేప-పందుల సంవర్ధనం
- 13.8 చేప-పశువుల సంవర్ధనం
- 13.9 పరిపాలనలో చేపలపెంపకం
- 13.10 మంచినీటి రొయ్యల సంవర్ధనం
- 13.11 గాలి పీల్చే చేపల సంవర్ధనం
- 13.12 చేపనారు ఉత్పత్తి పద్ధతులు
- 13.13 గావిపీల్చే చేపల సంవర్ధనం
- 13.14 సారాంశము
- 13.15 స్వపరిశీలన - జావాబులు
- 13.16 మూదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

13.1 ఉద్దేశ్యం.

ఈ భాగంలో భారతీయ పెద్ద కార్ప్, విదేశీయ కార్ప్ మిశ్రమ పెంపకానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలతోబాటు చేపలు, పశువులు, పంటలు ఈ మూడింటిని మేళ వించిన సమగ్రమైన సంవర్ధన వ్యవస్థను కూడా చర్చించడం జరిగింది. మంచి నీటి రొయ్యల పెంపకం, గాలిపీల్చే చేపల సంవర్ధనం వర్ణితమయింది. శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులతో సహా ఈ వ్యవస్థలవల్ల జరిగే ఉత్పాదకతను వివరంగా విపులీకరించడం జరిగింది.

13.2 ఉపోద్ఘాతం

చేపల గరిష్ఠ ఉత్పాదనకు, వివిధ జీవావరణాలలో లభించే సహజ ఆహారంతోబాటు అదనపు ఆహారాన్ని చేర్చి, దానికి అనుగుణంగా ఉండే, తొందరగా పెరిగే వేర్వేరు జాతులను మిశ్రమంగా పెంపొందించడానికి సంబంధించిన మూలసూత్రాలు.

మిశ్రమ చేపల పెంపకానికి చెందిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో స్థూలంగా ఇమిడి ఉన్న అంశాలు: నీటి కలుపు మొక్కల, పరభక్షక చేపల నివారణ; భారతీయ పెద్ద కార్ప్లు-కట్ల, రోహి, మ్రెగాల్, విదేశీయకార్ప్లు-వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్, సామాన్య కార్ప్ మొదలైన చేపలను ఉచిత

రీతిగా తగుసాంద్రతలో మిశ్రమంగా పెంచడానికి వాటి 100 మి.మీ. పరిమాణంలో ఉండే చిరుచేపల సేకరణ, నిలువ; క్రమబద్ధంగా అదనపు అహార సరఫరా, తగు సమయానికి వాటి సేకరణ.

మూడు మిథాలుగా చేపలను మిశ్రమంగా పెంచుతారు- కేవలం భారతీయ పెద్దకార్ప్ సంవర్ధనం, కేవలం విదేశీయ కార్ప్ సంవర్ధనం, భారతీయ, విదేశీయ కార్ప్ ఉమ్మడి సంవర్ధనం.

మిశ్రమ చేపల పెంపకంవల్ల మామూలుగా చేపల దిగుబడి పాళ్లారుకు 3000 నుండి 6000 వరకు సాలీనా ఉంటుంది.

కుంట నిర్వహణ పద్ధతులు అభివృద్ధి చెందడంవల్ల ఇంకా ఈ దిగుబడి ఎక్కువయింది.

చేపల, జంతువుల సమగ్ర సంవర్ధన వ్యవస్థ ఇటీవల ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇందులో చేప - బాతుల సంవర్ధనం, చేప - కోళ్ల సంవర్ధనం, చేప - పందుల సంవర్ధనం మొదలైనవి చేరినాయి. పశుశాల (కొట్టం) మలినాలను, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నుండి వెలువడే పిప్పిని పరిభ్రమింప జేసి చేపల పెంపకానికి వాటిని వాడుతారు.

మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలు, పశుషక్త్యధుల సంఖ్య, కావలసిన ఎరువు పరిమాణం, పరిభ్రమణ వ్యవస్థలు పటిష్ఠత మొదలైనవి వివరించనయినాయి.

పరి పాలలో చేపల పెంపకం, సమగ్ర చేప-వ్యవసాయ వ్యవస్థకు చెందినది, చేపల పెంపకానికి కావలసిన పరిపాలం ఆవశ్యకాలు, పరి పాలంలో పెంచడానికి తగిన చేపలు, ఇటీవలి వ్యవసాయ పద్ధతులవల్ల పరి పాలంలో చేపల సంవర్ధనానికి ఏర్పడే నిర్బంధాలు, చేప-పరి సాగుకు మెరుగ్గా పెట్టిన పద్ధతుల వివరణ.

మంచి నీటి రొయ్యల సంవర్ధనం ఇటీవలి ప్రయోగం. భారతదేశంలో అతకి పెద్ద రొయ్య, మూక్రోబ్రాకియమ్ రోనెన్ బగ్గి నది జలాలలో ఉండే రొయ్య, మా. మూల్కామ్ సోని, ఈ రెండింటి పెంపకం పద్ధతులు, పోచరీ నిర్వహణ, నారు ఉత్పాదన, సంవర్ధన వ్యవస్థలు, మంచి నీటి రొయ్యల ఉత్పాదక శక్యత విశదీకృతిమయింది.

మరెల్, ఎక్స్-చేప, సింఘి, మాగుర్ మొదలైన గాలిపీల్చే భారతీయ చేపలు వాణిజ్యపరంగా ప్రముఖమైనవి. వాటి నారు ఉత్పత్తి పద్ధతులు, సంవర్ధన వ్యవస్థలు వర్ణితమైనవి.

13.3 మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధన వ్యవస్థ

భారతదేశం తూర్పు ప్రాంతాలలో మంచి నీటి కుంటలో చేపల పెంపకం సాంప్రదాయకంగా జరగడం చారిత్రక విషయం. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలైన కట్ల రోహ (లేబియో రోహిట), మ్రిగాల్ (స్క్రినన్ మ్రిగాల్) మొదలైన వాటి గుడ్డు చేపలను, పని చేపలను, చిరుచేపలను అతిఎక్కువ సాంద్రతతో నిలువ చేసి పెంచుతారు. ఈ పద్ధతిలో నీటి ప్రాంతంలని సహజ ఉత్పత్తులపై చేపల పోషణ ఆధారితమై ఉంటుంది. వాటి నిర్వహణ కూడా అశాస్త్రీయమైనది. అదనపు ఆహారం యందు, తీరచుగా చేపలు పరాన్న జీవుల భారిపడతాయి. చేపల మనుగడ అతిన్యల్పమేగాక చేపనారు అత్యంత అధికంగా వృధా అవుతుంది. సాంప్రదాయకంగా జరిగే పెంపకంలో సాలీనా దిగుబడి 300 నుండి 1000 కి.గ్రాంలు పాళ్లారుకు ఉంటుందని అంచనా. సరాసరిగా ఇది 600 గ్రాంలకు మించదు.

మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధన వ్యవస్థను చైనాలో బహుళజాతి మత్స్య సంవర్ధనమని, బహుళ సంవర్ధనం అని యూరప్, రష్యా దేశాలలో మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధనం అని మధ్య ధరా ప్రాంతంలో వ్యవహృతమవుతున్నది. పీటన్నిటి భావన ఒక్కటే అయితే ఈ దేశాలలో సంవర్ధనం చేసే చేపల జాతులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. భారతదేశంలో భారతీయ, విదేశీయ, కార్ప్ చేపలను వివిధంగా మిశ్రమం చేసి పెంచుతారు.

సాంప్రదాయక చేపల పెంపకం బాటతు వెట్టుబడి, రాబడి సాలుసరి వివ

పెట్టుబడి:

	రూ లు
కుంట అద్దె	2,000.00
కుంట తయారీ	1,000.00
చేపనారు (7,500-1,00,000 పసి చేపలు)	3,000.00
నేకరణ ఖర్చులు	600.00
మొత్తం పెట్టుబడి	6,600.00

రాబడి:

దిగుబడి హక్కుదారుకు 1,000 కి.గ్రాంల చొప్పున	
కిలోకు రూ.9 చొప్పున నికరాదాయం	9,000.00
వ్యాపార నిర్వహణలో నికర ఆదాయం	2,400.00
వ్యాపార నిర్వహణ ఆదాయం, నికర ఆదాయం మధ్య నిష్పత్తి	26.6%

సంకేతికంగా మిశ్రమ చేపల పెంపకంవల్ల వ్యవసాయదార్లకు హక్కుదారుకు 4000 నుండి 6000 కి.గ్రాంల వరకు దిగుబడి లభించింది. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలో అతిగా జరిగే ఖర్చులు అదనపు ఆహారానికి సంబంధించినవి. మొత్తం ఖర్చులో దీని శాతం 60 కంటే మించుతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగినా లాభాలు కూడావచ్చువే. 5 కి.గ్రాం చేప బరువు ప్రమాణంగా తీసుకొన్నట్లయితే దానికి అయ్యే ఉత్పత్తి ఖర్చు రూ 4-5 మాత్రమే కాగా మరో విధంగానయితే ఈ ఖర్చులు 9 నుండి 12 రూపాయల వరకు పోతాయి.

13.4 సమగ్ర చేప సంవర్ధనం-జంతు సంవర్ధనం వ్యవస్థలు

సమగ్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆదర్శప్రాయమైనవి, రైతులు వీటిని సులభంగా అర్థం చేసుకొని అమలు చేయగలుగుతారు. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలు శక్తిదాయక ఆహారాన్ని ఉత్పాదించే వ్యవస్థలు. పరిభ్రమణంవల్ల కార్బానిక్ వ్యర్థపదార్థాల నుండి ప్రోటీన్లను తిరిగి పొందడం చేత ఒక ప్రమాణిక ప్రాంతంలో జరిగే ఉత్పాదకత ఇంకా హెచ్చుతుంది. సమగ్ర సంవర్ధన పరిష్కారం ఒక స్వయం సమృద్ధి వ్యవస్థ. దీని నిర్వహణలో సమయానుకూలంగా వేయవలసిన పదార్థాల కొరత సమస్య ఏర్పడదు. జంతు మలినాల అక్రమ వినియోగంవల్ల ఏర్పడే కాలుష్యాన్ని పరిభ్రమణ వ్యవస్థ ద్వారా తొలగించవచ్చు. మిశ్రమ పెంపక వ్యవస్థంవల్ల ఏడాది పొడవునా కుటుంబానికి ఉపాధి రాబడి సౌకర్యాలు లభించి సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి జరుగుతుంది.

13.5 చేప-బాతుల సంవర్ధనం

పెంపకంలో కోళ్ల తరవాత భారతదేశంలో రెండవ స్థానం బాతులది. తక్కువ నీటి వనరుల పరిస్థితులలో బాతులు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి. బాతుల శరీర ఆరోగ్యానికి, పెరుగుదలకు నీటి పరిసరాలు అవశ్యకం. భారత్, చైనా, మధ్య యూరప్ దేశాలు శతాబ్దాల తరబడి నీటి వనరుల సమీపంలో సాంప్రదాయకంగా పెంచుతున్నారు. కాని ఇటీవల వరకు చేపల ఉత్పాదకతపై నీటిది లాభకర ప్రభావం ఉంటుందని తెలియదు.

తమ ఆహారమైన మలస్కలను, కప్పలను, చిరుకప్పలను, దోమ, ఇతర కీటకాల డింభకాలను, నీటి కలుపు మొక్కలను కుంట నీటిలో బాతులు అన్వేషించి, తినడంవల్ల చేపలకు పనికిరాని జీవరాశిని నిర్మూలించినట్లు వుతుంది. ఈ చర్య సహజంగా కుంటలో పెరిగే ఆహారాన్ని వృద్ధి చేసి పెంపుడు

చేపలకు పోషకలింగించే వాటిని నిర్మూలిస్తుంది. బాతుల నిరంతర కదలికలవల్ల నీటికి గాలి సరఫరా జరుగుతుంది. ఇవి కుంట అడుగును కలచి నందువల్ల నేలలోని పోషక పదార్థాలు వైకి వచ్చి నీటి పోషక పదార్థాలను పెంచుతాయి.

మిశ్రమ చేపల సంవర్ధన వ్యవస్థకు సంబంధించిన జీవావరణ భావనకు అనుగుణంగా చేప కుంటల్లో బాతుల పెంపకం జరుగుతుంది. బాతులు నిరుపయోగమైన కుంట నీటి ఉపరితలం మీద నివసిస్తూ “ఎరువు యంత్రం” మాదిరిగా నిరంతరం తిరుగుతూ అన్నిచోట్లా ఎరువు సరఫరా చేస్తాయి. ఈ విధంగా కూలీ ఖర్చులు అదా అవుతాయి.

బాతులు చిన్న చేపలను తింటాయి. అందుచేత వీటిని నన్నరీకుంటకు, పోషణ కుంటలకు దూరంగా ఉంచాలి. సాధారణంగా 4 గ్రాంల కంటే చిన్నగా ఉండే చేపపిల్లలను ఇవితీంటాయి. 5-10 గ్రాంల చిరుచేపలను సులభంగా బాతులనుండి తప్పించుకొంటాయి. ఈ అలవాటు మూలంగా నిల్వకుంటల్లోని వనికరాని చేపలను అదుపులో ఉంచడానికి బాతులు ఉపయోగపడతాయి.

ఈ వ్యవస్థలో బాతులకు కలిగే లాభాలు: ప్రోటీన్ సహిత ఆహార ప్రాప్తి, పరి శుభ్రంగా ఉండే ఆరోగ్యదాయకమైన ఆవాసము, నీటిలో పెరగడంవల్ల పరాన్న జీవుల నుండి, రోగాలనుండి విమోచనం.

క్రమంగా నీటి జీవనానికి అలవాటు చేసిన వాగ్రాల వయస్సు కొచ్చిన బాతు పిల్లలను చేపకుంటలో వదలాలి. 6-7 నెలల వయస్సుకు చేరగానే ఇవి గుడ్డు పెట్టడం ప్రారంభిస్తాయి. రాత్రింబవళ్లు వీటిని నీటి ఉపరితలంపై స్వేచ్ఛగా తిరుగాడనివ్వాలి. కుంటకట్టల మీద బొంగుబద్దలతో నిర్మితమైన రక్షణ గృహాలలో వీటికి వసతి కల్పించాలి. తేలియాడే రక్షణ గృహాలపై పరిశోధనలు జరిగాయి. ఈ నిర్మాణాలు పీల్చనంత వరకు శుభ్రమైన వెలుతురుతో, గాలితో, పాడిగా ఉండాలి. ఒక బాతు నుండి వెలువడే రెట్టలు (విసర్జకాలు) 30-40 రోజులలో దాదాపు 6 కి.గ్రాంలు తూగుతాయని అంచనా.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొల్లేరు సరస్సులో బాతుల పెంపకానికి, గుడ్డను, మాంసాన్ని మార్కెట్ చేయడానికి తగిన వసతులు కల్పించినయినాయి. ఈ ప్రాంతం సమగ్ర చేపబాతు సంవర్ధనానికి అత్యంతయోగ్యమైనది. ఇంతేగాక స్థానికంగా చెరువులలో చేపల పెంపకం విస్తారంగా జరుగుతుంది.

13.6 చేప-కోళ్ల సంవర్ధనం

చేపల పెంపకంలో కోళ్ల ఎరువు ఉపయోగం ఇటీవలిది. కోళ్ల ఎరువులను పరిభ్రమించి చేపల పెంపకానికి వాడడం రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది. కోళ్ల ఎరువును అయూ స్థలాల నుండి సేకరించి, విడతలుగా క్రమవద్దతిలో కుంటలో వేయడం మొదటి పద్ధతి. రెండో విధంగా కోళ్ల ఆవాసాన్ని పాక్షికంగా చేప కుంటపైన ఉండేటట్లుగా కట్టి, విసర్జిత మమ్యే కోడి రెట్టలను నేరుగా పరిభ్రమింప చేయడం. మొదటి పద్ధతి అవలంబించడంవల్ల ఎరువు పరిమాణం, విడతలు ఈ రెండిటిని నియంత్రించవచ్చు. కాబట్టి నేడు ఈ పద్ధతి వైపు ఎక్కువగా మొగ్గుతున్నారు. రెండవ పద్ధతి అంటే నేరుగా ఎరువు పరిభ్రమణంవల్ల ఎరువు ఎక్కువయి, నీటిలో కుళ్లి ఆక్సిజన్ లోపం కలిగించి చేపలను హతమార్చే ప్రమాదం ఉంది.

ఒక సంవత్సర కాలంలో 40 పరిపక్వ పక్షులు ఒకటన్ను ఎరువును విసర్జిస్తాయని అంచనా. 500 కోడి పెట్టలు 450 కి.గ్రాంల మొత్తం సజీవ భారంతో ఉండేవి రోజుకు దాదాపు 25 కి.గ్రాంల తడి ఎరువును వెడతాయని లెక్కడుతున్నారు.

తాజాగా సేకరించిన కోళ్ల ఎరువులో 1.0 నుండి 1.8 శాతం నైట్రోజన్, 1.4 నుండి 1.8 శాతం ఫాస్ఫరస్ (P_2O_5), 0.8-0.9 శాతం పొటాష్ (K_2O) ఇతర సూక్ష్మ మూలకాలు, విలువైన కర్బనిక పదార్థం మొదలైనవన్నీ ఉంటాయి.

కోళ్ల ఎరువుతో కుంటలోని జంతు, వృక్షప్లవకాలు సమృద్ధిగా పెరుగుతాయి, ముఖ్యంగా రోటిఫర్లు ప్రబలమవుతాయి. ఎరువు వేసిన 12 రోజుల తరువాత వీటి వృద్ధి తారస్థాయికి చేరుతుంది. కోళ్ల ఎరువుతో కర్బనిక, రసాయనిక ఎరువులుండడం చేత అది సుసంపూర్ణమైన ఎరువుగా మన్నుతుంది.

నర్సరీ, నిల్వకుంటలలో కోళ్ల ఎరువు వాడకంపై ప్రయోగాలు జరిపినారు. పాక్టారుకు 5000 కి.గ్రాంల కోళ్ల ఎరువును నర్సరీ కుంటలో వేసి, పాక్టారుకు 2.25 మిలియన్ల సాంద్రతతో రోహా గుడ్డు చేపలను విడిచినారు. 81-94 శాతం చేపలు సజీవంగా ఉన్నాయి. నిర్వకుంటల్లో కేవలం కోళ్ల రెట్టలను పాక్టారుకు 3375 కి.గ్రాంల చొప్పునవేసి, కల్ల, రోహా, మ్రిగాల్, సామాన్య కార్ప్ల చిరుచేపలను పాక్టారుకు 5000 సాంద్రతతో విడిచినారు. దీనివల్ల 90 రోజులలో పాక్టారుకు 670 కి.గ్రాంల చొప్పున, ఏ విధమైన అదనపు ఆహారం లేకుండా దిగుబడి లభ్యమయింది.

13.7 చేప-పండుల సంవర్ధనం

చేప-పండుల సంవర్ధనం ఇటీవలనే భారత దేశానికి పరిచయమయింది. దీనితో జంతు ప్రోటీన్ల అధిక సముపార్జనకు కొత్త పుంతలు ఏర్పడ్డాయి. వీటిని తక్కువ ఖర్చుతో పొందడానికి, జంతువ్యర్థ పదార్థాలను సమర్థవంతంగా వినియోగించి రసాయనిక ఎరువులను అదనపు ఆహారాన్ని దుబారా చేయకుండా ఈ సంవర్ధన పద్ధతి సుసాధ్యం చేసింది. పంది పెంట లేదా ఎరువులో నైట్రోజన్ 3.7 శాతం. పాస్ఫరస్ (P_2O_5) 3.3 శాతం, పొటాష్ (K_2O) 0.4 శాతం ఉంటుంది.

ఒక పంది సంవత్సరానికి దాదాపు 550-600 కింగ్రాంల ఎరువు వెడుతుండని అంచనా. అందువల్ల 35-40 పండులు పాక్టారు సీటి ప్రాంతానికి పరిపూర్ణం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన కొల్లేరు సరస్సు ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు ప్రభుత్వపంది ఫారంల నుండి ఎరువును సేకరించుకొని చెరువులలో కార్ప్ల సంవర్ధనానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ చెరువులలో సంవత్సరానికి పాక్టారుకు 5000-1000 కి.గ్రాంల ఎరువును విడతలుగా వేసి చేపల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచినారు.

చేప-పంది సంవర్ధనం సాంప్రదాయకంగా పండులను పెంచే అటువిక జాతుల సామాజిక-ఆర్థిక స్థాయిని పెరుగువరచడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

13.8 చేప-పశువుల సంవర్ధనం

జలజంతు సంవర్ధనానికి ఇప్పటికీ భారత దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో పశువుల పేడను ఎరువుగా వాడుతున్నారు. ఈ విధంగా పోషకపదార్థాలతో చేపల పెంపకాన్ని కూడా చేస్తున్నారు. చేపనారు కొరకు నర్సరీ కుంటలో పచ్చి పేడను అత్యున్నతమైన ఎరువుగా పరిగణిస్తారు.

ఒక స్వల్పకాలిక ప్రయోగం ద్వారా, ఏ విధమైన ఎరువులు, అదనపు ఆహారం లేకుండా, కుంటలో కేవలం పశువుల పేడ వేయడంవల్ల 90 రోజులలో పాక్టారుకు 535 కి.గ్రాంల చేపల దిగుబడి వచ్చింది. దీర్ఘకాలిక ప్రయోగాలలో 11-12 నెలలో పాక్టారుకు 1350-1896 కి.గ్రాంల ఫలితం లభించింది.

13.9 వరి పొలాలలో చేపల పెంపకం

పొలాల్లో పరితోబాటు చేపలను పెంచడం భారతదేశంలో సర్వ సాధారణం. వరి, చేపలు ఒకచోట పెంచడంవల్ల వనరులన్నిటినీ పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. మూడునుండి ఎనిమిది నెలల పాటు నీళ్ళు ఆవసరమయ్యే వరి పొలాలలో ఈ పద్ధతిని అమలు పరుస్తారు. ఫలితంగా మూమూలుగా పండే వరిపంట ఏ మాత్రం తగ్గకుండా అదనంగా చేపలపంట కూడా లభ్యమవుతుంది.

చేప-వరి మిశ్రసంవర్ధనం వల్ల అనేక లాభాలుంటాయి. దోమలు, కీటకాలు, డింభకాలు వృద్ధిచెందవు. నీటిలో చేపలు నిరంతరం కదులుతూ ఉండడంవల్లకలుపు మొక్కలు పెరగవు. శైవలాలు చేపలకు ఆహారమవుతాయి. చేపల విస్తృత పదార్థాలు మొక్కలకు ఎరువవుతాయి. ఈ విధంగా చేపలను పెంచడంవల్ల పరిపైరుమీద ఏవిధమైన చేడు ప్రభావం ఉండదని వైగా పరి దిగుబడి పరిశీలనం పెరుగుతుందని పరిశీలనలు సూచిస్తున్నాయి.

చేపలను పెంచే పరిపాలలో కొన్ని అవసరమైన మార్పులు చేయవలసి ఉంటుంది పొలంలో కాలువలు తవ్వాలి. ఈ కాలువలన్నీ వచ్చి ఒకచోట కలిసే విధంగా అవి వెలువడే మార్గాల వద్ద ఒక పెద్ద గుంట తీయాలి. వాతావరణంలో ఉష్ణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఈ గుంట, కాలువలు చేపలకు నెరవులవుతాయి. అంతేగాక చేపల నేకరణకు ఇవి అనువుగా ఉంటాయి కూడా. పరిమళ్ళ మధ్య గట్లు ఎత్తుగా, పటిష్టంగా కట్టాలి. ఇవి కావలసిన నీటిమట్టం సర్దుబాటుకు, వరదలనుండి రక్షణకు సహాయపడతాయి. నీటి ప్రవేశ నిర్ణయ మార్గాలలో ఖాళీలను అమర్చినట్లయితే సంవర్ధితచేపలు బయటికి తప్పించుకొని పోలేవు. బయటనుండి అవాంఛనీయమైన చేపలు లోనికి చొరబడవు.

పరిపాలలో సంవర్ధితమయ్యే చేపలు, ఆధిక ఉష్ణోగ్రతను, కరిగిన తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిని తట్టుకొని జీవించేవిగా ఉండాలి. తక్కువ లోతులో ఉంటూకూడా స్వల్పమార్కెట్ పరిమాణానికి పెరిగేవిగా ఉండాలి. భారతీయ పెద్దకార్పిలు-కట్ట, రోహ, మిగాల్, విదేశీయ కార్పిలు- సామాన్య కార్ప్, టలేపియా, చన్నాస్ట్రయేటా, ఫుంటియన్ వగైరా జాతుల చేపల పెంపకం భారతదేశ పొలాలకు అనుకూలమైనవి. ఇంతేగాక ఫుంటియన్ జపానికన్ అనేచేపతోపాటు మంచిసిటిరొయ్య, మూక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గ్ ని కూడా పరి పాలలో సంవర్ధించ వచ్చునని ఇటీవలి పరిశీలనలు తెలుపుతున్నాయి.

కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో ఉష్ణకయ్య చేపలను, రోయ్యలను పరిపాలలో విరివిగా సంవర్ధించు చున్నారు. కేరళలోని వెంబానాడ్ సరస్సు ప్రాంతంలో సుమారు 5000 హెక్టార్ల పరిపాలలో పరి-చేపల సంవర్ధనం చేస్తున్నారు. వీటిని "పొక్కలి" క్షేత్రాలంటారు. ఈ భూముల్లో జూన్ మొదలు ఆక్టోబర్ మధ్య వరకు కేవలం నాలుగు నెలల్లో పరిసాగు చేస్తారు. కోతల తర్వాత మిగిలిపోయే వరిదంట్లు ఎంతో పోషక విలువలతో ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకోవడానికి బలమైన గట్లు ఏర్పాటుచేసి, ఉష్ణకయ్య చేపలను, రోయ్యలను పెంచడానికి పొలం సిద్ధంచేస్తారు. సరస్సునీటి తరంగాలతో కొట్టుకొని వచ్చిన డింభకానంతర దశలోని రోయ్యలు ఈ పొలాలలో చిక్కుకొనిపోయి, కొన్ని నెలలలో పెరిగి పెద్దవవుతాయి. పొలాల్లోని కాలువల తూములకు సంచి వలలు అమర్చి, ప్రవాహంలో కొట్టుకొని వచ్చే చేపలను, రోయ్యలను సేకరిస్తారు. అక్కడ సామాన్యంగా వెనియన్ ఇండికన్, మెటాపెనియన్ డోబ్సోని, మె. మోనోసెరాన్ మొదలైన రోయ్యలు, మిగిల్ జాతి చేపలు, ఎంబ్రోల్లోన్ సురాటెన్సిన్, చనాన్ చనాన్, మొదలైన ఇతరచేపలు దొరుకుతాయి. ఏడాదికి హెక్టారుకు 300- 11000 కి.గ్రాంల రోయ్యలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఉష్ణకయ్య రోయ్యలను, చేపలను పరిపాలలో సంవర్ధించే పద్ధతి పశ్చిమ బెంగాలులో హసనాబాద్, బసిర్ హాట్ వంటి 24 పరిగణాలలో అమలులో ఉంది. ముగిల్ సర్పియా, ము.టాడె, లాటెన్ కాల్ కేరిఫర్, మూక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గ్, మెటాపెనియన్ మోనోసెరాన్, మె. బ్రెవికోర్నిన్ మొదలైన చేపల, రోయ్యల జాతులు ఇక్కడ సంవర్ధితమవు తున్నాయి. వీటి ఉత్పత్తి హెక్టారుకు 100 నుండి 300 కి.గ్రాంల మధ్య ఉంటుంది.

పరిపాలలో చేపల సంవర్ధనం నాలుగు రకాలుగా జరుగుతుంది. నీటి పారుదల గల పరి భూముల్లో చేపలను నిలువ చేయడం, ద్వితీయ పంట పద్ధతి, మధ్యాంతర పద్ధతి, నిరంతర సంవర్ధన పద్ధతి.

ఇందులో మొదటి పద్ధతి చాలా సులభమైనది. వైర్లకు కాలువ నీళ్ళతో పాటు వచ్చే చేపలను పోకుండా అరికట్టి, పెరగనివ్వడం, పరి కోతలతోపాటు. వీటినికూడా సేకరించడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే ఒకే ఒక్క పరిపంట వండిస్తారో అక్కడ అదనంగా వీటిని మిగతా కాలంలో పెంచడం ద్వితీయ పంట పద్ధతి. ఇక మొదటి పంట రెండవ పంటలకు మధ్యఉండే కొద్దిపాటి వ్యవధి కాలంలో చేపలను పెంచడం మధ్యాంతర పద్ధతి. అనేక పరి పంటలు వండించినా, చేపలను పొలంలోని

ప్రతి రోజు వరిపండి (నూకలు), మాంసం ముక్కలు, ముల్గ్లు, ప్రింప్లు, చిల్లర చేపలు, కర్ర పెండెలం, నూనెపిట్టు మొదలైన వాటిని అదనపు ఆహారంగా ఇస్తారు. ఈ ఆహారాన్ని మట్టి పాత్రలో ఉంచి కుంటలో పెడతారు. వివిధ దేశాలలో రోయ్యలపోషక అవసరాలను గుర్తించి, తగిన మిశ్రమ ఆహారాన్ని తయారుచేసి వాడుతున్నారు.

కుంటలోని నిరుపయోగ్యమైన చేపలను, నిర్మూలించి, సున్నం చల్లి, నదీ వనరుల నుండి సేకరించిన 30-50 మి.మీ. నిడివితో ఉండే మా.మూల్కంసోని జవన రోయ్యలను ఈ కుంటలో వదులుతారు. హెక్టారుకు 200000 నుండి 30000 సాంద్రతను గరిష్ఠంగా పరిగణిస్తారు.

మా.మూల్కంసోని సంవర్ధనం రెండు విధాలుగా నిర్వహిస్తారు. మొదటిది “బ్యాచ్ సంవర్ధనం”, రెండవది “నిరంతర సంవర్ధనం”. కుంటలో రోయ్యలను నిల్వచేసి, వాటిని సగటు మార్కెట్ పరిమాణానికి చేరే వరకు పెంచి మొత్తం రోయ్యల వంటను సేకరించడం బ్యాచ్ సంవర్ధన పద్ధతి. సంవత్సరానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు అధిక సాంద్రతలో కుంటలోపేసి మార్కెట్ పరిమాణానికి వచ్చిన రోయ్యల మధ్య మధ్య నియమ బద్ధంగా సేకరించడం “నిరంతర సంవర్ధనం.”

నూకలు, తప్పుడు, నత్తల, చిల్లర చేపల మాంసం. చేప ఆహారం. మొదలైన తక్కువ ఖరీదు చేసే అదనపు ఆహారాన్ని రోయ్యలకు వేయాలి. రోయ్య జీవరాశికి 5, 10 శాతం ప్రమాణం రేటు ఆహారాన్ని సామాన్యంగా నిర్ణయిస్తారు. పెరిగే రోయ్యలు మృత్యు వాత బడడానికి ముఖ్యంగా వాటిలోని ప్రాంతీయ తత్వం, స్వజాతి భక్షణం ముఖ్యకారణాలు, అందుచేత దాక్కొనే ప్లలాలను కుంటలో విర్పరచడం వల్ల ఈభయాలను నివారించి రోయ్యలను పెంపొందించవచ్చు.

కేవలం మా. రొనెన్బర్గ్ జాతి రోయ్యలను వేర్వేరు సాంద్రతలలో నిల్వచేసి సంవర్ధించినట్టి ఫలితాలు హెక్టారుకు 577-606 కి. గ్రాంలు నాలుగు నెలల దిగుబడి అని తెలుపుతున్నాయి. రోయ్యలతో పొందికగా ఉండే చేపలను కూడా ఇదే సమయంలో పెంచవచ్చు. ఈ విధంగా సంవర్ధనం చేసిన కార్ప్లు మార్కెట్ ప్రమాణానికి చేరి హెక్టారుకు 1500-2000 కి.గ్రాంల దిగుబడిని ఇచ్చినాయి.

ఆరు నెలల్లో హెక్టారుకు 250 కి.గ్రాంలు, పది నెలల్లో హెక్టారుకు 313 కి.గ్రాంల మా. మూల్కంసోని రోయ్యల దిగుబడి గణనీయంగా పెరిగింది. హెక్టారుకు కేవలం 60,000 మా.మూల్కంసోని జవనరోయ్యల సాంద్రతతో 390 రోజులలో హెక్టారుకు 534 మొదలు కొని 690 వరకు వివిధ శ్రేణులలో రోయ్యల వంట లభించింది. మా. మూల్కంసోని రోయ్యల, కార్ప్ చేపల బహుళ సంవర్ధన వ్యవస్థ అవలంబించినందువల్ల 390 రోజులలో రోయ్యల ఉత్పత్తి హెక్టారుకు 634-962 కి.గ్రాంలు కాగా చేపల ఉత్పత్తి అదే విస్తీర్ణానికి 1126-2400 కి.గ్రాంలు ఉంది. బహుళ సంవర్ధన వ్యవస్థవల్ల అంత వరకు వినియోగించనికుంట జీవావరణ ప్రాంతాలను లాభదాయకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మా.మూల్కంసోని రోయ్యలకు భారతీయ పెద్దకార్ప్లైన కట్ల, రోహా, మ్రిగాల్ చేపల మధ్య పొత్తు బాగా కుదురుతుంది కాని విదేశీయ గడ్డి సామాన్య కార్ప్ చేపల పొంతన వల్ల రోయ్యల పెరుగుదల రేటుకు, మనుగడుకు ప్రమాదం వాటిల్లుతుంది.

13.11 గాలిపీల్చే చేపల సంవర్ధనం

వ్యాపారీత్యా, గాలిపీల్చే ముఖ్యమైన భారతీయ చేపలు-మరెల్లు (చన్నా మరూలియా, చ. త్రయేటా, చ.వన్క్వేటా) ఎక్కిపెర్స్ లేదా కోయిచేప (అనాబస్ టెస్టుడినియస్), సింఘీ (హిలె-రొస్ట్రాస్. ఫాసిలిస్) మాగుర్ (క్లారియస్ బ్రట్రాకస్), ఫెదర్బాక్లు (నోటాప్టరస్ చిటాలు) నో. నోటాప్టరస్ ఈజాతుల చేపలు మొప్పలతో శ్వాసించడంతోబాటు తమ అనుబంధ శ్వాసావయవాల ద్వారా వాతావరణంలో గాలిని నేరుగా పీల్చి శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి వాయుగత శ్వాసక్రియ ఇతర శరీరధర్మ అనుకూలనాలవల్ల కరిగిన ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండి, స్వేచ్ఛా కార్పన్ డయాక్సైడ్ ఎక్కువగాఉండే అననుకూల ప్రదేశాలైన చిత్తడినేల, కలుపుమొక్కలుండే గంటలు మొదలైన మురికి

నీటి ప్రాంతాలలో జీవిస్తాయి. నీటి బయట కూడా బ్రతికే సామర్థ్యంవల్ల వీటిని సజీవమత్స్యాలుగా మార్కెట్‌లకు పంపిస్తారు. లోనాటి చేపల మార్కెట్‌లోకి వచ్చే మిగతా చేపల కంటే ఇవి 15 శాతం ఎక్కువ. భారతీయ రాష్ట్రాలు చాలావరకు వీటిపైనే ముగ్గు చూపుతాయి. గాలి పీల్చే చేపలకు ఉండే వాసన, రుచి, తక్కువ ఎముకలు ఒక కారణమైతే కార్ప్స్ కంటే ఎక్కువ వెలకలిగి ఉండడం మరోకారణం వీటిలో ప్రోటీన్‌లు, ఇనుము ఎక్కువగా, కొవ్వు బహు తక్కువగా ఉండడం వల్ల పోషక పదార్థాలకు, శక్తిదాయకానికి రోగులు కోలుకోవడానికి వీటిని ఉత్తమ ఆహారంగా వైద్యులు సిఫారసు చేస్తారు. ఈ సుగుణాలవల్ల కాబోలు ఇతర చేపలతో వీటిని మార్కెట్‌లో వేరుగా ప్రదర్శిస్తారు. గాలి పీల్చే శక్తి సామర్థ్యాలండటంవల్ల వీటిని చాలా రోజులవరకు బురద పాత్రలో వేసి లేదా గుడ్డలో చుట్టి తాజాగా ఉంచుతారు. వీటి జనప్రియత్వానికి ఇదో కారణం.

మార్కెట్‌లు లేదా సాముతలలు భారత దేశమంతటా చెరువులలో, సరస్సులు, జలాశయాలు నదుల మొదలైన వాటిలో నివసిస్తాయి. పెద్దమర్కెట్, చన్నామారులియా, చారల మర్కెట్ చన్ద్రయేటా, మచ్చల మర్కెట్, చ.వన్‌క్షేటా సంవర్ధనానికి ఉత్తమ మైనవి. ప్రాథమిక చేపలు మాంసాహారులు, స్వజాతి భక్షకులు, అనాబన్ టెస్టుడియన్ దేశ మంతటా వ్యాపితమైన, పూర్వోత్తర భారత్‌లో ప్రేయమైన తినేచేప. వానాకాలంలో నేల పైకి పాకే సామర్థ్యం ఈ చేపకు ఉంది. చిత్తడ మంచి నీటిలో, చెరువులలో హిటెరాన్యూస్ట్రన్ ఫాసిలిన్, దాని పోషక పదార్థాలకు, కోలుకునే గుణాలకు భారత్ అంతటా ప్రసిద్ధికెక్కింది. క్లారియన్ బ్రట్రాకన్ భారతదేశం ఉష్ణకయ్యలలో, మంచి నీటిలో ఉండే చేప. నదులలో, సరస్సులలో జలాశయాల్లో నోటాస్టరన్ చిటాల, నో.నోటాస్టరన్ జాతులు సామాన్యంగా ఉంటాయి. పూర్వోత్తర భారతీయులకు ఇవి ఇష్టమైన ఆహారం.

13.12 చేపనారు ఉత్పత్తి పద్ధతులు

గాలి పీల్చే చేపలు సాధారణంగా నీటిలో మునిగే ప్రాంతాలు, వరిపొలాలు చిత్తడులు, కుంటలు, సరస్సులు, జలాశయాలు, నదులువగైరా ప్రాంతాలలో గుడ్లు పెడతాయి. ఋతుపవనాలు లేదా ఋతు పవనాల తదనంతర కాలంలో ఇవి గుడ్లు పెడతాయి. ఇవి సంతాన పాలనను ప్రదర్శించుతాయి. వీటి నారును ఎక్కువగా సహజ వనరులనుండి గ్రహిస్తారు. నియంత్రిత సాంకేతిక పద్ధతులలో కూడా నారు ఉత్పత్తిని విజయవంతంగా చేయగలిగినారు.

చన్న మారులియా, చ.చన్ద్రయేటా, చ.వన్‌క్షేటా మార్కెట్ చేపల నారు లేదా పసి చేపలను బంధిత జలాలనుండి, తక్కువ లోతైన మురికి నీటి గుంటలు, గుంటలు, వర్షాధార లేదా శాశ్వత చెరువులు మొదలైన వనరుల నుండి సేకరించవచ్చు. ఋతుపవనాలకు పూర్వం లేదా అదే కాలంలో చ. మారులియా అధిక ప్రజననం జరిపినా సంవత్సరమంతటా గుడ్లు పెడుతునే ఉంటుంది. చ.వన్‌క్షేటా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తెలంగాణా ప్రాంతంలో ఏడాదిపొడవునా ప్రజననం చేస్తుంది. కాని తక్కిన చోట్లలో ఏప్రిల్ మొదలు ఆక్టోబర్ వరకు దాని ప్రజనన కాలము. మొరినేగాడ ఎరువు వర్షంతో ఉండే చ.చన్ద్రయేటాను, బహువర్ణకాయుత నిమ్మ పనుపు రంగుతో ఉండే నలుపు వట్టిలుగల చ.వన్‌క్షేటాను, శరీరం రెండు వైపులా నారింజ పనుపు నిలుపు వట్టితో ఉండే చ.మరూలియాను చూడగానే గుర్తించి సేకరించవచ్చు. మర్కెట్ చేపనారును తొలి పసి చేప దశలోనే సేకరించడం ఉచితం ఎందుకంటే వెరిగినాకొద్దీ ఇవి గుంపుగా ఉండే స్వభావాన్ని కోల్పోతాయి. వీటిని తగుజాగ్రాతగా గుడ్డవలేసి తొందరగా లాగి పట్టుకోవలసి ఉంటుంది.

కార్ప్స్ చేపల పీయూషగ్రంథుల హోమోజనేట్ (Homogenate) తయారు చేసి ఇంజక్షన్ చేయడంవల్ల మార్కెట్‌లో ప్రేరేపిత ప్రజననం కలిగించవచ్చు. అడ చేపలశరీర తూకానికి కిలోకు 120 మి.గ్రాంల మోతాదులో మగచేపలకు కిలోకు 15 నుండి 40 మి.గ్రాంల మోతాదులో ఇచ్చినట్లుంటే గుడ్లు పెడతాయి. ఈ గుడ్లను ప్లాస్టిక్ పాత్రలలోకి మార్చుతారు. ఈ పాత్రలో వరసగా నీరు చిలకటంవల్ల సజీవ పిండాలు ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతాయి. చ. మారులియా గుడ్లు పొదిగే కాలం

భాగం-14 తీరప్రాంత జల సంవర్ధన, సముద్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు

విషయక్రమం

- 14.1 ఉద్దేశ్యం
- 14.2 ఉపోద్ఘాతం
- 14.3 ఉప్పుకయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనాలు
- 14.4 రొయ్య, చేపల పిల్లల ఉత్పత్తి
- 14.5 నర్బరీ పాలన
- 14.6 ఉప్పు కయ్యల రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయం
- 14.7 సముద్ర జంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు
- 14.8 మసల్ సంవర్ధనం
- 14.9 అయిస్టర్ సంవర్ధనం
- 14.10 క్లామ్ సంవర్ధనం
- 14.11 ముత్య సంవర్ధనం
- 14.12 ద్వీకవాట సంవర్ధన సంస్థలలోని సమస్యలు, అవరోధాలు
- 14.13 మీన సంవర్ధనము
- 14.14 సముద్ర కలుపు మొక్కల సంవర్ధనము
- 14.15 సారాంశం
- 14.16 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 14.17 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

14.1 ఉద్దేశ్యం

ఉప్పు టేళ్ళలో, రొయ్యల, చేపల పెంపకం, ఆల్సిప్ప, అయిస్టర్, క్లామ్ సంవర్ధనాలేకాక, ముత్యాల పరిశ్రమ, సముద్రకలుపు మొక్కల పెంపుదల గురించి ఈ పాఠంలో చర్చించాము.

14.2 ఉపోద్ఘాతం

ఉప్పు కయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనం పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ రాష్ట్రాలలో సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తోంది. ఈ వద్దతిలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే చేప పిల్లలను బంధించి, వాటిని బాగా పెంచి, కొప్పు పట్టేటట్లు చేస్తారు. సముద్రపొంగులో వచ్చే నీటిని ఆశయాలలో నిలువచేసి అందులో పెంచుతారు లేదా పంట పొలాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి.

ఇందులో కొన్ని ముఖ్యలోపాలు ఉన్నాయి. మనకు అత్యంత కావలసిన జాతుల పిల్లలు చాలా వృధా పోతాయి. అవసరం లేని జాతులు అధికంగా చేరతాయి. ఇక దిగుబడి గురించి అంచనాలు వెయ్యలేము. మొత్తానికి తక్కువగా లభ్యం అవుతాయి.

గత దశాబ్దం నుంచి ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. దీనివలన ఉష్ణకయ్యలలో వాటి పెంపకం సందర్భంగా మంచి పునాదులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ విజ్ఞానం పెంపొందడంతోపాటు అంతో ఇంతో వీటి దిగుబడి అవకాశాలు అధికం అయ్యాయి.

తీరప్రాంత జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలో రొయ్యలను ప్రథమంగా పేర్కొనాలి. వెనియన్ మోనోడాన్, వె. ఇండికన్ జాతులను ముఖ్యంగా కోరుకుంటాము. మార్కెట్ లో వీటి ధర హెచ్చు, త్వరితంగా పెరగడంతోపాటు జీవశాస్త్ర కారకాలు వీటికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఈ సందర్భంగా ఉష్ణకయ్య సంవర్ధకాలలో చాలా అనుకూలంగా ఉండే జాతులు, పాల మత్స్యం (చానోస్), గ్రేమల్లెట్ (ముగిల్ నెఫాలస్), మల్లెట్లు (తిజాటాడె, లి. పార్సియా) బెక్తి (లాటిన్ కాల్యారిఫెర్).

వాణిజ్యరీత్యా ముఖ్యమైన రొయ్యలు, చేపలను ఎన్నుకొని, వాటి పిల్లలను సహజ వాతావరణంలో నుంచి కాని ప్రయోగ స్థాయిలోనున్న పోచరీలలో కాని ఉత్పత్తిచేసే నేకరిస్తారు. ప్రస్తుతానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యం అయేవాటి మీదనే భారత దేశంలోని ఉష్ణకయ్యల పెంపకాలు జరుగుతున్నాయి.

మన పశ్చిమ తూర్పు తీర ప్రాంతాలలోనున్న ఉష్ణ కయ్యలలో కొన్ని విషయాలు గమనించారు. వీటిలో గోదావరి ఉష్ణకయ్య, కాకినాడ అఖాతము, పులికాట్ సరస్సు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాలలో ఆయాముతువుల్లో ఇవి ఎంతగానో లభ్యమవుతున్నాయి. రొయ్య, చేప పిల్లలను పట్టడానికి తగిన పరికరాలు Gear ఎలాంటివి కావాలి అనే విషయాలు వివరించబడినవి.

ప్రయోగాలకు లోబడి, రొయ్యల నుండి పిల్లలను ఉత్పత్తి పోచరీ ఉత్పత్తి భారతదేశంలో ఇటీవలనే అభివృద్ధి చెందుతోంది.

ఉష్ణకయ్య జలజంతు సంవర్ధన మాత్రం, రొయ్యల, చేపల పెంపకంలో శ్రద్ధ, అజమాయిషీలు ముఖ్యమైన ముందు చర్యలుగా భావించాలి. ఒక్కొక్కజాతికి సంబంధించి ఈ చర్యలు ఎలా ఉండాలి, పెంపకం, నిర్వహణ పద్ధతులు ఎలా ఉండాలి నియమావళి రూపొందించబడింది.

సాంకేతిక అజమాయిషీ చర్యల్లో ఉష్ణకయ్యలకు సంబంధించి నిలువ కుంటలు రూపొందించి వీటిని ఎలా రూపొందించాలి. వాటిలోని నీటి విషయంలో ఎలా శ్రద్ధవహించాలి, చేపల, రొయ్యల బాతులకు సంబంధించి వాటి బీజసంయోగం, వీటిని నిలువచేసే తగిన అదనపు ఆహార పద్ధతులు మొదలైన ముఖ్య అంశాలను క్షుణ్ణంగా వర్ణించబడినవి.

మోనోకల్చర్ (ఒకేజాతి) లేదా పాలీకల్చర్ (బహుజాతులు) వ్యవస్థలలో ఏ పద్ధతిలోనైనా ఉష్ణ కయ్యలలో వీటి పెంపకం సాగించవచ్చు. ఒకేసారి చేపలను ప్రవేశపెట్టి, ఒకేసారి పంటదిగుబడి చేసేకోవడం, ఒకేసారి ప్రవేశ చేపలను ప్రవేశపెట్టి, ఒకేసారి పంట దిగుబడి చేసేకోవడం, ఒకేసారి ప్రవేశపెట్టాక చాలాసార్లు పంట రాబట్టుకోవడం, తరుచుగా చాలాసార్లు ప్రవేశపెట్టాక, చాలాసార్లు వాటిని నేకరించుకోవడం వంటి పద్ధతులు వివరించబడినవి. జాతుల మేలుకలయిక, వాటి సంతాన సంఖ్యలు పరీక్షించడం మొదలగునవి గురించి వివరించబడింది.

పులి రొయ్యలు వెనియన్ మోనోడాన్, సంవత్సరానికి పాళ్వారుకు 1000 కే.జీ.లు సాధించడం వీలుంది. ఇది ప్రోస్పెక్టాలంలో బహుళ వ్యవసాయ పద్ధతిలో చేస్తారు. బహుళ సంవర్ధన పద్ధతులలో రొయ్యలు, చేపలు పెంచటంవల్ల వాటి సంఖ్య సంవత్సరానికి పాళ్వారుకు 2,671 కే. జీలు సాధించడం గమనించారు.

సముద్రజలాలలో, సముద్రజీవులను ఒక పద్ధతిలో పెంచడాన్ని సముద్రజల సంవర్ధనము అంటారు. ద్వీకవాట మలస్కు జీవుల పెంపకానికి ఈ సందర్భంగా ఇండియా ప్రాముఖ్యం వహిస్తోంది.

అవుతాయి. కాకినాడ ప్రాంతంలో చ. చనాన్ మార్చి జూలై కాలాల్లో మాత్రం లభ్యం అవుతాయి. అధిక సంఖ్యకు చేరుకోవడం ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ నెలలో జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి అక్టోబరు నుంచి డిశంబరు ప్రారంభంవరకూ తగుమాత్రపు సంఖ్యలో అధిక లభ్యతస్థితికి చేరుకుంటాయి. లోతుతక్కువగా ఉండే ఆటుపోటు ప్రాంత పిల్లకాలువలలోకి పాలచేప, చిరుచేప దశలు అత్యధిక సంఖ్యలో గుంపులుగా రావడానికి కుతూహలం చూపుతాయి. డ్రాగ్ నెట్ తో వీటిని సేకరించడం చాలా వీలుగా ఉంటుంది. గ్రేమల్లెట్ ముజిల్ నెఫాలిన్ చేప చిరుచేప దశలు కాకినాడ వద్ద నవంబరు నుండి డిశంబరు వరకు కొద్దికాలం అత్యధిక సంఖ్యలో దొరుకుతాయి. మిగతా మల్లెట్ల విత్తనాలు కూడా కాకినాడ దగ్గర ఏడాది పొడవునా లభ్యమవుతాయి. ఏప్రిల్-జూన్, నవంబరు-డిశంబరులలో పతాకస్థాయిలో దొరుకుతాయి. భక్తి చేప లోట్స్ కాల్యారిఫెర్ చిన్న వయసులోనివి కొద్ది సంఖ్యలో కాకినాడ దగ్గర అక్టోబరు నుంచి నవంబరు వరకు దొరుకుతాయి.

విస్తృత స్థాయిలో రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయంలో సహజ సిద్ధంగా లభ్యమయే విత్తనాల మీదనే నిత్యం ఆధారపడలేము. ఋతువ్రభావం వలన వీటి లభ్యత అటూఇటూ ఉంటుంది. అందువల్ల నియంత్రణ స్థితుల్లో వీటి విత్తనాలు సేకరించటం ఒకటే నమ్మకంగా వీటిని అందిస్తుంది. నియంత్రణ వద్దతుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి పెంచనుద్దేశించిన చేప, రొయ్యల జాతుల విత్తనాలను, అభివృద్ధి చెయ్యడం హాచరీ పద్ధతులను అనుసరించటం, మన దేశంలో ఇటీవలనే మొదలైంది.

ప్రకృతి సిద్ధంగా అయితే పినియడ్ రొయ్యలు పూర్తి లైంగిక పరివక్తను పొందడం, ప్రత్యుత్పత్తి ప్రారంభించడం సముద్రంలోనే జరుగుతుంది. రొయ్యలు లైంగిక పరివక్తను పొందే వయసు జాతి నుంచి జాతికి మారుతుంది.

పెనియన్ మోనోడాన్ 5-15 నెలల వయసులోను వె. ఇండిక్ 4-6 నెలల వయసులోను పరివక్త చేరుతాయి.

గుడ్లు పెట్టే రొయ్యలు సేకరించగానే హాచరీ (చేపనారు మడుగు) కార్యక్రమాలు ఆరంభం అవుతాయి. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయి పరివక్తగా ఉన్న రొయ్యలను కాని, పైక్రియను గురిచేసిన రొయ్యలను కాని హాచరీలో గుడ్లు పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు.

కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవం పురస్కరించుకొని, హాచరీ వ్యవస్థలను స్థూలంగా రెండు పద్ధతులుగా చెప్పవచ్చును : (1) జపనీస్ మాన్ కల్చర్ పద్ధతి. పెద్ద సిమెంటు కాంక్రీటు బాంకులు కొన్నిటిలో ఒకేసారి గుడ్లు పెట్టే కొన్నిటి ద్వారా గుడ్లు పెట్టనివ్వడం, వాటిలోని సముద్రజలాలలో వీటికి అహారంగా ఉపయోగపడే జంతువులను ఎదగనిస్తారు. (2) అమెరికాలోని గాలెస్టన్ ప్రయోగశాలలోని బంధిత వక్ర హాచరీపద్ధతి చిన్న చిన్న ఫైబర్ గ్లాస్ బాంకుల్లో గుడ్లు పెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. డింభకాల పోషణకి బాహ్యం నుంచి సజీవ అహార జీవుల సంవర్ధనాలను వేరుగా పంపిణీ చేస్తారు. భాభత్ దేశంలో ఈ గాలెస్టన్ పద్ధతికి కొద్దిగా మార్పులుచేసి హాచరీవ్యవస్థల ద్వారా పినియడ్ డింభకాల విస్తృత ఉత్పత్తి కొనసాగిస్తున్నారు.

కాలుష్యరహితమైన శుభ్రమైన సముద్రజల ఆవశ్యకత హాచరీల స్థాపనలో చాలా అవసరం. ఋతు సంబంధమైన గుణాత్మక ఇక్షణాల లేదాలు చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఇక హాచరీని సక్రమంగా నడపడానికి మంచివీటి జల ఆవశ్యకత ఉంటుంది. తగిన రోడ్లు సదుపాయాలు, విద్యుత్ సరఫరా జనరేటర్ ఉండాలి. గుడ్లు పెట్టే చేపలు రొయ్యలు, విషయం సరేసరి. డింభకాల పెంపకంలో తైలతాకిడిలేని గాలి, గాలివంపులు లేదా బ్లోయరుల ద్వారా ఎయిర్ స్ట్రమ్ల సహాయంతో మంచిగాలి సరఫరా సదుపాయం చూడాలి. నీరు బాగా సరఫరా కావాలి. మన దేశంలో ఈ సంబంధంగా 300 లీటర్ల కేపాసిటీగల స్థూపాకార పాస్టిక్ పూల్లు 1.75 నుండి 10-5 టన్నుల వరకూ భిన్న ప్రమాణాల కొలతలుగల గుండ్రని లేదా నలుచదర ప్లాస్టిక్ పాత్రలు, ఫైబర్ గ్లాసుతో చేసిన స్థూపాకార పాత్రలు ఉపయోగిస్తారు. వీటికి దిగువ శంకువు ఆకారంలో నిర్మించబడిన భాగాలుంటాయి. వీటి ద్వారా నీరు, విసర్జన వ్యధార్థాలు బయటకు పోతాయి.

హాచరీ బాంకులలోకి 28 నుంచి 34 ppt నెలేసిటికల శుభ్రమైన సముద్రజలాన్ని వడబోసి పంపుతారు. ఈ బాంకులలోకి స్పానర్ (గుడ్డు పెట్టే చేపలు, రొయ్యలు) లను వదలడానికి ముందు EDTA సోడియం ఉప్పును సీటికి 100 లీటర్లకు 1 గ్రాము చొప్పున కలుపుతారు. గుడ్డు పెట్టే కార్యక్రమం సాధారణంగా రాత్రిపూట జరుగుతుంది. 12-15 గంటల తరువాత గుడ్డునుండి నాస్టియస్ దశలు బయటపడతాయి. పెనియన్ మోనోడాన్ లో ఆరు నాస్టియస్ ఘట్టాలున్నాయి. నిలువసాన పదార్థాన్ని గ్రహించుకొనే నాస్టియస్ ఘట్టాలు పెరుగుతాయి. ఒక నిర్మోకానికి మరొక నిర్మోకానికి మధ్యనుండే అంతఃనిరోధక దశకాలము 8 నుంచి 12 గంటలు ఉంటుంది. నాస్టియస్, జోయి యాదశకు రూపవిక్రయం చెందుతుంది. జోయియా దశలు డయాటమ్లను ఆహారంగా తీసికోవడం మొదలుపెడతాయి. 4-6 దినాలలో 3 సార్లు నిర్మోకత్వము చెందాక జోయియా, మైసిస్ అవుతుంది. మైసిస్ దశ డయాటమ్లకు తోడు జంతుప్లవక జీవుల డింభకాలను తినడం ప్రారంభిస్తుంది. 4-6 రోజుల్లో మైసిస్ దశ పూర్తి అవుతుంది. తరువాత డింభక పరదశ వస్తుంది. ప్రింప్ (రొయ్య) డింభకదశ అభివృద్ధి రేట్ సీటి ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కనీస అవసర సీటి ఉష్ణోగ్రత 28-29° C.

హాచరీ కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగడానికి మూలకారకం రొయ్య డింభకాలకి తగిన ఆహార లభ్యత. ఈ కారణంగానే ఈ వ్యవహారం క్లిష్టమౌతుంది. డయాటమ్ల విషయంలో స్కెల్టోనెమా జాతులు, కియాటోసిరాన్ జాతులు అనువైనవి. హాచరీలలో విడిగా వీటిని ఆల్గల్ సంవర్ధనాలుగా ఉత్పత్తిచేస్తారు. బ్రాకియోనస్ ఫ్రికాటిలిస్ అనే రోటిఫరజీవి మొయినా జాతుల, క్లోడోసిరా జీవులు, అర్థిమియా అనే బ్రైన్షింప్ సంవర్ధన పద్ధతిలో నిత్యం ఉత్పత్తిచేస్తూ ఉండాలి. వీటిని సజీవ ఆహారంగా అందిస్తారు. ఎగ్ కస్టర్లును, ఎసిటెస్ జాతులను తాజాగానూరి కణజాలాలుగా వ్రేలాడదీసి పినియడ్ రొయ్యల పిల్లలను జావెనైల్ దశల్లో నూరి ఆ కణ జాలాలను, ఒరాటో స్క్యెల్లానిపా అనే స్టోమాటోపాడ్ ను ఆహారంగా ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమాలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారు. డింభక పరదశలకు క్లామ్ మాంసాన్ని సన్నగా ఖైమాగాచేసి ఆహారంగా ఇస్తారు.

చేపల్లో గ్రేమలెట్ ముజిల్ నెపాలస్, ఇతర మలెట్లు ప్రోత్సాహక ప్రజనన పద్ధతిలో గుడ్డు సాధించడం విజయవంతంగా జరిగింది. అయితే డింభక అభివృద్ధి, పిల్లలు గుడ్లనించి బయట కు రావడం విస్తృత పద్ధతిలో సాధించడం ఇంకా సరియైన పద్ధతిలో లేవు.

14.5 నర్సరీ పాలన

తాజాగా నేకరించిన రొయ్యల, చేపల విత్తనాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. సరాసరిగా నిలువ సరస్సులలోనికి మార్చినపుడు అధిక సంఖ్యలో చనిపోతాయి. పరిస్థితులకు సర్దుకోలేకపోతాయి. అందువలన వీటిని మొదటి చిన్న అరలలోనికి వదులుతారు. అక్కడ భౌతిక, రసాయనిక అనుకూలంగా ఉండడమేకాక తగిన ఆహారంకూడా సరఫరా చేయవచ్చు. ఈ చిన్న అరసని నర్సరీలు అంటారు.

మట్టితో నిర్మించిన 0.05 నుండి 0.1 హెక్టార్ల విస్తీర్ణం కలిగిన చిన్న చిన్న కుంటలు కాని, సిమెంట్ తో నిర్మించిన సిస్టర్న్లవంటివి చిన్న నెజలలో కాని నర్సరీలుగా ఉపయోగపడతాయి. ఉష్ణకయ్యల వ్యవసాయ సరస్సులలోని హాపాస్, బోనులు కూడా ఈ నర్సరీలుగా ఉపయోగపడతాయి.

మట్టితో నిర్మించిన నర్సరీ సరస్సులు తయారే ఈ క్రింది విధంగా జరుగుతుంది. ముందు దానిలోని నీటిని బయటకు తీసివేస్తారు. తరువాత ఫోస్ఫేటిక్ ఎరువులు ఆ సరస్సులోని మట్టికి కలుపుతారు. దీనివలన అందులో సహజసిద్ధమైన ఆహారజీవుల అభివృద్ధికి అవకాశం కలుగుతుంది. తరువాత ఆటూపోటుల వలన వచ్చే నీటిని అందులోనికి చేరుస్తారు. సుమారు 10 రోజులపాటు 0.3 మీటర్ల లోతువరకు నిలువచేస్తారు. బాగా మందంగా ఆల్జీజీవుల పెరుగుదల కనబడగానే నీటి ఘట్టాన్ని క్రమంగా పెంచుతారు.

ఒక్కొక్కజాతి అవసరాలను పురస్కరించుకొని ఆయా విధంగా సర్పరీలను రూపొందిస్తారు. ఆహారం ఒక ముఖ్యకారకం. దీనికే పరదశలు, జువెనైలు రొయ్యల సందర్భంగా సూక్ష్మ ఆర్థి, కుళ్లుతున్న వృక్ష సంబంధ పదార్థాల మీద ఆధారపడతాయి. పాల చేపలకు లాబ్-లాబ్ అనే బెంటిక్ ఆర్థి అవసరం అవుతుంది. మల్లెట్లకు జంతు స్తవక జీవులు అవసరమౌతాయి. ఇక pH, సెలెనిటి, కరిగిన ఆక్సిజన్ 4 ppm పైన, సెలెనిటి 10-15 ppt, మధ్య pH 8 కి పైన అనుకూలంగా ఉంటాయి. తరుచు నీటిని మారుస్తూ ఉండటం వలన నీటి నియంత్రణ సాధ్యమౌతుంది.

సరస్సులలో నిలువ చేసిన జాతులకు బయటకు పోకుండా బయటనుండి అసరంలేని జాతులులోనకు ప్రవేశించకుండా మార్గాలను బైర్మెన్ తెరలతో రక్షించుకోవాలి. దీనికే పరదశలను తయారైన సర్పరీలలోకి ప్రవేశపెట్టేముందు వాటిని క్రమ: అలవాటుచెయ్యాలి. సర్పరీ నీటిని కొద్ది కొద్దిగా ప్రమాణరీత్యా కలుపుతూ రావాలి. ఈత ఆకులు, ఎండిన మాంగ్రోవ్ మొక్కల కొమ్మలు చెరువులో వివిధ మట్టాలలో ఉంచడంవలన రొయ్యలకు సదుపాయంగా ఉంటుంది. ఆశ్రయ పీఠం కల్పించడమేకాక నిర్మోకత్వ కాలంలో రక్షణ సమకూరుతుంది. నిత్యం సరస్సులోని నీటిని అటుపోటు జలాలతో మార్చడం ఒక ముఖ్యవసరం. బాగా తయారైన సర్పరీలో వెనియన్ మోనోడాన్ వర దీనికే దశలను హెక్టారుకి 3-5 లక్షల వరకు నిలువ చెయ్యవచ్చు. ప్రతిరోజు వీటికి బరువులో 10-20 శాతం వరకు అదనపు ఆహారం సమకూర్చాలి. పనికి రాని చేపలు, రొయ్యలు, ఇక చేప తిండి, మలస్కజీవుల మాంసము గుండగానూరి వీటికి అందించవచ్చు. 6 నుండి 8 వారాలలో పరదేశిక దశలు 10-15 మి.మీ.ల నుండి 40-50 మి.మీ. పైకి పెరుగుతాయి. తరువాత వాటిని తీసివేసి పెద్ద పెద్ద సరస్సులలోకి మార్చాలి.

చానాన్ చానాన్ సర్పరీలలో నీటి మట్టం 0.5-0.8 వరకు ఉండాలి. దీనివలన లాబ్-లాబ్ వృద్ధికి ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది. దీని చిరుచేపలను 10-15 మి.మీ. పైకి ఉన్నవాటిని హెక్టారుకు మూడు లక్షల చొప్పున నిలువచేస్తారు. వీటికి అదనపు ఆహారంగా గింజలు, అయిల్ కేక్, చేపతిండి సరిసమాన నిష్పత్తిలో కలిపి ప్రతిరోజు ఇవ్వాలి. చేపల మొత్తం బరువులో 10 శాతం లెక్కన ఈ ఆహారాన్ని గుండ్రంగాచేసి ఇవ్వాలి.

పాలచేప వద్దతిలోనే మల్లెట్ సర్పరీలు కూడా తయారు చేస్తారు. హెక్టారుకు ఒక లక్ష చొప్పున 20-25 మి.మీ. పైకి ఉన్నవాటిని నిలువచేస్తారు. అదనపు ఆహారంగా వరి తవుడు, అయిల్ కేక్, చేపల మొత్తం బరువులో 5-10 శాతం లెక్కన ఇస్తారు. 40 రోజుల తరువాత జువెనైల్లను అభివృద్ధి సరస్సులలోనికి మారుస్తారు.

14.6. ఉప్పు కయ్యల రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయం

నాణ్యతగల రొయ్యలను, చేపలను వృద్ధి చేయడమే ఉప్పుకయ్యల జలజంతు సంవర్ధన ఉద్దేశ్యం.

ఉప్పు కయ్యల జలజంతు సంవర్ధన అటుపోటు మధ్య ఉండే భూములు, మాంగ్రోవ్ స్థలాలు, తీర చిత్తడి నేలలు, బురద ప్రాంతాలు, ఉప్పు కయ్యలకు దూరంగా ఉండే అటు పోటు ప్రాంతాలు అనువుగా ఉంటాయి. ఇవి కాక కొన్ని ఋతువుల్లో తీర ప్రాంతాలలోని వరి వ్యవసాయ భూములు, ఉప్పు తయారీ నేలలు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఒకానొక ఉప్పు కయ్య, సరస్సు ప్రాంతము అనువైనదా కాదా అని నిర్ణయించడంలో ఈ క్రింది విషయాలు, సమాచారము ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. అవి: (1) నీటి సరఫరాకు తగిన సౌకర్యం ఉండాలి (2) భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితులు అనువుగా ఉండాలి (3) అటుపోటు సందర్భంగా ఆ ప్రాంతంలో వైశాల్యము తగిన రీతిలో ఉండాలి. (4) అటు పోటు వలన వచ్చే నీరు తగినంత కాలం తన ప్రభావము చూపాలి (5) నీటినేలల లక్షణాలు (6) అక్కడి వృక్ష లక్షణాలు, సంపద (7) దగ్గరగా అవసరమైన నిలువ చేపల, రొయ్యల సదుపాయం ఉందా లేదా (8) నీరు బయటకు

తీసి వేయగలడం, (9) కాలుష్య రహిత వాతావరణం (10) రోడ్డు సదుపాయాలు, కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు (11) సామాజిక న్యాయ సంబంధ విషయాలు.

నిజానికి ఈ సరస్సులోనికి సంవత్సరం పొడవునా ఉప్పుకయ్యల నీరు లభ్యం అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఈ సరస్సులలో బంధించబడ్డ నీరు బయటకు పోవడానికి, క్రొత్తది రావడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. గాలికి ఇగిరిపోయిన, నేలలో ఇంకి పోయిన నీటి వత్తుం కూడా ఈ విధంగా భర్తీ అవుతుంది. సాధ్యమైనంత వరకు సహజ సిద్ధమైన స్వల్ప కాలువల నుంచి నదీమేఖ ద్వారాల కాలువల ద్వారాకాని, ఉప్పుకయ్యల నీటి కాలువల ద్వారా కాని, అఖాతంనుంచి కాని ఉండాలి. పంప్ చేయడం ద్వారాగాని నీటిని చేర్చవచ్చు. విద్యుత్ సదుపాయంతోకాని, డీజల్ పంపులతో కాని ఈ పనిని నిర్వహించవచ్చును. గాలి యంత్రాల సదుపాయం కూడా పొందవచ్చును.

ఖర్చు సందర్భంగా చెప్పకోవాలంటే ఆదర్శవంతమైన ప్రాంత లక్షణాలు కోన్ని ఉంటాయి. ఒకటి ఏమిటంటే దానిలోకి నీరు వక్షానికి 7,8 రోజులు ఒక మీటరు నీటి మట్టం భూమ్యాకర్షణ శక్తి వలన పొందగలడం.

స్థలాన్ని ఎన్నుకోవడంలో మట్టి లక్షణం, దాని నాణ్యత (Texture) గుణాలు ముఖ్య కారణాలు ఇసుక-మట్టి నేల కలసిన నేల అయితే రొయ్యల పెంపకానికి అనువుగా ఉంటుంది. క్లే- లోమ్ కూడా ఫరవాలేదు. 70 శాతం మించిన ఇసుక ఉన్న నేలైతే ఉప్పు కయ్యల నీటి వ్యవసాయానికి ఉపయోగంగా ఉండవు. గట్లకు స్థిరత్వం ఉండదు.

ఆప్రాంతం కాంటూరు (Contour) సర్వే జరుప వలసిన అవసరం ఉంది. అక్కడ భూ ప్రాంతాల ఆకారంపైజాను తగిన విధంగా నీటి ఆధారాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. ప్లానింగ్, డిజైన్, నిర్మాణ సందర్భంగా తీర ప్రాంతాలలోని జలక్షేత్రము ఆక్షేత్ర పద్ధతి వ్యవసాయక వ్యవస్థల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఈ క్షేత్రం ఆటుపోటు వలన నిండుతోందా, పంపు చేయడం వలన నిండుతోందా అనే విషయం, ఈ క్షేత్రాన్ని రొయ్యల పెంపకానికి వినియోగిస్తున్నారా అనే విషయాలు గమనించాలి.

ఉప్పు కయ్యల నీటి క్షేత్రంలో రకరకాల చెరువులు, భిన్న ఉపయోగాల కోసం ఉంటాయి. నిలువ కుంట లేదా నిలువ సరస్సు క్షేత్రంలోని ఉత్పత్తి కేంద్రము కాంటూర్ సర్వే, క్షేత్ర డిజైన్ ల వలన సరస్సు లోతు తెలుసుకోగలుగతారు. సరస్సులోకి కావలసిన ఆహార జంతువులు సమతూకంలో అభివృద్ధి చెందడానికి 1 మీటరు లోతు నీటి కొలత ఉన్న, లోతు తక్కువ చెరువులు ఉండాలి అంటారు. దీర్ఘచతురస్రాకార ఆకారం ఉండే చెరువుల్లో వలలు వేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కనీసం 0.5 హెక్టారు నీటి వైశాల్యం ఉన్న నిలువ సరస్సులు అధిక దృష్ట్యా చాలా వీలుగా ఉంటాయి. సర్పరీ సరస్సులు విత్తనాలు పెంపకానికి, ఉత్పత్తికి వీలుగా ఉంటాయి. వీటి నీటి వైశాల్యం 0.05 నుంచి 0.1 హెక్టారు వరకూ ఉంటే నిర్వహణ దృష్ట్యా సదుపాయకరమైనవి. ఉప్పుకయ్యల ప్రాంతాలలో చెరువులకు గోతులు త్రవ్వేటప్పుడు సారవంతమైన పై పొరలోని మట్టిని వేరుగా ఉంచి చెరువులో తయారైన సమయంలో దీనిని తిరిగి అడుగున పరవాలి.

ఉప్పుకయ్యల చేపల క్షేత్రంలో చెరువులతోపాటు నాలుగు ముఖ్య భాగాలు కలిగిఉంటాయి. అవి: (1) చుట్టు అంచువెంబడి ఒక డైక్ నిర్మాణం. దీనివలన బలమైన ఆటు పోటుల నుంచి క్షేత్రానికి రక్షణ కలుగుతుంది. (2) క్షేత్రం లోపలి ద్వితీయ డైక్ నిర్మాణం. ఇది చెరువులను ద్వితీయ స్లాయిస్ నుంచి వేరు చేస్తుంది. ఈ స్లాయిస్ లు నీటిని లోపలికి పైకి పోనిస్తాయి. (3) మాస్టర్ స్లాయిస్ నిర్మాణం. ఇది మొత్తం క్షేత్రానికి సంబంధించి నీరు లోపలికి ప్రవహించేటరును అడుపులో ఉంచుతుంది. (4) ఫీడర్ కాలువ, మాస్టర్ స్లాయిస్ నుంచి ప్రవహిస్తుంది. ఇది చెరువులకు నీటిని సరఫరా చేస్తుంది. పైగా రిజర్వాయర్ గా పనిచేస్తుంది. ద్వితీయ ఫీడర్ ఛానల్ ఇక్కడ నుంచి శాఖలు వేసికొని పోతుంది. ఇవి క్షేత్రం డిజైను మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.

చెరువులో పెంచే జాతులను బట్టి ఆయా జీవావరణస్థాయిని పెంచడంతో నిలువ కుంట శాస్త్రీయ పాలన ప్రారంభము అవుతుంది. ఉప్పుటేళ్ళ నీటికి సంబంధించి నెలెనిటి స్థాయిలో వచ్చే పొచ్చు తగ్గుల మార్పులు వీటి ముఖ్యలక్షణం అనవచ్చు. ఇక ఈ నెలెనిటి చెరువుల్లోని ఇతర భౌతిక జీవలక్షణాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇలా సంభవించే మార్పులను అదుపులో ఉంచగలడమే ఉప్పుటేళ్ళ, నీటి క్షేత్రం చెరువుల పాలనలోని ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం. ఇందువలన నిలువ ఉన్న రొయ్యలు, చేపలకు లాభం కలిగి అవి మనగలగడమూ, అధిక ప్రమాణంలో పెరగడమూ సంభవిస్తుంది. ఉప్పుకయ్యల నీటి క్షేత్రంలోని చెరువుల పాలన ఈ క్రింది విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. (1) పెంచడానికి తగిన స్టాక్ ను అందుకోవడానికి ఎటుగా చెరువును సిద్ధం చెయ్యడం. (2) తగిన పరిసర ఇళ్ళణాలు ఏర్పరచడానికి వీలుగా నీటి నరఫరా పాలన సరిచూడడం (3) అదనపు ఆహారం సమకూర్చడం ద్వారా పెరుగుతున్న "స్టాక్" విషయంలో శ్రాగ్రతపడడం. (4) సరియైన కాలంలో వంట నుంచి నత్తలితాలు వచ్చే రీతిలో దిగుబడి రాబట్టుకోడం.

స్టాకింగ్ లేదా నిలువ చేసుకోవడానికిముందు చెరువు తయారుచేసుకోవడం ఒక ముఖ్య మట్టం. చెరువులో జవ్వనైలను స్టాక్ చేయుటకు ముందు, చెరువు అడుగునించి అధికంగా ఉన్న స్ట్రీల్ మట్టిని, జీవక్రియా విస్తర్తకాలను తీసివేయాలి. చీడను,వేటూడి తినే జంతువులు ఉంటే నిర్మూలించాలి. అంతకు పూర్వం ఉన్న సంవర్షనానికి సంబంధించి విస్తర్తన పదార్థాలతోటి నిండి ఉన్న నీటిని పూర్తిగా తీసివేయాలి. దీనిలో సరియైన పోషకపదార్థాలు ఉండవు కూడా. చెరువు అడుగున సూర్యరశ్మికి గురిచేసి పూర్తిగా ఎండిపోయేటట్లు చేయాలి. దీనివలన ఇళ్ళక మత్స్యాలు, అవసరం కాని రొయ్యలను నిర్మూలించినట్లు అవుతుంది. చెరువు అడుగున సూర్యరశ్మికి గురిచేసినందువలన విషవాయువు లన్నింటిని నిర్మూలించినట్లు అవుతుంది. ఇవన్నీ ఆనేలలో చేరియుంటాయి. కుళ్ళిపోతున్న జీవపదార్థాలు అక్కడ చేరిన డెట్రైటస్ ఖనిజాలుగా మారిపోతాయి. ఆటు పోటు వలన డైక్ లను కడగటం వలన సిల్ట్ (Silt) బాగా చేరి చెరువులోతు తగ్గిపోతుంది. అలాగ అధికంగా సిల్ట్ చేరినట్లు తోస్తే ఎండిన తరువాత దానిని తీసివేయాలి.

ఈలో చేపలు, పీతలు, మలస్కజీవుల పంటివి బొరియజీవులు. మహావాపిట్టు (ఇప్పనూనె, తెలకపిండి), పొగాకు డస్ట్ మొదలైన జీవ సంబంధ విషపదార్థాలను ఉపయోగించి వాటిని నిర్మూలించవచ్చును. ప్యాక్టరుకి 100 నుండి 150 Kgl వరకు ఈ పదార్థాలను వాడాలి. బొరియ జంతువుల సంహారానికి ఈ విష పదార్థాన్ని ఎండిన చెరువు అడుగున ఒకే విధంగా మొత్తం జల్లాలి. ఆ తరువాత నీరు నెమ్మదిగా ప్రవేశపెట్టి 6-7 సెం.మీటర్లలోతు ఉండేటట్లు వదలాలి. విషపదార్థం కలిగి నందుల్లోకి, రంధ్రాలలోకి ప్రవేశించి ఈ పనికిరాని జంతువుల్ని నశింపజేస్తాయి. మూడు రోజులు తరువాత నీటిని పూర్తిగా తీసివేసి, చెరువు అడుగుని ఆటుపోటు జలంతో కడిగివేయాలి. దీనితో విషగుణం పోయి ఎరువుల ఉపయోగానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. నీరు బయటకు, లోనకు ప్రవహించే ద్వారాలను సన్నని వెదురు అల్లికతో కాని, నాలాన్ గుడ్డతో కాని మూసివేయాలి. దీనివలన ప్రమాదకరమైన జంతువులు లోనకు ప్రవేశించటానికి, లోన ఉన్న రొయ్యలు, చేపలు బయటకు పోవడానికి వీలుకాదు. ప్యాక్టరుకు 100 నుండి 200 kg ల వరకు సున్నం ఉపయోగించడం వలన మట్టి నీటి ఇళ్ళణం చాలా మెరుగుఅవుతుంది.

చెరువులో సహజ సిద్ధ అభివృద్ధికి, రొయ్యల చేపల ఆహార జీవుల పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి ఎరువులను ఉపయోగించాలి. చాలా వరకు ఉప్పుటేళ్ళ నీటిలో పెరిగే రొయ్యలు, చేపలు అడుగున ఉండే జీవుల మీద ఆధారపడి ఇష్టపడి ఉంటాయి. అందువల్ల నేల సారవంతం చేయడం ఉప్పుటేళ్ళ చెరువుల సందర్భంగా చాలా ఫలితాలను ఇస్తుంది. పోషక పదార్థాలు, లవణాలు జీవసంబంధ కార్బన్ తగినంతగా ఉన్నాయో లేదో లోపం ఉందేమో తెలుసుకోవడానికి పరీక్షలు జరుపవచ్చు. జీవసంబంధ రసాయనిక ఎరువులు కలిపి వాడడం చాలా ఉపయోగం అంటారు. చెరువు మట్టిలో జీవసంబంధ పదార్థం ఎంత ఉంటుందో చూసి దానిమీద ఆధారపడి జీవసంబంధ ఎరువు ప్రమాణాన్ని నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా ప్యాక్టరుకు ఇది 1000 నుండి 3000 కే.జీల వరకు ఉంటుంది.

కోళ్ల రెట్టులు, పశువుల పేడ మొదలైన జీవసంబంధమైన ఎరువులు హెక్టారుకు 100 కే.జీలు ఆధార ప్రమాణంగా తీసికొని, యూరియా, సూపర్ ఫాస్ఫేటు హెక్టారుకు 20 కే.జీలు కలపాలి. నెలకి ఒకసారి ఇది ప్రయోగిస్తే నెలనిటి 5-20 ppt ఉన్న షక్షంలో దట్టంగా ఆల్గల్ మొక్కలు అడుగున మొలుస్తాయి. నెలనిటి ఎక్కువైన కొద్దీ ఎరువుల ప్రమాణం పెంచించాలి. ఎరువులు వేసిన తరువాత చెరువులోకి నీటిని తీసికోవాలి. 20 సెం.మీ. ఎత్తుకి రానిచ్చి 5,6 రోజులు ఉంచాలి. తరువాత చెరువు పూర్తిగా నింపివేయాలి. నీటి అడుగున నివసించే జంతువులు, ఆల్గల్ బీళ్లు, ప్లవకజీవులు పెరుగుదల చక్కని స్థాయిలో ఉంచడానికి చెరువులో నీటి మట్టాన్ని 1.0 నుండి 1.2 మీటర్ల వరకూ ఉంచి తగిన ప్రమాణంలో ఎరువులు చేర్చాలి.

ఇక ఉప్పుటేళ్ళు నీటిలో సహజసిద్ధంగా ఉండే సారవంత భక్షణాన్ని పూర్తిస్థాయి వరకూ ఉపయోగించుకోవాలి. దీనికోసం తరుచుగా చెరువులో నీటిని అటుపోటు నీటితో మార్చుకోవాలి. తాజాగా వచ్చిన ఈ నీరు పోషక పదార్థాల పునరుద్ధరణకేకాక క్రొత్తచేప ఆహార జంతువులను కూడా తీసికొని వస్తుంది. ఒకవేళ ఎరువులను చెరువులో ఉపయోగించి ఉండే కనీసం 8-10 రోజులపాటు అగిన తరువాతనే నీటి మార్పుకు పూనుకోవాలి. లేని షక్షంలో కొంత వరకు మనం చేర్చిన పోషక పదార్థాలు బయటకు పోయే నీటి ద్వారా నష్టమైపోతాయి. నెలెనిటి మారుతూ ఉండే ఎరువుల ప్రభావం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. తక్కువ నెలెనిటి కాలంలో ఎరువుల అధిక ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి. అధిక నెలెనిటి ఉన్న షక్షంలో పాస్టర్స్ అందుబాటులో లేని విధంగా నేలలో ఉండి పోతుంది. నీటిస్థాయికి తగిన ప్రమాణంలో చేరుకోదు.

నీటి గుణాత్మక భక్షణం వలన పెంపకంలోనున్న రొయ్యలు, చేపలు యొక్క పెరుగుదల, ఆరోగ్యం, మనుగడ ఆధారపడిఉంటుంది. మంచి భక్షణంగల నీటిలోకి అత్యధిక సంఖ్యలోనున్న చేపల నుంచి విడుదల కాబడ్డ విసర్జక పదార్థాలతో నిండిపోనివ్వరాదు. కాలుష్యభక్షణాలు చేరనివ్వరాదు. నీటిలో ముడ్డిచేరి సిల్ట్తో ఉంటే ఉప్పుటేళ్ళు నీటి చేపల పెంపకానికి అనువుగా ఉండదు. యూరియాపైలెన్ చేపలను పెంచుతున్నప్పటికీ ఉష్ణోగ్రత, pH, నెలెనిటి, కరిగిన ఆక్సిజన్ విలువలు అకస్మాత్తుగా మారిపోతూ ఉంటే వాటి శరీర ధర్మ సర్దుబాట్లకు అవరోధం ఏర్పడుతుంది. నీటి గుణాత్మక భక్షణ కారకాలు అననుకూలంగా ఉన్న షక్షంలో వాటికి వత్తిడి ఏర్పడుతుంది. సీరోధకశక్తి తగ్గిపోతుంది. పెంపకానికి అలవాటుపడ్డ వీటికి రోగాలు వచ్చి చీడల బారిపడతాయి.

నీటి గుణాత్మక భక్షణాన్ని కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్తలు తీసికోవాలి. ఉప్పుకయ్యల నీటి క్షేత్రాలలో భౌతిక, రసాయనిక కారకాలు అననుకూలంగా మారకుండా ఆ చెడు భక్షణాలని అరికట్టడానికి నీటి మార్పు నిత్యం నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. సామాన్య పరిస్థితులలో అయితే క్షేత్ర సరస్సుల నుంచి వసంత కాలాల్లో అటుపోటు వచ్చినప్పుడు 3-4 రోజులపాటు షక్షాని కొకసారి నీటి మార్పు చేస్తారు. ఈ మార్పిడి సమయంలోని ప్రవాహం నీటిలో నుంటే విసర్జక పదార్థాలను తీసివేసి ముఖ్య భౌతిక, రసాయనిక, జీవసంబంధ భక్షణాలను నిలుపుతుంది. యాంత్రిక పద్ధతుల్లో నీటిలోకి గాలి సరఫరా అధికం చేయడం మరొక పద్ధతి. అప్పుడప్పుడు నీటి గుణాత్మక పరిశీలించడానికి చర్యలు తీసికోవాలి. ఈ విధంగా నెలెనిటి 5-20ppt గాను, కరిగిన ఆక్సిజన్ 4 ppm పై ఉండే విధంగాను pH 8 ప్రాంతంలోను ఉండే విధంగాను చూచుకోవాలి.

ఈ విధంగా చెరువు అడుగు భాగం సిద్ధమై తగినంత నీరు లోనకు ప్రవేశపెట్టాక, చేప ఆహారం సహజ సిద్ధంగా ఎదిగిన తరువాత, రొయ్యలు, చేపలు లోపల ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధం అవుతుంది. మంచి మంచి జాతుల రొయ్యలను, చేపలను మాత్రమే నిలువ చేసికోవాలి.

ఉప్పుకయ్యల నీటి వ్యవసాయం ఏకసంవర్తన పద్ధతిలో కాని, బహుళ సంవర్తన పద్ధతిలో కాని నిర్వహించవచ్చును. ఒకే ఒక జాతిని పెంచినప్పుడు అది ఏకసంవర్తన పద్ధతి అనిపించుకొంటుంది. అందువలన చేపకాని, రొయ్యకాని ఒకే జాతిని ఎన్నుకొని చెరువులో మార్కెట్ నెజుకు చేరేవరకూ పెంచుతారు. ఒక ప్రత్యేక తరహా భక్షణాలకు తగిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వాటిని సద్వినియోగపరచుకోడానికి ఈ పద్ధతి అనుసరిస్తారు.

ఏకసంవర్తన పద్ధతి భిన్న తరహాలో నిర్వహిస్తారు. (1) ఒకేసారి నిలువ చేయటం, ఒకేసారి పంట దిగుబడి చేసికోవటం. (2) ఒకసారి నిలువచేసి, తిరిగి తిరిగి పంట దిగుబడి చేయడం. (3) తిరిగి తిరిగి నిలువ చేసుకుంటూ, అనేకసార్లు పంట దిగుబడి చేసికోవడం. మొదటి పద్ధతిలో బాగా ఎదిగిన జువెనైల్ దళను ప్రవేశపెడతారు. ఒకే జాతికి చెంది ఉంటాయి. వీటిని పెంచి తగిన ప్రమాణం చేరుకొన్నాక పంట రాబట్టుకొంటారు. వెనియన్ మోనోడాన్ అనే పులి రొయ్య పద్ధతిలో ఫిబ్రవరి నుండి జూన్, వరకు కాని, జూన్ నుంచి అక్టోబరు వరకుకాని పెంచుతారు. చెరువులో 40-60 మి.మీ.ల పొడవులోని పె. మోనోడాన్ జువెనైల్లను చేరుస్తారు. సుమారుగా హెక్టారుకు 15 నుంచి 30 వేల వరకు వీటి సంఖ్య ఉంటుంది. పెరుగుదల రెండు మూడు నెలలు కానిచ్చాక 25 గ్రాములను మించిన రొయ్యలను దిగుబడి చేయవచ్చు.

ఇక ఒకేసారి నిలువ చేసికొని, అనేక సార్లు పంట దిగుబడి చేసికొనే పద్ధతిలో చిరుచేపలను బాగా ఎదిగిన జువెనైల్లను ఎన్నుకొంటారు. ఇందులో చాలా ప్రమాణ సమూహాలు ఉంటాయి. మొదట బాగా ఎదిగిన వాటిని దిగుబడి చేసికొని, చిన్నవాటిని క్రమంగా పెరుగనిచ్చి ఆయా నిర్ణీత ప్రమాణాలకు చేరుకోగానే ఆయా విరామకాలాలలో వాటిని సేకరిస్తారు. మూడవ పద్ధతిలో ఒకే నైజాలోగాని, భిన్న నైజాలోగాని, అధిక సంఖ్యలలో ప్రవేశపెడతారు. కొంతకాలం నియమిత విరామంలో ఇలావి అభివృద్ధి చెందాకపాక్షికంగా వాటిని సేకరిస్తారు. తరువాత చిన్న నైజా జువెనైల్లను తిరిగి ప్రవేశపెడతారు. ఈ పద్ధతి తిరిగి తిరిగి కొనసాగుతుంది. చక్కగా వ్యవహారం చూచుకుంటే, “స్టాక్” సరియైన రీతిలో సర్దుబాటు చేసికోగలిగితే ఏకసంవర్తన పద్ధతులలో ఈ మూడవదే చాలా సమర్థవంతమైనదని తెలిసింది.

ఒకే చెరువులో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జాతులను ప్రవేశపెట్టడం ఉప్పులేరు వీటి జలజంతు సంవర్తన అధిక అభివృద్ధి సాధించడానికి మరొకపద్ధతి. దీనిని బహుళ సంవర్తన విధానం అంటారు. అయితే ఇలాంటి జాతులు ఒక దానికొకటి సర్దుకొని పోయేవిగా ఉండాలి. ఒకే ఆహారపు అలవాట్లు కలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి జాతులు ఈ దిగువ టబులు కలిగి ఉంటేనే ఈ పద్ధతికి అనువుగా ఉంటాయి.

(1) ఇతర చేపలను రొయ్యలను తినే అలవాటు ఉండకూడదు. (2) నెలెనిటి ఉష్ణోగ్రతలో అడపా తడపా వచ్చే మార్పులకు తట్టుకోగల్గాలి. (3) తొందరగా పెరగాలి. (4) సహజ సిద్ధమైన అదనపు ఆహారాన్ని స్వీకరించ గల్గాలి. (5) మార్కెట్ లో అంగీకారం పొందగల్గాలి. ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకొంటే ఈ క్రింది జాతుల రొయ్యల చేపల జాతులు అనువుగా ఉంటాయని తెలిసింది.

వీనియన్ మోనోడాన్, పీ. ఇండికన్, చానోన్ చానాన్, మజిల్ నెఫాలన్, లిజాటాడె, లిజా వేర్నియా, ఇవికాక వివిధ పీనియడ్, మెటా పీనియడ్ రొయ్యలను కూడా బహుళ సంవర్తన పద్ధతిలో నిలువచేస్తారు. అయితే వాటి “విత్తనాలు” లభ్యంకావాలి.

బహుళ సంవర్తన పద్ధతిలో రొయ్యలు, చేపలు తగిన నిష్పత్తిలో కలయికలో నిలువచేస్తారు.

పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి అదనపు ఆహారం రొయ్యలకు, చేపలకు అందించాలి.

అదనపు ఆహారంగా సాధారణంగా వ్యవసాయ, లేదా జంతు సంబంధ సహజ ఉత్పత్తులగా ఉంటాయి. వరి తవుడు, గోధుమ పిండి, మొక్కజొన్న పిండి, నూనెపిట్టు, చేపతిండి, మలస్కాడిపుల మాంసమైమా, గమేలాలలోని, వృధా పదార్థాలు దీనికి వాడతారు. 18-20 శాతం వరకు ప్రోటీనులు కనీసం అవసరాలుగా గుర్తించారు. రొయ్యల వ్యవసాయంలో 40-60% వరకు బాగా ఉపయోగించు కోగలుతాయని వివిధ పరిశోధనలు నిరూపించాయి. తాజా, ఎండిన ఆహార మిశ్రమాలు, జంతు ప్రోటీన్లు, పుక్ష ప్రోటీన్ల మిశ్రమాలు మరింత మంచి ఫలితాలనిస్తున్నట్లు గమనించారు. సాధారణంగా వీటిని గుండ రూపంలో పెడతారు. వీటిని నీళ్ళలో కలిపి ముద్దగా (పేస్టు)చేసి ఆహార పళ్ళెలలో పుంచి చెరువులో పెడతారు. పెల్లెట్ లేదా గుళికల రూపంలో ఉంచి, రొయ్యలను, చేపలకు ఆహారం ఇవ్వడం ప్రస్తుతం జరుగుతోంది. ఈ పద్ధతిలో ఆహార అవసరాలను తగు పాళ్ళలో గుర్తుంచుకొని, కలిపి గుళికలు

రూపంలోకి మారుస్తారు. దీనివలన కాలుష్యం తక్కువగా ఉంటుంది. కరిగిపోయి వృధా పోకుండా ఆహారం కొంతవరకు ఆదా అవుతుంది.

రొయ్యలకు, చేపలకు ప్రతి రోజు ఆహారం ఇవ్వాలి. నిలువ జనాభా మొత్తం బరువులో 1-5 శాతం చొప్పున అదనపు ఆహారం ఇవ్వాలి. ఆహారం చాలా ఖర్చుతో కూడుకొన్న వ్యవహారము. అందువలన సహజ సిద్ధంగా ఎరువుల సహాయంతో లభ్యమయే సహజ ఆహార సదుపాయాన్ని సంపూర్ణక పద్ధతిలోనే అదనంగా, ఈ అదనపు ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. అందువలన సహజ సిద్ధంగా ఎంత ఆహారం ఉత్పత్తి అవుతోంది. దాని లక్షణాలు ఏమిటి? అనే విషయాల మీద ఇవ్వబోయే అదనపు ఆహార పరిమాణం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆహార విధానం, సంవర్ధన వ్యవస్థల విషయం కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.

షింప్ సంవర్ధన సందర్భంగా ఎదురయ్యే ముఖ్య సమస్య వాటిని సేకరించుకోవటం. చెరువులోని నీరు పూర్తిగా తీసి వేస్తేగాని రొయ్యలను, చేపలను సేకరించటం సాధ్యంకాదు. వలల సహాయంతో వీటిని ఎన్నిసార్లు పట్టినా 80-90 వరకు చెరువు అడుగున ఉండి పోతాయి. నీరు తీసి వేయడానికి భూమ్యాకర్షణ పద్ధతిలో స్లాయిన్ డ్రాఫ్టా ఆటుపోటు తగ్గుస్తాయిలోనున్న సమయంలో అనువుగా ఉంటుంది. అయినా ఒకస్తాయి దగ్గర నీటిని పంపు పద్ధతిలో తీయవలసి వస్తుంది.

ఉప్పుటెళ్ళ నీటి క్షేత్రంలోని ఫీడరు చానల్ లో చేపల పెంపకం జరుగదు. ఈ నీటి వనరులో లాటన్ కార్కారి ఫెర్ వంటి మాంసాహారీ చేపల్ని పెంచవచ్చు. ఆటుపోటు కాలంలో సముద్ర నీటితో పాటు చేపల్ని, రొయ్యల్ని రానిచ్చి దీనికి ఆహారంగా ఉపయోగ పడేటట్లు చేస్తే చాలు. లాటన్ ఉత్పత్తి హెక్టారుకు సంవత్సరానికి 2760 కే.జీలు పేరుగుతుంది.

14.7 సముద్ర జంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు (మారికల్చర్)

సముద్రజలాలలో సముద్రజీవులను ఒక నిర్దిత కార్యక్రమం ప్రకారం సంవర్ధనం జరిపే కార్యక్రమాన్ని సముద్ర జంతు సంవర్ధనం అంటారు.

సముద్ర జల వ్యవసాయం సాధారణంగా సముద్రతీరం వెంబడిగానీ, దాని ఇన్ లెట్సు లేదా అఖాతాలలో కాని సాధ్యం అవుతుంది.


ఉష్ణప్రాంత జలాలలో మస్సెల్లు, అయిస్సరులు, క్లామ్లు, క్లాకల్లు అనే ద్వీకవాటజీవులు విరివిగా కనబడతాయి. సామీప్యంగా ఇవి మానోగ్రోవ్ ప్రాంతాలలో కనబడతాయి. లేదా తీర ప్రాంతం వెంబడి ఉంటాయి. డింభకాలు లేదా శైశవదశలో ఇవి కొంతకాలం సంచరిస్తాయి. కాని ఆ తరువాత రాళ్ళు రప్పలు మొదలైన వాటికి స్థిరంగా అతుక్కొనిపోతాయి. మన దేశంలో సహజంగా లభ్యమయ్యే మలస్కజీవులను సేకరించి చవక రకం ఆహారంగా ఉపయోగించుకోటం సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తోంది. ద్వీకవాట జీవుల్ని సంవర్ధనంచేసి వాటినుంచి అధిక సంఖ్యలో పంటలను దిగుబడి చేసుకోవచ్చని తెలిసింది. ఇది సాంకేతికంగానే కాక ఆర్థిక దృష్ట్యా లాభసాటి విషయం. ఒక సంవత్సరంలోనే పంటరాబడి వస్తుంది.

ఫిన్ ఫిషెర్స్ క్రస్టేషియన్ లతో పోలిస్తే, మసిల్ సంవర్ధన క్రియలో ఇతర ఏ జీవికన్నా అత్యధిక ఉత్పాదన సాధ్యమవుతుందని తెలిసింది. అంతేకాదు కొన్ని ద్వీకవాట మలస్క జీవులు చాలా ఖరీదైనవి. ధనవంతులు మాత్రమే ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారని యూరప్, ఉత్తర అమెరికాల అలవాట్లను బట్టి తెలుస్తుంది. అందువల్ల మలస్క సంవర్ధనంలో కుతూహలం అధికం అవుతోంది.

14.8 మసల్ సంవర్ధనం

మసల్ సంవర్ధన చర్యలు కాలిఫోర్నియా ఆరుబయలు సముద్రంలోని లిజింజం అఖాతంలోను, గోవాలోని దోవాపాలా అఖాతంలోను, రత్నగిరి తీరంలోను, మద్రాసుకు దగ్గర తీరంలోను జరుగుతోంది.

స్పానింగ్ (గుడ్డు పెట్టు కార్యక్రమం) డింభక పెంపకమునకు సంబంధించి ప్రయోగాత్మక పర్యలు ప్రయత్నించారు. కాని హాచరీ టెక్నాలజీ సందర్భంగా మసల్ విత్తనాల ఉత్పత్తి అభివృద్ధి చెందలేదు. మే నుండి నెప్టెంబరు వరకు స్పానింగ్ జరుగుతుంది. అక్టోబరు, డిశంబరు మధ్య మసల్ విత్తనాలను సేకరిస్తారు. పశ్చిమ తరం వెంబడి వాటి సహజ ప్రాంతాలనుండి సేకరిస్తారు. గుడ్ల సమూహాన్ని పెంకుల మీద సేకరిస్తారు. ఈ పెంకులు రాష్ట్రాలనుంచి వ్రేలాడదీస్తారు. విత్తనాలు సహితం తాళ్లమీద సేకరిస్తారు. ఇవి వైలాన్ కాని, కొబ్బరి తాళ్లుగా కాని ఉంటాయి.



పటం 14.1. మసల్ సంవర్ధనం. a వెర్నా విరిడిస్ (హరిత మసల్) పార్శ్వ దృశ్యం. b వెర్నా ఇండికా పార్శ్వ దృశ్యం. c మసల్ రాష్ట్ర సంవర్ధనం. 1. వెదురు బొంగులతో నిర్మితమైన రాష్ట్ర 2. లోహంతో నిర్మించబడిన తెప్పలాంటి నిర్మితాలు 3. లంగరుతాడు 4. కొత్త విత్తనాలుంచబడిన తాడు 5. 7 నుంచి 10 రోజుల తరువాత మసల్ విత్తనాలతో మన్న తాడు 6. మునుగుటకు తోడ్పడు నిర్మాణము.

సెంట్రల్ మెరైన్ పిషరీస్ రిసర్చ్ ఈ విధంగా తేలియూడే రేష్టల సంవర్ధన పద్ధతులను రూపొందించింది. హరిత మసల్ వె. విరిడిస్ విత్తనాలు (20-30 మి.మీ) తాళ్ల మీదికి మారుస్తారు. మీటరుకు 500- 700 గ్రాంలు వడతాయి. పసివయసులోని జువెనైల్ దశలను 25 సెం.మీ. వెడల్పుగల అల్లిక నూలు గుడ్లతో (పోకుండా) ధక్కిస్తారు. ఇలా విత్తనాలున్న తాడు 5-8 మీటర్ల పొడవుఉంటాయి. రాష్ట్రనుంచి ఈ తాళ్లను వ్రేలాడదీస్తారు. ఒక త్రాడుకు మరొక త్రాడుకు మధ్య దూరం 0.5 నుంచి 1 మీటరు ఉంటుంది. దిగువ అంత్యభాగం అడుగునుంచి 2 మీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. 2-3 రోజులలో మసల్ లో తాడుకు అతుక్కుపోతాయి. 10 రోజులలో వైన గుడ్ల పీకి పోతుంది. గోధుమ వర్ణమసల్ వె. ఇండికా విత్తనాలు 25-29 మి.మీ పరిమాణం మొదట్లో తాళ్లకు అతికించినపుడు ఉంటాయి. మిగతా పద్ధతి అంతా మామూలుగానే ఉంటుంది.

14.9 అయిస్టర్ సంవర్ధన

మన దేశంలో అనేక జాతుల అయిస్టరులు ఉన్నాయి. వాటిలో క్రాస్టోస్ట్రీయా మద్రావెన్సిస్, క్రా. గ్రెహాయిడిస్, క్రా. డిస్కాయిడియా, అనే జాతులను మన వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి నదీముఖద్వారాలు, ఉప్పుటెళ్ళు పిల్ల కాలువలలో ఉంటాయి. తూర్పుతీరం, కేరళతీరం, క్రా. మద్రాసెన్సిస్ ప్రబలంగా ఉంటుంది. క్రా. డిస్కాయిడియా, గుజరాతు తీరం వెంబడి ఉంటుంది. క్రా.గ్రెహాయిడిస్, మహారాష్ట్ర తీరం వెంబడి కనబడుతుంది. క్రా. డిస్కాయిడియా, క్రా. మద్రాసెన్సిస్,

కర్నాటక తీరం వెంబడి ఉన్నాయి. తూర్పుతీరంలో అయిస్టర్ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు మద్రాసు దగ్గర ఎన్నూరులోను, ఒరిస్సాలో సోనాపూర్ ఉప్పుటెళ్ళలోను ఉన్నాయి. అయితే ఈ కేంద్రాలు పశ్చిమతీరంలో చాలా ఉన్నాయి.

అయిస్టర్ సంవర్ధన చర్యలు ఆటుపోటు మట్టాల మధ్య, అఖాతాలు, సదీముఖ ద్వారాలలోను సాధ్యం అవుతుంది.

టుటికారిన్ లో ర్యాంక్ అండ్ ట్రే సంవర్ధన పద్ధతిని అవలంబించి అయిస్టర్లను సంవర్ధనం చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క ర్యాంక్ లోను (13.2x2మీ) కొన్ని వరుసలో టేసకుండ్లంబాలునాటాయి. ఈ ర్యాంక్ ఒక ఫ్లాట్ ఫారమ్ మాదిరిగా పనిచేసే అయిస్టరు బోనులు నేలాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వీటిలో నర్సరీ దశలుంటాయి. ఇక ఎదుగుదల దశల్లోని అయిస్టరులకు వాటి ట్రేలకు ఆధారంగా ఈ ఫ్లాట్ ఫారమ్లు ఉంటాయి. అయిస్టరు బోను 40x10x10 సెం.మీ. ఉండి మూత కలిగి ఉంటుంది. ఇది మామూలు బోను పద్ధతిలోనే నిర్మించబడుతుంది. కాని అల్లికలో 22మీ.మీ. దూరం ఉంటుంది.

క్రా.మద్రాసెన్సిన్ కు ఏప్రిల్-మే, ఆగస్టు, సెప్టెంబరులకు మధ్య రెండు గుడ్లు పెట్టే కాలాలు ఉంటాయి. గుడ్ల సముదాయాన్ని అర్ధ స్థూపాకారంలో ఉన్న ఇంటి కప్పు వెంకులమీద సేకరిస్తారు. టుటికారిన్ లో ఇది సహజపద్ధతి. సున్నం పూసిన వెంకులు చాలా ఉపయోకరంగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది. గుడ్ల సేకరణ ప్రశస్తంగా ఉంటుంది.

సేకరణ పరికరాల మీద అయిస్టరు గుడ్లను 2 నెలలపాటు ఎదగనిస్తారు. 36 మీ.మీ. పరిమాణానికి ఎదుగుతాయి. తరువాత ఇక ఇసుక వస్తువుని తీసికొని వెంకుల నించి వీటిని గీరివేస్తారు. ఒక్కొక్క బోనులోను ఎదగడానికి వీలుగా 150-200 అయిస్టర్ పిల్లల్ని ఉంచుతారు. 3 నెలలలో ఇవి 50 మీ.మీ. సైజు చేరుకుంటాయి. తరువాత వీటిని ర్యాంక్ లలోని కొయ్యలు వాటి నుండి నేలాడుతున్న ట్రేలోకి మారుస్తారు. ఇక ఇవి పెరగడానికి మంచి అవకాశం వస్తుంది. ఒక్కొక్క ట్రేలోను 150-200 అయిస్టర్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ర్యాంక్ లోను 20 ట్రేలు ఉంటాయి. ఒక సంవత్సరంలోనూ 90-110 మీ.మీ.ల సైజుకు చేరుకొన్న అయిస్టరులు అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ర్యాంక్ లు 0.48 టన్నులు సరాసరి ఉత్పాదనకు ఒక సంవత్సరంలో సాధించగలరు. ఒక ఏడాది పయసుగల అయిస్టర్లకు తడిమాంసం మొత్తం బరువు 8-10 శాతం ఉంటుంది.

14.10 క్లామ్ సంవర్ధనం

మన దేశంలో క్లామ్లు ద్వీకవాట జీవులలో మొత్తం మంచి లాభదాయకమైనవి. ఈ విధంగా బాగా వివియోగంగా ఉన్న జాతులు మెరెట్రిక్స్ మెరెట్రిక్స్, మె. కాస్టా, కాటెలీనియా ఒవైనా, కా. మార్మోరాటా, పాఫియా మలబారికా, పా. లాటెరి నల్కా, విల్లోరిటా సిప్రినాయిడేస్, అనడోరా గ్రానోసా అనునవి. ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్నాటక, కేరళ మొదలైన తీరరాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి. కొంత శాతం ఎక్కువగా క్లామ్లను తినడానికి ఉపయోగించినా చాలావరకు వీటి ఉత్పత్తి, సున్నం, తెలుపు బూడిద వర్ణ సిమెంట్, కార్బియమ్ కార్బైడ్ ఇటుకలు మొదలైన వాటి కోసం

సహజ సిద్ధంగా అనడోరా గ్రానోసా లభ్యం అయ్యేప్రాంతం పరిమితంగా ఉంటుంది. కాకినాడ అఖాతంలో అనడోరా పాన్సు (బెడ్) సుమారు 44 కి.మీ. ప్రాంతంలో ఉంటుంది. చాలా వరకు ఇది వ్యవసాయానుకూలత కలిగి ఉంటుంది. కాకినాడ అఖాతంలో అ. గ్రానోసా గుడ్లు జనవరి - ఏప్రిల్ లో కనబడతాయి. ఫిబ్రవరి-మే నెలలో సహజ సిద్ధప్రాన్సు (బెడ్) ల మీద అధికంగా స్థిరపడతాయి. ఈ పాన్సు వైనుంచి విత్తనాలను స్కాపివలతో ఆటు, సమయంలో (Low tide) సేకరిస్తారు.


అనడోరా గ్రానోసా 40.6 మీ.మీ. 31గ్రా. పరిమాణానికి 5 నెలల్లో చేరుకుంటుంది. అంటే కోతకి ఇవి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కొన్ని చని పోయినా సుమారు 88.6 శాతం సరాసరి జీవిస్తాయి.

100 మీ కు నెలల్లో 0.39 టన్నుల నుండి 0.16 పాక్షాదులకు 7 నెలల్లో 6.1 టన్నుల వరకు సాధ్యమైంది. ఉత్పాదన రేటు 38 నుండి 41.6 టన్నుల వరకు ఒక పాక్షాదుకు సాధ్యమైంది అన్నమాట. మొత్తం బరువులో మాంసం వాటా 20 శాతం ఉంటుంది.

14.11 ముత్య సంవర్ధనము

ముత్యాలు మానవ దృష్టిని పుటతన నాగరికతా కాలం నుండి ఆకర్షిస్తున్నాయి. క్రీస్తు పూర్వం నుండి భారతదేశం ముత్యాలకు, ముత్యాల వాషారానికి ప్రసిద్ధి పొందింది. 13వ శతాబ్దంలో చైనా మొదటి సారిగా కృత్రిమ సంవర్ధన ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేసారు. అయితే ఈ విషయంలో జపాను వారు పన్నెక్కారు. 1983లో మొదటి విజయం సాధించిన దగ్గర నుంచి అధునాతన ముత్య సంవర్ధనా పద్ధతుల్లో వాసిక్కారు. భారత దేశంలో దీనికి తగిన వనరులు ఉండటం వలన ముత్య పరిశ్రమలో అభివృద్ధి సాధించడానికి ఆసక్తి కలిగిఉంది. 1973లో మెరైన్ రిసర్చి ఇన్స్టిట్యూట్ సాంకేతిక విజయాన్ని సాధించింది.

ముత్య పరిశ్రమ ఒక కళ లాంటిది. ముత్యము సంవర్ధనంలో ప్రముఖమైన అత్యంత సుందరమైన జీవశాస్త్ర ఉత్పాదన. పెర్ల్ ఆయిస్టర్ అని సామాన్యంగా పిలువబడే ద్వికవాట మలస్క జీవి ఉత్పాదన. దీనిలో ముఖ్య పాత్ర వహించే జాతి పింక్టాడా ఫుకేటా (పటం 14.2).



పటం 14.2. పింక్టాడా ఫుకేటా

పింక్టాడా ఫుకేటా అనే ముత్యపు చిప్ప పురుగు సహజ సిద్ధంగా మన్నార్ సింధుశాఖ, కచ్ సింధు శాఖలోనో కనబడుతుంది.

పింక్టాడా ఫుకేటా కర్పరాలు ఎరుపు గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. అయితే ఇతర వర్ణ విశేషాలు కూడా ఉండవచ్చు. ఎడమ కర్పరం లోతుగా మరింత కుంభాకార లక్షణంతో ఉంటుంది. కర్పరంలోని ముత్యపు లేదా నేక్రియస్ భాగం లోహ ప్రకాశంతో మెరిసి ఉంటుంది. ముత్యపు చిప్ప పురుగు కర్పరంలో 3 స్తరాలుంటాయి. బయట తట్టుగా కాంఖియోలిన్ అనే జీవ సంబంధ స్తరము ఉంటుంది మధ్య ప్రిస్మాటిక్ స్తరం ఉంటుంది. ఇక ఈ జీవి శరీరంలోని మెత్తటి భాగాలలో ప్రావారము. అంతరాంగ సముదాయము. మొప్పలు, పాదము, పర అబ్జక్టర్ కండరము ఇతర కండరాలు ఉంటాయి. కవాలాల అంటు వెంబడి ఉండే ప్రావారము మిగతా మెత్తని భాగాలను ఆవరించి ఉంటుంది.

అది చాలా మృదువుగా మిగడ-పసుపు వర్ణంలో ఉంటుంది. ప్రావారము ప్రాథమికంగా స్రావ నిర్మాణము. కర్పరము దీని ప్రభావం వలననే ఏర్పడుతుంది. ప్రావారములో ఉపకళా కణజాలముతో ఉంటుంది. దీనిలో బాహ్య ఉపకళా స్తరము, మధ్య సందాన కణజాలము, లోపలి ఉపకళా స్తరము ఉంటాయి. బాహ్య ఉపకళా స్తరము నేకర్ (మదర్ ఆఫ్ పెర్ల్)ను స్రవిస్తుంది.

బాహ్య ఉపకళా స్తరానికి పునర్నిర్మాణ శక్తి బాగా ఉంది. తన సహజ స్థానంలో నుంచి తీసివేసినా మనగలుగుతుంది. ఇతర కణజాలాలకు ముత్యపు చిప్ప పురుగులో ఆ భాగాన్ని మార్పిడి లేదా బ్రాన్స్‌స్లాంటు చేసినా తన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాని లోపలి ఉపకళా స్తరము కాని, సంధాన కణజాలం కాని ఈ శక్తిని కలిగి ఉండవు. మార్పిడి కాగానే చితికి పోతాయి.

బాహ్య ఉపకళా స్తర కణాలు ప్రావారము నుంచి విడి అప్పుడప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ముత్యపు చిప్ప పురుగు శరీరంలోకి పడిపోతాయి. అవి పునర్నిర్మాణ క్రియకు ప్రారంభం చేసి ఒకే ఒక స్తరం కల కణాల నుంచి రూపంలో ఏర్పరుస్తాయి. దీనిని “ముత్యపు నంచి వెర్లపాక్” అంటారు. ఈ ముత్యపు నంచిలో సహజ సిద్ధమైన ముత్యపు పదార్థం వెరుగుతుంది. ముత్య స్రావ ఫలితం వలన ఈ క్రియ అలా ఇంకా ఇంకా సాగి ముత్యపు చిప్ప పురుగు చనిపోయే వరకూ జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఒక విడిగా పున్న అందమైన సహజ ముత్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అవుతుంది.

ఈ విధంగా సహజ సిద్ధమైన ముత్యాలు వెర్ల ఆయిస్టర్ శరీరంలోకి ప్రమాదవశాత్తు ప్రవేశించిన వైదేశిక పదార్థాల వలన కూడా జరుగుతుంది. కవాలాలు తెరచుకొని ఉన్న సమయాల్లో సూక్ష్మ రేణువులు జీవులు ముత్యపు చిప్ప పురుగులోకి ప్రవేశిస్తాయి. కొన్ని పరిస్థితులలో ఈ వైదేశిక పదార్థాలు కర్పరానికి, ప్రవారానికి మధ్య చిక్కుకొని పోతాయి. ఈ వైదేశిక పదార్థ ఉత్తేజక చర్య వలన బాహ్య ఉపకళా స్తరము అంతర్గతము చెందుతుంది. వెర్లపాక్ ఏర్పడుతుంది. ముత్యం రూపొందుతుంది.

ముత్య పరిశ్రమలో ముత్యాలకు వెంపొందించే కార్యక్రమంలో ఒక సున్నితమైన సర్దదీని నిర్వహిస్తారు. డోనార్ లేదా దాత ఆయిస్టరు నుంచి ఒక చిన్న ప్రావార ఖండం తీసి, గ్రహీత లేదా రిసిపియెంటు ఆయిస్టరు ప్రత్యుత్పత్తి అవయవం మీదకు అతికిస్తారు. దానితో (గ్రాఫ్ట్) బాటు కేంద్రకం ఒకటి కూడా ఉంచుతారు. 25 గ్రాములు బరువు వై పడిన ముత్యపు చిప్ప పురుగు ఈ కార్యక్రమానికి అనువుగా ఉంటుంది. అప్పుడే గుడ్లు పెట్టిన ఆయిస్టర్లను కాని, రికవరీ దశలో ఉన్న వాటినికాని ముత్యాల ఉత్పత్తికి ఎన్నుకొంటారు. మొదట ఆయిస్టర్లను తెరిచి తప్పేటట్లు అంటే బ్రాంక్విలెడ్ చర్యకు గురి చేస్తారు. దీనికి మెంథాల్ కలిపిన నీటిలో వాటిని ఉంచుతారు. కర్పర పూసలు కేంద్రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఇవి గుండ్రంగా 2.7 మి.మీ. వ్యాసంతో నున్నగా బాగా పాలిష్ చేసినట్లుండాలి. బాహ్య ఉపకళా స్తరము పునర్నిర్మాణ క్రియలో కేంద్రకం చుట్టు ప్రవించి చివరకు ముత్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీనినే కల్చర్ వెర్ల అంటారు. సర్దికల్ చర్యవలన దీనిని సృష్టించడమే దీనికి కారణం. పైగా ఈ విధంగా ఆ “చిత్తనం” చేసిన ముత్యపు చిప్పను తిరిగి తిరిగి ఈ క్రియకు ఉపయోగించవచ్చు.

ముత్యపు చిప్ప పురుగుల క్షేత్రాలుగా ధక్షణ పొందిన ఆఖాతాలు అనువుగా ఉంటాయి. తీర ప్రాంతాలలో సముద్ర జలాలు అలజడికి లోను కాకుండా నిర్మలంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ క్షేత్రాలు ప్రారంభించ వచ్చు. లోతు సుమారుగా 10 మీటర్లుండాలి. సిల్టింగ్ అతి తక్కువగా ఉండాలి. ఉష్ణ మండల సముద్ర ఉష్ణోగ్రత వీటిని అవరించి ఉండాలి. సెలెనిటి ఉష్ణమండల విధానంలో ఉండాలి. 40 శాతం వరకు ఈ సర్దికల్ చర్యకు లోనైన ముత్యపు పురుగులు చనిపోతాయి. కేంద్రకాన్ని ప్రవేశ పట్టడంలో కానీ, జబ్బుల వల్ల కాని నీటిలో ఎక్కువ మెంథాల్ కలపటం కానీ దీనికి కారణాలు కావచ్చు.

రాఫ్ట్ కల్చర్ పద్ధతి ధక్షణ పొందుతున్న ఆఖాతాల్లో అనుసరించ దగు ఆచరణ పద్ధతి (నమూనా). మదర్ ఆయిస్టర్ కల్చర్ వ్యవస్థ, హాచరీ ఉత్పత్తిలోని పద్ధతులు ఇండియాలో అభివృద్ధి చెందాయి.

14.12 ద్వీకవాట సంవర్ధన వ్యవస్థలోని సమస్యలు, అవరోధాలు

ద్వీకవాట సంవర్ధనలో కుతూహలం మన దేశంలో ఇటీవలనే ఆరంభం అయింది. ఉత్పత్తికి తగిన విధంగా సర్దతులు రూపొందించ బడ్డా వాణిజ్య రీత్యా సంవర్ధన ఆరంభంకాలేదు. మన దేశానికి వారి

కల్చర్ ఒక క్రొత్త వుంత. అందువలన సముద్రంలో ఈ చర్యకు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కొంచెం ముందు వెనక ఆడుతున్నారు.

తీర ప్రాంతాలలో కొన్ని పరిమిత ప్రదేశాలలోనే ద్వీకపాట జీవులను తినడం జనరంజక చర్య. ఆయిష్టర్లు సయితం విస్తృతంగా ఆహారంగా ఉపయోగించడం తక్కువ. అందువల్ల అధిక తరంగా విటని పోషక పదార్థాలుగా స్వీకరించడానికి ఉద్యమ రూపంలో చర్యలు ప్రారంభం కావాలి.

సముద్ర జీవులను అనుకూలంగా రూపొందించే పరిశ్రమ ఈ జీవుల ఎగుమతి ప్రాశస్త్యాన్ని సరిగా గుర్తించలేదు. భారత దేశంలోని ద్వీకర జీవులను ఎగుమతికి గురిచేసే ప్రయత్నాలు ఇప్పటి వరకు జరుగలేదు.

ద్వీకపాట జీవుల సంవర్ధనపు అధారం కల్పించటం వలన జంతు ఫ్రోటీన్ ఉత్పత్తి అధికము అవుతుంది. ఉద్యోగావకాశాలు కలుగుతాయి. విదేశ మారక ద్రవ్యం లభిస్తుంది. అధిక విలువ కలిగిన వస్తువుల ఉత్పత్తి వలన ఇవి సాధ్యమవుతాయి. మన చేపల పరిశ్రమ అర్ధవంతమైన రీతిలో విస్తృత మవుతుంది. సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి కనపడుతుంది. ముఖ్యంగా స్కూల్ స్కేల్ రంగంలో.

14.13 మీన సంవర్ధనము

చాలా జాతుల చేపలు సంవర్ధన చర్యకు అనువుగా ఉంటాయి. పాలచేపలు పర్సన్ ఈల్ చేపలు దీనికి అనువుగా ఉంటాయి. CMFRI ఈ సందర్భంగా పరిశోధనలు జరిపింది. చానోస్ చానోస్ ఊప్సనీటి చెరువులో వెంచటంవల్ల పాక్టారుకు 750 kg లు రాబట్టు గలిగారు. ఆంగ్లిల్లా బైకమార్, అనే ఈల్ చేప తూర్పు తీరం వెంబడి అధికంగా కనబడుతుంది. ఇవి ఆరుబయట సముద్రంలో సంతానోత్పత్తి జరుపుకొంటాయి. వర్షాకాలంలో ఎల్వర్లు అనే ఈ ఈల్ పిల్లలు నదుల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ ఈల్ ను సంవర్ధనం జరిపే చర్యను రూపొందించారు. రెండేళ్ళతరువాత ఒక్కొక్క పాక్టారుకు 38 వేల కె.జీల ఉత్పత్తిని ఇది సాధించింది. ఈ విధంగా పెంచిన ఈల్ చేపలకు విదేశాలలో మంచి గిరాకీ ఉంది. ముఖ్యంగా జపాన్ వంటి దేశాలలో.

14.14 సముద్ర కలుపు మొక్కల సంవర్ధనము

సముద్ర తీరం వెంబడి వెరిగే సముద్ర కలుపు మొక్కలు కొన్ని ఉత్పాదనలో ముడి పదార్థాలుగా ఉపయోగపడతాయి. అగార్, అగార్ - అల్జిన్ వంటి ఆర్గానిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ల గురించి చెప్పకోవాలి. అగార్ అగార్ నీటిలో కరిగే జెల్. దీనిని ఎర్ర సముద్ర కలుపు మొక్కల నుంచి తీస్తారు. ఈ జాతులు గ్రాసిలేరియా జాతులు, గెలిడియెల్లా జాతులు. అల్జిన్ ఝర పదార్థంలో కరిగే జెల్. దీనిని నర్గాసమ్, బర్మినేరియా అనే గోధుమ సముద్ర కలుపు మొక్కలు నుంచి తీస్తారు.

వీటికి టెలాచినన్ కొల్లాయిడర్ ఇక్షణాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల అగార్-అగార్, అల్జిన్ లను అనేక చర్యలు, పదార్థాలలో ఉపయోగిస్తారు ఇవి: స్టబిలైజింగ్, ఎమల్సిఫయింగ్, సైజింగ్ ఆహారంలో సిమెంటింగ్ కారకాలు, కస్టర్నరీ, టెక్స్టైల్, ఫార్మసూటికల్ కాగితం. రొట్టెల పరిశ్రమలు. అగార్ సెంటటిక్ ఫైబర్ తయారీలో మాధ్యమంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. అందువలన ఈ ఫైబరును సివీడ్ రేయాన్ అంటారు.

సముద్ర కలుపు మొక్కలు ఖనిజాలకు, విటమిన్లకు, కొన్ని ట్రేస్ మూలకాలకు ఖర్చులేని ఆధారాలుగా ఉంటాయి. అందువల్ల వశువులకు, కోళ్ళకు ఆహారంలో కలుపుతారు. సముద్ర కలుపు మొక్కలను ఎరువుగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. వాటిలో పొటాషియమ్, సోడియమ్, మెగ్నీషియమ్, నీటిలో కరగ గలేస్టిటిలో ఉంటాయి. ఇవి నేలలో నీటిని నిల్వకొనే శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. పంటలకు వచ్చే డెఫిషియన్సీ రోగాలను అరికడతాయి.

తూర్పుతీరంలో మండపం నుంచి కన్యాకుమారి అగ్రం వరకూ పశ్చిమ తీరంలో ఓకా నుంటి పెరా వెల్ వరకు ప్రముఖ సముద్ర కలుపు మొక్కల ప్రాంతాలున్నాయి. ఇవి విశాఖ నుంచి భీముని పట్నం వరకూగల రాతిమయ తీరంలోను, చిలక సరస్సుప్రాంతంలోను కనబడతాయి. సహజ సిద్ధ వాతావరణం నుంచి సేకరించడమే కాక సముద్ర కలుపు మొక్కలను అనేక పద్ధతుల్లో సంవర్ధన జరుపుతారు. (1) రాతిబండలు కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు వాటి సహజ వాతావరణంలో ఉంచి ఉపయోగకర జాతులు పెరిగేటట్లు చేస్తారు. (2) కృత్రిమ ఆధార నిర్మాణాలు చేంతాడు (కొబ్బరి పురి) లేదా కృత్రిమ నారల వలలు వేసి రక్షిత ప్రాంతాలలో ఉంచుతాడు. (3) ముఖ్యమైన జాతులను రకాలను ఇతర తీర ప్రాంతాలకు తరలిస్తారు. (4) స్పోర్ పద్ధతి (సిద్ధ బీజాలు).

అంటు కట్టు పద్ధతిలో కావలసిన సముద్ర కలుపు మొక్కల సంవర్ధన సాధ్యమౌతుందేమోనని వాటి అవకాశాలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగాలు చేస్తున్నారు.

వీటి ఖండాలను చేంతాళ్ళకు బంధించి చుట్టూ రూపంలో వీటిని సమానాంతరంగా సముద్రంలో వేలాడ కడుతున్నారు. 80 రోజులలో గ్రేసీలేరియా, పంటకు తగిన నైజలోకి ఎదిగింది. 1.25 కే.జీ.ల మొక్క 8. చ.మీ. సంవర్ధన చుట్టంలో పెట్టి వెంచిన తరువాత 43.2 కే.జీ. (తాజాబరుపు) మొక్కగా ఎదిగింది.

మన దేశంలోని సముద్ర కలుపు మొక్క జాతుల అభివృద్ధికి కృషిచేసి ఆర్థిక దృష్ట్యా ప్రాధాన్యత కలవాటిని పెంచడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

స్వపరిశీలన

1. అయిస్టర్ల ర్యాక్ అండ్ ట్రే సంవర్ధన పద్ధతి గురించి వివరింపుము.

14.15 సారాంశము

ఉప్పునీటి కయ్యలలో చేపలు, రొయ్యల పెంపకమును గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. ఉప్పునీటి కయ్యలలో అనేక రకముల జంతుజాలములుండును. నీటికుంటలలో చేపలను, రొయ్యలను పెంచుటకు వాని సరియైన గ్రుడ్లు లభించవలెను. రొయ్యల ఉత్పత్తి, ఉత్పత్తిలోని మెళకువలను ఇక్కడ వివరించబడినది. నీటి కుంటల నిర్వహణా విధానమును గురించి కూడా ఇక్కడ వివరించ బడినది. ముత్యపు చిప్పలు మసెల్స్, ఆయిస్టర్స్, క్లామ్స్, వీని పరిరక్షణ, సుత్పత్తి విధానములను గురించి ఇక్కడ వివరించ బడినది. ఈ ద్వీకవాట నత్త గుల్లల సుత్పత్తి వల్ల చాల ధనము లభించును.

14.16 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. టుటికారిన్ లో ర్యాక్ అండ్ ట్రే సంవర్ధన పద్ధతిని అవలంబించి యిస్టర్లను సంవర్ధనం చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క ర్యాక్ లోను (13.2 x 2మీ) కొన్ని వరుసలో టేకు స్టంబాలుంటాయి. ఈ ర్యాక్ ఒకఫ్లాట్ ఫారమ్ మాదిరిగా పనిచేసే అయిస్టరు బోనులు వేలాడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. వీటిలో నర్సరీ దశలుంటాయి. ఇక ఎదుగుదల దశల్లోని అయిస్టరులకు వాటి ట్రేలకు ఆధారంగా ఈ ఫ్లాట్ ఫారమ్లు ఉంటాయి. అయిస్టరు బోను 40x10x10 సెం. మీ. ఉండి మూత కలిగి ఉంటుంది. ఇది మూమూలు బోను పద్ధతిలోనే నిర్మించ బడుతుంది. కాని అల్లికతో 22 మి.మీ. దూరం ఉంటుంది.


14.17 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. ఉప్పు కయ్యలకు సంబంధించి, రొయ్య, చేపల విత్తనాల లభ్యత, సేకరణ సహజ సిద్ధ ఉత్పత్తుల నుంచి ఏ విధంగా జరుగుతుందో వివరించుము.
2. పినియడ్ రొయ్య పోచరీ వ్యవస్థ గురించి వ్రాయుము.
3. ఉప్పు కయ్యల వనరులో రొయ్య, చేప విత్తనాల నర్సరీ పాలన గురించి వర్ణించుము.
4. ఉప్పు కయ్యల సంబంధించి నిలువ కుంటల తయారీ, నీటివనరు పాలన గురించి తెల్పుము.
5. ఉప్పు కయ్య ప్రాంతాలలో రొయ్యల, చేపల ఏక సంవర్ధన వ్యవస్థలను వివరించునది.
6. మసల్ సంవర్ధన గురించి వ్రాయుము.
7. సహజ సిద్ధ ముత్య పరిశ్రమ, సంవర్ధన ముత్యపు పరిశ్రమ పద్ధతులను వర్ణించుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. ఉప్పు కయ్యలలో సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తున్న రొయ్యల, చేపల సంవర్ధన క్రియలలోని లోపాలను తెల్పుము.
2. ఉప్పు కయ్యల క్షేత్రాలకు అనువుగా ఉన్న రొయ్యలు, చేపలు.
3. ఉప్పు కయ్యల చేపల క్షేత్రంలో ముఖ్య విభాగాలు.
4. ఉప్పు కయ్యల రొయ్యల, చేపలు సంవర్ధనంలో అదనపు ఆహార పోషణ.
5. అనడోరా గ్రానోసా సంవర్ధనము.



పటం 12.1, జల కీటకాలు A. రానాట్రా B. రిఫోసెర్వ C. బెలోస్టామా D. ఎలిడెస్ E. సిపా F. హెడ్రోమెట్రా G. గెలెన్ H. నోటోవెక్టా I. నైటిస్టర్ డింబకము.

12.4.4 గుడ్డు చేపలను విడువడం

హెక్టారుకు 1-2 మిలియన్ల గుడ్డు చేపలను పెంచవచ్చు. పోషక నిల్వలు అదనంగా అందజేసి చక్కగా నిర్వహిస్తే హెక్టారుకు 2.5-3.5 మిలియన్ల వరకు పెంచవచ్చునని రుజువైంది. స్తవక జీవుల లభ్యతను బట్టి గుడ్డు చేపల సాంద్రతను నిర్ణయించాలి. 50 లీటర్ల కుంట నీటిలో 1.5-2.0 మి.లీ. జంతు స్తవకాలు ఉండడం అవసరం.

వగలు వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉదయం లేదా సాయం సమయాలలో గుడ్డు చేపలను నర్సరీకుంట్లలో క్రమంగా వదులుతుండాలి. అవి కొత్త అవరణంలోకి అమాంతంగా పోతున్నట్లు భావించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

12.4.5 అదనపు ఆహారం

హెక్టారుకు 2.5 నుండి 3.5 మిలియన్ల గుడ్డు చేపలను పెంచుతున్నప్పుడు నర్సరీ కుంటలో పోషక పదార్థాలు అధికంగా అవసరమవుతాయి. నీటిలో ఉండే జంతు స్తవకాలు సరిపోవు. అందుచేత నీటికి తోడు అదనంగా పోషక పదార్థాలను సమకూర్చాలి. వేరుశనగ పిండి, తవుడు 1: 1 నిష్పత్తిలో తయారుచేసిన మిశ్రమాన్ని గుడ్డుచేపలకు అహారంగా వాడతారు. ఊకను తీసి వేయడానికి, అంతా ఒకే పరిమాణంలో ఉండే కణికలుగా తయారవడానికి ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లెడ పట్టాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసిన ఆహారాన్ని గుడ్డు చేపల బరువును బట్టి ఈ కింది విధంగా ఇవ్వాలి.

కుంటలో విడిచిన	1 నుండి 5 రోజులు	-	1 మిలియన్ గుడ్లు చేపలకు ప్రతిరోజు 5.6 కి.గ్రాంలు.
	6 నుండి 12 రోజులు	-	1 మిలియన్ గుడ్లు చేపలకు ప్రతిరోజు 11.2 కి.గ్రాంలు.
	13వ రోజు	-	అహారం అవసరం లేదు.
	14వ రోజు	-	గుడ్లు చేపల సేకరణ.

పెరుగుదలను వృద్ధిచేసే కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ ను ప్రతి చేపపిల్లలకు 0.01 మి.గ్రాం చొప్పున పోషక ఆహారంతోపాటు నిత్యం ఇవ్వాలి. ఇది గరిష్ట పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ప్రతి రోజు ఉదయం అదనపు ఆహారాన్ని నీటిపైన అంతటా సమానంగా పడేటట్లుగా చల్లడం మంచిది.

12.4.6 సేకరణ

నర్సరీ కుంటల్లో 15 రోజులుగా దాదాపు 60% గుడ్లు చేపలు 25-30 మి.మీ. పొడవుతో ఉండే పసి చేపలుగా పెరుగుతాయి. ఈ కుంటలోనే పెంచినట్లయితే వీటిలో చాలా వరకు చచ్చిపోతాయి. కాబట్టి వీటిని నర్సరీల నుండి తీసి పోషణకుంటలో వేయవలసి ఉంటుంది.

అదనపు ఆహారం వేగు నిండా ఉండడంవల్ల వీటిని నర్సరీకుంట నుండి సేకరించేటప్పుడు చాలా వరకు చనిపోతాయి. కాబట్టి సేకరించడానికి ఒక రోజు ముందుగా వీటికి ఆహారాన్ని ఇవ్వగూడదు. వీటి సేకరణ కూడా ఉదయమే జరగాలి.

ఒక నర్సరీ కుంటలో మూడు నెలలు కాలంలో కార్ప్ పసి చేపల పంటలు మూడు నాలుగు సేకరించవచ్చు.

12.5 పోషణకుంటల నిర్వహణ

కార్ప్ పసిచేపలను (25-30 మి.మీ.) చిరుచేపల దశ [100-150 మి.మీ] వరకు అభివృద్ధి చెందించడమే పోషణ కుంటల ముఖ్యోద్దేశం. నిర్వహణ పద్ధతులు సరియైనవి అవలంబించి మూడు నెలల్లో వీటిని పెంచవచ్చు.

నర్సరీ కుంటలో ఎదిగిన కార్ప్ పసి చేపలు నిలువ కుంటలో పెంచడానికి తగినట్లుగా ఉండవు. నిలువ కుంటల్లో పెద్ద భక్షక చేపలు వీటిని తింటాయి. అందువల్ల పసిచేపలకు రక్షణ కల్పిస్తూ చిరు చేపలుగా పెరిగే వరకు పోషణకుంటలో ఉంచాలి. చిరుచేపలు తమను తాము ధక్షింతుకొంటాయి. ఇంతేగాక ఇవి ప్రత్యేకమైన పోషణ పద్ధతులతో, అననుకూల పరిసరకారకాల నుండి ధక్షింతుకొనే శక్తిని పొంది ఉంటాయి. ఈ రకంగా మంచి నీటి చేపల పెంపకం వ్యవస్థలో పోషణ కుంటలది అవశ్యకమైన మాధ్యమిక దశ.

పోషణ కుంటలను 0.08-0.1 హెక్టారు [200-1000 చదరపు మీటర్లు] నీటి వైశాల్యంలో 1.5-2.0 మీటర్ల లోతు నీరు నిలువ ఉండేటట్లుగా దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా తవ్వుతారు.

నీటి మొక్కల తొలగింపు, అనవసరమైనట్టి చేపలను, భక్షక చేపల నిర్మూలన, మొదలైన కుంట నిర్వహణ కార్యక్రమం నర్సరీ కుంటల మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ పసిచేపలు, గుడ్లు చేపల కంటే అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలకీటకాలవల్ల అంతగా ప్రమాదముండదు.

12.5.1 కుంటలో ఎరువుల వాడకం

ఎరువులు వాడడానికి ముందుగా కుంటలో హెక్టారుకు 200 కి. గ్రాంల పొడిసున్నం వేయాలి. తరువాత వృక్ష జంతు ప్లవకాల అభివృద్ధికి గాను కార్బనిక్, అకార్బనిక్ ఎరువులను వాడాలి.

సిలేజ్	:	మేతను గుడ్డగా మార్చడం. ఇది వాయు రహిత అమ్ల కిణ్వ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది నిలువ చేపలకు ఆహారం.
సిల్వాటియర్	:	బహు సూక్ష్మమైన అవసాదనాల కూడిక, దీనిలో శిలల బంక మట్టి కణికలు ఉంటాయి.
స్కిమ్మడ్	:	ద్రవం మీది తలంపైన తేలే పదార్థాలను తీసివేయడం
స్లయిన్	:	నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించి, క్రమబద్ధం చేసే తలుపు-తూమ
స్టాకింగ్	:	క్రమరహితంగా వేర్వేరు పొదిగిన చేపలు
స్టేక్స్	:	గట్టిగా, వాడిగా ఉండే కర్రలు. భూమిలోపాతి స్తంభం లేదా ఊత మాదిరిగా పనిచేస్తాయి.
స్టాకింగ్ రేట్	:	ఒక పరిమాణ విస్తీర్ణం నుండి విడుదల చేసిన చేపల సంఖ్య
స్ట్రెస్సర్స్	:	ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితి
టెల్పన్	:	వాల ఖండము-రొయ్య ఉదరభాగం పరాంత చివర ఉండే త్రికోణాకార భాగం.
టాక్సిసిటీ	:	విషప్రభావం
టర్పిడిటీ	:	బురద నీరు కాంతి చొరనీయని నీరు.
వార్మింగ్	:	చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగించే పాడవాటి తాళ్లు.
వియర్	:	నదికి అడ్డంగా నీటిప్రవాహాన్ని అదుపు చేయడానికి కట్టే గోడ లేదా ఆ మాదిరిగా ఉండే నిర్మాణం.
జూప్లాంక్టన్	:	జంతు స్థవకాలు-నీటిపై తేలే సూక్ష్మ జంతువులు, చిన్న ప్రాథమిక జంతువులు, కొన్ని జలచర జంతువుల డింభకాలు.

భాగం-13 మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు.

విషయక్రమం

- 13.1 ఉద్దేశ్యం
- 13.2 ఉపోద్ఘాతం
- 13.3 మిశ్రమతుత్సన సంవర్ధనపనావస్త
- 13.4 సమగ్ర చేపసంవర్ధనం - జంతుసంవర్ధనం - వ్యవస్థలు
- 13.5 చేప-బాతుల సంవర్ధనం
- 13.6 చేప-కోళ్ళ సంవర్ధనం
- 13.7 చేప-పండుల సంవర్ధనం
- 13.8 చేప-పశువుల సంవర్ధనం
- 13.9 పరిపాలనలో చేపల పెంపకం
- 13.10 మంచినీటి రొయ్యల సంవర్ధనం
- 13.11 గాలి పీల్చే చేపల సంవర్ధనం
- 13.12 చేపనారు ఉత్పత్తి పద్ధతులు
- 13.13 గావిపీల్చే చేపల సంవర్ధనం
- 13.14 సారాంశము
- 13.15 న్యవరిశీలన - జాబాబులు
- 13.16 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

13.1 ఉద్దేశ్యం.

ఈ భాగంలో భారతీయ పెద్ద కార్ప్, విదేశీయ కార్ప్ మిశ్రమ పెంపకానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలతోబాటు చేపలు, పశువులు, పంటలు ఈ మూడింటిని మేళ వించిన సమగ్రమైన సంవర్ధన వ్యవస్థను కూడా చర్చించడం జరిగింది. మంచి నీటి రొయ్యల పెంపకం, గాలిపీల్చే చేపల సంవర్ధనం వర్ణితమయింది. శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులతో సహా ఈ వ్యవస్థలవల్ల జరిగే ఉత్పాదకతను వివరంగా విపులీకరించడం జరిగింది.

13.2 ఉపోద్ఘాతం

చేపల గరిష్ఠ ఉత్పాదనకు, వివిధ జీవావరణాలలో లభించే సహజ ఆహారంతోబాటు అదనపు ఆహారాన్ని చేర్చి, దానికి అనుగుణంగా ఉండే, తొందరగా పెరిగే వేర్వేరు జాతులను మిశ్రమంగా పెంపొందించడానికి సంబంధించిన మూలసూత్రాలు.

మిశ్రమ చేపల పెంపకానికి చెందిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో స్థూలంగా ఇమిడి ఉన్న అంశాలు: నీటి కలుపు మొక్కల, పరభక్షక చేపల నివారణ; భారతీయ పెద్ద కార్ప్లు-కట్ట, రోహా, మ్రెగాల్, విదేశీయకార్ప్లు-వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్, సామాన్య కార్ప్ మొదలైన చేపలను ఉచిత

రితిగా తగుసాంద్రతలో మిశ్రమంగా పెంచడానికి వాటి 100 మి.మీ. పరిమాణంలో ఉండే చిరుచేపల సేకరణ, నిలువ; క్రమబద్ధంగా అదనపు అహార సరఫరా, తగు సమయానికి వాటి సేకరణ.

మూడు మిథాలుగా చేపలను మిశ్రమంగా పెంచుతారు- కేవలం భారతీయ పెద్దకార్ప్ సంవర్ధనం, కేవలం విదేశీయ కార్ప్ సంవర్ధనం, భారతీయ, విదేశీయ కార్ప్ ఉమ్మడి సంవర్ధనం.

మిశ్రమ చేపల పెంపకంవల్ల మామూలుగా చేపల దిగుబడి పెళ్ళారుకు 3000 నుండి 6000 వరకు సాలీనా ఉంటుంది.

కుంట నిర్వహణ పద్ధతులు అభివృద్ధి చెందడంవల్ల ఇంకా ఈ దిగుబడి ఎక్కువయింది.

చేపల, జంతువుల సమగ్ర సంవర్ధన వ్యవస్థ ఇటీవల ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇందులో చేప - బాతుల సంవర్ధనం, చేప - కోళ్ల సంవర్ధనం, చేప - పందుల సంవర్ధనం మొదలైనవి చేరినాయి. పశుశాల (కొట్టం) మలినాలను, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నుండి వెలువడే పిప్పిని పరిభ్రమింప జేసి చేపల పెంపకానికి వాటిని వాడుతారు.

మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలు, పశువైద్యుల సంఖ్య, కావలసిన ఎరువు పరిమాణం, పరిభ్రమణ వ్యవస్థలు పటిష్ఠత మొదలైనవి వివరించనయినాయి.

పరి పాలలో చేపల పెంపకం, సమగ్ర చేప-వ్యవసాయ వ్యవస్థకు చెందినది, చేపల పెంపకానికి కావలసిన పరిపాలం అవశ్యకాలు, పరి పాలంలో పెంచడానికి తగిన చేపలు, ఇటీవలి వ్యవసాయ పద్ధతులవల్ల పరి పాలంలో చేపల సంవర్ధనానికి ఏర్పడే నిర్బంధాలు, చేప-పరి సాగుకు మెరుగ్ పెట్టిన పద్ధతుల వివరణ.

మంచి నీటి రొయ్యల సంవర్ధనం ఇటీవలి ప్రయోగం. భారతదేశంలో అతకి పెద్ద రొయ్య, మాక్రొబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గి నదీ జలాలలో ఉండే రొయ్య, మా. మాల్కమ్ సోని, ఈ రెండింటి పెంపకం పద్ధతులు, హాచరీ నిర్వహణ, నారు ఉత్పాదన, సంవర్ధన వ్యవస్థలు, మంచి నీటి రొయ్యల ఉత్పాదక శక్యత విశదీకృతిమయింది.

మరెల్, ఎక్స్ చేప, సింఘి, మాగుర్ మొదలైన గాలిపీల్చే భారతీయ చేపలు వాణిజ్యపరంగా ప్రముఖమైనవి. వాటి నారు ఉత్పత్తి పద్ధతులు, సంవర్ధన వ్యవస్థలు వర్ణితమైనది.

13.3 మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధన వ్యవస్థ

భారతదేశం తూర్పు ప్రాంతాలలో మంచి నీటి కుంటలో చేపల పెంపకం సాంప్రదాయకంగా జరగడం చారిత్రక విషయం. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో భారతీయ పెద్ద కార్ప్ చేపలైన కట్ల రోహ (లేబియో రోహిట), మిగాల్ (సిర్రినస్ మిగాల్) మొదలైన వాటి గుడ్డు చేపలను, పని చేపలను, చిరుచేపలను అతిఎక్కువ సాంద్రతతో నిలువ చేసి పెంచుతారు. ఈ పద్ధతిలో నీటి ప్రాంతంలని సహజ ఉత్పత్తులపై చేపల పోషణ ఆధారితమై ఉంటుంది. వాటి నిర్వహణ కూడా అశాస్త్రీయమైనది. అదనపు అహారం యందు, తీరచుగా చేపలు పరాన్న జీవుల బారిపడతాయి. చేపల మనుగడ అతిస్వల్పమేగాక చేపనారు అత్యంత అధికంగా వృధా అవుతుంది. సాంప్రదాయకంగా జరిగే పెంపకంలో సాలీనా దిగుబడి 300 నుండి 1000 కి.గ్రాంలు పెళ్ళారుకు ఉంటుందని అంచనా. సరాసరిగా ఇది 600 గ్రాంలకు మించదు.

మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధన వ్యవస్థను చైనాలో బహుళజాతి మత్స్య సంవర్ధనమని, బహుళ సంవర్ధనం అని యూరప్, రష్యా దేశాలలో మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధనం అని మధ్య ధరా ప్రాంతంలో వ్యవహృతమవుతున్నది. వీటన్నిటి భావన ఒక్కటే అయితే ఈ దేశాలలో సంవర్ధనం చేసే చేపల జాతులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. భారతదేశంలో భారతీయ, విదేశీయ, కార్ప్ చేపలను వివిధంగా మిశ్రమం చేసి పెంచుతారు.

పెట్టుబడి:

	రూ లు
కుంట అద్దె	2,000.00
కుంట తయారీ	1,000.00
చేపనారు (7,500-1,00,000 వసి చేపలు)	3,000.00
సేకరణ ఖర్చులు	600.00
మొత్తం పెట్టుబడి	6,600.00

రాబడి:

దిగుబడి హక్కుదారుకు 1,000 కి.గ్రాంల చొప్పున	9,000.00
కిలోకు రూ.9 చొప్పున నికరాదాయం	2,400.00
వ్యాపార నిర్వహణలో నికర ఆదాయం	26.6%
వ్యాపార నిర్వహణ ఆదాయం, నికర ఆదాయం మధ్య నిష్పత్తి	

సంకేతికంగా మిశ్రమ చేపల పెంపకంవల్ల వ్యవసాయదార్లకు హక్కుదారుకు 4000 నుండి 6000 కి.గ్రాంల వరకు దిగుబడి లభించింది. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలో అతిగా జరిగే ఖర్చులు అదనపు అహారానికి సంబంధించినవి. మొత్తం ఖర్చులో దీని శాతం 60 కంటే మించుతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగినా లాభాలు కూడా ఎక్కువే. 5 కి.గ్రాం చేప బరువు ప్రమాణంగా తీసుకొన్నట్లయితే దానికి అయ్యే ఉత్పత్తి ఖర్చు రూ 4-5 మాత్రమే కాగా మరో విధంగానయితే ఈ ఖర్చులు 9 నుండి 12 రూపాయల వరకు పోతాయి.

13.4 సమగ్ర చేప సంవర్ధనం-జంతు సంవర్ధనం వ్యవస్థలు

సమగ్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అదర్శప్రాయమైనవి, రైతులు వీటిని సులభంగా అర్థం చేసుకొని అమలు చేయగలుగుతారు. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలు శక్తిదాయక అహారాన్ని ఉత్పాదించే వ్యవస్థలు. పరిభ్రమణంవల్ల కార్మానిక వ్యర్థవదార్థాల నుండి ప్రోటీన్లను తిరిగి పొందడం చేత ఒక ప్రమాణిక ప్రాంతంలో జరిగే ఉత్పాదకత ఇంకా హెచ్చుతుంది. సమగ్ర సంవర్ధన పరిజ్ఞానం ఒక స్వయం సమృద్ధి వ్యవస్థ. దీని నిర్వహణలో సమయానుకూలంగా వేయవలసిన పదార్థాల కొరత సమస్య ఏర్పడదు. జంతు మలినాల అక్రమ వినియోగంవల్ల ఏర్పడే కాలుష్యాన్ని పరిభ్రమణ వ్యవస్థ ద్వారా తొలగించవచ్చు. మిశ్రమ పెంపక వ్యవస్థంవల్ల ఏడాది పొడవునా కుటుంబానికి ఉపాధి రాబడి సౌకర్యాలు లభించి సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి జరుగుతుంది.

13.5 చేప-బాతుల సంవర్ధనం

పెంపకంలో కోళ్ల తరవాత భారతదేశంలో రెండవ స్థానం బాతులది. తక్కువ నీటి వనరుల పరిస్థితులలో బాతులు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి. బాతుల శరీర ఆరోగ్యానికి, పెరుగుదలకు నీటి పరిసరాలు అవశ్యకం. భారత్, చైనా, మధ్య యూరప్ దేశాలు శతాబ్దాల తరబడి నీటి వనరుల సమీపంలో సాంప్రదాయకంగా పెంచుతున్నారు. కాని ఇటీవల వరకు చేపల ఉత్పాదకతపై వీటిది లాభకర ప్రభావం ఉంటుందని తెలియదు.

తమ ఆహారమైన మలస్కేలను, కప్పలను, చిరుకప్పలను, దోమ, ఇతర కీటకాల డింభకాలను, నీటి కలుపు మొక్కలను కుంట నీటిలో బాతులు అన్నేషించి, తినడంవల్ల చేపలకు పనికిరాని జీవరాశిని నిర్మూలించినట్లు పురుగుతుంది. ఈ చర్య సహజంగా కుంటలో పెరిగే అహారాన్ని వృద్ధి చేసి పెంపుడు

13.13 గాలి పీల్చే చేపల సంవర్ధనం

మర్రెల్ ప్రజననం తొలసారిగా సుంకేశుల (ఆంధ్రప్రదేశ్) చేపల ఫారంలో చేపట్టడం జరిగింది. తరవాత పాదరాబాద్, బాంబే ఈ పద్ధతిని అనుసరించినాయి. మర్రెల్ చేపలు మృదువుగా ఉండే చిన్న మిన్నో చేపలను తినటానికి ఇష్టపడతాయి. అందుచేత మర్రెల్ చిరుచేపలను 70.100 మి.మీ పొడవు పెరగగానే వాటిని, 2, 3 నెలలు ముందుగా ఈ చిన్న చేపలను వేసి, జలకీటకాల స్థావరాని కొరకు కుంట అంచులలో కలుపు మొక్కలు పెంచి తయారు చేసిన కుంటలలో వదలాలి.

అబంధిత చిత్తడి నీటిలో చ.మారులియా నిలువలు ఉంచి కర్నూటక రాష్ట్రంలోసాలీనా హెక్టారుకు 2000 కి.గ్రాంల ఉత్పత్తిని సాధించినారు. ఇదే విధంగా చ.వైయేటా ఉత్పత్తిని 895 కి. గ్రాంల పెరిగింది. మిన్నోలు, చిల్లర చేపల ఆహారాన్ని వీటికి పెట్టినారు. పొడువడిన అబంధిత చిత్తడ కుంటలో ఏ విధమయిన ఎరువు వేయకుండా హెక్టారుకు 2600 కి.గ్రాంల చ. మారులియా, చ. వైయేటా మర్రెల్ చేపల దిగుబడి లభ్యమయింది.

ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిపిన కుంట సంవర్ధన పరిశీలనలో మర్రెల్ పెంపకంలో అదనపు ఆహారం ఇవ్వడం ఆవశ్యకమని తేలింది. సాంప్రదాయమైన తప్పుడు, నూనె పిట్టు మొదలైన వృక్ష జాతి వదార్తాలు మర్రెల్ లకు నష్టించవని, ఇంతు ప్రోటీన్ లోన చిల్లర చేపల ఆహారం వల్ల ఇవి బాగా వృద్ధి చెంది మనగలుగుతాయని స్పష్టమయింది.

గాలిపీల్చే ఇతర చేపలకు వలెనే మర్రెల్ సంవర్ధనం కూడా తక్కువ లోతు నీటిలో పెంపకానికి సంబంధించిన వ్యవస్థకు చెందినట్టిది. నీటి కాలమ్ (Column) తక్కువగా ఉండడం చేత గాలిని పీల్చడానికి చేపలు నిలువుగా పైకి ప్రయాణించడానికి కాలసిన శక్తి చాలా స్వల్పం. దీని ఫలితంగా ఆహారం చేపలకు సమృద్ధిగా లభించి అతి వేగంగా పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది.

క్లారియన్ బట్రాకన్ (మాగుర్), హి.ఫాసిలన్ (సింఘి) తక్కువలోతు నీటి ఉనికికి అలవాటైన చేపలు ఈ పీల్చే చేపల వృద్ధికి వివిధ పద్ధతులున్నాయి. ఉదా. పంజర సంవర్ధనం, సింఘాడా (ట్రాపా) మఖానా (యురెలి) వంటి వాణిజ్య పంటతో బాటు పెంచడం, పొడుబడ్డ నీటిలో పెంచడం, కార్ప్ నర్సరీలలో కార్ప్ లతోబాటు పెంచడం, మురుగు నీటిలో పెంచడం.

క్లారియన్ తోను, అనాబస్ తోను, సింఘిక పొత్తుకుదురుతుంది. మీదు మిక్కిలి దీనిని ఏకాంతంగా సంవర్ధించినా-అంటే తీవ్రతరంగా ఉండే వ్యవస్థలలో పెంచినా సమర్ధవంతంగా పెరుగుతుంది.

గాలి పీల్చే చేపలన్నిటికంటే హిటెరాస్ట్రాస్ ఫాసిలన్ ఎక్కువ మొరటు దీని పెంపకంలో తక్కువ ప్రమాదం, నిర్వహణలో తక్కువశ్రమ.

కేవలం అనాబస్ ను బీహార్ లోని చిత్తడి కుంటల్లో పెంచి 3 నెలలో హెక్టారుకు 254 కి.గ్రాంల పంటను పండించినారు. పశ్చిమ బెంగాల్ లో దీన్ని సంవర్ధించి, హెక్టారుకు 1,25,000 చిరు చేపల సాంద్రతతో 11 నెలలలో హెక్టారుకు 720 కి.గ్రాంల ఫలితాన్ని పొందినారు. అనాబస్ ను బ్యారల్ ఆకారంలో నిర్మించిన బొంగు పంజరాం (1.5మీ పొడవు x 1మీ వ్యాసం)లో సంవర్ధించి 2.7కి గ్రాంలను 5 నెలలలో సాధించినారు.

గాలి పీల్చే చేపల సంవర్ధన వ్యవస్థను వృద్ధి చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రాష్ట్రంలోని లోనాటి చేపల ఉత్పత్తితో గాలి పీల్చే చేపలు 25 శాతం పాలు. ఈ చేపలకు కొల్లేరు సరస్సు ముఖ్యమైన ఉత్పత్తి కేంద్రం కాగాపాదరాబాద్ మర్రెల్ చేపలకు అతి పెద్ద వాణిజ్య కేంద్రం.

భాగం-14 తీరప్రాంత జల సంవర్ధన, సముద్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు

విషయక్రమం

- 14.1 ఉద్దేశ్యం
- 14.2 ఉపోద్ఘాతం
- 14.3 ఉప్పుకయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనాలు
- 14.4 రొయ్య, చేపల పిల్లల ఉత్పత్తి
- 14.5 వర్షరీ పాలన
- 14.6 ఉప్పు కయ్యల రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయం
- 14.7 సముద్ర జంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు
- 14.8 మసల్ సంవర్ధనం
- 14.9 అయిస్టర్ సంవర్ధనం
- 14.10 క్లామ్ సంవర్ధనం
- 14.11 ముత్య సంవర్ధనం
- 14.12 ద్వీకవాట సంవర్ధన సంస్థలలోని సమన్యలు, అవరోధాలు
- 14.13 మీన సంవర్ధనము
- 14.14 సముద్ర కలుపు మొక్కల సంవర్ధనము
- 14.15 సారాంశం
- 14.16 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 14.17 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

14.1 ఉద్దేశ్యం

ఉప్పు టేళ్ళలో, రొయ్యల, చేపల పెంపకం, అల్పిప్ప, అయిస్టర్, క్లామ్ సంవర్ధనాలేకాక, ముత్యాల పరిశ్రమ, సముద్రకలుపు మొక్కల పెంపుదల గురించి ఈ పాఠంలో చర్చించాము.

14.2 ఉపోద్ఘాతం

ఉప్పు కయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనం వశిమ బెంగాల్, కేరళ రాష్ట్రాలలో సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తోంది. ఈ పద్ధతిలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే చేప పిల్లలను బంధించి, వాటిని బాగా పెంచి, కొవ్వు పట్టేటట్లు చేస్తారు. సముద్రపొంగులో వచ్చే నీటిని ఆశయాలలో నిలువచేసి అందులో పెంచుతారు లేదా పంట పొలాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి.

ఇందులో కొన్ని ముఖ్యలోపాలు ఉన్నాయి. మనకు అత్యంత కావలసిన జాతుల పిల్లలు చాలా వృధా పోతాయి. అవసరం లేని జాతులు అధికంగా చేరతాయి. ఇక దిగుబడి గురించి అంచనాలు వెయ్యలేము. మొత్తానికి తక్కువగా లభ్యం అవుతాయి.

ఎఫీఎస్, మె. డాబ్ల్యు. మె. బ్రెవికార్నిస్, పారా వెనియూప్స్ నైలిఫెరా. పా. స్కల్ ఫైలిస్, పా. హార్ట్ వైకె. అయితే ప్రీతిపాత్రమైనవి మాత్రం రెండే రెండు. పులిరొయ్య వెనియన్ మోనోడాన్, తెల్లరొయ్యలు వె. ఇండికన్.

ఫిన్ ఫిష్ జాతుల్లో ఉష్ణకయ్యల సంవర్తనానికి పిలుగా ఉండే జాతులు చానాన్ చానాన్, ముజిల్ నెపాలన్, లిజాటాడ, లి. పార్సియా లి. మూక్రోటెఫిస్, లాటిన్ కాల్యారి ఫెర్, మెగాలాప్పు సీషినాయిడిస్, ఎలాప్సోసారస్, ఎట్రోప్లస్ సురతెన్నిస్.

14.4 రొయ్య, చేపల పిల్లల ఉత్పత్తి

మన దేశంలో తీరప్రాంత జలజంతు సంవర్తన చర్యలు ముమ్మరంగా జరపడానికి తగినంతగా రొయ్యలు, చేపల పిల్లలు లభ్యం కావాలి. వీటిని సహజ సిద్ధ వాతావరణంలోంచి సేకరించవచ్చు, లేదా నియంత్రిత పరిస్థితుల్లో హోవరీలలో వాటిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఉష్ణకయ్యలలోని, ఈ రొయ్య చేపల పరిశ్రమ మన దేశానికి సంబంధించి ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే పిల్లల మీదనే ఆధారపడి ఉంది.

వాణిజ్యరీత్యా ముఖ్యమైన పినియడ్ రొయ్యలు సముద్రంలో వేరు వేరు మట్టాలలో పిల్లలను పెడతాయి. పినియడ్ గుడ్డు నుంటి సంతానోత్పత్తి నాలుగా ముఖ్యమట్టాల ద్వారా జరుగుతుంది. వీటిని నాప్లియన్, జోయియా, మైసెన్, డింభక పరదళ అంటారు. సాధారణంగా వీటిలో 6 నాప్లియన్ 3 జోయియా, 3 మైసెన్ ఉపదళలను గుర్తించారు. వైవక సమూహ వలసలలో భాగంగా ఈ డింభక పరదళలు తీరం వెంబడి ఉష్ణకయ్యలలోకి ప్రవేశిస్తాయి. తగిన జీవావరణ సౌలభ్యం వాటికి ఇక్కడ లభిస్తుంది. వాటి పెరుగుదలకు ఇవి చేపనారు మడుగు లేదా తగిన నర్సరీలుగా ఉపయోగపడతాయి. డింభక దళలు నుంచి జువెనైల్ దళలవరకూ ఈ నర్సరీ ప్రాంతాల నుంచి వాటిని సేకరించి జలజంతు సంవర్తనంలోని “విత్తనాలు” గా ఉపయోగించడం ఈ సందర్భంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

అయితే రొయ్య “విత్తనాలు” లభ్యంకావటం, అధిక సంఖ్యలో ఉండడం అనేది అనేక జీవావరణ సంబంధ పదార్థ సంబంధ విషయాల మార్పుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విషయాలు నెలెనెటి, ఉష్ణోగ్రత, వర్షాలు, నదులనుంచి నీటి ప్రవేశం, ప్రవాహవేగం, లోతు, వైవకజీవులు, చాంద్రమాన మార్పులు, కాలాలు, ఋతువులు, మాన్ గ్రోవులు, బురదగట్లు కాలుష్యం మొదలైనవిగా ఉంటాయి.

పెనియన్ మోనోడాన్ పరడింభకాలు, పిల్లలు (జువెనైల్ దళలు) పశ్చిమ బెంగాల్ హుగ్లీ-మట్లా నది ముఖద్వారాలతో సంవత్సరం పొడవునా విస్తృతంగా దొరుకుతాయి. ఏప్రిల్, మే, అక్టోబరు, నవంబరులో ఉన్నత దళకు చేరుకుంటాయి. మిడ్నపూర్ షూటింగ్ నెట్లు ఉపయోగి అధిక సంఖ్యలో ఈ విత్తనాలు సేకరిస్తారు. కాకినాడ అఖాట్ వద్ద ఈ రొయ్య పరడింభకాలు జువెనైల్ దళలు సంవత్సరం పొడవునా లభ్యమవుతాయి. మే, జూలై, సెప్టెంబరు, డిసెంబరులో అధిక సంఖ్యలకు చేరుకుంటాయి. కాకినాడ వద్ద, ఆటుపోటు తక్కువ వైశాల్యంలో ఉండి, నీటివేగం అకారణంగా తక్కువగా ఉండటంవలన, మాన్ గ్రోవులు పొదల రూపంలో ఉండి, జీవావరణ పద్ధతి అనుకూలంగా ఉన్నందున, చేతి వలతోనే పులిరొయ్య విత్తనాలను సేకరించటం చాలా వీలైన పద్ధతి. కాకినాడ వద్ద పెనియన్ ఇండికన్ విత్తనాలు కూడా సంవత్సరం పొడవునా లభ్యం అవుతాయి. ఏప్రిల్, జూన్ కాలం, అగష్టు, సెప్టెంబరు కాలంలో వీటి లభ్యత అధికస్థాయికి చేరుకుంటుంది. హుగ్లీ-మట్లా నది ముఖద్వారాలలోను పులికాట్ సరస్సులోను వె. ఇండికన్ అధికలభ్యత జనవరి, మార్చి, అగష్టు నెలల్లో ఉంటుంది.

చనాన్ చనాన్ పాలచేప, చిరుచేపలు తూర్పు తీరంలో శ్రీకాకుళం నుంచి తూర్పు గోదావరి ద్వారా నెల్లూరు జిల్లా వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లభ్యం అవుతాయి. తమిళనాడులో పొంబన్, రామ్ నాడ్ జిల్లాలు వీటికి ప్రసిద్ధమైన సేకరణ కేంద్రాలు. పశ్చిమ తీరంలో మలబార్, దక్షిణ కెనరాలలో లభ్యం

అవుతాయి. కాకినాడ ప్రాంతంలో చ. చనాన్ మార్చి జులై కాలాల్లో మాత్రం లభ్యం అవుతాయి. అధిక సంఖ్యకు చేరుకోడం ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ నెలలో జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి అక్టోబరు నుంచి డిశంబరు ప్రారంభంవరకూ తగుమాత్రపు సంఖ్యలో అధిక లభ్యతస్థితికి చేరుకుంటాయి. లోతుతక్కువగా ఉండే ఆటూపోటు ప్రాంత పిల్లకాలువలలోకి పాలచేప, చిరుచేప దశలు అత్యధిక సంఖ్యలో గుంపులుగా రావడానికి కుతూహలం చూపుతాయి. డ్రాగ్ నెట్ తో వీటిని నేకరించడం చాలా వీలుగా ఉంటుంది. గ్రేమల్లెట్ ముజిల్ సెఫాలన్ చేప చిరుచేప దశలు కాకినాడ వద్ద నవంబరు నుండి డిశంబరు వరకు కొద్దికాలం అత్యధిక సంఖ్యలో దొరుకుతాయి. మిగతా మల్లెట్ల విత్తనాలు కూడా కాకినాడ దగ్గర ఏడాది పొడవునా లభ్యమవుతాయి. ఏప్రిల్-జూన్, నవంబరు-డిశంబరులలో వతాకస్థాయిలో దొరుకుతాయి. భక్తి చేప లోట్స్ కాల్యారిఫెర్ చిన్న వయసులోనివి కొద్ది సంఖ్యలో కాకినాడ దగ్గర అక్టోబరు నుంచి నవంబరు వరకు దొరుకుతాయి.

విస్తృత స్థాయిలో రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయంలో సహజ సిద్ధంగా లభ్యమయే విత్తనాల మీదనే నిత్యం ఆధారపడలేము. ఋతువ్రభావం వలన వీటి లభ్యత అటూఇటూ ఉంటుంది. అందువల్ల నియంత్రణ స్థితిలో వీటి విత్తనాలు నేకరించటం ఒకటే సమ్మతంగా వీటిని అందిస్తుంది. నియంత్రణ వద్దతుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి పెంచనుద్దేశించిన చేప, రొయ్యల జాతుల విత్తనాలను, అభివృద్ధి చెయ్యడం హాచరీ వద్దతులను అనుసరించటం, మన దేశంలో ఇటీవలనే మొదలైంది.

ప్రకృతి సిద్ధంగా అయితే పినియడ్ రొయ్యలు పూర్తి తైంగిక పరివక్షతను పొందడం, ప్రత్యుత్పత్తి ప్రారంభించడం సముద్రంలోనే జరుగుతుంది. రొయ్యలు తైంగిక పరివక్షతను పొందే వయసు జాతి నుంచి జాతికి మారుతుంది.

పెనియన్ మోనోడాన్ 5-15 నెలల వయసులోను పె. ఇండిక్ 4-6 నెలల వయసులోను పరివక్షత చేరుతాయి.

గుడ్లు పెట్టే రొయ్యలు నేకరించగానే హాచరీ (చేపనారు మడుగు) కార్యక్రమాలు ఆరంభం అవుతాయి. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయి పరివక్షంగా ఉన్న రొయ్యలను కాని, పైక్రియను గురిచేసిన రొయ్యలను కాని హాచరీలో గుడ్లు పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు.

కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవం పురస్కరించుకొని, హాచరీ వ్యవస్థలను స్థూలంగా రెండు వద్దతులుగా చెప్పవచ్చును : (1) జపనీస్ మాన్ కల్చర్ వద్దతి. పెద్ద సిమెంటు కాంక్రీటు బాంకులు కొన్నిటిలో ఒకేసారి గుడ్లు పెట్టే కొన్నిటి ద్వారా గుడ్లు పెట్టనివ్వడం, వాటిలోని సముద్రజలాలలో వీటికి అహారంగా ఉపయోగపడే జంతువులను ఎదగనిస్తారు. (2) అమెరికాలోని గార్లెస్టన్ ప్రయోగశాలలోని బంధిత చక్ర హాచరీవద్దతి చిన్న చిన్న ఫైబర్ గ్లాస్ బాంకుల్లో గుడ్లు పెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. డింభకాల పోషణకి బాహ్యం నుంచి సజీవ అహార జీవుల సంవర్ధనాలను వేరుగా పంపిణీ చేస్తారు. భావత దేశంలో ఈ గార్లెస్టన్ వద్దతికి కొద్దిగా మార్పులుచేసి హాచరీవ్యవస్థల ద్వారా పినియడ్ డింభకాల విస్తృత ఉత్పత్తి కొనసాగిస్తున్నారు.

కాలుష్యరహితమైన శుభ్రమైన సముద్రజల ఆవశ్యకత హాచరీల స్థాపనలో చాలా అవసరం. ఋతు సంబంధమైన గుణాత్మక లక్షణాల తేడాలు చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఇక హాచరీని సక్రమంగా నడపడానికి మంచిసిటి జల ఆవశ్యకత ఉంటుంది. తగిన రోడ్డు సదుపాయాలు, విద్యుత్ సరఫరా జనరేటర్ ఉండాలి. గుడ్లు పెట్టే చేపలు రొయ్యలు, విషయం సరేసరి. డింభకాల పెంపకంలో తైలతాకిడిలేని గాలి, గాలివంపులు లేదా బ్లోయరుల ద్వారా ఎయిర్ స్ట్రవ్ల సహాయంతో మంచిగాలి సరఫరా సదుపాయం చూడాలి. నీరు బాగా సరఫరా కావాలి. మన దేశంలో ఈ సంబంధంగా 300 లీటర్ల కేపాసిటీగల స్థాపకార పాస్టిక్ పూల్లు 1.75 నుండి 10-5 టన్నుల వరకూ భిన్న ప్రమాణాల కొలతలుగల గుండ్రని లేదా నలుచదర ప్లాస్టిక్ పాత్రలు, ఫైబర్ గ్లాసుతో చేసిన స్థాపకార పాత్రలు ఉపయోగిస్తారు. వీటికి దిగువ శంకువు ఆకారంలో నిర్మించబడిన భాగాలుంటాయి. వీటి ద్వారా నీరు, వినర్దన వదార్దాలు బయటకు పోతాయి.

కుంటలో ఎరువులు వేయడంవల్ల తక్కువ ఖర్చుతో చేపల అధిక ఉత్పత్తిని సాధించవచ్చు. చేపల ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారం ప్లవక జీవులు. ఎరువులు వేయడంవల్ల ప్లవక జీవులు చాలా వృద్ధి చెందుతాయి. పోషక పదార్థాల సమృద్ధి, ఉష్ణం, వెలుతురు, సూర్యరశ్మి ఇవన్నీ ఉండేచోట ప్లవక జీవుల వృద్ధి బాగా జరుగుతుంది. సత్రజని, ఫాస్టర్స్ పోటాషియం వంటి ప్రాథమిక పోషక పదార్థాలు అన్ని కుంటల్లోను లభిస్తాయి, కాని వీటి పరిమాణం మట్టుకు మారుతూ ఉంటుంది.

కుంట అడుగు దాని ఉత్పాదకతను నిర్ధారిస్తుంది. ఎరువులలోని పోషక పదార్థాలను కుంట అడుగులో ఉండే బురద గ్రహించి క్రమంగా వాటిని నీళ్లలోకి పంపిస్తుంది. ప్లవక జీవులు ఈ పదార్థాలను వినియోగించుకొని వృద్ధి చెందుతాయి.

వివిధ రకాల కార్బానిక్, అకార్బానిక్ ఎరువులను వాడుతారు. చేపకుంటకు వాడే సాధారణ కార్బానిక్ ఎరువులు- పశువుల వేడ, పండుల, కోళ్ల ఎరువులు, కుళ్ళిన ఆకులు తీగలు మొదలగునవి కంపోస్ట్ ఎరువులు ఇవ్వు పట్టు ఏకంగా లేదా పశువుల వేడతో కలిపి భారతదేశంలో ఉపయోగిస్తారు.

ఎక్కువగా ఆకార్బానిక్ ఎరువులు-యూరియా, అమోనియమ్ సల్ఫేట్, క్యాల్షియమ్, అమోనియం నైట్రేట్, సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మొదలైనవి.

కుంట ఉత్పాదకతను నిర్ణయించడంలో నేల ప్రాధాన్యం ఉంది. భారతదేశంలోని నేలలను, గులక నేలలు, నల్లరేగడి నేలలు, ఎర్రనేలలు, బంకమట్టి నేలలు అడవి నేలలు, ఎడారి నేలలు, ఉప్పుక్షార నేలలు (చవిటి), వీట్ నేలలు అని వినిమిది వర్గాలుగా, విభజించినారు.

(N.P.K. 6-8-4) 50 కి.గ్రాంలు సమవాయుదాల్లో నెలకొకసారి వేయాలి. అమోనియం సల్ఫేట్, సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, క్యాల్షియం, అమోనియం నైట్రేట్లను 11:5:1 నిష్పత్తిలో మిశ్రమం చేసి సంవత్సరానికి పాత్రారుకు 1000-1500 కి.గ్రా. వేయాలి. లేదా నేల రకాన్ని బట్టి వీటి నిష్పత్తిని మార్చాలి.

12.7.4 చిరుచేపలను నిలువకుంటలో విడవటం

నిలువ కుంటలో 100-150 మి.మీటర్లు చిరుచేపలను పెంచుతారు. నిలువ కుంటలో భక్షక చేపలు లేకుంటే 75-100 మి.మీ. చిరుచేపలను ఆరోగ్యంగా ఉండే వాటిని, పరాన్నజీవులకు గురికాని వాటిని ఎంపిక చేయాలి.

నిలువ కుంటలో బహుళజాతి చేపలను పెంచుతారు. అనువైన బహుళజాతి చిరుచేపలను ఎంపికచేసి చేపల దిగుబడిని పెంచవచ్చు. చిన్న ఆహార సంకెళ్ళున్న చేపలు శాకాహార ప్లవకాహార, సర్వభక్షక, డిట్రైటన్ ఆహార చేపలు పెంపకానికి ఎంపిక చేసుకోదగినవి భారతదేశంలో చేపల పెంపకానికి (కట్ల కట్ల) రోహా (లేబియోరోహిట) మ్రెగాల (సిరినా మ్రెగాలా), వెండికార్ప్లు, గడ్డికార్ప్లు, గడ్డికార్ప్లు సామాన్య కార్ప్లను ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తారు. కాలబను, గోరామి, మంచినీటి రొయ్యలన (మైకో-బ్రేకియమ్ రోసేన్ బర్గి, మై. మ్యూమ్ సోని) పై చేపలతోబాటు పెంచుతారు. నోటాప్టెరన్ చితాల, ముస్టన్ సింగాలను కూడా పెంచుతారు. నోటాప్టెరన్ చేపలను ధక్షక భట చేపలంటారు. కారణం ఇవి నిలువకుంటలోని మిన్నోలను, ఇతర భక్షక చేపలను తింటాయి.

బహుళజాతి చిరుచేపలను సరయిన నిష్పత్తిలో తీసుకున్నట్లయితే సజాతి, విజాతి పోరాటం తగ్గి అన్ని చేపలు సక్రమంగా ఎరుగుతాయి. బహుళజాతి చిరుచేపలు ఎంపిక వాటి గిరాకీప బట్టి మార్కెట్ కు యోగ్యమైన చేప పరిమాణాన్నిబట్టి, పెంపకం కాలాన్నిబట్టి ఉంటుంది.

12.7.5 అదనపు ఆహారం

నిలువకుంటలో పెరిగే అదనపు ఆహారం ఇవ్వటం భారతదేశంలో ఈ మధ్యనే మొదలయింది. చేపల అధిక ఉత్పత్తికి ఇదొక ముఖ్య సాధనం. అదనపు ఆహారం ఇవ్వటంవల్ల ఎక్కువ చిరు చేపలను

పెంచవచ్చు. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహార వనరులను బాగా వినియోగించుకోవచ్చు. ఉపయోగం కాకుండా మిగిలిన ఆహారం కుంటలో ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. అదనపు ఆహారం చిరు చేపలకు ఇవ్వగా, తేలికగా జీర్ణమయ్యేదిగా అధికశక్తినిచ్చేదిగా, చౌకలో ఎక్కువ పరిమాణంలో లభించేదిగా ఉండాలి.

వృక్ష సంబంధమైన ఆహారం, తప్పుడు, గోధుమతపుడు, సోయాచిక్కుడు, మొక్కజొన్న, నూనె పిట్టలు, ఓట్లు, చెట్ల వేళ్ళు, ఆకులు, గడ్డిమొక్కలు, కందమూలాలు ఇవన్నీ అదనపు ఆహారంగా పనికి వస్తాయి. జంతు సంబంధమయినవి ఎండిన చేపలు, తాజా సముద్రపు చేపలు, చేపఆహారం, చిన్న నూనపు ముక్కలు, రక్తం, వట్టు పురుగుల పూపాలు, పీతలు, నత్తలు మొదలైన వాటిని ఇవ్వవచ్చు. విటమిన్లను కూడా అదనపు ఆహారంలో చేర్చాలి.

వృక్షసంబంధమయిన అదనపు ఆహారాన్ని నూరి, నానబెట్టి లేదా ఉడికించి తయారు చేయాలి.

అదనపు ఆహారాన్ని ఉదయం వేళలో ఇవ్వాలి. ఆహారాన్ని కుంట అంతటా చల్లకుండా నిర్దేశిత స్థలాల్లోనే, ట్రేలోగాని, చిల్లల సంచులలోగాని ఉంచాలి. ఆహారాన్ని అవసరమైనంత మేరకే ఇవ్వాలి. తరువాత రోజుకు ఆహారం ఇచ్చేలోపుగా క్రితం రోజు ఇచ్చిన ఆహారం వినియోగం అయ్యేటంత మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఆహారం ట్రేలను, సంచులను అప్పడప్పుడు పరిశీలించి అందులోని ఆహారం పాడవకుండావాటిని ఇతర స్థలాలకు మార్చాలి. శైవల గుచ్చాలున్నపుడు ఆహారాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలి. గడ్డి కార్ప్ల కిచ్చే నీటి కలుపు మొక్కలను ఇతర ఆహారపు గడ్డి మొక్కలను పెదురు బొంగులనుపయోగించి నీటిలో తేలియాడేటట్లు చేయాలి.

12.7.6 ఆరోగ్య పరిరక్షణ

నిలువ కుంటలలో ఎక్కువ చిరుచేపలను పెంచేటప్పుడు అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కార్ప్చేపల పెంపకంలో వ్యాధులవల్ల చనిపోయే వాటి సంఖ్య చాలా తక్కువ. వత్తిడి వల్ల, వాటిని ఘోరముగా కదపటంవల్ల అవి వ్యాధులకు గురికావచ్చు. ఈ వ్యాధులను పెన్సిలిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్ వంటి జీవనాశక మందులను ఉపయోగించి నయం చేయాలి.

సున్నం ఉపయోగించి కుంటలను శుభ్రంగా ఉంచడమే కాకుండా వ్యాధినిరోధక వర్తతులను అవలంబించాలి. పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ (20 పి.పి.యమ్) లేక ఫార్మలిన్ (250 పి.పి.యమ్) ద్రావణంలో చేపలను ముంచి తీయటంవల్ల వ్యాధికారక జీవులు చచ్చిపోతాయి. తరుచుగా చేపల ఆరోగ్య పరిస్థితి కనిపెట్టి తక్షణ నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

12.7.7 పేకరణ

నిలువ కుంటలలో చిరుచేపల దిగుబడి తగ్గుముఖం పట్టకముందే ఎదిగిన చిరుచేపలను కుంట నుండి తీయాలి. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొనే శక్తి కుంటలకు కొంతవరకు ఉంటుంది. చేప వయస్సు మిరుతున్న కొద్దీ పెరుగుదల రేటు తగ్గిపోతుంది. వివిధ రకాల చేపలకు వేరువేరు పెరుగుదల రేటు ఉంటుంది. ఇంతకాకుండా ఒకేజాతి చేపలు వేరువేరు పెరుగుదలలను చూపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా విచక్షణతో వ్యవహరించి కుంటనుండి చేపలను తీసి అమ్మివేయాలి.

బహుశ జాతి చేపల సంబంధ బాంధవ్యాలను దృష్టిలో నుంచుకొని చేపలను తీయాలి. ఉదాహరణకు కుంట అడుగున జీవించే సామాన్య కార్ప్లు, మ్రెగాల్లు, గడ్డికార్ప్ల మలవిసర్జనాల మీద కొంతవరకు ఆధారపడతాయి. గడ్డికార్ప్లను ముందుగానే తీసేనట్లయితే అడుగున జీవించే చేపలకు ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది.

చేపల పరిమాణానికి వినియోగదారులు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యం ఆర్థిక అంశాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక కిలోగ్రాం లోపుగా ఉండే చేపల అమ్మకం ధర ఒక కిలోగ్రాంవైన, రెండు కిలోగ్రాములున్న చేపల ధరకంటే ఎక్కువ రావచ్చు. ఈ అంశం కుంటలలో నిలువ ఉండే కాలంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

సంవత్సరానికి కొకసారి మొత్తం చేపలను తీయడం యోగ్యంగా ఉంటుంది. నిలువ కుంటలనుండి పాక్షికంగా కొన్ని చేపలను తీయవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడంవల్ల సంవత్సరంలో అమ్మకానికి వచ్చే రెండు వంటలు తీయవచ్చు. పెట్టుబడి మీద తొందరగా లాభం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాని దీనికి సంవత్సరం పొడవునా చిరుచేపల లభ్యంకావాలి.

లాగుడు వలల వల్లగాని, నీటిని తీసివేసిగాని పెద్ద జలాశయాల్లోనయితే మొప్పవలలను, విసురు వలలను ఉపయోగించి చేపలను పడతారు. చాలా లోతైన పెద్ద కుంటల్లో నీటిని తీయరాదు. ఉపరితలంలో జీవించే చేపలను లాగుడు వలల ద్వారా పట్టవచ్చు. అడుగున నివసించే చేపలు నీటితోరావు. సాంప్రదాయక లాగుడువలలతో 20-40% అడుగున జీవించే చేపలు మాత్రమే వస్తాయి. ఈ వలలకు సంచులు నిర్మించి మొత్తం చేపలను పట్టవచ్చు.

మార్కెట్లో గిరాకీనిబట్టి చేపల దిగుబడిని సాందించితే మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది.

కార్ప్ చిరుచేపలు ఒక సంవత్సరంలో కిలోగ్రాంపైగా పెరిగి వినియోగానికి సిద్ధమవుతాయి. శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు ద్వారా సంవత్సరానికి హెక్టారుకు 4000 కి.గ్రాంలు భారతీయ పెద్ద కార్ప్లను, 200 కి.గ్రా. విదేశీయ కార్ప్లను, 10,000 కి.గ్రాంపైగా ముఖ్యమైన భారతీయ పెద్ద కార్ప్ల, విదేశీయ కార్ప్ల మిశ్రమ పంట దిగుబడి సాధించడం జరిగింది. ఈ పెంపకంలో 80% పైగా చిరుచేపలు జీవించి ఉన్నాయి.

ఆధునిక నిర్వహణ పద్ధతులలో విచక్షణాత్మకంగా చేపల పెంపకాన్ని చేపట్టి మంచి లాభాలను పొంది దీన్ని ఒక ఆకర్షణీయమైన వృత్తిగా నిరూపించవచ్చు.

స్వపరిశీలన

1. కార్పుచేపలకు, హానికలిగించు శత్రుచేపలు _____ మొదలైనవి.
2. _____ మొదలైన శైవలాలు చాలా ప్రమాద కరమైనవి. చేపలను ఆకస్మాత్తుగా చంపివేస్తాయి.

12.8 సారాంశము

చేపకుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులను గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. శాస్త్రీయ పద్ధతులలో చేపకుంటల నిర్వహణ విధానము చేపలు ఆరోగ్యముగా పెరుగుటకు చాలా అవసరము అలాగే చేపిల్లల నిలువ విధానమును గూడ ఇక్కడ వివరించబడినది. మన కుషయుక్తమైన చేపలను పెంపక ప్రకుంటలలో, వానికి హానికరమైన ఇతర చేపల, నీటి పురుగుల, నీటి మొక్కల నిర్మూలనా విధానములను గురించి కూడ ఇక్కడ వివరించబడినది.

12.9 స్వపరిశీలన-జవాబులు

1. చన్నా, అనబాస్, వల్లాగో, క్లేరియస్
2. స్పైరోగైరా, పిటోఫోరా, మైక్రోస్పెర్మ్

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. నర్సరీ కుంటల్లో గుడ్డు చేపలను విడిచే ముందు తీసుకోవలసిన నిర్వహణ పద్ధతులు తెలుపుము.
2. నర్సరీ కుంటలో అదనపు ఆహార ప్రాముఖ్యం.

3. నర్సరీ కుంటలో గుడ్డు చేపలు విడిచిన తరువాత నిర్వహణ పద్ధతి.
4. నిలువ కుంటలో నీటి కలుపు మొక్కల నివారణ తెలుపుము.
5. నిలువ కుంటలో ఎరువుల వాడకంపై చర్చించుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేపల పెంపకం కుంటల శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతుల స్థూల అంశాలేవి?
2. పోషణ కుంటలో పసి చేపల విడవడం గుర్చి వ్రాయుము.
3. నిలువ కుంటల నిర్వహణ
4. కుంటలో సున్నం వేయుటం.
5. కుంటల భావశక్తి అంటే ఏమిటి?

12.11 పదకోశం

ఆక్రిడ్	:	చేరు
ఎరోబిక్	:	జీవక్రియలకు స్వేచ్ఛా ఆక్సిజన్ గ్రహించడం
ఆల్గల్ బ్లామ్	:	శైవలాలను గుచ్చు - తేలియాడే (ప్లవక) శైవలాలు సమృద్ధిగా నీటి తలంమీద ఏర్పడి పచ్చగా కనిపించడం
అల్లినైడ్	:	శైవల సంహారక పదార్థము
అల్కలైనిటి	:	క్షారత - 7 కంటే పాచ్చు పి.హెచ్ కలగడం.
అనేరోబిక్	:	వాయురహిత శ్వాసక్రియ
ఎనయాన్	:	రుణ విద్యుత్ కలిగిన అయాన్లు
అప్టిబాడిస్	:	ప్రతి రక్షకాలు - ప్రోటీన్ అణువులు రక్తంలో ఉండి భాక్షిరి యాని ఎదుర్కొంటాయి.
ఎపథీ	:	నిర్లక్ష్యము
ఆటోక్టోనస్	:	లోపలి కారకాల కారణం.
బాక్ వాటర్స్	:	ఉప్పులేరు, సముద్రం నుండి లోతట్టు తీర ప్రాంతాలకు అలలవల్ల చేరే ఉప్పునీటి ప్రాంతం.
బెర్మ్	:	కుంటగట్టు మీది భాగం. పునాది మధ్యన ఉండే సన్నని మార్గం.
బయోమాస్	:	జీవరాశి ఒక నీటి ప్రాంతంలో గుణాత్మకంగా ఉండే జంతు వృక్షసమూహం.
బ్రాకెష్ హెటర్	:	ఉప్పుకయ్య, మంచినీరు, ఉప్పునీరు మిశ్రమం 30/1000 కంటే తక్కువ ఉప్పుదనం
బ్రూడ్ షిప్	:	లైంగిక పరిపక్వతకు చేరిన చేప (చేపల పాలమ్లలో)
కారాపెన్	:	పుష్క ఫలకం - శిరోవృక్షం మీది బాహ్య అస్థిపంజరం

మిశ్రమ పెంపకానికి యోగ్యమైన చేపజాతులలో భారతీయ పెద్దకార్ప్ లైన కట్ట, రోహా, మ్రిగాల్, చెనా వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్, ఇండోనేషియా ఉపజాతి అయిన సామాన్యకార్ప్. వీటి ఆహారపు అలవాట్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి.

కట్ట, వెండికార్ప్ రెండూ ఉపరితల ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తాయి. మొదటిది జంతుప్రకారము, రెండవది వృక్షప్రకారము ముఖ్యంగా భక్షిస్తాయి. రోహా నీటికాలం (Column) ఆహార సేకరణ చేస్తుంది. ఎక్కువగా ఇది వివిధరకాల శైవలాలను కుళ్ళుతున్న న్యూక్లియస్ సంపదను భుజిస్తుంది. గడ్డికార్ప్ తిండిపోతు. వివిధరకాల నీటి స్తూలవృక్ష సంపద, నేలమీది గడ్డి గానం (వశువుల మేతకువాడేది) దీని ఆహారం. మ్రిగాల్ ఆడుగున నివసించేది. కాబట్టి సగం కుళ్ళిన వృక్షపదార్థాలను, చెత్తాచెదారాన్ని ముఖ్యంగా తింటుంది. సామాన్యకార్ప్ సర్వభక్షి. సాధారణంగా అడుగులోని పదార్థాలను కుంట అంచులలోని పదార్థాలను, తీసుకొంటుంది. 100 మి.మీ పరిమాణంతో ఉండే చిరుచేపలను మిశ్రమ చేపల పెంపకం వ్యవస్థలో విడువచ్చు.

సామాన్యంగా చేపల మిశ్రమ పెంపకం మూడువిధాలు: భారతీయ పెద్దకార్ప్లు కట్ట, రోహా, మ్రిగాల్ల సంవర్ధనం, విదేశీయ కార్ప్లు, వెండికార్ప్, గడ్డికార్ప్ సామాన్యకార్ప్ల సంవర్ధనం, భారతీయ విదేశీయ కార్ప్లు ఉమ్మడి సంవర్ధనం.

3:3:4 నిష్పత్తిలో కట్ట, రోహా, మ్రిగాల్ పెంపకం సర్వసాధారణం, బహుపురాతన పద్ధతి కట్ట రోహా, మ్రిగాల్ మిశ్రమ నిష్పత్తిని వరసగా 4:3:3 లేదా 3:4:3 గా మార్చి కుంట పాక్టారుకు 3000 నుండి 3500 వరకు వాటి చిరుచేపలను వదలినట్లయితే దిగుబడి పెరుగుతుంది. విదేశీయ కార్ప్ల మిశ్రమ సంవర్ధనంలో వెండికార్ప్ గడ్డికార్ప్. సామాన్యకార్ప్లను వరసగా 4:2:3 లేదా 3:1:2 నిష్పత్తిలో పాక్టారుకు 3700 నుండి 5000 వరకు చిరుచేపలను విడుదల చేసినట్లయితే వేటి ఉత్పాదక శక్తి భారతీయ కార్ప్లకంటే ఎంతో అధిగమించుతుంది.

అదనపు ఆహారసరఫరా మిశ్రమ సంవర్ధనవ్యవస్థలో ముఖ్యమైన నిర్వహణచర్య. తవుడు, వేరుశనగ లేదా అవాలనూనె పిట్టులను అదనపు ఆహారంగా ప్రతిరోజూ 1:1 చేపబరువునిష్పత్తిలో, చేపల నిలువ పంట బరువుకు 1-2 శాతం రేటులో ఇవ్వాలి. చేపల అవసరాలకు, వాటి పెరుగుదల, నీటిసరిస్థితిని గమనిస్తూ తదనుగుణంగా అదనపు ఆహారం పరిమాణాన్ని తడవలను మార్చుతుండాలి. గడ్డికార్ప్లకు తగినంతగా నీటి కలుపు మొక్కలైన ప్లాడ్డిల్లా, కారా, లెమా, సిరటోఫిల్లమ్లను లుసర్ని, నేపియర్, పారా, మొదలైన నేలమీది మేతగడ్డిని సరఫరా చేయాలి. కుంటలో పాతిన బొంగుగడల వేదికమీది ఈనీటిమొక్కలను గడ్డిని ఉంచినట్లయితే గడ్డికార్ప్ ఆహారసేకరణ రేటు పెరుగుతుంది.

మిశ్రమ పెంపకం ద్వారా చేపల అధికోత్పత్తి శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులపై ఆధారితమై ఉంటుంది. కేవలం భారతీయ పెద్దకార్ప్ల దిగుబడి పాక్టారుకు 2,193 నుండి 2975 కి.గ్రాంల వరకు ఉంటుంది. దీని గరిష్ఠ దిగుబడి 16 నెలలకు పాక్టారొకంటికి 5564 కి.గ్రాంలు. విదేశీయ కార్ప్లనే కేవలం సంవర్ధించడంవల్ల వచ్చిన దిగుబడి పాక్టారుకు 2,909 నుండి 3,287 కి.గ్రాంలు ఒక సంవర్ధరానికి.

భారతీయ విదేశీయ కార్ప్ల మిశ్రమ సంవర్ధం వ్యవస్థవల్ల సాలీనా పాక్టారుకు 2900 నుండి 4200 కి.గ్రాంలు. ఇది మొట్టమొదటి సంవత్సరాల ప్రయోగాలలో ప్రయోగాల అనుభవంతో కుంటనిర్వహణ పద్ధతులలో మార్పు తేవడంవల్ల క్రమంగా చేపల దిగుబడి పాక్టారుకు సాలీనా 6053 నుండి 9389 కి గ్రాంలకు పెరిగింది.

మిశ్రమ సంవర్ధనంలో సాంకేతికంగా లేబడిన అసాధారణమైన వృద్ధి కార్ప్ పసిచేపలను నిలువ చేసి ఉపయోగించుకోవడం. కార్ప్ పసి చేపలను పాక్టారుకు 8000 నుండి 10,000 వరకు సంఖ్యాపరంగా ఉండే అతి సాంద్రతస్థితిలో నిలువ ఉంచగలిగినారు. వీటి నుండి పాక్టారుకు సంవత్సరానికి 10,194 నుండి 10,677 కి.గ్రాంల చేపల ఉత్పత్తి నమోదు చేసినారు.

పెట్టుబడి:

	రూ లు
కుంట అద్దె	2,000.00
కుంట తయారీ	1,000.00
చేపనారు (7,500-1,00,000 పసి చేపలు)	3,000.00
నీకరణ ఖర్చులు	600.00
మొత్తం పెట్టుబడి	6,600.00

రాబడి:

దిగుబడి హక్కుదారుకు 1,000 కి.గ్రాంల చొప్పున	
కిలోకు రూ.9 చొప్పున నికరాదాయం	9,000.00
వ్యాపార నిర్వహణలో నికర ఆదాయం	2,400.00
వ్యాపార నిర్వహణ ఆదాయం, నికర ఆదాయం మధ్య నిష్పత్తి	26.6%

సంకేతికంగా మిశ్రమ చేపల పెంపకంవల్ల వ్యవసాయదార్లకు హక్కుదారుకు 4000 నుండి 6000 కి.గ్రాంల వరకు దిగుబడి లభించింది. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలో అతిగా జరిగే ఖర్చులు అదనపు ఆహారానికి సంబంధించినవి. మొత్తం ఖర్చులో దీని శాతం 60 కంటే మించుతుంది. ఈ వర్ణంలో ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగినా లాభాలు కూడా ఎక్కువే. 5 కి.గ్రాం చేప బరువు ప్రమాణంగా తీసుకొన్నట్లయితే దానికి అయ్యే ఉత్పత్తి ఖర్చు రూ 4-5 మాత్రమే కాగా మరో విధంగానయితే ఈ ఖర్చులు 9 నుండి 12 రూపాయల వరకు పోతాయి.

13.4 సమగ్ర చేప సంవర్ధనం-జంతు సంవర్ధనం వ్యవస్థలు

సమగ్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అదర్శప్రాయమైనవి, రైతులు వీటిని సులభంగా అర్థం చేసుకొని అమలు చేయగలుగుతారు. మిశ్రమ సంవర్ధన వ్యవస్థలు శక్తిదాయక ఆహారాన్ని ఉత్పాదించే వ్యవస్థలు. పరిభ్రమణంవల్ల కార్బానిక్ వ్యర్థపదార్థాల నుండి ప్రోటీన్లను తిరిగి పొందడం చేత ఒక ప్రమాణిక ప్రాంతంలో జరిగే ఉత్పాదకత ఇంకా హెచ్చుతుంది. సమగ్ర సంవర్ధన పరిష్కారం ఒక స్వయం సమృద్ధి వ్యవస్థ. దీని నిర్వహణలో సమయానుకూలంగా వేయవలసిన పదార్థాల కొరత సమస్య ఏర్పడదు. జంతు మలినాల అక్రమ వినియోగంవల్ల ఏర్పడే కాలుష్యాన్ని పరిభ్రమణ వ్యవస్థ ద్వారా తొలగించవచ్చు. మిశ్రమ పెంపక వ్యవస్థంవల్ల ఏడాది పొడవునా కుటుంబానికి ఉపాధి రాబడి సౌకర్యాలు లభించి సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి జరుగుతుంది.

13.5 చేప-బాతుల సంవర్ధనం

పెంపకంలో కోళ్ల తరవాత భారతదేశంలో రెండవ స్థానం బాతులది. తక్కువ నీటి వనరుల పరిస్థితులలో బాతులు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి. బాతుల శరీర ఆరోగ్యానికి, పెరుగుదలకు నీటి పరిసరాలు అవశ్యకం. భారత్, చైనా, మధ్య యూరప్ దేశాలు శతాబ్దాల తరబడి నీటి వనరుల సమీపంలో సాంప్రదాయకంగా పెంచుతున్నారు. కాని ఇటీవల వరకు చేపల ఉత్పాదకతపై వీటిది లాభకర ప్రభావం ఉంటుందని తెలియదు.

తమ ఆహారమైన మలస్కెలను, కప్పలను, చిరుకప్పలను, దోమ, ఇతర కీటకాల డింభకాలను, నీటి కలుపు మొక్కలను కుంట నీటిలో బాతులు అన్వేషించి, తినడంవల్ల చేపలకు పనికిరాని జీవరాశిని నిర్మూలించినట్లు వుతుంది. ఈ చర్య సహజంగా కుంటలో పెరిగే ఆహారాన్ని వృద్ధి చేసే పెంపుడు

7. మాక్రోబ్రాకియమ్ రోసెన్ బర్గ్ సంవర్ధనాన్ని, నారు ఉత్పత్తి రాయుము.
8. మా.మూల్కంసోని పెంపక విధానాన్ని తెలుపుము.
9. గాలి పీల్చే చేపల నారును పెంచే పద్ధతులను విశదపరచుము.
10. మరైల్ల సంవర్ధనం గురించి రాయుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మిశ్రమ చేపల పెంపకంలో నీటి నిర్వహణ.
2. మిశ్రమ పెంపకంలో భారతీయ విదేశీయ కార్పాల ఆహారపు అలవాట్లు.
3. మిశ్రమ మత్స్య సంవర్ధన వ్యవస్థలో జాతులకలయిక.
4. మిశ్రమ సంవర్ధన కుంటల్లో చేపల ఉత్పత్తి.
5. సాంప్రదాయ చేపల పెంపకంలో ఆర్థిక విశ్లేషణ.
6. సమగ్ర వ్యవస్థల లాభాలు.
7. కోళ్ల రెట్టలలోని ఎరువు నిలువలు.
8. గోదావరి నదిలో మా.మూల్కంసోని ప్రజననం.
9. భారతీయ ప్రముఖ వాణిజ్య గాలిపీల్చే చేపలు.
10. క్లారియన్ బ్రూకన్ సంవర్ధనం.

భాగం-14 తీరప్రాంత జల సంవర్ధన, సముద్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు

విషయక్రమం

- 14.1 ఉద్దేశ్యం
- 14.2 ఉపోద్ఘాతం
- 14.3 ఉప్పుకయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనాలు
- 14.4 రొయ్య, చేపల పిల్లల ఉత్పత్తి
- 14.5 నర్సరీ పాలన
- 14.6 ఉప్పు కయ్యల రొయ్యల, చేపల వ్యవసాయం
- 14.7 సముద్ర జంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు
- 14.8 మసల్ సంవర్ధనం
- 14.9 అయిస్టర్ సంవర్ధనం
- 14.10 క్లామ్ సంవర్ధనం
- 14.11 ముత్య సంవర్ధనం
- 14.12 ద్వీకవాట సంవర్ధన సంస్థలలోని సమస్యలు, అవరోధాలు
- 14.13 మీన సంవర్ధనము
- 14.14 సముద్ర కలుపు మొక్కల సంవర్ధనము
- 14.15 సారాంశం
- 14.16 స్వపరిశీలన - ఐహాబులు
- 14.17 మూదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

14.1 ఉద్దేశ్యం

ఉప్పుటేళ్ళలో, రొయ్యల, చేపల పెంపకం, ఆల్పిప్స, అయిస్టర్, క్లామ్ సంవర్ధనాలేకాక, ముత్యాల పరిశ్రమ, సముద్రకలుపు మొక్కల పెంపుదల గురించి ఈ పాఠంలో చర్చించాము.

14.2 ఉపోద్ఘాతం

ఉప్పు కయ్యలలో రొయ్య, చేపల సంవర్ధనం పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ రాష్ట్రాలలో సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తోంది. ఈ పద్ధతిలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే చేప పిల్లలను బంధించి, వాటిని బాగా పెంచి, కొవ్వు పట్టేటట్లు చేస్తారు. సముద్రప్రాంతంలో వచ్చే నీటిని ఆశయాలలో నిలువచేసి అందులో పెంచుతారు లేదా పంట పొలాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి.

ఇందులో కొన్ని ముఖ్యలోపాలు ఉన్నాయి. మనకు అత్యంత కావలసిన జాతుల పిల్లలు చాలా వృధా పోతాయి. అవసరం లేని జాతులు అధికంగా చేరతాయి. ఇక దిగుబడి గురించి అంచనాలు వెయ్యలేము. మొత్తానికి తక్కువగా లభ్యం అవుతాయి.

భాగం-15 మత్స్య పోషణ, ఆరోగ్యస్థితి పరిశీలన పోషణ అవసరాలు, అదనపు ఆహార సదుపాయాలు

విషయక్రమం

- 15.1 ఉద్దేశ్యం
- 15.2 ఉపోద్ఘాతం
- 15.3 పోషక పదార్థాల అవసరాలు
- 15.4 జంతుప్రోటీనులు
- 15.5 సారాంశం
- 15.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 15.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

15.1 ఉద్దేశ్యం

చేపలకు కావలసిన మౌలిక ఆహార పోషణ అవసరాల గురించి ఈ భాగం చర్చిస్తుంది. ఇందులో ఆహార పదార్థాల జీర్ణ లక్షణం, ఉపయోగకర లక్షణాల గురించి చర్చించడం జరిగింది. వివిధ రకాల అదనపు పోషక పదార్థాల వివరాలు ఉన్నాయి. అదనపు ఆహార పదార్థాల ఎంపికలో ఉండే కారకాలు, ఆహార పదార్థాలు గ్రహించిన తరువాత ఏ రేటులో చేప శరీరంలోకి అవగాహన అవుతాయో చర్చించాము. ఈ అదనపు ఆహారాల తయారీ వివరాలు కూడా ఈ భాగంలో ఉన్నాయి.

15.2 ఉపోద్ఘాతం

మానవుడు సరస్సుల్లోను, చెరువుల్లోను తన ఆహారం కోసం చేపలను పెంపొందించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాల సందర్భంగా, వీటికి సంబంధించిన, మౌలిక ఆహార పోషణ అవసరాల గురించి, తెలుసుకోవలసి వస్తోంది. ఈ ఆవరణలలో చేపలను అత్యధికంగా పెంచుకోవడంలో కొన్ని ఆశయాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక మన ప్రమాణం తీసికొంటే, అందులో చేపలు సాధ్యమైనంత అధిక సంఖ్యలో ఉండాలి. దీనికి కావలసిన పోషకాలూ, మల్టిపుల్ స్టాకింగ్ జనాభాను తగిన విధంగా మల్చుకోవడం వంటి చర్యలు తీసికోవాలి. అలా చేపల పెంపుదల చర్యల పరిస్థితులలో జీవావరణలో నున్న సహజ ప్రోటీనులతో నున్న ఆహార జీవులు అభివృద్ధి చెందుతున్న బయోమాస్‌కు సహజ సిద్ధంగా నున్న ప్రోటీనులు చాలవు. ఆ పరిస్థితులలో అదనంగా ప్రోటీనులు పుష్కలంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు చేర్చాలి. ఇక మానవుల ఆహార పోషణ సందర్భంగా ప్రోటీన్ పదార్థాల అవసరాలు. పోటీ అధికంగా ఉన్నందు వల్ల ఇలా పెంచే అన్ని చేపలకి అలాంటి ఆహారం ఇవ్వడం అనేది ఆర్థిక దృష్ట్యానుంచి ఆలోచనగా తీవ్రం. కొన్నికొన్ని ఆహార పదార్థాలు మానవులు తీసికోరు వృక్షప్రోటీన్లు, చెడిపోయిన ఆంజులు, ఎందుగడ్డి, తినగా వినర్డించిన ఆహార తునకలు, పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలు, ఏకకణ ప్రోటీనులు మొదలైన వాటిని చేపలకు ఇవ్వాలి. చేపల పంటలను క్రమంగా అభివృద్ధి చేసికొన్న సందర్భాలలో ఇలాంటి పదార్థాలను ఉపయోగించుకోవడం మంచిది. వీటితో కృత్రిమ ఆహార పదార్థాలను కొన్ని ప్రయోగాలకు గురి చేసి తయారు చేసికోవచ్చు.

- iii) గోధుమ తాడు, వరి తాడు, లువైన, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న, రై, బార్లీ, మొదలైన గింజ ఆహార పదార్థాలు (గ్రెయిన్ ఫాదర్)
- iv) చేప పిండి, ఉష్ణ రక్త జంతువుల నుండి సేకరించిన తాజా మాంసము, రక్తము, కోడిగుడ్డు, రొయ్యలు, పీతలు, ఆల్బిన్లు, గవ్వలు, మొదలైన జంతు సంబంధ పదార్థాలు,
- v) విటమిన్లు, ఖనిజ పదార్థాలు వంటి అదనపు చేరిక ఆహార పదార్థాలు,

చేపలు సరాసరిగా చెరువుల్లో ఎరువుగా వేసిన వేడను కూడా తీసుకొంటాయి, ఇక వీటిలో ఏవి ఎన్నుకోవాలో చాలా రకరకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఆవి:-

- i) చేపకు ఇష్టంగా ఉండాలి.
- ii) సులభంగా జీర్ణం అవాలి.
- iii) అధిక మార్పిడి విలువ ఉండాలి.
- iv) సులభంగా తీసికోగలిగి ఉండాలి.
- v) అధికంగా లభ్యం కావాలి.
- vi) చాలా కాలం నిలువ ఉండాలి.
- vii) చవకగా లభ్యం కావాలి.

వీటన్నిటిలోకి చేపలు వీటిని సులభంగా గ్రహిస్తాయి. వీటి కన్వర్షన్ నిష్పత్తి ఎలాఉంటుంది. వాటి ఖరీదు ఎలా ఉంటుందా అనేవి ముఖ్యమైనవి. అది అన్ని నిలువలు కలిగిన సమ తూక పదార్థంగా ప్రోటీన్, క్రొవ్వు పదార్థాలు, పిండి పదార్థాలు, ఖనిజాలు విటమిన్లు కలిగి ఉండాలి.

ఆహార కన్వర్షన్ ఆధారపడి విషయాలు :

- i) ఇచ్చిన అదనపు ఆహార గుణాత్మక విలువ.
- ii) చెరువులో చేపలు నిలువలో ఉన్న సంఖ్యలక్షణం.
- iii) చేప జనాభాలోని నిలువలో పరిమాణం వరుస.
- iv) ఉష్ణోగ్రత ఆక్సిజన్ టెన్షన్, నీటి pH విలువ మొదలైన అవరణకారకాలు
- v) పోషక పదార్థాలు వాటిని తగినంతలో అన్ని ప్రాంతాలకు సరఫరా అయేటట్లు చూసే పద్ధతి.

కొన్నింటి కన్వర్షన్ రేటు సరళంగా ఉంటుంది. ఆయా పరిస్థితులను బట్టి వాటిని గుండ్ర గాచెయ్యడం లేదా నీటిలో నానవెయ్యడం లేదా ఎండబెట్టడం, ఉడకబెట్టడం జరుగుతుంది అయితే కేక్లు చాలాగట్టిగా ఉంటాయి. అందువల్ల చేపలు వాటినిసామాన్యంగా కొద్ది కొద్దిగా తీసికొంటాయి. గింజలయితే చాలా కాలంపాటు నానవేసి, చేపలకివ్వ దంతుంచిది. జంతువుక్షపదార్థాలు కుళ్ళిపోకుండా వాటిని వండడం అవసరం అవుతుంది.

భారతదేశంలో అదనపు ఆహారపదార్థాలు చేపలున్న సరస్సుల్లోకి వేయడం ఒక అధునికపద్ధతి అన్ని నిరకాల చేపలు పెంచే షక్తులలో ఆయిల్ కేక్ (ఉదాహరణకు మస్టర్డ్ ఆయిల్ కేక్), వరితాడు, లేదా గోధుమతాడు 1:1 నిష్పత్తిలో ఈచేపలకు ఆహారగ్రహించే దానిమీద ఆధారపడిఉంటుంది. నీటికలుపు మొక్కలని గ్రాస్కార్ప్కు తినగలిగినంత ఇవ్వాలి. చెరువులో అధికంగా ఆల్గల్ మొక్కలు అభివృద్ధిచెందుతున్న షక్తులలో అదనపు ఆహారపోషణని నిలిపిమెయ్యాలి. అదేవిధంగా ఆక్సీజన్ తగ్గిపోయినాసరే చెయ్యాలి.

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, సరస్సుల్లో చేపల పెంపకం విషయంలో అధునాతన పద్ధతుల్లో ఆహారం ప్రారంభించారు. సామాన్యంగా ఆహార పదార్థాలను సరస్సు మొత్తంమీద చల్లనవనరంలేదు. కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలలో వాటిని వుంచితేచాలు లేదా వాటిని పశ్చాత్తాపంపాటిలోవుంచి అక్కడక్కడ 3,4 స్థలాల్లో ఉంచవచ్చు. ఈవిధంగా ఉన్న ఆహారకేంద్రాలని అప్పుడప్పుడూ పరీక్షిస్తూవుండాలి. వాటిని మార్చాలి. ఈ స్థలమార్పిడివల్ల కుళ్ళడం నిరోధించబడుతుంది. నీటికలుపు, ఆకులు, గడ్డివంటి

వ్యక్తసంబంధమైన పదార్థాలను గ్రాస్ కార్ప్ కు వేసినప్పుడు వాటిని వెదురుబద్దలతో దీర్ఘచతురస్రాకారంలో చేసిన చట్రాలలో తేలేటట్లుచేయాలి. వీటిని అడుగున పాతిన కర్రలకుకట్టాలి. దీనివల్ల ఆకులపంటిప దార్థాలు చెరువుమీద తేలకుండా నిరోధించడమౌతుంది. ఆహారాన్ని ఉదయ కాలాల్లో ఇవ్వడంమంచిది. ఎందువల్లనంటే జీర్ణక్రియకు ఆక్సిజన్ అవసరమౌతుంది. జీవక్రియకు కూడ ఆక్సిజన్ అవసరం ఆధికం అవుతుంది. ఈవిధంగా అదనంగా కావలసిన ఆక్సిజన్ వగటిపూట అధికంగా ఉండడం జరుగుతుంది.

ఉష్ణప్రాంతాలలో ఈఅహారం ఇవ్వడం సంవత్సరం పొడవునా జరుగుతుంది. కాని సమశీతోష్ణమండలాలలో పరిమాణము కూడా చలికాలాలలో ఉష్ణోగ్రత తగ్గినప్పుడు తగ్గిస్తారు.

స్వపరిశీలన

1. చేపలు, మొక్కలలోని _____ చాలా శక్తి వంత మైన జంతు మాంస కృత్తులుగా మార్చును.
2. చేపమీల్ (Fish meal) లో సరియైన బల వర్ధకరమైన మాంసకృత్తులు అనేక _____ లను కలిగి యుండును.

15.5 సారాంశము

చేపలకనసరమైన పోషకాహార పదార్థములను గురించి ఇక్కడ వివరించ బడినది. చేపల కువయోగవడే వివిధరకముల ఆహార పదార్థములను గురించికూడా ఈ భాగంలో వివరించ బడినది.

15.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు

- 1) జీవ మాంసకృత్తులను
- 2) అమైన్ అసిడ్లు

15.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేపలయోగ్యమౌలిక ఆహారపోషణ విషయ పరిజ్ఞానమీద కృత్రిమాహార పదార్థాల ఉత్పత్తి వివిధంగా ఆధారపడేవుంటుంది.
2. చేపల ప్రోటీన్ అవసరాలగురించి వర్ణించుము.
3. చేపలకిచ్చే అదనపు ఆహారాలలోని రకాలను తెల్పుము. వీటి ఎంపికలోనున్న ముఖ్యకారకాలను ఇయ్యవలసినది.
4. కన్వర్షన్ రేట్ ఏకారకాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్ని ఆహారపదార్థాల కన్వర్షన్ రేటుగురించి వ్రాయుము.
5. అదనపు ఆహారాలతయారీ ప్రయోగములలో వివిధరకాలు ఉదహరించుము.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. కార్బోహైడ్రేటులు, 2. కొవ్వుపదార్థాలు, 3. అదనపు ఆహారాలలోనిరకాలు 4. అదనపు ఆహార పదార్థాల ఎంపికలోని కారకాలు 5. అదనపు ఆహారాల ప్రయోగం, లేదా చేపలకు అంధివ్యధంలోని పద్ధతులు.

భాగం-16 చేపల రోగాలు, కారణాలు అదనపు చర్యలు

విషయసూచిక

- 16.1 ఉద్దేశ్యం
- 16.2 ఉపోద్ఘాతం
- 16.3 చేపల రోగాలలో రకాలు
 - 16.3.1 బాక్టీరియా, వైరల్ రోగాలు
 - 16.3.2 ఫంగల్ రోగాలు
 - 16.3.3 ప్రోటోజోవా వల్ల వచ్చే రోగాలు
 - 16.3.4 పురుగులువల్ల వచ్చే రోగాలు
 - 16.3.5 మొప్పపుల్లాక్ డాక్టిలోగ్రస్ వల్ల వచ్చే జబ్బు
 - 16.3.6 సాంగ్విని కొలారక్తపుల్లాక్ కారణంగా ఏర్పడ్డరోగాలు
 - 16.3.7 అకాంతోసెఫాలస్లవల్ల వచ్చు రోగాలు
 - 16.3.8 క్రష్టేషియన్స్ వల్ల వచ్చు రోగాలు
 - 16.3.9 జీవావరణ జబ్బులు
 - 16.3.10 పోషకరోగాలు
- 16.4 సారాంశం
- 16.5 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 16.6 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

16.1 ఉపోద్ఘాతం

ఈ భాగంలో చేపల వివిధ రోగాల గురించి చర్చించాము. జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థల్లో ముఖ్యంగా కనబడే సామాన్య రోగాలు ప్రస్తావించాము. ఈ రోగాలకు గల కారణాలు కూడా ఉదహరించాము. ఈ రోగకారకక్రిములు, లక్షణాలు చికిత్స విషయాలు కూడా ఉన్నాయి.

16.2 ఉపోద్ఘాతం

వివిధ రోగాలు, సాంక్రామికరోగాలు, అసాంక్రామిక రోగాలు.

పరాన్నజీవులు వైకల్పిక లక్షణం కలిగి ఉండవచ్చు లేదా శాశ్వత లక్షణం కలిగి ఉండవచ్చు.

రోగాలు సంక్రమించడానికి సోకడానికి అనువైన పరిస్థితులు, ఒత్తిడి (స్ట్రెస్) పరిస్థితులు.

బాక్టీరియా, వైరల్ రోగాలు కారణాలు, లక్షణాలు, చికిత్స

ఫంగల్ రోగాలు, కారణాలు, లక్షణాలు చికిత్స

పోటోజోవా వలనవచ్చు రోగాలు, కారణాలు, అక్షణాలు, చికిత్స

వర్ష (పురుగులు) వలన వచ్చు రోగాలు, కారణాలు, అక్షణాలు, చికిత్స

క్రస్టేషియన్స్ వల్ల వచ్చు రోగాలు, కారణాలు, అక్షణాలు, చికిత్స.

జీవావరణ రోగాలు, కారణాలు, అక్షణాలు, తగు ముందు జాగ్రత్తలు.

పోషణసంబంధ రోగాలు, కారణాలు, అక్షణాలు, తగుముందు జాగ్రత్తలు.

16.3 చేపల రోగాలలో రకాలు


రోగాలను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చును. ఒకటి అంటురోగాలు, సూక్ష్మక్రిములు, అయిన పోటోజోవా, బాక్టీరియా, ఫంజై, వైరస్లు కారణంగా ఇవి ఏర్పడతాయి. క్రిములు కారణంగా కాక పోషణ లోపాలవల్ల, మరియు పదార్థాలవల్ల, అక్సిజన్ సరిగా అభించక పోవడంవల్ల మరొక రకం వ్యాధులు సమకూరుతాయి.

పరాన్న జీవులు వైకల్పిన్ లేదా అల్లిగేట్ అక్షణం కలిగి ఉంటాయి. వైకల్పిన్ పరాన్నజీవులు ప్రకృతిలో స్వతంత్రంగా నివసిస్తాయి. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో చేపలను పరాన్నజీవులు చేరవచ్చు. ఇలాటివాటికి మంచి ఉదాహరణ, మాంసాహార ప్రోటోజోవన్ ట్రెటావైమెనావైరి ఫెర్రిస్, వృంత అక్షణ ప్రోటోజోవన్ ఎపిస్టైలిస్. ఈ రెండుపరాన్న జీవులు ప్రకృతిలో స్వతంత్ర జీవనం గడపవచ్చు. ముఖ్యంగా జీవసంబంధ కాలుష్యం అధికంగా ఉన్న జలాలలో, అక్కడినుంచి చేప శరీరాలలోకి ప్రవేశించి చెప్పుకోదగిన నష్టాన్ని కల్గించవచ్చు. శాశ్వత పరాన్నజీవులు తమ సంతానోత్పత్తికి పోషకజీవి ఉనికి కోరుకుంటాయి. ఉదాహరణగా ఇక్టియోత్తయిరియస్ మూల్టివయిలిస్, కాస్టియ, మోనోజెనటిక్ ట్రిమూల్డెలు.

రోగం వ్యాప్తి చెందడానికి ఒక్కొక్క ఘనప్రమాణంకల సీటిలో తగినన్ని చేపలు రోగబారినదే అక్షణం కలవి ఉండాలి. ఈ క్రిమికూడా తగినసంఖ్యలో ఉండాలి. తరచుగా కొన్ని అనుకూల జీవావరణ కారకాలు (స్ట్రెస్సారులు) అవసరమౌతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే రోగం ప్రారంభం అవుతుంది. చేపలు కిక్కిరిసి ఉంటే చేపలకు రోగక్రిములకు మొట్టమొదటి భేటికి మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అంతేగాక పరాన్నజీవి త్వరితగతిలో ఆ చేపల సమూహంలో వ్యాప్తి చెందు తుంది. ఒక్కొక్కచేపలో ఈ విధంగా ప్రవేశించిన పరాన్నజీవి అనూహ్యసంఖ్యలోకి పెరిగిపోవడానికి ఎక్కువకాలం పట్టదు. ఒత్తిడి కారణంగా చాలా బాక్టీరియల్ రోగాలు, బాహ్య ప్రోటోజోవన్ రోగాలు వ్యాప్తిచెందుతాయి. ఒకానొక ఒత్తిడిపరిస్థితి ఏర్పడింది అనుకొందాం. హార్మోనులు అస్తవ్యస్త పరిస్థితికి చేరుకుంటాయి. బాక్టీరియా నిత్యం జలాలలో ఉంటాయి. వీటిని నిగ్రహించుకునే సహజశక్తిని ఇప్పుడు చేప కోల్పోతుంది. చేపల సమర్థత లోపిస్తుంది. బాక్టీరియా సందర్భంగా వాటికుండే నిరోధకశక్తి లోపిస్తుంది.

ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ అనేది జంతువుల రక్షణవ్యవస్థకు సంబంధించినది. దీనివలన ప్రత్యేకంగా ఏఒక్క రోగాన్ని మాత్రమే ఇది నిరోధించుకోగలుగుతుంది ఇమ్యూన్ లేదా వ్యాధి నిరోధకవ్యవస్థ సమర్థత లోపించడానికి కొన్ని భిన్నపరిస్థితులు కలసి కారణమౌతాయి. చేప తెల్లకణాలపటిమ తగ్గిపోతుంది. ఈ కణాలు బాక్టీరియాలు పోగాటిసైడ్ చేస్తాయి. ప్రతి రక్షకాలు ఉత్పత్తితగ్గిపోతుంది. [బాక్టీరియాను సంహరించడానికి తెల్లరక్తకణాలకు సహాయంగా రక్తంలో ఉండే ప్రత్యేక ప్రోటీనులను ప్రతిరక్షకాలు అంటారు].

16.1. పంటలో ఒక సామాన్య చిత్రం ఉంది. వత్తిడి ప్రాముఖ్యాన్ని వివరిస్తుంది. జీవావరణంలో తక్కువగాఉన్నా లేకపోయినా ఇవి రోగాలను కలుగజేసే పరాన్నజీవులకు వాహక జీవులుగా పనిచేస్తాయి.



పటం 13.1.

చేపల ఉత్పత్తికి ఉన్నత లక్షణాలుకల నీటిసరఫరా అతిముఖ్యం. నీటి సరఫరా సమృద్ధిగాఉండే చాలా సమస్యలు తీరిపోతాయి. చేపలు ముమ్మరంగా సాగుబడికి గురిఅయిన స్థితుల్లో నిలువనీటిని పల్చగాచేసి విషపదార్థ ప్రభావాలని తగ్గించివేస్తుంది. నీటి అవసరాలు కూడా తగినవిధంగా ఉంటాయి. పోషణలో తగినన్ని ప్రోటీనులు లేకపోతే పెరుగుదలరేటు తగ్గిపోతుంది. సంతానోత్పత్తి మందగిస్తుంది. అంటురోగాలకు ఎక్కువగా లోబడిపోతాయి. చేపల ఆహారంలో పోషక విషపదార్థాలు కూడా ఉండవచ్చు. ఇవి రావడానికి కారణాలు వేరే ఉండవచ్చు. ఆహారానికిపట్టిన సూక్ష్మక్రిముల ద్వారా ఇవి ఏర్పడవచ్చు. ఆహార తయారీలో ఉపయోగించినముడిసరకుల నాణ్యత తగ్గిపోవచ్చును. నిలువచేసిన కారణంగా ఆహార పదార్థాలలోని భాగాలు విచ్ఛిన్నం కావచ్చును.

16.3.1 బాక్టీరియా, వైరల్ రోగాలు

కార్ప్ చేప సోకుడు అబ్జామినల్ డ్రాప్స్ : కార్ప్ సంవర్తనంలో ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక భయంకరవ్యాధి. అక్రోమోనస్ (నూడోమోనస్) వంట్లటా దీనికి ప్రాథమిక కారణం. చేప ఆరోగ్యవర్ధిల్లి, పరిసరాలు ఇందులో ఇమిడిఉన్నాయి. ఈ రోగంరావడానికి ఇవేకారణం. వీటివలన అనేక శరీర ధర్మ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.

బాహ్యలక్షణాలను బట్టిచూస్తే రెండురకాల అబ్జామినల్ డ్రాప్స్ ని గుర్తించవచ్చు. మొదటిది పేగులకు సంబంధించినది. రెండవది అల్బర్ లక్షణం కలది. పేగులకు సంబంధించిన దానిలో పొట్టు ఉబ్బిపోతుంది. వస్తువుపచ్చ లేదా పింక్ రంగుద్రవం శరీరకుపొరంలోకి చేరటంవలన ఇలా జరుగుతుంది. అల్బర్ లేట్స్ వర్ణతిలో శరీరం మీద రక్తంతోకూడిన ప్రాంతాలు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ కండరాలు బాగా దెబ్బతినవచ్చు. వాజాలు కొన్ని సందర్భాలలో పాక్షికంగా నాశనంకావచ్చు.

చికిత్స

(a) ముందు జాగ్రత్త చర్యలు: రోగనివారణ (ప్రోఫిలాక్టిక్) చర్య వలన మరణాల రేటుకొంతవరకు తగ్గుతుంది. చేపశక్తినిహరించే అన్ని చర్యలు నిలువచేయాలి. చాలాకాలం నిలువ చెయ్యడం, అనవసరంగా వాటిని తాకుతూ ఉండడం సహజ ఆహారలోపం మొదలైనవి కలుగనియ్యకూడదు. రోగం కనబడిందా అంటే ఆచనిపోయిన చేపని జాగ్రతగా తీసివేసి, నశింపచేయాలి. చెరువుఖాళీచేసి, దానిని ఎండనిచ్చి, క్రిమిసంహారక చర్యలు తీసికోవాలి దీనికి క్వీక్ లైమ్ ఉపయోగించవచ్చు. చెరువులో ఎరువులు బాగావేసిన తరువాతనే స్టాకింగ్ చేయాలి. సహజసద్దాహారం అభివృద్ధిచెందడానికి తగినంత వ్యవధి కల్పించాలి. ఋతువులో ముందుగానే కృత్రిమ ఆహారాన్ని మంచి లక్షణాలు, వాసికలవాటిని సరఫరా చెయ్యాలి. అందువలన అధిక ప్రమాదంలేకుండానే చేపలు ఈగడ్డుకాలాన్ని గట్టెక్కుతాయి. వేరే సంతానానికి చెందిన చేపలను కలువకూడదు. ప్రతిక్షేత్రంలోనూ డ్రాప్స్ ని నిరోధించుకోగల చేపలను ఎంపికచేసి వాటినే పెంచే ప్రయత్నం చేయాలి.

(b) చికిత్సా చర్యలు : స్టాకుచేసినతర్వాత చేపలు రోగలక్షణాలు పెంపొందించుకొన్నా, అంటురోగం సంభవించే ప్రమాదంఉన్నా అంటిబయోటిక్సును వాడాలి. ఆహారంలో కలిపికాని సూదిద్వారాకాని

అది సాధించవచ్చు. ఆక్స్‌మోనన్ వంట్లాకు తగినమందు క్లోరాంఫనికాల్. సోకినక్రిమి దీనిని పోలిన ఇతర బాక్టీరియా అయినపుడు ఆక్స్‌ట్రెట్రాపైక్టిన్ నెస్టోమైసిన్ బాగా పనిచేస్తాయి. సూది శరీర కుహరంలోకి ఇవ్వాలి. దీని నిష్పత్తి పనికాల్‌కు సంబంధించి చేప వ్రతి 100 గ్రా.ల బరువుకు 1 నుంచి 1.5 మి.గ్రా. ఇవ్వాలి. కావలసిన క్లోరాం ఫనికాల్‌ను 1 -2 మి. లీటర్ల నీటిలో కరుగబెట్టివెయ్యాలి. అంటిబయోటిక్స్‌ను ఆహారంతో కలిపి వేయవచ్చును. అయితే 100 గ్రా. బరువుచేప రోజుకి 1 మి.గ్రా మందును తీసికోగలిగినట్లు చూడాలి. ఈ పద్ధతి అబ్జామినల్ డ్రాప్స్‌లో అల్పరేటివ్ పద్ధతికి ఉపయోగించాలి.

వైరల్ హెమరేజ్ సెప్టికెమియా

(VHS) : ఇదొక వైరల్ జబ్బు. ఇది గుప్తంగా ఉన్నవక్షంలో దానిని తెలిసికోవడం చాలాకష్టం. దీర్ఘకాల రోగంగా మారే అవకాశం ఉంది. మార్డూనికి ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నట్లే ఉండి, అకస్మాత్తుగా మరణానికి గురిఅవుతాయి. పరిసరాలలో మార్పువచ్చినా చేపలను అనవసరంగా తాకడం వట్టుకోవడం చేసినా ఇది జరుగుతుంది. దీర్ఘకాలరోగంగా మారిందా అంటే నెలలతరబడి నిలిచిపోతుంది. చేపల్లో పెరుగుదల కనపడక చిన్నవిగా ఉండిపోతాయి. చాలా వైరల్ రోగాల మాదిరిగానే ఒకసారి ఒక అవయవం మరొకసారి మరొక అవయవం దీనికి గురి అవుతాయి. అయితే తరచుగా కాలేయము మూత్రలు పిండాలు దీనికి లొంగిపోతాయి. మొట్టమొదటిసూచన నిర్లక్ష్యం. ఎక్కువగా తిరగడం మానివేస్తాయి. ఒడ్డుకుదిరిదాపుల్లో నేలమీద విశ్రాంతి తీసుకొంటూ ఉంటాయి. ఈదేయా అంటే చురుకుగా తిరిగినా ఒక క్రమంలేకుండా కదులుతాయి. నీటిలో వాటిస్థితి వింతగా గోచరిస్తుంది. కళ్ళు ఉబ్బిపోతాయి. రక్తహీనత గోచరిస్తుంది. హెమోగ్లోబిన్ రేలు పడిపోతుంది. మొప్పలు పాలిపోతాయి. చనిపోయాక పాలిపోయిన ఊదారంగులో ఉంటాయి. పొట్ట ఉబ్బిపోతుంది. శరీరకుహరంలో వాసనకొట్టే పసుపుప చ్చుద్రవం చేరుతుంది. పాయువు బయటకు చొచ్చుకు వస్తుంది. కండరాలమీద, వాయుకోశంమీద కొద్దిగా హెమోరేజ్ లు కనబడతాయి. పేగులు ఎర్రబడతాయి. వాచిపోతాయి. కండరాలలో ఎడిమా ఉండవచ్చు. వాణాలు చిందర వందర అవుతాయి. చర్మంమీద పుండ్లు కనబడతాయి.

చికిత్స: ప్రస్తుతానికి VHS కి తగినచికిత్స లేదు. జబ్బుపడినచేపని వేరుచేసి చనిపోయినవాటిని, ప్రమాదస్థాయిలో ఉన్నవాటిని తీసివేయాలి. చెరువులను క్రిమినంహారక ద్రవ్యాలకు గురిచెయ్యాలి. తగినంత నీటిసరఫరా అందియ్యాలి. చేపలు క్రిక్కిరిసి పోయేటట్లు ఉంచకూడదు. కావలసిన దానికన్నా అధికంగా ఆహారం అందించకూడదు. ఆహారంలో విటమినులు, ప్రోటీనులు సమృద్ధిగా ఉండాలి. కాని క్రొవ్వు పదార్థాలు మితంగా ఉండాలి. జబ్బు దీర్ఘక్షణం ఉన్నదిగా (క్రానిక్) కనబడితే ఆహారం ఇవ్వడం తాత్కాలికంగా నిలుపు చేయాలి. ఆ తరువాత క్రమంగా తేలిక ఆహారం ఇవ్వాలి. ఇందులో అన్నిరకాలు ఉండేటట్లుగా చూచుకోవాలి.

ఇన్ ఫెక్టివ్ పాంక్రియాటిక్ నెక్రోసిస్ (IPN) : ఈ వారన్‌వలన అకస్మాత్తుగా విస్తృతంగా చిన్నచేపలు మరణిస్తాయి. ఇది కృత్రిమ ఆహార పోషణ ఆరంభమైన మొదట్లో వస్తుంది.

లక్షణాలు : ఈ రోగంబారిన పడ్డ చేపలు వాటి దీర్ఘక్షణంమీద గుండ్రంగా తిరుగుతాయి. ఇటుఅటు వేగంగా ఈదుతాయి. ఇందులో ఒకపద్ధతి కనబడదు. ఆతరువాత ఒడ్డునగాని చెరువు అడుగునకాని కదలకుండా పడిపోతాయి. కళ్ళు ఉబ్బిపోతాయి. జీర్ణాశయంలోను వేగుల్లోను తెల్లని చిక్కనిద్రవం వేరుకొని పోతుంది. కాలేయం, ప్లీహం పాలిపోయిన పిత్తాశయం విపరీతమైన నెక్రోసిస్ కి గురి అవుతాయి.

ఫరంకులాసిస్ : ఫరంకులాసిస్ ఒక బాక్టీరియా వ్యాధి. దీనికి ఆక్స్‌మోనన్ కారణము. జీర్ణనాశంధ్వారా కాని చర్మంలోని చిన్న చిన్న గాయాల ద్వారాగాని ఇది వ్యాపిస్తుంది. ఈ బాక్టీరియా రక్తంలోను, కాలేయంలోను, ప్లీహంలోను, మూత్రపిండాల్లోను అత్యధికంగా సంతానోత్పత్తి జరుపుకొంటుంది. ఈ జబ్బువలన అతిత్వరలోనే అధిక సంఖ్యలో చేపలు మరణిస్తాయి.

అక్షణాలు : చర్మంమీద రక్తంతోకూడిన పుండ్లు రకరకాల సైజుల్లో ఏర్పడతాయి. చర్మం దిగువ చిన్న చిన్న కాయల మాదిరిగా ఏర్పడతాయి. జీవసంబంధ పదార్థం చేరి చెడిపోయిన సీటితో ఈ జబ్బు తరుచు సోకుతుంది.

చికిత్స : రోగం కనపడిన చెరువులను మిగతావాటితో సంబంధం లేకుండా చూడాలి. చనిపోయిన చేపలని తీసివేసి, నశింపజేయాలి. చెరువులు ఖాళీచేశాక వాటిని క్రిమి సంహారక పదార్థాలకు గురిచేయాలి. క్వీక్ లైమ్ కాల్షియమ్ సయనైడ్ కాని, ఉపయోగించవచ్చు. జబ్బు గుప్తస్థాయిలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వాటిని తాకూకూడదు. పరిసరాలలో అకస్మాత్తుగా మార్పు తీసికొని రాకూడదు. సోకుడు ప్రమాదం ఉందనితోస్తే న్యచ్చమైన జలాలతో నిండిన చెరువుల్లో వీటిని సాకాలి. ఉష్ణోగ్రత చాలా అధికంగా ఉండకూడదు. కరిగిన ఆక్సిజన్ స్థాయి అధికంగా ఉండాలి.

ఫరంకులాసిన్ చికిత్సకు సల్ఫానమైడ్లు, నైట్రోపురాన్లు, అంటిబయోటిక్లు ఆహారంలో కలిపి ఇవ్వాలి. జబ్బు అక్షణాలు కనబడగానే వీటిని ఇవ్వాలి.

16.3.2. ఫంగల్ రోగాలు (బూజు జబ్బులు)

సాప్రోలెగ్నియా సోకుడు : దీనిని సీటి బూజు అంటారు. ఇది అక్లేయా సాప్రోలెగ్నియా ప్రజాతుల ఫంగస్ వల్ల వస్తుంది. చేపలు గాయాలు వాతపడి, నీరసమై, జబ్బు అక్షణాలు పెంపొందించుకొని, లేదా చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఫంగస్ సీటిలో జీవ సంబంధ పదార్థాలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు కనబడుతుంది. అమాధ్యం వీటి అభివృద్ధికి వీలుగా ఉంటుంది. ఆహారం మీద, చనిపోయిన చేపల మీద, ఈ పరాన్నజీవి బూజుపూతికాహార పద్ధతిలో పోషణ జరుపుకొంటుంది. సాప్రోలెగ్నియా అన్ని జాతుల చేపలకు, అన్నిరకాల ఆవరణలోను అన్ని వయసుల చేపలకు సోకుతుంది. ముఖ్యంగా బాహ్యగాయాల ద్వారా ఈ పరాన్న ఫంగస్ లోనకు ప్రవేశించడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి.

అక్షణాలు : చర్మము, వాజాలు, కళ్లు, నోరు మొప్పలమీద పూలు మాదిరిగా బూడిద తెలుపు లేదా తేలిక గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడుతాయి. గుడ్డకి కాని ఈ జబ్బుసోకిందా అంటే వాటిచుట్టూ బూజు ఏర్పడుతుంది. చచ్చిన గుడ్డు, చుట్టు ప్రక్కల ఉన్నటు వంటి గుడ్డకు కూడా ఇది పట్టి అన్నీ కలిసి ముద్దగా ఏర్పడిపోతాయి.

చికిత్స : ఈ క్రింది వాటిని నిషేధించాలి. గాయాలు, సిమెంటు టాంకుల్లో చాలాకాలం ఉంచడం, మొరటుగా వాటిని పట్టుకోవటం, రోగాలు, నీరస, అనారోగ్య పరిసరాలు చేడు అక్షణాలు నీరు, అత్యధికంగా వీటిని నిలువచెయ్యడం. రోగ బారినపడ్డ చేపకు ఈ క్రింద పద్ధతిలో స్నానం చేయించాలి. 100 లీటర్ల సీటిలో 10 గ్రా. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కలిపి, 60-90 నిమషాలపాటు చేపలకి, లీటరు సీటిలో 10 గ్రా. ఉప్పు కలిపి 20 నిమషాల పాటు పిల్లచేపలకి; కాఫర్ నల్లేట్ స్నానం 10 లీటర్ల సీటిలో 5 గ్రా. కలిపి కర్రతొట్టెల్లో 450 మి. లీ. సీటిలో 1 గ్రాముల చైట్ గ్రీన్ (జింకు లేకుండా చూసి) కలిపిన స్టాక్ సాల్వ్యాషన్ తోటి; చిన్న చిన్న చెరువులను శుభ్ర పరచడానికి మలచైట్ గ్రీన్ ను ఉపయోగించవచ్చు. 5-10 m 3 లో 1 గ్రామ్ మలచైట్ గ్రీన్ కలపాలి.

బ్రాంకియోమైకోసిస్ (గిల్ రోట్) : బ్రాంకియోమైసిస్ అనే ప్రజాతి ఫంగస్ చాలా సిప్రినిడి చేపల మొప్పలకు రాట్ జబ్బు కలిగిస్తుంది. కిక్కిరిసి ఉన్న చేపల జనాభాలో ఎండాకాలంలో ఈ జబ్బు కనపడుతుంది. వృక్ష ప్లవక జీవులు జీవ సంబంధ పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న సందర్భాలు దీనికి అనువుగా ఉంటాయి.

అక్షణాలు : ప్రారంభంలో చేపలకు మొప్పలు పారిపోయి, వైన ముదురు ఎరుపు రంగుల మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తరువాత మొప్పలు పాక్షికంగా చెడిపోతాయి. తరువాత పసుపు గోధుమ రంగులోకి

మారి పోతాయి. తరువాత సాప్రాల్గ్మియా దాడి చేస్తుంది. వాతావరణం వెచ్చగా ఉంటే రోగ అభివృద్ధి త్వరిత గతిలో ఉంటుంది.

చికిత్స: కిక్కిరిసిన రీతిలో చేపలను నిలవ చెయ్యటం వాతావరణం వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు, జీవసంబంధ పదార్థాలు అధికంగా ఉండడం దీనికి అనుకూల పరిస్థితులు. వాతావరణం మరి వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అదనపు ఆహార పదార్థాల పోషణ తగ్గించాలి. మంచి స్వచ్ఛమైన నీటి సరఫరా మెరుగుపర్చాలి. జబ్బు కనపడిన సందర్భాలలో 200 కె. జీ. ల క్వీక్లైమ్ గుండగా నూరి పాక్టారుకు సరిపడునంతగా పరచాలి. అయితే pH 9.0 కి మించకుండా చూచుకోవాలి. రోగ నిరోధక జాగ్రత్త కోసం ఆల్టిస్టెడ్ ఒక దానిని (కాఫర్ సల్ఫేటు కాని బెంజాల్ కోవియమ్ క్లోరైడ్) ఉపయోగించాలి. బెంజాల్ కోవియమ్ క్లోరైడ్ను 1 గంట స్నానానికి ఉపయోగించాలి. దీనిలో 1-4 క్రియాశీలభాగాలు ఉండాలి. 10 లీటర్ల నీటిలో 1 గ్రా. కాఫర్ సల్ఫేటు నుంచిన ద్రావణంలో 10-30 నిముషాలసేపు స్నానం చేయిస్తే పరాన్నజీవులు నశిస్తాయి.

16.3.3 ప్రోటోజోవా వల్ల వచ్చే రోగాలు

చాలావరకు ప్రోటోజోవాన్ పరాన్నజీవులు చేపల శరీరంమీద నివసిస్తాయి. అవి చర్మానికి దిగువ పంటు, మొప్పలకి, కండరపోగులు, వృదులూస్థికణజాలాకు ఇంకా ఇలా కొన్ని అవయవాలపై దాడిచేస్తాయి.

కాస్టియాసిస్ : కాస్టియాసిస్ ఒక సామాన్య వ్యాధి. చిన్నవయసు నుండి అన్ని జాతుల చేపలమీద ఇవి దాడి చేస్తాయి. పెంచే తొట్టెల్లోకాని, చెరువుల్లోను, లాంకుల్లోను ఈ చేపలను దట్టంగా పెంచితే ఈ రోగం తరచు కనబడుతుంది. ఆహారంలోపం ఉన్న నీటిలో అధిక ఆమ్లత్వం గోచరించినా ఇది ఏర్పడుతుంది. ఫ్లాజెల్లేట్ కాస్టియా నెకాట్రీక్సు వలన ఏర్పడుతుంది. ఇది మిల్లిమీటర్ల 10-20 వేల భాగం ఉంటుంది. చర్మంమీద చాలా సంఖ్యలో ఇవి నివసిస్తాయి. వాజాలు, మొప్పలమీద కూడా కనబడే ఈ జబ్బు ఆహారపోషణ లోపంవల్ల సంభవిస్తుంది.

ఇక్షణాలు : రోగబారపడ్డ చేప చర్మంమీద తేలికవర్ణ బూడిద నీలివర్ణ ఫిల్ము ఏర్పడుతుంది. బాగారోగానికి గురిఅయిన భాగాలు ఎర్రగా మచ్చలుగా కనబడుతుంది. మొప్పలు అయితే గోధుమ వర్ణంలోమారి పాక్షికంగా చెడిపోవచ్చును. చేపలు నీరసపడిపోయి, వాటి ఆకలిశక్తిని కోల్పోతాయి.

చికిత్స : కాస్టియాసిస్కి తగిన స్నానాలు ఉన్నాయి. ఆ తరువాత రోగాల బారపడ్డ చేపలని ఆహారం పుష్కలంగా ఉన్న చెరువుల్లోకి చేర్చాలి. అయితే అవి కిక్కిరిసిపోకుండా చూడాలి. ఫార్మాలిన్ స్నానాలు చాలా పనిచేస్తాయి. 100 లీటర్ల నీళ్ళలో 20-25 మి.లీ. ఫార్మాలిన్ కలిపి 30-45 నిముషాల సేపు స్నానం చేయించాలి. ఫ్రయి, ఫిల్లకార్బిలకి ఉప్పు స్నానాలు చేయించవచ్చు. లీటరునీటిలో 10 గ్రా. ఉప్పునీరు కలిపి 20 నిముషాలు చేయించాలి. పెద్దచేపలకు మోతాదు రెట్టింపు చేయవచ్చు. అయితే స్నానం 10-15 నిముషాలసేపు చాలు.

మిక్స్స్పొరిడియన్లు : మిక్స్స్పొరిడియన్లు చేపలకు టేపికల్ పరాన్న జీవులు. వివిధ శరీర భాగాలమీద సీన్లను ఏర్పాటు చేస్తాయి. అదేవిధంగా లోన అవయవాల మీద అంతఃకణజాలాలమీద కూడా ఇవి రోగఇక్షణాలు తీసుకొని వస్తాయి. సామాన్యంగా చెప్పుకోవలసిన మిక్స్స్పొరిడియన్ ప్రజాతులు టెప్టాటికా, క్లరోమిక్సిమ్, మిక్స్బోలన్, హెన్నెగుయూ, తీలోహెక్సెల్లన్, మిక్సిడియమ్, లెంటోస్టోరా.

ఇక్షణాలు : నీరసం శరీరం తీసిపోవడం వర అంచుభాగాల దగ్గల పొలుసులు పైకిలేవడం, పొలుసులు రాలిపోవడం క్రోమిటోఫోర్ల (వర్ణకణాలు) నష్టం, పొలుసులకి రంధ్రాలు ఏర్పడటం మొదలగునవి. మనదేశంలో నీటిలో 400 ppm కన్న తక్కువగా క్లోరిన్ ఉన్న సందర్భాలలో కార్బ్ చేపలకు మిక్స్స్పొరిడియన్ సోకుడు సంభవిస్తుంది.

చికిత్స : కాండ్లన్ ద్రవంలో రోగబారివడ్డ చేపకాని క్రిమినంహారక చర్యలకు జనాభా ఉన్న సందర్భాలలో మిక్స్చూరిడియన్ సోకుతుంది. జనాభా తగ్గించడం ఒక ముఖ్యచర్య, తరువాత lg/kg చొ॥ న ఈస్ట్ గుళికలు అందించాలి.

ఇక్టియోఫ్ తెరియూసిన్ : ఇక్టియోఫ్ తెరియూసిన్ మల్టిపైస్ ఒక శైలికామయ. ప్రోటోజోవస్ జీవి. అన్నిజాతుల, అన్ని వయసుల చేపలకు చర్మం మొప్పలకు ఇది నష్టం కలిగిస్తుంది. పిల్ల పరాన్నజీవులు అతి చిన్నవిగా ఉంటాయి. నీటిలో తిరుగుతూ పోషక జీవులను వెతుకుతూ ఉంటాయి. చేప లభ్యమైనస్థలంలో బహిఃచర్యానికి అంతఃచర్యానికి మధ్య అతుక్కుంటాయి. బహిఃచర్య కణాలని పైకిలేపి కంటికి కనబడతాయి. పూర్తి పరిమాణానికి చేరాక పోషకజీవి వదిలిపెట్టి అడుగున పడిపోతాయి. చుట్టూ గోడను ఏర్పరచుకొని స్టిల్ దశలోనికి చేరుతాయి. తరువాత కణవిభజన జరిగి, పరాన్నజీవుల పిల్లలు గుంపుల్లో తిరుగుతూ కొత్త పోషక జీవుల కోసం వెతుకుతూ ఉంటాయి.

ఇక్షణలు : చర్మంమీద చిన్న చిన్న తెల్లని మచ్చలు కనబడతాయి. రోగం తీవ్రమైతే ఇవి తెల్లని మచ్చలుగా మారతాయి. మొప్పలుకూడా ఈ దాడికి గురిఅవుతాయి. చేపలు నీటిలో గెంతుతాయి రాయికి, రప్పకిగాని అడుగు బాగానికిగాని శరీరాన్ని రుద్దుకొని పరాన్నజీవులను విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నంచేస్తాయి.

చికిత్స : ప్రతి 2-4 రోజులకీ రోగబారివడ్డ చేపలను ఒక చెరువునుంచి మరొక చెరువుకు మార్చుతూ ఉండాలి. ఇక్టియోఫ్ తెరియూసిన్ పోషక జీవులు లేకుండా బ్రతకలేదు. చేపలు లేని చెరువుల్లో కొద్దిరోజులకే అందువలన ఈ పరాన్నజీవులు మరణిస్తాయి. పరాన్నజీవులన్న చేపలన్నిటినీ నిర్మూలించాలి. 10m² నీటికి 1 గ్రా. మలచైట్ గ్రీన్ ప్రతి రెండు రోజులకీ వేసి చేపలకు రోగనివారణ చేయాలి. పాక్షేరుకు 3 బున్నుల క్వీక్లైమ్ చేరువుల్లో పరచినందున పరాన్నజీవులు నశించాయి. ఈ సున్నాన్ని 2 విడతల్లో 2 రోజులు నిరామం ఇచ్చి పరచాలి. రోగాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి క్వీనైన్ స్నానం (20 లీ. నీటిలో 1 గ్రా), క్లోరమిన్ స్నానం (100 లీ. నీటిలో 1 గ్రా), బ్రీఫోప్లానిన్ స్నానం (100 లీ. నీటికి 1 గ్రా.) బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ చర్య జరుగుతున్నంతకాలం నీటిలోకి గాలి బాగా చొరనివ్వాలి. ఫార్మలీన్ PMA (వైరిడిల్ మెర్క్యురిక్ ఆసిటేట్) సామాన్య ఉప్పు స్నానాలు కూడా తిరిగి తిరిగి ఇవ్వడం మంచిది.

16.3.4 పురుగులవల్ల వచ్చే రోగాలు

మత్స్య, జలగలవల్ల వచ్చే జబ్బులు : నిర్మల జలాలలో ముఖ్యంగా రక్తాన్ని పీల్చే జలగ (పిసికోలా జామెట్రా) సాధారణంగా కనబడుతుంది. ఇది ఒక సామాన్య బాహ్యపరాన్నజీవి. ఇది అన్ని జాతుల చేపలమీద దాడి చేస్తుంది. ఇది 1 మి.మీ. వ్యాసం, 2.3 సెం.మీ. పొడవు ఉంటుంది. స్థూపాకారంలో గుండ్రని ఉంగరాల నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. శరీరానికి ఇరు అంత్యాల చూషక నిర్మాణాలు ఉంటాయి. వీటి సహాయంతో అది చేప శరీరానికి ఎక్కుడైనా అతుక్కుగల్గుతుంది. శరీర పూర్వభాగంలోని చూషకంతో రక్తం పీల్చుకుంటుంది. తన పొట్టు పూర్తిగా నిండాక పోషక జీవిని వదిలిపెట్టి అలల మాదిరిగా ఈడుకుంటూ పోతుంది.

ఇక్షణలు : పట్టేయంటే ఈ చేప శరీరంనిండా ఈ పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. చేప నీర్పంగా రక్తం కోల్పోయి ఉంటుంది. చేప శరీరంనిండా ఏర్పడ్డ రంధ్రాలవల్ల ఇతర పరాన్నజీవుల ప్రవేశానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. (ఉదా : ఫంగస్).

చికిత్స : పరాన్న జీవులు మరీ అధికంగా ఉంటే, చెరువు ఖాళీచేసి చేపలకి స్నానం చేయించాలి. లైసాల్ లో 50 శాతం క్రియోసాల్, 50 శాతం సబ్బు ఉంటాయి. 6 లీటర్ల నీటిలో 1 పి.సి. లైసాల్ కలిపి 5-15 సెకన్లు స్నానం చేశాక, మంచినీటిలో బాగా కడిగేయాలి. 20 నిమిషాలపాటు 1 లీటరు నీటిలో 11 గ్రా. ఉప్పు కలిపిన ద్రావణంలో స్నానం చేయించినా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. 1 లీటరు నీటిలో 2 గ్రా. క్వీక్లైమ్ కలిపి 5 సెకన్లపాటు స్నానం చేయించినా మంచి

అంటారు. చెరువు నిండిపోయాక అడుగున క్విక్‌లైమ్‌తో క్షృణ చేయాలి. జలగల గుడ్డు, ఇంకా బ్రతికివున్న జలగలు నశిస్తాయి.


లిగులాసిస్ : లిగులా ఇంటస్టినాలిస్ అనే ఒక పొడవాటి రిబ్బన్ రూపంలోని పరాన్నజీవులవల్ల ఈ రోగం వస్తుంది. చేపల సంవర్ధనంలో నీటి కోళ్ళను చేరనియ్యక పోవడంవల్ల దీనిని నిరోధించవచ్చు.

16.3.5 మొప్పల్లాక్ డాక్టీలోగైరస్‌వల్ల వచ్చే జబ్బు

డాక్టీలోగైరస్ ఒక చిన్న బల్ల వరుపు ట్రిమటోడ్ పురుగు. ఇది చేప మొప్పలమీద దాడి చేస్తుంది. పిల్లచేపలకి ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా చేపలు ఆరోగ్యస్థితిలో లేకపోతే మరి ప్రమాదం.

లక్షణాలు : ఎండాకాలంలో ఈ పరాన్నజీవి కార్ప్ సర్పింగ్ చెరువుల్లో కనబడుతుంది. మొప్పలు వాచి బూడిదరంగు అంచులు ఏర్పడతాయి. తరువాత పాక్షికంగా చెడిపోతాయి.

చికిత్స : డాక్టీలోగైరస్ సోకుడులో బాధపడే చేపలకి స్నాన చికిత్స జరపాలి. ఉప్పునీటి స్నానం: పెద్దచేపలకి లీటరు నీటిలో 2.5 గ్రా.ల ఉప్పు కలిపి 10 నిమషాలు స్నానం (చిన్న చేపలకి) లీటరుకు 15 గ్రా. ఉప్పు కలిపి 20 నిమషాలు స్నానం. ఫార్మలీన్ స్నానం: పెద్దచేపలు లీటరు నీటికి 1 మి.లీ. 15 నిమషాలపాటు స్నానం. ఫ్రయికి; లీటరు నీటికి 0.25-0.50 మి.లీ. ఫార్మలీన్ కలిపి 30 నిమషాలు స్నానం.




పటం 16.4. డాక్టీలోగైరస్ ఉదర పార్శ్వదృశ్యాలు

16.3.6 సాంగ్వినికోలా రక్తపుల్లక్ కారణంగా ఏర్పడే రోగాలు

సాంగ్వినికోలా చేపల రక్తంలో ప్రాథ దశలోని పురుగుగా జీవిస్తుంది. ముఖ్యంగా బల్బస్ అయోర్బేలోను, మొప్పల రక్తనాళాలలోను ఉంటుంది. గుడ్డు రక్త ప్రవాహంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ప్రవాసకాలంలో ఇవి నైజలో పెరుగుతాయి. చేప శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు సరఫరా అవుతుంది. శైలికామయ దింభకము (మిరాసిడియమ్) గుడ్డలోనుంచి దొలుచుకొనివచ్చి (లిమ్ఫియా మొ||) నత్తలపైకి దాడిచేస్తుంది. ఇది మాధ్యమిక పరాన్నజీవిగా ప్రవర్తిస్తుంది. నత్త కాలేయంలో స్పోరోసిస్ట్‌లు ఏర్పడతాయి. ఈ స్పోరోసిస్ట్‌లలో రేడియో, సర్కెరియా దశలుంటాయి. మొప్పలమీది నీటిలో తిరుగుతూ, స్వతంత్రంగా ఈదుతున్న సర్కెరియాలు చేపలోనికి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. మొప్పలు లేదా చర్మం ద్వారా ఇది జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో వాటి పలవ (forked) రూపంలోని తోక ఊడిపోతుంది. చేప రక్త వ్యవస్థలో లైంగిక పరివక్తృత చెందిన ప్లాక్‌గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. చేపకు జరిగే నష్టం అంతా వాటి గుడ్ల వల్ల జరుగుతుంది. మొప్పల రక్తనాళాలలో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. దీనివలన త్రాంబోసిస్ సంభవమౌతుంది. పరివక్తృ స్థితిలో ప్రాథ జీవులకూడా మొప్పలలోనికి చొచ్చుకొని పోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. రక్తనాళాలకు అడ్డంకులు

విర్వరుస్తాయి. శ్వాస వ్యవస్థకు అవసరమైన తలం తగ్గిపోతుంది. గుడ్లు పెట్టే కాలంలో 95 శాతం ప్రాథమిక సాంగ్వినికోలాలు మొప్పల రక్తనాళాలలోనే ఉంటాయి. అందువలన కార్ప్ ప్రథమ అభివృద్ధి దశలో సాంగ్వినికోలా దాడికి మరణిస్తాయి లేదా తీవ్రంగా గాయాలకి గురి అవుతాయి. మొప్పలలో నీటిగుడ్లు చేరి రక్తనాళాలకు అవరోధం కల్గిస్తాయి.



పటము 16.5. సాంగ్వినికోలా అభివృద్ధి దశల చక్రము. a. గుడ్లు b. శైలికామయ దింధ కము c. నత్త [మాధ్యమిక అతిదేయ] d. సర్పేరియా క్రిస్టాటా e. శైలికా పరివ క్షత చెందిన సాంగ్వినికోలా f. మొప్పలలో ఉన్న సాంగ్వినికోలా గుడ్లు g. మూత్ర పిండాలలో క్షీణించిన దశలోని సాంగ్వినికో లాగుడ్లు ముద్దగా చేరి ఉన్నాయి.

ఇక్షణలు : చేపలు బొత్తిగా కదలవు. ఒడ్డుకు చేరివుంటాయి. నీరు ప్రవేశించే ద్వారాలకు చేరుతాయి. పరిసరాల గురించి అసలు పట్టించుకోవు. మొప్పలనుంచి జిగులు విర్పడుతుంది. గుంపులో సర్పేరియా చేరడంవల్ల చిన్నచేపలు చచ్చిపోతాయి. చేపల పెరుగుదల దెబ్బతింటుంది.

చికిత్స : పరాన్న జీవుల చరిత్రను చేదించడానికి నత్తను నిర్మూలించాలి. అవే వీటి మాధ్యమిక పరాన్న జీవులు. క్విక్లైమ్ [పాక్టేరుకు 50 టన్నులు]తో కాని, క్లోరైడ్ ఆఫ్ లైమ్ తో కాని [పాక్టేరుకు 6-10 టన్నులు] 10m³ నీటికి కాఫర్ సల్ఫేటు, కాఫర్ డైక్లోరైడ్ లేదా కాఫర్ అసిటేట్ కలిపి కాని నత్తలను నిర్మూలించుకోవచ్చును.

16.3.7 అకాంతోసెఫాలస్ల వల్ల వచ్చు రోగాలు

అకాంతోసెఫాలస్లను ముళ్ళకెరీట పురుగులని కూడా అంటారు. వీటికి తుండము [ప్రాబాసిస్] ఉంటుంది. లఘునాకారంలో నున్న శరీరానికి ముందుభాగాన కొత్కేలవంటి నిర్మాణాలుంటాయి. ప్రాథమికము చేప జీర్ణ నాళంలో ఉంటాయి. అక్కడ వాటి ముక్కు పేగు పొరల్లోకి చొచ్చుకొనిపోయి ఉంటుంది. సోకుడు చాలా అధికంగా ఉండే షక్షంలో జీర్ణనాళ అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. చాలా అకాంతోసెఫాలస్ల సందర్భంగా కోపిపాడ్ దింధకాలు వీటి గుడ్లను మ్రింగడంతో వీటి జీవిత చరిత్ర పూర్తి అవుతుంది. చేప కోపిపాడ్ ని తినగానే జీవిత చరిత్ర పూర్తి అవుతుంది. పక్షులు, క్షీరదాలవంటి ఉన్నత సకశేరుకాలకు చేప మాధ్యమిక జీవిగా ఉండవచ్చు. ఈ సందర్భాలలో చేప ఉదర కుహరంలో అకాంతోసెఫాలస్ల దింధక దశలున్న కోశాలుండవచ్చు.

ఇక్షణలు : కండర క్షీణత అత్యధికంగా సోకుడుకు గురిఅయిన చేపల్లో సామాన్యంగా కనబడు తుంది. పేగులను పరిక్షించి ముళ్ళతోనున్న తుండాని గుర్తిస్తే ఈ జబ్బు సోకినట్లు తెలుస్తుంది.

అణువు చికిత్స : కోపిపాడ్ దింధకదశలు మాధ్యమిక పోషక జీవులు కాబట్టి ఈ విధమైన ఆహారాన్ని నిషేధించాలి.

16.3.8 క్రెస్టేషియన్స్ వల్ల వచ్చు రోగాలు

ఆర్గులన్ : ఆర్గులన్ జాతులు [చేప పేలు] చేపలమీద దాడిచేసే సామాన్య పరాన్న జీవులు. ఆర్గులన్ ఒక చిన్న బల్లవరుపు క్రస్టేషియన్. ఆకుపచ్చ పసుపుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది. 8 మి. మీ. పొడవు ఉంటుంది. చేప చర్మానికి ముఖ్యంగా వాజాల ఆధార భాగానికి అతుక్కుంటాయి. వీటి కళ్ళకు దిగువగా వుండే చూషకాలు కొక్కేలు దీనికి ఉపయోగపడతాయి. వాటి స్వర్గ శృంగాల మధ్యగా ఒక వాడి బాణంవంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. నోటికి ముందుగా కొమ్ము ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ కొండి గాయాలను చేస్తుంది. తద్వారా ఇతర సోకుడుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇదే పరిస్థితి అతిగా ఉంటే ఈ గాయానికి, దానివల్ల సంభవించే రక్త హీనతకు చేప చనిపోతుంది.

ఆక్షణాలు : చేప పేలకాలుకు చర్మం మీద ఎర్రని మచ్చలు ఏర్పడతాయి. చేపలు మతిపోయినట్లు ప్రవర్తించి, ఆర్గులిడ్లను వదలించుకోడం కోసం గోక్కుంటాయి దేనికో ఆనించుకొని.

చికిత్స : స్నానాల ద్వారా చికిత్స జరుపుతారు. జలగలకు చూడిగిగానే లైసాల్ స్నానం, హిటాసియమ్ పర్యాంగనేటు 1 గ్రా, 1 లీటరులో కలిపి 40 సెకన్ల స్నానం, ఇక ముందు జాగ్రత్త సందర్భంగా అయితే చెరువులు ఎండబెట్టి క్విక్ లైమ్ వాడాలి.

లెర్నియా : దీనినే లంగరు పరాన్న జీవి అంటారు. ఇది అతుక్కున్న ప్రాంతంలో వాపు ఎర్రగా ఉంటుంది. ఫంగల్ బాక్టీరియల్ సోకుడు ద్వితీయ స్థాయిలో ఏర్పడ వచ్చును. లెర్నియా తమ పోషక జీవులకు గట్టిగా అతుక్కుంటాయి. జవ్వెన్ల దశలు పోషక జీవీలోకి దూసుకుపోయాక తలలో ఉండే ఉపాంగాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. అందువల్ల పరాన్నజీవి ముందు భాగం లంగరు రూపంలో కనబడుతుంది. ఇది శాఖలుగా విస్తరించుకొని పరాన్నజీవి జారిపోకుండా నిరోధిస్తాయి. బాక్టీరియా వల్ల అత్యంత ప్రమాదకర సోకుడు రావడానికి ఈ పరాన్నజీవి ప్రాథమిక కారణం.

ఎర్గసిస్ : ఇదొక కోపిపోడా పరాన్నజీవి. రకరకాల చేపల మొవ్వల మీదదాడి చేస్తుంది. రెండవ జత స్వర్గశృంగాలు పెద్దవిగా అవుతాయి. వాటి చివరల సఖాలు వంటివి ఏర్పడతాయి. వాటితో అవి అతుక్కోగలుతాయి. చేపల రక్తం మీద, శరీర ద్రవాలమీద ఇవి ఆధారపడతాయి. ద్వితీయసోకుడు వ్యాధులు ఈ గాయాల ద్వారా సామాన్యంగా వస్తాయి.

16.3.9 జీవావరణ జబ్బులు

మరి ఆమ్లఘట్టణ జబ్బులు : 5.5 కన్నా నీటి pH తగ్గిపోతే నీరు కొద్ది కొద్దిగా చేపలలో చాలా వాటికి విషపూరితంగా మారిపోతుంది. pH 5.0 కు సరితూగితే మరణాలు ఆరంభమౌతాయి. చేప చర్మం మీద తెల్లటిపొర ఏర్పడుతుంది. జిగురు బాగా స్రవిస్తుంది. మొవ్వల అంచులు గోధుమ వర్ణంలోకి మారతాయి. అదే సమయంలో నీరు ఫెరుజినన్ గా ఉంటే కొల్లాయిడల్ ఐరన్ మొవ్వల మీదకు చేరుతుంది. ఊపిరి పీల్చుకోడం కష్టం అవుతుంది. ఆ విధంగా నీటి ఆమ్ల ఘట్టణం నుంచి హానికర ఫలితాలు అధికమౌతాయి.

pH 5.5 కన్నా తగ్గిపోతే పాక్షేరుకు 500 కేజీల కార్బియమ్ కార్బోనేట్ పరచాలి.

మరి క్షారఘట్టణం కల నీరు : pH 9.0 కన్నా అధికమైతే చేపకి చాలా ప్రమాదకరమౌతుంది. ఇదికాలవ్వం వల్ల సంభవించవచ్చు. లేదా అత్యంత ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో వృక్షసంపద అధికంగా అభివృద్ధి చెంది బాగా మునిగి ఉండడం బాగా అవగాహన చేసికోడం. చేపల మొవ్వలు కాలిపోతాయి. వాజాలకి హాని కలుగుతుంది.

ఆక్సిజన్ లోపం : చెరువులోని నీటి ఉష్ణోగ్రత అందులో కలిగిన ఆక్సిజన్ కు సంబంధం ఉంటుంది. కొంతవరకు అందులో ఉన్న జీవ పదార్థాల మీద కూడ ఆధారపడి ఉంటుంది. అందులో మునిగి ఉన్న వృక్ష సముదాయం కూడా కొంతపాత్ర వహిస్తుంది. ఏది ఎక్కువ కాకూడదు. ఏదో పద్ధతిలో యాంత్రికంగా నీరు జల్లితే నీటిలోని ఆక్సిజన్ వృద్ధి పొందుతుంది.

భాగం-17 సాంకేతిక మత్స్య విజ్ఞానము **పరిరక్షించడం (ప్రిజర్వేషన్) ప్రా సెసింగ్,** **ట్రాన్ స్పోర్టేషన్ (చేరవేత)**

విషయసూచిక

- 17.1 ఉద్దేశ్యం
- 17.2 ఉపోద్ఘాతం
- 17.3 ప్రిజర్వేషన్, ప్రాసెసింగ్ చర్య
 - 17.3.1 రెఫ్రిజిరేషన్, ఫ్రీజింగ్
 - 17.3.2 కానింగ్కు ముందర ముడిపదార్థాన్ని తయారుచేసుకోడం
 - 17.3.3 డబ్బాలు
 - 17.3.4 డబ్బాలో నిలువ పద్ధతులు
- 17.4 చేప రవాణా
- 17.5 సారాంశం
- 17.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 17.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

17.1 ఉద్దేశ్యం

ఆహారం యొక్క పోషక విలువలను కాపాడటానికి చేపలను నిలువచేసే సామాన్య సూత్రాల గురించి ఈ పాఠంలో వివరించడమయింది. మామూలుగా నిలువ చేసినట్లయితే చేప చెడిపోతుంది. అయినా నిలువ పద్ధతుల అనుసరణ మీద ఆ చెడి పోవడం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రిజర్వేషన్, ప్రాసెసింగ్ పద్ధతుల అనుసరించి ఈ చెడిపోవడాన్ని ఎలా అరికట్టాలో వివరించడం జరిగింది. అంతేకాదు, దగ్గర ప్రాంతాలకి కాని, దూరప్రాంతాలకికాని, రవాణా సందర్భంగా తగిన విధంగా రూపొందించిన సాధనాలలో వీటిని ఉంచుతారు. వాటిలో ఈ నిలువచేపల నాణ్యత ఇనుమడిస్తుంది. దేశంలోని పోషకాహార వినియోగించడంలో తోడ్పడుతుంది. ఈ వివరాలు కూడా దీనిలో ఉన్నాయి.

17.2 ఉపోద్ఘాతం

ఎవరయినా చేపలను కొనుక్కోనే ముందు జాగ్రత్తగా వాటిని పరీక్షించి మరీ డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. నాణ్యత, తాజాదనం ఏమాత్రం అయినా చెడిపోయాయా, వాటి పోషక విలువలు నిలువచేసే పద్ధతిలోను, ప్రాసెసింగ్లోను తరిగి పోయాయా ఆరోగ్యానికి ముప్పు కలుగుతుందా, చూడ్డానికి బాగున్నాయా అని తప్పక ఆలోచిస్తారు. అన్నిటికీ మించి కొన్నందుకు తిన్నందుకు తృప్తిని కోరుకొంటాడు.

తాజాచేప మిలమిల మెరుస్తుంది. శరీరం మీద ఒకే పద్ధతి జిగట పదార్థం ఉంటుంది. కళ్ళు పొడుచుకొని వస్తాయి. నల్లని కంటిపాప పారదర్శక శుక్ల పటలం ఉంటాయి. ఇక మొవ్వులు ఎర్రగాకాంతి వంతంగా ఉంటాయి. వాటి మీద జిగట కనబడదు. చేప మాంసం, శరీరం ధృఢంగా

ఉండాలి. చేపని తాకిన తరవాత, పట్టిన తరవాత ఈ వేళ్ళ గుర్తులు దాని మీద పడకూడదు. పొయ్యిద్వారము పొడుచు కొనిరాకూడదు. మంచి తాజా చేపల వాసన “మైన్” అనీ, ఫ్రెష్ సీ వీడి (Fresh Sea Weedy) అనీ (సముద్ర చేపలైతే), లేకీ (Laky) అనీ (మంచినీటి చేపలైతే) అంటారు.

సాధారణంగా అప్పుడే పట్టిన చేప జీర్ణనాళంలో అది తిన్నతిండి ఉంటుంది. అంచువల్ల పట్టిన చేపల శరీరం నుంచి ఈ జీర్ణనాళాన్ని తీసివేయాలి. లేకపోతే దాని జీర్ణరసాల ఎన్జైమ్ల శక్తి వల్ల ‘బెల్లి బర్న్’ (Belly burn) అనే లక్షణం వల్ల రంగు పోతుంది. లేదా ‘బార్న్ బెల్లి’ అని పొట్టచిరు కొనిపోవడమో, చిట్టి పోవడమో, జరుగుతుంది. తాజాచేపని వండుతూ ఉండే అప్లోకరమైన వాసన, ప్లావర్ గోచరిస్తాయి.

చేప చనిపోయిన తరవాత కండరాలలోని గ్లయికోజెన్ లాక్టిక్ ఆమ్లంగా మారిపోతుంది. శరీరం కొయ్యలా అవుతుంది. ‘రిగర్ మార్టిన్’ ప్రారంభం అవుతుంది. మాంసం దృఢంగా, గట్టిగా అయి నొక్కినా రసం రాదు, చేప కుళ్ళిపోతుంది. చర్మం మీద ప్రకాశం తగ్గిపోతుంది. రంగువాసి, క్షీణిస్తుంది. శరీరం మీద మందంగా జిగురు ఏర్పడుతుంది. అది అంతకంతకు మసకగా తయారవుతుంది. చివరకు పసుపు గోధుమ వర్ణాలకు తేలుతుంది. కళ్ళు క్రమంగా లోతుకు దిగిపోతాయి, కంటిపాప తెల్లగా పారవచ్చినట్లవుతుంది. శుక్లవటలం కాంతి నిరోధకస్థితి వస్తుంది. ఇక మాంసం క్రమంగా మెత్తబడిపోతుంది. ఏ మాత్రం ఒత్తినా రసికారుతుంది. ఇది అలూ ఇలూ పాల వర్ణంలో ఉంటుంది. చెడిపోయిన చేప వాసన కూడా క్రమంగా మారుతుంది. తాజా చేపలో మొదట ఇది అప్లోకరంగా ఉంటుంది. తరవాత కొంత తీపిదనం, ఏదో పళ్ళ వాసన వేసి తరవాత అమ్మోనియా వద్దతికి తేలుతుంది. చేపకంపు అని మనం వ్యవహరించే రీతి అధికం అవుతుంది. ఇక చివరగా కుళ్ళువాసన ప్రధానంగా కనబడుతుంది. తాజా చేపలో 6.4 pH ఉంటుంది, కాని చెడిపోయిన చేపలో ఇది 7.6 కు చేరుతుంది.

అంగీకార యోగ్యం కాని విధంగా దీని గుణాత్మక విలువలు తగ్గిపోతే, ఆ చెడిపోయిన చేపలని బజారులో అమ్ముడం కష్టం ఆ విషయం గమనించాలి.

చేప చెడిపోవడం (స్పాయిలేజి)

మూడు ముఖ్య కారకాల వల్ల నీటిపైకి వచ్చాక చేప చెడిపోతుంది. నాణ్యత నశించడానికి చాలా విధాల చర్యలు ఆరంభమవుతాయి. ఈ కారకాలు 1. బాక్టీరియా 2. జీర్ణరసాలలోని ఎన్జైమ్లు 3. ఆక్సిడేషన్ లేదా ఆల్కలిటిక్ (కుళ్ళిపోవడానికి దారితీసే ఆక్సిడేషన్). ఈ కారకాలు చేపజాతికి చేపజాతికి మారుతూవస్తాయి. చేప మాంసంలోని నూనె ఎంత ఉందో దీనిని నిర్ణయిస్తుంది. రిగర్ మార్టిన్ చర్య చాలా తగ్గిపోతుంది. కాని కణజాలాలలోని అంతరంగాలలో ఎన్జైమ్లు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. మాంసం మెత్తబడిపోతుంది. నైట్రోజన్ సంబంధిత భాగాలు విచ్ఛిన్నం అవుతాయి. బాక్టీరియా సంబంధిత విచ్ఛిన్న చర్య ఆరంభమవుతుంది. ఆక్సిడేషన్ వల్ల మాంసం చెడిపోయి కుళ్ళు కంపు కొడుతుంది. ఆయిల్ సార్టీన్, కల్లా మొదలైన మంచినీటి చేపల్లో నూనె పాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల చెడిపోయిన సందర్భాలలో గోధుమరంగులోకి మారతాయి. శరీరం భయట ఉన్న జిగురులో చేపచెడి పోడానికి కారణమయిన సూక్ష్మ వృక్ష జీవులుంటాయి. రిగర్ మార్టిన్ తగ్గిన తరవాత కూడా బాక్టీరియాచర్య, రసాయనికచర్య, ఆల్కలిటిక్ (స్వయంనాశకచర్య) చర్య కొద్దిరేట్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. సులభంగా ఆవిరి అయ్యే బాష్పశీల [వోలటైల్] అమ్మోనియా, CO₂, అమైన్ ఆమ్లాలు మొదలైనవి ఏర్పడతాయి. ప్రోటీన్లు, నైట్రోజెన్ సంబంధ పదార్థాలు చిట్టిపోయి, విచ్ఛిన్నం అయ్యాక ఈ మౌలిక సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి. హైడ్రోజెన్ సల్ఫైడ్ ఇండోల్ అనే అంత్య ఉత్పత్తులు తయారయి కుళ్ళువాసన కొడతాయి. బాక్టీరియా చర్యలవల్ల చెడిపోయిన సందర్భాలలో బ్రయిమిటెల్ అమీన్ ఏర్పడుతుంది. సముద్రమత్స్యాలు ఎంత వరకు చెడిపోయాయో తెలుసుకోడానికి దీని గాఢతను పరిగణనలోకి తీసికొంటారు. చేపలు చెడిపోకుండా తీసికోదగిన చర్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉష్ణోగ్రతను బాగా తగ్గించడం, అయ్యెనైజింగ్ వికిరణానికి గురి చెయ్యడం, చేపలకు గాయాలుతగల కుండా జాగ్రత్త పడడం మొదలైనవి.

ఇక ఫ్రీజర్‌షెన్ చర్యకు ముందుగా, జిగట, రక్తం మరకలు, మల పదార్థాలు ఇతర వైదేశిక పదార్థాలు శుభ్రమైన నీటిలో కడిగివేయాలి. పెద్ద చేపల్లో అయితే జీర్ణనాళం తీసివేసే లోపల కడగాలి. చేపలను నిలువచేయడానికి రిఫ్రీజరేషన్, ఫ్రీజింగ్, ఎండబెట్టుడం, ఉప్పులో ఊరవేయడం, పొగచూరించడం, డబ్బాలలో గాలిచొరకొండా మూతలు వేయడం [క్రానింగ్] మొదలైనవి చేస్తారు. ఎండబెట్టి ఉప్పురాసి, పొగ చూరించిన వాటిని 'క్యూర్డ్' చేపలు అంటారు. ఈ విధంగా చెయ్యడం వల్ల [నిలువచెయ్యడం వల్ల] చేప చాలా కాలం నిలువ ఉంటుంది. లేదా దూరప్రాంతాలి తీసికొనిపోడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

17.3 ఫ్రీజర్‌షెన్ ప్రాసెసింగ్ చర్య

17.3.1 రిఫ్రీజరేషన్, ఫ్రీజింగ్

ఫ్రీజింగ్ అంటే శరీరంలోంచి వేడిని తీసివేయడం. ఎన్‌జైమ్‌ల బాక్టీరియాల చర్యలను నిరోధించి కుళ్ళిపోవడాన్ని అపడానికి చేపలను తగ్గు ఉష్ణోగ్రతలలో నిలువచెయ్యాలి. చేపలను అయిస్ ముక్కల్లో నిలువచేస్తారు. అది కొద్దిరోజులపాటు నిలువకయితే సరిపోతుంది. పెద్ద చేపలయితే వాటి పొట్టలో అయిస్ ముక్కలు వేస్తారు. వాటిని పెద్ద పెద్ద గంపల్లో వేయడం మంచిదికాదు. అలమూర్లలోను అక్కడాఉంచి మెట్లు మెట్లుగా అమర్చడం లేదా పెట్లలో ఉంచడం, కట్టలుగా ఉంచడం లాభదాయకం. 66°C కు దిగువగా నిలువచేయడంవల్ల సూక్ష్మక్రిముల చర్యలు తగ్గుస్తాయిలో ఉంటాయి.

మంచు కణికలు ఏర్పడడంవల్ల జీవశాస్త్ర నిర్మాణాలకి కొంత నష్టం సంభవిస్తుంది. మంచు స్థితికాలు శరీర నిర్మాణానికి గాయంచేస్తాయి. ఆ విధంగా ఎన్‌జైమ్‌లు విడుదల అవుతాయి. నీరు గడ్డకట్టడంవల్ల ప్రోటీన్‌లు కూడా గడ్డ కడతాయి. ఆ విధంగా pH విలువ మారి చేప పాడిగా అయిపోతుంది. తేమ కోల్పోతుంది.

చేప ఉష్ణోగ్రత 1°C తగ్గగానే మంచు ఏర్పడడం మొదలవుతుంది. ఇనార్గానిక్, ఆర్గానిక్ సమ్మేళనాల గాఢత మారిపోతుంది. ఉష్ణోగ్రత తగ్గినకొద్ది నీరు ఇంకా గడ్డ కడుతుంది. -- 50°C నుంచి -- 60°C చేరుకొనే సరికి చేప మొత్తంలోని నీరు అంతా గడ్డకట్టి వేస్తుంది. ఎక్కువుగా నీరుగడ్డ కట్టటం -1°C నుండి -5°C లోపున జరుగుతుంది. మంచు స్థితికాలు భిన్న పరిణామాల్లో ఏర్పడతాయి. ఉష్ణం నిష్కర్షణ జరిగిన చోట మొదట మంచు గడ్డ కట్టడం ఆరంభమయి మిగతా భాగాలకు వ్యాపిస్తుంది. వీటిలో ఉండే ఉష్ణం రిఫ్రీజరేషన్ చేసే మాధ్యమంలోకి ప్రసరిస్తుంది. గడ్డకట్టేచర్య నెమ్మదిగా జరగడం తొందరగా జరగడం మీద ఈ స్థితికాల సైజు ఆధారపడి ఉంటుంది. నెమ్మదిగా జరిగే చర్యలో స్థితికాలు పెద్దవిగా ఉండే కణజాలాలను చించివేస్తాయి. కణ కుడ్యాలలోకి చొచ్చుకొనిపోయి వాటిలో ద్రవం బయటకు కారిపోతుంది. దీనిని డ్రిప్ (Drip) అంటారు. దీనితోపాటు కరిగియుండే ప్రోటీన్‌లు, విటమిన్‌లు, ఖనిజాలు కూడా బయటకు వస్తాయి. చూడడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది. చేప దృశ్యం అందవితారంగా ఉండటమేకాక బరువును కోల్పోతాయి. అందువల్ల డ్రిప్ చరకూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మంచులో నిలువచేసిన చేపల నాణ్యతను నిర్ణయిస్తారు.

చాలాకాలం చేపలను నిలువచేసే ఉద్దేశ్యం ఉంటే త్వరిత గతిలో గడ్డకట్టే విధానం అనువుగా వుంటుంది. దీనివల్ల బాక్టీరియల్ చర్య నిరోధించడమవుతుంది. తొందరగా గడ్డకట్టించడం వల్ల ప్రతిభాగం 0°C - 5°C స్థాయిల ప్రమాణంలోకి వస్తాయి. చక్కగా చేపలను 201°C దగ్గర గడ్డకట్టిస్తే వాటి భౌతిక లక్షణాలను కోల్పోకుండా పోషక విలువలను పూర్తిగా కలిగి వుంటుంది. అంతోయింతో తాజా చేపల్లాగే ఉంటుంది. చిన్న సైజు స్థితికాలు, గడ్డకట్టడానికి తక్కువ టైమ్ అవకాశం ఇవడం, లవణాలు పరస్పర వ్యాపనం చెందడానికి నీరు ఇరిగి పోవడానికి కూడా తక్కువ అవకాశం సమయం ఇవ్వాలి. చెడిపోకుండా నిరోధించాలి. ఇవన్నీ త్వరగా గడ్డకట్టించడంలో ఉండే లాభాలు. తొందరగా గడ్డ కట్టించడానికి మూడు సమర్థవంతమైన మార్గాలున్నాయి. a). రిఫ్రీజరేషన్ మాధ్యమంలో

చేపలను సరాసరిగా ముంచడం. b). ఫ్లేట్ల ద్వారా అప్రత్యక్షంగా రిఫ్రెజరేటర్కు చేపలకు సంబంధంగా ఏర్పరచడం. c). బలవంతాన సంవహనచర్య జరిపి రిఫ్రెజరేషన్ జరిగిన గాలిని ఉష్ణమార్పిడి తలాల దిక్కుగా పోనివ్వడం, తొందరగా గడ్డ కట్టే చర్య జరిపించడంలో చాలా పద్ధతులున్నాయి. భారతదేశంలో ఇలాటి కర్మాగారాలలో (Plant) ఎయిర్ బ్లాస్ట్ పద్ధతి విరివిగా వాడకంలో ఉంది.

కోల్డ్స్టోరేజ్ పద్ధతిలో చేపలను నిలవచెయ్యడం భారత దేశంలో చాలా తక్కువ స్థాయిలోనే జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతి అవకాశంఉన్న ప్రాంతాలలో ఇది కనబడుతుంది. రాత్రికి రాత్రి చేపలను కోల్డ్స్టోరేజి పద్ధతిలో నిలువచేసి, మర్నాడు మార్కెట్కు వంపేస్తారు. ఐస్ అధికంగా లభ్యం అవుతుండడంతో రకరకాల పద్ధతుల్లో చేపలను అన్ని ప్రాంతాలకు చేరవేస్తారు. ఐస్లో ఉంచిన చేపలు రెయిల్, బ్రక్, లాంచీలలో పంపుతారు. వశ్యము తీరంలో ఇటువంటి కేంద్రాలు బొంబాయి, మంగుళూరు, కొచ్చిన్, త్రివేంద్రమ్ వంటి నగరాలలో చాలా ఉన్నాయి. రోయ్యలు, లాబ్స్టర్లు, కప్పకాళ్ళను ఇలాఐస్లో నిలువనిస్తారు. బొంబాయిలో ప్రాంపెల్లు, జ్యా చేపలు మొదలైన చేపలను గడ్డ కట్టించినిలువ చేస్తారు. కొన్ని నెలల వరకు ఇవి నిలువ ఉంటాయి.

తైలసార్దీన్ చేప (సార్దినెల్లా లాంజినెస్), మాకెరల్ (రాస్ట్రెల్లిజెర్ కనగుర్తా), సీర్ (స్క్రింబె-రోమార్స్ గట్టాటన్) అనే మూడు వాణిజ్య ప్రాధాన్యతల ఆహారమత్స్యాల సందర్భంగా రిఫ్రెజరేట్ చేసిన సముద్ర జలంలో ప్రెజర్వేషన్ చేస్తున్నారు. దీనికి కృత్రిమ సముద్ర నీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే మామూలు ఉప్పును-1.1 నింటి 0°C ఉష్ణోగ్రత దగ్గర 3.5% ఉండే విధంగా కరిగిస్తారు.

సామాన్యంగా రిఫ్రెజరేటర్లలో సముద్ర జలాలలో నిలువ చేసిన చేపలు దృఢమైన టెక్చర్తో చూడడానికి చక్కగా ఉంటాయి. ఐస్లో నిలువచేసినవి ఇంత మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండవు. 2 రోజులు నిలువచేసి తైలసార్దీన్లలో ప్రత్యేకంగా ఏ తేదాలు కనబడవు అయితే అంతకంటే ఎక్కువ కాలం నిలువచేస్తే నాణ్యత తరిగి పోతుంది. అదే విధంగా మాకెరల్ 4 నుండి 6 రోజుల వరకు, సీర్ 12 నుండి 14 రోజుల వరకు నిలవచెయ్యవచ్చు.

ప్రీజింగ్లో రకరకాల పద్ధతులు అమలులో ఉన్నాయి. ఇవి షార్ప్ఫ్రీజర్ ఎయిర్, బ్లాస్ట్ఫ్రీజర్, కాంటాక్ట్ ఫ్లేట్ ఫ్రీజర్, వెర్రికల్ ఫ్లేట్ ఫ్రీజర్, ఇమ్మర్షన్ ఫ్రీజింగ్, లిక్విడ్ ఫ్రీయాన్ ఫ్రీజింగ్, లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఫ్రీజింగ్, ప్యూయిడైజ్డ్ బెడ్ ఫ్రీజర్, క్రయోజెనిక్ ఫ్రీజింగ్, సబ్ ఫ్రీజింగ్ మొదలగు అన్ని పద్ధతులలోనూ ఉష్ణోగ్రతను హరించడం, ప్రధమ నాణ్యలక్షణాలను స్థిరీకరించడం జరుగుతుంది.

భారతదేశంలో చాలా వరకు బ్లాస్ట్ ఫ్రీజర్ చాల వరకు వాడుకలో ఉంది, ఎయిర్ బ్లాస్ట్ఫ్రీజర్ ఒక గుహలేదా టన్నల్ రూపంలో ఉంటుంది. వాయుప్రసరణం వల్ల అతి త్వరలో ఉష్ణోగ్రత మార్పిడి అవుతుంది. 0 నుండి 30°C ఉష్ణోగ్రత వరకు ఉపయోగిస్తారు. గాలి వేగం 30 నుండి 1050 మీటర్లు mt వరకు ఉంటుంది.

ఎముక బాగాల నిర్మూలన, గడ్డ కట్టించడం

రోయ్యలు లభ్యంకాని సందర్భాలలో, చేపల భాగాలలో ఎముకలు తీసివేసి ఫిల్లెట్ల రూపంలో గడ్డకట్టించే విధానం చేపల ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో జరుగుతుంది. చేప వెన్నెముక వెంటడి ఇరు పార్శ్వా మాంసాన్ని ఖండాలుగా కోస్తారు. వీటినే ఫిలేట్లు అంటారు. చానోన్ చానోన్, మార్బాలమత్స్యం, పర్చీలు, మల్లెట్లు, కార్ప్లు, ఈల్లు మొదలైనవి దీనికి అనువుగా ఉంటాయి. ఫిల్లెటింగ్ కేవలం చేతితోకాని, ఫిల్లెటింగ్ యంత్రంతో కాని చెయ్యవచ్చు. వీటికి చర్మం ఉన్నా ఉండవచ్చు, తీసివేసినాసరే మొత్తానికి ధనవంతుల చేతుల్లో అధిక ధరలు లభ్యమవుతాయి. ఫిల్లెట్లను ట్రైన్లో ముంచడం కూడా మంచిది. చూడ్డానికి బాగుండడమేకాక డ్రైవ్చర్య నిరోధించబడుతుంది. ఉప్పగా రుచిగా ఉంటాయి. ఫిలేట్ ఫ్రీజింగ్చర్య విడివిడిగా త్వరలో కాని, మొత్తం అన్నిటికీ ఒకేసారి కాని చెయ్యవచ్చు. (బ్లాక్ఫ్రీజింగ్). ట్రైన్లో ముంచిన తరువాత ఫిలేట్లని పాలిథీన్సంచులో ఉంచి (కాగితాలలో చుట్టి) ఫ్లేట్ఫ్రీజర్కు చేర్చి ఉష్ణోగ్రత తగ్గిస్తారు. ఇది -35°C నుండి -40°C

వరకు తగ్గించి 23°C దగ్గర నిలువచేస్తారు. బ్లాక్ ఫ్రీజింగ్ చర్యలో ఫిల్లెట్‌లను 500 గ్రా, 1 కేజీ, 2 కేజీల లెక్కన పాలీథీన్ సంచుల్లో విలవచేస్తారు. వీటికి మైనం కూడా పూస్తారు ఫిల్లెట్‌లు మునిగే వరకు సంచులో గ్లేడ్ జలం నింపుతారు. 35 నుండి 40° వరకు ఫ్రీజర్‌లో ఉంచి 23°C వద్ద నిలువచేస్తారు.

ఎండ పెట్టడం

చేప శరీరకణ జాలాల నుండి తేమను, నీటిని పూర్తిగా తీసివేయడం ఎండబెట్టడం అనిపించు కొంటుంది. గాలిని పంపి తేమను పారించవచ్చు. సహజ సిద్ధంగా ఎండలో కాని ఆరు బయలుకాని ఉంచి నీరు పోగొట్టువచ్చు లేదా డ్రయర్‌లను ఉపయోగించి కృత్రిమంగా నీటి ప్రమాణం తగ్గించవచ్చు. నీటి తేమ పోయాక బాక్టీరియా చర్య నిరోధించబడుతుంది. ఎన్‌జైమాటాక్ చర్యవల్ల చెడిపోవడం జరిగదు. చేపలను ఫ్రీజర్స్ చెయ్యడానికి ఎండలో ఆరవేయడం అతి సరళ చర్య. సుమారు మూడోపంతు సముద్రం నుంచి వచ్చిన చేపలను ఈ చర్యకేగురిస్తారు. మంచి నీటి చేపలను కొద్ది ప్రమాణాల్లోనే ఎండబెడతారు. ఆరు బయలులో ఎండబెట్టడానికి, పొడివాతావరణం, సూర్యరశ్మి కొద్దిగా గాలివీడడం అవసరం.

తీరం వెంటడి సముద్రపు ఒడ్డున ఈ ఎండబెట్టే కార్యక్రమం కనబడుతుంది. నేలకు వచ్చాక చేపల్ని సముద్రనీటిలో శుభ్రపరచి పల్లగా కొబ్బరి పీచు మొదలైన చాపల మీద వరుస్తారు. ఒకటి రెండు రోజులు సూర్యరశ్మిలో ఎండబెడతారు. సరిసమానంగా ఎండడానికి చేపలను అటూఇటూ తిప్పాలి. నేలమీద ఇసుకతో కలుషితం కాకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఎండబెట్టడంలో మరొక పద్ధతి కూడా ఉంది. తాళ్ళు, వెదురు కర్రలులేదా రాబుల వంటి వెంటడి సమాంతరంగా రెండు పెద్దరాటలకి ఇటూ అటూకట్టి వేలాడతారు. దీనికి ఉదాహరణగా బాంబేడక్‌ను చెప్పవచ్చు. సరిసమానంగా ఎండడం, ఇసుక చేరకపోవడం ఈ పద్ధతిలో లాభాలు అంతో, ఇంతో, పెద్ద చేపలయితే పొట్టచిల్లి ఉప్పురాసి మరి ఎండబెడతారు. సూర్యరశ్మిలో ఎండబెట్టడం నెమ్మదిగా జరిగే చర్యకాబట్టి చెడిపోయే చేపలు కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఇక ఎండబెట్టే దర్యవల్ల వచ్చే వానన చాల మందికి కిట్టదు. రసాయనిక లక్షణాలు నీటితేమలోని తేడాలవల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఇక సరియైన సూర్యకాంతి లేని పక్షంలో వాటిని ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తారు.

తేమను తీసివేయడానికి కృత్రిమ లేదా యాంత్రిక డ్రయర్‌లను ఉపయోగిస్తారు. మంచి పోషక విలువలున్న చేపలని, ఎండలో ఎండబెట్టిన చేపలకన్నా ఎక్కువ కాలం ఉంచవచ్చును. నీటిలో మునిగిస్తే చేపలకి తిరిగి తమ సహజాస్థితికి వస్తాయి. ఎండబెట్టిన చేపలకయితే మాత్రం, ఇలాచేసినా తాజా చేపలకుండే జిలాటిన్ లక్షణంరారు.

ఆ విధంగా గాలి ఉష్ణోగ్రత ఈ ఎండబెట్టే చర్యలో ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత అధికంగా చేస్తే ఈ చర్య సమర్థత పెరుగుతుంది. గాలి ఎంత పొడిగా ఉంటే ఈ చర్య అంత త్వరితగతినీ జరుగుతుంది.

ఉప్పులో ఊరవేత

సామాన్య ఉప్పు సోడియంక్లోరైడ్‌ను ఈ చర్యలో ప్రజర్యేటిన్‌గా ఉపయోగిస్తారు. ఈ కణజాలలోకి ప్రవేశించి బాక్టీరియా అభివృద్ధిని నిరోధించి ఎన్‌జైమ్‌ల క్రియాశీల లక్షణం పోగొడుతుంది. ఉప్పు చేప శరీరానికి తాకగానే ఈ చర్య ఆరంభం అవుతుంది. చివరకు ఉప్పు శరీరం అంతాచేరి తగిన నెలెనిట్రి అందుకుంటుంది. రుచి వానన బాగుంటాయి.

ఊరవేతకు సంబంధించి గమనించవలసిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉప్పు స్వచ్ఛమైనదిగా ఉండాలి. ఇక ఎంత ఉప్పు ఉపయోగిస్తున్నామో ఏ పద్ధతిలో దానిని వినియోగిస్తున్నామో, ఉష్ణోగ్రత మొదలైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అనేవి కూడా చూడాలి.

చిన్న చేపలయితే శుభ్రపరచవలసిన అవసరం లేకుండానే సరాసరి ఉప్పులో ఊరవేస్తారు. ఇక ఒక మోస్తరు నైజాలో ఉన్న పెద్దవిగా ఉన్న తలలోని ఆంతరాంగాలు తీసివేస్తారు. శరీరం పొడవునా కత్తితో గాట్లు కొన్ని దాని మాంసంలో నుంచి వేస్తారు. తరువాత చేపలని కడిగి ఉప్పుతో నింపుతారు. సరిసమానంగా మాంసంలోనించి ఇది వ్యాపిస్తుంది. సొరచేపల వంటి వాటి సందర్భంగా అయితే వాటిని తగిన విధంగా ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తారు. సాధారణంగా సార్డిన్లు, మాకరల్లు, సీర్ చేపలు, మర్జాలమత్స్యలు, సొర చేపలు, రొయ్యలను ఉప్పులో ఊర వేయడం జరుగుతుంది.

ఉప్పులో కాల్షియమ్, మెగ్నీషియం అల్ప ప్రమాణాలలో ఉన్న చేప మాంసం కొయ్యల్లాగా, తెల్లగా అయిపోతుంది. అందువల్ల స్వచ్ఛమైన ఉప్పునే ఉపయోగించడంవల్ల చేపనాణ్యత చెడిపోదు. పైగా కాల్షియం, మెగ్నీషియం, కొద్దిగా ఉన్న చేప చేదుగా అయిపోతుంది. ఈ పదార్థాలు ఉప్పులోవలికి బాగా చేర కుండా అడ్డగిస్తాయి.

ఊరవేత కార్యక్రమం మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. తేమ పద్ధతి, పొడిపద్ధతి, మిశ్రమపద్ధతి. పొడి పద్ధతిలో చేపలని మొదట ఉప్పులో రుద్దుతారు. తరువాత వాటిని వరుసల్లో అమరుస్తారు. దీనికి తొట్టెలు సిమెంటు లాంకులు ఉపయోగపడతాయి. తరవాత చేపల వరుసల మధ్య కూడా ఉప్పు వేస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఉప్పుకి, చేపలకి నిష్పత్తి 1:3 నుంచి 1:8 వరకు ఉండేలా పాటిస్తారు. తైలంఅధికంగా వుండేచేపలకి అధికంగా ఉప్పు అవసరం కావడం వల్ల ఈ నిష్పత్తి మారుతుంది. 10-24 గంటల తరవాత చేపలని, తొట్టెల్లోంచి తీసి నెల్వబ్రైన్లో కిడిగి ఎండలో 2-3 రోజులు ఎండబెడతారు. పెద్దచేపలు సుమారు మూడవ వంతు బరువును, చిన్నచేపలు సుమారు సగం బరువును అంటే డ్రైన్డ్ బరువులో కోల్పోతాయి.

మరొకపద్ధతి తడి పద్ధతి. ఈ ఊరవేత పద్ధతిలో ముందుగా ఉప్పు ద్రావణం తయారుచేసుకొని వుంచుకొంటారు. చేపలని శుభ్రంగా కిడిగి అందులో ముంచుతారు. రోజూ ఈ చేపలని కడుపుతారు. ఆ విధంగా సరిగా ఇవి ఊరవేతకు గురి అవుతాయి. సీర్, నల్ల పాంఫెట్, ఇండియన్ సాల్మన్ మొదలైన చేపల్లో జీర్ణనాళం తీసి వేస్తారు. 1:3 నిష్పత్తి లో ఉప్పు వేస్తారు. మొదట ఈ జీర్ణనాళ ప్రాంతంలో ఉప్పు నిండుగా వేస్తారు. తరవాత దొంతర్లుగా వేరుస్తారు. మర్నాటికి కొంత ఉప్పు కిందికి దిగిపోతుంది కాబట్టి మరికొంత ఉప్పు వేస్తారు. ఇలాగే తిరిగి చేశాక ఉప్పు బాగా పడుతుంది. 7-10 రోజులు ఇలాగ వాటిని కదల్చకూండా ఉంచుతారు. ద్రవాన్ని మాత్రం బయటకు తీసివేస్తారు. ఈ పద్ధతి తూర్పు తీరంలో బాగా అమలులో వుంది. పశ్చిమ తీరంలో జీర్ణనాళం తీసివేసి ఉప్పు ఒకే సారిగా మొత్తం వేసి వెదురు బుట్టల్లో చేపల్ని వేరుస్తారు. తడి ఉప్పు ఊరవేతకు గురి అయిన చేపలను వానలు రాకముందుగానే ఉపయోగించు కోవాలి. మళ్ళీ ఎండబట్ట అవసరం లేకుండా చేపలని మార్కెట్లోకి తరలిస్తారు.

పిల్ క్యూరింగ్ మరొక పద్ధతి. ఇది ధక్కిణ, ఆగ్నేయ తీరప్రాంతాలలో ఆవలంబిస్తారు. మనదేశంలో ఈ పద్ధతిలో చేపలకి ఉప్పు రాసి గోతుల్లో ఆకులు చుట్టూవేసి చేపలను పాతి పెడతారు. 2-3 రోజుల తరవాత బయటకు తీసి మార్కెట్కు సరాసరి పంపుతారు.

ఇక మిశ్రమ ఊరవేత కార్యక్రమంలో ఉప్పు, బ్రెన్ (ఉప్పు నీరు) రెండూ ఒకేసారి ఉపయోగిస్తారు. చేప శరీరంలోని ఉప్పు గాఢత, చుట్టూ ఉన్న మాధ్యమంలోని గాఢతను చేరుకొనే వరకు ఈ ఉప్పు కార్యక్రమం కొనసాగిస్తారు. ఉప్పు ఊరవేత కార్యక్రమం చేప ఆకారం, నిర్మాణం కండర కణాల యాంత్రిక లక్షణాలను మార్చవచ్చును.

పొగ చూరించడం

ఈ పద్ధతిలో కూడా చేపలను నిలువచేస్తారు. అయితే నిలువతో బాటు చేపెండి పోవడం, పొగలోని నిర్మాణాలు చేపశరీరాలలోకి చేరడం జరుగుతుంది. ఇందులో నాలుగు మౌలిక అంశాలు ఉన్నాయి. అవి బ్రెనింగ్, డ్రైయింగ్ స్మోకింగ్, హీట్ట్రీట్ మెంట్ అనేటివి. పొగ చూరింపుచర్యతో చేపకి నుంచి ప్లావర్నుంచి వస్తుంది. చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది.

మొగుట చేపలని ఉప్పునీళ్ళలో ముంచుతారు. తరువాత కడ్డీలకు వ్రేలాడతీస్తారు. పీటిని కిల్స్ అనే ఒక బారెల్ కుపైగా అమరుస్తారు. తరువాత పొగ కుంటల నుంచి సుమారు 60°C వద్ద ఈ పొగను వాటి మీదుగా పోస్తారు. అయితే పొగ వేడిగానూ పంపుతారు లేదా చల్లగానూ పంపుతారు. పొగ అధికంగా ఉండవచ్చు లేదా తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇదంతా మనకు కావలసిన వద్దతిలో కోరుకొన్న చేప విధానం బట్టి ఉంటుంది. చల్లని పొగ అయితే దూరంగా ఉన్న పొగ కుంటనుంచి గొట్టుం ద్వారా సుమారు 30°C వద్ద పొగను పోనిస్తారు. ఒక చిన్న షెడ్ లో అధిక సంఖ్యలో చేపలను ఉంచి పొగచూరించవచ్చు.

పొగ చూరించడంలో ఫార్మాలిన్ హైడ్రేట్, అమ్మోనియా, ఫినాల్ లు, ఫినాలిక్ నిర్మాణాలు ఉపయోగించి సమర్థవంతంగా చేపలను నిలువచేసుకోవచ్చు సార్టీన్ లు మాకెరల్ లు, పాంఫ్రెట్ లు, జ్యాచేపలు, రిబ్బన్ చేపలు, హిల్స్ మొదలైనవాటిలో పొగ చూరించిన చేపలు మంచి నాణ్యత కలిగి ఉంటాయి.

డబ్బాలో నిలువ చెయ్యడం

సూక్ష్మ జీవులను వేడి చేయడం ద్వారా నిర్మూలించి, చేపలు చెడి పోవడాన్ని నిరోధించడం, తద్వారా నిలువ చెయ్యడం డబ్బాల ద్వారా (కేనింగ్) సాధ్యమవుతుంది.

అహార పదార్థాలతో బాటు సూక్ష్మక్రిములుంటాయి. పీటిని నిర్మూలించక పోతే ఆహారం చెడి పోతుంది. ఈ సూక్ష్మక్రిములను అంతం చెయ్యడమే కాక, కొత్తగా తిరిగి మరి కొన్ని చేరుకుండా చూడాలి. కానింగ్ చర్యలో కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలున్నాయి. మొదట చేపని సరిగా తయారు చేసుకోవాలి. డబ్బాతయారు చేసుకోవాలి దానిలో చేపలను వేసి తిరిగి దానిమూత వేయాలి. ఇలానింపిన డబ్బాలన నేడిచేసి చేప పోకుండా క్రిములను సంహరించాలి. అఖరికి చాల్లార్చి శుభ్రపరచి, నిలువ చెయ్యాలి.

ముడిపదార్థాన్ని తగిన విధంగా ప్రోసెస్ చెయ్యాలి. దానిలో క్లాస్టిడియమ్ బాక్ట్యులినీయమ్ అనేదాని సిద్ధబీజాలుంటాయి. ఇవిచాలా ప్రమాదకరమైనవి, వాటిని నిర్మూలించడం అతి ముఖ్యం. ఇది చేపలవంటి ప్రోటీన్ అధికంగా గలవాటిలో ఉంటాయి. పీటిలో pH విలువ 6-7 ఉండి అమ్లస్థితికివ్యతిరేకంగా (నాన్ ఎసిడిక్) ఉంటాయి. క్లాస్టిడియమ్ స్పోరోజీన్స్ అనే మరొకబాక్టీరియమ్ ఉండి ఇది వేడిని బాగా తట్టుకోగలుగుతుంది. క్లాస్టిడియమ్ బాక్ట్యులినీయమ్ కన్నా 5-6 రెట్లు అధిక ఉష్ణోగ్రత పీటి సంహారానికి కావాలి 4 నిమిషాల బాటు 120°C వద్దకాని, 10 నిమిషాల పాటు 115°C వద్ద కాని మరిగిస్తే ఇవి చాలా సంఖ్య లో నశిస్తాయి.

17.3.2 కానింగ్ కు ముందర ముడి పదార్థాన్ని తయారు చేసుకోడం

(a) డ్రిసింగ్ : మొదట్లో చేపలని బాగాడ్రస్ చెయ్యాలి. డ్రిసింగ్ క్రియలో పాలునులు తల, పేగులు తీసివేస్తారు పెద్ద పెద్ద చేపల్లో అయితే కొన్ని సందర్భాలలో వెన్నెముక కూడా తీసివేస్తారు తలలేని ఈ చేపలని కడ్డీలమీద ఉంచి స్మోకింగ్ చర్యకు గురిచేస్తారు. ఆతరువాత డబ్బాలో పెడతారు. చిన్న చేపలయితే యాంత్రిక వద్దతిలో ముక్కలు చేసి డబ్బాల్లో పాడు గునా అమరిక చేస్తారు. తల, పేగులు తీసివేసిన తరువాత రక్తం పూర్తిగా కారి పోనియ్యాలి. ఈ విధంగా డ్రస్ చేసిన ముక్కలని చివరసారిగా క్లోరినేటిడ్ సీళ్ళతో కడగాలి. దీనివల్ల బాక్టీరియా పూర్తిగా తొలగించబడతాయి.

(b) ఉప్పులో ఊరవేత : తరువాత చేపల ప్లావర్ పోకుండా నిలుపు చెయ్యాలి. దానిరుచి యధాతథంగా ఉండడానికి ఉప్పురాసి బ్రెనింగ్ ప్రక్రియకు గురిచెయ్యాలి. చేపలని పొడి ఉప్పుతో కలిపి బ్రెన్ లో ముంచాలి. ఉప్పుగాఢత 1.1 నుంచి 1.6 శాతం వరకు వచ్చి చేప తగిన అంగీకారయోగ్యస్థితికి చేరుకొంటుంది. ఉప్పురాత చేప శరీరంలో ఉప్పుసమాన గాఢత పెంపొందించుకోడానికి అవసరం ఉప్పుశుభ్రమైనదిగా ఉండవలసిన అవశ్యకత ఎంతయినా ఉంది. ప్రొసెసింగ్ చేసే ముందు కేన్ లోలో ఉప్పుగుళికలు వెయ్యడం మంచిది.

(c) ప్రీకుకింగ్ : ప్రోటీన్ లలోని అధిక నీటిని తీసివేసేవిధంగా చేపలని వేడిచేసి పండడాన్ని ప్రీకుకింగ్ అంటారు. నీటిని తీసివేయక పోతే అనేక దుష్ఫలితాలు ఒనగూడతాయి. కనీసం 60 శాతానికి చేపలోని నీటిని తగ్గించాలి. ఈ ప్రక్రియలో చేపల బరువు తగ్గిపోతుంది. బ్రెన్ లో వంట ఆవిరిలోకాని, వేదిగాలిలో కాని వంట కన్న తృప్తి కరంగా ఉంటుంది.

(d) క్రయింగ్ : వంట పద్ధతిలో, తేమను తీసివేయడానికి వేడిగాలితరంగాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల నూనె నాణ్యత మెరుగవుతుంది. మరి ఎక్కువగా ఎండబెడితే, టెక్స్చర్ గట్టిగా ఆయిపోతుంది. ఈ విధమైన ఎండవేతను బాగా కప్పి స్థలాలలో బాగా గాలిని చొరనిచ్చి జరపవచ్చు.

(e) పొగ చూరించడం : తేమను తీసివేయడంలో బాటుగా, డబ్బాలో నిలువ చేసిన చేపలకి మంచి ఫ్లావర్ సమకూర్చడానికి పొగచూరించే పద్ధతి అవలంబిస్తారు ఈ ప్రక్రియలో చేపలను కడ్డీల నుండి వ్రేలాడ దీస్తారు. వీటిని పొగచూరే గూహ ద్వారా పంపుతారు. ఇటీవల ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పద్ధతి పొగచూరించడం అనుసరిస్తున్నారు. దీనివల్ల మంచి ఫ్లావర్ సమకూరుతోంది అయితే రంగు విషయంలో అంత సంతృప్తికర ఫలితాలు చేకూరలేదు. ఒకేపద్ధతిలో పొగ చూరించడం విషయంలో కొంత ఇబ్బంది వస్తోంది, మామూలు పద్ధతిలో పొగచూరించడానికి 8-16 గంటలు పడితే ఎలక్ట్రో స్టాటిక్ పొగచూరించడానికి 10-30 నిమిషాలు పడుతుంది, రుచివిషయంలో ఫలితాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి.

17.3.3 డబ్బాలు

కానింగ్ పరిశ్రమలో డబ్బాలు టీన్ ఫ్లేట్లతో తయారు చేస్తారు. పల్చని స్టీల్ షీట్ కు రెండు ప్రక్కలా టీన్ పూస్తే టీన్ ఫ్లేట్ తయారవుతుంది. ఈ విధంగా రక్షకగుణంతో బాటు స్టీలు కుండే శక్తి కూడా లభిస్తుంది. టీన్ ఫ్లేట్ క్షత్తయకర లక్షణం నుంచి [కరోషన్] రక్షణ సమకూరుతుంది. దానిమీద నాలుగు స్తరాలు, అల్ట్రా, టీన్ రక్షక ఆక్సైడ్, తెలం ఉండడమే దీనికి కారణం. ఆధార స్టీల్ కుండే రసాయనిక గుణంతోబాటు ఈ లక్షణాలు తోడవుతాయి. ప్రత్యేక ఎనామిల్ లతో కాని, లక్కుతో కాని టీన్ కుపూతపుయ్య వచ్చును. సల్ఫర్ ను శోషించడానికి వీలుగా ఇనార్గానిక్, ఆర్గానిక్ లక్కులు రకరకాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. సముద్ర ఆహార పదార్థాలని డబ్బాలలో నిలువచేస్తే సల్ఫర్ అయాన్లు తయారవుతాయి. ఇవి టీన్ కోటింగ్ తో ప్రతిచర్య జరుపుతాయి. ఈ సల్ఫర్ అయాన్లు మన ఆరోగ్యానికి భంగరకం కాదు కాని వస్తువు కంటికి నదరుగా కనబడకుండా పోతుంది.

సల్ఫర్ నిరోధకతకల నల్లఫ్లేట్లు, అల్యూమినియమ్, జింక్, నికల్ టీటానియమ్లతో పూత పూసిన స్టీల్ ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తారు. కాని దీనిని అంతగా ఉపయోగించి నట్లుగా లేదు. గ్లాస్ జార్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే టీన్ ఫ్లేట్ల కన్నా ఇవి అధికంగా ప్రాసెసింగ్ టైమ్ తీసికొంటాయి.

17.3.4 డబ్బాలో నిలువ పద్ధతులు

నింపడం : ఖాళీ డబ్బాలను జాగ్రత్తగా నింపడానికి పనివాళ్ళు అవసరం పడుతుంది. లేదా యాంత్రిక పద్ధతుల్లో నయినా నింపవచ్చు. పాకింగ్ చేసేటప్పుడు అందులో గాలి బుడగలు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా చర్యలో గాలి పూర్తిగా తీసివేసినప్పుడు ఈ బుడగలు అలాఉండి పోతాయి. అదేకాక పాకింగ్ లో మరి గట్టిగా ఉండకూడదు వైన కొంచెం ఖాళీస్థలం ఎప్పుడూ ఉంచాలి. ప్రాసెసింగ్ లో వదలిన గాలికి ఈస్థలం వదలి వెళ్తాలి.

కొప్పు చేరి వుండే చేప జాతుల్లో [సాల్మన్, హెర్రింగ్, మాకెరల్ మొ||] అయితే ఉప్పురాసిన తరవాత ఫలితాలు అమోదయోగ్యంగా ఉంటాయి. కొప్పు తక్కువగా ఉండే చేపల సందర్భంగా ప్రత్యేక అదనపు పదార్థాలు కలుపవలసివస్తుంది. దానివల్ల వాటి ఫ్లావర్ టెక్స్చర్ బాగుపడతాయి. చేపలని సరిగా ఉప్పులో ఊరవేయకపోతే బ్రెన్ ఉపయోగించాలి. దీనివల్ల ఫ్లావర్ బాగుపడుతుంది.

గ్లూమేట్ [మోనోసోడియమ్ గ్లూమేట్] డబ్బాలలో నిలువచేసే చేపలకి ఉపయోగిస్తారు. 1 కే.జి. చేపలకి 1.6 గ్రాముల చొప్పున గాఢతలో కలపాలి. వృక్షసంబంధ సూనెలు, అలివ్ సూనెలు డబ్బాలను నింపడానికి ఉపయోగిస్తారు.

రేచక్రీయ (ఎగ్జాస్టింగ్) : సీలు వేయడానికి ముందు డబ్బాలోని గాలి వాయువులను తీసివేయాలి. ఇది రేచక్రీయ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ఉష్ణప్రక్రియకులోనుచేసినపుడు గాలి వ్యాకోచం చెందుతుంది. సమయంలో డబ్బాపైన వికృతి (strain) చర్య తగ్గిపోతుంది. లోన జరిగే క్షయము నిరోధించడానికి జిప్సమ్ తీసివేయాలి. లోన శూన్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. డబ్బాని చల్లార్చినపుడు ఈ విషయాలు ప్రస్ఫుటమవుతాయి. ఇవి చక్కగా పాకింగ్ జరిగిందనటానికి గుర్తులు. చేపల రంగు, ప్లావర్ కాపాడబడాలి. విటమిన్లు విలువ తరిగిపోదు. అభివృద్ధి చెందడానికి కావలసిన గాలి పోగొట్టడంవల్ల లోన క్రిముల అభివృద్ధి సాధ్యంకాదు.

ఆ తరువాత సీలు పూర్తిచేసి మూతకి డబ్బాకి మధ్య గాలి చొరలేకుండా మూతపడిపోతుంది. డబ్బాలో పేర్చిన చేపలు ఫైర్లెజ్డ్ కావడంవల్ల పై విధంగా క్రిములు లోపలకి చొరలేవు కాబట్టి చేపలు చెడిపోకుండా ఉంటాయి.

(c) ప్రాసెసింగ్ : ఆవిరితో జరిపే ప్రాసెసింగ్ క్రియలో గాలిని వీలైనంత వరకు పూర్తిగా తీసివేయడం ముఖ్య అంశం. చేపలతో సహా డబ్బాను రిటార్ట్ లో ఉంచి వేడిచేస్తారు. ఈ ఉష్ణోగ్రత క్రియాశీలత లోపించినా చెడిపోడానికి దోహదం చేయ్యగలిగే క్రిములను చంపడానికి లేదా బాచేస్ లో ఉపయోగించవచ్చు. ఇటీవల ఓవెన్ బాయిల్డ్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ విధంగా, ఆవిరితోగాని, నీటితోగాని పీడన విధానంలో ప్రాసెసింగ్ ను ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నారు.

నిలువు లేదా సమానాంతర పద్ధతిలో, నిశ్చలంగా కాని తిరుగుతూ ఉండే విధానంలో చాల వరకు ఈ రిటార్ట్ లోకి ఆవిరి పంపబడుతుంది. రిటార్ట్ కుపైన ఒక రంధ్రం ఉంటుంది. దానిలో నుంచి ఆవిరి ప్రవేశిస్తుంది. రిటార్ట్ లోకి ప్రవేశించిన ఆవిరి బరువు, లోనకు ప్రవేశిస్తున్న ఆవిరి బరువు రెండూ కలసి గాలిని కిందనుంచి బయటకు నెట్టివేస్తాయి. కలగావులగం జరిగదు. రిటార్ట్ లోకాని గాలి గోళాలు మిగిలిపోతే ప్రాసెసింగ్ ఎగుడు దిగుళ్ళలో ఉంటుంది. పీడనకి, ఉష్ణోగ్రతకి మధ్య అటంకపరచి ప్రాసెసింగ్ తృప్తిగా జరిగదు. ప్రాసెసింగ్ కి కావలసిన కాలము, ఆవారానికి కావలసిన ఉష్ణోగ్రత అనేక కారణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కట్టలు కట్టే విధానం డబ్బాలు, రిటార్ట్ వ్యవస్థ మొదలైనవి.

పై విధంగా ఉష్ణప్రక్రియ జరిపితే చాలా వరకు చెడిపోడానికి కారణాలయిన బాక్టీరియా చనిపోతాయి. ఇంకా చనిపోకుండా కొన్ని బాక్టీరియా మిగిలిపోతే, ప్రాసెసింగ్ తరువాత అతి త్వరగా చల్లార్చడం వల్ల వాటి నిర్మూలన కూడా పూర్తి అవుతుంది. డబ్బాలను 35°C వరకు చల్లార్చాలి. దీనివల్ల డబ్బా ఉపరితలం పొడిగా ఆరిపోతుంది. తుప్పు పట్టకుండా నిరోధిస్తుంది. 5 PPM గాఢతకల క్లోరినేటెడ్ జలంతో చల్లార్చేక్రియ జరుపుతారు. ప్రాసెసింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు తరువాత, పీడనాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా నియంత్రిత చేసినా అప్పుడప్పుడు తాత్కాలికంగా చిల్లులు కనబడతాయి. ఈ రంధ్రాల ద్వారా బాక్టీరియా ప్రాసెసింగ్ తరువాత లోపలికి ప్రవేశించవచ్చు. దీనిని తగ్గించడానికి కోలినేటెడ్ నీరు చల్లార్చడానికి ఉపయోగిస్తారు.

డబ్బాలోనిలువ పూర్తి అవగానే వాటిని చిన్న ప్రాంతాలకి చేర వేయడానికి ప్రయత్నించ కూడదు. దానిలో కలిపిన ఉప్పుగుళికలు ఇతర అదనపు పదార్థాలు పూర్తిగా డబ్బాలోని చేపలకు పూర్తిగా వ్యాప్తి చెందవు. దీనికి కొద్ది రోజుల అవసరం అవుతుంది. కనినం 3 నెలలయినా వీటిని నిలువచేసి ఉంచి గమనించాలి. ఆ తరువాత నాణ్యత పరీక్షలు జరిపి ఎగుమతికి సిద్ధం చేయాలి. ఈ కాలంలో కారుతున్నా, సంక్రమణ జరుగుతున్నా తెలిసి పోతుంది.

కొన్ని సందర్భాలలో డబ్బాలోని చేపల్లో క్రిమి సంబంధ నాశనక్రియ లక్షణాలు కనబడుతాయి. ఇది సరియైన పద్ధతిలో కానింగ్ క్రియ జరగక పోవడమే కారణం ముఖ్యంగా చల్లారే క్రియ సక్రమంగా జరగపోవడము, ముడి పదార్థాలని సరిగా ప్రిజర్వ్ చెయ్యకపోవడం కారణాలు. చెడిపోయిన లక్షణాలతోబాటు, చనిపోయిన బాక్టీరియా కూడా కనబడతాయి. బాక్టీరియా ప్రాసెసింగ్ కొన్ని సందర్భాలలో తట్టుకోగల్గుతాయి. కాని చల్లారేక్రియలో నిలువక్రియలోనూ చనిపోతాయి. సరియైన పద్ధతిలో ప్రాసెసింగ్ జరగకపోతే, వేడినితట్టుకోగల్గే, సిద్ధబీజాలు తయారు చెయ్యగలే బాక్టీరియా మిగిలిపోతాయి. సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరచే సామాన్య బాక్టీరియాలు మిసోఫిలిక్ నిర్మాత జీవులు అయి ఉంటాయి. (క్లాస్టిడియమ్ స్పోరోజిన్, క్లా. ఫుట్రిఫికమ్). వీటివల్ల కుళ్లు బుడగలు ఏర్పడతాయి. మిసోఫిలిక్ ఎయిరోబ్స్ (బాసిల్లస్ జాతులు) ఫ్లావర్ ను ఏర్పరుస్తాయి. వాటివల్లనే రంగులో మార్పువస్తుంది. పదార్థాలు మెత్తబడిపోతాయి. థర్మోఫిలిక్ బాసిల్లె "ఫ్లాట్ సోర్స్" ఏర్పరచడం చాలా అరుదు. బాక్టీరియాకు గాస్ ఉత్పత్తి చేసేకత్తి ఉంది డబ్బాలో ఉన్న పదార్థంతో ప్రతి చర్య జరపడానికి అవకాశం ఉంది. డబ్బాలో తల భాగంవైపు చేరిన వాయువు సహాయంతో ఏ విధమైన నష్టం ఎంతవరకు జరిగిందే నిర్ణయించగలుగుతాము. డబ్బాలు ఉబ్బి పోవడానికి CO₂ కూడా కారణమవచ్చు. అలాగే మైక్రోబ్ లవల్ల చెడిపోవడం కారణంగా ఏర్పడే హైడ్రోజన్ కూడా దీనిని కలిగించవచ్చు.

వివరగా ఈ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా అనేక పద్ధతులలో పరీక్షిస్తారు. ఆర్గన్ లెప్టికల్ పద్ధతి, రసాయనిక పద్ధతి, సూక్ష్మక్రిమి పద్ధతి దీనికి వినియోగిస్తారు. తరవాత ఒకలాబెల్ (label) మీద చక్కగా వివరాలన్నీ ఇస్తారు. ఉత్పత్తి పేరు, దానిలోని పదార్థం బరువు. మిగతా వివరాలు ఎవరినా ఉంటే అవన్నీ సమకూరుస్తారు. ప్రాసెసింగ్ పూర్తి అయ్యాక వాటిని ఒక గదిలో నిలువచేస్తారు. వాటి ఘనీభవ ఉష్ణోగ్రతకు కొద్దిగా వైన ఈ గది ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి.

17.4 రవాణా

ఆధునిక కాలంలో చేపలు పట్టడం, చేపల ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు చాలాపురోగతి సాధించాయి. తాతా చేపల సందర్భంగా ఆర్థిక దృష్ట్యా సద్వినియోగ వరచుకోవడం వాటి రవాణా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చేపలు పట్టడం అంతకంతకు అధికమవుతోంది వట్టి తీరానికి చేరిన తరవాత వీటిని వినియోగదారులకు అందే విధంగా రవాణాచేయాలి. మన దేశంలో 4,8 00 కి.మీ. పొడవైన తీరం వెంటడి చేపలు పట్టే ప్రాంతాలు భిన్న లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి.

పూర్వకాలంలో అధికంగా పట్టిన చేపలు, పడవల్లోంచి తెచ్చిన అధిక సంఖ్యలను కొబ్బరి తోటల్లో పాతిపెట్టేసేవారు. ఆ తరవాత వాటిని ఎరువులుగా ఉపయోగించేవారు. అధనంగా లభించిన చేపలని ఉప్పు ఊరవేత చేసేవారు. అయితే వాటికి సరసమైన ధర బజారులో రాదు. సరియైన సాంకేతిక పద్ధతుల్లో వాటిని సేకరించి, నిలువ చేసేపద్ధతులు, తగిన రవాణా సౌకర్యాలు లేక పోవడం వల్ల ఈ పద్ధతులు అనుసరించేవారు. చేపలు పట్టే పడవలు యాంత్రిక విధానాలు అనుసరించడం ప్రాముఖ్యత వహించిన విషయం. చేపలు పట్టే ప్రాంతాల నుంచి దేశం లోతట్టు ఉండే ప్రాంతాలకు వీటిని రవాణా చెయ్యవలసిన అవసరంఉంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలు వేలాది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. సామాన్య వినియోగదారునికి చేరడానికి కొనసాగిన సమస్యలు ఉన్నాయి. పట్టిన చేపలని ఎందులో ఉంచాలి, ఐస్ వివిధంగా దానికి కలపాలి, రవాణా ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనే విషయాలు అధ్యయనం చెయ్యాలి.

చేప పరిశ్రమలవారు తమ ఉత్పత్తులను ఎగుమతిచేసి, విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆర్జించడం మీదనే దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. భారతదేశంలోని వినియోగదారులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా వినియోగదారునికి అందవలసినంతగా ఈ చేపలు లభ్యం కావడం లేదు. చాలా దేశాలు

మంచి పురోగతి సాధించారు. యాంత్రిక రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుయ్యాయి. కాని మనదేశం మూత్రం ఇంకా వెనుకబడి ఉంది. పద్ధతులను ప్రమాణీకరించలేదు.

ఆధునిక రీతిలో పరిరక్షించడం (ప్రిజర్వేషన్), హిమీకరణ (ఫ్రీజింగ్) డబ్బాలలో నిలువ చేయడం వంటివి. రొయ్యలను పరిరక్షించడం సందర్భంగానే ఉపయోగిస్తున్నారు. భారతదేశంలో సముద్రమత్స్య పరిశ్రమలో రొయ్యల వాలూ 10-12% ఉంటోంది. మిగతా 90 % చేపల వాలూ అవుతుంది. వీటికి విదేశీ రవాణా అవసరాలు లేవు. వాటి సందర్భంగా సేకరించడం, రవాణా చెయ్యడం, బ్రుక్లు, వాన్లు, ఉపయోగించడంవల్ల తీరప్రాంతాల రవాణా సుఖకరం అయ్యింది. ఇటీవల ప్రశీతల (రిఫ్రిజరేటెడ్) రైల్ వాగన్లు ప్రవేశపెట్టడం వల్ల వాటి ద్వారా నగరాలు మధ్య రవాణా సౌకర్యం కల్పించడంవల్ల తాజా చేపల రవాణా కొంత మేలు జరిగింది.

చేప త్వరగా చెడిపోడానికి అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. నేలమీదకు చేరాక క్రిముల ప్రభావం వల్ల నాణ్యత నశించిపోతుంది. కొద్దికాలం పాటు చేపలను పరిరక్షించడానికి, ముందుకు గడ్డలుగా కట్టి ఉపయోగించి తాజాగా ఉంచ ప్రయత్నిస్తారు. 24 గంటల కొకసారి మంచును తిరిగి ఉపయోగించాలి. ముందు ఉపయోగించిన మంచు కలిగిపోతుంది. అయితే మంచు దొరకడం ఆపరిస్థితుల్లో కష్టం అవుతుంది. అర్ధికంగా లాభదాయకం కూడా కాదు ఇటీవల మంచు తరగిపోకుండాని నిరోధించ గలిగే కంట్రైనర్ రూపొందించారు. వెదురు బద్దలతో బుట్టలు అల్లి లోపల బిటుమిన్ పూసిన క్రాఫ్ట్ కాగితంతో లైనింగ్ చేస్తారు. గవ్వ, పాలీతీన్, తాటిచేపలు, అరటి ఆకులు కూడా ఉపయోగించి చేపల రవాణా జరిపిస్తారు. చేపలకి మంచుకు 1:1 నిష్పత్తిలో పాకింగ్ చేస్తారు.

వెదురు బద్దలు చిల్లి, లోతు తక్కువ ఉండే విధంగా బట్టలు అల్లుతారు. బుట్టకు లోతట్టుగా గోవెనంచులు కుడతారు. 300 గేజ్ పాలీతీన్ దాని మీద పరుస్తారు. మంచుతో కూడిన చేపలను దానిలో ఉంచి నపుడు గోనె తడి కాకుండా ఇది నిరోధిస్తుంది. యూనియన్ క్రాఫ్ట్ కాగితాన్ని కూడా పాలీతీన్ కు బదులు వాడుతారు. దిగువ రంధ్రాలు వేయడంవల్ల కరిగిన మంచు నీళ్లు కారిపోతాయి. తాజా జ్యూచేపలు, సార్డిన్లు ఈ పద్ధతిలో రవాణా అవుతాయి.

చాలా "బాలరీ" దేశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక ధనం పెట్టుబడి పెట్టి ఈ రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధించారు. చేపల రవాణా, తాజా చేపల సరఫరా, సాధించడంలో శీతల నిలువ కేంద్రాలు, మంచు యంత్రాగారము మంచి పాత్రవహిస్తాయి. ఆధునిక కంట్రైనర్లు, ప్రశీతక వాహనాలు చేపలను తొందరగా అందరికి అందజేస్తాయి. మన దేశంలో చేపల రవాణాకి తక్కువ ఖర్చుతో సమర్థవంతమైన రవాణా కంట్రైనర్లను రూపొందించారు.

ఈ కంట్రైనర్ సెకండ్ హ్యాండ్ టీచెస్ట్ మంచు కరిగి పోకుండా నిరోధించే లక్షణం దీని కుంది. ఉష్ణోగ్రతను 60 గంటల వరకు తగుమట్టులో ఉంచుతుంది. దీనిలో రెండు సైజులుంటాయి. 28.2x18.2x8.5 సెం.మీ. 110 కే.జీలు ఒకటి. 45.5x45.5x1.0 సెం.మీ - 80 కేజీలు రెండవది. 25 మి.మీ. మందంలోని థర్మోకోల్ను సరియైన సైజుల్లోకి కోస్తారు. కంట్రైనర్లోకి వీటిని సరిగానర్చే విధంగా ఉంటాయి. పాలీతీన్ సంచులు కూడా ఉంటాయి ఆరు ప్రక్కలా మంచు కరిగిన నీరు నుండి రక్షణకలుగుతుంది. థర్మోకోల్ వల్ల లోపలివల్ల ధనం బయటకుపోదు. వైను ఉష్ణోగ్రత లోపలికి చేరదు.

చేపలని 5 ppm క్లోరినేటెడ్ సీటితో మళ్ళీ మళ్ళీ కడిగి చేప శరీరం నుంచి జిగురు ఇనక, దుమ్ము, రక్తం ఇతరవైదేశిక పదార్థాలను పోగొతాయి. మంచు ఖండాల్లో బాక్టీరియా ప్రభావం లేకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తారు. 1:1 నిష్పత్తిలో (1 కే.జీ. చేపలకు 1 కే. జి. మంచు) కంట్రైనర్లో వేస్తారు. దానిమీద కడిగిన చేపలని ఉంచుతారు. తిరిగి ఆ చేపలమీద మంచు పరుస్తారు. దాని మీద చేపలని మళ్ళీ ఒక వరసలో ఉంచుతారు. ఆ విధంగా ఏ కాంతంగా చేపలు, మంచు వరసల్లో ఉంచుతారు. చేపలు, మంచు తగిన బరువు వచ్చేదాకా కంట్రైనర్లో నింపుతారు. చివరగా వై వరస మూత్రం మంచు వరస ఉండాలి. మందుకు, చేపలకు, తాకిడి చక్కగా ఉండే

విధంగా చూసుకోవాలి. చివరగా, చివరి థర్మోకోల్ ఆరవ భాగం వెట్టెలో ఉంచి మూత వేస్తారు. ఈ మూతను వెట్టెకు మేకులతో దిగగొట్టాలి. కంటైనర్‌ను చివరిగా గోనె సంచిలో ఉంచి కట్టి కుట్టివేయాలి. ఇక రవాణాకు ఇది సిద్ధం అవుతుంది.

రవాణా కాలాన్ని అనుసరించి లోపల ఉపయోగించే మంచు చేపల నిష్పత్తి మార్పుకోవచ్చు. 24 రోజుల లోపలనే రవాణా పూర్తి అయిపోతుందను కొంటే 3/4 లేదా 1/2 వరకు మంచు ఉపయోగించాలి. ప్రయాణ కాలం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందను కొంటే కంటైనర్‌లో మంచు అధికంగా ఉంచుకోవాలి. మార్కెట్‌కు చేరడానికి నరఫరాకి తగిన కాలం లెక్కలోకి తీసికోవాలి.

కంటైనర్‌లను రైల్ వాగన్‌లలో కాని, ట్రక్‌లలోకి కాని ఎక్కించాలి. ఈ అమరికలో ఒక దానికి మరొక దానికి మధ్య స్థలం, ఖాళీలు, ఉంచకూడదు. కంటైనర్ సరాసరి సూర్యరశ్మికి గురి చెయ్యకూడదు. కంటైనర్‌లను తిరిగి తిరిగి ఉపయోగించుకోడానికి వీలుగా శుభ్రంగా కడిగి ఎండ బెట్టుకోవచ్చును. సరాసరిగా లెక్కలు వేసుకొంటే 40 గంటలకి, 3 ట్రైప్స్ ప్రయాణాలు జరపవచ్చును. కంటైనర్, థర్మోకోల్, పాలిథీన్, గోనె సంచులు, మేకులు మొదలైనవాటి ఖర్చు పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది. ఏ దశలోను వీటిని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించి చెప్పలేము.

అధిక సంఖ్యలో తీరానికి చేపలు దిగుబడి అయితే వాటిని వెంటనే రవాణా చెయ్యడానికి ఇబ్బందులు ఎదురు అవవచ్చు. అలాటి పరిస్థితుల్లో వాటిని అధిక శీతలీకరణకు చెయ్యాలి. ఆ విధంగా నిలువ చేసుకోవాలి. వీటిని లోహ ట్రేలలో హీమీకరణ చెయ్యవచ్చు. 1 కె.జి., 2 కె.జి. ల చేపలని నిలువ చెయ్యడానికి వీలుగా విభజిస్తారు. మధ్య స్థలాలలో మంచి నాణ్యత కలసీటితో నింపుతారు. హీమీకరణ - 40° C వద్ద 2½ నుంచి 3 గంటల వరకు సాగుతుంది. గడ్డలుగా ఉన్న హీమాన్ని ట్రేలలో నుంచి తీసివేసి వెంటనే కంటైనర్‌లో ప్యాక్ చెయ్యాలి. ఇలాటి హీమీ కరణ సదుపాయాలు సార్దీన్, మాకరల్ వంటి చిన్ననైజా చేపల సందర్భంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎయిర్ బ్లాస్ట్ ఫ్రీజర్‌ను పెద్ద పెద్ద చేపల సందర్భంగా ఒక్కొక్క దానికి విడివిడిగా ఉపయోగిస్తారు. 2,3 రోజులపాటు ప్రయాణాలకు ఈ పద్ధతిచాలా మంచిది.

ఈ పద్ధతి హీమీకరణలో ఒక ఇబ్బంది ఉంది. చేపల పొట్టలు ఈ ప్రక్రియలో చిట్టపోతాయి. లోనఉన్న అంతరాంగవస్తుదాయం బయటకు వచ్చేస్తుంది. వినియోగదారునికి అంత సమ్మతంగా ఉండదు. ఈ విధమైన ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి 15% బ్రెన్‌లో చేపలని 30 నిమిషాలపాటు హీమీకరణకు ముంచడం మంచిది. దీనివల్ల చేపకి కొద్దిగా ఉష్ణదశం వస్తుంది. ఉడికిన తరవాత సార్దీన్ల సందర్భంగా చూడ్డానికి బాగుంటాయి. టెక్స్‌చర్ గట్టిగా ఉంటుంది.

పొడి మంచు (డ్రై ఐస్-గడ్డకట్టిన కార్బన్ డయాక్సైడ్)ను కూడా అదనపు శీతలీకరణకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అప్పటికే చల్లబర్చిన శీతలీకరణచేసిన చేపలని ఉష్ణబంధిత వ్యాన్‌లలో తీసికొనిపోయే సందర్భాలలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. మొదట్లోనే పొడి మంచు పద్ధతి అనుసరించ కూడదు. దీనివల్ల సమానంగా చేపల మొత్తం శీతల ప్రభావం అందదు. వైగా చేపలకి శీతలీకరణ గాయాలు సంభవమవుతాయి.

వై వేటు రంగంలో పెట్టుబడి వెట్టే వ్యాపారస్తులకి కుతూహలం ఉత్సాహం కలగాలి. పరిక్షణము, సంపాదనము, రవాణా పద్ధతుల్లో శాస్త్రీయ అభివృద్ధి జరిగితే, ఆ సదుపాయాలను సద్వినియోగ పరచుకోడానికి వారు ముందుకు వస్తారు. సంపుటికరణము, రవాణా విధానాల్లో అభివృద్ధి జరిగితే జాలరివాళ్ళ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మెరుగవుతుంది. దేశంలోని ప్రోటీన్ సంబంధ హీనపోషణ పరిస్థితి సర్దుబాటు అవుతుంది.

న్యవరిశీలన

1. _____ లో ఊరవేయుటవల్ల చేపలను భాగా నిలువచేయవచ్చును.

2. డబ్బాలలో నిలువ చేయుటవల్ల చేపలను _____ కూడా పాడు చేయుకుండా చాలా బాగా వుంచవచ్చును.

17.5 సారాంశము

ఈ భాగంలో చేపలను నిలువ చేయు విధానములను గురించి చెప్పబడినది. వీటిలో ముఖ్యమైన శీతలీకరణ, యెండబెట్టుట, ఉప్పులో ఊరచేయుట, పాగజారుట, డబ్బాలలో నిలువచేయుట విధానములను గురించి విశదముగా చెప్పబడినది. తాజా, నిలువ యున్న చేపల రవాణా విధానములు గూడ వివరించబడినవి.

17.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. ఉప్పు
2. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్

17.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మన దేశంలో మత్స్య పరిశ్రమ సందర్భంగా పరిరక్షణ, సంపాదనా ప్రక్రియలలో సాంకేతిక పద్ధతుల అభివృద్ధిని వర్ణింపుము.
2. కేనింగ్ (లేదా డబ్బాలలో నిలువ చేయుట) అనగా ఏమి? ఈ సంపాదనా విధానంలో అనుసరించే పద్ధతులను వివరింపుము.
3. కానింగ్ కు ముందుగా ముడిసరుకు (చేపలు) ను ఏ ప్రాథమిక క్రియలకు లోసుచేస్తారో వివరించుము.
4. చేపల రవాణాలో ఇటీవల సాధించిన పురోభివృద్ధిని వర్ణించుము?
5. చేపల పరిరక్షణలో అనుసరించే ప్రతిశీతనము, హిమీకరణము, సంపాదనములను వర్ణించునది.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేపల తాజాదనము ఏ విధంగా పరిరక్షించగలమో తెలుపుము.
2. చేపల చెడిపోయిన అక్షరాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తామో వ్రాయుము.
3. పరిరక్షణలోని ఎండ బెట్టే చర్య.
4. పరిరక్షణలో ఉప్పుతో సంపాదన చర్య
5. పరిరక్షణలో పాగచూరించే సంపాదన చర్య.

భాగం-18 సహపదార్థాల ఉత్పత్తి

విషయక్రమం

- 18.1 ఉద్దేశ్యం
- 18.2 ఉపోద్ఘాతం
- 18.3 సంఘటన
 - 18.3.1 ఎంజైములు
 - 18.3.2 విటమినులు
 - 18.3.3 పాస్టోరిపెడ్లు
- 18.4 చేపలనుంచి లభ్యమయ్యే సహ పదార్థాలు
 - 18.4.1 చేప నూనెలు
 - 18.4.2 చేప తిండి
 - 18.4.3 చేప పిండి
 - 18.4.4 చేప సెలేజి
 - 18.4.5 ఫిష్ సాల్మ్యుల్స్
 - 18.4.6 చేపప్రోటీనులు
 - 18.4.7 సొరచేపవాజాలు
 - 18.4.8 చేప గుడ్లు, చేపనమూనాలు
 - 18.4.9 చేప బంక
 - 18.4.10 ఐసింగ్లాస్
 - 18.4.11 చేప చర్మాలు
 - 18.5.12 స్పైరాల్లు
- 18.5 సారాంశం
- 18.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు
- 18.7 మూదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

18.1 ఉద్దేశ్యం

తాజా పరిస్థితిలోకాని, నిలువ చేసిన స్థితిలో కాని ఆహారంగా తీసుకొనే చేపల ప్రాముఖ్యం గురించి ఈ భాగం వివరిస్తుంది. మంచినిటి, ఉప్పునీటి చేపలోని మాంసభాగాలు భిన్న రసాయనిక లక్షణాల కలిగి ఉంటాయి. మొత్తం చేప శరీరంలోని వివిధ అవయవాలనుంచి రకరకాల సహపదార్థాల ఉత్పత్తిని సాధించగలుగతాము. ఇవి మానవునికి సంబంధించి చాలా పోషక విలువలు కలిగి ఉంటాయి. అంత ఆహార ప్రాధాన్యతలేని సందర్భాలలో వాటిని ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తారు.

18.2 ఉపోద్ఘాతం

ఉన్నత లక్షణం గల చేప తిండి జంతు పోషణలో అదనంగా చేర్చబడుతుంది. మిగతా పదార్థాలు ఎరువులుగా ఉపయోగపడతాయి. సముద్ర, మంచినీటి చేపల రసాయనిక నిర్మాణంలో ఖనిజాలు, ఎంజైములు, విటమినులు, ప్రోటీనులు, ఫాస్ఫోలిపిడ్లు మొదలైనవి ఉంటాయి. చేపల నుంచి లభ్యమయ్యే ప్రోటీను మానవ పోషణలో అతి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. సులభంగా జీర్ణం కావడం జీవశాస్త్ర రీత్యా ప్రోత్సహించే విలువ కలిగి ఉంటాయి. చేప గుడ్ల సమూహాలు, చేపనూనె, చేప తిండి, చేపపిండి, చేపసీలేజి, చేపబంక, ఐసింగ్లాస్ మొదలైనవి లభ్యమయ్యే సహపదార్థాలు. చేపనునె, కాలేయతైలం, కాడ్ లివర్ ఆయిల్, ఫార్మ్ లివర్ ఆయిల్, సార్డెన్ ఆయిల్ మొదలైనవి అధిక విటమినులు కలిగి ఉంటాయి. వీటిని రాబట్టడానికి ప్రత్యేక పద్ధతులు ఉంటాయి. చేప నూనెతో క్రావ్వుత్తులు, స్నేహకము (Lubricant), అలంకరణ ద్రవ్యాలు, మందులు మొదలైనవి తయారు చేస్తారు. సారచేప శరీర భాగములు, సాల్మన్, కేసరీ వృధా పదార్థాలు (cannery) మొదలైన వాటిని, అలంకరణ ద్రవ్యాలు, నబ్బులు, రసాయనిక పరిశ్రమలు, చాకోలెట్లు, మందులు తయారుచేయుటలో ఉపయోగిస్తారు. సహపదార్థాలు భిన్న రసాయనిక సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. చేపతిండిని ఎరువులు గాను జంతువులకు ఆహారంగాను ఉపయోగిస్తారు. చేపపిండి మానవులకు ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది. చేప చర్మం నుంచి చర్మజిలాటిన్, బంక మొదలైనవి తయారు అవుతాయి. చేపల వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి, ఈ దిగువ పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. చేప పొలుసుల నుంచి బొగ్గు కృత్రిమ ముత్యాలు, అగ్నిప్రమాదాల నివారణలో ఉపయోగపడే నురగను ఉత్పత్తి చేసే పదార్థాలు, చేపల వాయుకోశం నుంచి ఐసింగ్లాస్, బంక పదార్థాలు, పాంక్రియాస్ నుంచి ఇన్సులిన్, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల నుంచి తైలగిక హోర్మోనులు, మిల్క్ [milk] నుంచి ప్రోటమిన్, మాంసం నుంచి హిస్టమిన్, పొలుసుల నుంచి గ్లైసెన్, సిస్టెన్ మొదలైనవి.

18.3 సంఘటన (Composition)

చేప మాంసంలో 80 శాతం నీటి ఆవిరి, నూనె ఉంటాయి. 15-25 శాతం ప్రోటీను, 1-2 శాతం ఖనిజ పదార్థాలు, 1 శాతం మిగతా పదార్థాలు ఉంటాయి. భారతదేశంలోని మంచినీటి, ఉప్పునీటి చేపల రసాయనిక సంఘటనలో తేడా ఉంటుంది. ప్రోటీన్ శాతం బాంబే డక్ లో 9.05 శాతం నుంచి 26.10 శాతం [బూడిదవర్ణసార చేపలో] వరకు ఉంటుంది. మంచినీటి చేపలలో 13.7 శాతం [బెక్టిలో] నుండి 25.2 [మహాసీర్లో] వరకు ఉంటుంది.

చేపల కండరాలలో కనబడే ముఖ్య ఖనిజ పదార్థాలు కాల్షియమ్, ఫాస్ఫరస్ సోడియమ్, పొటాషియమ్, సల్ఫర్, క్లోరిన్. ఇవన్నీ చేరి 1 నుంచి 2 శాతం వరకు ఉంటాయి. ఉదా|| 100 గ్రా ప్రోటీన్ సరిసరిగా నున్న చేప మాంసంలో కాల్షియం 0.109, మెగ్నీషియం 0.133, పొటాషియమ్ 1.67, ఫాస్ఫరస్ 1.148, సల్ఫర్ 1.119, ఐరన్ 0.0055 గ్రా||. ఐరన్ న్యూక్లియో సంక్లిష్టస్థితిలో నుంటుంది.

చేపల కండరాలలో ఉండే ఇతర ఖనిజ పదార్థాలు రాగి, మాంగనీసు, స్ట్రోన్టియమ్, జింకు, అల్యూమినియమ్, బేరియమ్, సీసం, మాలిబ్డినమ్, వెనాడియమ్, బిస్మత్, కోబాల్ట్, నికెల్, టీటా నియమ్, క్రోమియం, పాడరసము, నియోబియమ్, బోరాన్, లిథియమ్, అనగంటిమొని, సిలికాన్, రేడియమ్, బ్రోమిన్, ఫ్లోరిన్ మరియు అయోడిన్ కాడ్మియం, బంగారం కొన్ని జాతుల్లో ఉన్నాయి.

ఈ ఖనిజాల లభ్యత చేప నుంచి చేపకు మారుతుంది. కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, సిల్ఫర్, బెల్లి అనే చేపల ఎముకల నుండి లభ్యమవుతాయి. ఈ ఎముకలను చేప మాంసంతో పాటు తినడం బరుగుతుంది. కొన్ని అస్థిమత్స్యాల పొలుసుల నుంచి, ఎముకల నుంచి కాల్షియం మాత్రం లభ్యమవుతుంది. ప్రోటీన్ల లభ్యత మీద ఫాస్ఫరస్ ప్రమాణం ఆధారపడి వుంటుంది. మంచినీటి, సముద్రజలాల చేపల

కణజాలాల నుంచి సోడియం కన్నా కొద్దిగా అధికంగా పొటాషియం లభిస్తోంది. సముద్ర నీటి చేపల తాజామాంసం నుంచి 0.2 శాతం, మంచినీటి చేపల తాజా మాంసం నుంచి 0.02 నుండి 0.03 శాతం ఫరకు కోరిన్ లభ్యం అవుతుంది.

కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువ ప్రమాణాలలో లభ్యం అవుతాయి. జీవంతో ఉన్న చేపల్లో గ్లైకోజెన్ ఉంటుంది. కాని చనిపోయిన తర్వాత అది త్వరితంగా లాక్టోజ్ అమ్లంగా మారిపోతుంది.

చేప కండరాలలోని వోలటైల్ ఊరాలు నత్రజని సంబంధమైన భాగాలు (అమ్మోనియా, మోనో, డై, ట్రైమిథైల్ అమైన్లు), టెట్రామిథైల్ అమ్మోనియమ్ ఊరాలు (ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్, బైట్రైన్) గ్వనిడైన్ నుంచి వచ్చిన క్రియాటిన, మిథైల్ గ్వనిడైన్ మొ|| గ్లైకొస్యూరిన్ నుంచి వచ్చిన, కార్బోసిన్, ఎస్సిరిన్, హిస్టిడైన్ యురియా అమైన్ అమ్లాలు ప్యూరిన్ నుంచి వచ్చినవి.

ఎలాస్ట్రాంక్ చేపల్లో ప్రోటీన్తో సంబంధం లేని నత్రజని 50 శాతం ఉంటుంది. చేపలు చెడిపోయిన సందర్భంలో ఏర్పడిన ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఎంత ఏర్పడిందో లెక్క కడితే తెలిసి పోతుంది. ఇలా పొడయి పోవడంలో హిస్టిడిన్ డికార్బాక్సిలేషన్ చర్యవల్ల హిస్టమిన్ గా మారిపోతుంది. హిస్టిడిన్ చక్కని మాంసం వాసన వస్తుంది. కాని హిస్టమిన్ ఆహార విషకలుషిత పదార్థంగా మారడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. సార్తెన్లు, హెగ్రింగ్, మాకెరల్, టన్నీ మొదలైనవి హిస్టిడైన్ పంటి మౌలిక అమైన్ అమ్లాలను కలిగి ఉంటాయి. క్రియటిన్, ఫాస్ఫోరిక్ ఆమ్లం, అమైన్ ఆక్సైడ్ ఆమ్లం కూడా హార్బోడాన్ నెహిరియన్ పంటి చేపల్లో గుర్తిస్తారు.

18.3.1 ఎంజైమ్లు

చేపల కండరాలలో వివిధ ప్రసిద్ధ ఎంజైమ్లు ఉండటం వల్ల అది చాలా విలువ కలిగి వుంటుంది. మంచినీటి, సముద్ర నీటి చేపలు రెండింటిలోను అమైలేజ్లు, ట్రైపేస్లు, థయామినేస్, ఆడినోసిన్ ట్రైఫోస్ఫేట్స్, కోలేస్, ఎస్టరేస్లు, స్ట్రాక్టియేస్, బూట్రెనేస్, గ్లైకోజినేజ్ పంటి ప్రోటియోలిటిక్ ఎంజైములున్నట్లు పరిశోధనలు చెపుతున్నాయి. థయామినేస్ ఉప్పు నీటి చేపల్లో లభ్యం కాదు.

18.3.2 విటమిన్లు

విటమిన్ A, D, నికోటిన్ కాంప్లెక్స్, B12, C ఉన్నత జాతులకు చెందిన చేపలలో ఉన్నాయి. B-కాంప్లెక్సులో థయామిన్, రిబోఫ్లావిన్, రిబోఫ్లావిన్ ఆమ్లం ముఖ్యంగా ఉన్నాయి. చేప కాలేయంలో B12 అధికంగా ఉంటుంది. చేప మాంసంలో కూడా B12 విటమిన్ C విటమిన్తోబాటు ఉంటుంది.

బొంబాయి తీరం నుంచి సేకరించిన ఉప్పునీటి చేపల పరిశీలనలో ఈ క్రిందిపదార్థాలు ఉన్నాయని తెలిసింది. ఇవి థయామిన్ 0.1-1.1, రిబోఫ్లావిన్ 0.5 నుంచి 12.9 నికోటినిక్ ఆమ్లం 2.7 నుంచి 4.82 mg/g, పశ్చిమ బెంగాల్లో మంచినీటి చేపల నుండి ఈ క్రింది పదార్థాలు లభ్యమవుతున్నట్లు చూసారు. విటమిన్ C, నికోటినిక్ ఆమ్లం 3.2-10.2 mg/g, కోలెస్ 2.03 - 37.74 mg/g. కోలెడ్ గా ఉంటాయి. B12 విటమిన్ భారత మత్స్యాలలో 50 నుంచి 210mg/g వరకు లభ్యమవుతుంది.

18.3.3 ఫాస్ఫోలిపిడ్లు

ఫాస్ఫోలిపిడ్లు చాల రకాల చేపలలో 0.17 నుంచి 0.7 శాతం వరకు వాటి కండరాలలో ఉంటాయి. కాడ్ చేప మాంసంలో క్లిష్టమైన మిశ్రమంలో ఫాస్ఫోలిపిడ్లు ఉంటాయి. అందులో లెసిథిన్ మిగతా ఇతర లిపిడ్ల కన్నా అధికంగా ఉండి మొత్తంలో 50-60 శాతంవైగా ఉంటుంది. భారత మత్స్యాలలో (బొంబాయి) ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్లు ఎంత ప్రమాణంలో ఉన్నాయో ఒక పరిశోధన జరిగింది. పొడి పదార్థం ప్రమాణంలోకి తీసుకుంటే మొత్తం ఫాస్ఫోలిపిడ్లు 4.3 నుంచి 5.7 శాతం వరకు ఉండవచ్చని అందులో లెసిథిన్లు అధికంగాను (2.3-3.6 శాతం) వస్తాయి.

మొత్తం కౌల్టెస్టర్ 0.3 నుంచి 0.8 శాతం వరకు ఉంటుంది. అందులో ఎడికౌల్టెస్టర్ 0.15 నుంచి 0.5 శాతం వరకు పొడి బరువులో ఉంటుంది.

ప్రత్యేకంగా గుర్తించలేని ఫోన్స్ లిఫిట్లు A,B,C అనుపేర పిలువబడేవి కూడా కొన్ని వేర్వేర చబడ్డాయి. కాని బాగా తెలిసిన లెసిటీవ్లు, నెఫలిన్ కన్న ఈ ఫోన్స్ లిఫిట్లు చాలా తక్కువ ప్రమాణంలో ఉంటాయి.

18.4 చేపల నుంచి లభ్యమవుతున్న పదార్థాలు

చేపనూనెలు, కాలేయతైలాలు, చేప మూంసము, చేప పిండి, చేప పిండి, పేపర్, చేప ప్రొటీన్, సోరచేప వాడాలు, చేపగుడ్డ సమూహాలు, చేప బంక, బసింగ్లాన్, చేప చర్మాలు, స్కెటోల లవ మింగ సహ పదార్థాలు చేపల నుండి లభ్యమవుతాయి.

18.4.1 చేప మూనెలు

18.4.1 చేప నూనెలు

నూనె పదార్థాలను చేప మొత్తం శరీరం నుంచి కాని లేదా కేవలం కాలేయం నుంచీకాని తీస్తారు. శరీరం నుండి గ్రహించే తైలాలును శారీరక తైలాలు అంటారు. వీటిలో రెండు రకాలున్నాయి. ఎండినతైలాలు, పాక్షిక ఎండినతైలాలు, ఎండే నూనెలు, సార్బిన్, సాల్మన్, హెర్రింగ్, మాకెరల్, అంకోవి, తెల్లచేపలలో ఉంటాయి. స్పర్మిట్, కార్ప్ మొదలైన వాటిలో పాక్షిక ఎండేతైలాలుంటాయి. వీటిలో అయోడిన్ తక్కువగా ఉంటుంది. శారీరక తైలం తాగడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఇది పారిశ్రామిక రంగంలో ఉపయోగపడుతుంది. కాలేయం నుంచి గ్రహించిన నూనె వైద్య ప్రాముఖ్యత కలిగిఉంటుంది. అందులోవిటమిన్ A అధికంగా ఉంటుంది. విశేషమేమంటే శరీరతైలం అధికంగా లభ్యమయ్యే సందర్భాలలో మిగతా మాంసంలో నూనె తక్కువగా ఉంటుంది. తాజాగా గ్రహించిన నూనెలు రకరకాలు రంగులను కలిగి ఉంటాయి. రంగులేనిస్థితి నుండి బంగారు వర్ణం లేదా ఆకుపచ్చ-పసుపురంగు నుంచి ఎరుపువర్ణం కూడా కనబడుతుంది. నిలువచేసిన చేపల నుంచి తీసిన నూనె ముదురు వర్ణంలో ఉంటుంది. అంతేకాక ఈ నిలువ తాజా చేపల నూనెలో నూనె గాఢత కూడా మారుతుంది. వాటిలోని అయోడిన్ ప్రమాణం కూడా మారుతుంది.

చేపనూ వె సంఘటన

చేప నూనెల సంఘటనలో ఆయా జాతులను బట్టి మారడమేకాక ఇదే విధంగా భూచర జంతువుల నుంచి లభ్యమయ్యే నూనెలనుంచి, శాకాహార క్రొవ్వు పదార్థాల నుంచి, భిన్నంగా ఉంటుంది. చేప నూనెలు మరింత క్లిష్టంగా ఉంటాయి. వైగా కొవ్వుసంబంధమైన ఆమ్లాలలో గొలుసు సంఘటనలు దీర్ఘంగా ఉంటాయి. ఇవి C-14 నుండి C-22 వరకూ కొన్ని సందర్భాలలో C-24 వరకూ ఉండడమేకాక ఇంకా అధిక దీర్ఘ సంఘటనలు అంత అరుదుకాదు. ఈ చేప నూనెలు భిన్న భిన్న పరిమాణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మోనోస్టాయినుంచి పెంటా (5) హెక్సా (6) ఎథిలనిక్ ఆమ్లాల వరకూ ఉంటాయి. సముద్ర మత్స్యాలలో C-20, C-22 ఇంకా అధికగాడత అంటే [అంటే అధిక దీర్ఘగొలుసు నిర్మాణాలు] కలిగి ఉంటాయి. సంతృప్త ఆమ్లాలు అందులో ముఖ్యంగా కేవలం 15-20 శాతం మాత్రం మొత్తం ఆమ్లాలలో ఉంటాయి. అదేవిధంగా C-10, C-18 ఆమ్లాలు పామిటిక్ ఆమ్లాలు అల్పగాడత కలిగి ఉంటాయి. సంతృప్త ఆమ్లాలు, అందులో ముఖ్యంగా పామిటిక్ ఆమ్లాలు కేవలం 15-20 శాతం మాత్రం మొత్తం ఆమ్లాలలో ఉంటాయి. చేపల శరీర కాలేయ తైలాల పాటీ ఆమ్ల సంఘటనకు అధిక నిష్పత్తిలో అసంతృప్త C-10, C-22 ఆమ్లాలు కలిగిన శరీరతైలాలకు పోలిక ఉంటుంది.

చేపతెలాంతలో ట్రైగ్లిసరైడ్ల మిశ్రమం ఉంటుంది. ఇవి చాల వరకు క్లిష్టంగా ఉంటాయి. ట్రైగ్లిసరైడ్లు అరుదుగానైనా ఉంటాయి లేదా అనలు కనబడనే కనబడవు. అన్నిటి కన్నా అతి సామాన్యంగా కనబడే ట్రైగ్లిసరైడ్ సమ్మేళనంలో మూడు భిన్న ఫాటీ ఆమ్లాలుంటాయి. అయితే

అప్పుడప్పుడు ఒకే ఫాటీఆమ్లానికి చెందిన రెండు ప్రాతిపదికలు (Radicals) ఒకే గ్లిసరైడ్ అణువు మీద కనబడుతుంది. చేపతైలాలలో సబ్బుగా మారడానికి వీలుకాని వదార్థప్రమాణం చాలా భిన్న ప్రమాణాలలో కనబడుతుంది. సారచేప కాలేయ తైలాలలో ఇది చాలా అధికంగా ఉంటుంది. సబ్బుగా మారడానికి వీలుగాని వదార్థాలలో చాలా రకాల ఆల్కహాలు ఇతర హైడ్రో కార్బన్లు ఉంటాయి. అన్ని చేప నూనెల్లోను కొలెస్టరాల్ ఉంటుంది.

కాలేయతైలం

చేప కాలేయతైలంలో విటమిన్-A ముఖ్యంగా ఉంటుంది. D విటమిన్ కొన్ని జాతుల్లో ఉంటుంది. ఈ విటమిన్లు దీని జీవక్రియా విధానం వలన ఏర్పడి క్రమంగా కాలేయంలోకి చేరి నిలువఅవుతాయి. సబ్బుగా మారడానికి అవకాశం లేని వదార్థం ఆహార మత్స్యాలకు సంబంధించి కాలేయతైలాలలో తక్కువగా అంటే, 0.1% వరకు ఉంటుంది. అయితే సారచేపలు కొన్నిటిలో మాత్రం 80 శాతం వరకూ ఉంటుంది. చేపల కాలేయాలను వాణిజ్య పరంగా మూడు రకాలుగా చేస్తారు.

రకం	ఉదాహరణ	% నునె	విటమిన్ A శక్తి
అధికతైలప్రమాణం తక్కువ విటమిన్ A శక్తి	కాడ్లు	60-75	500 నుండి 20,000 iu/g
తక్కువ తైలప్రమాణం అధిక విటమిన్ A శక్తి	ఝనా హోలిబట్	4-128	25000 నుండి 600,000 iu/g
అధికనూనె ప్రమాణం అధిక విటమిను శక్తి	సుత్తితల సోరచేప	25-75	3,00,000 iu/g

విటమిన్ A ముఖ్యంగా కాలేయంలో నిలువ ఉంటుంది. కాని హోలిబట్ లలో, విటమిను A అంతరాంగాలలోకి చేరి నిలువ అవుతుంది. ఇది కాలేయంలో చేరడానికితోడుగా జరుగుతుంది. వయస్సు, లైంగిక లక్షణం, అహారం లభ్యంకావడం, ఋతువులు మొదలయిన ఈ చేపలలో లభ్యం అయ్యే నూనెలో విటమిన్ A లో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. ఏదైనా ఒక జాతికి సంబంధించి వాటిలో అధిక ప్రమాణం కలవాటి నుండి విటమిన్ Aను అధికగాడతలో పొందవచ్చును.

భిన్న జాతుల చేపలలో మాత్రం ఈ విధంగా విటమిన్ A పరిమాణానికి, గాఢతకు తగిన పొందిక చూపలేము. ముదురు వర్ణంలోని కాలేయం సారచేపల్లో అధిక గాఢతల్లో విటమిన్ A కలిగి ఉంటుంది. పోలికలకి తేలిక వర్ణం సారచేపల్లో ఇది తక్కువ. అంతేకాక భిన్న లందికలలో కూడా విటమిన్ A ప్రమాణం చెప్పుకో తగినంతగా మారుతుంది.

విటమిన్ A కాలేయంలోని ప్రోటీనులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కొంత వరకూ తైలంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మొత్తానికి ఇది ఫాటీఆమ్లు ఎస్టర్ల రూపంలో [96-100%] ఉంటుంది. విటమిన్ Aలో విటమిన్ A1 (సముద్రమత్స్యాల కాలేయ తైలంలో) విటమిన్ A2 (మంచి నీటి జలాల చేపల కాలేయతైలాలలో) విటమిన్ A2, Aలో 40% క్రియాశీలత కలిగి ఉంటుంది. వాణిజ్య స్థాయిలో లభ్యం కావడం వలన విటమిన్ A చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది.

కాలేయతైలాల నుంచి మూడు సిస్ ఐసోమర్లను వేరు చేశారు. ఇది నియో విటమిన్ A ఐసో ఎ, ఐసో బి. అయితే ఇవి విటమిన్ A కన్న తక్కువ శక్తివంతంగా ఉంటాయి. కొన్ని మత్స్యతైలాలు విటమిన్ Dను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి. ఝనా కాలేయతైలం, హోలిబట్ కాలేయతైలం, కాడ్లివర్ ఆయిల్ ఒక్కొక్క గ్రాము నూనెకు 2,50,000 - 5000-500 ప్రమాణాలు కలిగి ఉంటాయి. కాలేయంలో తైలం తక్కువగా లభ్యం అయ్యే సందర్భాలలో విటమిన్ D అధిక ప్రమాణాలలో లభ్యమవుతుంది. విటమిన్ D, D3 రూపంలో కొంత వరకు విడిగాను కొంత వరకు ఎస్టర్ల రూపంలోనూ లభ్యం అవుతుంది.

లివర్ ఆయిల్ లోని విటమిన్ E, విటమిన్ లో సంభవించే ఆక్సికరణచర్యను నిరోధిస్తుంది. హైడ్రోకార్బనులు, కార్బోహైడ్రేట్, వర్ణక పదార్థాలు, ఫాటీ ఆల్కహాల్, గ్లిసరాల్, ఈ ధర్మ మొదలైనవి గ్లిసరైడ్లు కాక లభ్యమయే ఇతర పదార్థాలు.

తైలనిష్కర్షణ

తైలాన్ని కాలేయం నాచి సాధించడానికి మొదట చేపల నుంచి కాలేయాలను నేకరించాలి. వాటిని నిలువ చెయ్యాలి. అంతరాంగ సముదాయాన్ని కూడా నేకరించడం హోలిబట్ వంటి చేపల సందర్భంలో జరుగుతుంది. దీనిని విడిగా నిలువచేస్తారు. ఆ విధంగా నేకరించిన పదార్థాన్ని నిలువచేసే చర్యలకు గురి చెయ్యాలి. లేకపోతే క్రిముల ప్రభావానికి లోను కావడం, కుళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాక విడివిడిగా ఫాటీఆమ్లాలు విగ్నడుతుంటాయి. విటమిన్ A కాలేయంలో స్థిరంగా ఉంటుంది. నిలువ కార్యక్రమంలో సామాన్య ఉష్ణ ఉపయోగపడుతుంది. లేదా వాటిని శీతలీకరణ చర్యకు గురిచెయ్యడం కాని ఫార్మలిన్ లో నిలువచెయ్యడం కాని చెయ్యవచ్చు.

ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయాలు వైద్య ప్రమాణాలలో నూనె తీయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి తాజాగా కాని, చక్కగా నిలువ చేసినవిగా ఉంటాయి. చెడిపోయిన వర్ణహీనమైన కాలేయాలను సాంకేతిక విలువలు కలిగిన తైలాల ఉత్పత్తికి ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల నూనె తీత కార్యక్రమం చాలా వరకు కాలేయంలో ఉండే నూనె ప్రమాణం, విటమిన్ A శక్తిమీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కాడ్ వంటి అధిక ప్రమాణంలో నూనెను కలిగిన చేపల కాలేయం నుంచి నూనెను రాబట్టడానికి చాలా సరళమైన పద్ధతిలో ఆవిరికి గురిచేస్తారు. కాలేయాన్ని ఖండాలుగాచేసి పెద్ద పెద్ద పాత్రలలో 85-90° వద్ద ఉడక బెడతారు. కాలేయకణాలు చిట్టిపోయి శిథిలమై నూనె బయటకు వచ్చి ఉపరితలం మీద తేలుతుంది. నూనెను ఈ విధంగా తెట్టులాగ తీసి నేకరిస్తారు.

తేలియాడే పద్ధతి అనే మరొకటుంది. ఇది కొంత విస్తృతమైన చర్య. మొదట కాలేయాన్ని నేకరిస్తారు. అక్వానైడ్ (పారాల్లివైడ్, సోడియమ్ కార్బోనేట్ కలిపిన పదార్థం)తో నిలువస్తారు. ఇది ప్రోటీన్ ను డినేచర్ చేస్తుంది కాని నుండి ద్రవరూపంలోని పదార్థాన్ని తీసివేస్తే గుజ్జవంటిది ఏర్పడుతుంది. ఆతరువాత ఈ గుజ్జు స్క్వెడాని తరువాత ఒకటిగా కొన్ని పెద్ద పెద్ద బాంకుల లాంటి పాత్రలలో నుంచి కాని స్టూపాకార గిన్నెలలో నుంచి కాని పోనిస్తారు. కలవడానికి ఒక కాడ వంటిది ఉంటుంది. వీటికి గొట్టాల ద్వారా వెచ్చని నీటితో సంబంధం ఉంటుంది. ఎమల్షన్ రూపంలో నూనె, నీరు కలిసిన ఈ పదార్థాల నుంచి నూనె త్వరిత గతిలో విడిపోయి వైకి తేలిపోతుంది.

ఆవిరి చర్యలలో నూనెను పూర్తిగా సాధించటం జరగదు. ముఖ్యంగా నూనె తక్కువగా నున్న చేపల కాలేయం నుంచి ఇది సాధ్యం కాదు. అయితే వీటిలో విటమిన్ A శక్తి అధికంగా ఉంటుంది. కాలేయంలోని ప్రోటీనులు కాలేయతైలం బయట పడకుండా నిరోధిస్తాయి. అలాంటి సందర్భాలలో వేరే పద్ధతులు అనుసరించాలి. కాలేయప్రోటీన్లను ఆల్కహాల్ లతో జీర్ణం అయేటట్లు చూడడం ఒకటి. హోలిబట్, టునా సొరచేషల్లో ఈ పద్ధతి అనువుగా ఉంటుంది. ఈ పదార్థాన్ని నూరి సజలకాస్టిక్ సోడా 1.2% (బరువులో)తో కాని సోడియమ్ కార్బోనేట్ 2-5 తో కాని కలిపి జీర్ణక్రియకు లోను చేస్తారు. ఈ క్రియలో 82-88° ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడివేడి ఆవిరికి గురి చెయ్యాలి. ఒక గంట కాలం నిత్యం కలుపుతూ పదార్థాన్ని కేంద్రప్రసారక (Centrifugal) యంత్రం ద్వారా పంపుతారు. కాలేయాన్ని సార్లీన్ తైలంతో కలపడం వల్ల విటమిన్లు విడిపోతాయి.

ఎంజైమ్ ఆల్కలీ, జీర్ణక్రియా పద్ధతిని కూడా నూనెను రాబట్టడంలో ఉపయోగించవచ్చు. ఈ చర్యలో ఖండాలుగా విభజించిన కాలేయాన్ని అదే ప్రమాణంలోని నీటితో కలపాలి. కాలేయంలో ఉదజహరికావడం దానికి చేర్చి pH సరిచూడాలి. తరువాత పెప్సిన్ (0.5 శాతం బరువు) కలపాలి. తరువాత ఈ పదార్థం 43-49° వద్ద జీర్ణం అయేటట్లు చూడాలి. ఈ చర్య జరిగిన చివర సోడియమ్ కార్బోనేట్ కలపాలి. దానివల్ల pH విలువ 9.0 కి చేరు కుంటుంది. అదే సమయంలో

ఉష్ణోగ్రతను కూడా 80°కు పెంచాలి. ఈ విధంగా ఒక గంట కాలం ఈ పదార్థాన్ని వండాలి. తరువాత తైలాన్ని బయటకు తీసివేసి వడపోత చెయ్యాలి.

ద్రావణ పద్ధతిలో కాలేయాలనుంచి నూనెను, రాబట్టే చర్యలో లభ్యమయ్యే నూనె కన్నా జీర్ణక్రియలో లభ్యమయ్యేతైలం తక్కువ ప్రమాణంలో ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలోనే సాధించిన తైలం ముదురు రంగులో ఉంటుంది. దాని స్వగ్రత (Viscosity) అధికంగా ఉంటుంది. తరువాత విడివిడిగావున్న ఈ ఫాటీ ఆమ్లాలను బయటకు తీసివేసి శుద్ధి చేయాలి.

ఈ పద్ధతుల్లో సేకరించిన తైలాన్ని నిశ్చలంగా కదల్చకుండా ఉంచి, నీరు దుమ్ము కణాలు అధుగున స్థిరపడేటట్లు చేయాలి. స్టిరియన్ ను మళ్ళీ రూపంలోనున్న నూనె సందర్భంలో వడపోయ్యాలి. అంతేకాక దానిని కేంద్రసారక చర్యను ఫుల్లర్ ఎర్త్ తో చర్యకు గురి చెయ్యాలి. నూనెను 0-10° వరకూ చల్లారాక స్టిరియన్ వేరు చేయవచ్చు. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలోనే వడపోత కార్యక్రమం నిర్వహించాలి.

తక్కువ శక్తికల కాలేయాల తైలానికి జంతువులకు అదనపు విటమిన్ ల ఆధారాలుగా ఉపయోగిస్తారు. అధిక శక్తివంతమైన వాటిని వైద్య ప్రయోజనాలకు ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో రక్తపీడనం తగ్గించడం దృష్ట్యా కాలేయ తైలాలు చాలా క్రియాశీల అక్షణం కలిగి ఉన్నాయని తెలుస్తుంది.

కాడ్ లివర్ ఆయిల్ : కాడ్ లివర్ ఆయిల్ రకరకాల కాడ్ చేపల నుంచి లభ్యమౌతోంది. ముఖ్యంగా గాడన్ కలారియన్, గాడన్ మార్కువా మొదలైన వాటిని పేర్కొనాలి. వీటి తాజా కాలేయాన్ని ఆవిరి వంట పద్ధతికి గురిచేసిన తరువాత 0° వరకు చల్లార్చుతారు. స్టిరియిన్ విడుదల అయిపోతుంది. మంచి అక్షణంకల కాడ్ లివర్ ఆయిల్ తేలిక వర్ణం పసుపుగా కొద్దిగా చేపకంపు కొడుతూ ఉంటుంది. అయితే చెడిపోయిన వాసన ఉండదు. రుచి కూడా చెడుగా ఉండదు. కొద్దిగా ఆల్కాహోల్ తో కరుగుతుంది. ద్రావణీకరణ, క్లోరోఫారమ్, తేలిక పెట్రోలియమ్ తో కలిసిపోతుంది. 0° వద్ద ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది.

కాలేయ తైలాలు ఫాటీఆమ్లాలు కలిగి ఉంటాయి. దీన్న మత్స్యాలలో ఇవి దీన్న అక్షణం కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాలలో పూర్తిగా శుద్ధి చేయని నూనెలో కొద్దిగా అయోడిన్ (3.15 ppm) నూడ్లు ప్రమాణాలలో ఆర్సెనిక్ (1.4 to 5.1ppm) ఉంటాయి.

తక్కువ స్థాయికి చెందిన నూనె ముదురువర్ణం కలిగి ఆక్సిడ్ లేదా చేదుగా ఆప్లుఅక్షణం కలిగి ఉంటుంది. నూనెలోని విటమిన్ A మాత్రం సూర్యరశ్మికి బహిర్గతమైతే నశించిపోతుంది. గాలి పోకితే నూనె చిక్కగా అయిపోతుంది. అందువల్ల నూనెను జాగ్రత్తగా నిలువచెయ్యాలి. విటమిన్ A నశించిపోకుండా చూడాలి. వీటికి వార్ని హైడ్రోగ్వాయిరెటిక్ ఆమ్లం (nordi hydrogwaiaretic acid) (1.05%) అస్కార్బిల్ పామిటేట్ (0.10%) అనే నిలువ ఉంటే పదార్థంను కలపాలి.

రికెట్సు, క్షయ రోగులకు పోషణను అభివృద్ధి చేసి కార్నియమ్ ను బాగా గ్రహించగల్గేటట్లు ఈ నూనె చేస్తుంది. జీర్ణమయ్యే కొవ్వులతోబాటు దీనిలో విటమిన్ A, D లు చాలా పుష్కలంగా ఉండడంవల్ల ఇది సాధ్యమవుతోంది. పిల్లల అదనపు పోషణకు ఉపయోగించవచ్చు. గాయాలను, కాలిన పుండ్లకు దానిని రాయవచ్చును. ఎగ్జెమా, మైకోసిస్ వంటి చర్మ వ్యాధులకు అయోడిన్ కలిగిన నూనె ఉపయోగపడుతుంది. కొద్దిగానో గోప్పగానో కుళ్ళిపోయిన కాలేయం నుంచి, కాడ్ లివర్ నూనె తీయవచ్చు. అయితే ఈ నూనె సాంకేతికంగా తక్కువ స్థాయికి చెందినదిగా ఉంటుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో వేరు చేసిన స్టిరియిన్ లు సబ్బుల తయారీలో కాని ఫిష్ టాలోకాని, చర్మ క్యూరింగ్ లో కాని ఉపయోగిస్తారు. తక్కువస్థాయి లూట్రికెంటులు, గ్రీన్ లు, సబ్బుల తయారీకి పనికి వస్తుంది.

హోలిబర్ట్ కాలేయ తైలము తాజా లేదా నిలువ చేసిన కాలేయాల నుంచి సాల్యెంట్ నిష్కర్షణ పద్ధతిలో కాని, ఆల్కలి జీర్ణక్రియ పద్ధతిలోకాని సేకరిస్తారు. దీనికి సెటోడిస్ (Psetodis) జాతి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ నూనె తేలిక రంగు నుంచి బంగారు పసుపు వరకు ఉంటుంది. చేప

వాసన ఉంటుంది కాని కుళ్ళువాసన ఉండదు. కాడ్ లివర్ ఆయిల్ కు సరిగా ఉంటుంది. దాని సంఘటనలో కాడ్ హోలిబల్ లివర్ నూనెలకు మంచి వైద్యప్రాముఖ్యత ఉండదు. గాఢత కలిగిన విటమిన్ పదార్థాల తయారీలో కూడా ఇది ఉపయోగపడదు. టునా సారచేప కాలేయ నూనె విటమిన్ A, D లు పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి. సారచేపల నుంచి వాణిజ్య స్థాయిలో నూనెల తయారీ జరుగుతుంది. బొంబాయి, బరోడా, కేరళలో ఇది జరుగుతుంది.

సారచేప కాలేయ తైలాలు : షార్క్ లివర్ ఆయిల్

ఏ కొద్ది జాతుల్లో తప్ప మన దేశంలో సార చేపల కాలేయ తైలాల దిగుబడి దృష్టి వాలా ప్రసిద్ధమైనది. వీటిలో విటమిన్ శక్తి చాలా అధికంగా ఉంటుంది. (సరాసరి గ్రాము నూనెలో 12000 అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు). గ్రాముకు 3 ఇక్షల అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలున్న జాతులు కూడా లభించాయి. సారచేపల తైలాలు ఈ క్రింది జాతుల నుంచి లభిస్తోంది. గాలియోనెడ్ (బ్రెగ్రెనన్, కార్పార్తెనన్, మనన్ ఫైరన్, కా. మెలిసెర్రా కా. లింబాటన్ స్కోలియోడాన్ పాలనెర, స్కోవాల్ షెక్స్ తూర్పు పశ్చిమ తీరాల్లో వీటి లభ్యత సందర్భంలో తేడాలు కనబడతాయి. పైన చిన్న ఋతువులకు సంబంధించి కూడా లభించాయి.

కాలేయాల నుంచి నూనెను చాలా సరళ పద్ధతిలో సాధిస్తారు. చిన్న సార చేపల నుండి, కాలేయం సేకరించి ఆ మొత్తాన్ని బాగా వేడి చేస్తారు. ఈ విధంగా నూనె విడిపోయి వేరుగా వస్తుంది. ఈ విధంగా వచ్చిన నూనెను వడపోసి నిర్జీరకరణ చేసి సోడియమ్ సల్ఫేట్ ను కలుపుతారు. శుద్ధి చేసిన తరువాత దీనిని విటమిన్ A శక్తికి తగిన విధంగా ఉండేటట్లు పల్చని స్థితికి తీసికొని వస్తారు. డియోడరైజ్డ్ వేరుశనగ నూనెను కలుపుతారు. కృత్రిమ విటమిన్ D ను కూడా వేరుచేస్తారు.

నూనె తీతలోను, నిలువ క్రియలోను ముక్కి పోవడం (రేసిడిటి పాడనూపడం) క్రిమి సోకుడు, లోహ పాత్రల కాలుష్యం గాలికి, వెలుతురుకు అరబెట్టడం వల్ల విటమిన్ A నశిస్తుంది. తీరానికి చేరగానే కాలేయాలను తగిన రీతిలో ప్రక్రియకు గురి చెయ్యాలి. నిలువ చేసిన నూనెలోని అర్థానికే వెరాక్సైడ్ లు సయితం విటమిన్ A మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. దీనిని నివారించడం కోసం ఏంటి ఆక్సిడెంటులను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి షిసోబుటైల్ గాలెల్ (0.2%) + సిట్రేక్ లేదా బార్బారిక్ ఆమ్లం (0.01%) 0- బ్రయానెటిక్ - గాలెల్-ఫ్లోరోగ్లూసిన్ బార్బారిక్, వేరుశనగ నూనె కలపడంవల్ల పరిస్థితి దిగజారి పోకుండా ఉంటుంది. తాజాగా గ్రహించిన నూనె పసుపు, ఆరెంజి, ఊదా, రంగులు కలిగి ఉంటుంది. కొద్దిగా చేపవాసన ఉంటుంది. అప్పు ఇక్షణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. విటమిన్ D తో పాటు శుద్ధి చేసిన వేరుశనగ నూనె కలపడం వల్ల షార్క్ లివర్ ఆయిల్ తగు విధంగా పల్చ బడుతుంది.

చిన్న జాతుల సారచేపల్లో ఫాటి ఆమ్లసంఘటన మారుతూ ఉంటుంది. విదేశాల నుంచి లభించిన సారచేపల కాలేయతైలాలకు మనదేశపు చేపల కాలేయ తైలాలకు గాఢ అమ్లాల ఉనికిలో తేడా 40 % వరకు ఉంటుంది. విదేశ సారచేపలలో 20% గాఢత లేని ఫాటి ఆమ్లలుంటాయి. ఇవి హెక్సా డెసిన్ యిక్ 'ఓలియిక్' లైనోలెనిక్ టెట్రాకాన్-12, 16 డయినోయిక్ ఆమ్లాలు. ఇవి భారతదేశ సార చేపలలో కనబడ్డాయి. సారచేప నూనెలో నుంచి వేరుచేసిన గ్లిసరైడ్ లలో లైనోలిన్ డైక్లవన్ డోనిన్, అరాకెడోనా, డయిక్లవన్, డోనిన్ లైనోలెన్, అరాకెడోనోక్లవన్ డోనిన్. ట్రైచాలిన్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.

శారీరక తైలాలు

చేపతిండి, శారీరక తైలం సేకరించడానికి మొత్తం చేపను ప్రక్రియకు గురిచెయ్యాలి. వాణిజ్య ప్రాముఖ్యత కలతైలాలు సార్జిన పార్రింగ్, సొల్మన్ తైలాలు, చేపతైలం అధికంగా ఉండే సందర్భాలలో వీటిని తడి చర్యలకు, తక్కువ తైలం ఉండే సందర్భాలలో పాడి చర్యకు గురిచేస్తారు.

తడి చర్మలు ఇలా చాలా ఉంటాయి. చేపలను పిండిగా నొక్కి ముద్దగా చేస్తారు. ఈ ముద్దను ఆవిరిలో ఎడ తెరిపి లేకుండా నిలుపుస్తూపాలుగా ఉన్న పాత్రలో ఉడకబెడతారు. ఈ విధంగా వండిన పదార్థాన్ని నొక్కి నూనె తీస్తారు. ఈ నూనెతో బాటు కొన్ని ఫిక్షపాలుబులు కూడ చేరి ఉంటాయి. దీనిని స్టక్ వాటర్ అంటారు. దీనిని మెత్తగా నిలువ ఉండే విశాలపాత్రలు లేదా బాంకులకు చేరుస్తారు. ఆ తరువాత వీటిని సెంట్రీఫ్యూగల్ ప్రక్రియకు గురిచేసి నూనెను తీస్తారు. నూనె తీసివేయగా ముగిసిన పదార్థాన్ని ఎండబెట్టిపొడి చేసి చేపతిండి పేర బజారులోకి విడుదల చేస్తారు (ఫిష్మీల్). పొడి ప్రక్రియలో తక్కువ నూనె ఉండే చేపలను తీసికొంటారు. దీనిలో తైలం దిగుబడి తక్కువగా ఉంటుంది. వ్యర్థఫిలేట్ను సారచేపకళేబరాలను ఒక గ్రౌండరులో పెట్టి పిండిగా చేస్తారు. తరువాత ఆ పదార్థాన్ని స్టూఫాకార పాత్రల్లో ఆవిరి సహాయంతో ఉడకపెడతారు. నిత్యం దానిని కలుపుతూ ఉండాలి. తరువాత నూనెను పిండి బయటకు తీసివేస్తారు.

ముడి తైలాలు వాసన, రుచి అంతగా హితవుగా ఉండవు. హైడ్రోజేనేషన్ చర్మలో దీనిని తగ్గించు కోవడం చేస్తారు. విడివిడి ఆమ్లాలు కాస్టిక్ సోడావల్ల స్యూట్రలైస్ అవుతాయి. తరువాత అత్యధిక వేడిలోని ఆవిరి తైలంను డియోడరైజ్ చేస్తారు. దీనికి పీడనం తగ్గించడం అవసరం అవుతుంది. ఆ తరువాత 105° C వరకు వేడి చేసి వీటిని పూర్తిగా తొలగిస్తారు.

ఋతువులను బట్టి నూనెరాబడి మారుతూ ఉండడం భిన్న జాతుల చేపల్లో గమనించారు. బహుశాయది వాటికి లభ్యమయే ఆహారాన్ని బట్టి ఉంటుందనవచ్చు. ప్లవక జీవులలో కోపి పాదాలు, డైనోస్ట్రాకెల్లాట్లు ఉండడం ఉండక పోవడం మీద ఈ క్రొవ్వు పదార్థాల ఉనికి ఆధారపడుతుంది.

డియోడరైజేషన్, హైడ్రోజేనేషన్ తరువాత ఫాటీ ఆమ్లాలు గ్లిసెరైడ్లు ఉన్న తైలాలను మానవ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగిస్తారు. అయోడిన్ తక్కువగా ఉండే నూనెలను లాండ్రి సబ్బులు, చవకరకం బాయిలెట్ సబ్బులు మొదలైన వాటి తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. సల్ఫోనేషన్, పాలిమరైజేషన్, సపోసిఫికేషన్ చర్మల సహాయంతో ఉన్నత ప్రామాణం గల సబ్బులు తయారవుతాయి.

చర్మ పరిశ్రమలో చర్మం మృదువుగా వంగ గల్గేటట్లు చెయ్యడానికి నీరు లోనికి ప్రవేశించ కుండా చేప నూనెలు సహాయ పడతాయి. అధిక అయోడిన్ పరిమాణాలున్న నూనెలు, డిస్టియరినేటిడ్ చేపనూనెలు, డ్రయర్లలో కలుపుతారు. వీటిని లిన్ సీడ్, బంగ్ ఆయిల్లతో కలపడానికి (బ్లెండ్స్) ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఉష్ణ నిరోధక ఫిల్ములు సులభంగా వంగగలిగే ఫిల్ములు తయారవుతుంది.

చేప నూనెలకు యింకా యితర ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కొవ్వొత్తులు, స్నేహకాలు 'కట్టింగ్' నూనెలు, అలంకరణ ద్రవ్యాలు, మందులు, లిసోలియమ్, ప్రత్యామ్నాయ రబ్బర్ వాటర్ ప్రూఫ్ తయారీలు, అచ్చుసెరాలు, కోర్ ఆయిల్ మొదలైన వాటి తయారీల్లో ఉపయోగిస్తారు. విటమిన్లు ఉండే నూనెలు, జంతువులు, కోళ్ళ ఆహారంగా ఉపయోగపడతాయి. సిట్రస్ (నారింజ నిమ్మ) మొక్కలకు ఫంగస్ సోకకుండా చేపనూనె ఉపయోగపడుతుంది. తక్కువస్థాయి యినువ ఖనిజాల గాఢత పెంపొందించడానికి ఫాటీ ఆమ్లాలు తోడ్పడతాయి.

సార్డిన్ నూనె

సార్డిన్ నూనెను సార్డినెల్లా లాంజినెస్ నుంచి తీస్తారు. ఇది పశ్చిమ తీరంలో కుటీర పరిశ్రమగా జరుగుతోంది.

ఆగస్టు మార్చి మధ్యలో చాలా ముమ్మరంగా ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. చేపలను సేకరించాక నీటి తొట్టిలో కొద్దిగా నీళ్ళుంచి 30-45 నిమషాలు సేపు మరగబెడతారు. నూనె బయటకు వచ్చి కణజాలాల నుంచి వైన తేలుతుంది. తరువాత నూనెను వేరుచేస్తారు. మిగిలిన పదార్థాన్ని కొబ్బరిపీను సంపర్కంలో పెట్టి నొక్కుతారు. తరువాత నూనె నీటితో సహా బయటకు వస్తుంది. దీనిని వడబోస్తారు. 10-15% వరకూ నూనె లభిస్తుంది. మిగిలిన పదార్థాన్ని గ్యాస్స్ అంటారు. దీనిని ఎండ బెట్టి

ఎరువుగా ఉపయోగిస్తాడు. తాజాగా తీసిన నూనెలో విటమిన్ A (కాడ్డీవర్ ఆయిల్ లో (25%) ఉంటుంది. ఇది మనకు త్రాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాని నిలువలో విటమిన్ A తగ్గిపోతుంది. సాంకేతిక విలువలు కలిగిన నూనెను, జనవనార బాచింగ్ (Batching) లోను, తోలు చర్మం డ్రస్ చేయటంలో లూబ్రికేంట్ గాను, క్రిమి సంహారక సబ్బులుగాను, లోహాల టెంపరింగ్ లోను నాలు వడవల అడుగు భాగాల పెయింటింగ్ లోను ఉపయోగిస్తారు.

నూనె తీసివేసిన తరువాత ఆ మిగిలిన వృధా పదార్థం నుండి వివిధ పదార్థాల ఉత్పత్తి సాధించవచ్చు. కాని మనదేశంలో దీనిని పూర్తి వినియోగానికి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు గురిచేయటంలేదు. సారవేప కళేబరాలను కొన్ని ప్రక్రియలకు గురిచేసి ఈ దిగువ ప్రయోజనకర వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. అవి పేస్టులకు, పుడ్డింగులకు అవసరమైన తినగలే ఆధారం, వాజాలు, తోకలు, రసాల తయారీలోను, విటమిన్లు కెరాటాక్స్, స్టీరాలులు ఉపయోగపడతాయి. అదే విధంగా, పాల్మాన్, కేసరీ వృధా పదార్థాలను, అలంకరణ ద్రవ్యాలు, సబ్బులు, రసాయనిక పరిశ్రమలలోను, చాక్ లేట్లు, మందులు, జంతు పోషణ పదార్థాలు చేప పిల్లల ఆహారం వంటి పదార్థాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

18.4.2 చేప తిండి

చేప నూనె తయారీలో చేపలను కొన్ని ప్రక్రియలకు గురిచేసిన తరువాత మిగిలిన వృధా పదార్థాలను చేప తిండి (ఫిష్ మీల్) అంటారు. నూనెలేని చేపలను కాడ్ పరిశ్రమలో ఈ ప్రక్రియకు గురిచేసిన తరువాత లభ్యమయ్యే వృధా పదార్థాలను తెల్ల ఫిష్ మీల్ అంటారు. ముడి పదార్థాన్ని బట్టి దానిని తడి ప్రక్రియకు గాని, పొడి ప్రక్రియకుగాని గురిచేస్తారు. పొడి ప్రక్రియలో ఈ 'తిండి'ని అధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఆర పెడతారు. ఇది ఎండ లేదా మంటల ప్రక్రియ, ఆవిరి ప్రక్రియలుగా ఉంటాయి. ఆవిరి ప్రక్రియలో తరచు కొంత శూన్య ప్రదేశము సృష్టించి ఆవిరితో కూడిన తొడుగులు చుట్టిన పాత్రల్లో జరుపుతాయి. ఈ శూన్య ప్రదేశ వద్దతిలో ఎండబెట్టినపుడు వచ్చిన దిగుబడి చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. మరి ఆస్థాయిలోని చేప తిండిని జంతువుల అదనపు పోషక పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు. మిగతాది ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు.

చేప తిండి రసాయనిక సంఘటన చాల వరకూ మారుతుంది. నీటి తేమ 6-12, ప్రోటీనులు 55-70, క్రొవ్వు 2-15, జంతు పదార్థం 10-20 లేదా ఎక్కువ శాతంలో ఉంటుంది. చేప తిండి ప్రోటీనులు కల మంచి ఆహారంగా భావించబడుతోంది. సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. కోయిఫిషియంట్ (గుణకాలు) జీవశాస్త్ర విలువలు అధికంగా ఉంటాయి. అంతేకాక దీనిలో కార్బియం 5-36%, ఫాస్ఫరస్ 3-42 శాతం అయోడిన్ మొ. కొన్ని చేప తిండి పదార్థాలలో విటమిన్ A, D, K లు ఉంటాయి. విటమిన్ B-12 జంతువుల పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది. ఇది అధిక గాఢతలో ఉంటుంది. ఇక దీనిని పొలాల్లో పశువుల పోషణకు ఉపయోగించిన ఆహారాల్లో చేరుస్తారు. చేప తిండిని అదనపు ఆహారంగా ఉపయోగించడంవల్ల ఆవుల నుంచి పాలలోగాని, పంది మాంసములోగాని ప్రమాదకర ప్రభావాలు కనబడలేదు. చేప తిండి సుమారు యీ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉంటుంది. B విటమిన్లు థయామిన్ 0.13, రైబో ఫ్లావిన్ 0.67, నికోటినిక్ ఆమ్లం 6.4, పాంటోథినిక్ ఆమ్లం 0.91, ఫైరిడాక్సిన్ 1.40, కోలీన్ 369.5 మి.గ్రా/100 గ్రా. కోబాలమిన్ 0.12 మి.గ్రా/గ్రా., అయినోసెటాల్ (230 మి. గ్రా/గ్రా) పశ్చిమ తీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే చేప తిండి తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. దీనిని కాఫీ, టీ పొగాకు పంటల్లో ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు చెడిపోయిన హార్స్ మాకెరెల్ లు, సార్డిన్ లు దీనికి ఉదాహరణ. చేపల ఎరువులో 5-7 నత్రజని, P₂O₅ 4-6 CaO 4-6 శాతం ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాలలో చేపల వృధా పదార్థాలను గోతులు తీసి 35-60 రోజులు కప్పిపెట్టి ఉంచుతారు. తరువాత ఎండబెట్టి ఎండలో పులియ బెడతారు. అలాంటి పదార్థాలను ఫిట్ మాస్యూర్ అంటారు. దానిలో N 3-5, P₂O₅ 2-6, CaO 1-52 శాతం ఉంటాయి. చేప గ్యాస్ లో 8-10 శాతం నత్రజని ఉంటుంది.

చేప తిండి సాధారణంగా బస్తాలలోగాని, కొబ్బరిపీచు సంచుల్లోగాని, నిలువచేస్తారు. ఇవి కీటకాలు మొదలైనవి చేరకుండా ఉపయోగపడతాయి. డబ్బాలలో అయితే వాటిని గాలి చొరకుండా సీలు చేసి నిలువ చెయ్యడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఏడు సుమారు 1.5 లక్షల మణుగుల చేప ఎర్రపు తయారవుతుంది. ఇది చాలా వరకు కార్వార్ నుంచి కన్యాకుమారి అగ్రం వరకు ఉత్పత్తి అవుతుంది.

18.4.3 చేప పిండి

చేపపిండి మానవ ఆహారంలో ప్రోటీన్ అదనంగా చేర్చడానికి చాలా ఆదర్శవంతంగా ఉంటుంది. 3-4 నెలల పసివారు కూడా దీనిని తీసి కొనవచ్చు. చేప పిండి చాలా ఉన్నతమైన లక్షణం గల చేప ఆహారం. మానవులు తీసికోడానికి చాలా అనువైనది. దీనిని ద్రావణీయ పద్ధతిలో వాణిజ్య రీత్యా సేకరించడం వీలవుతుంది. దీనిని గోధుమ, మొక్కజొన్న పిండితో కలపవచ్చును. రొట్టెలు, బిస్కెట్లు, కేక్లు, స్వీటులు, రసాలు, గంజి మొదలైన వాటి తయారీలో ఇది ఒక మంచి సాధకంగా ఉంటుంది. 10 శాతం వరకు చేప పిండి కలిపినా రొట్టె రుచిలోగాని చూడానికి కాని తేడా కనబడదు. సమాన మనవచ్చు.

18.4.4 చేపసిలేజి

తాజా చేపలని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో కలుపుతారు, లేదా ఫార్మిక్ ఆమ్లం లేదా మొలాసెస్ను సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల మిశ్రమంలో గాని, తాజా చేపలని కలుపుతారు. ఈ విధంగా ముద్ద రూపంలో పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఇది సిలేజి. ఇది చేప తిండికన్నా శ్రేష్టమైనది. అందులోని విటమిన్లకు మార్పుండదు చేపల వాసన కూడా ఉండదు.

18.4.5 ఫిష్ సాల్ఫ్యూరల్స్

చేప నూనె తయారీ కర్మాగారాల కానరీలలో చేప నూనె తయారీ తరువాత మిగిలిన పదార్థాన్ని ఫిష్ సాల్ఫ్యూరల్స్ అంటారు. దీనిని జంతువులకిచ్చే పాడి ఆహార పదార్థాలకు కలుపుతారు. ఫిష్ సాల్ఫ్యూరల్స్ తో కలిగే ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ప్రోటీన్ల క్షయకరణలో ఏర్పడే పదార్థాలు విటమినులు కలిగి ఉంటాయి. వీటిలో B కాంప్లెక్సు ముఖ్యమైనది. దానిలో నీరు శాతం 50, ముడి ప్రోటీనులు 33.9, క్రొవ్య 2.6, బూడిద 9.4 ఉంటాయి. విటమినులు థయామిన్ 4.0, రిబోఫ్లావిన్ 20.0 నికోటిన్ ఆమ్లం 325, కార్నియమ్ పాంటోథీనేట్ 40.0, బయోటిన్ 0.14, మెరిడాక్సిన్ 0.0125, కోలీన్ 4000, విటమిన్ B12 0.3 mg/g ఆర్టికైన్, హిస్టిడైన్, లైసైన్, టైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ఫేవెల్ అలనీన్, మిథియోసిన్, త్రియోసిన్, యాసిన్, ఎపోలూసిన్, వేలైన్ మొదలైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇవి చేప మాంసము, చేప తిండి, చేప గుడ్లలో మార్పుతూ ఉంటాయి. వీటిని సులభంగా సాధించుకోవచ్చు. నిలువ చెయ్యవచ్చు. దానిని బ్రెస్ కేక్లలోకి ప్రవేశపెట్టి మంచి చేప ఆహారంగా తయారు చెయ్యవచ్చు లేదా నిర్దిష్టకరణ చేసి పాడిగా చెయ్యవచ్చు.

18.4.6 చేప ప్రోటీన్లు

చేప ప్రోటీనులు సులభంగా జీర్ణం అవుతాయి. జీవశాస్త్ర రీత్యాను పెరుగుదల పెంచే రీతిలో ఉంటాయి. మానవ పోషణలో ఈ విధంగా ముఖ్యపాత్ర వహిస్తాయి. మిగతా జంతువులలో కన్నా వీనిలోని ప్రోటీన్లు, అమైనో ఆమ్లాలు చక్కని సమతూకంలో ఉంటాయి. లైసిన్, మెథియోనైన్ వంటి అమైనో ఆమ్లాలు చక్కని చేప ప్రోటీనులలో అధికంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా చెప్పాలంటే గుడ్డులోని ఆల్బుమెన్, పంది ప్రోటీన్, కేసీన్ కన్నా విలువైనది. బహుశా కోడి ప్రోటీన్లతో సమాన మనవచ్చు.

చేప కండరాల నుండి 15-25 శాతం ప్రోటీన్లను సేకరించవచ్చు. ఇది దీనిలో నుంచి అధికంగా లభ్యమయ్యే పదార్థం సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణ ఉపయోగంతో 15 శాతం వరకు అందులోని ప్రోటీన్ సాధించవచ్చు. కణాలలో అంటే అంతాకణ ప్రాంతం ఉన్న ప్రోటీన్లలో 65-75 శాతం మియోసిన్,

స్వపరిశీలన

1. చేప సిలేజి అనగానేమి?
2. చేప బంక గురించి తెలుపుము.

18.5 సారాంశం

చేపల నుండి అనేక రకములైన సహజద్రావ్యములు వచ్చును. ఇవి చాలా ఉపయోగకరమైనవి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి చేపమాంసకృత్తులు, కాలేయపు నూనెలు, శరీరనూనెలు, చేపతిండి, చేపపిండి, చేప చర్మము, చేప మొవ్వులు, చేపగుడ్డు, ఐసోగ్లాస్. వీటి ఉపయోగములు, తయారు చేయువిధానము కూడా ఇక్కడ చెప్పబడినది. చేపలో మాంసకృత్తులు, విటమినులు యొక్క శాతములోపుండును.

18.6 స్వపరిశీలన - జవాబులు

1. తాజా చేపలని సల్వారిక్ ఆమ్లంతో కలుపుతారు లేదా ఫార్మిక్ ఆమ్లం లేదా మెలానెస్ను సల్వారిక్ ఆమ్ల మిశ్రమంలోగాని తాజా చేపలని కలుపుతారు. ఈ విధంగా ముద్ద రూపంలో పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఇది సిలేజి. ఇది చేప తిండి కన్నా శ్రేష్టమైనది. అందులోని విటమిన్లకు మార్పుండదు చేపల వాసన కూడా ఉండదు.
2. చేప బంక చర్మాలు, కత్తిరింపుతునకలు, ఎముకల నుంచి తయారు చేస్తారు. ఈ పదార్థం బాగా కడిగిన తరువాత కొద్దిగా అసెటిక్ ఆమ్లంతోకాని, లేదా యితర ఆమ్లం ఏదయినా గాఢత కలిగిన దానితో కలిపి 6-10 గంటలు ఉడక బెట్టాలి. తరువాత అడుగున చేరిన ద్రవాన్ని వేరు చేస్తారు.

18.7 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. చేపల రసాయనిక సంఘటనను సామాన్య రీతిలో వర్ణించునది.
2. చేపల కాలేయం నుంచి నూనె ఏ విధంగా తీయబడుతుందో క్లుప్తముగా వర్ణించుము.
3. కొడ్ లివర్ ఆయిల్ ఉపయోగాలు, సంఘటనలు తెలుపునది.
4. ఫార్మ్ లివర్ ఆయిల్ యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలు, సంఘటనను వర్ణించునది.

II. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. చేప కండరాలలోని నైట్రోజిన్ పదార్థాలేవో తెలుపునది.
2. చేప తిండి అంటే ఏమిటి? చేప ఆహారం యొక్క భిన్న ఉపయోగాలు తెలుపునది.
3. చేప ప్రొటీన్ల ఉపయోగాలేవి?
4. సార్టిన్ నూనె ఏ విధంగా తీస్తారు? వానిముఖ్య ఉపయోగాలేవి?

భాగం-19 నావలు, గియర్

విషయక్రమం

- 19.1 ఉద్దేశ్యం
- 19.2 ఉపోద్ఘాతం
- 19.3 మత్స్యనావలు
 - 19.3.1 దేశీయనావలు
 - 19.3.2 కొరకల్
 - 19.3.3 సంగదామె
 - 19.3.4 ఘాథోని
 - 19.3.5 కటమరాన్
 - 19.3.6 టటికారిన్ నావ
 - 19.3.7 డగ్ అవుట్ కానోయి
 - 19.3.8 జౌట్ రిగ్గర్ కానోయి
 - 19.3.9 మసూలానావ
 - 19.3.10 నిర్మించబడ్డనావలు
 - 19.3.11 నావ
 - 19.3.12 డింగి, నౌక
- 19.4 మత్స్య నావలకు యంత్ర సౌకర్యఅమరిక
- 19.5 జౌట్ బోర్డు మోటారులు
- 19.6 ఇన్ బోర్డు మోటారులు
- 19.7 మత్స్యనావల నిర్మాణంలో ఉపయోగించే సామగ్రి
- 19.8 హాల్ లోని అడుగు భాగం రక్షించడానికి లోహతోడుగు
- 19.9 లోహఫెట్టింగ్
- 19.10 నావరక్షణ.
- 19.11 మత్స్యగేర్
 - 19.11.1 డిజేంబ్లింగ్ పద్ధతి
 - 19.11.2 బ్రాష్ బారిమర్లు
 - 19.11.3 వడబోతపద్ధతి
 - 19.11.4 ఎంటాంగ్లింగ్ పద్ధతి
 - 19.11.5 సెల్ ఫిషింగ్ పద్ధతి
- 19.12 మంచినీటి వనరులలో ఉపయోగనికి సామాన్య ఫిషింగ్ గియర్
 - 19.12.1 బోనులు
 - 19.12.2 పింగ్లింగ్
 - 19.12.3 కాస్ట్ నెట్

19.12.4 స్టేకేనెట్

19.12.5 హండ్ సీన్లు

19.12.6 మొవ్వవలలు

19.12.7 బ్రామేల్ వల

19.13 స్పాన్ సేకరణకుగియర్

19.14 మేష్ నెజా, దారం, అల్లిక

19.15 గంచా

19.16 ఫిషింగ్ గియర్ లో ఉపయోగించే సామగ్రి

19.17 ఫిషింగ్ గియర్ పరి రక్షణ

19.18 సారాంశం

19.19 స్వపరిశీలన - జవాబులు

19.20 మాదిరి పరిక్షావశ్యలు

19.1 ఉద్దేశ్యం

సముద్రము, మంచినీటి వనర్లలోను చేప పరిశ్రమలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల నావలు, గియర్ గురించి ఈ భాగం చర్చిస్తుంది. చేపలను పట్టే నావలను యాంత్రికం చెయ్యడం గూర్చి చర్చించడ ముంది. స్పాన్ (అతి చిన్న చేప పిల్లలు) సేకరణలో ఉపయోగించే గియర్ వివరించడముంది. మత్స్య నావలను రక్షించే విధానము పద్ధతులు తెలియజేయడముంది. ఇంకా ఈ భాగంలో చేప గియర్ నిర్మాణంలో ఉపయోగించే సామగ్రిగురించి, వాటిని కాపాడుకొనే పద్ధతుల గురించి విశదీకరణంగా ఉన్నాయి.

19.2 ఉపోద్ఘాతం

వివిధ రకాల మత్స్య నావలు.

చేప నావలకు యంత్రాలను అమర్చడం.

నావలను శ్రద్ధగా కాపాడు కోవడం.

సముద్ర, మంచినీటి వనరులలో ఉపయోగించే మత్స్య గియర్ లలోని రకాలు.

స్పాన్ సేకరణలో ఉపయోగపడే గియర్.

మత్స్య గియర్ ఉపయోగపడే సామగ్రి.

చేపల నావల అదనపు సామగ్రి.

చేప గియర్ ల పరిరక్షణ.

ఇటీవల కాలాల్లో చేపల దిగుబడి (1965లో) 52.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 70 మిలియన్ల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు పెరిగింది. దీనికి కారణం మూడు సాంకేతిక విప్లవాలు (1) మత్స్య నావల యాంత్రీకీకరణ (2) మత్స్యగియర్ ను రూపొందించడానికి సింథటిక్ దారాలు ఉపయోగించడం (3) ఎలక్ట్రానిక్ ఘంకరాలతో చేపల ఉనికిని గుర్తించడం.

సింథటిక్ తాళ్ళతో తయారు చేసిన ఆధునిక మత్స్యగియర్ చేపల దిగుబడిలో ఆధికం చెయ్యడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి. అయినా ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఇంకా కొత్త పరికరాలు పరిణామం చెందాయి.

19.3 మత్స్యనావలు

మత్స్య నావ, పరికరాలతో సహా అభివృద్ధి చెందిన ఒక నిర్మాణము. ఇది ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశముతో నిర్మించబడి ఉంటుంది. ఈ నావ చేపలను పట్టే విధానాలతో మౌలికంగా రూపొందించబడి ఉంటుంది. చేపలను పట్టే ప్రతి వారికీ, తాను పడే ప్రతి ప్రమాణ శ్రమకీ ఎంత అధికంగా వీలయితే అన్ని చేపలను పట్టే ఉద్దేశం ఉంటుంది. మత్స్య నావల్లో విస్తృతమైన మార్పులు అంత తరచుగా రాకపోయినా వీటికి యాంత్రిక సౌకర్యం కల్పించడం ఒక పెద్ద మార్పు అని చెప్పవచ్చును.

19.3.1 దేశీయ నావలు

ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి అనువుగా ఒక వర్గంలో రూపొందించబడిన నావలు ఉంటాయి. అవి ఆ ప్రత్యేక ప్రాంతాలకే పరిమితమై ఉంటాయి. కోరకల్, సంగదామ్, షూథోని, కటమరాన్, టుటికారిన్ నావలు, డగ్ జాట్ కానోన్, ప్లాంక్ బిల్ట్ కానోన్, అవుట్ రిగ్గర్ కానోన్. మసులాబోట్, బిల్ట్ అప్ బోట్, నావ, డింగి నౌక అనే పడవలు కొన్ని ఇలాటిరకాలు.

19.3.2 కోరకల్

దీనిని వెదురు బద్దల చట్రం ఉంటుంది. సాధారణంగా పెద్ద వెడల్పుయిన నోరు ఉంటుంది (సుమారు 4 మీటర్లు). నిలువునా బల్ల వరువుగా ఉంటుంది. తోలు వంటి దానిని చుట్టి నీరు చొరకుండా జాగ్రత్త చేస్తారు. మొత్తానికి ఒక వెడల్పుయిన బుట్ట రూపంలో ఉంటుంది. నదులు, జలాశయాల్లో చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు.

19.3.3 సంగదామ్

ఇదొక చిత్రమైనది. తాటి వట్టెరో లోతుగా తవ్వుతారు. తరచు కలుపుతారు. ఒక ప్రక్క తాటి చెట్టు మొదళ్ళలో త్రవ్వి రెండింటిని చేర్చి వెదురు రాబలతో కలుపుతారు. వీటిలో ప్రతి చివర బల్బ్ రూపంలో ఉంటుంది. వెడల్పుగా మరొక ప్రక్క సన్నగా ఉంటుంది.

19.3.4 షూథోని

దీనిని కర్ర చెక్కల నుంచి కాపీ చేస్తారు. ముందుగా దిగువద్రోణి ఉంటుంది. ముందు వెడల్పుగా బల్లవరువుగా ఉంటుంది. తరవాత సన్నగా అయిపోతుంది. గాలి లేనప్పుడు తెడ్డును ఉపయోగించవససి వస్తుంది. గాలిపీస్తున్నప్పుడు ఒక నలు చదరపు తెవ చాపవెదురురాబకు కడతారు. ఇది స్తంభం మాదిరిగా వని చేస్తుంది. సన్నని టేకు చెక్కలను, పడవ రిబ్బలకు మేకులతో ఆమరుస్తారు. ఇవి ఏ చెక్కతోనయినా చెయ్యవచ్చు. ఈ పడవలకు మోటారుల అమరిక చాలా వీలుగా ఉంటుంది.

19.3.5 కటమరాన్

ఇదొక ద్రోణిలేని పడవ. కొన్ని దుంగలకు కలిపి కడతారు. ఈ దుంగలు వంగికానోయ్ రూపంలో ఉంటాయి. ఒక చివర నీటి పైకి లేచినట్లుగా శంకువు అకారంలో ఉంటుంది. ఇది స్టైమ్ మాదిరిగా రూపొంది ఇక్కడి నుంచి చిక్కాని ఉపయోగిస్తారు. ఈ కటమరాన్ తూర్పు తీరంలో ఒరిస్సా నుంచి కన్యాకుమారి అగ్రం వరకు ఉపయోగిస్తారు. కొద్దిగా కేరళ తీరానికి కూడా వ్యాపిస్తుంది. ఇందులో నాలుగు రకాలుంటాయి. (1) ఒరిస్సా గంజం పద్ధతి (2) ఆంధ్ర పద్ధతి (3) కోరమాండల్ పద్ధతి (4) బోట్ కటమరాన్.

[i] రిస్సా గంజామ్ పద్ధతి

ఇందులో అయిదు దుంగలుంటాయి. వీటిని త్రాళ్ళతో కట్టరు. కర్ర చెక్కలతో కొయ్యలు కొట్టి అతుకుతారు. బోట్ అకారంలో ఉంటుంది.

[ii] అంధ్రపద్ధతి

పైదాని కన్నా ఇది పెద్దది. బరువు కర్రలతో నిర్మితమవుతుంది. పక్కంలో ఉన్న కర్ర చెక్కలని అతకడానికి తీసుకు బలమైన దుంగలు ఉపయోగిస్తారు.


[iii] కోరమాండల్ పద్ధతి

ఇందులో 3-5 దుంగలుంటాయి. చాలా రకాలు ఈ నిర్మాణంలో కనబడతాయి. మద్రాసు చుట్టుపక్కల దీనిని సామాన్యంగా ఉపయోగిస్తారు.

[iv] బోట్ కటమరాన్

దీనిలో రెడుంగలుంటాయి. మామూలు నావ అకారంలో అమరుస్తారు. మండపం, ముక్కూరు ప్రాంతాలలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ట్యూటికారిన్, కన్యాకుమారి, కోలాచెల్ ప్రాంతాలలో చాల రకాలు దీనికి సంబంధించి ఉన్నాయి.


19.3.6. టుటికారిన్ నావ



పటం 19.1 టుటికారిన్ నావ


ఫిషింగ్ లగ్గర్లు అని కూడా అంటారు. వీటిని కార్వెల్ నావలు అంటారు 11 మీ x 2 మీ x 1మీ సముద్ర ప్రయాణానికి తీరం దగ్గరగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. వీటిని సాధారణంగా తల్లి నావలుగా ఉపయోగిస్తారు లేదా సరుకుల నావగా ఉపయోగిస్తారు. సరాసరి చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగించరు.

19.3.7. డగ్ అఫుట్ కానోయ్



పటం 19.2 డగ్ అఫుట్ కానోయ్ (మంబార్)

19.3.8. జాట్ రిగ్గర్ కానోయ్



పటం 19.3 కార్వార్లోని జాట్ రిగ్గర్ కానోయ్

సన్నని ద్రోణితో నిర్మితమైన కానోయ్లు. కర్మాగారాలలో తయారయిన కానోయ్లలోని కర్ర చెక్కలు మరింత విడివిడిగా ఉంటాయి. మార్కెట్ చేపలు పట్టడానికి వీటిని కెనరా, కొంకణ్ తీరాలలో ఉపయోగిస్తారు.

ప్రమాణాలలో ఇవి మిశ్రమంగా ఏర్పడి పోషణ చక్కగా జరుగుతుంది. అవగాహన కూడా బాగా ఉంటుంది. చేపల మాంసం లోని అమైనో ఆమ్లాలు సంఘటన ఈ దిగువ ఇవ్వడం అయింది. దీనివలన కృత్రిమంగా పోషణ చేసేటప్పుడు తగిన మార్గదర్శకం ఏర్పడుతుంది. (తట్టిక 15.1)

15.4. జంతు ప్రోటీనులు

ఫిష్మీల్ (చేపతిండి) : చేప తిండి ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రోటీన్ పదార్థం, అందులో చేప ఆహారంగా కావలసిన అన్ని అమైనోఆమ్లాలు ఉంటాయి సోయాబీన్ తో పోషించబడ్డ చేపలకన్న చేపతిండి తీసికొన్న చేపలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

అమైనో ఆమ్లం	చేపకండరం	చేప మయోసిన్	గుడ్డు	పంది మాంసం	ఆవు పాలు	కోడి మాంసం
ఆర్జినైన్	7.4	4.8	6.6	7.2	4.2	7.1
హిస్టిడైన్	2.6	2.7	2.4	2.9	2.6	2.3
లైసిన్	9.0	15.0	7.0	8.1	8.7	8.4
టైరోసిన్	3.8	2.7	4.5	3.4	6.0	4.3
ట్రెప్టోఫాన్	1.2	0.9	1.5	1.3	1.5	1.2
ఫినైల్ అలనైన్	4.4	4.4	6.3	4.9	5.5	4.6
ప్రిన్లైన్	1.2	—	2.4	1.3	1.0	1.3
మిథియోనైన్	3.4	2.3	4.0	3.3	3.2	3.2
త్రియోనైన్	4.7	5.8	4.3	4.6	4.7	4.7
లూసిన్	9.5	10.2	9.2	7.7	11.0	—
ఐసోలూసిన్	6.5	7.7	7.7	6.3	7.5	—
వేలైన్	6.0	6.0	7.2	5.8	7.0	—

తట్టిక 15.1 చేప, ఇతర జంతు ప్రోటీన్ లో సంఘటన - “వెల్ ఆఫ్ ఇండియా” మంచి గ్రహించినది.

పట్టు పురుగు కోశస్తదశలు : జపాన్ లో కార్పులను ముమ్మరంగా పెంచుతారు. వీటిని బోనులు, తేలే నిర్మాణాలలో ఉంచుతారు. పట్టు పురుగుతో పోషించడంవల్ల వాటిలో

ఆహార మార్పిడి రెండుగా తేలింది. ఆంతేగాక చేపలకు బియ్యం, తాడు, ముప్పర్లు అయిల్ కేక్ 1:1 నిష్పత్తిలో ఇచ్చి పోషించిన వాటికన్న, కోశస్తదశలలోని పట్టు పురుగుల నిచ్చి పోషించిన వాటి ఫలితాలు చాలా బాగున్నాయని తెలిసింది. జంతు ప్రోటీన్లు, మిశ్రమాలు ఇచ్చి పోషించినవి, వృక్ష ప్రోటీన్లు కొన్నికలసి కాని లేదా ఇతర ప్రోటీన్లు ఒక్కటొక్కటి కాని ఇచ్చి పోషించిన వాటికన్నా మంచి విలువలు చూపించి, తిన్న ఆహారాన్ని బాగా గ్రహించుకొనే శక్తి, బరువు అధికమయే శక్తి కనబడ్డాయి. వృక్ష ప్రోటీన్లను 10-15 శాతం జంతు ప్రోటీన్లతో కలిపి మౌలిక పదార్థాలుగా ఉపయోగించి, వాటిని తగురీతిలో కలిపి, కృత్రిమ పోషక పదార్థాలుగా తయారు చేసికొని చేపల పెంపకం ముమ్మరంగా జరిపించికోవచ్చని తేలింది.

వృక్ష ప్రోటీన్లు : వీటిలో లైసిన్, మిథియోనైన్ పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అమైనో ఆమ్లాల తరుగుదలను నివారించుకోవడానికి జంతుప్రోటీన్లు కలవవలసి వస్తుంది. కార్బుకు పోషక పదార్థాలు ఇవ్వడానికి సాధారణంగా ఆయిల్ కేక్లు, గ్రెయిన్ ఫాడర్లు ఎన్నుకొంటారు. భారతదేశపు

కార్బులు, వైదేశిక కార్బులు కలిపి పెంచడంలో పరితాడు. ముష్టిర్లు ఆయిల్ కేక్ 1:1 నిష్పత్తిలో వాడితే అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చునని తెలిసింది. ఆయిల్ కేక్, గ్రెయిన్ ఫాడర్ యొక్క పోషక విలువ వాటి గుణాత్మక విలువలు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 10-20% శాతానికి తక్కువగా కొవ్వు పదార్థం ఉన్న షక్షంలో మొత్తం ప్రోటీన్ గుణాత్మక విలువ తగ్గిపోతుంది. సాల్ఫ్యూరు ద్రావణ నిష్కర్షణ పద్ధతిలో ఏర్పడిన ఆయిల్ కేక్, పరితాడు ఉపయోగించినపుడు పూర్తిగా ప్రోటీన్ ల ఉపయోగం వీలవుతుంది.

పత్రప్రోటీన్లు : పత్రప్రోటీన్ ల విలువ చేపల సందర్భంగా ఇంకా బాగా తెలియదు. అయినా కొన్ని జాతులలో కొన్ని వృక్ష సంహార పదార్థాలు తినడం అలవాటు ఉంది. అయితే ఇవి రాబోయే కాలంలో చాలా ప్రాముఖ్యం వహించవచ్చు. ఈ అర్థిక పోటీ పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయ పరిస్థితులలో ఇవి అధికంగా ఉత్పత్తి కావచ్చు. వాటిలో కొన్ని పదార్థాలు, వాననలు విషపదార్థాలు తీనివేసిన తరువాత ఇవి అర్థికపరంగా మంచి ఉపయోగంలోనికి రావచ్చును.

అల్టిప్రోటీన్లు : కొన్ని రకాల పెంపకపు చేపలలో అల్టి ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది. క్లోరెల్లా జాతులలో అన్ని గుణాత్మక విలువలు కలిగిన అమైనో ఆమ్లాలు ప్రోటీన్లు ఉన్నాయని తెలిసింది. దీనికి తగిన మాధ్యమం ఎన్నుకొని పంటలు పండి కాలం సరిగా చూచుకొని తగిన సర్దుబాట్లతో ఎన్నుకోవచ్చు. తిలాపియా మెస్సాంబిక సందర్భంగా, క్లోరెల్లా గుళికలు పోషణవల్ల అధిక ప్రమాణాంతో ఉత్పత్తి జరిగిందని తెలుసుకొన్నారు.

ఏకకణ ప్రోటీన్లు : ఈస్ట్, బాక్టీరియా, ఫంజై, అల్టిమొడలైన వాటి నుండి నేకరించిన ప్రోటీన్లు మంచి పోషక పదార్థాలని తెలిసింది. వీటిని తగిన మాధ్యమంలో పెంచవచ్చు. ఇలాంటివి ముడినూనెలు, గ్యాస్, ఆయిల్, సహజసిద్ధ ఆయిల్ బొగ్గు, కార్బో హైడ్రేటులు సల్ఫేట్ లిక్విడ్, మొలాసెస్, జీవసంబంధ వర్ణపదార్థాలు. ఈస్ట్కు ప్రత్యక్ష మూలంగా ద్రవస్థితిలోని హైడ్రోకార్బన్లమీద పెంచినపుడు ఫలితాలు చాలా తృప్తికరంగా ఉంటాయని తెలిసింది.

కార్బోహైడ్రేట్లు : ఇవి స్టార్చ్ పోషక పదార్థాలు, కృత్రిమ పోషకపదార్థాలలో ఆహార కెలోరీల అవసరాల సందర్భంగా, ఇవి ముఖ్య ఆధారాలుగా ఉంటాయి. కార్బులు, మల్టెట్లు మొదలైన పెంపకం చేపల సర్వాహారాలుగా ఉంటాయి. ఇవి కొంత వృక్ష సంబంధమైన ఆహారాన్ని తీసికొంటాయి. అందువల్ల స్టార్చ్ పదార్థాలను సులభంగా జీర్ణం చేసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటాయి. 30-90% వరకు స్టార్చ్ జీర్ణ అవుతుందని తెలుసు కొన్నారు. వరి, గోధుమ, తాడు, చాలా జీర్ణ లక్షణం కలిగి ఉంటాయని తెలిసింది. ఇది ముఖ్యంగా ఈ పెంపకం చేపలలో ఉపయోగిస్తున్నారు. గింజలు ధాన్యాలకు బదులు, బంగాళాదుంపలు ఉపయోగించవచ్చు. ఇక బంగాళాదుంప స్టార్చ్, జైలెమ్, అల్టిన్ ల జీర్ణ శక్తులు 85, 66, 53% గా ఉందని తెలిసింది. కార్బుల పోషణలో ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ నిష్పత్తి 1:7, 1:8 గా ఉండడంవల్ల చవకరకం కార్బోహైడ్రేటుల నిచ్చి, పోషించడానికి మంచి ఆవకాశం కలుగుతుంది. అయితే సహజసిద్ధ ఆహారంలో ప్రోటీన్లు మాత్రం పెరుగుదలకు తగినస్థాయిలో ఉండాలి. సమతూకపు ఆహారం రూపొందించడంలో కార్బోహైడ్రేటులు ప్రోటీన్లు అలా నిష్పత్తి చాలా జాగ్రత్తగా సర్దుకొని రావాలి. దానివలన పెరుగుదలకు కావలసిన ప్రోటీన్లు అలా ఉండనిచ్చి ఆహారకెలోరీల సరఫరాకి కార్బోహైడ్రేటులను సమకూర్చాలి. కొన్ని చేపల సందర్భంగా దాని పోషణస్థాయి సంతృప్తికరంగా ఉంది అంటే దానిలో 39.6% ప్రోటీన్లు, 18.2% కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండి, ఆహారమార్పిడి శక్తి 1:4-4:1 ఉండాలి.

కొవ్వు పదార్థాలు : ఉష్ణప్రాంత జలాలలో పెరుగుతూ ఉన్న చేపలు కొవ్వు పదార్థాలని సులభంగా ఉపయోగించుకోగలిగి ఉంటాయి. కాడ్లివర్ ఆయిల్ ఆహారంలో కలిపిన సందర్భాల్లో పెరుగుదలలో ప్రోత్సాహం కనిపించింది. అయితే దీనికి లైపిడ్లు కారణమా, నూనెలోని ఇతర పదార్థాలు కారణమా తెలియలేదు. అధికతరంగా ఉన్నకొవ్వు పదార్థాలు, కాలేయంలోకి చేరతాయి. అందువలన బ్రపుల్ చేపల సందర్భంగా వాటి ఆహార పదార్థాలలో 10 శాతం కొవ్వు తగ్గిస్తారు. చాలా మంచి స్థాయిలో పెరుగుదల సాధించడానికి మరణాల సంఖ్య తగ్గించడానికి రెయిన్ బో బ్రపుల్ లో ఒమెగా-3 కాన్ పిగు

రేషన్ ఉండి 3-10% ఉన్నవి అవసరమవుతాయి. అధికతరంగా చేప దిగుబడి రావడం, శరీరంలో కొప్పు చేరడం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిసింది. ఇది సోర్గంతో పోషణ జరిగే వాటి సందర్భంగా తెలిసింది. అయితే ఈ సందర్భాలలో ప్రోటీనులు పరిమితం కాకూడదు. అందువలన ఆహారంలో ప్రోటీనులు తగినస్థాయిలో ఉన్న షక్తంలో కొప్పు పదార్థాలను తగినరీతిలో ప్రయోజన స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని అధికంగా దిగుబడి సాధించు కోవచ్చునని తెలిసింది. వైగా ప్రోటీనులను పెరుగుదలకు వినియోగించుకోవచ్చు.

సూక్ష్మపోషక పదార్థాలు : పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే సూక్ష్మపోషక పదార్థాలను ఆహార పదార్థాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించలేము. అయినా వీటి ఉనికి సామాన్యంగా అవసరమవుతుంది. వాటి సహాయంతోనే పోషక పదార్థాల సమతుల్యంలో అందుతాయి ప్రోటీనుల అవగాహన మెరుగవుతుంది. ప్రోటీనులు ఉన్నప్పటికీ చాలా సందర్భాలలో సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలు లేక పోతే, అభివృద్ధి (పెరుగుదల) కుంటుపడుతుంది.

విటమినులు : సాల్మన్ ట్రాట్ సందర్భంగా 7 రకాల విటమినులు పెరుగుదలకు అవుసర మవుతాయి. పెంచుకొనే కార్బులకు వైరి డాక్సీన్, రైబ్ ఫ్లావిన్, పాంట్ తినిక్ ఆసిడ్ అవసరం అవుతాయి. కార్బులకు విటమిన్ B₁₂లో భాగమైన కోబాల్టను 0.8mg. 1 Kg చొప్పున ఆహారం రోజుకు ఇస్తే మంచి ఫలితాలు కనబడ్డాయి. దీనికి నైట్రోజన్. అవగాహనకు సంబంధం ఉంది. మొత్తానికి వీటికి 4 శాతం ఫాడర్ ఈస్ట్ చేర్చాలి హామోగ్లోబిన్ కండర ప్రోటీనులు సంశ్లేషణ దీనికి సంబంధం ఉంది. కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ కలిపినపుడు మనుగడ విషయంలోను, పెరుగుదల విషయంలోను ఈ పెంపుడు చేపల విషయంలో సత్ఫలితాలు కనబడతాయి.

అంటి బయోటిన్ : అత్యధిక స్థాయిలో చేపల పెంపకం జరగడం వల్ల వాటికి రోగాలు రావడానికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అవి తీసుకొనే ఆహారమీద వాటి ప్రోటీన్ జీవక్రియ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటి బయోటిన్కు పాత్ర దీనిమీదనే ఆధారపడుతుంది. 20000 ప్రమాణాల టెట్రామెసన్ ప్రతి 3 రోజులకు కార్బులకు అందిస్తే పెరుగుదల 10.5 శాతం అదా కావడం కనబడింది.

జీర్ణశక్తి : చేపల సహజ సిద్ధ పదార్థాలు పోషణ సందర్భంగా అధిక స్థాయిలో ఉంటాయి. ప్రోటీనులు, కొప్పు, కార్బోహైడ్రేట్లను సద్వినియోగం చేసుకోడం సరళంగా క్రమపద్ధతిలో ఉంటుంది. కాని కృత్రిమాహార పదార్థాల సందర్భంగా అయితే విస్తృతంగా ప్రయోగాలు జరిపి ఫలితాల విశ్లేషణ చెయ్యాలి. అప్పుడే వాటి జీర్ణశక్తి (సద్వినియోగ) కొయఫీషియంట్లు (గుణకము) అర్థం అవుతాయి. జీర్ణక్రియ గుణకము (కొయఫీషియంట్లు) లు నైట్రోజన్ కెలోరీల పద్ధతిలో కొలుస్తారు.

అదనపు ఆహారగణ (స్వీకారం)

అత్యధిక దిగుబడి రాబట్టడానికి చెరువులో స్వతస్సిద్ధంగా లభ్యమయే ఆహార పదార్థాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చెయ్యాలి. దీనికి స్వజాతి భక్షణ అనగా ఒక చేపను (జాతి) మరొక చేప తినడం అలవాటు లేని మంచి పొందిక గల చేపలను పెంచాలి. వీటి ఆహార పద్ధతులు ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నా ఒక విధమైన సర్దుబాటు ఉండాలి. చేపల పెరుగుదలను త్వరితం చేయడానికి వాటి సంఖ్యను అధిక తరం చెయ్యడానికి చాలా రకాల అదనపు ఆహార పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు. అదనపు ఆహార పదార్థాలు అందివ్వగానే చేపలు వెంటనే వాటిని గ్రహిస్తాయి. అతరువాత మిగిలిన భాగాలు ఎరువులుగా ఉపయోగించవచ్చు. అవిధంగా అప్రత్యక్షంగా చేపలకు లేవలసిన అదనపు ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేసినట్లు అవుతుంది.

భిన్న ఆహార స్వీకార లక్షణాలుకల పెంపుడు చేపల అదనపు ఆహార వివరాలు ఈ దిగువ విధంగా ఉంటాయి.

- అకులు గడ్డి, దుంపలు వేళ్ళు పిండి పదార్థాల వంటి శాకాహారాలు,
- మస్టర్డ్(అవ), వేరుశనగ, నూగులు, కొబ్బరి మొదలైన వాటి పిండి లేదా ఆయిల్ కేక్లు.

- iii) గోధుమ తాడు, వరి తాడు, లుపైన్, సోయాబీన్, మొక్క జొన్న, రై, బార్లీ, మొదలైన గింజ ఆహార పదార్థాలు (గ్రెయిన్ ఫాదర్)
- iv) చేప పిండి, ఉష్ణ రక్త జంతువుల నుండి సేకరించిన తాజా మాంసము, రక్తము, కోడిగుడ్డు, రొయ్యలు, పీతలు, ఆల్బిప్పలు, గవ్వలు, మొదలైన జంతు సంబంధ పదార్థాలు,
- v) విటమిన్లు, ఖనిజ పదార్థాలు వంటి అదనపు చేరిక ఆహార పదార్థాలు,

చేపలు సరాసరిగా చెరువుల్లో ఎరువుగా వేసిన పేడను కూడా తీసుకొంటాయి, ఇక వీటిలో ఏవి ఎన్నుకోవాలో చాలా రకరకాల సీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అవి:-

- i) చేపకు ఇష్టంగా ఉండాలి.
- ii) సులభంగా జీర్ణం అవాలి.
- iii) అధిక మార్పిడి విలువ ఉండాలి.
- iv) సులభంగా తీసికోగలిగి ఉండాలి.
- v) అధికంగా లభ్యం కావాలి.
- vi) చాలా కాలం నిలువ ఉండాలి.
- vii) చవకగా లభ్యం కావాలి.

విటమిన్లలోకి చేపలు వీటిని సులభంగా గ్రహిస్తాయి. వీటి కన్సర్వేషన్ నిష్పత్తి ఎలాఉంటుంది. వాటి ఖరీదు ఎలా ఉంటుందా అనేవి ముఖ్యమైనవి. అది అన్ని నిలువలు కలిగిన నమ తూక పదార్థంగా ప్రోటీన్, క్రొవుస్ పదార్థాలు, పిండి పదార్థాలు, ఖనిజాలు విటమిన్లు కలిగి ఉండాలి.

ఆహార కన్సర్వేషన్ ఆధారపడి విషయాలు :


- i) ఇచ్చిన అదనపు ఆహార గుణాత్మక విలువ.
- ii) చెరువులో చేపలు నిలువలో ఉన్న సంఖ్యలక్షణం.
- iii) చేప జనాభాలోని నిలువలో పరిమాణం వయసు.
- iv) ఉష్ణోగ్రత ఆక్సిజన్ టెన్షన్, నీటి pH విలువ మొదలైన అవరణకారకాలు
- v) పోషక పద్ధతులు వాటిని తగినంతలో అన్ని ప్రాంతాలకు సరఫరా అయ్యేటట్లు చూసే పద్ధతి.

కొన్నింటి కన్సర్వేషన్ రేటు సరళంగా ఉంటుంది. ఆయా పరిస్థితులను బట్టి వాటిని గుండ్ర గాచెయ్యడం లేదానీటిలో నానవెయ్యడం లేదా ఎండబెట్టడం, ఉడకబెట్టడం జరుగుతుండి అయితే కేకలు చాలాగట్టిగా ఉంటాయి. అందువల్ల చేపలు వాటినిసామాన్యంగా కొద్ది కొద్దిగా తీసికొంటాయి. గింజలయితే చాలా కాలంపాటు నానవేసి, చేపలకివ్వడంమంచిది. జంతువృక్షపదార్థాలు కుళ్లిపోకుండా వాటిని వండడం ఆవసరం అవుతుంది.

భారతదేశంలో అదనపు ఆహారపదార్థాలు చేపలున్న సరస్సుల్లోకి వేయడం ఒక అధునికపద్ధతి అన్ని నిరకాల చేపలు పెంచే షక్తిలో ఆయిల్ కేక్ (ఉదాహరణకు మస్టర్డ్ ఆయిల్ కేక్), వరితాడు, లేదా గోధుమతాడు 1:1 నిష్పత్తిలో ఈచేపలకు ఆహారంగ్రహించే దానిమీద ఆధారపడిఉంటుంది. నీటికలుపు మొక్కలని గ్రాస్కార్ప్కు తినగలిగినంత ఇవ్వాలి. చెరువులో అధికంగా ఆల్గల్ మొక్కలు అభివృద్ధిచేం దుతున్న షక్తిలో అదనపు ఆహారపోషణని నిలిపిమెయ్యాలి. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయినానరే చెయ్యాలి.

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, సరస్సుల్లో చేపల పెంపకం విషయంలో అధునాతన పద్ధతుల్లో ఆహారం ప్రారంభించారు. సామాన్యంగా ఆహార పదార్థాలను సరస్సు మొత్తంమీద చల్లనవసరంలేదు. కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలలో వాటిని వుంచితేచాలు లేదా వాటిని పశ్చిమవంటివాటిలోవుంచి అక్కడక్కడ 3,4 స్థలాల్లో ఉంచవచ్చు. ఈవిధంగా ఉన్న ఆహారకేంద్రాలని అప్పడప్పుడూ పరీక్షిస్తూవుండాలి. వాటిని మార్చాలి. ఈ స్థలమార్పిడివల్ల కుళ్ళడం నిరోధించబడుతుంది. నీటికలుపు, ఆకులు, గడ్డివంటి

19.3.9. మసులా నావ



పటం 19.4 అంధ తీరంలోని మసులానావ


దీనిని కర్ర చెక్కలతో నిర్మిస్తారు. కొబ్బరి తాడుతో పీటిని కడతారు. పీటినిర్మాణం బింకంగా ఉండదు. నావలో చుట్టం, రిబ్బలు ఉండవు. అందువల్ల కెరటాల ధాటికి సులభంగా తట్టుకొంటాయి. ఇందులో చాలా రకాలున్నాయి. కాకినాడ మచిలీపట్నం మధ్య తీరం లోతట్టుగా రిబ్బలు ఉండే విధానం రూపొందించారు.

19.3.10. నిర్మించబడ్డ నావలు



పటం 19.5 సార్వత్రిక నిర్మించిన నావ


1. సామానుగది 2. వంట 3. చేపలగది




పటం 19.6 సత్వతి పద్ధతి పద్ధతిలో నావ

స్వదేశీయ నిర్మిత నావలు ఉత్తమమైనవి. వశిష్టతీరంలో కనబడతాయి. రత్నగిరికి ఉత్తరాన, బొంబాయి- కాంబే తీరం వెంబడి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. రత్నగిరి విధానంలో ఓ డముఖ భాగం (బో) కూచిగా ఉంటుంది. నన్నగా సరాసరిగా ఉండే ద్రోణి ఉంటుంది. గన్ వేల్ దిగువగా ఉంటుంది. బెస్సీన్ పద్ధతిలో హోల్ భాగం వెడల్పుగా ఉంటుంది. అ ప్రాంతంలో బెస్సీన్ నావని మచ్చా అంటారు. సత్వతి నావలో సుమారు కూచిగా ఉన్నచో ఉంటుంది. బిమ్ వెడల్పుగా ఉంటుంది. ద్రోణి సరాసరిగాను గన్ వేల్ పైగాను ఉంటుంది. ఈ నావనే అక్కడ గల్ బట్ [Galbat] అంటారు. మరొక పద్ధతి బ్రోచ్ విధానం. దీని అడుగు భాగం చదరంగా [Flat] ఉంటుంది. దీనిని సది ముఖ

ద్వారాలలోను లోతట్టు సముద్రాలలోను ఉపయోగిస్తారు. నిర్మించబడ్డ ఇటువంటి నావలు ముఖ్యంగా సత్వతి పద్ధతిని చాలా జనరంజకం అయ్యాయి. వీటి డిజైన్ లో మార్పు లేకుండానే వాటిని యాంత్రికరణ చేయవచ్చు.



పటం 19.7 కాకినాడ నావ




పటం 19.8 మనులానావ

19.3.11 నావ

లోతు తక్కువ ప్రాంతాలలో నావలు తిప్పడం కష్టం. అలాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నావ నిర్మాణ కాశల్యానికి “నావ” ఒక మంచి ఉదాహరణ. సన్నగా ద్రోణి లేకుండా తేలియ్యా, పడవ. దీని నిర్మాణంలో పెద్ద తేదాలు కనబడవు. 21'-10" పొడవు, 5' వెడల్పు, 24" కీళ్ళు ఉండి, బన్నేజి 2.7 ఉంటుంది. ద్రోణి లేకుండా ఉండే అడుగుభాగంలో గుండ్రని డబ్బు ప్రాంతాలంటాయి దీనిని తెరచాపతో కాని, తెడ్లతో కాని, పాడుగాటి వెదుళ్ళతో కాని లోతు తక్కువ నావలలోను, బురద ప్రాంతాలలోను సులభంగా పోవడానికి వీలవుతుంది.

టేకుతో తయారయిన బలమైన చట్రంతో ఏర్పడుతుంది. పొడవునా 3,4 ప్రాంతాలలో రెండు ప్రక్కలా స్క్రింజెస్ ఉంటాయి. ఎక్కువ బరువున్నానరే గట్టిగా ఉన్న సముద్ర తీరానికి, కెరటాల లోంచి సునాయాసంగా చేరుకోగలుగుతుంది. దీనికి కార్వెల్ కర్రచెక్కలు పొట్టిగా ఉన్న ముందు డెక్ (పడవ పై భాగము) పొడవు వెనకనున్న డెక్ ఉంటాయి. యాంత్రికరణకు అనువుగా ఉంటుంది. కాకినాడ ఆ చుట్టుప్రక్కలా ముఖ్యంగాను ఇతర ఆంధ్రతీరంలోనూ ఈనావ విరివిగా ఉపయోగించబడుతుంది.



పటం 19.9 డింగి కార్వెల్ నావ [ఉ.డి.రిస్సా]

19.3.12 డింగి, నాక

ఒకేసారి, వర్షపు బెంగలలోను బిందీస్ కార్వెల్ నావలు ఇవ్వ వచ్చుగా యాపాందిరీమదిన చాకలు. వీటి పరిమాణము 13మీ x 3మీ x 2మీ వరకు ఉండే చాలా పోలంగా ఉంటాయి. వీటిని చేపలు పట్టడం కంటే అనేక ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు. యాంత్రికరణ చేసే దిండ్ల బోట్లలోను, యాంత్రికరణ చేసే దిండ్ల బోట్లలోను [19.11] గాంధీ రెడ్ క్రాస్ యాంత్రికరణ చేసే దిండ్ల బోట్లలోను ఉపయోగించబడుతుంది.

19.4 మత్స్య నావలకు యాంత్రిక సౌకర్య అమరిక

మత్స్య నావను చోదనము (Propulsion) ను జరపడానికి, ఫిషింగ్ గియర్ ను నియోగించడానికి తగిన యాంత్రిక పరికరాలను అనుర్పటానికి నావలో ఇంజన్ ను అమరుస్తారు. దీనివల్ల మత్స్య పరిశ్రమకు ఈ క్రింది సౌకర్యాలు సమకూరుతాయి.

- i. నావికులను సురక్షితంగా, సుఖంగా సముద్రంలో చాలా దూరం వరకు తీసికొని పోగలడం. అక్కడుండి అవసరంకొద్దీ చేపల గంపును అనుసరించటం పట్టడం.
- ii. శక్తివంతమైన వలలను, తీగను (lines) ఉపయోగించడానికి వీలు కల్పించడం.
- iii. కాలాన్ని వృధా చేయకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలడం, సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి, శ్రమను తగ్గించు కోడానికి వీలుగా యాంత్రిక పరికరాలను ఉపయోగించగలటం.
- iv. వట్టిని చేపలను లోపం రాకుండా పరిరక్షణము చేసి, తీరాలకు జాగ్రత్తగా చేరవేయడం.

యాంత్రికరణలో ప్రధమ సమస్య సరియైన ఇంజన్ ను ఎన్నుకోవడం. చాలా రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి.

19.5 జాట్ బోర్డ్ మోటార్లు

చాలా రకాలు సరదాగా బోట్లలో ఫిషింగుకు ఉపయోగించే విధంగా ఉంటాయి. తేలికగా ఆల్.పి.ఎమ్. చాలా అధికంగా ఉంటుంది. అందువల్ల బరువు నావలకు ఉపయోగించడం సమంజసం కాదు. అయితే ఈనాడు బరువు పసులకి వీలుగా కొత్త మోడల్లు వస్తున్నాయి. నీటి అడుగున ఉండే భాగాలు కంచుతో చేస్తున్నారు. పొడువుగా నిలువుగా ఉండే స్తంభాలు వాడుతున్నారు. ఇంజన్ బెడ్ గాని, స్ట్రెమ్ ట్యూబ్ కాని స్థాపించ వలసిన అవసరం లేదు. పని అయిపోయాక దానిని తీసివేయవచ్చు. గాలి వాటం అనుకూలంగా ఉన్నా తీసివేయవచ్చు. అయితే పెట్రోల్ ధర ఎక్కువ. ఇంజన్ చాలా సున్నితమైనది. ఇటీవల డీసెల్ తో నడిచే జాట్ బోర్డ్లు కూడా వాడుకలోకి వస్తున్నాయి.

19.6 ఇన్ బోర్డు మోటార్లు

గాసోలీన్ ఇంజన్లు


మార్పు చెందిన కారు ఇంజన్లు. సులభంగా దొరుకుతాయి. తక్కువ బరువు చవక నిర్వహణ చాలా సులభం, కాని ఇంధనం ఖరీదైనది. సులభంగా నిప్పు అంటుకొంటుంది. అందువల్ల మత్స్య నావలను దీనికి ఉపయోగించకూడదు.

కోరోసిన్ ఇంజన్లు

ఇవి కూడా మార్పు చెందిన కారు ఇంజన్లు. కిరోసిన్ కు వేరుగా ప్రత్యేకంగా ఒక కార్బురేటర్ ఉంటుంది. ఇవి చిన్నవి, తేలికగా, సులభంగా నిర్వహించవచ్చు. ఇంధనం ఖరీదు ఎక్కువ కాదు, కాని బరువు నిర్వహణ సాధ్యం కాదు.


నెమిడిసల్ ఇంజన్లు

ఇవి బరువు నిర్వహణలో ఉపయోగపడతాయి. నెమ్మదిగా పని చేసే ఆయిల్ ఇంజన్లు. ద్వయచక్ర పద్ధతిలో చాలవరకు ఉంటాయి. కదిలే యాంత్రిక భాగాలు తక్కువ. ఈ ఇంజన్లు బరువుగా, పెద్దవిగా ఉంటాయి. గడగడ లాడతాయి. అందువల్ల బలమైన బోట్ల మీదనే వాడగలం.



పటం 19.22 పై డిపెనింగ్ బాటమ్ ట్రాల్

ట్రాల్లర్లలో వివిధ వర్గాలు a) ఓమ్ ట్రాల్ b) బుల్ ట్రాల్ c) ఆటర్ ట్రాల్. ఆటర్ ట్రాల్ చాలా వాడుకలో ఉన్నది. దీనిలో ముఖ్య మూడు వర్గాలున్నాయి. అవి మిడ్ వాటర్ ట్రాల్, సెమిపిలాజిక్ ట్రాల్, పై డిపెనింగ్ బాటమ్ ట్రాల్.



పటం 19.23 కేరళ తీరంలోని బోట్స్

సీన్ వలలు


దీనిలో వల ఒక చివరి భాగం ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం నుంచి మూట్ చేస్తారు. ఆ విధంగా కొంత ప్రాంతం అవరిస్తుంది. ఆ తరువాత దానిని తిరిగి ఈ ప్రాంతం ప్రాంతానికి తీసికొని వస్తారు. తరువాత గియర్ను మొత్తం తీస్తారు. ఈ విధంగా తీరం నుంచి కాని నావసీన్ వలల నుంచి కాని ప్రధమంలో వినరవచ్చును. వీటికి సంచులుండవచ్చు లేక పోవచ్చు.

సరౌండింగ్ వలలు


దీనిలో ఒక చేపల గుంపు (పోల్) ను ఆవరించి, వైకి తీస్తారు. రింగ్ నెట్లు. వర్ప్ సీన్లు బాగా పరిచయమైన వలలు.

వర్ప్ సీన్

దీని ముఖ్య లక్షణం పర్సింగ్. లాగే దారం పట్టి ఈడిస్తే మూతపడిపోతుంది. ఇది సంచికి దిగువ భాగంలో ఉంటుంది. దీనిని రీడ్ లైన్ అంటారు. ఆ విధంగా వల ముడుతలు పడి పోవడమో గుత్తులుగా చేరి పోవడమో అవుతుంది.




పటం 19.24
సీన్ నెట్ సంచి తోకుండా




పటం 19.25
సంచిలో సీన్ నెట్

అవిధంగా తోపల బంధించబడ్డ చేపలని మత్స్య నావలోని వారు పైకి లాగుతారు. ఇందులోకూడా ధృకాలున్నాయి. రెండు నావలతో వర్ప్ సీన్, డెక్ వర్ప్ సీన్, లాంపారా. రింగ్ నెట్, బీచ్ సీన్, బోట్ సీన్, డేనిష్ సీన్.



పటం 19.26
లఫ్ట్ వెల్



పటం 19.27 వివిధ రకాల లిప్ట్ వలలు
1. మంచి 2. గ్రాడు 3. వెడుఉకర 4. వల 5. కర్ర 6. వెడురుచాట

డిప్ నెట్లు


నీటి అడుగుకు దింపి పైకి లేవేవన్నీ ఈ రకానికి చెందుతాయి. వీనిని డిప్ లేదా లిప్ట్ వలలు అంటారు. ఉదా|| చైనీస్ డిప్ వల. మిగతా ఉదాహరణలు ఫిష్ వీల్లు.

ఫారింగ్ నెట్లు

ఈ విధమైన గియర్లు చేపల మీద పడి వాటిని ఆవరిస్తుందియ కవర్ వలలు, కాన్ వలలు మొదలైనవి.

19.11.4. ఎంటాంగ్లింగ్ పద్ధతి

ఈ మూదిరి పలలో చేపలు చిక్కుకోడానికి అవి మూసలి వాటిని తారసీల్లాల్సి. ఈ వలలను డ్రిఫ్ట్ వలలుగా కాని, నీటి మధ్య మట్టాలలో కాని, ఉపరి తలం మీద కాని ఉంచి ప్రచాలనము చేస్తారు లేదా ఒకచోట స్థిరంగా ఉంచుతారు ఒకే న్తరం ఉండే గిల్ వలలు కాని, చాలా స్తరాలుండే ట్రెన్సుల్ వలలు కాని ఈ రకానికి చెందుతాయి. ఇవి మంచినీటి సముద్ర నీటి వనర్లలో ఉపయోగిస్తారు.



పటం 19.28 తేలియాడే గిల్ వల
1. ఫ్లాట్ 2. లంగరు 3. సింకర్లు

గిల్ వలలు, బాంగల్ వలలు

నీటిలో ఇవి నిటారుగా వ్రేలాడుతూ ఉంటాయి. ప్రవాహంలో కదుల్తూ ఉంటాయి లేదా ఒక చోట స్థిరంగా ఉంచుతారు. నిజమైన గిలవలల్లో చేపలు గిల్ వెనక చిక్కు కొంటాయి వల రంధ్రాలు తలను బయటకు పోనిస్తాయి కాని శరీరాన్ని కాదు. బయటకు పోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మొవ్వులు

తెరచు కొంటాయి ఆ మొవ్వులు వలలో చిక్కు కొంటాయి. అందువల్ల మేష్ సైజు చాలా ముఖ్యం. ఇందులోను రకాలున్నాయి. బాటమ్ డ్రిప్టింగ్, బాటమ్ సెట్, సర్దేస్ డ్రిప్ట్, బ్రామ్మెల్ వలలు.

19.11.5 సెల్స్ ఫిషింగ్ పద్ధతి

గియర్ లో కొన్ని రసాయనిక, భౌతిక ఉత్తేజనమాలను కల్పిస్తారు. వాటికి అనుగుణంగా చేప శరీర ధర్మ రీత్యా జరిగే ప్రతిక్రియల ఆధారంగా ఈ వలలు తమ కార్యం నిర్వహిస్తాయి. వాసన శబ్దం, కాంతి వంటివి ముఖ్యమైన ఉత్తేజకాలు. చేపల అయో తత్వాల ననుసరించి ఆకర్షించ బడతాయి కృత్రిమంగా కొన్ని అవరోధాలను సృష్టించి-ఫిష్ ప్యాడ్స్, నెట్ వాల్ - చేపలను వాటి మీద నుంచి గెంతునిస్తారు. సమాంతరంగా ఉన్న తేలియాడే వలరాష్ట్ బ్రాస్ లేదా ఒక నావ లేదా వెట్టెను ఉపయోగించి ఇలా ఉత్తేజకాలకు లోనైన చేపలను పట్టుకొంటారు.

దుమికే చేపలకి బోనులు

కొన్ని కొన్ని జాతుల చేపలు ఉత్సాహంతో లేదా ప్రమాదం అనిపించి నపుడు నీటిపైకి గెంతుతాయి. ఈ లక్షణాన్ని ఆధారం చేసుకొని కృత్రిమంగా గోడ వలలు, హెడ్జెన్ వంటివి నిర్మించి వాటిని గెంతు నిస్తారు. ఆ సమయంలో వాటిని నేకరిస్తారు. సాల్మన్ బ్రాష్ బోట్ బ్రాష్ వరండా నెట్లు, స్కూప్ నెట్లు, ఫిట్ పాల్ బ్రాష్ కొన్ని రకాలు.


సామాన్య సముద్ర ఫిషింగ్ గియర్

సముద్రంలో చేపలు పట్టడం రకరకాల సైజులు, డిజైన్లు ఉన్న వలలతో సాధ్యమవుతుంది. అంతేకాక సముద్రంలో దూరంగా పెద్ద పెద్ద చేపలని పట్టడానికి తీగలు, గాలాలు ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యమైన వలలు, స్థిరంగా ఉన్న వలలు, మ్యాగ్ నెట్లు, బోట్ సీన్లు, షోర్ సీన్లు, డ్రాగ్ నెట్లు, డ్రిప్ట్ నెట్లు, బ్రాల్ నెట్లు గిల్ నెట్లు, కాస్ట్ నెట్లు.

స్థిరమైన వలలను బెంగాల్ మొదలు తూర్పు తీరం అంతాను, ఉత్తరాన పశ్చిమ తీరం కతీయవార్ వరకు వాడతారు. వీటిని అటు పోటు మధ్య ప్రాంతాలలో, అటు సమయంలో స్థిరంగా కడతారు వాటిని స్థిరంగా ఉంచడానికి కర్ర స్తంభాలు, ప్లాట్లు, సింకర్లు ఉపయోగిస్తారు. వలలు నలుచదరంగాను లేదా త్రికోణాకారంలో ఉంటాయి. వివిధ సైజుల్లో ఉంటాయి. పోటు సమయంలో చేపలు వలలలోకి ఈదుకొని వస్తాయి. అటు సమయంలో చిక్కుకొని పోతాయి. ఒక రాష్ట్రం నుండి మరో రాష్ట్రానికి వీటి నిర్మాణం కొంత మారుతుంది. పేర్లు కూడా వేరుగా ఉంటాయి.


పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సాలలో శంకు ఆకార స్థిర వలలను పంచ్, కతీయా, కోల్ జాల్, పంచ్ కతీయా-బెర్రెజాల్ బెహూండి లేదా గుర్ని జాల్ అంటారు. అవే రాష్ట్రాలలో దీర్ఘ చతురస్ర స్థిర వలలని బయర్డ్ మూల్ జాల్ అంటారు. ఉత్తర ఒరిస్సాలో బ్రుండాజాల్ అంటారు. తంజావూరులో కలవరై అని, పాక్ జలసంధి మన్నార్ సింధు శాఖల్లో కలమ కుట్టి వల అంటారు. కెనరా తీరంలో కొండవల తోర్కువల, వాగాల్ జాల్, బంగేలాజాల్, పట్టుబల, పాడి, ఇంతాగ్ జాల్ అంటారు. గుజరాత్ కతీయ వార్ తీరాల్లో పాడి. నిటాజాల్ అంటారు. జాలరి వాళ్ళే తమ ఇళ్ళల్లో వీటిని స్వంతంగా అల్లు కొంటారు. చిన్న చిన్న వలలు జనపనారతోట్, మరో గట్టి దారంతోట్ అల్లు కొంటారు, తాడుతో కాని, అక్కడ లభ్యమయే చెట్టు బెరడు నిష్కర్షణ ద్రవాలతో వీటికి తగిన ప్రక్రియ కావిస్తారు.

బాగ్ వలలు సాధారణంగా శంకువు ఆకారంలో ఉంటాయి. వాటికి ఫ్లాంక్లు కాని రెక్కల వంటివి కాని ఉండవు. అయితే పొడవుగా చివరకు సన్నంగా ఫ్లాంక్లు ఉన్న రకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆంధ్ర తీరంలోని ఇరగవల, తమిళనాడులోని తురివల, కేరళలోని కొల్లివల ఇలాంటివే. నీటిని రెండు పడవల మీద నుంచి ప్రయోగిస్తారు. కేరళలోని మతికొల్లివల తైల సార్పీన్లను పట్టడానికి ఉపయోగించే ప్రత్యేక బాగ్ నెట్. కేరళలోనే మరొక పెద్ద నావ సీన్ మరొక పద్ధతి.



పటం 19.29 డోల్. బొంబాయి తీరంలోని బాగ్ నెటు


బొంబాయి గుజరాత్ తీరాలలో డోల్ అనే బాగ్ నెట్‌ను విస్తృతంగా వాడతారు. ఇది పొడవైన శంకువు అకారంలో ఉంటుంది. నోరు విశాలంగా ఉంటుంది. నోటి భాగం వెదురు రాటలకు కడతారు. కూచిగా ఉన్న భాగం పడవలో పట్టుకొంటారు. ప్రవాహం వేగంగాను ఉన్నతంగానూ ఉండే సందర్భాలలో దీనిని వాడతారు వల తిన్నగా ఉండి బాగా విచ్చు కొంటుంది. చేపలు దానిలో పట్టు బడతాయి.



పటం 19.30
మాడవలయ్ కోరమాండల్
తీరంలోని తీరసీన్

తీరసీన్ వలలు

దీనికి సామాన్య ఉదాహరణలు-ఒరిస్సాలోని బెర్హంపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పద్మలోడు అలివివల, కోర మాండల్ తీరంలోని వెరయూ లేదా మాడవలయ్య మన్నార్ సేంధు శాఖలోని కరవలయ్. ముఖ్యంగా



పటం 19.31 డ్రెడ్ వల

ఇది శంకువు అకారంలో ఉన్న వల రెండు సంచులుంటాయి. కొంకణ మలబార్ తీరాల్లో మాకేరల్‌ను పట్టడానికి విరివిగా ఉపయోగించే వల. భారత దేశ సముద్రాలన్నిటిలోనూ వాడే అతి పెద్ద తీరసీన్ వల. తీరం మీద ఉండే పెద్ద స్తంభానికి ఒక చివర ఈ వలను కడతారు. నావ మరొక చివరను

సముద్రంలోకి తీసికొని పోతుంది. అర్ధ చంద్రాకారంలో చుట్టి తిరిగి మీదకి వస్తుంది. వలలో నిండుగా చేపలు పడ్డాక, మనషులు చాలా మంది దీనిని ఇరుప్రక్కలాగే పట్టి ఒడ్డుకు లాక్కొని వస్తారు.

డ్రైఫ్ట్ వలలు, గిల్ వలలు రెండూ గోడల రూపంలో వివిధ సైజుల్లో, మెష్లలో ఉంటాయి. జనపనారతో అల్లుతారు. సింకర్లు, ఫ్లోట్లు అమర్చి వలను తిన్నగా నిటారుగా అమరుస్తారు.

కాస్ట్ వలలు చాలా మంది ఉపయోగిస్తారు. ఒకే మనిషి చిన్నవలను ఉపయోగించగలుగుతాడు. సాధారణంగా దీనికి ఒకతాడు ఉంటుంది. విడిదిలించి వలను వేస్తారు. వల విస్తరించుకోగానే చేపలు అందులో బంధించ బడతాయి.

తీగలు (ట్రెన్లు), గాలాలు పురాతన కాలం నుంచి వాడుకలో ఉన్నాయి. గాలాలను తీగలకు కాని, మాలుదారాలకి కాని చివరగా అమరుస్తారు. ఈ గాలాలకి ఎరలను అతికిస్తారు. సారచేపల వంటి పెద్ద వాటికి గాలుకు గాలాలు వాడతారు. ఈ తీగలను నార్లలో సముద్రంలోకి తీసికొని పోవాలి.

ట్రాల్ వలను యాంత్రికనావల నుంచి సాధారణంగా ప్రయోగిస్తారు. ఈ వలను ఇంతకు ముందు వర్ణించడం జరిగింది.

19.12 మంచినీటి వనరులలో ఉపయోగానికి సామాన్యఫిషింగ్ గియరు


మన దేశంలో చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగించే గియర్లను సమీక్షించి చూస్తే, కొన్నిటిని మంచినీటి, సముద్రనీటి వనరులు రెండిటికి ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. డ్రాగ్ నెట్లు, బోనులు, గాలాలు, తీగలు, మొప్పవలలు, మొద్దలైన వాటిని మంచినీటి వనరులలో సమర్థవంతంగా వాడడం జరుగుతోంది. అయితే సామాన్యంగా వాడుకలో ఉన్నవి. అన్ని ప్రాంతాలలోను వాడడం లేదు. చాలా ప్రాంతాలలో వాడుకలో ఉన్న వాటి గురించి ఈ దిగువవివరించడం అయింది.

19.12.1 బోనులు

చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగపడే బోనుల గురించి ఇదివరకే ఈ పాఠంలో వివరించాం. అతి సరళమైన విధానం నుంచి చాలా క్లిష్టమయిన పద్ధతి వరకు వాడుకలో ఉన్నాయి. అనేక రకాల ఆకారాలలో వెదురు బద్దలతో తయారుచేసుకొన్న పంజరాల వంటి నిర్మాణాలున్నాయి. చీలికలు వంటి రంధ్రాల ద్వారా చేపలులోనకు ప్రవేశించ గలుగుతాయికాని బయటకు రాలేవు. ఆకారాలు, నెట్లు భిన్నంగా ఉంటాయి. స్థూపాకారం అర్థస్థూపాకారం, చతురస్రాకారం మొదలైన ఆకారాలలో వీటికిపైన మూత ఉంటుంది. దీనిని అవసరం కొద్దివాడ వచ్చును. ఈ పంజరం వెదురు బద్దలు సన్నగా చీల్చి దగ్గరగా అల్లుతారు. వీటిని జనుము దారాలతోటి లేదా ఇతర దారాలతోటి బిగిస్తారు. ఈ బోనుకు బలం ఆపాదించడానికి 3 చుట్టుబద్దలు ఉంటాయి. ఇవి కూడా వెదురుతో తయారు చేస్తారు. ఒకటి నోటి దగ్గర తరవాత 20-30 సెం.మీ. దూరంలో కడతారు.

19.12.2 ఏంగ్లింగ్

కడ్డీ, తీగ నిర్మాణంలో ఒక తేలిక వెదురు బద్ద చివర కూచిగా ఉన్నది. దాని చివర ఒక బలమైన ట్యుయిన్ దారం దాని చివర తగిన గాలం ఉంటాయి. తీగ చాలా పొడవుగా ఉన్న పక్షంలో 1.5 సెం.మీ. వరకు ఉన్నగాలాలు కొన్ని అక్కడక్కడా కడతారు. సహజమైన లేదా కృత్రిమమైన ఆహార నిర్మాణాలను ఉపయోగించి వాటిని ఆకర్షింపజేస్తారు. మాంసాహార చేపలయిన మర్రెల్, వల్లగ్లో మొదలైన మార్బల మత్స్యలు, కొన్ని కార్ప్ చేపలు సులభంగా దీని వల్ల చిక్కుతాయి.



పటం 19.32 కాస్ట్ నెట్

19.12.3 కాస్ట్ నెట్ (వల)

ఈ వల అన్ని ప్రాంతాలలోను, అన్ని కాలాలలోను ఉపయోగిస్తారు. ఇదొక శంకువు ఆకారంలోని వల. బలమైన తాడు ఉంటుంది. ఈ తాడు బాహ్య మెష్ లోంచి పోతుంది. దీనికి లీడ్ సింకర్స్ ఉంటాయి. ఈ వల వ్యాసం సుమారు 3.5 మీటర్లుంటుంది. బాహ్యంగా (అంచు) మెష్ల సంఖ్య 400-500 ఉంటుంది. ఇవి సంఖ్య, సైజులో అగ్రం దగ్గరగా కలుసుకొంటాయి. బాహ్యంగా ఉండే కార్డ్ (తాడు) నిర్మాణం 100-120 వరకు లీడ్ సింకర్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఇవి సుమారు 3 కే.జీ.ల బరువుంటాయి. ఇవి దగ్గరగా అమరి ఉంటాయి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఒక రకం చేపలకని కాదు. అన్ని రకాల చేపలు ప్రచాలనంలో పడతాయి.

19.12.4 స్టేక్ నెట్

శంకు ఆకార బాగ్ నెట్ అన్నిటికన్న సామాన్యమైన స్టేక్ నెట్. సేలయేళ్ళు, టైడల్ జలాలలో దీనిని పెట్టి చేపలను పడబోత చేస్తారు. నీటి ప్రవాహ వేగంవల్ల వలనోటిభాగం తెరుచుకొనే ఉంటుంది. అడుగు బురదలోకి పాతినరాట్లకు దీనిని కట్టి వలను స్థిరంగా ఉంచుతారు. 2-3 మీటర్ల దూరంలో నిలువునా పాతిన రాబలు ఈ వలకు ఆధారం కల్పిస్తాయి. నిలువనీటిలో ఇద్దరు మనుషులు వలను ఇరుప్రక్కలా పట్టి లాగుతారు. నీటిని ఒక ప్రక్కనుంచి మరొక ప్రక్కకి పడబోత చేస్తారు. చేపలని సంచిలోకి పట్టాక తోక భాగం దగ్గర ద్వారం లోంచి వాటిని సేకరిస్తారు.

మరొక రకం స్టేక్ వల ఉంది. దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉంటుంది. 2.5-3.5 మీటర్ల దూరంలో సమాన దూరంలో వున్న కొయ్యలకో, వెదురు రాబలకో, తల, పాదం తాళ్ళను (Head & foot ropes) కడతారు. సుమారు 8-12 రాబలు, 2-3 మీటర్ల పొడవునా నున్నవి సామాన్యంగా ఉపయోగిస్తారు. వల పొడవును బట్టి ఈ రాబల సంఖ్య ఉంటుంది. ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు ఈ వలను పట్టి లాగడం వల్ల దానికి పారాబోలిక ఆకారం వస్తుంది. చేప పిల్లలు మార్కెట్ లో అమ్మదగిన సైజ్ లోనివి దొరుకుతాయి, కార్ప్ చేపలని, మిగతా కుండలలోని చేపలని పట్టడానికి ఇది చాలా తోనువైన వల.

19.12.5 హండ్ సీన్లు

వీటిని సామాన్యంగా డ్రాగ్ నెట్లు అంటారు. అతి సరళమైన ఈ వలను ఇద్దరు అటుఇటు పట్టి లాగుతారు. అలా లాగే సమయంలో రెండు ప్రక్కలా సమాన పీడనం ఉండడం ముఖ్యం. ఈ

వల దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా ఉంటుంది. ఇది చేపలు వట్టే నీటి వనరు వెడల్పు ననుసరించి, దాని పొడవు ఉంటుంది. చిన్న చిన్న వలలు మెష్ కలిపి కుట్టుడం జరుగుతుంది. చిన్నవల కొలతలు సాధారణంగా 15మీ X 6 మీ. ఉంటుంది. మెష్ సైజు 6 మి.మీ. నుంచి 25 మి.మీ. ఉంటుంది. లోతు అధికంగా ఉండే చెరువుల్లో అయితే ప్రతి ప్రమాణం యొక్క కొలతలు 30 మీ X 9 మి.మీ. వల వెడల్పు కనీసం చెరువు లోతుకు రెట్టింపు ఉండాలి. సంచిగా ఏర్పడడానికి అవకాశం అప్పుడే ఏర్పడుతుంది. చేపలను పట్టడానికి తగిన విధంగా వేలాడుతుంది. అతిలోతు సరస్సుల్లోను, జలాశయాల్లోను చాలా పెద్ద సైజు డ్రాగ్ వెల్లను ఉపయోగిస్తారు. 300 మీటర్లు మించిన పొడవు 15 మీటర్లు వెడల్పు ఉంటాయి. చెరువులు కుంటలలో అయితే, ఉపరితలం నుంచి దిగువకు నిలువునా ఉన్న నీటి పొరల్లోకి చేపలు, వలదెల్లి భాగంలో చిక్కుకొంటాయి. చివరికి వైకి లాగివేస్తారు.


19.12.6 మొప్ప వలలు

చాలా మంది మొప్ప వలలతో చేపలు పట్టడం చెరువులు, కుంటలలో అవలంబిస్తున్నారు. చేపలని తాళు చిక్కుల్లో బంధించి మొప్పలను ఇంకెంచి పట్టడం ఇందులోని లక్ష్యం, దారంతో ఒకే స్తరంలో అల్లిక కలిగిన వల ఉంటుంది. దీనిని పైభాగంతో బెండుతోటి. దిగువ బరువుతోటి వ్రేలాడ గడతారు. ఈ విధంగా నీటిలో వ్రేలాడ గట్టడం అంతో ఇంతో వదులుగా ఉంచుతారు. అందువల్ల రంధ్రాలు చాలవరకు పొడవుగా డయమండ్ ఆకారంలో ఉంటాయి. కాని చతురస్రాకారంతో ఉండవు నెట్ గిల్ నెట్టింగ్, డ్రప్ గిల్ నెట్టింగ్ అనేవి రెండూ, నిలువ నీటిలోనూ, ప్రవహించే నీటిలోనూ నిర్వహిస్తారు.

మొప్పవలలు 40-50 మీటర్లు పొడవు, 3-4 మీటర్లు వెడల్పు ఉంటాయి. మెష్ (రంధ్రాల) సైజు 75 మి.మీ. 175 మి.మీ. ఉంటాయి. అయితే నీటి సైజు 100 మీటర్లు పొడవు వరకు ఉండవచ్చు. పాస్టిక్ ఫ్లోట్లు, లిడ్ సింకర్లు, పాడ్ రోప్కు, పుల్ రోప్కు తక్కువ దూరాలతో కడతారు.

19.12.7 ట్రామెల్ వల

ఇది అనేక స్తరాలుకల వల. తాళుతో అల్లిన ఈవల ఫ్లోట్ వరస నుంచి దిగువ లీడ్లైన్ వరకు వ్యాపిస్తుంది. బాహ్యంగా ఉన్న రెండు ఒకే సైజులో ఉంటాయి. ముతక ట్రయిన్ దారంతో




చిత్రం 19.33 వ్యాపి బెంగాలులోని లీడ్ జాల్

1. వెదురుబాట 2. ప్రవాహము 3. పోట్లు


ఏర్పడుతుంది. మెష్ పెద్దదిగా ఉంటుంది. లోపలి వల సన్నని ల్యూయిస్ తో ఏర్పడుతుంది. మెష్ చిన్నదిగా ఉంటుంది. బయటి వలను దాటిన చేపలు లోపలివలలో చిక్కుకుంటాయి. సాధారణంగా సముద్ర జలాల్లో వాడతారు.

బీన్ జాల్ ఒక బ్యాగ్ నెట్. అటుపోటు ప్రవాహానికి ఎదురుగా పెడతారు. రాటలకో, వెదురు సంభాలకో కడతారు. ఫ్లాట్స్ ని చిక్కు రెక్కలకు కడతారు. పశ్చిమ బెంగాల్ నదుల ముఖ ద్వారాల దగ్గర, డెల్టా ప్రాంతాలలో వాడతారు. చిన్న చిన్న చేపలని పట్టడానికి వాడతారు.

సుందర్ బాన్స్ లోని ఖల్ పట్టాజాల్, చిలక సరస్సులోని జనోస్, కేరళ ఉప్పు టేళ్ళలోని తట్టువల- ఇవి నదీ ముఖ ద్వారాల దగ్గర వాడే సమర్థవంతమైన వలలు. ఉప్పు నీటి మడుగుల్లో కొంత భాగాన్ని వెదురు బద్దల తెరలలో కాని లేదా ఇతర సిర్మాజాలతో అని ఆవరిస్తారు. చేపలని ఈ ఆవరణలోకి రానిస్తారు. చేపలని కాస్ట్ వలలతో కాని, డిప్ వలలతోకాని లేదా అటు సమయంలో నీటిని పోనిచ్చి కాని వాడతారు.




పటం 19.34. ఖల్ పట్టాజాల్ (సుందర్ బాన్స్)
1. నది 2. నేట్ 3. ఖాల్




పటం 19.35 షాంగోజాల్ (వర్సెల్)

నదీ ముఖాలలో పై ప్రాంతాలలో వాడే వర్సెల్ లలో షాంగోజాల్ ఒక రకం దీనిని కానోయ్ (చెక్క దొర్తి చేసిన) నుండి ప్రచాలనము చేస్తారు.




పటం 19.36 చాంది జాటు (డ్రైఫ్ట్ గిల్ వల)
1. వెదురు ప్లాట్లు, 2. తాడు 3. మట్టితో చేసిన భరువు

పశ్చిమ బెంగాల్ లోని నదీమంజుల వద్ద వాడే డ్రైఫ్ట్ గిల్ వలలో ఒక రకం ఈ చాందిజాట్. హిల్సా చేపలకి సంబంధించి ఇదొక సమర్థవంతమైన గియర్. ఈ వల 305 మీ. పొడవు 3 మీ వెడల్పు ఉండి మెష్ కొలత 7.5 నుంచి 10.2 సెం.మీ. ఉంటుంది.



పటం 19.37 బెర్జాల్ (సీన్ వల)

బెర్జాల్ పెద్ద నైజు సీన్ వల. నీటిలో వేడింగ్ (Wading) పద్ధతిలో కానీ, పడవల మీద నుంచి కాని గంగా నదీ జలాలలో దీనిని వాడతారు.



పటం 19.38 కరకు లేదా కల్లాజాల్ (డ్రైఫ్ట్ వల)

ఎంతయినా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మొప్ప వలల సైజు చాలా ముఖ్యం. ఈ వల సామర్థ్యం దాని వాస్తవమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది తిరిగి దాని ఫ్లోట్లు, బరువుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ట్యూయిన్, దాని మందం, మెష్ సైజు, నిలువునా మెష్ల సంఖ్య, ఫ్లోట్లు తేలే అక్షణం, సింకర్లు, మొదలైనవి. పట్టేచేప, చేప నివసించే ప్రాంతాల అక్షణాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.

తేలిక రకం వలలు బజారులో లభ్యమయ్యే నూలు దారాలతో అల్లుతారు. వీటిని 3-6 వరకు కలిపి తిరిగి మందంగా ఉన్న దారాలుగా వేనుతారు. ఇంకా బలమైన ముతక వలలని సాధారణంగా జనుము నారలతో వేనుతారు. జనుము మొక్క (క్రొటలేరియా జన్సియా).

అనుబంధ నిర్మాణాలు

వల సరియైన స్థితిలో ఉండడానికి ప్లవాలు, సింకర్లు కలసి తోడ్పడతాయి. ప్లవాలు వలను వైకి లేపితే సింకర్లు దిగువకు ఉంచుతాయి. ప్లవాలను హెడ్ రోప్లకు అతికి ఉంటాయి. ఇవి కార్కుతో కాని, కర్ర, పాస్టిక్, స్పాంజి, రబ్బర్ గ్లాస్ లేదా బోహ లోహ నిర్మాణాలతో కాని ఎర్పరుస్తారు. ప్లవాలు సాధారణంగా గోళాకారంగాకాని, దీర్ఘ గోళాకారంలో కాని ఉంటాయి. బయట నుంచి వీటిని వెయింట్ చేస్తారు. కార్కుతోటి కర్రతోటి చేసిన వాటిని తారుపూసి వాటర్ప్రూఫ్ (తడి అంటకుండా) చేస్తారు.

సింకర్లు ఫుట్ రోప్కి అతికి ఉంటాయి. ఇవి ఇనుము లేదా సీసముతో తయారుచేయడం చాలా మంచిది. రాళ్ళు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సిమెంట్ కాంక్రీట్తో కావలసిన సైజు ఆకారంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చును. అదే విధంగా లంగర్లు తగిన బరువు పదార్థంతో తయారు చేస్తారు. వలను లంగరువేసి అడుగునకాని, మధ్య మట్టాలలో కాని ఉంచితే, ఒక చిన్న నావను, స్తంభం జెండా ఉంచి, వల ఎక్కడవుందో గుర్తించు కొంటారు.

19.17 ఫిషింగ్ గియర్ పరిరక్షణ

సరియైన జాగ్రత్తలు రక్షణ తీసికోకపోతే ఫిషింగ్ గియర్ నశించి పోవడానికి అవకాశాలున్నాయి. ఇది జరగడానికి చాలా అవకాశాలున్నాయి. యాంత్రిక రాపిడి అరుగుదల, వంగిపోవడం, సాగడం కారణంగా కొన్ని బాషలు దెబ్బ తిన వచ్చు. బూజు బాక్టీరియా పట్టి కుళ్ళి పోవచ్చు. చేపలు పట్టిన తరువాత వలకి చేపల జిగురు తదితర జీవ సంబంధ పదార్థాలు అతుక్కొంటాయి. ఆ రాత్రికి రాత్రి ఆ వలని అలా వదలకూడదు. ప్రవాహ నీటిలో (కొళాయి మొ.) దానిని శుభ్రంగా కడగాలి. అలా కడిగి ఆరవేయడం సాధ్యం కాకపోతే, బ్రెన్ నీటిలో ముంచి వేయాలి. లేదా ముతక ఉప్పు తగినంత దాని మీద జల్లాలి. వలను శుభ్రపరచడానికి కావర్ సల్ఫేట్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఎక్కువ కాలం సూర్యకాంతికి గురి చెయ్యడం కూడా మంచిది కాదు. అందువల్ల వాటి పని అయిపోగానే వాటిని కడిగి నీడలో ఆరవేయాలి. తడి వలలు బాక్టీరియా నాశనానికి సులభంగా గురి అవుతాయి. బాగా గాలి బారే షెడ్లలో విడి విడిగా వ్రేలాడ కట్టడం చాలా మంచి పద్ధతి. ఇక గుట్టలుగా పడవేయ వలసి వస్తే మధ్య మధ్య ఉప్పు చల్లడం అవసరం.

బాక్టీరియా చర్యలను, ఆ విధంగా చెడిపోవడాన్ని నిరోధించడానికి, ఈ వలను 'బార్క్' చర్యకు కృషి చేస్తారు. ఇందులో చాలా టానింగ్ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు. అకేషియా, మాంగ్రోవ్లు, కరేల్ వుడ్ మొదలైన చెట్ల బెరడును నీటిలో మరిగించి వాటి డికాక్షన్ తీస్తారు. ఈ ద్రవాన్ని చల్లార్చి దానిలో వలను కొంతకాలం ముంచుతారు. ఎండ బెట్టిన తరువాత తిరిగి ఈ డికాక్షన్లో రెండవసారి ముంచుతారు. ఈ విధంగా ముంచడం ఎండబెట్టడంవల్ల నన్నని పాపరూపంలో టానిక్ ఆస్తుం ఏర్పడుతుంది. దారాలను బాక్టీరియా చర్యకు గురి కాకుండా నిరోధిస్తుంది. తరువాత వలను 1% పాటాషియమ్ డైక్రోమేట్తో చేర్చి రంగును స్థిరీకరిస్తారు.

కొన్ని వలలకు పని, రాపిడి ఎక్కువ. ఈ అరుగుదలను నిర్బంధించడానికి తారు పూతలు పుడతారు, కోల్ తారు రెండూ బాగానే ఉపయోగపడతాయి. వలను వేడితారులో ముంచుతారు. లేదా కిరోసిన్ తారు కరిగించి ముంచుతారు. ఏ విధంగా నయినా 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. తరువాత ఎండ బెడతారు. దీనివల్ల తాడుకు శక్తి వస్తుంది. నీటిని చేరనియదు, ఇక క్రిముల సంహారానికి ఎండలో ఎండ బెట్టడం లేదా 35% కాపర్ సల్ఫేట్, కాపర్ నాఫ్తినేట్, కాపర్ ఓలియేట్ ద్రావణంతో చేరుస్తారు.

ఫిషింగ్ గియర్ పరిరక్షణలో వివిధ పద్ధతులు సూర్యరశ్మి, కాపర్ సల్ఫేట్, కాపర్ నాఫ్తినేట్, కాపర్ ఓలియేట్, క్యూప్రెనాల్, టానింగ్ (కవ్ ఉపయోగించి) తారు, అక్రిలోనిరైల్, ఆర్థిల్ ప్రక్రియ, అసిటైలేషన్, మొబైల్ డెక్ కోటింగ్ ఆయిల్.

స్వపరిశీలన

1. కొరకుల్ అను పడవ.
2. _____ అను నావలను ఒకే దూలము నందలి మధ్య భాగమును తొలిచి తయారు చేయుదురు.
3. సముద్ర మధ్య భాగములో జీవించు చేపలను పట్టుకొనుటకై _____ ను వాడుదురు.

19.18 సారాంశము

చేపల వేట కుపయోగించే పడవల రకములను గురించి ఈ భాగంలో వివరించబడినది. దీనిలో ముఖ్యమైనవి కొరకుల్, సంగడం, థోని, కటుమరాన్, డిగ్ అవుట్ కనోస్, మనులా పడవ, నౌక మొదలైనవి.

అలాగే చేపల వేట కుపయోగపడే వివిధ రకముల వలలను గురించికూడ ఇక్కడ వివరించబడినది. వీనిలో ముఖ్యమైనవి బ్రాప్స్, బాక్ నెట్స్, బ్రాల్ నెట్స్, సిన్ నెట్స్, పర్సుసీస్సు, మెంటాంగిల్ నెట్స్, గిల్ నెట్స్ మొదలైనవి.

వివిధ రకముల చేపల వేటకు, వివిధ రకముల పడవలు, వలలు అవసరము. ఇవి ఆయా చేపల జీవిత పద్ధతులపై నాధారపడి తయారు చేయబడినది.

19.19 స్వపరిశీలన- జవాబులు

1. కొరకుల్ అను పడవ బొంగులతో తయారు చేయబడినది. ఇది చూచుటకు బుట్టవలె నుండును. నదులలోను, జలాశయములలోను చేపల వేటకై దీని నుపయోగింతురు.
2. కెమాన్
3. గిల్ నెట్స్

19.20 సమూహ పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మన దేశంలోని వివిధ మత్స్యనావలు ఏవో తెల్పి వాటిని క్లుప్తంగా వర్ణింపుము.
2. డిజ్ బ్లింగ్ పద్ధతి ఫిష్ గియర్ ను వర్ణింపుము.

3. పడబోత వలలు అననేమి? సరిక్కిందంగా వాటి గురించి వ్రాయుము.
4. మంచి నీటి వనర్లలో ఉపయోగించే సామాన్య ఫిషింగ్ గియర్ గురించి చర్చించుము.
5. స్పాన్ నేరణలో ఉపయోగించే గియర్ ను వర్ణింపుము
6. మత్స్య నావల నిర్మాణంలో అవసరమయ్యే సామగ్రి గురించి వ్రాయుము
7. సింథటిక్ చేప వలల ట్రయిన్ ను వర్ణించుము.

II ఈ కింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మత్స్యనావల యాంత్రీకరణ. 2. బోనులు అవరోధాలు, . ఎన్ బ్లాండ్లింగ్ పద్ధతి వలలు,
4. మత్స్య నావలకు కావలసిన జాగ్రత్తలు 5. ఫిషింగ్ గియర్ పరిరక్షణ

భాగం-20 చేపల పరిశ్రమ విస్తరణ చేపల సంవర్ధన ప్రోత్సాహం, విస్తరణ పద్ధతులు. విస్తరణ పథకాలు

విషయక్రమం

- 20.1 ఉద్దేశ్యం
- 20.2 ఉపోద్ఘాతం
- 20.3 మత్స్య పరిశ్రమ ప్రోత్సాహము
- 20.4 చేప పరిశ్రమ విస్తరణ
 - 20.4.1 విస్తరణ అధికార్థ విధులు
 - 20.4.1.1 మత్స్యవిస్తరణ డివిజన్ లో అధికార్థ
 - 20.4.1.2 విషయ విజ్ఞాన నిష్ఠాతులు
 - 20.4.1.3 మత్స్య సంవర్ధన విస్తరణ ముఖ్య అధికార్థ
 - 20.4.2 విస్తరణ పద్ధతులు
 - 20.4.2.1 విస్తరణ కార్యక్రమంలో పద్ధతులు పరీక్షరణ
- 20.5 విస్తరణ కార్యక్రమము
- 20.6 సారాంశం
- 20.7 వ్యవస్థీకరణ - జవాబులు
- 20.8 మాదిరి పరీక్షా ప్రశ్నలు
- 20.9 పదకోశము

20.1 ఉద్దేశ్యం

చేపల సంవర్ధనను ప్రోత్సహించడంలో చేపల పరిశ్రమ క్షేత్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి చర్యల గురించి ఈ భాగం చర్చిస్తుంది. విస్తరణ విభాగం నిర్వహణ విభాగం విస్తరణ విభాగంలోని వారి విధులను గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ సాంకేతిక విజ్ఞాన సదుపాయాలను వ్యవసాయదారులకు అందజేసే విస్తరణ గురించి ప్రత్యేకంగా ఉదహరించడమయింది. విస్తరణ కృషి కార్యక్రమం రూపొందించుకొనే విషయం కూడా చర్చించడమయింది.

20.2 ఉపోద్ఘాతం

చేపల సంవర్ధన ప్రోత్సాహానికి జరిగిన ముఖ్య కృషి విశేషాలు.

చేపల పరిశ్రమ విస్తరణలోని ఇక్ష్వం

విస్తరణలోని నిర్వహణ పద్ధతులు

చేపల పరిశ్రమ విస్తరణ అధికార్థ విధులు

4. మత్స్య పరిశ్రమకు సంబంధించి వివిధ రంగాలతో నిష్పాతులైన వారితో ఒక కేంద్ర సంఘాన్ని స్థాపించాలి. వాణిజ్య మత్స్య విజ్ఞానానికి సంబంధించి, ఈ రంగంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికర కార్య కలాపాలను క్రోడీకరించడానికి ఒక సంకలన విభాగాన్ని ఏర్పరచాలి. దీని ద్వారా రాష్ట్ర విస్తరణ కేంద్రానికి సమాచారం చేరవేయాలి.
5. ప్రతి రాష్ట్ర మత్స్య వర్తన విభాగము ఒక ప్రత్యేక 'సెల్' ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దీనికి చీఫ్ ఎక్స్‌టెంషన్ ఆఫీసర్ అధికారిగా ఉండాలి. రాష్ట్రంలో లభ్యమయే నీటి వనరులను ఆధారంగా తీసుకొని, మత్స్య సంవర్ధన సేకరణ సందర్భంగా వీలైనన్ని విభాగాలుగా వాటిని విభజించాలి. ఒక్కొక్క విభాగానికి సేవకులను నియమించాలి. వీటిలో ప్రత్యేక భాగాలు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు చేప సంవర్ధనము, ఉప్పు కయ్యల చేప సంవర్ధనము, సముద్ర జల జంతు సంవర్ధనము, చేపల సేకరణ, వాటి సమీకరణ (హార్డింగ్), రవాణా, సంపాదన [Processing] అమ్మకం మొదలగునవి.
6. కేంద్ర బృందం ప్రతి సంవత్సరం పునశ్చరణ తరగతులను అందరు రాష్ట్ర విస్తరణ సేవకులకు జరిపించాలి.
7. గ్రాడ్యుయేట్ తరగతుల్లో మత్స్య విజ్ఞానము ఒక ముఖ్యాంశముగా ప్రవేశ పెట్టాలి. ఈ విధంగా శిక్షణ పొందిన బృందం విస్తరణ కార్య క్రమాలకి లభ్యం అవుతారు. వ్యవసాయ విశ్వ విద్యాలయంవారు ముఖ్యంగా ఈ పనిని చేపట్టాలి.

వ్యవస్థాకృతి (Organisational set up)

వ్యవస్థా రూపము / మత్స్య సంవర్ధన విస్తరణ
మత్స్య సంవర్ధన ముఖ్య అధికారి
(పరిపాలన)

విషయ పరిజ్ఞాన నిష్పాతులు

1. మత్స్య సేకరణ ఆధారాలు
2. మంచినీటి మత్స్య సంవర్ధనము
3. ఉప్పు కయ్యల మత్స్య సంవర్ధనము
4. సముద్రజల జంతు సంవర్ధనము
5. చేపల సేకరణ
6. సంపాదన, వాటి సందక్షణ
(Quality Control)

మత్స్య సంవర్ధన డివిజన్‌లో అధికారులు

1. మంచి నీటి మత్స్య సంవర్ధనము
2. తీరజల జంతు సంవర్ధనము
3. మత్స్య సేకరణ
4. సమీకరణ (హార్డింగ్), సంపాదన
వాటి సందక్షణ, అమ్మకం మొదలగునవి

20.4.1. విస్తరణ అధికార్థ విధులు

మత్స్య సంవర్ధన క్షేత్ర అధికారులు

మత్స్య సంవర్ధన విస్తరణ క్షేత్ర అధికారులు ఆయా విభాగాలలో ప్రత్యేకత సంతరించుకొన్న వారిని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అప్పడే విస్తరణ కార్యక్రమంలో ఆ ప్రత్యేక విధుల నిర్వహణ సులభ పాధ్యమవుతుంది. ఆ పనిని బట్టి చేపల సేకరణకాని, జల జంతు సంవర్ధన కాని క్షేత్ర విస్తీర్ణం వనరులను బట్టి ఈ అధికారుల సంఖ్య నిర్ణయించుకోవాలి. చేపల సేకరణ అధికారికి జల జంతు సంవర్ధన విషయాల అధికారిగాను, లేదా ఈ తిరుగు మార్గంలోనే బదిలీ చెయ్యకూడదు. క్షేత్ర జాలర్లతో అతి సన్నిహితంగా మెలుగుతూ, అధిక అభివృద్ధిని సాధించే విధంగా ఆధునిక సాంకేతిక

అభివృద్ధిలను వారికి అందజేస్తూ ఉండాలి. ఈ సందర్భంగా దృశ్య శ్రవ్య ప్రచారం జరపాలి. శిక్షణ, డిమాన్ స్ట్రెషన్లు జరపాలి. అప్పడప్పుడు అధికార్లు జ్యేత్ర సందర్శనానికి పోతూఉండాలి. సమస్యలు ఏ విధంగా తీర్చాలో వారికి తెలుపుతూ ఉండాలి. వారి కుటుంబ సంక్షేమ సందర్భంగా సమాచారాన్ని సేకరించుకొని దీనిని నిత్యం గమనిస్తూ ఉండాలి. కేవలం ఆఫీస్లో కూర్చోకుండా జాల్దర్లతో భాగస్వామిగా మెలగాలి. వారందరి చేత మన్నన, గౌరవం పొందాలి. ఈ విషయాలను ఎప్పటి కప్పుడు డైరీలో వ్రాసుకొని ఉంచుకోవాలి.

20.4.1.1 మత్య విస్తరణ డివిజన్ అధికార్లు

అనేక విస్తరణ జ్యేత్ర అధికార్లకు సంబంధించి ఒక డివిజన్ కు అధికారిగా డివిజన్ అధికార్లు ఉంటారు. ఇతను కూడా తరుచుగా జ్యేత్ర అధికార్ల కార్యకలాపాలపై అజమాయషీ అడుపు చెయ్యాలి. సరాసరి జాల్దర్లకు ప్రశ్నావళి పత్రాలు అందించి వారి వద్ద నుంచి సమాధానాలు వారికి అందుతున్నాయో దీనివల్ల తెలుస్తుంది జ్యేత్రఅధికార్ల డైరీలు కూడా, డివిజన్ అధికార్లు తనిఖి చెయ్యాలి. ముఖ్య విస్తరణ అధికారి వద్దనుంచి తగిన సమాచారం అంతా సేకరించి సాంకేతిక విషయాలన్నీ జ్యేత్ర విస్తరణ అధికార్లకు అందజేయ్యాలి.

20.4.1.2 విషయ విజ్ఞాన నిష్ఠాతులు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మత్స్య సేకరణ విజ్ఞానంలో జరుగుతున్న పురోగతిసంతా, ప్రచురణ ద్వారా కాని అయూదేశాలకు పోయి కాని సేకరించి దానిని ఒక సంకలన 'నెట్' రూపంతో ఒక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పరచవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మత్స్య విస్తరణ ఈనాడు బహుళ విషయపరిజ్ఞానస్థాయికి చేరుకొంది. విషయ పరిజ్ఞాన నిష్ఠాతులు ప్రతిరంగంలోను రూపొందాలి. వాణిజ్య మత్స్య పరిశ్రమ విస్తృతరీతిలో ఈ విషయంలో పరిణత చెందాలి. ఒక సంకలన విభాగం వారి క్రింద రూపొందాలి. మత్స్య సేకరణ విస్తరణ ముఖ్య అధికారి క్రింద అతని ముఖ్య కేంద్రంలో ఈ దిగువ విషయపరిజ్ఞాన నిష్ఠాతులు ఒక టీమ్ గా ఉండాలి.

1. మత్స్య ఆధారాలు (Resources)
2. మత్స్య సేకరణ సాంకేతిక విజ్ఞానము
3. తీర జల జంతు సంవర్ధనము
4. మంచి నీటి జల జంతు సంవర్ధనము
5. చేప సంపాదన (Processing)
6. వాసి పరిరక్షణ (Quality control)
7. అమ్మకం

విషయ విజ్ఞాన నిష్ఠాతులు, విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని అయూ భాషల్లో కూడా ప్రచురించి జ్యేత్ర అధికార్లకు అందజేయ్యాలి. ఒక పత్రికను కూడా నిర్వహించి నిత్యం జరిగే సాంకేతిక అభివృద్ధి సమాచారాన్ని అందరికీ అందజేయ్యాలి. సంవత్సరానికి కొకసారి జ్యేత్ర అధికారులకు పునశ్చరణ తరగతులు నిర్వహించాలి.

20.4.1.3 మత్స్య సంవర్ధన విస్తరణ ముఖ్య అధికార్లు

రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇతను విస్తరణ కార్యక్రమానికి అధికారిగా ఉంటాడు. అభివృద్ధి జరుగుతున్న కొద్ది కొత్త ప్రాంతాలను ఈతడు గుర్తించాలి. వాణిజ్య పరంగా వనరులను సద్వినియోగ పరచడానికి సాంకేతిక పరంగా కొత్త పుంతలు తొక్కడానికి అంచనాలు వేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మన దేశంలో సముద్ర కలుపు మొక్కలను వాణిజ్య పరంగా ఉపయోగించుకోడానికి కొత్త అవకాశాలు కనబడ్డాయి. అందువల్ల ఆ ప్రాంతాలలో సముద్ర కలుపు పెద్ద ఎత్తున సంవర్ధన సాధ్యమవుతుందేమో ముఖ్య అధికారి పథకాలు రూపొందించుకోవాలి. మన దేశంలో కాని ఇతర దేశాల నుంచి కాని జ్యేత్ర

అధికారము శిక్షణ ఇప్పించాలి. తరచు డివిజన్ అధికారతో సమావేశాలు జరిపి, జరిగిన పురోభివృద్ధిని సమీక్షించి, సమాచారం అందవలసిన వారికి ఎలా చేరుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలి.

మనదేశం అవిశాలమైనదే కాక 6100 కి.మీ. తీరం కలిగి ఉంది. ఇందులో ఉష్ణకయ్యలు మంచి నీటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఉత్పత్తిలో ప్రయోగ రీత్యా అభివృద్ధి సాధించాలంటే విస్తృత రంగాలలో కృషి జరపాలి.

మత్స్య పరిశ్రమ అభివృద్ధి అంతా రాష్ట్రాల అజమాయిషీ కిందనే ఉంది. విద్యా, సాంస్కృతిక విషయాల సందర్భంగా భిన్న పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. అందువల్ల వీటి నన్నింటిని సమన్వయ పరిచేటందుకు ఒక బలమైన తీర సంఘం అవసరమవుతుంది.

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో కేంద్ర మత్స్య సంవర్ధన విస్తరణ శిక్షణ కేంద్రం [Central Fishers Extention Training Center] ఉంది. ఇది కాక ఈ దిగువ కేంద్రాలున్నాయి.

సెంట్రల్ మరైన్ ఫిషరీస్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్	కొచ్చిన్ [కేరళ]
సెంట్రల్ ఇన్ లాండ్ ఫిషరీస్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్	బారక్ పూర్ [పం. బెం.]
సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడ్యుకేషన్	బొంబాయి
సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెక్నాలజీ	కొచ్చిగడన్
సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ నాటికల్	కొచ్చిన్
అండ్ ఇంజనీరింగ్ ట్రయినింగ్	మంగుళూరు, టుటికారిన్,
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిషరీస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫిషరీస్ పాకర్టీస్	కొచ్చిన్ మొ.
ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్	

ఇవన్నీ మత్స్య విస్తరణ విజ్ఞానంలో శిక్షణ విద్య అందజేస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారి ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ, ఖమ్మం జిల్లా పాలేర్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కావలి, తిరుపతి, హైదరాబాద్ మొదలైన చోట్లా ఈ సందర్భంగా శిక్షణ, విద్య అందజేస్తున్నారు. అంతేకాక తీర జల జంతు సంవర్ధన రంగంలోను, మంచి నీటి మత్స్య విస్తరణ రంగంలోనూ పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. కాకినాడలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఫిషరీస్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. ఇది జాలరకు చేపలు పట్టడంలో శిక్షణ నిస్తోంది.

విషయ విజ్ఞాన నిపుణులు సమాచారాన్ని కేవలం సంపాదించడమేకాక, క్షేత్రాలకు తరచు వెళ్తూ ఉండాలి. అక్కడ కనబడే లోపాలను గుర్తించాలి. దాని అభివృద్ధికి సర్దుబాటుకు ఏ చర్యలు తీసుకోవాలో అంచనాలు వేసుకోవాలి. విస్తరణ మాన్యువల్ అన్ని భాషల్లోతయారు చేసుకోవాలి. 'ఫిషరీస్ బులెటిన్' జాలరకు మత్స్య వ్యవసాయదార్లకు అందే విధంగా అన్ని భాషల్లోను ప్రచురించాలి. మొత్తానికి సమన్వయచర్యలను రూపొందించుకొని ఉత్పత్తిరంగంలో నూతన పంథాలను తెలుసుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉత్పత్తి వనరులను బలపరచుకోవాలి. దీనికి ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానం మన అందుబాటులో ఉంది.

20.4.2 విస్తరణ పద్ధతులు

విస్తరణ కార్యక్రమాలలో మనం అనుసరించే పద్ధతుల మీదనే వీటి విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆయా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం ఎన్నుకొనే పద్ధతి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విస్తరణ పద్ధతుల బోధన కొన్ని అధ్యయన పరిస్థితుల మీద వాటికి సంబంధించిన కొన్ని మూలకాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అవి:

1. భౌతిక సదుపాయాలు

విస్తరణ సేవకునికి అజమాయిషీ నిర్వర్తించు ప్రాంతం ఒక జిల్లా, బ్లాకు, డివిజను లేదా మండలం, రాష్ట్రం ఉండవచ్చు. అదే అతని తరగతి గదిలాంటిది.

2. విద్యార్థులు

విస్తరణ సేవకుని వద్ద విద్యార్థులుగా జాబర్లు, మత్స్య వ్యవసాయదార్లు, మత్స్య కృషిలో పాల్గొనే స్త్రీలు పిల్లలు, బాలురు, బాలికలు.

3. విషయ విజ్ఞానం

ఇందులో మత్స్య సంవర్ధనము, మత్స్యసేకరణ ఉండవచ్చు. జల జంతు సంవర్ధన విషయాలన్నీ ఉంటాయి. మత్స్య, రొయ్య సంవర్ధనం మంచిసీటి వనర్లలోను ఉప్పనీటిలోను ఏ విధంగా జరుగు తాయో తెలుసుకోవాలి. చేప, రొయ్య, విత్తనాల ఉత్పత్తి, కుంటలు చెరువుల నిర్వహణ మసల్, ఆయిస్టర్ సంవర్ధనము, కప్పల సంవర్ధనము మొదలైనవి ఉంటాయి. ఇక చేపల సేకరణ సందర్భంగా, గియర్, టాకర్, ఫిషింగ్, రకరకాల చేపల సేకరణ పరికాల ఉపయోగం దీనిలో ముఖ్య అంశాలుగా ఉంటాయి.

4. ఇన్స్ట్రక్టర్

విస్తరణ సేవకులు డిగ్రీస్థాయి విద్యార్థులు కలిగి ఉండాలి. మత్స్య విస్తరణ క్షేత్రంలో బాగా శిక్షణ పొంది, అతనికి మంచి దృష్టి, చారవ, యుక్తి మొదలైన లక్షణాలు ఉండాలి.

బోధనా సామగ్రి

నేర్చుకొనే వారికి విషయపరిజ్ఞానం అందించడంలో, బోధనా సందర్భంగా ఎన్నుకొనే సామగ్రి ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది.

నేర్చే వానికి, నేర్చుకొనే వానికి మధ్య సమాచార ప్రాసారానికి తగిన సన్నివేశాలు సృష్టించేదే బోధనా పద్ధతిలోని అంతరార్థం.

ఈ దిగువ అంశాలు విస్తరణ పద్ధతులలో ముఖ్య విధులు:

1. నేర్చుకొనే వ్యక్తి చూడగల్గ, వినగల్గి నేర్చే సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి
2. నేర్చుకొనే వ్యక్తికి తగిన ఉత్తేజం కుతూహలం కలగాలి అప్పుడే మానసకంగా భౌతికంగా ఈ చర్యకు సిద్ధంగా ఉంచగలుగుతాడు.
3. నేర్చుకొనే వ్యక్తి ఈ నేర్పడంనేర్చుకోడం సందర్భంగా కొన్ని అంశాలు గుర్తించుకొనేలాగ చెయ్యాలి. శ్రద్ధ, కుతూహలం, సమ్మతం, చర్య, తృప్తి ఉండాలి.

20.4.2.1. విస్తరణ కార్యక్రమంలో పద్ధతులు పరీకరణ

వీటిని ముఖ్యంగా ప్రత్యక్ష అప్రత్యక్ష పద్ధతులుగా పరీకరిస్తారు. ఈ దిగువ అవి వివరించబడ్డాయి.
ప్రత్యక్ష పద్ధతులు (Direct methods)

- (i) వ్యక్తిగత భేటీలు (Individual contacts)
- (ii) సామూహిక భేటీలు (Group contacts)
- (iii) ప్రదర్శన డిమాన్ స్ట్రేషన్లు (Demonstration)

8. తక్కువ ఖర్చుతో వారి అలవాట్లలో మార్పు తీసికొని రావచ్చు.

అనుసరించ వలసిన సూత్రాలు.

ఈ కృషి విజయవంతం కావడానికి కొన్ని సూత్రాలున్నాయి. అవి :

1. వెళ్ళవలసిన స్థల నిర్ణయం.
2. ఎన్ని సామూహిక భేటాలు జరుపాలో నిర్ణయించుకోవాలి.
3. ముందుగానే ఈ సమావేశాల సందర్భంగా అన్ని విషయాల గురించి పథకం వేసుకోవాలి.
4. ముందుగానే స్థలం, కాలం తేదీ నిర్ణయించుకోవాలి.
5. ఈ సమావేశాలు రాత్రిపూట జరపకూడదు పగటిపూట జరపాలి.
6. దృశ్య, శ్రవణ పరికరాలను సన్నివేశానికి తగిన విధంగా తీసికొని వెళ్ళాలి.
7. తగినంత సంఖ్యలో లీఫ్ లెట్లు, పాంప్లెట్లు తీసికొని వెళ్ళాలి.
8. అక్కడి నాయకులను ఈ సమావేశాల సందర్భంగా సంప్రదించి వారి సలహాలందుకోవాలి.
9. జరిగేస్థలం, కాలం, తేదీ విషయంగా తగిన విధంగా ప్రచారం జరపాలి.
10. కాల జ్ఞానం పాటించి సమావేశాలనుకొన్న అనుసమయానికి ప్రారంభించాలి.
11. ఆప్రాంతం నాయకునిచే సమావేశ ప్రారంభం జరిపించాలి.
12. క్లుప్తంగా ఆ సమావేశ ఉద్దేశం ఏమిటో వివరించాలి.
13. అసలు విషయం నుంచి దాట వేయకూడదు.
14. దృశ్య, శ్రవణ పరికరాల ఉపయోగంతో పాటు సాంకేతిక వివరాలు తెలపాలి.
15. వినేవారిలో ఎంతకుతూహలం ఉందో, ఎంతవరకు వింటున్నారో అంచనా వేయాలి.
16. అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా సమావేశ సభికులను చర్చలో పాల్గొన నీయాలి.
17. చుట్టు ప్రక్కల మత్స్య వ్యవసాయరంగంలో, వ్యవసాయదార్లు ఎలా ముందుకు పోతున్నారో ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి.
18. తగిన సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవలసిన విషయాల మీద తగిన చర్చ తీసికోవాలి.
19. సామూహిక మానసిక వైఖరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారిని అభివృద్ధిస్తూ, కోరికను కలుగజేసి, కుతూహలం రేకెత్తించి తగిన చర్చకు ప్రేరేపించాలి.
20. నిర్ణీత కాలంలో సమావేశం ముగించాలి.
21. స్థానిక నాయకులలో ఎవరినైనా సమావేశం చివర కొద్ది మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించాలి.
22. సమావేశం చివర లీఫ్ లెట్లు పంచిపెట్టాలి.
23. ఇంకా కొన్ని వివరాలు కావాలని కోరిన మత్స్య వ్యవసాయదార్ల వివరాలను రాసిపెట్టుకోవాలి.
24. అలాంటి సమావేశాలకు దూరదర్శన్, ఆకాశవాణి దిన పత్రికలు, మాగజైన్ల ద్వారా ప్రచారం ఇవ్వాలి. ఏ విధంగా అనేక మంది మత్స్య వ్యవసాయదారులను కలుసుకొన్న వైనం తెలియపర్చాలి.
25. ఈ మత్స్య వ్యవసాయదారులని తిరిగి కలుసుకోవాలి. వ్యక్తిగత సమావేశాలు జరుపుకొని పోస్ట్ ద్వారా ఇతరత్రా ఈ సయోధ్యను పెంపొందించాలి.

(iii) డిమాన్ ష్ట్రేషన్ [ప్రదర్శన]

మత్స్య వ్యవసాయదార్లు లేదా పని వారి సమక్షంలో ప్రత్యక్షంగా ప్రయోగాలు జరిపి, పాత పద్ధతులని కాని, కొత్త పద్ధతులని కాని క్షేత్రంలో కాని, ప్రయోగశాలలో కాని కట్టారా చూపించడం ఈ పద్ధతిలోని అంతర్యం. స్థానికంగా కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరించవచ్చని అక్కడి వ్యవసాయదార్లకు నమ్మకం కలిగించడం ఇందులో ఉద్దేశ్యం. దీనిని నిర్వహించడానికి విస్తరణ కార్యకర్త ముందుకు రావచ్చు. లేదా శిక్షణ పొందిన ఇతర వ్యక్తిచేత ఇప్పించవచ్చు.

దీనిలో ఉద్దేశాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

1. మత్స్య వ్యవసాయదార్లు కొత్త పద్ధతులను అలవర్చుకొంటారు.
2. పురాతన, సాంప్రదాయక పద్ధతులకు బదులు కొత్త విధానాలు అమలులోకి వెడతారు.
3. లోపాలతో కూడిన పద్ధతులు అనుసరించడానికి బదులు కొత్త సమర్థవంతమైన పద్ధతులు అందు బాటులోకి వస్తాయి.
4. కాలహరణం లేక, వ్యక్తి వృధా కాకుండా, చికాకు లేని విధంగా పనులు నిర్వహించగలిగితే వ్యవసాయదారులకి సంతృప్తి కలుగుతుంది.
5. స్థానికంగా ఈ పద్ధతులు అనుసరించవచ్చని, వారందరికీ నమ్మకం, ధైర్యం కుదురుతుంది.

అనుసరించదగిన సూత్రాలు

1. ఈ పద్ధతికి డిమాన్ ష్ట్రేషన్ అవసరం అవుతుందేమో నిర్ణయించుకోవాలి. దానిలో కొన్ని సాంకేతిక విషయాలు ఉంటాయి.
2. ముందుగానే మొత్తం ప్రోగ్రాం అంతా రూపొందించుకోవాలి.
3. పరికరాలు, సామగ్రి అంతా డిమాన్ ష్ట్రేషన్ కు తగిన విధంగా పని చేసే తీరులో ఉన్నట్లు ముందుగా చూసుకోవాలి.
4. అదే విధంగా ముందుగానే తేదీ సమయం, స్థలం నిర్ణయించుకోవాలి.
5. వీలయినంత వరకు ఈ డిమాన్ ష్ట్రేషన్, స్థానిక మత్స్య క్షేత్రంలో జరిగేట్లు చూసుకోవాలి.
6. అందరు మత్స్య వ్యవసాయ దార్లకు సమావేశ డిమాన్ ష్ట్రేషన్ వివరాలు గురించి మంచి ప్రచారం ముందుగా ఇవ్వాలి.
7. ఒక రోజుముందుగా ఆక్షేత్రానికి పోయి అవసరమైన పరిస్థితులు పరికరాలు సమకూరి ఉన్నాయోలేదో ధ్రువపరచుకోవాలి.
8. వీలయితే ఒక రిహార్సల్ జరుపుకోడం మంచిది.
9. స్థలానికి ముందుగానే వచ్చి అన్నిసరి చూసుకోవాలి.
10. అక్కడికి చేరిన వారందరికీ డిమాన్ ష్ట్రేషన్ సరిగ్గా కనబడే పద్ధతిలో ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకోవాలి.
11. ఆసలు డిమాన్ ష్ట్రేషన్ ప్రారంభించడానికి ముందుగా, ఆ పద్ధతి, టెక్నిక్ గురించి ఒకసారి వివరణ ఇవ్వాలి.
12. వారు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులు ఏలాగ ఉన్నాయో తెలుసుకోడానికి వారిని కొన్ని ప్రశ్నలడగాలి.
13. పరికరాలు, సామగ్రి వివరాలు వారికి తెలియజేసే డిమాన్ ష్ట్రేషన్ లో అవి ఏలా ఉపయోగపడతాయో వారికి వివరించాలి.
14. టెక్నిక్ ప్రదర్శనలో నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వెళ్ళాలి. అవసరమైతే ప్రతి చర్య తిరిగి చెయ్యాలి.
15. మీరు చేసే చర్య వారికి అర్థం కావడానికి మీరు చెప్పే విషయాలు సులభగ్రాన్యంగా ఉండే విధంగా సరళ భాషలో అందివ్వాలి.

6. బొమ్మలు, పటాలు కూడా ఇస్తూ పాఠకులకు సులభంగా అర్థం అయ్యే విధంగా చెయ్యాలి.
7. పాఠకునికి సులభంగా ఉండే విధంగా పాఠాలకి కూడా హెడ్డింగ్లు పెట్టాలి.
8. సరళభాష, సామాన్య వాడుక పదాలు ఉండాలి.

(ii) వార్తావ్యాసాలు (News articles)

వార్తా పత్రికల ద్వారా, వార్తల రూపంలో వచ్చే సమాచారం చాలా మంది పాఠకులకు ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. అధిక సంఖ్యలో పాఠకులకు, అమిత కుతూహలం కలిగించే వార్తలు అతి ముఖ్యవార్తలుగా ఉంటాయి. జరుగుతున్న విషయాల గురించి షక్తిపాత రహితంగా, ఖచ్చితంగా ఈ వార్త వ్యాఖ్య ఉంటాయి. పాఠకులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి.

ఈ వార్తా వ్యాసాల ఉద్దేశం ఇలా ఉంటుంది.

1. పాఠకులలో ఉత్సాహాన్ని కలిగించడం
2. పాఠకులకు కావలసిన సమాచారం అందించడం.
3. అనుకూల వాతావరణం కలిపించడం
4. ఇతర విస్తరణ కార్యక్రమాలయిన సభలు, సమావేశాలు డిమాన్డ్స్, షెడ్యూల్స్ కు బలం చేకూర్చడం.
5. ప్రత్యక్ష పద్ధతులకు ఆధారం కల్పించాలి.

అనుసరించవలసిన సూత్రాలు

వార్తావ్యాసాలు వ్రాసే సమయంలో ఈ క్రింది సూత్రాలు గుర్తుంచుకోవాలి.

1. విషయంలోని ముఖ్యాంశాలు ముందు రాయాలి.
2. సరళ భాష ఉపయోగించి, క్లిష్ట పద జాలం వదిలిపెట్టాలి.
3. స్వంత అభిప్రాయాలు చెప్పడం మంచిదికాదు.
4. ఖచ్చితంగా, క్లుప్తంగా న్యాయంగా అభిప్రాయాలు చెప్పాలి.
5. కుతూహలం కలిగే విధంగా విజ్ఞప్తులను చెయ్యాలి.
6. బొమ్మలు, పటాలు మొదలైనవి వెయ్యాలి.
7. అధునిక సాంకేతిక వివరాలు ఇవ్వాలి.
8. మీ పూర్తి అడ్రస్ ఇవ్వాలి. దీని వల్ల ఇంకా సమాచారం కావాలనుకునే వ్యవసాయదార్ల మీకు వ్రాయడానికి వీలవుతుంది.

(iii) వ్యక్తిగత ఉత్తరాలు

చదవను, వ్రాయను నేర్చిన వ్యవసాయదారుల సందర్భంగానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. కొంత మంది వ్యవసాయదార్లు విస్తరణ సేవకులకు ఉత్తరాలు రాస్తూ కొంత సమాచారాన్ని కోరుతూ ఉంటారు. వ్యక్తిగతంగా పోయి కలుసుకోడానికి అవకాశం లేని సందర్భాలలో, విస్తరణ సేవకులు వ్యవసాయదార్లకు ఉత్తరాలు రాస్తారు.

మత్స్య వ్యవసాయదార్లు వ్రాసిన సమస్యలకు, విస్తరణ సేవకులు వెంటనే సమాధానం ఇవ్వాలి. పూర్తి సమాచారం అందించాలి. ఉత్తరంలో భాష సరళంగా దస్తూరితో స్పష్టంగా వ్రాయాలి. చిన్న చిన్న పదాలు, చిన్న వ్యాఖ్యలతో చదవడానికి వీలుగా అనుకూలంగా ఉండాలి. క్లిష్ట పదాలు వదిలి పెట్టాలి.

(iv) సర్క్యులర్లు

చాల మంది వ్యవసాయ దార్లకు పంపే ఉత్తరం ఇది. విస్తరణ సేవకులు ఒక ఉత్తరాన్ని కాపీచేసి పంపే విధానం గురించి సమాచారం ఇవ్వవలసి వచ్చినా, క్షేత్రసమస్యలకి కాలానుగుణంగా సమాచారం అందజేయవలసి వచ్చినా ఈ పద్ధతి అనుసరిస్తారు.

విస్తరణ అధికార్లు సర్క్యులర్ నిర్వహించ వలసిన కార్యాన్ని ముందుగా నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రత్యేక అవసరాలకు, ఆశయాలకు సంబంధించి ఈ సర్క్యులర్ రూపొందాలి. కాలానికి తగినట్లు అప్పటి సమస్యలకు సంబంధించి ఉండాలి. అవసరమైతే ఈ ఉత్తరాలు ఒక వరసలో క్రమంగా విడుదల చెయ్యవచ్చును. విషయ పరిజ్ఞానం, మొత్తం సర్క్యులర్లు వాటిలో చర్చించిన విషయాలు, సరఫరా చేసిన సుమారు తేదీలు అందులో సూచించాలి. సమస్యలో సున్న తీవ్రత, దానికి సంబంధించిన సత్యాలను, విస్తరణ అధికారి బయట పెట్టాలి. పరిష్కారాలు కూడా సూచించాలి. తప్పులు దొర్లకుండా ఆకట్టుకొనే విధంగా సర్క్యులర్ను రూపొందించాలి. చెప్పే విషయాన్ని సూటిగా, సరళవాక్యాలలో బోధించాలి. వరసలో క్రమంగా విడుదల చెయ్యవచ్చును. విషయ పరిజ్ఞానం, మొత్తం సర్క్యులర్లు వాటిలో చర్చించిన విషయాలు, సరఫరా చేసిన సుమారు తేదీలు అందులో సూచించాలి. సమస్యలో సున్న తీవ్రత, దానికి సంబంధించిన సత్యాలను, విస్తరణ అధికారి బయట పెట్టాలి. పరిష్కారాలు కూడా సూచించాలి. తప్పులు దొర్లకుండా ఆకట్టుకొనే విధంగా సర్క్యులర్ను రూపొందించాలి. వచ్చే విషయాన్ని సూటిగా, సరళవాక్యాలలో బోధించాలి.

(v) టెలిఫోన్ సంభాషణలు

విస్తరణ కార్యక్రమంలో ఇది ముఖ్య విధానం కాదు. గ్రామాలలో వ్యవసాయ దార్లకు టెలిఫోన్ సదుపాయం విస్తృతంగా ఉండదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, గ్రామంలో టెలిఫోన్ సదుపాయం ఉన్న వ్యవసాయదార్లకే ఇది చాలా అనువుగా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాలలో విషయం సేవకుడు చాల క్లుప్తంగా విషయాన్ని సూటిగా చెప్పే పద్ధతిలో మాట్లాడాలి. ఇలా మాట్లాడిన తరువాత ఉత్తరం ద్వారా లేదా స్వయంగా పోయి వ్యవసాయ దారుని కలసి కాని ఇదే విషయాన్ని తిరిగి చర్చించాలి.

(vi) ఆకాశవాణి

ఆకాశవాణి అత్యంత జనాభాను చేరుకోడానికి ఉపయోగపడుతున్న సాధనం. వారు చదువుకొన్న వారు అయినా కాకపోయినా, ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే ఈ సదుపాయాల వల్ల అనేక మంది శ్రోతలకు సమాచారం తొందరగా అందజేయడమవుతుంది. ఆకాశవాణి ద్వారా సాంకేతిక విషయాల మీద కుతూహలం పెంచడమవుతుందని, వాటి మీద ఉత్సుకత రేకెత్తించవచ్చని, జాలర్లు, మత్స్య వ్యవసాయదార్లలో పీటిని అనుసరించాలనే కోరిక రేకెత్తించవచ్చని తెలిసికొన్నారు. కొద్ది విరామ కాలంలోనే మత్స్య వ్యవసాయదార్లు ఆత్మాధునికమైన మారుతున్న సాంకేతిక విలువలను సులభంగా అలవర్చుకొంటారని తెలిసింది.

ప్రస్తుతం ఆలిండియా రేడియో/ఆకాశవాణి అన్ని కేంద్రాలలోను, వ్యవసాయ విభాగాలు ఉన్నాయి. అవి గ్రామస్థులకు తగిన విధంగా పథకాలను రూపొందించి ప్రసారం చేస్తున్నారు. సుమారు అన్ని కేంద్రాలకు వీటికి తగిన విధంగా కాలం కేటాయించాయి. దేశ వ్యాప్తంగా, గ్రామీణ చర్చా సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ చర్చా సదస్సులు వారం, వారం ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాల మీద చర్చలు నిత్యం జరిపి వాటి మీద తమ అభిప్రాయాలు రేడియో కేంద్రానికి పంపుతారు. తమ సూచనలు విమర్శలు అందజేస్తారు. బీదవారు విద్యారహితులైన వారికి సమాచార ప్రాసరంలో ఇవి ఎంతగానో తోడ్పడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఎన్నో సర్వేలు నిర్వహించారు. వాటిలో ఆకాశవాణి శక్తివంతమైన ప్రసార సాధనం అని తెలింది. వ్యవసాయదారుని విజ్ఞానం పెరిగిందని, ఆ విజ్ఞాన సమాచారాన్ని అవసరమైన మేరకు నిలుపుకోగలుగుతున్నాడని తెలింది.

అందువల్ల సమాచారం అందించే ఉద్దేశ్యం ఉన్నప్పుడు, అది అత్యధిక స్థాయిలో అర్థవంతమయ్యే రీతిలో ఉండాలి. వివేచనగానే విశదం అయ్యే విధంగా ఉండాలి. సాంకేతిక పదాలు వదిలిపెట్టాలి.

డోస్ [dose] గురించి చెప్పేటప్పుడు మరొకసారి వివరాలు ఇవ్వాలి. స్థానిక భాషలో చెప్పాలి.

ఆకాశవాణి ప్రసారానికి ఉద్యమించే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి.

1. ప్రసంగకర్తకు

- (i) విషయం మీద స్పష్టమైన క్రమబద్ధమైన అవగాహన ఉండాలి.
- (ii) ముందుగా పూర్తిగా దీని గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి.
- (iii) గ్రామస్థులకు అర్థం, అవగాహన అయే విధంగా మాట్లాడగలిగి ఉండాలి.
- (iv) విశదీకరణ శక్తి బాగా ఉండాలి.
- (v) గ్రామస్థులంటే బాగా అనగా వారితో కలసి మెలసి ఉండాలి.
- (vi) పదాలు ఉచ్చరించడానికి స్పష్టమైన కంఠ ధ్వని ఉంటాలి.
- (vii) స్థానిక సంభాషణా రీతులు అవగాహన అయి ఉండాలి.
- (viii) మైక్ ద్వారా మాట్లాడడానికి బెదురు ఉండకూడదు.
- (ix) సామాన్య స్థాయిలో తొందరగా కాకుండా నెమ్మదిగా కాకుండా సమవేగంతో మాట్లాడగలగాలి.
- (x) చమత్కారధోరణి అలవర్చుకోవాలి.
- (xi) మైక్రోఫోన్ లోని లోతుపాతులు తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి.

2. ఆకాశవాణి ప్రసంగంలోని విషయం

- i) అవసరాలకు తగిన విధంగా ఉండాలి.
- ii) వింటున్న శ్రోతల మెదడులో స్పష్టంగా ఆ విషయం మీద ముద్ర పడాలి.
- iii) ప్రసంగానికి ముందు, చివర స్పష్టంగా సంగ్రహ విశేషాలుండాలి.
- iv) ఆలోచనా ప్రసంగాలు చాల మంది శ్రోతలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఉండాలి.
- v) ముఖ్యమైన అవసరమైన విషయాల మీదనే చర్చ జరగాలి.
- vi) క్లిష్ట వాక్యసముదాయాలు, కష్టమైన పదాలు దొర్లకుండా చూసుకోవాలి.
- vii) ముఖ్యమైన విషయాలను తిరిగి చెప్పాలి.
- viii) ఆర్థిక విషయాలు ముచ్చటించాలి.
- ix) ఉదాహరణలు ఇచ్చేటప్పుడు నిజ జీవితంలో శ్రోతల అనుభవాలలోనివి ఉదాహరించాలి.
- x) ముఖ్య బోధనా విషయాలను పరిమితంగా చెప్పాలి.
- xi) ముఖ్యమైన విషయాలను అబ్స్ట్రాక్ట్ విషయాలను చర్చించేటప్పుడు ఉదాహరణలివ్వాలి.

3. ముఖ్యమైన శ్రోతల ముందు ఉంచేటప్పుడు గమనించవలసిన విషయాలు

- i) ప్రసంగం చేసే సమయంలో మూల భావాలను, సూత్రాలను నొక్కి చెప్పాలి.
- ii) రిహార్సల్స్ చేసుకోడంతో బాటు సరియైన సమయంలో ప్రసంగం ఉండాలి.
- iii) చర్యనీయ పద్ధతిలో ఉండాలి
- iv) ప్రసంగం తడబాటు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోవాలి

v) మూలాడుతున్నపుడు వదాలు మింగివేయడం ఉండకూడదు.

4. ఆకాశవాణి ప్రసంగం

i) స్థానిక ప్రతికల్లో ప్రకటించబడాలి.

ii) ఒక వారం ముందుగా ఆకాశవాణి మీదుగా తేదీ ప్రకటించాలి.

iii) రీఫ్లెక్ట్ రూపంలో అచ్చువేసి చక్కగా పంచివెట్టాలి.

(vii) సినిమా

అందరికీ అందుబాటులో ఉండే బలమైన ప్రచార సాధనం సినిమా మరొకటి. ఈనాడు మన దేశంలో 9,000 సినిమా థియేటర్లున్నాయి. అందులో 7000 పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి 100 మందికి 4.5 సీట్లున్నట్లు లెక్కలు తెలుపుతున్నాయి. పల్లె ప్రాంతాల లోనివి చాలవరకు టూరింగ్ సినిమాలే వీటికి తగిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు. అవసరమైన దీతిలో సినిమా షోలు ఏర్పరచుకోవడం కష్టం.

క్షేత్ర ప్రచార విభాగము, డెవలప్ మెంట్ బ్లాక్, విద్యా సంస్థలు, సామాజిక విభాగాలు పల్లెల్లో వ్యవసాయము, మత్స్య సంపదకు సంబంధించిన సినిమాలు చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇండియన్ కవున్సిల్ ఫర్ ఆగ్రికల్చర్ రిసర్చ్, ఫిలిమ్స్ డివిజన్ తదితర సంస్థల సహకారంతో సినిమాలు తీస్తూ ఉంటుంది.

సినిమాలు తరచుగా చూపిస్తూ ఉంటే, ఈ మధ్యమాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోగలిగితే, అన్ని విషయాలు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అయితే పల్లెల్లో చూపించే సినిమాలు పాత కాలం నాటివని ప్రదర్శనలు చప్పుగా ఉంటాయని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ మధ్య ముఖ్యంగా వినోదాత్మకమైనదని, కాలం సరదాగా వెళ్ళుచున్నావని అనువుగా ఉంటుందని మర్చిపోకూడదు. అందువల్ల విషయాన్ని కూడా వినోదాత్మకంగా తెలియజేయాలి. అందులో పాత్రలు, ప్రేక్షకులకు నన్నిహితులైన వారుగా ఉండాలి. సన్నివేశాలు పరిచితమైనవిగా చూపించాలి.

(viii) ప్రదర్శనలు [ఎగ్జిబిట్లు]

ఇది కేవలం దృగ్విషయమేకాని వినిపించే విషయం కాదు. చూసి మాత్రమే దీని విషయం తెలుసుకోగలుగుతాము. వాటిలో కుతూహలాన్ని రేకెత్తించి, మంచి మంచి వద్దతులు అనుసరించాలని ప్రేక్షకులకు ఉత్సాహాన్ని పెంపొందిస్తాయి.

కొద్ది కాలంలోనే చూసే వారిని ఈ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకోవాలి విషయం త్వరలోనే అర్థం అయిపోవాలి. సరళంగా ఉండాలి. చక్కగా నేటి వివరాలు భాగాలుగా రాసి వెట్టాలి. ఒక తగు మాత్రం ఎత్తులో ఉంచాలి. ప్రదర్శనకు ముందు, తరువాత కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చెయ్యాలి. ఎంత మంది ప్రేక్షకులు వచ్చి చూసారు, వివరాలు, వివరాలు ఎంత మంది కోరారు - మొదలైన అంశాలు నేకరించి ప్రదర్శన ఎంత విజయవంతమయిందో అంచనాలు వేసుకోవాలి.

(ix) పోస్టర్లు

ఇది కూడా దృశ్య సంబంధమైన పరికరమే. అయితే దీనిని ఒక్క దానిని మరే ఇతర వాటి సహాయం లేకుండా ఉపయోగించలేము. బోధనా కార్యక్రమంలోకాని, ఇతరత్రా కాని ఇదొక అంశంగా ఉంటుంది. ప్రజల్లో ఇది కొంత ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ పోస్టరు పల్లెల్లో ఉన్నంత కాలం ఆ గ్రామస్థులకు దాని విషయం గుర్తుకు వస్తూనే ఉంటుంది.

పోస్టరు ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. స్పష్టంగా క్లుప్తంగా ఉండాలి. ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం ఏమిటో అందులో స్పష్టంగా ఉండాలి. అందులో నియమాలకు నిబంధనలకు సిఫార్సులకు స్థానం ఉండాలి. ఇక గ్రామస్థులందరికీ అత్యధిక సంఖ్యలో చూడడానికి అనువైన స్థలంలో ఉంచాలి.

(x) చార్టులు

ఒక సబ్జెక్టు మీద వివరణలతో బాటు మిగతా ఇతర సేవలలో లేదా, పోలికలు లక్షణాలు దీనిలో పొందుపరుస్తాయి. అంటే భావాలు, సత్య విషయాలు చిత్రీకరించిన అవకాశం ఈ చార్టు. వీటిని బోధనా సందర్భంగా కాని ఒక ఉద్యమ సందర్భంగా కాని వాడవచ్చును. చార్టులలో రకాలున్నాయి. పుల్ చార్టులు, స్క్రిప్ టీక్ చార్టులు, ఫ్లో చార్టులు, బార్ చార్టులు, వైచార్టులు, లైన్ చార్టులు, పిక్చరియల్ గ్రాఫ్లు మొదలైనవి.

(xi) స్లైడ్లు

ఇదొక దృశ్యసదుపాయము. పారదర్శకమైన బొమ్మని విద్యుత్కాంతి సహాయంతో ప్రాజెక్ట్ చేయగలుగుతాము. చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వీటిని తయారు చేయగలుగుతాము. ఈ మొత్తం పరికర సముదాయం లేదా గా ఉంటుంది. సులభంగా లేవకొని పోగలుగుతాము. ప్రతి స్లైడ్ను ఎంతకాలం అయినా ఉంచుకోగలుగుతాము. ఈ పటాలను అనేక కోణాల నుంచి తీసి చూపడం వల్ల వ్యవసాయదారులకు విషయం సులభంగా అర్థం అయిపోతుంది.

(xii) నమూనాలు, మోడల్లు

నమూనా అంటే స్పెసిమెన్ అని చెప్పాలి. అంటే నిజమైన జీవరాసుల్ని శాశ్వతంగా ప్రజెర్వ్ చేసిన ఒక పతక మీద నిలబెట్టి లేదా ఇతర విధంగా దానిని అందరికీ చక్కగా కనబడే విధంగా చెయ్యడం. మోడల్ అంటే అసలైన దానికి నకలు అన్నమాట. వీటిని ప్రదర్శించడం లేదా బోధనా కార్యక్రమాలు, ఉద్యమాలలో వినియోగించడం జరుగుతుంది. వ్యవసాయదార్లకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. ఇవి స్పష్టంగా అన్ని విషయాలను విశదీకరిస్తాయి.

(xiii) దూరదర్శన్

దూరదర్శని ఒక శక్తివంతమైన ప్రచార సాధనము బహుళ ప్రజానికానికి సమాచారం చేరడమేకాక దీనిలో ఆకాశవాణి, పత్రికా సాధనము, సినిమా ప్రయోజనము మూడు కలిగి పనిచేస్తాయి. చూసిన వారి భావాల్లోనూ, ఆలోచనల్లోనూ మంచి స్ఫూర్తి ప్రచారంతోబాటు వినోదము, విద్యమేళవిస్తాయి. ఇది ప్రపంచ దృశ్య సాధనంగా బట్టి వ్యక్తుల మీద ఒకేసారి శ్రోత ప్రేక్షక ప్రభావంపడి ఎన్నటికీ మరచిపోలేని విధంగా అభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు చాలా వాటిలో దీనిని సరాసరి విద్యార్థులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. సంప్రదాయ విద్య (ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్) సందర్భంగా అదనపు సదుపాయానికి, సైకోమోట్ నిపుణత పెంపొందించడానికి, నియోజనవిద్యకు, ఆవిద్యను పార్లద్రోలడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. మత్స్య విస్తరణ కార్యక్రమంలో దీనిని మన దేశంలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

దూరదర్శన్ వ్రాసుకొనే ప్రసంగం, ఆకాశవాణి, వార్తా పత్రికలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని సంబంధంగా చూపించే బొమ్మలకి, చెప్పే విషయాలకి చక్కని పొందిక కుదరాలి. ఇది ఏ విధంగా పటిష్టంగా చూపించ గలుగుతామో రూపొందించుకో గలుగుతామో చూడాలి. ఈ క్రింది విషయాలు ఈ సందర్భంగా పాటించాలి.

- i) విషయ సందర్భంగా ఎక్కడా అస్పష్టత గోచరించకూడదు. ఖచ్చితంగా ఉండడమేకాక ప్రేక్షకుల దృష్ట్యా అవసరాను గుణ్యంగా ఉండాలి.
- ii) ముఖ్య విషయాలను నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ విషయానికి ఆధారంగా చెప్పే సంగతులను క్రోడీకరించుకోవాలి.
- iii) రిసోర్స్ మెటీరియల్ను కాని, రిసోర్స్ పర్సన్ను కాని సంప్రదించి, కొత్త విషయాలు అవసరమైతే తెలుసుకోవాలి.
- iv) ఒక పద్ధతి రూపొందించుకోవాలి. ఎలా చెప్పదలచుకోవాలో నిర్ణయించుకోవాలి. ఇది డిమా

నాన్వేషన్ కావచ్చు, పటాలతో కూడిన రిపోర్టు కావచ్చు, లేదా డ్రమటిక్ ప్రజెంటేషన్ కావచ్చు లేదా ఒక ఇంటర్వ్యూకావచ్చు, ఫోరమ్ కావచ్చు, లేదా కొన్ని ఇలాంటివి కలిసి ఒక కార్యక్రమం రూపొందించవచ్చు.

v) ఇతరులెవరైనా చర్చలో పాల్గొన వలసిన అవసరం ఉండేమో నిర్ణయించుకొని అలాంటి వారిని ముందుగా సంప్రదించాలి. (వ్యవసాయదారులు, గృహిణులు, బాలురు, బాలికలు, నిపుణులు మొదలైనవారు).

vi) చెప్పి వలసిన అంశాలను బాగా విశద పరచే దృశ్య పరికరాలను ముందుగా నిర్ణయించుకోవాలి. అలాటి వాటిని పట్టిక రూపంలో రాసుకోవాలి.

vii) ప్రోగ్రాం ఒక సూచన ప్రాయంగా రాసుకోవాలి. ఒక కౌగితం తీసుకొని దానిలో మూడు కాలమ్లు రాసుకోవాలి. మొదటి దానిని కాలవిభాగం అంటారు. ఒక్కొక్క 'షాట్'కు ఎంత కాలం పడుతుందో దీనిలో రాసుకోవాలి. రెండవ కాలంలో చూపించవలసిన అంశాలను గుర్తించుకోవాలి. అందులోనే 'సీన్' ప్రత్యేకతలను గుర్తించుకోవాలి. మూడవ కాలమ్లో సంభాషణలు కాని వ్యాఖ్యానాలు కాని ఉంటాయి. చెప్పవలసిన అంశాలు అందులో పొందు పరచుకోవాలి. దీనినే శ్రవణ కాలమ్ అంటారు. కౌగితం మీద చూపవలసిన పస్తువులు వాటి కెదురుగా చెప్పవలసిన అంశాలు రాసిపెట్టుకోవాలి.

ఒక ప్రోగ్రాం నుంచి మరొక ప్రోగ్రాంలోకి దాటవేసేటప్పుడు ఒక ప్రత్యేక అవసరం కనబడుతుంది. దీనినే బ్రాంసింగ్ అంటారు. దీనిని దృశ్యరూపకంగా కాని, నోటి ద్వారాకాని రెండు విధాలుగా కాని చెయ్యవచ్చు. అన్ని అంశాలను ఈ పద్ధతిలో కలిసి కట్టుగా రూపొందించవచ్చు. ప్రోగ్రాం మొత్తం మెరుగు పట్టినట్లువుతుంది. మొత్తం కార్యక్రమం అంతా సాఫీగా సాగిపోతుంది. బ్రాంసింగ్ లను స్పెక్టిక్లర్ లో ఆయా ప్రాంతాలలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రారంభం, ముగింపులను రాసి పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఏం చూట్టాడో కూడా రాసుకోవాలి.

viii) ప్రోగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ సలహాల సమసరించి స్క్రిప్ట్ ఆవుట్ లైన్ లో మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అతనికి దీని కాపీ ఇవ్వాలి. అలాగే పాల్గొనే వారికు కూడా ఇవ్వవచ్చు. ఇది కనీసం ప్రోగ్రాం దూరదర్శన్ లో ప్రదర్శనకు ఒక వారం ముందుగా చెయ్యాలి.

ix) ఏదైనా ప్రచురణ సమయంలో అందరికీ పంచి పెట్టవలసిన అవసరం ఉండే తగినన్ని కాపీలు ఉంచుకోవాలి.

x) దృశ్య సాధనాలు, పరికరాలు, సామగ్రి తదితరమైనవి అన్నీ వాటిని ఉపయోగించుకొనే క్రమంలో అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. మరొకసారి చూసుకోడంమంచిది.

xi) ఇంటి దగ్గర కాని, ఆఫీస్ లో కాని ఇతర అనువైన ప్రాంతంలో ముందుగా రిహార్సల్స్ చేసుకోడం మంచిది. మొత్తం ప్రోగ్రాంకు పట్టేకాలం, ప్రతిముఖ్య అంశానికి కావలసిన కాలం సరిచేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొంత తీసివేయడం లేదా కొంత అదనంగా చేర్చడం జరపాలి. ఆ విధంగా సమయం సరిదిద్దుకోవాలి. కేంద్రంలో జరిపినట్లుగానే భావించుకొని రిహార్సల్ జరపాలి.

xii) రావలసిన సమయానికి బాగా ముందుగానే దూరదర్శన్ కేంద్రానికి రావాలి. పాల్గొనే వారికి ప్రోగ్రాం గురించి పరిచయం చేయాలి. దూరదర్శన్ పరికరాలు, సెట్ అలవాటు చెయ్యాలి. ముందు కెమెరాలు లేకుండా చేసి, తరవాత అవకాశం ఉన్నంత వరకు కెమెరాలతోనే రిహార్సల్స్ చెయ్యాలి.

xiii) ప్రోగ్రాం 'టెలికాస్ట్' అవుతున్న సమయంలో విషయం మీద దృష్టిని నిలపాలి. కెమెరాలో ఎలా చూస్తున్నామో, చూడడం లేదో అనే విషయాలు మనసులో అనుకోకూడదు. ఇదంతా

రిహార్స్ లోనే ముందుగా జాగ్రత్త పడాలి. మీ ముందున్న శ్రోతలందరూ ఒకే వ్యక్తిగా భావించుకోవాలి. కాని వందలు వేలు సంఖ్యగా భావించుకోకూడదు. అంతా సామాన్య దృష్టితో భావించుకొన్నట్లు పార్కులోగా ప్రవర్తించాలి.

టాల్ కలెన్ లో ఉన్న విధంగానే ప్రోగ్రాం సాగనివ్వాలి. ప్రోగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ ఆశించిన విధంగానే ఉండాలి. ప్రోగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ ను, సాంకేతిక నిపుణులను పూర్తిగా నమ్మి అంతా వారిచేతిలో పెట్టి ఎంత మంచి ప్రోగ్రాం వలెయితే అంత మంచిది వచ్చేదిగా చూసుకోవాలి.

విదయనా మర్చివట్టు, పారపాట అయివట్టు అయితే దాని గురించి పట్టించుకోకుండా ప్రోగ్రాం అనుకొన్నట్లు జరగనివ్వాలి.

20.5 విస్తరణ కార్యక్రమం

లెగాన్ ఇలా అన్నాడు : విస్తరణ కార్యక్రమంలో కొన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించిన మనః పూర్వకంగా రూపొందించిన విద్యావిషయక ఉద్దేశాలుంటాయి. ఈ ఉద్దేశాలు ఒకానొక వరిస్థితిని తగినంతగా విశ్లేషణ చేసినందువల్ల సాధించగలుగుతాము.

ఇదొకబూపింట్ మాదిరిగా పని చేస్తుంది, విస్తరణ సేవకునికి మార్గదర్శకంగా పని చేస్తుంది. ఆ విధంగా విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించ గలుగుతాడు. చక్కగా కార్యక్రమం విస్తరణ సేవకునికి (నావికునికి కంపాస్ మాదిరిగా) తోడ్పడుతుంది.

విస్తరణ కార్యక్రమ ప్రణాళిక అవసరం

విస్తరణ కార్యక్రమం విజయవంత మవాలంటే ముందుగా ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలి. విస్తరణ కార్యక్రమ ప్రణాళిక ముఖ్యవిధులు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

1. విస్తరణ కార్యక్రమ కార్యక్రమ సాఫల్యానికి తాను నిర్వహించ వలసిన పని ఏమిటో తెలుసుకోగలుగుతాము.
2. ఇదొక మార్గ దర్శకంగా పనిచేసి దీనికి సంబంధించిన వారం సరియైన పంథాలో పనిచేసే విధంగా సహాయపడుతుంది.
3. ఒకానొక విస్తరణ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలేమిటో వాటిని రూపొందించడానికి సహాయపడుతుంది.
4. జరిగిన కార్యక్రమాన్ని పరిగ్గా అంచనా వెయ్యడానికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది.
5. ముందుగానే కార్యక్రమం నిర్ణయించ బడింది కాబట్టి విస్తరణ కార్యక్రమ మారినా కార్యక్రమ నిర్వహణలో మార్పురారు.
6. దీని వల్ల కార్యక్రమ నిర్వాహకుల నుంచి నాయకులు తయారు కావడానికి అవకాశం ఉంది.
7. సామాన్య సామర్థ్యం పెంపొందించడానికి తోడ్పడుతుంది.
8. దీనివల్ల కాలం వృధాకాకుండా, శక్తి ధనం వ్యర్థం కాకుండా నిరోధించడమవుతుంది.
9. గ్రామాభ్యుదయానికి సంబంధించి కార్యక్రమాలను సమీకృతం చెయ్యడం వీలవుతుంది.
10. స్థానిక ప్రజల నుండి మంచి సహకారం ఆధారం లభ్యం అవుతాయి.
11. ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేయడానికి సహాయం దొరుకుతుంది.
12. సామాన్య ప్రజానీకానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఒక వ్రాత పత్రం మాదిరిగా వారికి అందజేయవచ్చు.

విస్తరణ కార్యక్రమ ప్రణాళిక నూత్రాలు

విస్తరణ కార్యక్రమ ప్రణాళిక రూపొందించుకొనే ముందు ఈ క్రింది నూత్రాలు పాటించాలి :

1. విస్తరణ కార్యక్రమాలను తయారు చేసుకోవడం, అమలు పెట్టడంలో, వాటి విజయాన్ని అంచనాలు వేసుకోడంలోనూ వేరు వేరు ప్రాతిపదికలు అనుసరించాలి.
2. గ్రామీణ మత్స్యకారులను వారి సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని భృత్యబంధమైన వివరాలను సేకరించి, విశ్లేషించి అంచనాలు కట్టాలి.
3. వ్యవసాయ దార్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉద్దేశాలను నిర్ణయించుకోవాలి.
4. వ్యవసాయదార్ల అవసరాలను తీర్చడంలోకాని, ఉద్దేశ్యాలను చేరుకోవడంలోకాని కనబడే అడ్డంకులు సమస్యల వివరాలు
5. వాటికి పరిష్కారం కనుకోవడం.
6. అందులో ముఖ్యమైన వాటిని గుర్తించి ఆయా అవసరాలను బట్టి సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి.
7. ప్రత్యేక సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకోవాలి.
8. వ్యక్తిపరంగా కాని, సమూహపరంగా కాని వారికి బాధ్యతలను అప్పగించడం.
9. విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని పదకం ప్రకారం, ఒక్కొక్క మెట్టు, చక్కని సమన్వయరీతిలో నిర్వహించుకోవడం.
10. విస్తరణ కార్యక్రమం సక్రమంగా నిర్వహించబడు తోందో లేదో సరిచూడడం.
11. అనుకూలమైన సాధించామో లేదో సమీక్షించు కోడం అవసరమైతే కార్యక్రమాన్ని మరింత కాలం పొడిగించడం.

1. కార్యక్రమ ప్రణాళికలోని ఘట్టాలు

ఈ ఘట్టాలు a) పరిస్థితి విశ్లేషణ, సమన్వయనిర్ణయం b) అక్షయనిర్ణయం c) విద్య d) కార్యక్రమ నిర్వహణను అంచనా కట్టడం, e) పునః పరిశీలన

2. సేకరణ, విశ్లేషణ, అంచనాలు వెయ్యడం

విస్తరణ కార్యక్రమం నిర్వహణ తగినన్ని సక్రమమైన వివరాలను సేకరించడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వాటిని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషణపరచి అర్థ విశ్లేషణ చెయ్యాలి. గ్రామం లేదా బ్లాక్ లోని చేప కుంటలు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఆ క్షేత్రంలో ఏవి రకాల చేపలు, రొయ్యలు వృద్ధి చేస్తున్నారు. దీనికి ఏవి పద్ధతులు అనుసరిస్తున్నారు. ఏవి పద్ధతుల్లో వాటి అభివృద్ధి లేట్ పెంచగలిగామో విస్తరణ కార్యక్రమ క్షుణ్ణంగా తెలిసే ఉండాలి.

మత్స్య సంవర్ధన కృషిలో చేపలు, రొయ్యలు ఏ విధంగా సంవర్ధనకు గురిఅవుతాయో, ఏ పద్ధతులు అనుసరిస్తారో, క్షేత్ర నిర్వహణ ఏ విధంగా జరుగుతుందో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. చేపలు, రొయ్యలు అభివృద్ధికి ఏ కారకాలు కారణమవుతాయో గ్రహించుకు రావాలి. ఏ ప్రాంతంలో అయినా అర్థవంతంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటే విస్తరణ కార్యక్రమ, గ్రామసేవికులు, బ్లాక్ డెవలప్ మెంట్ ఆఫీసర్లు, వీటికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని, అంకెల వివరాలు తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే సరియైన కార్యక్రమ ప్రణాళిక తయారవుతుంది.

A. గ్రామానికి సంబంధించి సామాన్య సమాచారం :

1. గ్రామం మొత్తం జనాభా
2. మొత్తం కుటుంబాలు

సాధించడానికి చెయ్యవలసిన కార్యక్రమాలను ఒక వట్టిక రూపంలో తయారుచేసుకోవాలి. విస్తరణ అధికార్థ సహాయంతో గ్రామ పంచాయతీలు మండలాలు కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోవాలి.

8. బాధ్యతలను అప్పగించడం

విస్తరణ కార్యక్రమ పథకంలోని బాధ్యతలను వ్యక్తులకు, కొన్ని సంఘాలు లేదా కొంత మంది వ్యక్తుల సమూహాలకు అప్పగించాలి. ఈ విషయంగా విస్తరణ అధికారి చొరవతీసికోవాలి. ఆయా పనిని బట్టి, వ్యక్తుల పూర్వ అనుభవాన్ని సామర్థ్యాన్ని బట్టి పనులను తగిన వారికి అప్పగించాలి.

9. కార్యక్రమాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం

ప్రతి అంశాన్ని ఒక్కొక్క మెట్టు క్రమంగా ముందుకు తీసికొని పోతూ యావత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి. ఇందులో విస్తరణ కార్యకర్తలు, VLWలు, స్థానిక సంస్థలు బ్లాక్ డెవలప్ మెంట్ అధికార్థ పంచాయతీ సమితులు పాల్గొనాలి. ఇక ఎరువులు, కలుపు మొక్కల సంహారక మందులు, క్రిమి సంహారక మందులు, చేపరొయ్య విత్తనాలు, అదనపు ఆహార సదుపాయాలు, వలలు, దృశ్య శ్రవణ పరికరాలు, లిటరేచర్ అందించడానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి. విస్తరణ కార్యక్రమం ఆచరణలోకి పెట్టబోయే ముందు, శిక్షణ శిబిరం నిర్వహించవలసి వస్తుంది. ముందుగా స్థానిక నాయకులను, మత్స్య వ్యవసాయదారులను సంప్రదించిన తర్వాత ఆచరణ అమలులో పెట్టాలి.

10. కార్యక్రమ ఆచరణ అమలులోని క్రియాశీలతను సరి చూడడం

ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో జరిగే ప్రతి అంశానికి సంబంధించి తగిన రికార్డులురాసి పెట్టుకొని ఉండాలి. ప్రతి సమగ్రమైన ప్రణాళికకు ఇది అవసరం. భావిలో కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోడానికి ఇది ఆధారంగా ఉంటుంది. కార్యక్రమ సాఫల్యతను అంచనాలు వేసుకోవచ్చును. ఎంతవరకు మన ఆశయాలు సాధించగలుగ్తామో తెలుసుకోడానికి ఇలాంటి అంచనాలు వేసుకోవాలి. దీని వల్ల విస్తరణ కార్యక్రమం ఎంత సమర్థవంతంగా నడిచిందో తెలుస్తుంది. ఏమైనా మార్పులు చేయవలసి వస్తే దీని వల్ల విస్తరణ కార్యక్రమం ఎంత సమర్థవంతంగా నడిచిందో తెలుస్తుంది. ఏమైనా మార్పులు చేయవలసి వస్తే దీనివల్ల తేలిపోతుంది. అక్కడివెజల అవసరాలు ఏమిటో కూడా దీనివల్ల గ్రహింపుకు వస్తాయి.

11. అభివృద్ధి సమీక్ష

మత్స్య వ్యవసాయదారుల సామూహిక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో తేడాలుంటాయి. అందువల్ల కార్యక్రమంలోని ప్రతి మెట్టాన్ని సమీక్షించాలి. బ్లాక్లు, సహకార సంస్థలు, పంచాయతీ సమితులు వంటి సంస్థలు ఈ కార్యక్రమ పురోభివృద్ధిని సమీక్షించాలి. ఒక గ్రామంలో ఒక కార్యక్రమం విజయవంతమైతే దానిని వక్క గ్రామానికి విస్తరింపజేయాలి. అయితే ఆ గ్రామంలోని అవసరాలు స్థితిగతులు కూడా గమనించాలి. వ్యవసాయదారులు కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలను తీరస్కరించవచ్చు. వీటికి గల కారణాలను తెలుసుకొని వాటిని కూడా సమీక్షించాలి.

స్వపరిశీలన

1. డింగి నౌకను గురించి వ్రాయుము.

20.6 సారాంశం

చేపల పరిశ్రమాభివృద్ధికై విస్తరణ పథకములు, విధానములను గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. ఈ విధానమువల్ల చేపల ఉత్పత్తికై తీసుకోవలసిన మెళుకువలు తెలుసుకోవచ్చును. మత్స్య పరిశ్రమ అభివృద్ధికై అనేక మంది సిబ్బంది అనేక నిర్ణయములను వివరించెదరు. వీరి నిర్ణయములలో ముఖ్యమైనవి పల్లె ప్రజలతో సామూహిక సభలు, సమావేశములు, వార్తాపత్రికల ద్వారా చేపల పరిశ్రమాభివృద్ధి దాని

ఉపయోగములు వివరించుట. ఆకాశవాణి దూరదర్శనముల ద్వారా ప్రజలకు ఈ చేపల పెంపకమువల్ల లాభములను గురించి తెలియజేయుటలను గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది.

20.7 వ్యవహార - జవాబులు

డింగి, నాక :

ఒరిస్సా, వశిష్ట బెంగాల్ కు చెందిన కార్వెల్ నావలు. ఇవి చక్కగా రూపొందించబడిన నౌకలు. వీటి పరిమాణము 13 మీ X 3 మీ X 2 మీ పరకు ఉండి చాలా విశాలంగా ఉంటాయి. వీటిని చేపలు పట్టడంలో సహా అనేక ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు.

20.8 మాదిరి - పరీక్షా ప్రశ్నలు

I. ఈ క్రింది ప్రతిప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. దేశంలో మత్స్య సంవర్ధనకు లభించే ప్రోత్సాహం గురించి వ్రాయుము. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య చర్యలేవి తీసికొంటున్నామో తెలుపుము.
2. మత్స్య విస్తరణ కార్యకర్తల విధులను పేర్కొనుము.
3. 'వ్యక్తిగత భేటీలు' పద్ధతి గురించి వ్రాయుము.
4. సామూహిక భేటీలు అననేమో తెలుపునది సామూహిక భేటీ సందర్భంగా పాల్గొనవలసిన సూత్రాలను వర్ణించుము.
5. డిమాన్ స్ట్రేషన్ ప్రదర్శనలతోని ఉత్సాహము ఏమిటి? విస్తరణ కార్యక్రమంలో 'డిమాన్ స్ట్రేషన్' లో గమనించవలసిన సూత్రాలను తెలుపుము.
6. "సామూహిక చర్యలు" అంటే ఏమిటో వ్రాయుము. మత్స్య సంవర్ధన కార్యక్రమంలో ఈ ప్రత్యక్ష పద్ధతి ప్రాధాన్యత చర్చించుము.
7. ఆకాశవాణి ప్రసంగాలు మత్స్య విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తోంది? ఆకాశవాణి ప్రసంగాలు రూపొందించుకోవడంలో ఆచరించవలసిన సూత్రాలేవి?
8. దూరదర్శన్ ఎంతవరకు మత్స్య విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించగలుగుతుంది.? దూరదర్శన్ పాత్ర ఈ సందర్భంగా ఎలా ఉంటుందో చర్చించండి.
9. విస్తరణ కార్యక్రమ ప్రణాళిక యొక్క విధులు, సూత్రాలు తెలుపునది.
10. సేకరణ విశ్లేషణ, అంచనాల గురించి విస్తరణ కార్యక్రమ సందర్భంగా తెలుపునది.

II. ఈ క్రింది ప్రతిప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం వ్రాయండి.

1. మత్స్యవీరశ్రమ విస్తరణలోని ప్రాథమిక అవసరాలు.
2. వివిధ విస్తరణ పద్ధతులు.
3. వార్తా వ్యాసాంగాలు.
4. సినిమాలు.
5. బుర్రెట్స్, లీఫ్ లెట్స్ మొ.

20.9 పదకోశము

ఆక్సిడ్	:	చేదు
ఎరోబిక్	:	జీవుక్రియలకు స్వేచ్ఛా ఆక్సిజన్ గ్రహించడం.
ఆల్బల్ బ్యూమ్	:	శైవల గుచ్చం - తేలియాడే (వైవక) శైవలాలు సమృద్ధిగా నీటి తలంమీద ఏర్పడి పచ్చగా కనిపించడం.
ఆల్గినైడ్	:	శైవల సంహారక పదార్థము
అల్గాలైసిటి	:	క్షౌత-7 కంటే పెచ్చు. పి. హెచ్ కలగడం. ప్లాప్లాక్స్ అయాన్ల సంఖ్య
అనేరోబిక్	:	వాయురహిత శ్వాసక్రియ
ఏనయాన్	:	రుణ విద్యుత్ కలిగిన అయాన్లు
అప్టిబాడేస్	:	ప్రతి రక్తకాలు-ప్రోటీన్ అణువులు రక్తంలోఉండి బాక్టీరియాను ఎదుర్కొంటాయి.
ఎపథి	:	నిర్లక్ష్యము
ఆటోక్టోనస్	:	లోపలి కారకాల కారణం
బాక్ వాటర్స్	:	ఉప్పుటేరు, సముద్రం నుండి లోతట్టు తీర ప్రాంతాలకు అలలవల్ల చేరే ఉప్పునీటి ప్రాంతం.
బెర్మి	:	కుంటగట్టు మీది భాగం. పునాది మధ్యన ఉండే గణాత్మకంగా ఉండే ఇంతు వృక్ష సమూహం.
బ్రాక్ష్మెవాటర్	:	ఉష్ణకయ్య, మంచినీరు, ఉప్పునీరు మిశ్రమం 30/1000 కంటే తక్కువ ఉష్ణదనం.
బ్రూడ్ ఫిష్	:	లైంగిక పరిపక్వతకు చేరిన చేప (చేపల పారమలలో)
కారాపేస్	:	పుష్క వలకం - శిరోవృక్షం మీది బాహ్య అస్థిపంజరం.
కారియింగ్	:	బాళశక్తి- ఒక నిర్దిత పరిమాణం చేపలను (గరిష్ట) ఆదుకునే నీటి ప్రాంతం శక్తి
కేటయాన్	:	ధన విద్యుత్ అయాన్
డెబిలిటి	:	బలహీనత
డికార్బోనికేషన్	:	కార్బియమ్ కార్బోనేట్ అవక్షేపం, $CaCO_3$ నీటిలోని CO_2 పీడనం మధ్య మొక్కలు CO_2 పీల్చుకొన్నందువల్ల కలిగే చర్య
డికార్బాక్సిలేషన్	:	కార్బాక్సిల్ అమ్లం క్షయం చెందడం. ఇందువల్ల CO_2 తో కొత్త సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి.
డిమెర్సల్	:	అడుగు మీద-చేప గుడ్లు అడుగుకు మునిగి పాడగడం.
డమోర్సల్	:	దివాచరి - రాత్రింబవళ్ళకు సంబంధించిన
డ్రాట్	:	1. చేపలు పట్టుబడినవి - అట్టి వలను లాగడం 2. పడవను తేల్చడానికి తగిన నీటి తోతు
డ్రైప్	:	చేపలను శీతలీకరించేటప్పుడు కారే కణజాల ద్రవ్యం

16. ఒక మట్టం పూర్తి అయ్యాక కొన్ని ప్రశ్నలడిగి వారు ఆ పద్ధతిలోని విషయాలు అవగాహన చేసుకొన్నారో లేదో తెలుసుకోవాలి.
17. డిమాన్ స్ట్రెషన్ పూర్తి అయ్యాక కొంత మంది మత్స్య వ్యవసాయ ధారులని, మిగతావారి సమక్షంలో అదే డిమాన్ స్ట్రెషన్ చర్యను చెయ్యనియ్యాలి.
18. డిమాన్ స్ట్రెషన్ చర్యసంతా క్లుప్తీకరించి ఆ పద్ధతిలో ఉన్న మెళకువలు, జాగ్రత్తలు వారికి నచ్చు చెప్పాలి.
19. వారివారి క్షేత్రాలలో ఈ పద్ధతిని అనుసరించడానికి ముందుకు వచ్చిన వారి పేర్లను సమోదా చేసుకోవాలి.
20. ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్ వ్రతీకా రూపంలో ఈ డిమాన్ స్ట్రెషన్ గురించి విస్తృత ప్రచారం జరిగే విధంగా చూసుకోవాలి.
21. ఆ గ్రామానికి తిరిగి కొంతకాలం పోయ్యాక వెళ్ళి ఈ డిమాన్ స్ట్రెషన్ ఫలితంగా ఎంతమంది వ్యవసాయదార్లు ఈ కొత్త పద్ధతి అనుసరిస్తున్నారో గమనించాలి

(iv) సామూహిక చర్యలు

ఈ సామూహిక చర్యలు ఒకనాయకుడు ఉండగా జరగవచ్చు. నాయకుడుగా వ్యవహరించే వ్యక్తి లేకపోయినా జరపవచ్చును. ఇద్దరు లేదా అంత కన్న అధిక సంఖ్యలో వ్యక్తుల మధ్య ఒకే సమస్య మీద జరిగే చర్యకు సామూహిక చర్య అంటారు.

సామూహిక చర్యలోని ముఖ్యోద్దేశాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

1. ఒకే ఒక సమస్య మీద సమాచారం, ఉద్దేశం, అభిప్రాయాల పరస్పర మార్పిడి.
2. ఒకానొక సమస్యకు సంబంధించి పరిష్కారం (సమాధానం) తెలుసుకోవడం.
3. పాత లేదా కొత్త పద్ధతి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడం.
4. ఇతర మత్స్య వ్యవసాయదార్లకు ఉత్సుకత కలిగించడం (మాటివేట్)
5. ఈ చర్యకు సంబంధించి ఒక పోగ్రాంకు పథకం వేసుకోవడం.

అనుసరించదగిన సూత్రాలు

సామూహిక చర్యలు రూపొందించుకోవడంలో ఈ అంశాలు పాటించాలి.

1. ఒకానొక సామూహికంగా చర్చించవలసిన అవసరం ఉందా లేదా అని ముందు నిర్ణయించుకోవాలి.
2. చర్చించవలసిన సమస్యనే ముందుగానే గుర్తించుకోవడం.
3. ముందుగానే స్థలం, కాల, తేదీ నిర్ణయాలు జరపుకోవాలి.
4. జరగవలసిన సామూహిక చర్య గురించి ముందుగా ప్రచారం చేసుకోవాలి.
5. స్థానిక వ్యక్తిని ఒకరిని సమూహానికి నాయకునిగా చెయ్యాలి.
6. కొత్త వాళ్ళయితే సభ్యులకు నాయకున్ని పరిచయం చెయ్యాలి.
7. సమస్య వివరించి, చర్చించవలసిన అవసరం గుర్తు చెయ్యాలి.
8. అనవసరంగా ఉద్దేశాలకు లోను కావద్దని సభికులను కోరాలి.
9. సభ్యులు ఒకరి తరువాత ఒకరు మాట్లాడాకాని దీర్ఘ ఉపన్యాసాలు చెయ్యవద్దనాలి. క్లుప్తంగా విషయం గురించి చెప్పాలని కోరాలి.

(iii) డిమాన్ ష్ట్రేషన్ [ప్రదర్శన]

మత్స్య వ్యవసాయదార్లు లేదా పని వారి సమక్షంలో ప్రత్యక్షంగా ప్రయోగాలు జరిపి, పాత పద్ధతులని కాని, కొత్త పద్ధతులని కాని జ్ఞేత్రంలో కాని, ప్రయోగశాలలో కాని కచ్చారా చూపించడం ఈ పద్ధతిలోని అంతర్యం. స్థానికంగా కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరించవచ్చని అక్కడి వ్యవసాయదార్లకు నమ్మకం కలిగించడం ఇందులో ఉద్దేశ్యం. దీనిని నిర్వహించడానికి విస్తరణ కార్యకర్త ముందుకు రావచ్చు. లేదా శిక్షణ పొందిన ఇతర వ్యక్తచేత ఇప్పించవచ్చు.

దీనిలో ఉద్దేశాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

1. మత్స్య వ్యవసాయదార్లు కొత్త పద్ధతులను అలవర్చుకొంటారు.
2. పురాతన, సాంప్రదాయక పద్ధతులకు బదులు కొత్త విధానాలు అమలులోకి పెడతారు.
3. లోపాలతో కూడిన పద్ధతులు అనుసరించడానికి బదులు కొత్త సమర్థవంతమైన పద్ధతులు అందు బాటులోకి వస్తాయి.
4. కాలపారణం లేక, వ్యక్తి వృధా కాకుండా, చికాకు లేని విధంగా పనులు నిర్వహించగలిగితే వ్యవసాయదారులకి సంతృప్తి కలుగుతుంది.
5. స్థానికంగా ఈ పద్ధతులు అనుసరించవచ్చని, వారందరికీ నమ్మకం, ధైర్యం కుదురుతుంది.


అనుసరించదగిన సూత్రాలు

1. ఈ పద్ధతికి డిమాన్ ష్ట్రేషన్ అవసరం అవుతుందేమో నిర్ణయించుకోవాలి. దానిలో కొన్ని సాంకేతిక విషయాలు ఉంటాయి.
2. ముందుగానే మొత్తం ప్రోగ్రాం అంతా రూపొందించుకోవాలి.
3. పరికరాలు, సామగ్రి అంతా డిమాన్ ష్ట్రేషన్ కు తగిన విధంగా పని చేసే తీరులో ఉన్నట్లు ముందుగా చూసుకోవాలి.
4. అదే విధంగా ముందుగానే తేదీ సమయం, స్థలం నిర్ణయించుకోవాలి.
5. వీలయినంత వరకు ఈ డిమాన్ ష్ట్రేషన్, స్థానిక మత్స్య జ్ఞేత్రంలో జరిగేట్లు చూసుకోవాలి.
6. అందరు మత్స్య వ్యవసాయ దార్లకు సమావేశ డిమాన్ ష్ట్రేషన్ వివరాలు గురించి మంచి ప్రచారం ముందుగా ఇవ్వాలి.
7. ఒక రోజుముందుగా ఆక్షేత్రానికి పోయి అవసరమైన పరిస్థితులు పరికరాలు సమకూరి ఉన్నాయోలేదో ధ్రువపరచుకోవాలి.
8. వీలయితే ఒక రిహార్సల్ జరుపుకోడం మంచిది.
9. స్థలానికి ముందుగానే వచ్చి అన్నిసరి చూసుకోవాలి.
10. అక్కడికి చేరిన వారందరికీ డిమాన్ ష్ట్రేషన్ సరిగ్గా కనబడే పద్ధతిలో ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకోవాలి.
11. ఆసలు డిమాన్ ష్ట్రేషన్ ప్రారంభించడానికి ముందుగా, ఆ పద్ధతి, టెక్నిక్ గురించి ఒకసారి వివరణ ఇవ్వాలి.
12. వారు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులు ఎలాగ ఉన్నాయో తెలుసుకోడానికి వారిని కొన్ని ప్రశ్నలడగాలి.
13. పరికరాలు, సామగ్రి వివరాలు వారికి తెలియజేసే డిమాన్ ష్ట్రేషన్ లో అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయో వారికి వివరించాలి.
14. టెక్నిక్ ప్రదర్శనలో నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వెళ్ళాలి. అవసరమైతే ప్రతి చర్య తిరిగి చెయ్యాలి.
15. మీరు చేసే చర్య వారికి అర్థం కావడానికి మీరు చెప్పే విషయాలు సులభగ్రాన్యంగా ఉండే విధంగా సరళ భాషలో అందివ్వాలి.

3. జాగ్రత్తగా వృత్తిరీత్యా చేపలను వట్టి వారి సంఖ్య
4. మత్స్య సేకరణలో నిమగ్నమయిన కుటుంబాల సంఖ్య
5. గ్రామంలోని ఇతర ముఖ్య వృత్తులు
6. రవాణా సౌకర్యాలు - ఎంతవరకు లభ్యం అవుతాయి.
7. విద్యాబోధనా సదుపాయాలు
8. వైద్య, ప్రజారోగ్య సదుపాయాలు
9. మంచినీటి సదుపాయాలు
10. ఆహార అలవాట్లు పోషకాస్త్రాయి మొదలగునవి.


B. జ్వేత్రనిర్వహణ, ఉత్పత్తి కార్యక్రమాల వివరాలు :

1. గ్రామంలో మత్స్య సేకరణకు కేటాయించబడిన మొత్తం భూమి వైశాల్యం
2. సగటు మత్స్య జ్వేత్రం పరిమాణం
3. అతి చిన్న మత్స్యజ్వేత్రం వైశాల్యం
4. అతిపెద్ద మత్స్యజ్వేత్రం వైశాల్యం
5. మత్స్య సంవర్ధనము, రొయ్య సంవర్ధనము మొదలైన వివరాలు.
6. జ్వేత్రము ఉపయోగపడే పద్ధతి (ఉదా: విత్తనాల ఉత్పత్తి, తినడానికి వీలుగా ఉండే సైజ్లో చేపల పెంపకం మొ||
7. ఏ ఏకకాల చేపలు రొయ్యలు పెంచుతున్నారు.
8. ఏక సంవర్ధనమా బహుళ సంవర్ధనమా చేపలు మాత్రం పెంచుతున్నారా, చేపలు రొయ్యలు కలిపి పెంచుతున్నారా.
9. నీటి నేల లక్షణాలు
10. చేపల శత్రువులను నిర్మూలించడానికి తీసి కొన్న చర్యలు
11. నీటి కలుపు మొక్కలను తీసివేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు
12. వేసిన ఎరువులు జీవసంబంధ నీర్జీవసంబంధ
13. నీటిలో నివసించే కీటకాల నిర్మూలనకు తీసికొన్న చర్యలు
14. అదనపు పోషక ఆహార వివరాలు ఏరేట్లో ఇస్తున్నది.
15. గమనించిన జబ్బులు-నాటి నివారణకు తీసికొన్న చర్యలు
16. హెక్టేర్ కు చేప రొయ్యల మొత్తం అభివృద్ధి
17. జాతి, జాతికి మొత్తం విత్తనాల ఉత్పత్తి.
18. హెక్టేరుకు, సంవత్సరానికి మొత్తం ఖర్చు
19. హెక్టేరుకు సంవత్సరానికి లాభం మొత్తం
20. హెక్టేరుకు సంవత్సరానికి నికర లాభం
21. ఫిషింగ్ గియర్ పని ఉపయోగించారు.
22. సాంప్రదాయక ఆధునిక పరికరాలు పారుదల సౌకర్యాలు
23. నీటి ఆధారాలు, మరుగునీటి పారుదల సౌకర్యాలు



పటం 19.22 పై ఓపెనింగ్ బాటమ్ బ్రాల్

బ్రాల్ లలో వివిధ వర్ణాలు a) ఓమ్ బ్రాల్ b) బుల్ బ్రాల్ c) ఆటర్ బ్రాల్. ఆటర్ బ్రాల్ చాలా వాడుకలో ఉన్నది. దీనిలో మళ్ళీ మూడు వర్ణాలున్నాయి. అవి మిడ్ వాటర్ బ్రాల్, సెమిపిలాజిక్ బ్రాల్, పై ఓపెనింగ్ బాటమ్ బ్రాల్.



పటం 19.23 కేరళ తీరంలోని బోట్ స్నె

సీన్ వలలు

దీనిలో వల ఒక చివరి భాగం ఒక నిర్దిత ప్రాంతం నుంచి ఖూట్ చేస్తారు. ఆ విధంగా కొంత ప్రాంతం అవరిస్తుంది. ఆ తరువాత దానిని తిరిగి ఈ ప్రారంభ ప్రాంతానికి తీసికొని వస్తారు. తరువాత గియర్ ను మొత్తం తీస్తారు. ఈ విధంగా తీరం నుంచి కాని నావసీన్ వలల నుంచి కాని ప్రథమంలో విసరవచ్చును. వీటికి సంచులుండవచ్చు లేక పోవచ్చు.

సరౌండింగ్ వలలు

దీనిలో ఒక చేపల గుంపు (పోల్) ను ఆవరించి, వైకి తీస్తారు. రింగ్ నెట్ లు. వర్వ్ సీన్ లు బాగా పరిచయమైన వలలు.

వర్వ్ సీన్

దీని ముఖ్య లక్షణం పర్వీంగ్. లాగే దారం పట్టి ఈడిస్తే మూతపడిపోతుంది. ఇది సంచికి దిగువ భాగంలో ఉంటుంది. దీనిని లీడ్ లైన్ అంటారు. ఆ విధంగా వల ముడుతలు పడి పోవడమో గుత్తులుగా చేరి పోవడమో అవుతుంది.

ii. వీటింగ్

నూలు దారంతో దోమ తెర సామగ్రితో షెడ్డుజాకార్ లేదా దీర్ఘ చతురస్రాకార పద్ధతిలో అల్లిక అయితే, ఆ అల్లిక అందరికీ తెలిసినదే. ముర్చిదాబాద్, లాల్ గోలా, మిడ్నపూర్ పద్ధతుల్లో లినో అల్లిక కనబడుతుంది. నైలాన్ వలకైతే సరళ అల్లిక కనబడుతుంది. నైలాన్ వలకైతే సరళ అల్లిక కనబడుతుంది.

iii. దారం

నూలు దారాల వలల్లో దారం కౌంటు 0-2 వెరకు ఉండే హేండ్లమ్ దారాలు వాడతారు. లాల్ గోలా, ముర్చిదాబాద్ పద్ధతుల్లో చిన్న మెష్లు ఉంటాయి. వీటికి సన్నని దారాలు వాడతారు. మిడ్నపూర్ వలలో ముతక దారం వాడతారు. ఇక నైలాన్ మోనోఫిలమెంట్ దారం మెష్ నైట్ను బట్టి మారుతుంది. చిన్న మెష్ల వలల్లో 0.02 సెం.మీ వ్యాసం దారాన్ని, పెద్ద మెష్ వలల్లో 0.04 సెం.మీ వ్యాసం దారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

19.15. గంచా

రెండు రకాల గంచాలను వాడుతారు.

i. మిడ్నపూర్ పద్ధతి

వీటిని సన్నని నూలు దారంతో అల్లుతారు. హేండ్లమ్ అల్లిక. ప్రచాలనంలో వీటి ఆకారం త్రికోణాకారంలో ఉంటుంది. అందువల్ల వీటిని త్రికోణాకార పద్ధతి అని అంటారు. ఒక ప్రక్క దీనిని ఉంగరానికి కడతారు. రెండో ప్రక్క రెండు తాళుతో దూరంగా రెండు వెదురు రాట్లకు కడతారు. సామాన్య కొలతలు 170 సెం.మీ. పొడవు, ఎత్తు 60 సెం.మీ. వర భాగం వెడల్పు 45 సెం.మీ. ఇది ఒక తొట్టెలాంటి వీటి జలాశయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇందులో చిక్కిన స్పాన్ స్వతంత్రంగా తిరగ గలుగుతాయి.

ii. ముర్చిదాబాద్ పద్ధతి

ఇది మిడ్నపూర్ పద్ధతి నుండి డిజైన్ లో మాత్రం మారుతుంది. వర భాగంలో ఒకే ఒక దారం దానిని పొడిగిస్తుంది. మాంక్ హూడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. అందుకే మాంక్ హూడ్ పద్ధతి అంటారు. వర భాగంలో వర్తెక్స్ ఆకారంలో ఉండడంవల్ల స్పాన్ నేకరణకు ఎక్కువ అవకాశం ఉండదు. కొలతలు ముందు దాని కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి. కాని నిష్పత్తి మాత్రం అదే విధంగా ఉంటుంది.

మస్లిన్ గంచా. మూడో పద్ధతి జాన్ పూర్ పద్ధతి వలలలోకి దీనిని కుడతారు.

ఉంగరం

కేన్ లేదా పచ్చి వెదురు చీలి ఈ ఉంగరాలను చేస్తారు. చుట్టూ జనుము లేదా సన్ హెంట్ తాడుతో రెండుసార్లు చక్కగా చుడతారు. వలకు కాడ్ చివర ఉంగరాన్ని అతుకుతారు. సాధారణ కొలత 20 - 25 సెం.మీ.

టావింగ్

వలలను సాధారణంగా టాన్ చేస్తారు. దీనికి సామాన్యంగా దొరికే టావింగ్ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

19.16. ఫిషింగ్ గియర్ లో ఉపయోగించే సామాగ్రి

అదర్భవంతమైన వల అంటూ ఏదీ ఉండదు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో వాతావరణానికి, చేప వివసింనే ప్రాంతాలకు అనుసరించి ఉంటుంది. అందువల్ల పరిష్కరించిన వల నిర్మించుకోవలసిన ఆవశ్యకత

ఎంతయినా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మొప్ప వలల సైజు చాలా ముఖ్యం. ఈ వల సామర్థ్యం దాని సాన్యతమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది తిరిగి దాని ఫ్లోట్లు, బరువుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ట్యూబుస్, దాని మందం, మెష్ సైజు, నిలువునా మెష్ల సంఖ్య, ఫ్లోట్లు తేలే లక్షణం, సింకర్లు, మొదలైనవి. వట్టేచేప, చేప నివసించే ప్రాంతాల లక్షణాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.

తేలిక రకం వలలు బజారులో లభ్యమయ్యే నూలు దారాలతో అల్లుతారు. వీటిని 3-6 వరకు కలిపి తిరిగి మందంగా ఉన్న దారాలుగా వేసుతారు. ఇంకా బలమైన ముతక వలలని సాధారణంగా జనుము నారలతో వేసుతారు. జనుము మొక్క (క్రొటలేరియా జిన్నియా).

అనుబంధ నిర్మాణాలు

వల సరియైన స్థితిలో ఉండడానికి ప్లవాలు, సింకర్లు కలిపి తోడ్పడతాయి. ప్లవాలు వలను పైకి లేపితే సింకర్లు దిగువకు ఉంచుతాయి. ప్లవాలను పాడ్రోపెలకు అతికి ఉంటాయి. ఇవి కార్కుతో కాని, కర్ర, పాస్టిక్, స్పాంజి, రబ్బర్ గ్లాస్ లేదా బోఫా లోహ నిర్మాణాలతో కాని ఎర్పరుస్తారు. ప్లవాలు సాధారణంగా గోళాకారంగాకాని, దీర్ఘ గోళాకారంలో కాని ఉంటాయి. బయట నుంచి వీటిని పెయింట్ చేస్తారు. కార్కుతోటి కర్రతోటి చేసిన వాటిని తారుపూసి వాటర్ప్రాఫ్ (తడి అంటుకుండా) చేస్తారు.

సింకర్లు పుట్ రోప్కి అతికి ఉంటాయి. ఇవి ఇనుము లేదా సీసముతో తయారుచేయడం చాలా మంచిది. రాళ్ళు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సిమెంట్ కాంక్రీట్తో కావలసిన సైజు ఆకారంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చును. అదే విధంగా లంగర్లు తగిన బరువు పదార్థంతో తయారు చేస్తారు. వలను లంగరువేసి అడుగునకాని, మధ్య మట్టాలలో కాని ఉంచితే, ఒక చిన్న వావను, స్తంభం జెండా ఉంచి, వల ఎక్కడవుందో గుర్తించు కొంటారు.

19.17 ఫిషింగ్ గియర్ పరిరక్షణ

సరియైన జాగ్రత్తలు ధక్షణ తీసికోకపోతే ఫిషింగ్ గియర్ నశించి పోవడానికి అవకాశాలున్నాయి. ఇది జరగడానికి చాలా అవకాశాలున్నాయి. యాంత్రిక రాపిడి అరుగుదల, వంగిపోవడం, సాగడం కారణంగా కొన్ని బాషలు దెబ్బ తిన వచ్చు. బూజు బాక్టీరియా వట్టి కుళ్ళి పోవచ్చు. చేపలు పట్టిన తరువాత వలకి చేపల జిగురు తదితర జీవ సంబంధ పదార్థాలు అతుక్కొంటాయి. ఆ రాత్రికి రాత్రి ఆ వలని అలా వదలకూడదు. ప్రవాహ నీటిలో (కొళాయి మొ.) దానిని శుభ్రంగా కడగాలి. అలా కడిగి ఆరవేయడం సాధ్యం కాకపోతే, బ్రెన్ నీటిలో ముంచి వేయాలి. లేదా ముతక ఉప్పు తగినంత దాని మీద జల్లాలి. వలను శుభ్రపరచడానికి కావర్ సల్ఫేట్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఎక్కువ కాలం సూర్యకాంతికి గురి చెయ్యడం కూడా మంచిది కాదు. అందువల్ల వాటి పని అయిపోగానే వాటిని కడిగి నీడలో ఆరవెయ్యాలి. తడి వలలు బాక్టీరియా నాశనానికి సులభంగా గురి అవుతాయి. బాగా గాలి బారే షెడ్లలో విడి విడిగా వేలాడ కట్టడం చాలా మంచి పద్ధతి. ఇక గుట్టలుగా పడవేయ వలసి వస్తే మధ్య మధ్య ఉప్పు చల్లడం అవసరం.

బాక్టీరియా చర్యలను, ఆ విధంగా చెడిపోవడాన్ని నిరోధించడానికి, ఈ వలను 'బార్న్' చర్యకు కృషి చేస్తారు. ఇందులో చాలా లూనింగ్ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు. అకేషియా, మాంగ్రోవ్లు, కరేల్ వుడ్ మొదలైన చెట్ల బెరడును నీటిలో మరిగించి వాటి డికాక్షన్ తీస్తారు. ఈ ద్రవాన్ని చల్లార్చి దానిలో వలను కొంతకాలం ముంచుతారు. ఎండ బెట్టిన తరువాత తిరిగి ఈ డికాక్షన్లో రెండవసారి ముంచుతారు. ఈ విధంగా ముంచడం ఎండబెట్టడంవల్ల సన్నని పొవరూపంలో లూనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. దారాలను బాక్టీరియా చర్యకు గురి కాకుండా నిరోధిస్తుంది. తరువాత వలను 1% పొటాషియమ్ డైక్రోమేట్తో చేర్చి రంగును స్థిరీకరిస్తారు.

10. సంబంధం ఉన్న విషయం గురించి అయినా మాట్లాడమని సభ్యులని కోరాలి.
11. సమస్యకు సంబంధించి కనబడే సమాధానాలు, పరిష్కారాలు సూచించమని సభ్యులని అడగాలి.
12. ఆ సమస్యకు తగిన సరియైన పరిష్కారం ఏదో సూచించమని సభికులనే కోరాలి.
13. ఈ పద్ధతిలో లోపాలేమయినా ఉంటే వాటి గురించి సభికులను ప్రస్తావించనియ్యాలి.
14. డెమాన్ స్ట్రీట్ చేసేవారు పట్టుకు మీరు తటస్థంగా ఉండాలి. ఏ ఒకరిని సమర్థించినట్లు, కనబడ కూడదు.
15. ఒకే కేస్ లోయినట్లుగా ప్రవర్తించకూడదు.
16. మత్స్య వ్యవసాయదార్ల అభిప్రాయాలలోని ముఖ్యాంశాలను "నోట్" చేసుకోవాలి.
17. చివర, చర్చలన్నిటినీ క్రిడీకరించాలి.

అప్రత్యక్ష పద్ధతులు

[i] బుల్లెటిన్లు, లిఫ్లెట్లు, పాంప్లెట్లు, ఫోల్డర్లు, న్యూస్ లెటర్లు

మత్స్య వ్యవసాయదారునితో సమాచార ప్రసారం చెయ్యడానికి పైవి సహాయపడతాయి. అయితే ఇవి చాలా వరకు చదువు నేర్చుకొన్న వారికే ఉపయోగపడతాయి. ప్రత్యక్ష పద్ధతులు మాత్రమే ఆ సందర్భంలో చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. అయితే పై సమాచార పత్రాలన్నిటినీ జాగ్రత్త చేసుకొని తగిన సమయంలో ఉపయోగించుకోవడాని అలాటి వ్యవసాయదారులకు అవసర పడవచ్చు. అనాడు కొత్త సాంకేతిక పద్ధతులు మెళకువలు ఉపయోగపడతాయి.

ఇలాంటి పత్రికల రచనకి ఉద్దేశాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి.

1. సమాచారం చాలా మంది వ్యక్తులకు ఒకేసారి తొందరలో అందుతుంది.
2. ఈ సమాచారం రాబోయే రోజుల్లో ఉపయోగపడడానికి వీలుంది.
3. ఇతర ప్రత్యక్ష పద్ధతులకు తోడుగా నిలుస్తాయి.
4. ఖచ్చితమైన, సులభంగా అర్థమయ్యే సమాచారాన్ని అందివ్వ గలుగతాము.
5. తక్కువ ఖర్చుతో, కొత్త పద్ధతుల అనుసరణకు తగిన విధంగా వ్యవసాయదార్లను ప్రభావితం చేయవచ్చు.
6. విద్యా వ్యాప్తి సాధ్యమవుతుంది.
7. వ్యక్తుల సంబర్ధంగా కాని, సామూహికంగా గాని వారు సాధించిన దానికి గుర్తింపు కలుగుతుంది.

అనుసరించవలసిన పద్ధతి

ఈ సందర్భంగా కొన్ని సూత్రాలు అనుసరించాలి. అవి:

1. ఏ ఏ విషయాల మీద సమాచారం అందించాలో తేల్చుకోవాలి. వాటిలో అతిముఖ్యమైన వాటిని ఎన్నుకోవాలి.
2. ఆయా క్షేత్రాలలో ఈ పద్ధతులు సులభతరంగా, అనుసరణీయంగా ఉన్న వాటినే ఎన్నుకోవాలి. వాటి సమాచారాన్నే ఇవ్వాలి.
3. క్లిష్టంగా ఉండే శాస్త్రీయ పదజాలం వాడకూడదు.
4. ఆయా విషయాలకు సంబంధించి ముఖ్యాంశాలను మాత్రమే ప్రర్యాకంగా చర్చించాలి.
5. ముఖ్యాంశాలను ఒక దాని తరువాత ఒకటి ఉదహరించు కొంటూరావాలి.

6. బొమ్మలు, పటాలు కూడా ఇస్తూ పాఠకులకు సులభంగా అర్థం అయ్యే విధంగా చెయ్యాలి.
7. పాఠకునికి సులభంగా ఉండే విధంగా పాఠాలకి కూడా పాడ్డింగ్లు పెట్టాలి.
8. సరళభాష, సామాన్య వాడుక పదాలు ఉండాలి.

(ii) వార్తావ్యాసాలు (News articles)

వార్తా పత్రికల ద్వారా, వార్తల రూపంలో వచ్చే సమాచారం చాలా మంది పాఠకులకు ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. అధిక సంఖ్యలో పాఠకులకు, అమిత కుతూహలం కలిగించే వార్తలు అతి ముఖ్యవార్తలుగా ఉంటాయి. జరుగుతున్న విషయాల గురించి షక్తిపాత రహితంగా, ఖచ్చితంగా ఈ వార్త వ్యాఖ్య ఉంటాయి. పాఠకులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి.

ఈ వార్తా వ్యాసాల ఉద్దేశం ఇలా ఉంటుంది.

1. పాఠకులలో ఉత్సాహాన్ని కలిగించడం
2. పాఠకులకు కావలసిన సమాచారం అందించడం.
3. అనుకూల వాతావరణం కలిపించడం
4. ఇతర విస్తరణ కార్యక్రమాలయిన సభలు, సమావేశాలు డిమాన్డ్స్ ప్రెషన్లకు బలం చేకూర్చడం.
5. ప్రత్యక్ష పద్ధతులకు ఆధారం కల్పించాలి.

అనుసరించవలసిన సూత్రాలు

వార్తావ్యాసాలు వ్రాసే సమయంలో ఈ క్రింది సూత్రాలు గుర్తుంచుకోవాలి.

1. విషయంలోని ముఖ్యాంశాలు ముందు రాయాలి.
2. సరళ భాష ఉపయోగించి, క్లిష్ట పద జాలం వదిలిపెట్టాలి.
3. స్వంత అభిప్రాయాలు చెప్పడం మంచిదికాదు.
4. ఖచ్చితంగా, క్లుప్తంగా న్యాయంగా అభిప్రాయాలు చెప్పాలి.
5. కుతూహలం కలిగే విధంగా విజ్ఞప్తులను చెయ్యాలి.
6. బొమ్మలు, పటాలు మొదలైనవి వెయ్యాలి.
7. ఆధునిక సాంకేతిక వివరాలు ఇవ్వాలి.
8. మీ పూర్తి అక్రెడ్న్ ఇవ్వాలి. దీని వల్ల ఇంకా సమాచారం కావాలనుకునే వ్యవసాయదార్ల మీకు వ్రాయడానికి వీలవుతుంది.

(iii) వ్యక్తిగత ఉత్తరాలు

చదవను, వ్రాయను నేర్చిన వ్యవసాయదారుల సందర్భంగానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. కొంత మంది వ్యవసాయదార్లు విస్తరణ సేవకులకు ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ కొంత సమాచారాన్ని కోరుతూ ఉంటారు. వ్యక్తిగతంగా పోయి కలుసుకోడానికి అవకాశం లేని సందర్భాలలో, విస్తరణ సేవకులు వ్యవసాయదార్లకు ఉత్తరాలు రాస్తారు.

మత్స్య వ్యవసాయదార్లు వ్రాసిన సమస్యలకు, విస్తరణ సేవకులు వెంటనే సమాధానం ఇవ్వాలి. పూర్తి సమాచారం అందించాలి. ఉత్తరంలో భాష సరళంగా దస్తూరితో స్పష్టంగా వ్రాయాలి. చిన్న చిన్న పదాలు, చిన్న వ్యాఖ్యలతో చదవడానికి వీలుగా అనుకూలంగా ఉండాలి. క్లిష్ట పదాలు వదిలి పెట్టాలి.

24. మత్స్య వ్యవసాయదారుల ఆర్థిక పరిస్థితి (పూర్వకాలిక దీర్ఘకాలిక అప్పులు, అప్పుతీసికొన్న అసలు మొ||).
25. అప్పు తీసికొని రావడానికి ఆధారాలు, అవకాశాలు
26. క్షేత్రంలోని కూలీల సమస్యలు
27. నిలువ చెయ్యడానికి లభ్యమయ్యే అవకాశాలు
28. చేప, రొయ్యలకు అవసరమైన రవాణా సౌకర్యాలు
29. అమ్మకపు అవకాశాలు

విస్తరణ కార్యకర్తలు, గ్రామస్థాయి సేవకులు [VLW] బ్లాక్ డెవలప్ మెంట్ అధికార్లు, గ్రామ సేవకులు, అక్కడి గ్రామ పంచాయత్, కోఆపరేటివ్ సంస్థలు, బడులు గ్రామీణ యువజన క్లబ్ లను మరింత బలాన్ని చేకూర్చాలి. వారు సమాచారాన్ని సేకరించి కుటుంబస్థాయి, గ్రామస్థాయి, బ్లాక్ స్థాయిల్లో నిర్మాణ కార్యక్రమాలని చేపట్టాలి. స్థానిక సమస్యలు ప్రాధాన్యతను బట్టి పని ముఖ్యమో గుర్తించడానికి వీలుగా విస్తరణ కార్యకర్తలు నాయకులుగా ముందుకు రావాలి. వీరు సేకరించిన వివరాలు గ్రామ పంచాయత్ కు కాని, పంచాయత్ సమితికి కాని బ్లాక్ కు కాని పంపి సమీక్ష జరిగేటట్లు చూడాలి. దీనినిబట్టి ఏ సమస్యలకి ప్రాధాన్యత నివ్వాలి సంస్థలు నిర్ణయించుకొంటాయి.

3. కార్యక్రమ ఉద్దేశ్యాలు

విస్తరణ కార్యకర్తలు, గ్రామస్థులలో సంప్రదించి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకొనే ముందు, ఈ విస్తరణ కార్యక్రమ ఉద్దేశం ఏమిటో నిర్ణయిస్తారు. కుటుంబానికి సంబంధించి గ్రామ పంచాయత్ ఈ విస్తరణ కార్యక్రమం గురించి నిర్ణయించాలి. ఈ కార్యక్రమంలోని ముఖ్య అంశాలను ప్రత్యేకంగా చూపించాలి. ముఖ్యంగా కాలర్ల విషయంగా సామాజిక, ఆర్థిక మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

4. సమస్యల వివరాలు

కార్యక్రమాలని రూపొందించుకోవడంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వీటిని మూడు వర్గాలుగా విభజించవచ్చును. ఒకటి తమ వనరులను ఉపయోగించుకొని గ్రామస్థులే పరిష్కరించుకోగలిగిన సమస్యలు. రెండు బయట నుంచి ఎక్కువగా అవసరం లేకపోయినా సమాజం మొత్తం సహకారంతో పరిష్కరించుకోగలిగిన సమస్యలు. ఇక మూడవది అధికవ్యయం అవసరమయి, సాంకేతిక సహకారం కావలసి వచ్చినపుడు బయట సహకారం కోరుకోవలసినవి.

5. సమస్యల పరిష్కారం

కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకోవడంలో ఎదురయ్యే సమస్యల పరిష్కారానికి, విస్తరణ కార్యకర్త సహకారం తీసికోవాలి. సమస్యలను పరిష్కరించుకొనేటప్పుడు సులభసాధ్య రీతిలో, ఆర్థిక భారం మించకుండా చూసుకోవాలి. తనకు తాను ఈ సమస్యను తీర్చలేని సందర్భాలలో విస్తరణ అధికారి, తగిన సాంకేతిక నిపుణుల సహకారాన్ని కోరాలి. వీలయితే గ్రామస్థుల సమ్మతంలో ఆ నిపుణులు సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా చూసుకోవాలి.

6. ప్రాధాన్యతను బట్టి సమస్యల పరిష్కారం

కార్యక్రమ రూప కల్పనలో కనబడే అన్ని సమస్యలను ఒకేసారి పరిష్కరించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒక క్రమంలో ఒక దాని తరువాత ఒకటిగా వీటిని చేదించాలి. అతి ముఖ్య సమస్యలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. దీని వల్ల చెప్పకోదగినంత సాధించిన వారిమవుతాము. ఈ కార్యక్రమం వల్ల లభ్యమయ్యే ఉపయోగాల గురించి మత్స్య వ్యవసాయదారులకు సమ్మిక కుదురుతుంది.

7. క్రియాశీల కార్యక్రమ పథకము

సమస్యల పరిష్కార సందర్భంగా క్రియాశీల కార్యక్రమ పథకాన్ని రూపొందించుకోవాలి. [Plan of activities]. కొన్ని ఆశయాలను సాధిద్దామని నిర్ణయాలు ఇది వరకే తీసికొని ఉంటాము. వీటిని

సాధించడానికి చెయ్యవలసిన కార్యక్రమాలను ఒక పట్టిక రూపంలో తయారుచేసుకోవాలి. విస్తరణ అధికార్థ సహాయంతో గ్రామ పంచాయతీలు మండలాలు కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోవాలి.

8. బాధ్యతలను అప్పగించడం

విస్తరణ కార్యక్రమ పథకంలోని బాధ్యతలను వ్యక్తులకు, కొన్ని సంఘాలు లేదా కొంత మంది వ్యక్తుల సమూహాలకు అప్పగించాలి. ఈ విషయంగా విస్తరణ అధికారి చొరవతీసికోవాలి. ఆయా వనిని బట్టి, వ్యక్తుల పూర్వ అనుభవాన్ని సామర్థ్యాన్ని బట్టి వనులను తగిన వారికి అప్పగించాలి.

9. కార్యక్రమాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం

ప్రతి అంశాన్ని ఒక్కొక్క మెట్టు క్రమంగా ముందుకు తీసుకొని పోతూ యావత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి. ఇందులో విస్తరణ కార్యకర్తలు, VLWలు, స్థానిక సంస్థలు బ్లాక్ డెవలప్ మెంట్ అధికార్థ పంచాయతీ సమితులు పాల్గొనాలి. ఇక ఎరువులు, కలుపు మొక్కల సంహారక మందులు, క్రిమి సంహారక మందులు, చేపరొయ్య విత్తనాలు, అదనపు ఆహార సదుపాయాలు, వలలు, దృశ్య శ్రవణ పరికరాలు, లిటరేచర్ అందించడానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి. విస్తరణ కార్యక్రమం ఆచరణలోకి పెట్టబోయే ముందు, శిక్షణ శిబిరం నిర్వహించవలసి వస్తుంది. ముందుగా స్థానిక నాయకులను, మత్స్య వ్యవసాయదారులను సంప్రదించిన తరువాత ఆచరణ అమలులో పెట్టాలి.

10. కార్యక్రమ ఆచరణ అమలులోని క్రియాశీలతను సరి చూడడం

ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో జరిగే ప్రతి అంశానికి సంబంధించి తగిన రికార్డులురాసి పెట్టుకొని ఉండాలి. ప్రతి సమగ్రమైన ప్రణాళికకు ఇది అవసరం. భావిలో కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోడానికి ఇది ఆధారంగా ఉంటుంది. కార్యక్రమ సాఫల్యతను అంచనాలు వేసుకోవచ్చును. ఎంతవరకు మన ఆశయాలు సాధించగలుగుతామో తెలుసుకోడానికి ఇలాంటి అంచనాలు వేసుకోవాలి. దీని వల్ల విస్తరణ కార్యక్రమం ఎంత సమర్థవంతంగా నడిచిందో తెలుస్తుంది. ఏమైనా మార్పులు చేయవలసి వస్తే దీని వల్ల విస్తరణ కార్యక్రమం ఎంత సమర్థవంతంగా నడిచిందో తెలుస్తుంది. ఏమైనా మార్పులు చేయవలసి వస్తే దీనివల్ల తేలిపోతుంది. అక్కడిప్రజల అవసరాలు ఏమిటో కూడా దీనివల్ల గ్రహింపుకు వస్తాయి.

11. అభివృద్ధి సమీక్ష


మత్స్య వ్యవసాయదారుల సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో తేడాలుంటాయి. అందువల్ల కార్యక్రమంలోని ప్రతి ఘట్టాన్ని సమీక్షించాలి. బ్లాక్లు, సహకార సంస్థలు, పంచాయతీ సమితులు వంటి సంస్థలు ఈ కార్యక్రమ పురోభివృద్ధిని సమీక్షించాలి. ఒక గ్రామంలో ఒక కార్యక్రమం విజయవంతమైతే దానిని వక్క గ్రామానికి విస్తరింపజేయాలి. అయితే ఆ గ్రామంలోని అవసరాలు స్థితిగతులు కూడా గమనించాలి. వ్యవసాయదారులు కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలను తీరస్కరించవచ్చు. వీటికి గల కారణాలను తెలుసుకొని వాటిని కూడా సమీక్షించాలి.

స్వపరిశీలన


1. డింగి నౌకను గురించి వ్రాయుము.

20.6 సారాంశం

చేపల పరిశ్రమాభివృద్ధికై విస్తరణ పథకములు, విధానములను గురించి ఇక్కడ వివరించబడినది. ఈ విధానమువల్ల చేపల ఉత్పత్తికై తీసుకోవలసిన మెళుకువలు తెలుసుకోవచ్చును. మత్స్య పరిశ్రమ అభివృద్ధికై అనేక మంది సిబ్బంది అనేక నిర్ణయములను వివరించెదరు. వీరి నిర్ణయములలో ముఖ్యమైనవి పల్లె ప్రజలతో సామూహిక సభలు, సమావేశములు, వార్తాపత్రికల ద్వారా చేపల పరిశ్రమాభివృద్ధి దాని



పటం 19.13 క్రాస్ బా




పటం 19.14 వెల్టెడ్ బా

గాయ పరిచే గియర్


ఈటెలు, హార్పూన్లు రకరకాలవి, క్లాంప్లు, టాంగ్లు, తుపాకులు ఈజాబిటాలోకి వస్తాయి.

పటం 19.15 ఒక రకం చేపగాలం


1. కన్ను 2. పొంక్
3. ముళ్ళతో అంత్యభాగం 4. వంపు



పటం 19.16 రకరకాల గాలాలు




పటం 19.6 పాడైన తీగలు (త్రేన్లు) వాటి కోళ్ళు



పటం 19.22 పై ఓవెనింగ్ బాటమ్ ట్రాల్

ట్రాల్స్‌లో వివిధ పద్ధతులు a) ఓవ్ ట్రాల్ b) బుల్ ట్రాల్ c) ఆటర్ ట్రాల్. ఆటర్ ట్రాల్ చాలా వాడుకలో ఉన్నది. దీనిలో మళ్ళీ మూడు పద్ధతులన్నాయి. అవి మిడ్ వాటర్ ట్రాల్, సెమిపిలాజిక్ ట్రాల్, పై ఓవెనింగ్ బాటమ్ ట్రాల్.



పటం 19.23 కేరళ తీరంలోని బోట్ సీన్

సీన్ వలలు

దీనిలో వల ఒక చివరి భాగం ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం నుంచి ఘోల్ చేస్తారు. ఆ విధంగా కొంత ప్రాంతం అవరిస్తుంది. ఆ తరువాత దానిని తిరిగి ఈ ప్రారంభ ప్రాంతానికి తీసికొని వస్తారు. తరువాత గియర్‌ను మొత్తం తీస్తారు. ఈ విధంగా తీరం నుంచి కాని నావసీన్ వలల నుంచి కాని ప్రథమంలో విసరవచ్చును. వీటికి సంఘటించవచ్చు లేక పోవచ్చు.

సరౌండింగ్ వలలు

దీనిలో ఒక చేపల గుంపు (పోల్) ను ఆవరించి, పైకి తీస్తారు. రింగ్ నెట్‌లు. వర్ప్‌సీన్‌లు బాగా పరిచయమైన వలలు.

వర్ప్‌సీన్

దీని ముఖ్య అక్షణం పర్పింగ్. లాగే దారం పట్టి ఈడిస్తే మూతపడిపోతుంది. ఇది సంచికి దిగువ భాగంలో ఉంటుంది. దీనిని లీడ్‌లైన్ అంటారు. ఆ విధంగా వల ముడుతలు పడి పోవడమో గుత్తులుగా చేరి పోవడమో అవుతుంది.

డైక్	: పాడవాటి అనకట్టు
ఇకలాజికల్ సన్	: ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో జీవి నిర్వహించే పాత్ర. అందులో ఎన్నో ఇతర జాతుల జీవులుంటాయి. ఇండియాలో కట్టకట్ట ఇంటు ప్లవకావారి; అరిస్టిక్టన్ నోబిలిస్ చైనాలో.
ఇస్సువరీ	: నదీముఖం - నది, సముద్రాన్ని కలిసే చోటు - అలలు ఉప్పదనం హెచ్చుతగ్గులు.
యూట్రాఫికేషన్	: ఎక్కువలోతు, స్వచ్ఛమైన నీటి ప్రాంతం, తక్కువ ఉత్పాదకత ఉండి క్రమంగా తక్కువ లోతయి ఎక్కువ ఉత్పాదకత పొంది చివరకు శుష్క భూమిగా మారడం.
ఎక్స్‌పోజెట్	: బహిష్కరణదాంగం (రొయ్య ఉపాంగం)
ఎక్స్‌పోజర్	: విదేశీయ - చేపలను ప్రవేశ పెట్టడం
పాకుట్టెట్ పారసైట్	: కొన్ని కారణాల వల్ల పరాన్న జీవనం జరపడం
పెకండిట్	: ఒక కాలంలో చేపలలో, రొయ్యలలో గుడ్లు పెట్టే సామర్థ్యం (పరిపక్వ అండాలు చాలా ఉండడం).
పెరుజినస్	: ఇసుమువల్ల కలుషితమయేది.
ఫిల్లెట్	: చేప వెన్నెముకకు సమాంతరంగా ఉండే కండర చారలు.
ఫిష్ కిల్	: చేప చావు ఆక్సీజన్ లోటు, విషపానం, సాంక్రామిక వ్యాధులవల్ల చేపల రాశి చావడం
ఫిష్ సీడ్	: చేప శారు-పొదిగిన పసితనంలో ఉండే పసిచేపలు, చిరుచేప.
ఫ్రై	: పసిచేప -లార్యాడింభక దశ దాటిన చేప
గ్లనరైడ్‌లు	: కొవ్వు అమ్లాల ఎస్టర్‌లు, గ్లిసెరాల్
గువ్వాల్	: పడవ పక్క భాగంలోని పై అంచు
హచ్‌లింగ్	: పొదిగిన చేప - ఫలదీకరణం చెందిన అండం నుండి అప్పడే వెలువడిన డింభకం.
హార్మినైడ్	: వృక్ష సంహారకాలు - ముఖ్యంగా కలుపు మొక్కల నిర్మూలనకువాడే రసాయనికాలు
హార్మోరస్ ఫిష్	: శాకాహార చేప
హల్	: పడవ చట్రం.
ఇంఫాడ్ మెంట్	: అనకట్టతో ఏర్పడే కృత్రిమ జలాశయం
ఇన్సెక్టువన్ డిసిన్	: సాంక్రామిక వాధులు.
ఇంటర్ స్పెసిఫిక్	: జాత్యాంతర - వేర్వేరు జాతుల మధ్య ఉండే సంబంధం
ఇంట్రాస్పెసిఫిక్	: అంతజాతి-ఒకే జాతి జీవుల మధ్య సంబంధం
క్రీల్	: పడవ కింది భాగంలో ఉండే ముక్యఅధారం కల్పించే కిర్ర.
లాబ్ లాబ్	: కుళ్ళిన ఆకుపచ్చ, నిల్లిపచ్చ శైవలాలు, డయాటమ్ ప్రోటోజోవా, బాక్టీరియాలతో కూడిన జీవరాశుల సంక్లిష్టం
లివింగ్	: కొట్టుకొని పోవడం

లలియన్

నాస్తియన్

అసియన్

పారామిటర్లు

పెరెసియల్

పెరియోడ్లు

పి. షాన్

పాగోసిటెడ్

ఫైటోప్లాంట్స్

స్లియోపోడ్లు

పొలిమరైజేషన్

ప్రాఫైలాక్టిక్

రాష్ట్ర

రామింగ్

రాన్సిడిటీ

రిక్రూట్ మెంట్

రిలేటివ్ కండిషన్

సాహసఫీకేషన్

సేపేక్

సెలేక్

సిల్టేటియర్

స్కిమ్మర్

స్టాంపుస్

స్టాకింగ్

స్ట్రక్

స్ట్రాకింగ్ రేట్

: గాయాలు

: క్రస్టీషియా జీవులలో కలిగే మొదటి డింభకదశ.

: అస్థిమయం - (ఎముకల గూడు)

: కారకాలు, ప్రభావితం చేసే విషయాలు అంశాలు

: ఏదాది పొడుగు - సంవత్సరాంతం

: వక్రభాగాన్ని అతికి ఉండే రొయ్య ఉపాంగాలు

: హైడ్రోజన్ అయాన్ల శాధత.

: శోషణం - భక్షణం

: సూర్యరశ్మిలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ నిర్వహించే, పత్ర హరితంతో ఉండే సూక్ష్మజీవులకాలు, వృక్షజీవులకాలు

: రొయ్య ఉదర భాగం కింద ఉండే ఉపాంగాలు

: ఒక రసాయనిక చర్య-చిన్న అణువులు ముద్దగా ఏర్పడడం లేదా చిన్న అణువులు చేరినందువల్ల అసంఖ్యాక అణువుల భారంతో ఉండే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరచడం

: ముందు జాగ్రత్త

: బల్ల కట్టు-చెట్ల మొద్దులతో తయారయే పడవ

: దిమ్మినకొట్టడం - ఇనుప లేదా కర్ర మొద్దులతోనెలను చదునుచేయడం.

: అసహ్యకరమైన వాసన

: చిన్న తరహా చేపల సమూహంలో కొత్త చేపలను అదనంగా చేర్చడం

: చూసిన చేప, లేదా రొయ్య బరువును లెక్క కట్టిన బరువుతో విభజించడం, చేప పొడవు, బరువుల నుండి సంగ్రహించినది.

: జ్వరంతో జరిగే జలవిశ్లేషణ

: చిద్రత ఇనుక లేదా బురద నుండి నీరు కారిపోవడం

: మేతను గుఱ్ఱగా మార్చడం. ఇది వాయు రహిత ఆమ్ల కిణ్వప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది నిలువ చేపలకు ఆహారం

: బహు సూక్ష్మమైన అవసాదనాల కూడిక. దీనిలో శిలల బంక మట్టి కణికలు ఉంటాయి.

: ద్రవం మీది తలంపైన తేలే పదార్థాలను తీసి వేయడం

: నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించి, క్రమబద్ధం చేసే తలుపు-తూము

: క్రమంహితంగా వేర్వేరు పొదిగిన చేపలు

: గట్టిగా, వాడిగా ఉండే కర్రలు. భూమిలోపాతి స్తంభం లేదా ఊత మాదిరిగా పనిచేస్తాయి.

: ఒక పరిమాణ విస్తీర్ణం నుండి విడుదల చేసిన చేపల సంఖ్య

ప్రెస్సర్స్
టెల్ఫన్

టాక్సిసిటీ

టర్నిడిటీ

వార్నింగ్

వియర్

జాప్లాంక్టాన్

- : ప్రతి కూలవాతావరణస్థితి
- : వాలఖండము-రొయ్య ఉదరభాగం పరాంత చివర ఉండే త్రికోణాకార భాగం
- : విషప్రభావం
- : బురద నీరు కాంతి చొరనీయని నీరు
- : చేపలు పట్టడానికి ఉపయోగించే పాడవాటి తాళ్ళు.
- : నదికి అడ్డంగా నీటి ప్రవాహాన్ని అడుపు చేయడానికి కట్టే గోడలేదా ఆ మాదిరిగా ఉండే నిర్మాణం
- : జంతుప్లవకాలు-నీటిపై తేలే సూక్ష్మ జంతువులు, చిన్న ప్రౌఢ జంతువులు, కొన్ని జలచర జంతువుల డింభకాలు.

BRAOU

డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
జంటుశాస్త్రం

కోర్సు-IV : మత్స్యశాస్త్రం

మాదిరి పరీక్షా పత్రం

Time : 3 Hours]

[Max. Marks : 75

[Min. Marks : 27

సెక్షన్ - ఎ

3 x 15 = 45

గమనిక: ఈ క్రింది వాటిలో ఏదైనా మూడు ప్రశ్నలకు
30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

ప్రతి ప్రశ్నకు 15 మార్కులు

1. మన దేశంలో చేపల రవాణాలో ఇటీవల సాధించిన పురోభివృద్ధిని వర్ణించండి.
2. చేపల వలస గురించి వ్రాయుము?
3. ఒక కుంటలో జరిగే మిశ్రమ సంవర్ధనానికి చెందిన ఖర్చులు, రాబడి గూర్చి వివరింపుము?
4. గాలిపీల్చే చేపల నారును పెంచే పద్ధతులను విశద పరుచుము?
5. సహజ సిద్ధమైన ముత్యములు ఏర్పడు విధానమును, సంవర్ధన ముత్య పరిశ్రమ పద్ధతులను వర్ణించుము?
6. భారతదేశంలో చేపల పెంపకములో అనాదిగా యున్న చరిత్రను క్లుప్తంగా వ్రాయుము?

సెక్షన్ - బి

5 x 6 = 30

ఈ క్రింది వాటిలో ఏదైనా ఐదు ప్రశ్నలకు
10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

ప్రతి ప్రశ్నకు 6 మార్కులు

7. చేప-బాతుల సంవర్ధనమును వివరింపుము?
8. భారతదేశ సంపదలో మత్స్య సంవర్ధన పాత్ర
9. ఉప్పు కయ్యల క్షేత్రాలకు అనువుగాయున్న రొయ్యల చేపల గురించి వ్రాయుము?
10. చేపలను ఎండబెట్టే పద్ధతులను తెలుపుము?
11. చేపల తాజాదనాన్ని ఏ విధంగా పరిశీలించెదవు?
12. పాలచేపకు గుర్తింపు లక్షణాలను తెలుపుము?
13. హవరీ పారిశుధ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమమును గూర్చి సంగ్రహంగా వ్రాయుము?
14. చేపలలో అంటు లక్షణములు లేని రోగాలు
15. కుంటలలో సున్నం వేయడం
16. చేపకుంట సంవర్ధనానికి ఎంపిక చేసిన స్థలం లక్షణాలు.

BRAOU

డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
జంతుశాస్త్రం

కోర్సు-IV : మత్స్యశాస్త్రం

అభ్యాసం - 2

గమనిక :

1. విద్యార్థులు పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి యథాతథంగా జవాబులు రాయకూడదు.
2. స్వంత వాక్యాల్లోనే జవాబులు రాయాలి.
3. ఉల్లేఖనాలు సవివరంగా సూచించాలి.
4. అభ్యాసం రాయడానికి అరరావు కాగితాలు ఉపయోగించాలి.
5. తగినంత మార్జిన్ పరిక్షకుల సూచనల నిమిత్తం కేటాయించాలి.
6. ఈ అభ్యాసం పూర్తిచేయడానికి రెండు గంటలు ఉపయోగించాలి.

I. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మసల్ సంవర్ధన గురించి వ్రాయుము?
2. మన దేశంలోని వివిధ మత్స్య నావలు ఏవోతెల్చి వాటిని క్లుప్తంగా వర్ణింపుము?
3. 'స్పాన్' సేకరణలో ఉపయోగించే గియర్ను వర్ణింపుము?

II. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. పాలచేప గుర్తింపు లక్షణాలను తెలుపుము?
2. చేపనారు బంగిల తయారీ, రవాణా పద్ధతులను వర్ణింపుము?
3. చేపల తాజాదనాన్ని ఏ విధంగా పరిశీలించెదవు?

BRAOOU

డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

జంతుశాస్త్రం

కోర్సు-IV : మత్స్యశాస్త్రం

అభ్యాసం - 3

గమనిక :

1. విద్యార్థులు పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి యథాతథంగా జవాబులు రాయకూడదు.
2. స్వంత వాక్యాల్లోనే జవాబులు రాయాలి.
3. ఉల్లేఖనాలు నవీకరణగా సూచించాలి.
4. అభ్యాసం రాయడానికి అరరావు కాగితాలు ఉపయోగించాలి.
5. తగినంత మార్కిన్ పరీక్షకుల సూచనల నిమిత్తం కేటాయించాలి.
6. ఈ అభ్యాసం పూర్తిచేయడానికి రెండు గంటలు ఉపయోగించాలి.

I. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మన దేశంలో చేపల రవాణాలో ఇటీవల సాధించిన పురోభివృద్ధిని వర్ణించండి?
2. చేపల పరిరక్షణలో అనుసరించే రిఫ్రీజరేషన్, ఫ్రేజింగ్ ల వివిధ పద్ధతులను తెలుపుము?
3. కానింగుకు ముందుగా ముడిసరుకు (చేపలు)ను ఏ ప్రాథమిక క్రియలకు లోను చేస్తారో వివరింపుము?

II. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. భారతదేశంలో చేపల పెంపకములో అనాదిగా యున్న చరిత్రను క్లుప్తంగా వ్రాయుము?
2. కుంటలో సున్నం వేయడం
3. మత్స్య పరిశ్రమ విస్తరణలోని ఆశయాలు.

BRAOU

డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం

బి.యన్.సి. మూడవ సంవత్సరపు పాఠ్యప్రణాళిక

మత్స్య శాస్త్రం, కోర్సు - 4

మత్స్యశాస్త్రం : భారత దేశములోని మత్స్య శిక్షణా సంస్థలు

- : చేపలు వలస
- : సకళేరుక చేప - అంతర్భాగ మండలం
- : చేపల పెంపకం - పరిచయం చరిత్ర, ప్రస్తుతస్థితి, వృత్తి వనరులు.
- : పెంపకానికి చేపల, రొయ్యల జాతుల ఎంపిక, వాటి వర్గీకరణ, గుర్తింపు లక్షణాలు.
- : ఆహార సేకరణ పెరుగుదల, నిడివి - బరువుల సంబంధం, ముఖ్యమైన చేపల, రొయ్యల ప్రజననం అలవాట్లు
- : సంవర్ధిత చేపల, రొయ్యల జీవిత చరిత్ర, గుడ్లు, డింభక దశలు
- : సహజ వనరుల నుండి చేపనారు, సేకరణ, బండాలలో ప్రజననము
- : ప్రేరేపిత ప్రజననము, హాచరీవ్యవస్థ, చేపనారు రవాణా.
- : చేపకుంటు స్థలం ఎంపిక, రూపకల్పన, కుంటల నిర్మాణం
- : నీటికుంట నీరు, నేల లక్షణాలు, ఆహారపు గొలుసు, ఉత్పాదకత
- : కుంట నిర్వహణ
- : మంచినీటి జలజంతు సంవర్ధన వ్యవస్థలు
- : తీరప్రాంత జల సంవర్ధన, సముద్ర సంవర్ధన వ్యవస్థలు
- : మత్స్య పోషణ, ఆరోగ్యస్థితి, పరిశీలన, పోషణ అవసరాలు, అదనపు ఆహార సదుపాయాలు
- : చేపల రోగాలు, కారణాలు అదనపు చర్యలు
- : సాంకేతిక మత్స్య విజ్ఞానము పరిరక్షించడం, (ప్రిజర్వేషన్) (ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్ స్ఫార్మేషన్ (చేరవేత).
- : సహవదార్థాల ఉత్పత్తి
- : నావలు, గియర్
- : చేపల పరిశ్రమ విస్తరణ, చేపల సంవర్ధన, ప్రోత్సాహం, విస్తరణ వద్దతులు, విస్తరణ పథకాలు.

BRAOU

డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
జంతుశాస్త్రం

కోర్సు-IV : మత్స్యశాస్త్రం

అభ్యాసం - 1

గమనిక :

1. విద్యార్థులు పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి యథాతథంగా జవాబులు రాయకూడదు.
2. స్వంత వాక్యాల్లోనే జవాబులు రాయాలి.
3. ఉల్లేఖనాలు సవివరంగా సూచించాలి.
4. అభ్యాసం రాయడానికి అరకాపు కాగితాలు ఉపయోగించాలి.
5. తగినంత మార్టిన్ పరీక్షకుల సూచన విమిత్రం కేటాయించాలి.
6. ఈ అభ్యాసం మూర్తిచేయడానికి రెండు గంటలు ఉపయోగించాలి.

I. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. సహజ సిద్ధమైన ముత్యములు ఏర్పడు విధానమును సంవర్ధన మత్స్య పరిశ్రమ వర్ధతులను వర్ణించుము?
2. 'బంధము' అంటే ఏమిటి? బంధాలు ఏ విధంగా కార్పూల ప్రజనానికి దోహదం చేస్తాయో వివరింపుము?
3. భారతదేశంలో చేపల పెంపకంలో అనాదిగా యున్న చరిత్రను క్లుప్తంగా వ్రాయండి?

II. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. చేపలను ఎండబెట్టే వర్ధతులను తెలుపుము?
2. మత్స్య నావలు
3. పోషణ కుంటలలో పసి చేపల విడవడం గురించి వ్రాయుము?

BRAOU

డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం
జంతుశాస్త్రం

కోర్సు-IV : మత్స్యశాస్త్రం

అభ్యాసం - 2

గమనిక :

1. విద్యార్థులు పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి యథాతథంగా జవాబులు రాయకూడదు.
2. స్వంత వాక్యాల్లోనే జవాబులు రాయాలి.
3. ఉల్లేఖనాలు సవివరంగా సూచించాలి.
4. అభ్యాసం రాయడానికి అరరావు కాగితాలు ఉపయోగించాలి.
5. తగినంత మార్కిన్ పరీక్షకుల సూచనల నిమిత్తం కేటాయించాలి.
6. ఈ అభ్యాసం పూర్తిచేయడానికి రెండు గంటలు ఉపయోగించాలి.

I. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 30 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. మసల్ సంవర్ధన గురించి వ్రాయుము?
2. మసల్ చేశంలోని వివిధ మత్స్య నావలు ఏవోతెల్పి వాటిని క్లుప్తంగా వర్ణింపుము?
3. 'స్పాన్' నేకరణలో ఉపయోగించే గియర్ను వర్ణింపుము?

II. ఈ కింది ప్రతి ప్రశ్నకు 10 పంక్తులలో సమాధానం రాయండి.

1. పాలచేప గుర్తింపు లక్షణాలను తెలుపుము?
2. చేపనారు బంగిల తయారీ, రవాణా పద్ధతులను వర్ణింపుము?
3. చేపల తాజాదనాన్ని ఏ విధంగా పరిశీలించెదవు?

BRAOOU